



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103845557 A

(43) 申请公布日 2014.06.11

(21) 申请号 201210521348.6

(22) 申请日 2012.12.07

(71) 申请人 张朝军

地址 537628 广西壮族自治区博白县顿谷镇
石坪村马支石队

(72) 发明人 张朝军

(51) Int. Cl.

A61K 36/889 (2006.01)

A61K 36/896 (2006.01)

A61P 19/08 (2006.01)

权利要求书1页 说明书1页

(54) 发明名称

一种续断接骨粉及其制备方法

(57) 摘要

一种续断接骨粉及其制备方法,主要由下列按重量配比的药物制成:续断 50-60 份、乳香 20-30 份、没药 20-30 份、川乌 10-20 份、草乌 10-20 份、血竭 10-15 份、38 度纯米酒 5-8 份。本发明按君、臣、佐、使选药配伍,配方科学,疗效确切,对骨折、跌打损伤、骨质增生、腰椎及颈椎病均有疗效。

1. 一种续断接骨粉其特征在于,主要由下列按重量组份配比的药物制成:续断 50-60 份、乳香 20-30 份、没药 20-30 份、川乌 10-20 份、草乌 10-20 份、血竭 10-15 份、38 度纯米酒 5-8 份。

2. 根据权利要求 1 所述的一种续断接骨粉其特征在于,它的优选配方为:续断 60 份、乳香 10 份、没药 25 份、川乌 15 份、草乌 15 份、血竭 10 份、38 度纯米酒 8 份。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的一种续断接骨粉其特征在于,它的生产步骤如下:

(1) 选料:选取续断 60 份、乳香 10 份、没药 25 份、川乌 15 份、草乌 15 份、血竭 10 份、38 度纯米酒 8 份。

(2) 干燥:把上述药物在 40-50 度温度下用干燥机干燥;

(3) 粉碎:将续断、乳香、没药、川乌、草乌、血竭粉碎过 100 目筛;

(4) 装瓶:将上述已粉碎混合的药物装瓶备用。

4. 根据权利要求 3 所述的一种续断接骨粉,其特征在于:用于接合断骨、骨折时,将药物与小鸡仔捣碎外敷患处,外用木片或竹片固定;用于治疗骨质增生、腰椎及颈椎病时将药与酒拌匀后外涂擦即可。

一种续断接骨粉及其制备方法

[0001] 技术领域本发明属于中药技术领域,特别涉及一种续断接骨粉及其制备方法。

[0002] 背景技术目前,交通工具迅速发展给人们带来了极大便利,同时车辆川流不息也导致交通事故的发生,各种骨折、骨错位患者接踵而来,固而需要续断骨、接碎骨、还原骨位康复病人。除此之外,由于当前人们在饮食及工作等方面不注意,也引起了颈椎、腰椎等骨科疾病的产生;而市场上治疗此类疾病的药物多为西药,副作用大,人们不喜欢使用。

[0003] 发明内容本发明为解决上述问题不足而提供一种以中药续断为主的一种续断接骨粉,本发明还同时提供了其煎煮的制备方法。

[0004] 本发明所述的续断接骨粉,主要由下列按重量组份的药物制成:续断 50-60 份、乳香 20-30 份、没药 20-30 份、川乌 10-20 份、草乌 10-20 份、血竭 10-15 份、38 度纯米酒 5-8 份。其优选配方为:续断 60 份、乳香 10 份、没药 25 份、川乌 15 份、草乌 15 份、血竭 10 份、38 度纯米酒 8 份。

[0005] 上述组方按中医方剂学的君、臣、佐、使配伍,以主药续断为君药;乳香、没药为臣药;川乌、草乌为佐药;血竭为使药。配方中,续断性温而善于续筋络、接断骨;乳香、没药行血散淤;川乌、草乌行气止痛;血竭去淤血而生新血,因而上述药物合用具有续筋接骨、行血散淤、行气止痛作用。

[0006] 本发明的有益效果是:经发明人多年使用证明,用于接续断骨碎骨,有效率达 98%,用于治疗骨后增生及颈椎、腰椎病有效率达 96%。

具体实施方式:

[0007] 具体实施例如下:

[0008] 1. 一种续断接骨粉,主要由下列按重量组份配比的药物制成:续断 50-60 份、乳香 20-30 份、没药 20-30 份、川乌 10-20 份、草乌 10-20 份、血竭 10-15 份、38 度纯米酒 5-8 份;

[0009] 2. 根据权利要求 1 所述的一种续断接骨粉,它的优选配方为:续断 60 份、乳香 10 份、没药 25 份、川乌 15 份、草乌 15 份、血竭 10 份、38 度纯米酒 8 份;

[0010] 3. 根据权利要求 1 或 2 所述的一种续断接骨粉,它的生产步骤如下:

[0011] (1) 选料:选取续断 60 份、乳香 10 份、没药 25 份、川乌 15 份、草乌 15 份、血竭 10 份、38 度纯米酒 8 份;

[0012] (2) 干燥:把上述药物在 40-50 度温度下用干燥机干燥;

[0013] (3) 粉碎:将续断、乳香、没药、川乌、草乌、血竭粉碎过 100 目筛;

[0014] (4) 装瓶:将上述已粉碎混合的药物装瓶备用;

[0015] 4. 根据权利要求 3 所述的一种续断接骨粉,用于接合断骨、骨折时,将药物与小鸡仔捣碎外敷患处,外用木片或竹片固定;用于治疗骨质增生、腰椎及颈椎病时将药与酒拌匀后外涂擦即可。