

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2004-511558

(P2004-511558A)

(43) 公表日 平成16年4月15日(2004.4.15)

(51) Int.Cl.⁷

C07D 451/02
A61K 31/46
A61K 31/4995
A61P 1/04
A61P 1/16

F I

C07D 451/02
A61K 31/46
A61K 31/4995
A61P 1/04
A61P 1/16

テーマコード (参考)

4C050
4C064
4C065
4C086

審査請求 有 予備審査請求 有 (全 190 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2002-536283 (P2002-536283)
(86) (22) 出願日 平成13年10月4日 (2001.10.4)
(85) 翻訳文提出日 平成15年4月21日 (2003.4.21)
(86) 国際出願番号 PCT/IB2001/001844
(87) 国際公開番号 W02002/032901
(87) 国際公開日 平成14年4月25日 (2002.4.25)
(31) 優先権主張番号 60/241,804
(32) 優先日 平成12年10月19日 (2000.10.19)
(33) 優先権主張国 米国 (US)


(71) 出願人 397067152
ファイザー・プロダクツ・インク
アメリカ合衆国コネチカット州グロトン市
イースタン・ポイント・ロード
(74) 代理人 100077517
弁理士 石田 敬
(74) 代理人 100092624
弁理士 鶴田 準一
(74) 代理人 100108903
弁理士 中村 和広
(74) 代理人 100082898
弁理士 西山 雅也
(74) 代理人 100081330
弁理士 樋口 外治

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 架橋ピペラジン誘導体

(57) 【要約】

式 (I) (式中、a、c、d、k、l、m、W、X、Y、Z、R¹ および R⁴ は前記と同様である) の、そして炎症およびその他の免疫障害を治療するのに有用な化合物またはその製薬上許容可能な塩。




【特許請求の範囲】

【請求項 1】

次式：

【化 1】



10

{式中、aは1、2、3、4または5であり、

cは0または1であり、

dは1、2、3、4または5であり、

kは1、2、3または4であり；lは0、1、2、3または4であり；mは0、1、2、3または4であり；k、lおよびmはすべて0であるということではなく、そしてmおよび／またはkが0でない場合には、lは0でなければならず、

WはCHまたはNであり、

XはC(O)、C(S)またはCH₂であり、

YはCH₂であり、

Zは酸素、NR⁹またはCR^{1 1}R^{1 2}であり、

R¹は各々別々に、水素、ヒドロキシ、ヒドロキシスルホニル、ハロ、(C₁～C₆)アルキル、メルカプト、メルカプト(C₁～C₆)アルキル、(C₁～C₆)アルキルチオ、(C₁～C₆)アルキルスルフィニル、(C₁～C₆)アルキルスルホニル、(C₁～C₆)アルキルチオ(C₁～C₆)アルキル、(C₁～C₆)アルキルスルフィニル(C₁～C₆)アルキル、(C₁～C₆)アルキルスルホニル(C₁～C₆)アルキル、(C₁～C₆)アルコキシ、(C₆～C₁₀)アリールオキシ、ハロ(C₁～C₆)アルキル、トリフルオロメチル、ホルミル、ホルミル(C₁～C₆)アルキル、ニトロ、ニトロソ、シアノ、(C₆～C₁₀)アリール(C₁～C₆)アルコキシ、ハロ(C₁～C₆)アルコキシ、トリフルオロメトキシ、(C₃～C₇)シクロアルキル、(C₃～C₇)シクロアルキル(C₁～C₆)アルキル、ヒドロキシ(C₃～C₇)シクロアルキル(C₁～C₆)アルキル、(C₃～C₇)シクロアルキルアミノ、(C₃～C₇)シクロアルキルアミノ(C₁～C₆)アルキル、((C₃～C₇)シクロアルキル)((C₁～C₆)アルキル)アミノ、((C₃～C₇)シクロアルキル)((C₁～C₆)アルキル)アミノ(C₁～C₆)アルキル、シアノ(C₁～C₆)アルキル、(C₂～C₇)アルケニル、(C₂～C₇)アルキニル、(C₆～C₁₀)アリール、(C₆～C₁₀)アリール(C₁～C₆)アルキル、(C₆～C₁₀)アリール(C₂～C₆)アルケニル、ヒドロキシ(C₁～C₆)アルキル、ヒドロキシ(C₆～C₁₀)アリール(C₁～C₆)アルキル、ヒドロキシ(C₁～C₆)アルキルチオ(C₁～C₆)アルキル、ヒドロキシ(C₂～C₆)アルケニル、ヒドロキシ(C₂～C₆)アルキニル、(C₁～C₆)アルコキシ(C₁～C₆)アルキル、(C₁～C₆)アルコキシ(C₆～C₁₀)アリール(C₁～C₆)アルキル、(C₆～C₁₀)アリールオキシ(C₁～C₆)アルキル、(C₆～C₁₀)アリール(C₁～C₆)アルコキシ(C₁～C₆)アルキル、アミノ、(C₁～C₆)アルキルアミノ、((C₁～C₆)アルキル)₂アミノ、(C₆～C₁₀)アリールアミノ、(C₆～C₁₀)アリール(C₁～C₆)アルキルアミノ、アミノ(C₁～C₆)

50

アルキル、 $(C_1 \sim C_6)$ アルキルアミノ $(C_1 \sim C_6)$ アルキル、 $((C_1 \sim C_6)$ アルキル)₂ アミノ $(C_1 \sim C_6)$ アルキル、ヒドロキシ $(C_1 \sim C_6)$ アルキルアミノ $(C_1 \sim C_6)$ アルキル、 $(C_6 \sim C_{10})$ アリールアミノ $(C_1 \sim C_6)$ アルキル、 $(C_6 \sim C_{10})$ アリール $(C_1 \sim C_6)$ アルキルアミノ $(C_1 \sim C_6)$ アルキル、 $(C_1 \sim C_6)$ アルキルカルボニルアミノ、 $((C_1 \sim C_6)$ アルキルカルボニル) $((C_1 \sim C_6)$ アルキル) アミノ、 $(C_1 \sim C_6)$ アルキルカルボニルアミノ $(C_1 \sim C_6)$ アルキル、 $((C_1 \sim C_6)$ アルキルカルボニル) $((C_1 \sim C_6)$ アルキル) アミノ $(C_1 \sim C_6)$ アルキル、 $(C_1 \sim C_6)$ アルコキシカルボニルアミノ、 $(C_1 \sim C_6)$ アルコキシカルボニル) $(C_1 \sim C_6)$ アルキルアミノ、 $(C_1 \sim C_6)$ アルコキシカルボニルアミノ $(C_1 \sim C_6)$ アルキル、 $(C_1 \sim C_6)$ アルコキシカルボニル) $((C_1 \sim C_6)$ アルキル) アミノ $(C_1 \sim C_6)$ アルキル、カルボキシ、 $(C_1 \sim C_6)$ アルコキシカルボニル、 $(C_6 \sim C_{10})$ アリール $(C_1 \sim C_6)$ アルコキシカルボニル、 $(C_1 \sim C_6)$ アルキルカルボニル、 $(C_1 \sim C_6)$ アルキルカルボニル $(C_1 \sim C_6)$ アルキル、 $(C_6 \sim C_{10})$ アリールカルボニル、 $(C_6 \sim C_{10})$ アリールカルボニル $(C_1 \sim C_6)$ アルキル、 $(C_6 \sim C_{10})$ アリール $(C_1 \sim C_6)$ アルキルカルボニル、 $(C_6 \sim C_{10})$ アリール $(C_1 \sim C_6)$ アルキルカルボニル $(C_1 \sim C_6)$ アルキル、カルボキシ $(C_1 \sim C_6)$ アルキル、 $(C_1 \sim C_6)$ アルコキシカルボニル $(C_1 \sim C_6)$ アルキル、 $(C_6 \sim C_{10})$ アリール $(C_1 \sim C_6)$ アルコキシカルボニル $(C_1 \sim C_6)$ アルキル、 $(C_1 \sim C_6)$ アルコキシ $(C_1 \sim C_6)$ アルキル $(C_1 \sim C_6)$ アルキルカルボニルオキシ $(C_1 \sim C_6)$ アルキル、アミノカルボニル、 $(C_1 \sim C_6)$ アルキルアミノカルボニル、 $((C_1 \sim C_6)$ アルキル)₂ アミノカルボニル、 $(C_6 \sim C_{10})$ アリールアミノカルボニル、 $(C_6 \sim C_{10})$ アリール $(C_1 \sim C_6)$ アルキルアミノカルボニル、アミノカルボニル $(C_1 \sim C_6)$ アルキル、 $(C_1 \sim C_6)$ アルキルアミノカルボニル $(C_1 \sim C_6)$ アルキル、 $((C_1 \sim C_6)$ アルキル)₂ アミノカルボニル $(C_1 \sim C_6)$ アルキル、 $(C_6 \sim C_{10})$ アリールアミノカルボニル $(C_1 \sim C_6)$ アルキル、 $(C_1 \sim C_6)$ アルキルアミノカルボニル $(C_1 \sim C_6)$ アルキル、アミジノ、グアニジノ、ウレイド、 $(C_1 \sim C_6)$ アルキルウレイド、 $((C_1 \sim C_6)$ アルキル)₂ ウレイド、ウレイド $(C_1 \sim C_6)$ アルキル、 $(C_1 \sim C_6)$ アルキルウレイド $(C_1 \sim C_6)$ アルキル、 $((C_1 \sim C_6)$ アルキル)₂ ウレイド $(C_1 \sim C_6)$ アルキル、 $(C_2 \sim C_9)$ ヘテロシクロアルキル、 $(C_2 \sim C_9)$ ヘテロアリール、 $(C_2 \sim C_9)$ ヘテロシクロアルキル $(C_1 \sim C_6)$ アルキルおよび $(C_2 \sim C_9)$ ヘテロアリール $(C_1 \sim C_6)$ アルキルから選択され、
 R^4 は $(R^5 Q_q)_f (C_6 \sim C_{10})$ アリール、 $(R^5 Q_q)_f (C_3 \sim C_{10})$ シクロアルキル、 $(R^5 Q_q)_f (C_2 \sim C_9)$ ヘテロアリール、 $(R^5 Q_q)_f (C_2 \sim C_9)$ ヘテロシクロアルキルであって、ここで、
 f は 0、1、2、3、4 または 5 であり、
 Q は $(C_1 \sim C_6)$ アルキルであり、
 q は 0 または 1 であり、
 R^5 は別々に、 $(C_2 \sim C_9)$ ヘテロシクロアルキルカルボニル、 $(C_2 \sim C_9)$ ヘテロアリールカルボニル、 $(C_2 \sim C_9)$ ヘテロアリール $(C_1 \sim C_6)$ アルキルアミノカルボニル、 $(C_2 \sim C_9)$ ヘテロアリールアミノカルボニル、 $(C_2 \sim C_9)$ ヘテロシクロアルキル $(C_1 \sim C_6)$ アルキルアミノカルボニル、 $(C_1 \sim C_6)$ アルキルスルホニルアミノカルボニル、 $(C_1 \sim C_6)$ アルキルスルホニルアミノ $(C_1 \sim C_6)$ アルキルアミノカルボニル、ウレイド $(C_1 \sim C_6)$ アルキルアミノカルボニル、 $(C_1 \sim C_6)$ アルキルウレイド $(C_1 \sim C_6)$ アルキルアミノカルボニル、 $((C_1 \sim C_6)$ アルキル)₂ ウレイド $(C_1 \sim C_6)$ アルキルアミノカルボニル、ハロ $(C_1 \sim C_6)$ アルキルアミノカルボニル、 $(C_1 \sim C_6)$ アルキルカルボニルアミノ $(C_1 \sim C_6)$ アルキルアミノカルボニル、ヒドロキシ $(C_1 \sim C_6)$ アルキルアミノカルボニル、アミノスルホニル $(C_1 \sim C_6)$ アルキルアミノカルボニル、カルボキシ $(C_1 \sim C_6)$ アルキルアミノカルボニル、 $(C_1 \sim C_6)$ アルキルアミノスルホニル $(C_1 \sim C_6)$ アルキルアミノカルボ

ニル、アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ、($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ
 ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ、カルボキシ ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニ
 ルアミノ、カルボキシ ($C_1 \sim C_6$) アルコキシカルボニルアミノ、($(C_1 \sim C_6)$ ア
 ルキル)₂ アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ、アセチルアミノ ($C_1 \sim$ ^{*}
 C_6) アルキルカルボニルアミノ、(アセチル) ($(C_1 \sim C_6)$ アルキル) アミノ (C
 $1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ、($C_1 \sim C_6$) アルキルスルホニルアミノ (C_1
 $\sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ、シアノグアニジノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニ
 ルアミノ、($C_1 \sim C_6$) アルキルシアノグアニジノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニル
 アミノ、($(C_1 \sim C_6)$ アルキル)₂ シアノグアニジノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボ
 ニルアミノ、アミノカルボニル ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ、アミノカルボ
 ニルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ、($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノカル
 ボニルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ、($(C_1 \sim C_6)$ アルキル)
 2 アミノカルボニルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ、($C_2 \sim C_9$) ヘ
 テロアリアル ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ、($C_2 \sim C_9$) ヘテロシクロア
 ルキル ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ、アミノスルホニル ($C_1 \sim C_6$) アル
 キルカルボニルアミノ、ヒドロキシ ($C_1 \sim C_6$) アルキルウレイド、アミノ ($C_1 \sim C$
 6) アルキルウレイド、($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルウレイド
 、($(C_1 \sim C_6)$ アルキル)₂ アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルウレイド、($C_2 \sim C_9$)
) ヘテロシクロアルキル ($C_1 \sim C_6$) アルキルウレイド、($C_2 \sim C_9$) ヘテロアリー
 ルウレイド、($C_2 \sim C_9$) ヘテロアリアル ($C_1 \sim C_6$) アルキルウレイド、($C_1 \sim$
 C_6) アルキルスルホニルウレイド、アミノスルホニル ($C_1 \sim C_6$) アルキルウレイド
 、アミノカルボニル ($C_1 \sim C_6$) アルキルウレイド、($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノカル
 ボニル ($C_1 \sim C_6$) アルキルウレイド、($(C_1 \sim C_6)$ アルキル)₂ アミノカルボ
 ニル ($C_1 \sim C_6$) アルキルウレイド、アセチルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルウレイド
 、(アセチル) ($(C_1 \sim C_6)$ アルキル) アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルウレイド、カル
 ボキシ ($C_1 \sim C_6$) アルキルウレイド、ハロ ($C_1 \sim C_6$) アルキルスルホニルアミ
 ノ、アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルスルホニルアミノ、($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ (C
 $1 \sim C_6$) アルキルスルホニルアミノ、($(C_1 \sim C_6)$ アルキル)₂ アミノ ($C_1 \sim$
 C_6) アルキルスルホニルアミノ、アセチルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルスルホニルア
 ミノ、(アセチル) ($(C_1 \sim C_6)$ アルキル) アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルスルホニ
 ルアミノ、ウレイド ($C_1 \sim C_6$) アルキルスルホニルアミノ、($C_1 \sim C_6$) アルキル
 ウレイド ($C_1 \sim C_6$) アルキルスルホニルアミノ、($(C_1 \sim C_6)$ アルキル)₂ ウレ
 イド ($C_1 \sim C_6$) アルキルスルホニルアミノ、($C_1 \sim C_6$) アルキルスルホニルアミ
 ノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルスルホニルアミノ、シアノグアニジノ ($C_1 \sim C_6$) アルキル
 スルホニルアミノ、カルボキシ ($C_1 \sim C_6$) アルキルスルホニルアミノ、($C_1 \sim C_6$
) アルキルシアノグアニジノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルスルホニルアミノ、($(C_1 \sim C_6$
) アルキル)₂ シアノグアニジノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルスルホニルアミノ、アミノカル
 ボニル ($C_1 \sim C_6$) アルキルスルホニルアミノ、($C_1 \sim C_6$) アルコキシカルボニル
 アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルスルホニルアミノ、アミノスルホニルアミノカルボニル、
 ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノスルホニルアミノカルボニル、($(C_1 \sim C_6)$ アルキル
)₂ アミノスルホニルアミノカルボニル、($C_6 \sim C_{10}$) アリアルスルホニル、(C_1
 $\sim C_6$) アルキルアミノスルホニルアミノ、($(C_1 \sim C_6)$ アルキル)₂ アミノスルホ
 ニルアミノ、アミノカルボニル ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルス
 ルホニルアミノ、($C_2 \sim C_9$) ヘテロシクロアルキルオキシカルボニルアミノ ($C_1 \sim$
 C_6) アルキルスルホニルアミノ、($C_2 \sim C_9$) ヘテロアリアルオキシカルボニルアミ
 ノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルスルホニルアミノ、シアノグアニジノ、($C_1 \sim C_6$) アルキ
 ルシアノグアニジノ、($(C_1 \sim C_6)$ アルキル)₂ シアノグアニジノ、($C_2 \sim C_9$)
 ヘテロシクロアルキルシアノグアニジノ、($C_2 \sim C_9$) ヘテロシクロアルキル ($C_1 \sim$
 C_6) アルキルシアノグアニジノ、($C_2 \sim C_9$) ヘテロアリアル ($C_1 \sim C_6$) アルキ
 ルシアノグアニジノ、アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルシアノグアニジノ、($C_1 \sim C_6$)

10

20

30

40

50

アルキルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルシアノグアニジノ、($(C_1 \sim C_6)$ アルキル)
 2 アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルシアノグアニジノ、アミノカルボニル ($C_1 \sim C_6$) ア
 ルキルシアノグアニジノ、カルボキシ ($C_1 \sim C_6$) アルキルシアノグアニジノ、(C_1
 $\sim C_6$) アルキルアミノカルボニル ($C_1 \sim C_6$) アルキルシアノグアニジノ、($(C_1$
 $\sim C_6)$ アルキル) 2 アミノカルボニル ($C_1 \sim C_6$) アルキルシアノグアニジノ、ヒド
 ロキシ ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ、アミノカルボニル ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ
 、カルボキシ ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ、($C_1 \sim C_6$) アルキルスルホニルアミノ
 ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ、($C_1 \sim C_6$) アルコキシカルボニルアミノ ($C_1 \sim C_6$)
 アルキルアミノ、アミノスルホニル ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ、($C_2 \sim C_9$)
 ヘテロアリール ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ、アセチルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキル
 アミノ、(アセチル) ($(C_1 \sim C_6)$ アルキル) アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ
 、($C_2 \sim C_9$) ヘテロシクロアルキル ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ、($(C_1 \sim C_6$
 $)$ アルキル) 2 アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ、($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ (C_1
 $\sim C_6$) アルキルアミノ、($C_1 \sim C_6$) アルコキシ ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ
 、($C_1 \sim C_6$) アルコキシカルボニル ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ、シアノ ($C_1 \sim$
 C_6) アルキルアミノ、($C_2 \sim C_9$) ヘテロシクロアルキルオキシカルボニルアミノ (C_1
 $\sim C_6$) アルキルアミノ、($C_2 \sim C_9$) ヘテロアリールオキシカルボニルアミノ (C_1
 $\sim C_6$) アルキルアミノ、シアノグアニジノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ、(C_1
 $\sim C_6$) アルキルシアノグアニジノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ、($(C_1 \sim C_6)$ アル
 キル) 2 シアノグアニジノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ、ウレイド ($C_1 \sim C_6$) アル
 キルアミノ、($C_1 \sim C_6$) アルキルウレイド ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ、($(C_1$
 $\sim C_6)$ アルキル) 2 ウレイド ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ、アミノカルボニルオキ
 シ ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ、ヒドロキシ ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ
 、($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノカルボニル ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ、
 ($(C_1 \sim C_6)$ アルキル) 2 アミノカルボニル ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミ
 ノ、($C_1 \sim C_6$) アルコキシカルボニルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミ
 ノ、アミノスルホニル ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ、ヒドロキシ ($C_1 \sim C_6$)
 アルキルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ、($(C_1 \sim C_6)$ アルキ
 ル) 2 アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ (C_1
 $\sim C_6$) アルキルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルカル
 ボニルアミノ、アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニル
 アミノ、($C_1 \sim C_6$) アルコキシ ($C_1 \sim C_6$) アルキルミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキル
 カルボニルアミノ、($C_2 \sim C_9$) ヘテロシクロアルキルオキシカルボニルアミノ、(C_2
 $\sim C_9$) ヘテロアリールカルボニルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ、
 ($C_2 \sim C_9$) ヘテロアリールカルボニルアミノ、($C_2 \sim C_9$) ヘテロシクロアルキル
 カルボニルアミノ、($C_2 \sim C_9$) ヘテロアリール ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルア
 ミノ、($C_2 \sim C_9$) ヘテロシクロアルキル ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ、
 ($C_2 \sim C_9$) ヘテロシクロアルキルカルボニルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニ
 ルアミノ、シアノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ、($C_1 \sim C_6$) アルキルス
 ルホニルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノカルボニルアミノ、($C_1 \sim C_6$) アルコ
 キシカルボニルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノカルボニルアミノ、($C_2 \sim C_9$)
 ヘテロシクロアルキルオキシカルボニルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノカルボニル
 アミノ、($C_2 \sim C_9$) ヘテロアリールオキシカルボニルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキル
 アミノカルボニルアミノ、ウレイド ($C_1 \sim C_6$) アルキルウレイド、($C_1 \sim C_6$) アル
 キルウレイド ($C_1 \sim C_6$) アルキルウレイド、($(C_1 \sim C_6)$ アルキル) 2 ウレイ
 ド ($C_1 \sim C_6$) アルキルウレイド、シアノグアニジノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルウレイド
 、($C_2 \sim C_9$) ヘテロアリール (シアノグアニジノ)、アミノスルホニル、アミノ (C_1
 $\sim C_6$) アルキルスルホニル、($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキル
 スルホニル、($(C_1 \sim C_6)$ アルキル) 2 アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルスルホニル、
 ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノスルホニル、($(C_1 \sim C_6)$ アルキル) 2 アミノスルホ

ニル、 $(C_2 \sim C_9)$ ヘテロシクロアルキルスルホニル、アミノ $(C_1 \sim C_6)$ アルキル
 アミノスルホニル、 $(C_1 \sim C_6)$ アルキルアミノ $(C_1 \sim C_6)$ アルキルアミノスルホ
 ニル、 $((C_1 \sim C_6)$ アルキル) $_2$ アミノ $(C_1 \sim C_6)$ アルキルアミノスルホニル、
 $(C_2 \sim C_9)$ ヘテロアリールアミノスルホニル、ヒドロキシ $(C_1 \sim C_6)$ アルキルア
 ミノスルホニル、 $(C_1 \sim C_6)$ アルコキシ $(C_1 \sim C_6)$ アルキルアミノスルホニル、
 ウレイド $(C_1 \sim C_6)$ アルキルアミノスルホニル、 $(C_1 \sim C_6)$ アルキルウレイド $(C_1$
 $C_1 \sim C_6)$ アルキルアミノスルホニル、 $((C_1 \sim C_6)$ アルキル) $_2$ ウレイド $(C_1$
 $\sim C_6)$ アルキルアミノスルホニル、 $(C_1 \sim C_6)$ アルキルスルホニルアミノ $(C_1 \sim$
 $C_6)$ アルキルアミノスルホニル、 $(C_1 \sim C_6)$ アルコキシカルボニルアミノ $(C_1 \sim$
 $C_6)$ アルキルアミノスルホニル、 $(C_2 \sim C_9)$ ヘテロシクロアルキルオキシカルボニ
 ルアミノ $(C_1 \sim C_6)$ アルキルアミノスルホニル、 $(C_2 \sim C_9)$ ヘテロアリールオキ
 シカルボニルアミノ $(C_1 \sim C_6)$ アルキルアミノスルホニル、アミノカルボニル $(C_1$
 $\sim C_6)$ アルキルアミノスルホニル、シアノグアニジノ $(C_1 \sim C_6)$ アルキルアミノス
 ルホニル、 $(C_2 \sim C_9)$ ヘテロアリールアミノスルホニル、 $(C_2 \sim C_9)$ ヘテロアリ
 ール $(C_1 \sim C_6)$ アルキルアミノスルホニル、 $(C_2 \sim C_9)$ ヘテロシクロアルキルア
 ミノスルホニル、 $(C_1 \sim C_6)$ アルキルカルボニルアミノスルホニル、ハロ $(C_1 \sim C$
 $6)$ アルキルカルボニルアミノスルホニル、 $(C_1 \sim C_6)$ アルコキシカルボニルアミノ
 スルホニル、ウレイドスルホニル、 $(C_1 \sim C_6)$ アルキルウレイドスルホニル、 $((C$
 $1 \sim C_6)$ アルキル) $_2$ ウレイドスルホニル、水素、ヒドロキシ、ヒドロキシスルホニル
 、ハロ、メルカプト、 $(C_1 \sim C_6)$ アルキルチオ、 $(C_1 \sim C_6)$ アルキルスルフィ
 ニル、 $(C_1 \sim C_6)$ アルキルスルホニル、カルボキシ $(C_1 \sim C_6)$ アルキルスルホニル
 、 $(C_6 \sim C_{10})$ アリールスルホニル、 $(C_2 \sim C_9)$ ヘテロアリールスルホニル、 $(C$
 $1 \sim C_6)$ アルコキシ、ヒドロキシ $(C_1 \sim C_6)$ アルコキシ、 $(C_6 \sim C_{10})$ アリ
 ールオキシ、トリフルオロ $(C_1 \sim C_6)$ アルキル、ホルミル、ニトロ、ニトロソ、シア
 ノ、ハロ $(C_1 \sim C_6)$ アルコキシ、トリフルオロ $(C_1 \sim C_6)$ アルコキシ、アミノ $(C$
 $1 \sim C_6)$ アルコキシ、 $(C_3 \sim C_{10})$ シクロアルキルヒドロキシ $(C_3 \sim C_{10})$
 シクロアルキル $(C_3 \sim C_{10})$ シクロアルキルアミノ $(C_2 \sim C_6)$ アルケニル、 $(C$
 $2 \sim C_6)$ アルキニル、 $(C_6 \sim C_{10})$ アリール、 $(C_6 \sim C_{10})$ アリール $(C_2$
 $\sim C_6)$ アルケニル、ヒドロキシ $(C_6 \sim C_{10})$ アリール、 $((C_1 \sim C_6)$ アルキル
 アミノ) $(C_6 \sim C_{10})$ アリール、ヒドロキシ $(C_1 \sim C_6)$ アルキルチオ、ヒドロキ
 シ $(C_2 \sim C_6)$ アルケニル、ヒドロキシ $(C_2 \sim C_6)$ アルキニル、 $(C_1 \sim C_6)$ ア
 ルコキシ $(C_6 \sim C_{10})$ アリール、 $(C_6 \sim C_{10})$ アリール $(C_1 \sim C_6)$ アルコキ
 シ、アミノ、 $(C_1 \sim C_6)$ アルキルアミノ、 $((C_1 \sim C_6)$ アルキル) $_2$ アミノ、 $(C$
 $6 \sim C_{10})$ アリールアミノ、 $(C_6 \sim C_{10})$ アリール $(C_1 \sim C_6)$ アルキルアミ
 ノ、アミノ $(C_1 \sim C_6)$ アルキルアミノ、 $(C_2 \sim C_9)$ ヘテロシクロアルキルアミノ
 、 $(C_2 \sim C_9)$ ヘテロアリールアミノ、 $(C_2 \sim C_9)$ ヘテロアリール $(C_1 \sim C_6)$
 アルキルアミノ、 $(C_2 \sim C_9)$ ヘテロシクロアルキル $(C_1 \sim C_6)$ アルキルアミノ、
 $(C_3 \sim C_{10})$ シクロアルキル $(C_1 \sim C_6)$ アルキルアミノ、 $(C_1 \sim C_6)$ アルキ
 ルカルボニルアミノ、 $(C_1 \sim C_6)$ アルコキシカルボニルアミノ、 $(C_2 \sim C_6)$ アル
 ケニルカルボニルアミノ、 $(C_3 \sim C_{10})$ シクロアルキルカルボニルアミノ、 $(C_6 \sim$
 $C_{10})$ アリールカルボニルアミノ、 $(C_2 \sim C_9)$ ヘテロシクロアルキルカルボニルア
 ミノ、 $(C_2 \sim C_9)$ ヘテロアリールオキシカルボニルアミノ、 $(C_2 \sim C_9)$ ヘテロシ
 クロアルコキシカルボニルアミノ、ハロ $(C_1 \sim C_6)$ アルキルカルボニルアミノ、 $(C$
 $1 \sim C_6)$ アルコキシ $(C_1 \sim C_6)$ アルキルカルボニルアミノ、 $(C_1 \sim C_6)$ アルコ
 キシカルボニル $(C_1 \sim C_6)$ アルキルカルボニルアミノ、 $((C_1 \sim C_6)$ アルキルカル
 ボニル) $((C_1 \sim C_6)$ アルキル)アミノ、 $((C_1 \sim C_6)$ アルコキシカルボニル)
 $((C_1 \sim C_6)$ アルキル)アミノ、 $(C_1 \sim C_6)$ アルキルスルホニルアミノ、 $((C$
 $1 \sim C_6)$ アルキルカルボニル) $((C_1 \sim C_6)$ アルキル)アミノ、 $(C_3 \sim C_{10})$
 シクロアルキル $(C_1 \sim C_6)$ アルキル)アミノ、 $((C_1 \sim C_6)$ アルキルスルホニ
 ル) $((C_1 \sim C_6)$ アルキル)アミノ、 $(C_2 \sim C_9)$ ヘテロアリールスルホニルアミ

10

20

30

40

50

ノ、(C₆～C₁₀)アリールスルホニルアミノ、((C₆～C₁₀)アリールスルホニル)((C₁～C₆)アルキル)アミノ、カルボキシ、(C₁～C₆)アルコキシカルボニル、(C₆～C₁₀)アリール(C₁～C₆)アルコキシカルボニル、(C₁～C₆)アルキルカルボニル、カルボキシ(C₁～C₆)アルキルカルボニル、アミノ(C₁～C₆)アルキルカルボニル、(C₁～C₆)アルキルアミノ(C₁～C₆)アルキルカルボニル、((C₁～C₆)アルキル)₂アミノ(C₁～C₆)アルキルカルボニル、(C₆～C₁₀)アリールカルボニル、(C₂～C₉)ヘテロアリール(C₁～C₆)アルキルカルボニル、(C₆～C₁₀)アリール(C₁～C₆)アルキルカルボニル、ヒドロキシ(C₁～C₆)アルコキシカルボニル、(C₁～C₆)アルコキシ(C₁～C₆)アルキルカルボニルオキシ、((C₁～C₆)アルキル)₂アミノカルボニルオキシアミノカルボニル、ヒドロキシアミノカルボニル、(C₁～C₆)アルキルアミノカルボニル、((C₁～C₆)アルキル)₂アミノカルボニル、(C₆～C₁₀)アリールアミノカルボニル、(C₆～C₁₀)アリール(C₁～C₆)アルキルアミノカルボニル、(アミノカルボニル(C₁～C₆)アルキルアミノカルボニル、((C₁～C₆)アルキルアミノカルボニル(C₁～C₆)アルキルアミノカルボニル、(カルボキシ(C₁～C₆)アルキル)アミノカルボニル、(C₁～C₆)アルコキシカルボニル(C₁～C₆)アルキルアミノカルボニル、(アミノ(C₁～C₆)アルキル)アミノカルボニル、(ヒドロキシ(C₁～C₆)アルキルアミノカルボニルアミジノ、ヒドロキシアミジノ、グアニジノ、ウレイド、(C₁～C₆)アルキルウレイド、(C₆～C₁₀)アリールウレイド、((C₆～C₁₀)アリール)₂ウレイド、(C₆～C₁₀)アリール(C₁～C₆)アルキルウレイド、ハロ(C₁～C₆)アルキルウレイド、((C₁～C₆)アルキル)((C₆～C₁₀)アリール)ウレイド、((C₁～C₆)アルキル)₂ウレイド、ハロ(C₁～C₆)アルキルカルボニルウレイド、(ハロ(C₁～C₆)アルキル)((C₁～C₆)アルキル)ウレイド、((C₁～C₆)アルコキシカルボニル(C₁～C₆)アルキル)ウレイド、グリシンアミド、(C₁～C₆)アルキルグリシンアミド、アミノカルボニルグリシンアミド、(C₁～C₆)アルコキシ(C₁～C₆)アルキルカルボニルグリシンアミド、(アミノカルボニル)((C₁～C₆)アルキル)グリシンアミド、((C₁～C₆)アルコキシカルボニル(C₁～C₆)アルキルカルボニル)((C₁～C₆)アルキル)グリシンアミド、((C₁～C₆)アルコキシカルボニルアミノ(C₁～C₆)アルキルカルボニル)グリシンアミド、(C₆～C₁₀)アリールカルボニルグリシンアミド、((C₆～C₁₀)アリールカルボニル)((C₁～C₆)アルキル)グリシンアミド、((C₆～C₁₀)アリール(C₁～C₆)アルキルアミノカルボニル)グリシンアミド、(C₆～C₁₀)アリール(C₁～C₆)アルキルアミノカルボニル)((C₁～C₆)アルキル)グリシンアミド、(C₆～C₁₀)アリールアミノカルボニルグリシンアミド、((C₆～C₁₀)アリールアミノカルボニル)((C₁～C₆)アルキル)グリシンアミド、アラニンアミド、(C₁～C₆)アルキルアラニンアミド、(C₂～C₉)ヘテロアリール、アミノ(C₂～C₉)ヘテロアリール、(C₁～C₆)アルキルアミノ(C₂～C₉)ヘテロアリール、((C₁～C₆)アルキル)₂アミノ(C₂～C₉)ヘテロアリール、(C₂～C₉)ヘテロアリールオキシ、(C₂～C₉)ヘテロシクロアルキル、カルボキシ(C₁～C₆)アルコキシ、(C₁～C₆)アルキルスルホニルアミノカルボニル(C₁～C₆)アルコキシ、(C₁～C₆)アルキルスルホニルアミノ(C₁～C₆)アルコキシ、(C₂～C₉)ヘテロアリール(C₁～C₆)アルコキシ、カルボキシ(C₁～C₆)アルキルアミノ(C₂～C₆)アルコキシ、アミノ(C₂～C₆)アルコキシ、(アミノカルボニル)(ヒドロキシ)アミノ、(C₁～C₆)アルキルアミノ(C₂～C₆)アルコキシ、((C₁～C₆)アルキル)₂アミノ(C₂～C₆)アルコキシ、(C₁～C₆)アルキルカルボニルアミノ(C₂～C₆)アルコキシ、アミノカルボニルアミノ(C₂～C₆)アルコキシ、(C₁～C₆)アルキルアミノカルボニルアミノ(C₂～C₆)アルコキシ、((C₁～C₆)アルキル)₂アミノカルボニルアミノ(C₂～C₆)アルコキシ、アミノ(C₂～C₆)アルコキシカルボニルアミノ、(C₁～C₆)アルキルアミノ(C₂～C₆)アルコキシカルボニルアミノ、((C₁～C₆)ア

10

20

30

40

50

ルキル)₂ アミノ (C₂ ~ C₆) アルコキシカルボニルアミノ、(C₂ ~ C₉) ヘテロアリールアミノ (C₂ ~ C₆) アルコキシ、バルビツリル、(C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ (C₁ ~ C₆) アルキルアミノカルボニル、アミノ (C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ (ここで、(C₁ ~ C₆) アルキルは、水素、アミノ、ヒドロキシル、(C₁ ~ C₆) アルコキシ、カルボキシ、さらなる置換化 (C₂ ~ C₉) ヘテロアリール、(C₆ ~ C₁₀) アリール、(C₂ ~ C₉) ヘテロシクロアルキルおよびシクロアルキルから選択される1つまたは2つの基で任意に置換されるか、あるいは2つの基が一緒になって炭素環を作り上げる)、ならびに R¹⁻⁹ カルボニルアミノ (ここで R¹⁻⁹ は、(C₁ ~ C₆) アルキル、(C₂ ~ C₆) アルコキシおよびヒドロキシから選択されるさらに1つまたは2つの基で任意に置換される (C₂ ~ C₉) ヘテロシクロアルキルを含有する窒素である) から選択され、

R⁹ は、水素、(C₁ ~ C₆) アルキル、(C₆ ~ C₁₀) アリール、(C₆ ~ C₁₀) アリール (C₁ ~ C₆) アルキル、(C₁ ~ C₆) アルキルカルボニル、(C₁ ~ C₆) アルキルカルボニル (C₁ ~ C₆) アルキル、(C₆ ~ C₁₀) アリール (C₁ ~ C₆) アルキルカルボニル、(C₆ ~ C₁₀) アリール (C₁ ~ C₆) アルキルカルボニル (C₁ ~ C₆) アルキル、アミノカルボニル、(C₁ ~ C₆) アルキルアミノカルボニル、(C₁ ~ C₆) アルキル)₂ アミノカルボニルおよび (C₁ ~ C₆) アルコキシカルボニルからなる群から選択され、そして

R¹⁻¹¹ および R¹⁻¹² は、各々別々に、水素、(C₁ ~ C₆) アルキル、(C₆ ~ C₁₀) アリール、(C₆ ~ C₁₀) アリール (C₁ ~ C₆) アルキル、ヒドロキシ、(C₁ ~ C₆) アルコキシ、ヒドロキシ (C₁ ~ C₆) アルキル、(C₁ ~ C₆) アルコキシ (C₁ ~ C₆) アルキル、アミノ、(C₁ ~ C₆) アルキルアミノ、((C₁ ~ C₆) アルキル)₂ アミノ、(C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ、(C₃ ~ C₈) シクロアルキルカルボニルアミノ、(C₃ ~ C₈) シクロアルキル (C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ、(C₁ ~ C₆) アルコキシカルボニルアミノ、(C₁ ~ C₆) アルキルスルホニルアミノ、(C₆ ~ C₁₀) アリールカルボニルアミノ、(C₁ ~ C₆) アルコキシカルボニル (C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ、(C₆ ~ C₁₀) アリール (C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ、((C₆ ~ C₁₀) アリール (C₁ ~ C₆) アルキルカルボニル) ((C₁ ~ C₆) アルキル) アミノ、(C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ (C₁ ~ C₆) アルキル、(C₃ ~ C₈) シクロアルキルカルボニルアミノ (C₁ ~ C₆) アルキル、(C₁ ~ C₆) アルコキシカルボニルアミノ (C₁ ~ C₆) アルキル、(C₂ ~ C₉) ヘテロシクロアルキルカルボニルアミノ (C₁ ~ C₆) アルキル、(C₆ ~ C₁₀) アリール (C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ (C₁ ~ C₆) アルキル、(C₂ ~ C₉) ヘテロアリールカルボニルアミノ (C₁ ~ C₆) アルキル、(C₆ ~ C₁₀) アリールスルホニルアミノ、(C₁ ~ C₆) アルキルスルホニルアミノ (C₁ ~ C₆) アルキル、アミノカルボニルアミノ、(C₁ ~ C₆) アルキルアミノカルボニルアミノ、ハロ (C₁ ~ C₆) アルキルアミノカルボニルアミノ、((C₁ ~ C₆) アルキル)₂ アミノカルボニルアミノ、アミノカルボニルアミノ (C₁ ~ C₆) アルキル、(C₁ ~ C₆) アルキルアミノカルボニルアミノ (C₁ ~ C₆) アルキル、((C₁ ~ C₆) アルキル)₂ アミノカルボニルアミノ (C₁ ~ C₆) アルキル、ハロ (C₁ ~ C₆) アルキルアミノカルボニルアミノ (C₁ ~ C₆) アルキル、アミノ (C₁ ~ C₆) アルキル、(C₁ ~ C₆) アルキルアミノ (C₁ ~ C₆) アルキル、((C₁ ~ C₆) アルキル)₂ アミノ (C₁ ~ C₆) アルキル、カルボキシ (C₁ ~ C₆) アルキル、(C₁ ~ C₆) アルコキシカルボニル (C₁ ~ C₆) アルキル、アミノカルボニル (C₁ ~ C₆) アルキルおよび (C₁ ~ C₆) アルキルアミノカルボニル (C₁ ~ C₆) アルキルからなる群から選択される} により表される化合物またはその製薬上許容可能な塩またはプロドラッグ。

【請求項2】

R¹ が水素、ハロ、シアノ、ニトロ、トリフルオロメチル、トリフルオロメトキシ、(C₁ ~ C₆) アルキル、ヒドロキシまたは (C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルオキシである、請求項1記載の化合物。

【請求項 3】

c が 1 であり、X が C (O) または CH₂ であり、d が 1 であり、そして Z が酸素、NH、(C₁ ~ C₆) アルキルまたは CR^{1 1} R^{1 2} である、請求項 1 記載の化合物。

【請求項 4】

R⁴ が (R⁵)_f (C₆ ~ C₁₀) アリールまたは (R⁵)_f (C₂ ~ C₉) ヘテロアリール (ここで、f は 1 または 2 である) である、請求項 1 記載の化合物。

【請求項 5】

c が 1 であり、X が C (O) であり、d が 1 であり、Z が酸素または (C₁ ~ C₆) アルキルであり、W が窒素または CH であり、そして l、m および k がそれぞれゼロ、ゼロおよび 2 または 3 であるか、あるいは、k、l および m がそれぞれゼロ、ゼロおよび 2 または 3 である、請求項 1 記載の化合物。 10

【請求項 6】

R⁴ がフェニルであり、Q が (C₁ ~ C₆) アルキルであり、q が 0 または 1 であり、そして少なくとも 1 つの R⁵ が： (C₂ ~ C₉) ヘテロアリールアミノカルボニル、(C₂ ~ C₉) ヘテロアリールカルボニルアミノ、(C₁ ~ C₆) アルキルスルホニルアミノカルボニル、アミノスルホニルアミノカルボニル、カルボキシ (C₁ ~ C₆) アルキルシアノグアニジノ、カルボキシ、(C₂ ~ C₉) ヘテロアリールアミノ、(C₂ ~ C₉) ヘテロアリールスルホニル、(C₂ ~ C₉) ヘテロアリール (C₂ ~ C₉) ヘテロアリールオキシ、(C₂ ~ C₉) ヘテロアリールカルボニル、(C₂ ~ C₉) ヘテロアリール (C₁ ~ C₆) アルキルカルボニル、カルボキシ (C₁ ~ C₆) アルキルアミノカルボニルアミノ、(C₂ ~ C₉) ヘテロアリールアミノカルボニルアミノ、カルボキシ (C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ、(C₂ ~ C₉) ヘテロアリール (C₁ ~ C₆) アルキルアミノ、カルボキシ (C₁ ~ C₆) アルキルアミノカルボニル、カルボキシ (C₁ ~ C₆) アルキルスルホニルアミノ、(C₂ ~ C₉) ヘテロアリールアミノスルホニル、カルボキシ (C₁ ~ C₆) アルキルスルホニル、カルボキシ (C₁ ~ C₆) アルキルアミノ、カルボキシ (C₁ ~ C₆) アルキルカルボニル、カルボキシ (C₁ ~ C₆) アルコキシ、カルボキシ (C₁ ~ C₆) アルコキシカルボニルアミノ、ヒドロキシアミノカルボニル、(C₁ ~ C₆) アルキルスルホニルアミノカルボニル (C₁ ~ C₆) アルコキシ、(C₂ ~ C₉) ヘテロアリール (C₁ ~ C₆) アルコキシ、カルボキシ (C₁ ~ C₆) アルキルアミノ (C₂ ~ C₆) アルコキシ、(C₂ ~ C₉) ヘテロアリールアミノ (C₂ ~ C₆) アルコキシ、アミノ (C₁ ~ C₆) アルキルカルボニル、(C₁ ~ C₆) アルキルアミノ (C₁ ~ C₆) アルキルカルボニル、((C₁ ~ C₆) アルキル)₂ アミノ (C₁ ~ C₆) アルキルカルボニル、アミノ (C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ、(C₁ ~ C₆) アルキルアミノ (C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ、((C₁ ~ C₆) アルキル)₂ アミノ (C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ、アミノ (C₁ ~ C₆) アルキルウレイド、(C₁ ~ C₆) アルキルアミノ (C₁ ~ C₆) アルキルウレイド、((C₁ ~ C₆) アルキル)₂ アミノ (C₁ ~ C₆) アルキルウレイド、アミノ (C₁ ~ C₆) アルキルスルホニルアミノ、(C₁ ~ C₆) アルキルアミノ (C₁ ~ C₆) アルキルスルホニルアミノ、((C₁ ~ C₆) アルキル)₂ アミノ (C₁ ~ C₆) アルキルスルホニルアミノ、アミノ (C₁ ~ C₆) アルキルスルホニル、(C₁ ~ C₆) アルキルアミノ (C₁ ~ C₆) アルキルスルホニル、((C₁ ~ C₆) アルキル)₂ アミノ (C₁ ~ C₆) アルキルスルホニル、アミノ (C₁ ~ C₆) アルキルシアノグアニジノ、(C₁ ~ C₆) アルキルアミノ (C₁ ~ C₆) アルキルシアノグアニジノ、((C₁ ~ C₆) アルキル)₂ アミノ (C₁ ~ C₆) アルキルシアノグアニジノ、アミノ (C₁ ~ C₆) アルキルアミノスルホニル、(C₁ ~ C₆) アルキルアミノ (C₁ ~ C₆) アルキルアミノスルホニル、((C₁ ~ C₆) アルキル)₂ アミノ (C₁ ~ C₆) アルキルアミノスルホニル、((C₁ ~ C₆) アルキル) アミノ (C₆ ~ C₁₀) アリール (C₁ ~ C₆) アルキル、アミノ、アミノ (C₁ ~ C₆) アルコキシ、アミノ (C₁ ~ C₆) アルコキシカルボニルアミノ、(C₁ ~ C₆) アルキルアミノ、((C₁ ~ C₆) アルキル)₂ アミノ、(C₆ ~ C₁₀) アリールアミノ、(C₆ ~ C₁₀) アリール (C₁ ~ C₆) アルキルアミノ、アミノ (C₁ ~ 20 30 40 50

C₆) アルキルアミノ、(C₂ ~ C₉) ヘテロシクロアルキルアミノ、(C₂ ~ C₉) ヘテロアリールアミノ、(C₃ ~ C₁₀) シクロアルキル (C₁ ~ C₆) アルキル) アミノ、(アミノ (C₁ ~ C₆) アルキル) アミノカルボニル、グリシンアミド、(C₁ ~ C₆) アルキルグリシンアミド、アラニンアミド、(C₁ ~ C₆) アルキルアラニンアミド、((C₁ ~ C₆) アルキル)₂ アミノ (C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ、ハロ、(C₁ ~ C₆) アルコキシ、(C₁ ~ C₆) アルキル、ハロ (C₁ ~ C₆) アルキル、アミノカルボニル (C₁ ~ C₆) アルキルウレイド、(C₁ ~ C₆) アルキルカルボニル、(C₁ ~ C₆) アルキルスルホニルアミノ、(C₁ ~ C₆) アルキルスルホニルアミノ (C₁ ~ C₆) アルキルアミノカルボニル、アミノスルホニル、アミノカルボニル、ウレイド (C₁ ~ C₆) アルキルアミノカルボニル、アミノカルボニル (C₁ ~ C₆) アルキルアミノカルボニル、アミノカルボニル (C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ、ウレイド (C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ、(C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ (C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ、(C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ (C₁ ~ C₆) アルキルアミノカルボニルアミノ、ウレイド (C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ、ウレイド、ハロ (C₁ ~ C₆) アルキルスルホニルアミノ、(C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ (C₁ ~ C₆) アルキルアミノカルボニルから選択される、請求項 1 記載の化合物。

10

【請求項 7】

R⁴ がピリジルであり、Q が (C₁ ~ C₆) アルキルであり、q が 0 または 1 であり、そして少なくとも 1 つの R⁵ が：(C₂ ~ C₉) ヘテロアリールアミノカルボニル、(C₂ ~ C₉) ヘテロアリールカルボニルアミノ、(C₁ ~ C₆) アルキルスルホニルアミノカルボニル、アミノスルホニルアミノカルボニル、カルボキシ (C₁ ~ C₆) アルキルシアノグアニジノ、カルボキシ、(C₂ ~ C₉) ヘテロアリールアミノ、(C₂ ~ C₉) ヘテロアリールスルホニル、(C₂ ~ C₉) ヘテロアリール (C₂ ~ C₉) ヘテロアリールオキシ、(C₂ ~ C₉) ヘテロアリールカルボニル、(C₂ ~ C₉) ヘテロアリール (C₁ ~ C₆) アルキルカルボニル、カルボキシ (C₁ ~ C₆) アルキルアミノカルボニルアミノ、(C₂ ~ C₉) ヘテロアリールアミノカルボニルアミノ、カルボキシ (C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ、(C₂ ~ C₉) ヘテロアリール (C₁ ~ C₆) アルキルアミノ、カルボキシ (C₁ ~ C₆) アルキルアミノカルボニル、カルボキシ (C₁ ~ C₆) アルキルスルホニルアミノ、(C₂ ~ C₉) ヘテロアリールアミノスルホニル、カルボキシ (C₁ ~ C₆) アルキルスルホニル、カルボキシ (C₁ ~ C₆) アルキルアミノ、カルボキシ (C₁ ~ C₆) アルキルカルボニル、カルボキシ (C₁ ~ C₆) アルコキシ、カルボキシ (C₁ ~ C₆) アルコキシカルボニルアミノ、ヒドロキシアミノカルボニル、(C₁ ~ C₆) アルキルスルホニルアミノカルボニル (C₁ ~ C₆) アルコキシ、(C₂ ~ C₉) ヘテロアリール (C₁ ~ C₆) アルコキシ、カルボキシ (C₁ ~ C₆) アルキルアミノ (C₂ ~ C₆) アルコキシ、(C₂ ~ C₉) ヘテロアリールアミノ (C₂ ~ C₆) アルコキシ、アミノ (C₁ ~ C₆) アルキルカルボニル、(C₁ ~ C₆) アルキルアミノ (C₁ ~ C₆) アルキルカルボニル、((C₁ ~ C₆) アルキル)₂ アミノ (C₁ ~ C₆) アルキルカルボニル、アミノ (C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ、(C₁ ~ C₆) アルキルアミノ (C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ、((C₁ ~ C₆) アルキル)₂ アミノ (C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ、アミノ (C₁ ~ C₆) アルキルウレイド、(C₁ ~ C₆) アルキルアミノ (C₁ ~ C₆) アルキルウレイド、((C₁ ~ C₆) アルキル)₂ アミノ (C₁ ~ C₆) アルキルウレイド、アミノ (C₁ ~ C₆) アルキルスルホニルアミノ、(C₁ ~ C₆) アルキルアミノ (C₁ ~ C₆) アルキルスルホニルアミノ、((C₁ ~ C₆) アルキル)₂ アミノ (C₁ ~ C₆) アルキルスルホニルアミノ、アミノ (C₁ ~ C₆) アルキルスルホニル、(C₁ ~ C₆) アルキルアミノ (C₁ ~ C₆) アルキルスルホニル、((C₁ ~ C₆) アルキル)₂ アミノ (C₁ ~ C₆) アルキルスルホニル、アミノ (C₁ ~ C₆) アルキルシアノグアニジノ、(C₁ ~ C₆) アルキルアミノ (C₁ ~ C₆) アルキルシアノグアニジノ、((C₁ ~ C₆) アルキル)₂ アミノ (C₁ ~ C₆) アルキルシアノグアニジノ、アミノ (C₁ ~ C₆) アルキルアミノスルホニル、

20

30

40

50

($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノスルホニル、($(C_1 \sim C_6)$ アルキル) $_2$ アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノスルホニル、($(C_1 \sim C_6)$ アルキル) アミノ) ($C_6 \sim C_{10}$) アリール ($C_1 \sim C_6$) アルキル、アミノ、アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルコキシ、アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルコキシカルボニルアミノ、($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ、($(C_1 \sim C_6)$ アルキル) $_2$ アミノ、($C_6 \sim C_{10}$) アリールアミノ、($C_6 \sim C_{10}$) アリール ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ、アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ、($C_2 \sim C_9$) ヘテロシクロアルキルアミノ、($C_2 \sim C_9$) ヘテロアリールアミノ、($C_3 \sim C_{10}$) シクロアルキル ($C_1 \sim C_6$) アルキル) アミノ、(アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキル) アミノカルボニル、グリシンアミド、($C_1 \sim C_6$) アルキルグリシンアミド、アラニンアミド、($C_1 \sim C_6$) アルキルアラニンアミド、($(C_1 \sim C_6)$ アルキル) $_2$ アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ、アミノカルボニル ($C_1 \sim C_6$) アルキルウレイド、($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニル、($C_1 \sim C_6$) アルキルスルホニルアミノ、($C_1 \sim C_6$) アルキルスルホニルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノカルボニル、アミノスルホニル、アミノカルボニル、ウレイド ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノカルボニル、アミノカルボニル ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノカルボニル、アミノカルボニル ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ、ウレイド ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ、($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ、($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノカルボニルアミノ、ウレイド ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ、ウレイド、ハロ ($C_1 \sim C_6$) アルキルスルホニルアミノ、($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノカルボニルから選択される、請求項 1 記載の化合物。

10

20

【請求項 8】

酸性化合物のための製薬上許容可能な対イオンが、アルカリ金属陽イオン、アルカリ土類金属陽イオン、アンモニウムまたは水溶性アミン付加塩、N-メチルグルカミン (メグルミン)、低級アルカノールアンモニウムおよび製薬上許容可能な有機アミンのその他の塩基性塩から選択され、そして製薬上許容可能な塩が、塩酸塩、臭化水素酸塩、ヨウ化水素酸塩、硝酸塩、硫酸塩、重硫酸塩、リン酸塩、酸性リン酸塩、酢酸塩、乳酸塩、クエン酸塩、酸性クエン酸、酒石酸塩、重酒石酸塩、コハク酸塩、マレイン酸塩、フマル酸塩、グルコン酸塩、サッカリン酸塩、安息香酸塩、メタンスルホン酸塩、エタンスルホン酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、p-トルエンスルホン酸塩およびパモエート塩から選択される、請求項 1 記載の化合物の塩。

30

【請求項 9】

哺乳類における、自己免疫疾患、慢性関節リウマチ、I 型糖尿病 (近年開始)、狼瘡、炎症性腸疾患、視神経炎、乾癬、多発性硬化症、リウマチ性多発性筋痛、ブドウ膜炎および脈管炎、急性および慢性炎症性症状変形性関節症、成人呼吸促進症候群、乳児期の呼吸促進症候群、虚血性再灌流障害、糸球体腎炎、ならびに慢性閉塞性肺疾患 (COPD)、アレルギー症状、喘息およびアトピー性皮膚炎、感染に関連した炎症、ウイルス性炎症、インフルエンザ、肝炎およびギヤンバレー症候群、慢性気管支炎、慢性または急性組織、細胞および固形器官移植片拒絶、異種移植、アテローム硬化症、再狭窄、HIV 感染性 (補受容体使用)、ならびに肉芽腫性疾患、類肉腫症、らい病および結核、ならびに癌関連後遺症、多発性骨髄腫から選択される障害または症状を治療または予防するための；細胞浸潤低減の結果としての炎症部位でのサイトカインおよび／または TNF の産生を限定するための；TNF および IL-1 に関連した疾患および／またはうっ血性心不全の治療のための、ならびに肺気腫またはそれに関連した呼吸困難、気腫；HIV-1、HIV-2、HIV-3；サイトメガロウイルス (CMV)、アデノウイルス、ヘルペスウイルス (帯状疱疹および単純ヘルペス) を治療するための、感染 (この場合、このような感染は有害な炎症性サイトカインおよび／または TNF の産生を誘導する) に関連した後遺症、真菌性髄膜炎、関節組織損傷、過形成、パニヌス形成および骨吸収、乾癬性関節炎、肝不全、細菌性髄膜炎、川崎病、心筋梗塞、急性肝不全、ライム病、敗血症性ショック、癌、外

40

50

傷およびマラリアを治療するための、このような障害または症状を治療または予防するのに有効な量の請求項 1 記載の化合物またはその製薬上許容可能な塩またはプロドラッグ、ならびに製薬上許容可能な担体を含む製剤組成物。

【請求項 10】

哺乳類における受容体 CCR1 に結合するケモカインを阻害することにより治療または予防され得る障害または症状を治療または予防するための製剤組成物であって、このような障害または症状を治療または予防するのに有効な量の請求項 1 記載の化合物またはその製薬上許容可能な塩またはプロドラッグ、ならびに製薬上許容可能な担体を含む製剤組成物。

【請求項 11】

哺乳類における、自己免疫疾患、慢性関節リウマチ、I 型糖尿病（近年開始）、狼瘡、炎症性腸疾患、視神経炎、乾癬、多発性硬化症、リウマチ性多発性筋痛、ブドウ膜炎および脈管炎、急性および慢性炎症性症状変形性関節症、成人呼吸促進症候群、乳児期の呼吸促進症候群、虚血性再灌流障害、糸球体腎炎、ならびに慢性閉塞性肺疾患（COPD）、アレルギー症状、喘息およびアトピー性皮膚炎、感染に関連した炎症、ウイルス性炎症、インフルエンザ、肝炎およびギヤンバレー症候群、慢性気管支炎、慢性または急性組織、細胞および固形器官移植片拒絶、異種移植、アテローム硬化症、再狭窄、HIV 感染性（補受容体使用）、ならびに肉芽腫性疾患、類肉腫症、らい病および結核、ならびに癌関連後遺症、多発性骨髄腫から選択される障害または症状を治療または予防するための；細胞浸潤低減の結果としての炎症部位でのサイトカインおよび／または TNF の産生を限定するための；TNF および IL-1 に関連した疾患および／またはうっ血性心不全の治療のための、ならびに肺気腫またはそれに関連した呼吸困難、気腫；HIV-1、HIV-2、HIV-3；サイトメガロウイルス（CMV）、アデノウイルス、ヘルペスウイルス（帯状疱疹および単純ヘルペス）を治療するための、感染（この場合、このような感染は有害な炎症性サイトカインおよび／または TNF の産生を誘導する）に関連した後遺症、真菌性髄膜炎、関節組織損傷、過形成、パヌス形成および骨吸収、乾癬性関節炎、肝不全、細菌性髄膜炎、川崎病、心筋梗塞、急性肝不全、ライム病、敗血症性ショック、癌、外傷およびマラリアを治療するための方法であって、このような障害または症状を治療または予防するのに有効な量の請求項 1 記載の化合物またはその製薬上許容可能な塩またはプロドラッグを、このような治療または予防を必要とする哺乳類に投与することを包含する方法。

【請求項 12】

哺乳類における CCR1 受容体を中和することにより治療または予防され得る障害または症状の治療または予防方法であって、このような障害または症状を治療または予防するのに有効な量の請求項 1 記載の化合物またはその製薬上許容可能な塩またはプロドラッグを、このような治療または予防を必要とする哺乳類に投与することを包含する方法。

【請求項 13】

哺乳類における、自己免疫疾患、慢性関節リウマチ、I 型糖尿病（近年開始）、狼瘡、炎症性腸疾患、視神経炎、乾癬、多発性硬化症、リウマチ性多発性筋痛、ブドウ膜炎および脈管炎、急性および慢性炎症性症状変形性関節症、成人呼吸促進症候群、乳児期の呼吸促進症候群、虚血性再灌流障害、糸球体腎炎、ならびに慢性閉塞性肺疾患（COPD）、アレルギー症状、喘息およびアトピー性皮膚炎、感染に関連した炎症、ウイルス性炎症、インフルエンザ、肝炎およびギヤンバレー症候群、慢性気管支炎、慢性または急性組織、細胞および固形器官移植片拒絶、異種移植、アテローム硬化症、再狭窄、HIV 感染性（補受容体使用）、ならびに肉芽腫性疾患、類肉腫症、らい病および結核、ならびに癌関連後遺症、多発性骨髄腫から選択される障害または症状を治療または予防するための；細胞浸潤低減の結果としての炎症部位でのサイトカインおよび／または TNF の産生を限定するための；TNF および IL-1 に関連した疾患および／またはうっ血性心不全の治療のための、ならびに肺気腫またはそれに関連した呼吸困難、気腫；HIV-1、HIV-2、HIV-3；サイトメガロウイルス（CMV）、アデノウイルス、ヘルペスウイルス（

10

20

30

40

50

帯状疱疹および単純ヘルペス）を治療するための、感染（この場合、このような感染は有害な炎症性サイトカインおよび／またはTNFの産生を誘導する）に関連した後遺症、真菌性髄膜炎、関節組織損傷、過形成、パンヌス形成および骨吸収、乾癬性関節炎、肝不全、細菌性髄膜炎、川崎病、心筋梗塞、急性肝不全、ライム病、敗血症性ショック、癌、外傷およびマラリアを治療するための製剤組成物であって、CCR1受容体中和有効量の請求項1記載の化合物またはその製薬上許容可能な塩、ならびに製薬上許容可能な担体を含む製剤組成物。

【請求項14】

哺乳類におけるCCR1受容体を中和することにより治療または予防され得る障害または症状を治療または予防するための製剤組成物であって、CCR1受容体中和有効量の請求項1記載の化合物またはその製薬上許容可能な塩またはプロドラッグ、ならびに製薬上許容可能な担体を含む製剤組成物。

10

【発明の詳細な説明】

【0001】

発明の背景

本発明は、新規のピペラジン誘導体、それらの使用方法およびそれらを含む製剤組成物に関する。

【0002】

本発明の化合物は、炎症細胞および免疫調節細胞（好ましくは白血球およびリンパ球）上に見出される受容体CCR1に結合するケモカインの強力なそして選択的な阻害剤である。CCR1受容体は、時としてはCC-CKR1受容体とも呼ばれる。これらの化合物は、THP-1細胞およびヒト白血球のMIP-1 α （およびCCR1と相互作用することが示された関連ケモカイン（例えばRANTES、HCC-1、MCP-2およびMCP-3））誘導性走化性も阻害し、そして自己免疫疾患（例えば、慢性関節リウマチ、I型糖尿病（近年開始）、狼瘡、炎症性腸疾患、視神経炎、乾癬、多発性硬化症、リウマチ性多発性筋痛、ブドウ膜炎および脈管炎）、急性および慢性炎症性症状（例えば、変形性関節症、成人呼吸促進症候群、乳児期の呼吸促進症候群、虚血性再灌流障害、糸球体腎炎、および慢性閉塞性肺疾患（COPD））、アレルギー症状（例えば、喘息およびアトピー性皮膚炎）、感染に関連した炎症（例えば、ウイルス性炎症（例えば、インフルエンザ、肝炎およびギャンーバレー症候群）、慢性気管支炎、組織、細胞および固形器官移植片拒絶（例えば異種移植）（慢性および急性）、アテローム硬化症、再狭窄、HIV感染性（補受容体使用）、ならびに肉芽腫性疾患（例えば、類肉腫症、らい病および結核）、ならびにある種の癌に関連した後遺症、例えば多発性骨髄腫の治療または予防に有用であると思われる。この一連の化合物は、細胞浸潤低減の結果としての炎症部位でのサイトカイン、例えばTNFおよびIL-1（これらに限定されない）の産生も限定し、TNFおよびIL-1に関連した疾患、例えばうっ血性心不全、肺気腫またはTNFおよびIL-1に関連した呼吸困難、気腫；HIV-1、HIV-2、HIV-3；サイトメガロウイルス（CMV）、アデノウイルス、ヘルペスウイルス（帯状疱疹および単純ヘルペス）に関連した疾患のために利益を提供する。それらは、感染（この場合、このような感染は有害な炎症性サイトカイン、例えばTNFの産生を誘導する）に関連した後遺症、例えば真菌性髄膜炎、関節組織損傷、過形成、パンヌス形成および骨吸収、乾癬性関節炎、肝不全、細菌性髄膜炎、川崎病、心筋梗塞、急性肝不全、ライム病、敗血症性ショック、癌、外傷およびマラリア等にも利益を提供し得る。

20

30

40

【0003】

MIP-1 α およびRANTESは、炎症性細胞、特にCD8+リンパ球、多形核白血球（PMN）およびマクロファージにより産生される可溶性走化性ペプチド（ケモカイン）である（J. Biol. Chem., 270(30) 29671-29675 (1995)）。これらのケモカインは、重要な炎症性および免疫調節性細胞の移動および活性化を誘導することにより作用する。ケモカインのレベル上昇は、慢性関節リウマチ患者の滑液に、移植患者からの慢性および急性拒絶組織に、ならびにアレルギー曝露後のアレ

50


ルギー性鼻炎患者の鼻分泌物中に見出されている (Teran, et al., J. Immunol., 1806-1812 (1996) および Kuna et al., J. Allergy Clin. Immunol. 321 (1994))。MIP1 α の中和または遺伝子破壊によりケモカイン／受容体相互作用を妨げる抗体は、単球およびCD8+リンパ球の漸増を限定することにより、疾患におけるMIP-1 α およびRANTESの役割に直接的証拠を提供した (Smith et al., J. Immunol. 153, 4704 (1994) および Cook et al., Science, 269, 1583 (1995))。これらのデータは全部で、CCR1受容体アンタゴニストがおそらくは、いくつかの免疫ベースの疾患の有効治療である、ということを実証する。本明細書中に記載された化合物は、CCR1受容体の強力なおよび選択的なアンタゴニストである。 10

【0004】

発明の要約

本発明は、次式：

【化2】



20

{式中、 a は1、2、3、4または5であり、
 c は0または1であり、
 d は1、2、3、4または5であり、
 k は1、2、3または4であり； l は0、1、2、3または4であり； m は0、1、2、3または4であり； k 、 l および m はすべて0であるということではなく、そして m および/または k が0でない場合には、 l は0でなければならず、

30

【0005】

W はCHまたはNであり、

X はC(O)、C(S)または CH_2 であり、

Y は CH_2 であり、

Z は酸素、 NR^9 または $CR^{11}R^{12}$ であり、

R^1 は各々別々に、水素、ヒドロキシ、ヒドロキシスルホニル、ハロ、($C_1 \sim C_6$)アルキル、メルカプト、メルカプト($C_1 \sim C_6$)アルキル、($C_1 \sim C_6$)アルキルチオ、($C_1 \sim C_6$)アルキルスルフィニル、($C_1 \sim C_6$)アルキルスルホニル、($C_1 \sim C_6$)アルキルチオ($C_1 \sim C_6$)アルキル、($C_1 \sim C_6$)アルキルスルフィニル($C_1 \sim C_6$)アルキル、($C_1 \sim C_6$)アルキルスルホニル($C_1 \sim C_6$)アルキル、($C_1 \sim C_6$)アルコキシ、($C_6 \sim C_{10}$)アリーロキシ、ハロ($C_1 \sim C_6$)アルキル、トリフルオロメチル、ホルミル、ホルミル($C_1 \sim C_6$)アルキル、ニトロ、ニトロソ、シアノ、($C_6 \sim C_{10}$)アリール($C_1 \sim C_6$)アルコキシ、ハロ($C_1 \sim C_6$)アルコキシ、トリフルオロメトキシ、($C_3 \sim C_7$)シクロアルキル、($C_3 \sim C_7$)シクロアルキル($C_1 \sim C_6$)アルキル、ヒドロキシ($C_3 \sim C_7$)シクロアルキル($C_1 \sim C_6$)アルキル、($C_3 \sim C_7$)シクロアルキルアミノ、($C_3 \sim C_7$)シクロアルキル 40 50

アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキル、($(C_3 \sim C_7)$ シクロアルキル) ($(C_1 \sim C_6)$ アルキル) アミノ、($(C_3 \sim C_7)$ シクロアルキル) ($(C_1 \sim C_6)$ アルキル) アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキル、シアノ ($C_1 \sim C_6$) アルキル、($C_2 \sim C_7$) アルケニル、($C_2 \sim C_7$) アルキニル、($C_6 \sim C_{10}$) アリール、($C_6 \sim C_{10}$) アリール ($C_1 \sim C_6$) アルキル、($C_6 \sim C_{10}$) アリール ($C_2 \sim C_6$) アルケニル、ヒドロキシ ($C_1 \sim C_6$) アルキル、ヒドロキシ ($C_6 \sim C_{10}$) アリール ($C_1 \sim C_6$) アルキル、ヒドロキシ ($C_1 \sim C_6$) アルキルチオ ($C_1 \sim C_6$) アルキル、ヒドロキシ ($C_2 \sim C_6$) アルケニル、ヒドロキシ ($C_2 \sim C_6$) アルキニル、($C_1 \sim C_6$) アルコキシ ($C_1 \sim C_6$) アルキル、($C_1 \sim C_6$) アルコキシ ($C_6 \sim C_{10}$) アリール ($C_1 \sim C_6$) アルキル、($C_6 \sim C_{10}$) アリールオキシ ($C_1 \sim C_6$) アルキル、($C_6 \sim C_{10}$) アリール ($C_1 \sim C_6$) アルコキシ ($C_1 \sim C_6$) アルキル、アミノ、($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ、($(C_1 \sim C_6)$ アルキル)₂ アミノ、($C_6 \sim C_{10}$) アリールアミノ、($C_6 \sim C_{10}$) アリール ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ、アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキル、($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキル、($(C_1 \sim C_6)$ アルキル)₂ アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキル、ヒドロキシ ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキル、($C_6 \sim C_{10}$) アリールアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキル、($C_6 \sim C_{10}$) アリール ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキル、($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ、($(C_1 \sim C_6)$ アルキルカルボニル) ($(C_1 \sim C_6)$ アルキル) アミノ、($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキル、($(C_1 \sim C_6)$ アルキルカルボニル) ($(C_1 \sim C_6)$ アルキル) アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキル、($C_1 \sim C_6$) アルコキシカルボニルアミノ、($C_1 \sim C_6$) アルコキシカルボニル) ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ、($C_1 \sim C_6$) アルコキシカルボニルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキル、

10

20

30

40

【0006】

($C_1 \sim C_6$) アルコキシカルボニル) ($(C_1 \sim C_6)$ アルキル) アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキル、カルボキシ、($C_1 \sim C_6$) アルコキシカルボニル、($C_6 \sim C_{10}$) アリール ($C_1 \sim C_6$) アルコキシカルボニル、($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニル、($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニル ($C_1 \sim C_6$) アルキル、($C_6 \sim C_{10}$) アリールカルボニル、($C_6 \sim C_{10}$) アリールカルボニル ($C_1 \sim C_6$) アルキル、($C_6 \sim C_{10}$) アリール ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニル、($C_6 \sim C_{10}$) アリール ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニル ($C_1 \sim C_6$) アルキル、カルボキシ ($C_1 \sim C_6$) アルキル、($C_1 \sim C_6$) アルコキシカルボニル ($C_1 \sim C_6$) アルキル、($C_6 \sim C_{10}$) アリール ($C_1 \sim C_6$) アルコキシカルボニル ($C_1 \sim C_6$) アルキル、($C_1 \sim C_6$) アルコキシ ($C_1 \sim C_6$) アルキル ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルオキシ ($C_1 \sim C_6$) アルキル、アミノカルボニル、($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノカルボニル、($(C_1 \sim C_6)$ アルキル)₂ アミノカルボニル、($C_6 \sim C_{10}$) アリールアミノカルボニル、($C_6 \sim C_{10}$) アリール ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノカルボニル、アミノカルボニル ($C_1 \sim C_6$) アルキル、($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノカルボニル ($C_1 \sim C_6$) アルキル、($(C_1 \sim C_6)$ アルキル)₂ アミノカルボニル ($C_1 \sim C_6$) アルキル、($C_6 \sim C_{10}$) アリールアミノカルボニル ($C_1 \sim C_6$) アルキル、($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノカルボニル ($C_1 \sim C_6$) アルキル、アミジノ、グアニジノ、ウレイド、($C_1 \sim C_6$) アルキルウレイド、($(C_1 \sim C_6)$ アルキル)₂ ウレイド、ウレイド ($C_1 \sim C_6$) アルキル、($C_1 \sim C_6$) アルキルウレイド ($C_1 \sim C_6$) アルキル、($(C_1 \sim C_6)$ アルキル)₂ ウレイド ($C_1 \sim C_6$) アルキル、($C_2 \sim C_9$) ヘテロシクロアルキル、($C_2 \sim C_9$) ヘテロアリール、($C_2 \sim C_9$) ヘテロシクロアルキル ($C_1 \sim C_6$) アルキル および ($C_2 \sim C_9$) ヘテロアリール ($C_1 \sim C_6$) アルキルから選択され、

【0007】

R^4 は ($R^5 Q_q$)_f ($C_6 \sim C_{10}$) アリール、($R^5 Q_q$)_f ($C_3 \sim C_{10}$) シクロアルキル、($R^5 Q_q$)_f ($C_2 \sim C_9$) ヘテロアリール、($R^5 Q_q$)_f ($C_2 \sim C_9$) ヘテロシクロアルキルであって、ここで、

50

f は 0、1、2、3、4 または 5 であり、

Q は (C₁ ~ C₆) アルキルであり、

【0008】

q は 0 または 1 であり、

R⁵ は別々に、(C₂ ~ C₉) ヘテロシクロアルキルカルボニル、(C₂ ~ C₉) ヘテロアリールカルボニル、(C₂ ~ C₉) ヘテロアリール(C₁ ~ C₆) アルキルアミノカルボニル、(C₂ ~ C₉) ヘテロアリールアミノカルボニル、(C₂ ~ C₉) ヘテロシクロアルキル(C₁ ~ C₆) アルキルアミノカルボニル、(C₁ ~ C₆) アルキルスルホニルアミノカルボニル、(C₁ ~ C₆) アルキルスルホニルアミノ(C₁ ~ C₆) アルキルアミノカルボニル、ウレイド(C₁ ~ C₆) アルキルアミノカルボニル、(C₁ ~ C₆) アルキルウレイド(C₁ ~ C₆) アルキルアミノカルボニル、((C₁ ~ C₆) アルキル)₂ ウレイド(C₁ ~ C₆) アルキルアミノカルボニル、ハロ(C₁ ~ C₆) アルキルアミノカルボニル、(C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ(C₁ ~ C₆) アルキルアミノカルボニル、ヒドロキシ(C₁ ~ C₆) アルキルアミノカルボニル、アミノスルホニル(C₁ ~ C₆) アルキルアミノカルボニル、カルボキシ(C₁ ~ C₆) アルキルアミノカルボニル、(C₁ ~ C₆) アルキルアミノスルホニル(C₁ ~ C₆) アルキルアミノカルボニル、アミノ(C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ、(C₁ ~ C₆) アルキルアミノ(C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ、カルボキシ(C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ、カルボキシ(C₁ ~ C₆) アルコキシカルボニルアミノ、((C₁ ~ C₆) アルキル)₂ アミノ(C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ、アセチルアミノ(C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ、(アセチル)((C₁ ~ C₆) アルキル)アミノ(C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ、

10

20

【0009】

(C₁ ~ C₆) アルキルスルホニルアミノ(C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ、シアノグアニジノ(C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ、(C₁ ~ C₆) アルキルシアノグアニジノ(C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ、((C₁ ~ C₆) アルキル)₂ シアノグアニジノ(C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ、アミノカルボニル(C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ、アミノカルボニルアミノ(C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ、(C₁ ~ C₆) アルキルアミノカルボニルアミノ(C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ、((C₁ ~ C₆) アルキル)₂ アミノカルボニルアミノ(C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ、(C₂ ~ C₉) ヘテロアリール(C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ、(C₂ ~ C₉) ヘテロシクロアルキル(C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ、アミノスルホニル(C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ、ヒドロキシ(C₁ ~ C₆) アルキルウレイド、アミノ(C₁ ~ C₆) アルキルウレイド、(C₁ ~ C₆) アルキルアミノ(C₁ ~ C₆) アルキルウレイド、((C₁ ~ C₆) アルキル)₂ アミノ(C₁ ~ C₆) アルキルウレイド、(C₂ ~ C₉) ヘテロシクロアルキル(C₁ ~ C₆) アルキルウレイド、(C₂ ~ C₉) ヘテロアリールウレイド、(C₂ ~ C₉) ヘテロアリール(C₁ ~ C₆) アルキルウレイド、(C₁ ~ C₆) アルキルスルホニルウレイド、アミノスルホニル(C₁ ~ C₆) アルキルウレイド、アミノカルボニル(C₁ ~ C₆) アルキルウレイド、(C₁ ~ C₆) アルキルアミノカルボニル(C₁ ~ C₆) アルキルウレイド、((C₁ ~ C₆) アルキル)₂ アミノカルボニル(C₁ ~ C₆) アルキルウレイド、アセチルアミノ(C₁ ~ C₆) アルキルウレイド、(アセチル)((C₁ ~ C₆) アルキル)アミノ(C₁ ~ C₆) アルキルウレイド、カルボキシ(C₁ ~ C₆) アルキルウレイド、ハロ(C₁ ~ C₆) アルキルスルホニルアミノ、アミノ(C₁ ~ C₆) アルキルスルホニルアミノ、(C₁ ~ C₆) アルキルアミノ(C₁ ~ C₆) アルキルスルホニルアミノ、((C₁ ~ C₆) アルキル)₂ アミノ(C₁ ~ C₆) アルキルスルホニルアミノ、アセチルアミノ(C₁ ~ C₆) アルキルスルホニルアミノ、(アセチル)((C₁ ~ C₆) アルキル)アミノ(C₁ ~ C₆) アルキルスルホニルアミノ、ウレイド(C₁ ~ C₆) アルキルスルホニルアミノ、(C₁ ~ C₆) アルキルウレイド(C₁ ~ C₆) アルキルスルホニルアミノ、((C₁ ~ C₆) アルキル)₂ ウレイド(C₁ ~ C₆) アルキルスルホニル

30

40

50

10

20

30

40

50

$C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ、アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ、($C_1 \sim C_6$) アルコキシ ($C_1 \sim C_6$) アルキルミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ、($C_2 \sim C_9$) ヘテロシクロアルキルオキシカルボニルアミノ、($C_2 \sim C_9$) ヘテロアリールカルボニルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ、($C_2 \sim C_9$) ヘテロアリールカルボニルアミノ、($C_2 \sim C_9$) ヘテロシクロアルキルカルボニルアミノ、($C_2 \sim C_9$) ヘテロアリール ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ、($C_2 \sim C_9$) ヘテロシクロアルキル ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ、($C_2 \sim C_9$) ヘテロシクロアルキルカルボニルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ、

【0012】

シアノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ、($C_1 \sim C_6$) アルキルスルホニルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノカルボニルアミノ、($C_1 \sim C_6$) アルコキシカルボニルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノカルボニルアミノ、($C_2 \sim C_9$) ヘテロシクロアルキルオキシカルボニルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノカルボニルアミノ、($C_2 \sim C_9$) ヘテロアリールオキシカルボニルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノカルボニルアミノ、ウレイド ($C_1 \sim C_6$) アルキルウレイド、($C_1 \sim C_6$) アルキルウレイド ($C_1 \sim C_6$) アルキルウレイド、(($C_1 \sim C_6$) アルキル)₂ ウレイド ($C_1 \sim C_6$) アルキルウレイド、シアノグアニジノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルウレイド、($C_2 \sim C_9$) ヘテロアリール (シアノグアニジノ)、アミノスルホニル、アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルスルホニル、($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルスルホニル、(($C_1 \sim C_6$) アルキル)₂ アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルスルホニル、($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノスルホニル、(($C_1 \sim C_6$) アルキル)₂ アミノスルホニル、($C_2 \sim C_9$) ヘテロシクロアルキルスルホニル、アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノスルホニル、($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノスルホニル、(($C_1 \sim C_6$) アルキル)₂ アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノスルホニル、($C_2 \sim C_9$) ヘテロアリールアミノスルホニル、ヒドロキシ ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノスルホニル、($C_1 \sim C_6$) アルコキシ ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノスルホニル、ウレイド ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノスルホニル、($C_1 \sim C_6$) アルキルウレイド ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノスルホニル、(($C_1 \sim C_6$) アルキル)₂ ウレイド ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノスルホニル、($C_1 \sim C_6$) アルキルスルホニルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノスルホニル、($C_1 \sim C_6$) アルコキシカルボニルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノスルホニル、($C_2 \sim C_9$) ヘテロシクロアルキルオキシカルボニルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノスルホニル、($C_2 \sim C_9$) ヘテロアリールオキシカルボニルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノスルホニル、アミノカルボニル ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノスルホニル、シアノグアニジノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノスルホニル、($C_2 \sim C_9$) ヘテロアリールアミノスルホニル、($C_2 \sim C_9$) ヘテロアリール ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノスルホニル、($C_2 \sim C_9$) ヘテロシクロアルキルアミノスルホニル、($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノスルホニル、ハロ ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノスルホニル、($C_1 \sim C_6$) アルコキシカルボニルアミノスルホニル、ウレイドスルホニル、($C_1 \sim C_6$) アルキルウレイドスルホニル、

【0013】

(($C_1 \sim C_6$) アルキル)₂ ウレイドスルホニル、水素、ヒドロキシ、ヒドロキシスルホニル、ハロ、メルカプト、($C_1 \sim C_6$) アルキルチオ、($C_1 \sim C_6$) アルキルスルフィニル、($C_1 \sim C_6$) アルキルスルホニル、カルボキシ ($C_1 \sim C_6$) アルキルスルホニル、($C_6 \sim C_{10}$) アリールスルホニル、($C_2 \sim C_9$) ヘテロアリールスルホニル、($C_1 \sim C_6$) アルコキシ、ヒドロキシ ($C_1 \sim C_6$) アルコキシ、($C_6 \sim C_{10}$) アリールオキシ、トリフルオロ ($C_1 \sim C_6$) アルキル、ホルミル、ニトロ、ニトロソ、シアノ、ハロ ($C_1 \sim C_6$) アルコキシ、トリフルオロ ($C_1 \sim C_6$) アルコキシ、アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルコキシ、($C_3 \sim C_{10}$) シクロアルキルヒドロキシ ($C_3 \sim C_{10}$) シクロアルキル ($C_3 \sim C_{10}$) シクロアルキルアミノ ($C_2 \sim C_6$) アルケニ

10

20

30

40

50

ル、(C₂～C₆)アルキニル、(C₆～C₁₀)アリール、(C₆～C₁₀)アリール
 (C₂～C₆)アルケニル、ヒドロキシ(C₆～C₁₀)アリール、((C₁～C₆)ア
 ルキルアミノ)(C₆～C₁₀)アリール、ヒドロキシ(C₁～C₆)アルキルチオ、ヒ
 ドロキシ(C₂～C₆)アルケニル、ヒドロキシ(C₂～C₆)アルキニル、(C₁～C
 6)アルコキシ(C₆～C₁₀)アリール、(C₆～C₁₀)アリール(C₁～C₆)ア
 ルコキシ、アミノ、(C₁～C₆)アルキルアミノ、((C₁～C₆)アルキル)₂アミ
 ノ、(C₆～C₁₀)アリールアミノ、(C₆～C₁₀)アリール(C₁～C₆)アルキ
 ルアミノ、アミノ(C₁～C₆)アルキルアミノ、(C₂～C₉)ヘテロシクロアルキル
 アミノ、(C₂～C₉)ヘテロアリールアミノ、(C₂～C₉)ヘテロアリール(C₁～
 C₆)アルキルアミノ、(C₂～C₉)ヘテロシクロアルキル(C₁～C₆)アルキルア
 ミノ、(C₃～C₁₀)シクロアルキル(C₁～C₆)アルキルアミノ、(C₁～C₆)
 アルキルカルボニルアミノ、(C₁～C₆)アルコキシカルボニルアミノ、(C₂～C₆
)アルケニルカルボニルアミノ、(C₃～C₁₀)シクロアルキルカルボニルアミノ、(
 C₆～C₁₀)アリールカルボニルアミノ、(C₂～C₉)ヘテロシクロアルキルカルボ
 ニルアミノ、(C₂～C₉)ヘテロアリールオキシカルボニルアミノ、(C₂～C₉)ヘ
 テロシクロアルコキシカルボニルアミノ、ハロ(C₁～C₆)アルキルカルボニルアミノ
 、(C₁～C₆)アルコキシ(C₁～C₆)アルキルカルボニルアミノ、(C₁～C₆)
 アルコキシカルボニル(C₁～C₆)アルキルカルボニルアミノ、((C₁～C₆)アル
 キルカルボニル)((C₁～C₆)アルキル)アミノ、

10

【0014】

20

((C₁～C₆)アルコキシカルボニル)((C₁～C₆)アルキル)アミノ、(C₁～
 C₆)アルキルスルホニルアミノ、((C₁～C₆)アルキルカルボニル)((C₁～C
 6)アルキル)アミノ、(C₃～C₁₀)シクロアルキル(C₁～C₆)アルキル)アミ
 ノ、((C₁～C₆)アルキルスルホニル)((C₁～C₆)アルキル)アミノ、(C₂
 ～C₉)ヘテロアリールスルホニルアミノ、(C₆～C₁₀)アリールスルホニルアミノ
 、((C₆～C₁₀)アリールスルホニル)((C₁～C₆)アルキル)アミノ、カルボ
 キシ、(C₁～C₆)アルコキシカルボニル、(C₆～C₁₀)アリール(C₁～C₆)
 アルコキシカルボニル、(C₁～C₆)アルキルカルボニル、カルボキシ(C₁～C₆)
 アルキルカルボニル、アミノ(C₁～C₆)アルキルカルボニル、(C₁～C₆)アルキ
 ルアミノ(C₁～C₆)アルキルカルボニル、((C₁～C₆)アルキル)₂アミノ(C
 1～C₆)アルキルカルボニル、(C₆～C₁₀)アリールカルボニル、(C₂～C₉)
 ヘテロアリール(C₁～C₆)アルキルカルボニル、(C₆～C₁₀)アリール(C₁～
 C₆)アルキルカルボニル、ヒドロキシ(C₁～C₆)アルコキシカルボニル、(C₁～
 C₆)アルコキシ(C₁～C₆)アルキルカルボニルオキシ、((C₁～C₆)アルキル
)₂アミノカルボニルオキシアミノカルボニル、ヒドロキシアミノカルボニル、(C₁～
 C₆)アルキルアミノカルボニル、((C₁～C₆)アルキル)₂アミノカルボニル、(
 C₆～C₁₀)アリールアミノカルボニル、(C₆～C₁₀)アリール(C₁～C₆)ア
 ルキルアミノカルボニル、(アミノカルボニル(C₁～C₆)アルキルアミノカルボニル
 、((C₁～C₆)アルキルアミノカルボニル(C₁～C₆)アルキルアミノカルボニル
 、(カルボキシ(C₁～C₆)アルキル)アミノカルボニル、(C₁～C₆)アルコキシ
 カルボニル(C₁～C₆)アルキルアミノカルボニル、(アミノ(C₁～C₆)アルキル
)アミノカルボニル、(ヒドロキシ(C₁～C₆)アルキルアミノカルボニルアミジノ、
 ヒドロキシアミジノ、グアニジノ、ウレイド、(C₁～C₆)アルキルウレイド、(C₆
 ～C₁₀)アリールウレイド、((C₆～C₁₀)アリール)₂ウレイド、(C₆～C<sub>1
 0</sub>)アリール(C₁～C₆)アルキルウレイド、ハロ(C₁～C₆)アルキルウレイド、
 ((C₁～C₆)アルキル)((C₆～C₁₀)アリール)ウレイド、

30

40

【0015】

((C₁～C₆)アルキル)₂ウレイド、ハロ(C₁～C₆)アルキルカルボニルウレイ
 ド、(ハロ(C₁～C₆)アルキル)((C₁～C₆)アルキル)ウレイド、((C₁～
 C₆)アルコキシカルボニル(C₁～C₆)アルキル)ウレイド、グリシンアミド、(C

50

$C_1 \sim C_6$) アルキルグリシンアミド、アミノカルボニルグリシンアミド、($C_1 \sim C_6$)
 アルコキシ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルグリシンアミド、(アミノカルボニル) ($C_1 \sim C_6$)
 アルキル) グリシンアミド、($C_1 \sim C_6$) アルコキシカルボニル($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニル) ($C_1 \sim C_6$)
 アルキル) グリシンアミド、($C_1 \sim C_6$) アルコキシカルボニルアミノ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニル) グリシンアミ
 ド、($C_6 \sim C_{10}$) アリールカルボニルグリシンアミド、($C_6 \sim C_{10}$) アリール
 カルボニル) ($C_1 \sim C_6$) アルキル) グリシンアミド、($C_6 \sim C_{10}$) アリール
 ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノカルボニル) グリシンアミド、($C_6 \sim C_{10}$) アリール
 ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノカルボニル) ($C_1 \sim C_6$) アルキル) グリシンアミド
 、($C_6 \sim C_{10}$) アリールアミノカルボニルグリシンアミド、($C_6 \sim C_{10}$) アリ
 ールアミノカルボニル) ($C_1 \sim C_6$) アルキル) グリシンアミド、アラニンアミド、
 ($C_1 \sim C_6$) アルキルアラニンアミド、($C_2 \sim C_9$) ヘテロアリール、アミノ($C_2 \sim C_9$)
 ヘテロアリール、($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ($C_2 \sim C_9$) ヘテロアリール
 、($C_1 \sim C_6$) アルキル) $_2$ アミノ($C_2 \sim C_9$) ヘテロアリール、($C_2 \sim C_9$)
 ヘテロアリールオキシ、($C_2 \sim C_9$) ヘテロシクロアルキル、カルボキシ($C_1 \sim C_6$)
 アルコキシ、($C_1 \sim C_6$) アルキルスルホニルアミノカルボニル($C_1 \sim C_6$) アル
 コキシ、($C_1 \sim C_6$) アルキルスルホニルアミノ($C_1 \sim C_6$) アルコキシ、($C_2 \sim C_9$)
 ヘテロアリール($C_1 \sim C_6$) アルコキシ、カルボキシ($C_1 \sim C_6$) アルキルア
 ミノ($C_2 \sim C_6$) アルコキシ、アミノ($C_2 \sim C_6$) アルコキシ、(アミノカルボニル
) (ヒドロキシ) アミノ、($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ($C_2 \sim C_6$) アルコキシ、(
 ($C_1 \sim C_6$) アルキル) $_2$ アミノ($C_2 \sim C_6$) アルコキシ、($C_1 \sim C_6$) アルキル
 カルボニルアミノ($C_2 \sim C_6$) アルコキシ、アミノカルボニルアミノ($C_2 \sim C_6$) ア
 ルコキシ、($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノカルボニルアミノ($C_2 \sim C_6$) アルコキシ、
 ($C_1 \sim C_6$) アルキル) $_2$ アミノカルボニルアミノ($C_2 \sim C_6$) アルコキシ、アミ
 ノ($C_2 \sim C_6$) アルコキシカルボニルアミノ、($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ($C_2 \sim C_6$)
 アルコキシカルボニルアミノ、($C_1 \sim C_6$) アルキル) $_2$ アミノ($C_2 \sim C_6$)
 アルコキシカルボニルアミノ、($C_2 \sim C_9$) ヘテロアリールアミノ($C_2 \sim C_6$) ア
 ルコキシ、バルビツリル、($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ($C_1 \sim C_6$) アル
 キルアミノカルボニル、アミノ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ(ここで、($C_1 \sim C_6$)
 アルキルは、水素、アミノ、ヒドロキシル、($C_1 \sim C_6$) アルコキシ、カル
 ボキシ、さらなる置換化($C_2 \sim C_9$) ヘテロアリール、($C_6 \sim C_{10}$) アリール、($C_2 \sim C_9$)
 ヘテロシクロアルキルおよびシクロアルキル(これらに限定されない)から
 選択される1つまたは2つの基で任意に置換されるか、あるいは2つの基が一緒になって
 炭素環を作り上げる)、ならびに R^{1-9} カルボニルアミノ(ここで R^{1-9} は、($C_1 \sim C_6$)
 アルキル、($C_2 \sim C_6$) アルコキシおよびヒドロキシから選択されるさらに1つま
 たは2つの基で任意に置換される($C_2 \sim C_9$) ヘテロシクロアルキルを含有する窒素で
 ある)(これらに限定されない)から選択され、

【0016】

R^9 は、水素、($C_1 \sim C_6$) アルキル、($C_6 \sim C_{10}$) アリール、($C_6 \sim C_{10}$)
 アリール($C_1 \sim C_6$) アルキル、($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニル、($C_1 \sim C_6$)
 アルキルカルボニル($C_1 \sim C_6$) アルキル、($C_6 \sim C_{10}$) アリール($C_1 \sim C_6$)
 アルキルカルボニル、($C_6 \sim C_{10}$) アリール($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニル($C_1 \sim C_6$)
 アルキル、アミノカルボニル、($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノカルボニル、(
 ($C_1 \sim C_6$) アルキル) $_2$ アミノカルボニルおよび($C_1 \sim C_6$) アルコキシカルボニ
 ルからなる群から選択され、
 R^{1-1} および R^{1-2} は、各々別々に、水素、($C_1 \sim C_6$) アルキル、($C_6 \sim C_{10}$)
 アリール、($C_6 \sim C_{10}$) アリール($C_1 \sim C_6$) アルキル、ヒドロキシ、($C_1 \sim C_6$)
 アルコキシ、ヒドロキシ($C_1 \sim C_6$) アルキル、($C_1 \sim C_6$) アルコキシ($C_1 \sim C_6$)
 アルキル、アミノ、($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ、($C_1 \sim C_6$) アルキル
) $_2$ アミノ、($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ、($C_3 \sim C_8$) シクロアルキル

カルボニルアミノ、(C₃ ~ C₈) シクロアルキル (C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ、(C₁ ~ C₆) アルコキシカルボニルアミノ、(C₁ ~ C₆) アルキルスルホニルアミノ、(C₆ ~ C₁₀) アリールカルボニルアミノ、(C₁ ~ C₆) アルコキシカルボニル (C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ、(C₆ ~ C₁₀) アリール (C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ、((C₆ ~ C₁₀) アリール (C₁ ~ C₆) アルキルカルボニル) ((C₁ ~ C₆) アルキル) アミノ、(C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ (C₁ ~ C₆) アルキル、(C₃ ~ C₈) シクロアルキルカルボニルアミノ (C₁ ~ C₆) アルキル、

【0017】

(C₁ ~ C₆) アルコキシカルボニルアミノ (C₁ ~ C₆) アルキル、(C₂ ~ C₉) ヘテロシクロアルキルカルボニルアミノ (C₁ ~ C₆) アルキル、(C₆ ~ C₁₀) アリール (C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルアミノ (C₁ ~ C₆) アルキル、(C₂ ~ C₉) ヘテロアリールカルボニルアミノ (C₁ ~ C₆) アルキル、(C₆ ~ C₁₀) アリールスルホニルアミノ、(C₁ ~ C₆) アルキルスルホニルアミノ (C₁ ~ C₆) アルキル、アミノカルボニルアミノ、(C₁ ~ C₆) アルキルアミノカルボニルアミノ、ハロ (C₁ ~ C₆) アルキルアミノカルボニルアミノ、((C₁ ~ C₆) アルキル)₂ アミノカルボニルアミノ、アミノカルボニルアミノ (C₁ ~ C₆) アルキル、(C₁ ~ C₆) アルキルアミノカルボニルアミノ (C₁ ~ C₆) アルキル、((C₁ ~ C₆) アルキル)₂ アミノカルボニルアミノ (C₁ ~ C₆) アルキル、ハロ (C₁ ~ C₆) アルキルアミノカルボニルアミノ (C₁ ~ C₆) アルキル、アミノ (C₁ ~ C₆) アルキル、(C₁ ~ C₆) アルキルアミノ (C₁ ~ C₆) アルキル、((C₁ ~ C₆) アルキル)₂ アミノ (C₁ ~ C₆) アルキル、カルボキシ (C₁ ~ C₆) アルキル、(C₁ ~ C₆) アルコキシカルボニル (C₁ ~ C₆) アルキル、アミノカルボニル (C₁ ~ C₆) アルキルおよび (C₁ ~ C₆) アルキルアミノカルボニル (C₁ ~ C₆) アルキルからなる群から選択される} により表される化合物またはその製薬上許容可能な塩またはプロドラッグに関する。

【0018】

式 I の好ましい化合物としては、R¹ が水素、ハロ、シアノ、ニトロ、トリフルオロメチル、トリフルオロメトキシ、(C₁ ~ C₆) アルキル、ヒドロキシまたは (C₁ ~ C₆) アルキルカルボニルオキシであるものが挙げられる。

式 I のその他の好ましい化合物としては、c が 1 であり、X が C (O) であり、d が 1 であり、そして Z が酸素であるものが挙げられる。

式 I のその他の好ましい化合物としては、c が 1 であり、X が C (O) であり、d が 1 であり、そして Z が NR⁹ (ここで R⁹ は水素または (C₁ ~ C₆) アルキルである) であるものが挙げられる。

式 I のその他の好ましい化合物としては、c が 1 であり、X が CH₂ であり、d が 1 であり、そして Z が酸素であるものが挙げられる。

式 I のその他の好ましい化合物としては、c が 1 であり、X が CH₂ であり、d が 1 であり、そして Z が NR⁹ (ここで R⁹ は水素または (C₁ ~ C₆) アルキルである) であるものが挙げられる。

【0019】

式 I のその他の好ましい化合物としては、c が 1 であり、X が C (O) であり、d が 1 であり、そして Z が CR^{1 1} R^{1 2} であるものが挙げられる。

式 I のその他の好ましい化合物としては、c が 1 であり、X が CH₂ であり、d が 1 であり、そして Z が CR^{1 1} R^{1 2} であるものが挙げられる。

式 I のその他の好ましい化合物としては、R⁴ が (R⁵)_f (C₆ ~ C₁₀) アリールまたは (R⁵)_f (C₂ ~ C₉) ヘテロアリール (ここで、f は 1 または 2 である) であるものが挙げられる。

【0020】

式 I のその他の好ましい化合物としては、c が 1 であり、X が C (O) であり、d が 1 であり、Z が酸素であり、l および m がゼロであり、k が 2 であり、そして W が CH である

10

20

30

40

50

式 I のその他の好ましい化合物としては、c が 1 であり、X が C (O) であり、d が 1 であり、Z が酸素であり、l および m がゼロであり、k が 3 であり、そして W が C H であるものが挙げられる。

式 I のその他の好ましい化合物としては、c が 1 であり、X が C (O) であり、d が 1 であり、Z が NR^9 (ここで R^9 は水素または ($\text{C}_1 \sim \text{C}_6$) アルキルである) であり、l および m がゼロであり、k が 2 であり、そして W が CH であるものが挙げられる。

式 I のその他の好ましい化合物としては、c が 1 であり、X が C (O) であり、d が 1 であり、Z が NR^9 (ここで R^9 は水素または ($\text{C}_1 \sim \text{C}_6$) アルキルである) であり、1 および m がゼロであり、k が 3 であり、そして W が CH であるものが挙げられる。

式 I のその他の好ましい化合物としては、c が 1 であり、X が C (O) であり、d が 1 であり、Z が酸素であり、k および l がゼロであり、m が 2 であり、そして W が C H であるものが挙げられる。

式 I のその他の好ましい化合物としては、c が 1 であり、X が C (O) であり、d が 1 であり、Z が酸素であり、k および l がゼロであり、m が 3 であり、そして W が窒素であるものが挙げられる。

式 I のその他の好ましい化合物としては、c が 1 であり、X が C (O) であり、d が 1 であり、Z が NR^9 (ここで R^9 は水素または ($\text{C}_1 \sim \text{C}_6$) アルキルである) であり、k および l がゼロであり、m が 3 であり、そして W が CH であるものが挙げられる。

式 I のその他の好ましい化合物としては、c が 1 であり、X が C (O) であり、d が 1 で 50

20

30

40

50

50

50

アミノ (C₁ ~ C₆) アルキルスルホニル、(C₁ ~ C₆) アルキルアミノ (C₁ ~ C₆)
 アルキルスルホニル、((C₁ ~ C₆) アルキル)₂ アミノ (C₁ ~ C₆) アルキルス
 ルホニル、アミノ (C₁ ~ C₆) アルキルシアノグアニジノ、(C₁ ~ C₆) アルキルア
 ミノ (C₁ ~ C₆) アルキルシアノグアニジノ、((C₁ ~ C₆) アルキル)₂ アミノ (C₁ ~ C₆)
 アルキルシアノグアニジノ、アミノ (C₁ ~ C₆) アルキルアミノスルホニル、
 (C₁ ~ C₆) アルキルアミノ (C₁ ~ C₆) アルキルアミノスルホニル、((C₁ ~ C₆)
 アルキル)₂ アミノ (C₁ ~ C₆) アルキルアミノスルホニル、(((C₁ ~ C₆)
 アルキル) アミノ) (C₆ ~ C₁₀) アリール (C₁ ~ C₆) アルキル、アミノ、ア
 ミノ (C₁ ~ C₆) アルコキシ、アミノ (C₁ ~ C₆) アルコキシカルボニルアミノ、(C₁ ~ C₆)
 アルキルアミノ、((C₁ ~ C₆) アルキル)₂ アミノ、(C₆ ~ C₁₀)
 アリールアミノ、(C₆ ~ C₁₀) アリール (C₁ ~ C₆) アルキルアミノ、アミノ (C₁ ~ C₆)
 アルキルアミノ、(C₂ ~ C₉) ヘテロシクロアルキルアミノ、(C₂ ~ C₉)
 ヘテロアリールアミノ、(C₃ ~ C₁₀) シクロアルキル (C₁ ~ C₆) アルキル) ア

ミノ、(アミノ($C_1 \sim C_6$)アルキル)アミノカルボニル、グリシンアミド、($C_1 \sim C_6$)アルキルグリシンアミド、アラニンアミド、($C_1 \sim C_6$)アルキルアラニンアミド、(($C_1 \sim C_6$)アルキル)₂アミノ($C_1 \sim C_6$)アルキルカルボニルアミノ。

【0030】

式 I のその他の好ましい化合物としては、 R^4 がフェニルであり、Q が($C_1 \sim C_6$)アルキルであり、q が 0 または 1 であり、そして少なくとも 1 つの R^5 がハロ、($C_1 \sim C_6$)アルコキシ、($C_1 \sim C_6$)アルキル、ハロ($C_1 \sim C_6$)アルキルであるものが挙げられる。

【0031】

式 I のその他の好ましい化合物としては、 R^4 がフェニルであり、q が 0 または 1 であり、Q が($C_1 \sim C_6$)アルキルであり、そして少なくとも 1 つの R^5 が官能基の以下の一覧から選択されるものが挙げられる：アミノカルボニル($C_1 \sim C_6$)アルキルウレイド、($C_1 \sim C_6$)アルキルカルボニル、($C_1 \sim C_6$)アルキルスルホニルアミノ、($C_1 \sim C_6$)アルキルスルホニルアミノ($C_1 \sim C_6$)アルキルアミノカルボニル、アミノスルホニル、アミノカルボニル、ウレイド($C_1 \sim C_6$)アルキルアミノカルボニル、アミノカルボニル($C_1 \sim C_6$)アルキルアミノカルボニル、アミノカルボニル($C_1 \sim C_6$)アルキルカルボニルアミノ、ウレイド($C_1 \sim C_6$)アルキルカルボニルアミノ、($C_1 \sim C_6$)アルキルカルボニルアミノ($C_1 \sim C_6$)アルキルカルボニルアミノ、($C_1 \sim C_6$)アルキルカルボニルアミノ($C_1 \sim C_6$)アルキルアミノカルボニルアミノ、ウレイド($C_1 \sim C_6$)アルキルカルボニルアミノ、ウレイド、ハロ($C_1 \sim C_6$)アルキルスルホニルアミノ、($C_1 \sim C_6$)アルキルカルボニルアミノ($C_1 \sim C_6$)アルキルアミノカルボニル。

【0032】

式 I のその他の好ましい化合物としては、 R^4 がピリジルであり、q が 0 または 1 であり、Q が($C_1 \sim C_6$)アルキルであり、そして少なくとも 1 つの R^5 が官能基の以下の一覧から選択されるものが挙げられる：($C_2 \sim C_9$)ヘテロアリールアミノカルボニル、($C_2 \sim C_9$)ヘテロアリールカルボニルアミノ、($C_1 \sim C_6$)アルキルスルホニルアミノカルボニル、アミノスルホニルアミノカルボニル、カルボキシ($C_1 \sim C_6$)アルキルシアノグアニジノ、カルボキシ、($C_2 \sim C_9$)ヘテロアリールアミノ、($C_2 \sim C_9$)ヘテロアリールスルホニル、($C_2 \sim C_9$)ヘテロアリール($C_2 \sim C_9$)ヘテロアリールオキシ、($C_2 \sim C_9$)ヘテロアリールカルボニル、($C_2 \sim C_9$)ヘテロアリール($C_1 \sim C_6$)アルキルカルボニル、カルボキシ($C_1 \sim C_6$)アルキルアミノカルボニルアミノ、($C_2 \sim C_9$)ヘテロアリールアミノカルボニルアミノ、カルボキシ($C_1 \sim C_6$)アルキルカルボニルアミノ、($C_2 \sim C_9$)ヘテロアリール($C_1 \sim C_6$)アルキルアミノ、カルボキシ($C_1 \sim C_6$)アルキルアミノカルボニル、カルボキシ($C_1 \sim C_6$)アルキルスルホニルアミノ、($C_2 \sim C_9$)ヘテロアリールアミノスルホニル、カルボキシ($C_1 \sim C_6$)アルキルスルホニル、カルボキシ($C_1 \sim C_6$)アルキルアミノ、カルボキシ($C_1 \sim C_6$)アルキルカルボニル、カルボキシ($C_1 \sim C_6$)アルコキシ、カルボキシ($C_1 \sim C_6$)アルコキシカルボニルアミノ、ヒドロキシアミノカルボニル、($C_1 \sim C_6$)アルキルスルホニルアミノカルボニル($C_1 \sim C_6$)アルコキシ、($C_2 \sim C_9$)ヘテロアリール($C_1 \sim C_6$)アルコキシ、カルボキシ($C_1 \sim C_6$)アルキルアミノ($C_2 \sim C_6$)アルコキシ、($C_2 \sim C_9$)ヘテロアリールアミノ($C_2 \sim C_6$)アルコキシ。

【0033】

式 I のその他の好ましい化合物としては、 R^4 がピリジルであり、q が 0 または 1 であり、Q が($C_1 \sim C_6$)アルキルであり、そして少なくとも 1 つの R^5 が官能基の以下の一覧から選択されるものが挙げられる：アミノ($C_1 \sim C_6$)アルキルカルボニル、($C_1 \sim C_6$)アルキルアミノ($C_1 \sim C_6$)アルキルカルボニル、(($C_1 \sim C_6$)アルキル)₂アミノ($C_1 \sim C_6$)アルキルカルボニル、アミノ($C_1 \sim C_6$)アルキルカルボニルアミノ、($C_1 \sim C_6$)アルキルアミノ($C_1 \sim C_6$)アルキルカルボニルアミノ、(

($C_1 \sim C_6$) アルキル)₂ アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ、アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルウレイド、($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルウレイド、($C_1 \sim C_6$) アルキル)₂ アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルウレイド、アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルスルホニルアミノ、($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルスルホニルアミノ、($C_1 \sim C_6$) アルキル)₂ アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルスルホニルアミノ、アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルスルホニル、($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルスルホニル、($C_1 \sim C_6$) アルキル)₂ アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルスルホニル、アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルシアノグアニジノ、($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルシアノグアニジノ、($C_1 \sim C_6$) アルキル)₂ アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルシアノグアニジノ、アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノスルホニル、($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノスルホニル、($C_1 \sim C_6$) アルキル)₂ アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノスルホニル、($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ) ($C_6 \sim C_{10}$) アリール ($C_1 \sim C_6$) アルキル、アミノ、アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルコキシ、アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルコキシカルボニルアミノ、($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ、($C_1 \sim C_6$) アルキル)₂ アミノ、($C_6 \sim C_{10}$) アリールアミノ、($C_6 \sim C_{10}$) アリール ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ、アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノ、($C_2 \sim C_9$) ヘテロシクロアルキルアミノ、($C_2 \sim C_9$) ヘテロアリールアミノ、($C_3 \sim C_{10}$) シクロアルキル ($C_1 \sim C_6$) アルキル) アミノ、(アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキル) アミノカルボニル、グリシンアミド、($C_1 \sim C_6$) アルキルグリシンアミド、アラニンアミド、($C_1 \sim C_6$) アルキルアラニンアミド、($C_1 \sim C_6$) アルキル)₂ アミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ。

10

20

【0034】

式 I のその他の好ましい化合物としては、 R^4 がピリジルであり、Q が ($C_1 \sim C_6$) アルキルであり、q が 0 または 1 であり、そして少なくとも 1 つの R^5 がハロ、($C_1 \sim C_6$) アルコキシ、($C_1 \sim C_6$) アルキル、ハロ ($C_1 \sim C_6$) アルキルであるものが挙げられる。

【0035】

式 I のその他の好ましい化合物としては、 R^4 がピリジルであり、Q が ($C_1 \sim C_6$) アルキルであり、q が 0 または 1 であり、そして少なくとも 1 つの R^5 が：アミノカルボニル ($C_1 \sim C_6$) アルキルウレイド、($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニル、($C_1 \sim C_6$) アルキルスルホニルアミノ、($C_1 \sim C_6$) アルキルスルホニルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノカルボニル、アミノスルホニル、アミノカルボニル、ウレイド ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノカルボニル、アミノカルボニル ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノカルボニル、アミノカルボニル ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ、ウレイド ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ、($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ、($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノカルボニルアミノ、ウレイド ($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ、ウレイド、ハロ ($C_1 \sim C_6$) アルキルスルホニルアミノ、($C_1 \sim C_6$) アルキルカルボニルアミノ ($C_1 \sim C_6$) アルキルアミノカルボニルから選択されるものが挙げられる。

30

40

【0036】

本発明は、式 I の化合物の製薬上許容可能な酸付加塩にも関する。本発明の前記の塩基性化合物の製薬上許容可能な酸付加塩を調製するために用いられる酸は、非毒性酸付加塩、即ち薬理学的に許容可能な陰イオンを含有する塩、例えば塩酸塩、臭化水素酸塩、ヨウ化水素酸塩、硝酸塩、硫酸塩、重硫酸塩、リン酸塩、酸性リン酸塩、酢酸塩、乳酸塩、クエン酸塩、酸性クエン酸、酒石酸塩、重酒石酸塩、コハク酸塩、マレイン酸塩、フマル酸塩、グルコン酸塩、サッカリン酸塩、安息香酸塩、メタンスルホン酸塩、エタンスルホン酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、p-トルエンスルホン酸塩およびパモエート塩 (即ち、1, 1-メチレンビス-(2-ヒドロキシ-3-ナフトエート)) を生成するものである。

50

【0037】

本発明は、式 I の塩基付加塩にも関する。現実には酸性である式 I の化合物の製薬上許容可能な塩基性塩を調製するための試薬として用いられ得る化学塩基は、このような化合物と非毒性塩基性塩を生成するものである。このような非毒性塩基性塩としては、このような薬理的に許容可能な陽イオン、例えばアルカリ金属陽イオン（例えばカリウムおよびナトリウム）、アルカリ土類金属陽イオン（例えばカルシウムおよびマグネシウム）、アンモニウムまたは水溶性アミン付加塩、例えば N-メチルグルカミン（メグルミン）、低級アルカノールアンモニウムおよび製薬上許容可能な有機アミンのその他の塩基性塩が挙げられるが、これらに限定されない。塩基性化合物の製薬上許容可能な塩、例えば塩酸塩、臭化水素酸塩、ヨウ化水素酸塩、硝酸塩、硫酸塩、重硫酸塩、リン酸塩、酸性リン酸塩、酢酸塩、乳酸塩、クエン酸塩、酸性クエン酸、酒石酸塩、重酒石酸塩、コハク酸塩、マレイン酸塩、フマル酸塩、グルコン酸塩、サッカリン酸塩、安息香酸塩、メタンスルホン酸塩、エタンスルホン酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、p-トルエンスルホン酸塩およびパモエート塩（即ち、1, 1-メチレンビス（2-ヒドロキシ-3-ナフトエート））も包含される。

10

【0038】

本発明の化合物は、オレフィン様二重結合を含有し得る。このような結合が存在する場合、本発明の化合物はシスおよびトランス配置として、そしてそれらの混合物として存在する。

【0039】

別記しない限り、本明細書中で言及されるアルキル、アルケニルおよびアルキニル基、ならびに本明細書中で言及されるその他の基のアルキル部分（例えばアルコキシ）は線状または分枝鎖であり、そしてそれらは環状（例えばシクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシルまたはシクロヘプチル）でも、あるいは線状または分枝鎖でもあり、環状部分を含有する。別記しない限り、ハロゲンとしては、フッ素、塩素、臭素およびヨウ素が挙げられる。

20

(C₃ ~ C₁₀) シクロアルキルは、本明細書中で用いられる場合、0 ~ 2 レベルの不飽和を含有するシクロアルキル基、例えばシクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロペンテニル、シクロヘキシル、シクロヘキセニル、1, 3-シクロヘキサジエン、シクロヘプチル、シクロヘプテニル、ビシクロ[3. 2. 1] オクタン、ノルボルナニル等を指す。

30

【0040】

(C₂ ~ C₉) ヘテロシクロアルキルは、本明細書中で用いる場合、例えばピロリジニル、テトラヒドロフラニル、ジヒドロフラニル、テトラヒドロピラニル、ピラニル、チオピラニル、アジリジニル、オキシラニル、メチレンジオキシ、クロメニル、バルビツリル、イソキサゾリジニル、1, 3-オキサゾリジン-3-イル、イソチアゾリジニル、1, 3-チアゾリジン-3-イル、1, 2-ピラゾリジン-2-イル、1, 3-ピラゾリジン-1-イル、ピペリジニル、チオモルホリニル、1, 2-テトラヒドロチアジン-2-イル、1, 3-テトラヒドロジアジン-1-イル、テトラヒドロアゼピニル、ピペラジニル、クロマニル等を指すが、これらに限定されない。この場合、ヘテロシクロアルキル基は、(C₁ ~ C₆) アルキル、(C₁ ~ C₆) アルコキシ、ハロ、トリフルオロメチル、トリフルオロメトキシまたは (C₁ ~ C₆) アルキルアミノ基（これらに限定されない）により任意に置換される。

40

【0041】

(C₂ ~ C₉) ヘテロアリールは、本明細書中で用いられる場合、フリル、チエニル、チアゾリル、ピラゾリル、イソチアゾリル、オキサゾリル、イソキサゾリル、ピロリル、トリアゾリル、テトラゾリル、イミダゾリル、1, 3, 5-オキサジアゾリル、1, 2, 4-オキサジアゾリル、1, 2, 3-オキサジアゾリル、1, 3, 5-チアジアゾリル、1, 2, 3-チアジアゾリル、1, 2, 4-チアジアゾリル、ピリジル、ピリミジル、ピラジニル、ピリダジニル、1, 2, 4-トリアジニル、1, 2, 3-トリアジニル、1, 3

50

、5-トリアジニル、ピラゾロ[3, 4-b]ピリジニル、シンノリニル、プテリジニル、プリニル、6, 7-ジヒドロ-5H-[1]ピリンジニル、ベンゾ[b]チオフェニル、5, 6, 7, 8-テトラヒドロキノリン-3-イル、ベンゾキサゾリル、ベンゾチアソリル、ベンズイソチアゾリル、ベンズイソキサゾリル、ベンズイミダゾリル、チアナフテニル、イソチアナフテニル、ベンゾフラニル、イソベンゾフラニル、イソインドリル、インドリル、インドリジニル、インダゾリル、イソキノリル、キノリル、キノロニル、フタラジニル、キノキサリニル、キナゾリニル、ベンズオキサジニル等を指すが、これらに限定されない。この場合、ヘテロアリアル基は、(C₁ ~ C₆) アルキル、(C₁ ~ C₆) アルコキシ、ハロ、トリフルオロメチル、トリフルオロメトキシまたは(C₁ ~ C₆) アルキルアミノ基（これらに限定されない）により任意に置換される。

10

【0042】


アリアルは、本明細書中で用いられる場合、フェニルまたはナフチルを指す。

「ウレイド」という用語は、本明細書中で用いられる場合、「アミノ-カルボニル-アミノ」部分を指す。

【0043】

「アセチル」という用語は、本明細書中で用いる場合、次式を有する官能基を指す：

【化3】



20

【0044】

「(C₂ ~ C₉) ヘテロシクロアルキル (C=N-CN) アミノ」という用語は、本明細書中で用いる場合、次式を有する官能基を指す：

30

【化4】




40

「HET」が(C₂ ~ C₉) ヘテロシクロアルキルまたは(C₂ ~ C₉) ヘテロアリアル基を指す場合、前記の基の窒素は結合の場所である。

【0045】

「バルビツリル」という用語は、本明細書中で用いる場合、次式を有する官能基を指す：

【化5】



10

【0046】

「メルカプト」という用語は、本明細書中で用いる場合、「HS-」部分を指す。

「アルコキシ」という用語は、式 OR_a （式中、 R_a は前記のようなアルキル基、例えばメトキシ、エトキシルである）の基を指す。

「カルボキシ」という用語は、式 $-\text{COOH}$ の基を指す。

「グリシンアミノ」という用語は、式 $-\text{NH}-\text{C}(\text{O})-\text{CH}_2-\text{NH}_2$ の基を指す。

「シアノ」という用語は、式 $-\text{CN}$ の基を指す。

【0047】

「ニトロ」という用語は、式 $-\text{NO}_2$ の基を指す。

20

「ニトロソ」という用語は、式 $-\text{NO}$ の基を指す。

「アミジノ」という用語は、式 $-\text{C}(\text{NH})-\text{NH}_2$ の基を指す。

「スルホニル」という用語は、式 $-\text{SO}_2-$ の基を指す。

「スルフィニル」という用語は、式 $-\text{S}(\text{O})-$ の基を指す。

「チオ」という用語は、式 $-\text{S}-$ の基を指す。

「オキシ」という用語は、式 $=\text{O}$ の基を指す。

「ホルミル」という用語は、式 $-\text{CHO}$ の基を指す。

「グアニジノ」という用語は、式 $-\text{N}(\text{H})-\text{C}(\text{NH})-\text{NH}_2$ の基を指す。

【0048】

「アラニンアミド」という用語は、式 $-\text{NH}-\text{C}(\text{O})-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{NH}_2$ の基を指す。

30

【0049】

本発明の化合物としては、すべての配座異性体（例えばシスおよびトランス異性体）および式 I の化合物のすべての光学異性体（例えばエナンチオマーおよびジアステレオマー）、ならびにこのような異性体のラセミ、ジアステレオマーおよびその他の混合物が挙げられる。原子の同位体置換、例えば水素の重水素置換を含有する化合物も、本発明の範囲内に含まれる。

【0050】

本発明は、自己免疫疾患（例えば、慢性関節リウマチ、I 型糖尿病（近年開始）、狼瘡、炎症性腸疾患、視神経炎、乾癬、多発性硬化症、リウマチ性多発性筋痛、ブドウ膜炎および脈管炎）、急性および慢性炎症性症状（例えば変形性関節症、成人呼吸促進症候群、乳児期の呼吸促進症候群、虚血性再灌流障害、糸球体腎炎および慢性閉塞性肺疾患（COPD））、アレルギー症状（例えば喘息およびアトピー性皮膚炎）、感染に関連した炎症（例えばウイルス性炎症（例えばインフルエンザ、肝炎およびギラン・バレー症候群）、慢性気管支炎、慢性または急性の組織、細胞および固形器官移植片拒絶（例えば異種移植）、アテローム硬化症、再狭窄、HIV 感染性（補受容体使用）ならびに肉芽腫性疾患（例えば類肉腫症、らい病および結核）、ならびにある種の癌に関連した後遺症、例えば多発性骨髄腫を治療または予防するための、このような障害または症状を治療または予防するのに有効な量の式 I の化合物またはその製薬上許容可能な塩またはプロドラッグ、ならび製薬上許容可能な担体を含む製剤組成物にも関する。

40

50

【0051】

本発明の組成物は、細胞浸潤低減の結果としての炎症部位でのサイトカイン、例えばTNFおよびIL-1（これらに限定されない）の産生を限定して、TNFおよびIL-1に関連した疾患、例えばうっ血性心不全、肺気腫またはそれに関連した呼吸困難、気腫；HIV-1、HIV-2、HIV-3；サイトメガロウイルス（CMV）、アデノウイルス、ヘルペスウイルス（帯状疱疹および単純ヘルペス）に関連した疾患に利益を提供する。それらは、感染（この場合、このような感染は有害な炎症性サイトカイン、例えばTNFの産生を誘導する）に関連した後遺症、例えば真菌性髄膜炎、関節組織損傷、過形成、パネラス形成および骨吸収、乾癬性関節炎、肝不全、細菌性髄膜炎、川崎病、心筋梗塞、急性肝不全、ライム病、敗血症性ショック、癌、外傷およびマラリア等にも利益を提供し得る。本発明は、哺乳類、好ましくはヒトにおける受容体CCR1と結合するケモカインを抑制することにより治療または予防され得る障害または症状を治療または予防するための製剤組成物であって、このような障害または症状を治療または予防するのに有効な量の式Iの化合物、その製薬上許容可能な塩またはプロドラッグ、ならび製薬上許容可能な担体を含む製剤組成物にも関する。このような障害および症状の例は、前段落に列挙されたものである。

10

【0052】

本発明は、自己免疫疾患（例えば、慢性関節リウマチ、I型糖尿病（近年開始）、狼瘡、炎症性腸疾患、視神経炎、乾癬、多発性硬化症、リウマチ性多発性筋痛、ブドウ膜炎および脈管炎）、急性および慢性炎症性症状（例えば変形性関節症、成人呼吸促進症候群、乳児期の呼吸促進症候群、虚血性再灌流障害、糸球体腎炎および慢性閉塞性肺疾患（COPD））、アレルギー症状（例えば喘息およびアトピー性皮膚炎）、感染に関連した炎症（例えばウイルス性炎症（例えばインフルエンザ、肝炎およびギヤンバレー症候群）、慢性気管支炎、慢性または急性の組織、細胞および固形器官移植片拒絶（例えば異種移植）、アテローム硬化症、再狭窄、HIV感染性（補受容体使用）ならびに肉芽腫性疾患（例えば類肉腫症、らい病および結核）、ならびにある種の癌に関連した後遺症、例えば多発性骨髄腫を治療または予防するための方法であって、このような障害または症状を治療または予防するのに、例えば細胞浸潤低減の結果としての炎症部位でのサイトカイン、例えばTNFおよびIL-1（これらに限定されない）の産生を限定して、TNFおよびIL-1に関連した疾患、例えばうっ血性心不全、肺気腫またはそれに関連した呼吸困難、気腫；HIV-1、HIV-2、HIV-3；サイトメガロウイルス（CMV）、アデノウイルス、ヘルペスウイルス（帯状疱疹および単純ヘルペス）に関連した疾患に利益を提供するのに有効な量の式Iの化合物またはその製薬上許容可能な塩を、本発明のこのような治療または予防を必要とする哺乳類に投与することを包含する方法にも関する。それらは、感染（この場合、このような感染は有害な炎症性サイトカイン、例えばTNFの産生を誘導する）に関連した後遺症、例えば真菌性髄膜炎、関節組織損傷、過形成、パネラス形成および骨吸収、乾癬性関節炎、肝不全、細菌性髄膜炎、川崎病、心筋梗塞、急性肝不全、ライム病、敗血症性ショック、癌、外傷およびマラリア等にも利益を提供し得る。本発明は、哺乳類、好ましくはヒトにおける受容体CCR1を中和することにより治療または予防され得る障害または症状を治療または予防するための方法であって、このような障害または症状を治療または予防するのに有効な量の式Iの化合物、その製薬上許容可能な塩またはプロドラッグを、このような治療または予防を必要とする哺乳類に投与することを包含する方法にも関する。

20

30

40

【0053】

本発明は、哺乳類、好ましくはヒトにおける、自己免疫疾患（例えば、慢性関節リウマチ、I型糖尿病（近年開始）、狼瘡、炎症性腸疾患、視神経炎、乾癬、多発性硬化症、リウマチ性多発性筋痛、ブドウ膜炎および脈管炎）、急性および慢性炎症性症状（例えば変形性関節症、成人呼吸促進症候群、乳児期の呼吸促進症候群、虚血性再灌流障害、糸球体腎炎および慢性閉塞性肺疾患（COPD））、アレルギー症状（例えば喘息およびアトピー性皮膚炎）、感染に関連した炎症（例えばウイルス性炎症（例えばインフルエンザ、肝炎

50

およびギャンーバレー症候群)、慢性気管支炎、組織、細胞および固形器官移植片拒絶(例えば異種移植)、アテローム硬化症、再狭窄、H I V感染性(補受容体使用)ならびに肉芽腫性疾患(例えば類肉腫症、らい病および結核)、ならびにある種の癌に関連した後遺症、例えば多発性骨髄腫から選択される障害または症状を治療または予防するための製剤組成物であって、C C R 1受容体中和有効量の式 I の化合物またはその製薬上許容可能な塩、ならび製薬上許容可能な担体を含む製剤組成物にも関する。細胞浸潤低減の結果としての炎症部位でのサイトカイン、例えばT N FおよびI L - 1(これらに限定されない)の産生を限定し、T N FおよびI L - 1に関連した疾患、例えばうっ血性心不全、肺気腫またはそれに関連した呼吸困難、気腫; H I V - 1、H I V - 2、H I V - 3; サイトメガロウイルス(C M V)、アデノウイルス、ヘルペスウイルス(帯状疱疹および単純ヘルペス)に関連した疾患に利益を提供するために製剤組成物を用いることも包含される。それらは、感染(この場合、このような感染は有害な炎症性サイトカイン、例えばT N Fの産生を誘導する)に関連した後遺症、例えば真菌性髄膜炎、関節組織損傷、過形成、パニクス形成および骨吸収、乾癬性関節炎、肝不全、細菌性髄膜炎、川崎病、心筋梗塞、急性肝不全、ライム病、敗血症性ショック、癌、外傷およびマラリア等にも利益を提供し得る。本発明は、哺乳類、好ましくはヒトにおけるC C R 1受容体を中和することにより治療または予防され得る障害または症状を治療または予防するための製剤組成物であって、C C R 1受容体中和有効量の式 I の化合物、その製薬上許容可能な塩またはプロドラッグ、ならび製薬上許容可能な担体を含む製剤組成物にも関する。

10

【0054】

本発明は、自己免疫疾患(例えば、慢性関節リウマチ、I型糖尿病(近年開始)、狼瘡、炎症性腸疾患、視神経炎、乾癬、多発性硬化症、リウマチ性多発性筋痛、ブドウ膜炎および脈管炎)、急性および慢性炎症性症状(例えば変形性関節症、成人呼吸促進症候群、乳児期の呼吸促進症候群、虚血性再灌流障害、糸球体腎炎および慢性閉塞性肺疾患(C O P D))、アレルギー症状(例えば喘息およびアトピー性皮膚炎)、感染に関連した炎症(例えばウイルス性炎症(例えばインフルエンザ、肝炎およびギャンーバレー症候群)、慢性気管支炎、組織、細胞および固形器官移植片拒絶(例えば異種移植)(慢性または急性)、アテローム硬化症、再狭窄、H I V感染性(補受容体使用)ならびに肉芽腫性疾患(例えば類肉腫症、らい病および結核)、ならびにある種の癌に関連した後遺症、例えば多発性骨髄腫から選択される障害または症状を治療または予防するための方法にも関する。本発明の治療方法は、細胞浸潤低減の結果としての炎症部位でのサイトカイン、例えばT N FおよびI L - 1(これらに限定されない)の産生を限定して、T N FおよびI L - 1に関連した疾患、例えばうっ血性心不全、肺気腫またはそれに関連した呼吸困難、気腫; H I V - 1、H I V - 2、H I V - 3; サイトメガロウイルス(C M V)、アデノウイルス、ヘルペスウイルス(帯状疱疹および単純ヘルペス)に関連した疾患に利益を提供することも包含する。それらは、C C R 1受容体中和有効量の式 I の化合物、その製薬上許容可能な塩またはプロドラッグを、このような治療または予防を必要とする哺乳類に投与することを含めて、哺乳類、好ましくはヒトにおける、感染(この場合、このような感染は有害な炎症性サイトカイン、例えばT N Fの産生を誘導する)に関連した後遺症、例えば真菌性髄膜炎、関節組織損傷、過形成、パニクス形成および骨吸収、乾癬性関節炎、肝不全、細菌性髄膜炎、川崎病、心筋梗塞、急性肝不全、ライム病、敗血症性ショック、癌、外傷およびマラリア等にも利益を提供し得る。

20

30

40

【0055】

本発明の詳細な説明

以下の反応図は、本発明の化合物の調製を例証する。別記しない限り、反応図および以下の考察におけるa、c、d、f、k、l、m、W、X、Y、Z、R¹およびR⁴は、前記と同様である。

R¹⁻⁶は、非置換、一置換、二置換、環状または非環状であり得るアミノ基を指す。

【0056】

合成Dおよびスキーム1、2、3、4、5、6および7における反応は、共通譲渡同時係


50

属中出願仮出願第60／193789号（2000年3月31日出願）（この開示内容を、本明細書中に援用する）に記載されている。

【0057】

【化6】


合成A



【0058】

【化7】

合成 A (続き)



10


20

30


40

【 0 0 5 9 】


【 化 8 】

合成B

1



2



10


20

30

40

【 0 0 6 0 】

【 化 9 】

合成C

10

20


30

40

【 0 0 6 1 】


【 化 1 0 】

合成E



10

1



20

30


2

VII

40

【 0 0 6 3 】

【 化 1 2 】

合成 F


10

20

【 0 0 6 4 】

【 化 1 3 】

スキーム 1



10

20


30

40

【 0 0 6 5 】

【 化 1 4 】

スキーム2



10


20

30

【 0 0 6 6 】

【 化 1 5 】


スキーム 3



【 0 0 6 7 】


【 化 1 6 】

スキーム 4



【 0 0 6 8 】
【化 1 7 】

スキーム 5



10


20

30

【 0 0 6 9 】

【 化 1 8 】

スキーム 6



10

20


30

40

【 0 0 7 0 】

【 化 1 9 】

スキーム 7



10

20

30

40

50

【0071】

合成 A の反応 1 では、式 I I (式中、k は 1、2、3 または 4 である) の化合物を、非プロトン性溶媒、例えばテトラヒドロフランの存在下で、塩基、例えば水素化ナトリウム、および求電子物質、例えば任意置換化臭化ベンジルで処理する。反応混合物を周囲温度で、約 1 時間～約 12 時間、好ましくは約 10 時間、攪拌する。その結果生じたラクタムを次に、非プロトン性溶媒、例えばジクロロメタンの存在下でトリエチルオキシニウムテトラフルオロボレートと反応させることにより、式 I I I の対応する化合物に転化する。反応混合物を周囲温度で、約 1 時間～約 12 時間、好ましくは約 10 時間、攪拌する。

【0072】

合成Aの反応2では、式III（式中、kは1、2、3または4である）の化合物を、非プロトン性溶媒、例えばジクロロメタンの存在下で、塩基、例えばトリエチルアミンの存在下で、ニトロメタンとIIIを縮合することにより、式Vの対応する化合物に転化する。反応混合物を周囲温度で、約1時間～約16時間、好ましくは約10時間、攪拌する。

【0073】

合成Aの反応3では、式V（式中、kは1、2、3または4である）の化合物を、プロトン性溶媒、例えばメタノールの存在下で、触媒、例えば炭素上パラジウムでVを先ず処理することにより、式V（式中、kは1、2、3または4であり、そしてWは窒素である）の対応する化合物に転化する。反応混合物を、約4時間～約16時間、好ましくは約12時間、水素ガスの正の圧力下で振盪する。その結果生じたアミノエステルを次に、無水プロトン性溶媒、例えばメタノール中で、塩基、例えばナトリウムメトキシドで処理する。反応混合物を周囲温度で約4時間～約16時間、好ましくは約10時間攪拌する。

10

【0074】

合成Aの反応4では、式V（式中、kは1、2、3または4であり、Wは窒素である）の化合物を、還元剤、例えば水素化アルミニウムリチウムでVを還元することにより、式VII（式中、mは1、2、3または4であり、kおよびlは0であり、そしてWは窒素である）の対応する化合物に転化する。反応物を、約2時間～約12時間、好ましくは約10時間、灌流する。

20

合成Aの反応5では、式V（式中、kは1、2、3または4であり、Wは窒素である）の化合物を、触媒、例えば20%炭素上水酸化パラジウムの、ならびにプロトン性溶媒、例えばメタノールの存在下で、式VI（式中、kは1、2、3または4であり、そしてWは窒素である）の対応する化合物に転化する。反応物を、約周囲温度～約80℃、好ましくは約60℃で、約3時間～約13時間、好ましくは約10時間、水素の正の圧力下で振盪する。

【0075】

合成Aの反応6では、式VI（式中、kは1、2、3または4であり、Wは窒素である）の化合物を、塩基、例えば水素化ナトリウムの、ならびに非プロトン性溶媒、例えばテトラヒドロフランの存在下で、アルキル化剤、例えば任意置換化臭化ベンジルと先ず反応させる。反応物を約2時間～約12時間、好ましくは約10時間攪拌する。その結果生じたカルバメートを次に、非プロトン性溶媒、例えばジクロロメタンの存在下で、酸、例えばトリフルオロ酢酸での処理により、脱保護化する。反応物を、周囲温度で、約1時間～約4時間、好ましくは約2時間攪拌する。その結果生じたアミドを、非プロトン性溶媒、例えばテトラヒドロフランの存在下で、還元剤、例えば水素化アルミニウムリチウムで還元することにより、式VII（式中、kは1、2、3または4であり、mおよびlは0であり、そしてWは窒素である）の対応する化合物に転化する。反応物を、約2時間～約12時間、好ましくは約10時間、灌流する。

30

【0076】


合成Bの反応1では、式VIII（式中、kは1、2、3または4である）の化合物を、酸、例えば0.25 M水性塩酸の存在下で、アミン、例えばベンジルアミン、および3-オキソペンタンジオン酸と反応させることにより式IXの対応する化合物に転化する。反応物を周囲温度で、約30分～約2時間、好ましくは約1.5時間攪拌し、次に約1時間～約4時間、好ましくは2時間、50℃に加熱する。

40

【0077】

合成Bの反応2では、式IX（式中、lは1、2、3または4である）の化合物を、まず、次式：

【化20】



10

のホスホニウムイリドと反応させることにより、式VII（式中、kは1、2、3または4であり、lおよびmは0であり、そしてWはCHである）の対応する化合物に転化する。反応物を約4時間～約16時間、好ましくは約10時間、灌流する。その結果生じたオレフィンを次に、プロトン性溶媒、例えばエタノールの存在下で、触媒、例えば20%炭素上水酸化パラジウムの存在下で水素ガスの正圧下で振盪することにより還元する。

【0078】

合成Cの反応1では、式XI（式中、lは1、2、3または4である）の化合物を、プロトン性溶媒、例えばエタノールの存在下で、まずアジ化ナトリウムと反応させることにより、式XIの対応する化合物に転化する。反応物を約3時間～約12時間、好ましくは約10時間灌流する。その結果生じた二アジ化物を次に、酸化白金の、ならびに極性溶媒、例えばエタノールの存在下で、還元する。反応物を、約3時間～約12時間、好ましくは約10時間、水素の正圧下で振盪する。

20

【0079】


合成Cの反応2では、式XI（式中、lは1、2、3または4である）の化合物を、プロトン性溶媒、例えばメタノールの存在下で、まず塩基、例えばナトリウムメトキシドで化合物XIを処理することにより、式XIIの対応する化合物に転化する。反応物を約3時間～約12時間、好ましくは約10時間灌流する。その結果生じたピペラジーンジオンを、非プロトン性溶媒、例えばテトラヒドロフラン中で、還元剤、例えば水素化アルミニウムリチウムで処理することにより、式XIIの対応する化合物に転化する。反応物を、約3時間～約12時間、好ましくは約10時間灌流する。

30

【0080】

合成Cの反応3では、式XII（式中、lは1、2、3または4である）の化合物を、非プロトン性溶媒、例えば1,2-ジクロロエタン中で、塩基、例えばトリエチルアミンの、ならびに還元剤、例えばナトリウムトリアセトキシボロヒドリドの存在下で、次式：

【化21】



40

の任意置換化ベンズアルデヒド化合物と反応させることにより、式VII（式中、lは1、2、3または4であり、kおよびmは0であり、そしてWは窒素である）の対応する化

50

合物に転化する。反応混合物を、周囲温度で、約 1 時間～約 1 2 時間、好ましくは約 1 0 時間、攪拌する。

【0081】

合成 D の反応 1 では、式 X I I I の化合物を、非プロトン性溶媒、例えば塩化メチレンの存在下で、式 HR^{1-6} の適切なアミンと式 X I I I を反応させることにより、式 X V の対応する化合物に転化する。反応混合物を、周囲温度で約 1 時間～約 2 4 時間、好ましくは約 1 2 時間攪拌する。

【0082】

合成 D の反応 2 では、式 X V の化合物を、塩基、例えば水素化ナトリウムの、ならびに極性非プロトン性溶媒、例えばジメチルホルムアミドの存在下で、チオフェノールと X V を反応させることにより、式 X V I I の対応する化合物に転化する。反応物を約 1 時間～約 1 0 時間、好ましくは約 4 時間、加熱、灌流する。

10

【0083】

合成 D の反応 3 では、式 X I I I の化合物を、ピリジンの、ならびに極性非プロトン性溶媒、例えばアセトニトリルの存在下で、シアン酸ナトリウムと X I I I を反応させることにより、式 X I V の対応する化合物に転化する。反応物を、周囲温度で、約 2 時間～約 1 8 時間、好ましくは約 1 0 時間攪拌する。次に式 HR^{1-6} の適切なアミンを付加し、そのようにして生成された反応混合物を、周囲温度で約 2 ～約 2 4 時間、好ましくは約 8 時間攪拌する。

【0084】

合成 D の反応 4 では、式 X I V の化合物を、合成 D の反応 2 で前記した手法にしたがって、式 X V I の対応する化合物に転化する。

20

合成 E の反応 1 では、式 X X X I (式中、k は 1、2、3 または 4 である) の化合物を、無水物、例えば無水酢酸で処理する。反応混合物を、約 8 時間～約 1 5 時間、好ましくは約 1 2 時間、7 0 °C に加熱する。その結果生じた混合物を次に濃縮し、無水物を、非プロトン性溶媒、例えばトルエンの存在下で、任意置換化ベンジルアミンで処理する。反応混合物を、周囲温度で約 1 時間～約 1 6 時間、好ましくは約 1 0 時間攪拌し、次に蒸す遺物、例えば無水酢酸で処理して、1 時間～2 0 時間、好ましくは約 1 6 時間、加熱、灌流する。

【0085】

合成 E の反応 2 では、式 X X X I I (式中、k は 1、2、3 または 4 である) の化合物を、水素供給源、例えばシクロヘキサジエンの、ならびにプロトン性溶媒、例えばエタノールの存在下で、触媒、例えば炭素上パラジウムで X X X I I を先ず処理することにより、式 V I I (式中、k は 1、2、3 または 4 であり、l および m は 0 であり、そして W は窒素である) の対応する化合物に転化する。反応混合物を、周囲温度で、約 1 時間～約 4 時間、好ましくは約 1 . 5 時間攪拌する。その結果生じた混合物を次に、非プロトン性溶媒、例えばトルエン中で、還元剤、例えばレッド A 1 で処理する。反応物を、約 2 時間～約 6 時間、好ましくは約 4 時間、6 0 °C に加熱する。

30

【0086】

合成 F の反応 1 では、式 X X X V I の化合物を、非プロトン性溶媒、例えばテトラヒドロフラン中で、還元剤、例えば水素化アルミニウムリチウムで処理することにより、式 X X X V I I の対応する化合物に転化する。反応混合物を約 1 時間～約 6 時間、好ましくは約 2 時間、加熱、灌流する。

40

【0087】

合成 F の反応 2 では、式 X X X V I I の化合物を、非プロトン性溶媒、例えばクロロホルムの存在下で、活性剤、例えば塩化スルホンルで先ず処理することにより、式 X X X V I I の対応する化合物に転化する。反応物を約 1 時間～約 1 0 時間、好ましくは約 3 時間、加熱、灌流する。その結果生じた塩化アルキルを次に、非プロトン性溶媒、例えばアセトニトリルの存在下で、シアン化物、例えばシアン化カリウムで処理する。反応混合物を、室温で約 1 時間～約 1 0 時間、好ましくは約 3 時間攪拌する。

50


【0088】

合成Fの反応3では、式XXXVIIの化合物を、水中で、塩基、例えば水酸化カリウムでシアン化物を先ず処理することにより、式XXXIXの対応する化合物に転化する。反応混合物を約1時間～約10時間、好ましくは約6時間、加熱、灌流する。その結果生じたメチルエーテルを、酸、例えば47%水性臭化水素で処理することにより、脱保護化する。反応混合物を、約10時間～約30時間、好ましくは約24時間、加熱灌流する。約8時間～約16時間、好ましくは約12時間、酸、例えば硫酸の存在下で、エタノール中で還流することにより、脱保護化フェノール酸を、最後に式XXXIX（式中、jは1である）の対応する化合物に転化する。

【0089】

合成Fの反応4では、式XXXVIの化合物を、非プロトン性溶媒、例えばトルエンの存在下で、還元剤、例えば水素化ジイソブチルアルミニウムでエステルを先ず処理することにより、式XXXIX（式中、jは2または3である）の対応する化合物に転化する。その結果生じたアルデヒドを、非プロトン性溶媒、例えばテトラヒドロフランの存在下で、次式：

【化22】



（式中、gは1または2である）のホスホニウム塩から得られるホスホニウムイリドで処理する。反応物を、約4時間～約16時間、好ましくは約10時間灌流する。その結果生じたオレフィンを次に、プロトン性溶媒、例えばエタノールの存在下で、触媒、例えば炭素上20%水酸化パラジウムの存在下で水素の正圧下で振盪することにより還元する。スキームDの反応2に関して記載された手法にしたがって、メチルエーテルを脱保護化する。

【0090】

スキーム1の反応1では、式VIIの化合物を、塩基、例えばトリエチルアミンの、ならびに極性非プロトン性溶媒、例えば塩化メチレンの存在下で、式A-(X)_c-(Y)_d-A（式中、Aはクロロまたはブロモである）の化合物とVIIを反応させることにより、式XVIIの対応する化合物に転化する。反応物を、約-10℃～約10℃の温度で、約15分～約90分、好ましくは約30分間攪拌する。

【0091】

スキーム1の反応2では、式XVIIの化合物を、市販されているか、あるいは炭酸カリウム、ヨウ化カリウムの、ならびに非プロトン性溶媒、例えばブタノンの存在下で、合成DおよびEで調製されたのと同様に合成される式H-(Z)-R⁴（式中、dZは酸素である）の化合物とXVIIを反応させることにより、式Iの対応する化合物に転化する。反応物を、約4時間～約8時間、好ましくは約6時間、加熱灌流する。

【0092】

スキーム2の反応1では、式VIIの化合物を、塩基、例えばトリエチルアミンの、ならびに極性非プロトン性溶媒、例えば塩化メチレンの存在下で、式A-(X)_c-(Y)_d-(Z)-R⁴（式中、Aはクロロまたはブロモである）の化合物とVIIを反応させることにより、式Iの対応する化合物に転化する。反応物を、約-10℃～約10℃の温度で、約15分～約90分、好ましくは約30分間攪拌する。

【0093】

スキーム3の反応1では、式VIIの化合物を、スキーム1の反応2に前記した手法にしたがって、式XIXの対応する化合物に転化する。

スキーム3の反応2では、式XIXの化合物を、メタノール、テトラヒドロフランおよび水の存在下で、水酸化リチウム一水和物とXIXを反応させることにより、式XXの対応する化合物に転化する。

【0094】

スキーム3の反応3では、式XXの化合物を、4-ジメチルアミノピリジン、1-(3-ジメチルアミノプロピル)-3-エチルカルボジイミンおよび極性非プロトン性溶媒、例えば塩化メチレンの存在下で、適切なアミンまたはスルホンアミドとXXを反応させることにより、式Iの対応するアミドまたはアシルスルホンアミドに転化する。その結果生じる反応混合物を、周囲温度で一夜攪拌する。

10

【0095】

スキーム4の反応1では、式VIIの化合物を、スキーム1の反応2に前記した手法にしたがって、式XXIIの対応する化合物に転化する。

スキーム4の反応2では、式XXIIの化合物を、触媒、例えば炭素上白金の、ならびに極性プロトン性溶媒、例えばエタノールの存在下で、XXIIを水素化することにより、式XXIIIの対応する化合物に転化する。反応は、約30 psi~約40 psi、好ましくは約35 psiの圧力で、約15分~約1時間、好ましくは30分間実行する。

20

【0096】

スキーム4の反応3では、尿素生成のために、式XXIIIの化合物を、塩基、例えばピリジンの、ならびに極性非プロトン性溶媒、例えば塩化メチレンの存在下で、4-ニトロフェニルクロロホルメートとXXIIIを先ず反応させ、その後、そのようにして生成された中間物質を適切なアミンと反応させることにより、式Iの対応する尿素に転化する。そのようにして生成された反応混合物を、周囲温度で一夜攪拌させる。塩基、例えばトリエチルアミンの、ならびに極性非プロトン性溶媒、例えば塩化メチレンの存在下で、式XXIIIの化合物を適切な塩化スルホンと反応させて、式Iのスルホンアミドを生成する。反応物を、周囲温度で一夜攪拌する。シアノグアニジン生成のために、式Iの化合物を、先ず、非プロトン性溶媒、例えばテトラヒドロフラン中で水素化ナトリウムと反応させ、その後、そのようにして生成された中間物質をジメチル-N-シアノジチオイミノカルボネートと反応させる。その結果生じる混合物を一夜、加熱還流する。N-シアノ-N-メチル-N'-イソチオウレア中間物質を次に、極性非プロトン性溶媒、例えばメタノールの存在下で適切なアミンと反応させて、式Iのシアノグアニジンを生成する。アミド生成のために、式XXIIIの化合物を、N-メチルモルホリン、O-ベンゾトリアゾール-1-イル-N, N, N', N'-テトラメチルウロニウムヘキサフルオロホスフェートの、ならびに極性非プロトン性溶媒、例えば塩化メチレンの存在下で、酸、例えば3-tert-ブトキシカルボニルアミノプロピオン酸と反応させて、式Iのアミドを生成する。第二級アミン生成のために、合成Bの反応1に前記した手法にしたがって、式XXIIIの化合物を適切なアルデヒドと反応させて、式Iのアミンを生成する。

30

40

【0097】

スキーム5の反応1では、式VIIの化合物を、スキーム1の反応2に前記した手法にしたがって、式XXV（式中、nは0、1、2、3または4である）の対応する化合物に転化する。

【0098】

スキーム5の反応2では、式XXVの化合物を、ジクロロエタン/酢酸の10:1比溶液の存在下で、適切なアミンとXXVを反応させることにより、式Iの対応する化合物に転化する。反応混合物を、周囲温度で、約30分~約2時間、好ましくは約1時間攪拌する。還元剤、例えばナトリウムシアノボロヒドリドを次に混合物に付加して、反応物を周囲温度で一夜攪拌させる。このように生成されたアミンが第二級アミンである場合、スキーマ

50

ム 4 の反応 3 に前記した手法にしたがって、式 I の化合物をさらに反応させて、尿素、スルホンアミド、シアノグアニジノまたはアミドを提供する。

【0099】

スキーム 6 の反応 1 では、式 XX の化合物を、周囲温度で、約 1 時間～約 24 時間、好ましくは 1 時間、正味で、または非プロトン性溶媒中で、塩チオニルで XX を処理することにより、式 XXIX の対応する化合物に転化する。そのように生成された酸塩化物を、アミン塩基、例えばトリエチルアミンの存在下で、式 $(H_3CO)(H_3C)NH \cdot HCl$ の化合物とともに、極性非プロトン性溶媒中に溶解する。反応混合物を、周囲温度で、約 1 時間～約 48 時間、好ましくは約 12 時間攪拌する。

【0100】

スキーム 6 の反応 2 では、式 XXIX の化合物を、約 $-100^{\circ}C$ ～周囲温度、好ましくは約 $-78^{\circ}C$ の温度で、極性非プロトン性溶媒の存在下で、 $(C_2 \sim C_9)$ ヘテロアリアルリチウム試薬と XXIX を反応させることにより、式 I の対応する化合物に転化する。その結果生じる反応混合物を、約 $-78^{\circ}C$ ～約 $50^{\circ}C$ 、好ましくは約 $20^{\circ}C$ の温度で、約 1 時間～約 24 時間、好ましくは約 12 時間攪拌する。

【0101】

スキーム 7 の反応 1 では、式 VII の化合物を、スキーム 1 の反応 2 に前記した手法にしたがって、式 XXXII (式中、j は 1、2 または 3 である) の対応する化合物に転化する。

【0102】

スキーム 7 の反応 2 では、式 XXXII (式中、j は 1、2 または 3 である) の化合物を、スキーム 3 の反応 2 に前記した手法にしたがって、式 XXXIV (式中、j は 1、2 または 3 である) の対応する化合物に転化する。

【0103】

スキーム 7 の反応 3 では、式 XXXIV (式中、j は 1、2 または 3 である) の化合物を、スキーム 3 の反応 3 に前記した手法にしたがって、適切なアミンまたはスルホンアミドで処理することにより、式 I (式中、j は 1、2 または 3 である) の対応するアミドまたはアシルスルホンアミドに転化する。スキーム 6 に関して前記した手法にしたがって、式 XXXIV (式中、j は 1、2 または 3 である) の化合物を式 I の対応する化合物に転化する。

【0104】

別記しない限り、前記の反応の各々の圧力は重要でない。一般的に、反応は約 1 ～約 3 大気圧で、好ましくは周囲圧 (約 1 大気圧) で実行する。

本来は塩基性である式 I の化合物は、種々の無機および有機酸を用いて広範な種々の異なる塩を生成し得る。このような塩は動物への投与のために製薬的に許容可能でなければならないが、しかししばしば、実際には、製薬上非許容可能な塩として反応混合物から式 I の化合物を最初に単離し、次にアルカリ性試薬での処理により遊離塩基化合物に反応混合物を単に転化し戻して、その後、遊離塩基を製薬上許容可能な酸付加塩に転化する。本発明の塩基化合物の酸付加塩は、水性溶媒媒質中で、あるいは適切な有機溶媒、例えばメタノールまたはエタノール中で実質的等量の選定無機または有機酸で塩基化合物を処理することにより容易に調製される。溶媒の注意深い蒸発時に、固体塩を得る。

【0105】

本発明の延期化合物の製薬上許容可能な酸付加塩を調製するために用いられる酸は、非毒性酸付加塩、即ち、製薬上許容可能な陰イオンを含有する塩、例えば塩酸塩、臭化水素酸塩、ヨウ化水素酸塩、硝酸塩、硫酸塩または重硫酸塩、リン酸塩または酸性リン酸塩、酢酸塩、乳酸塩、クエン酸塩または酸性クエン酸、酒石酸塩または重酒石酸塩、コハク酸塩、マレイン酸塩、フマル酸塩、グルコン酸塩、サッカリン酸塩、安息香酸塩、メタンスルホン酸塩およびパモエート (即ち、1, 1'-メチレンビス-(2-ヒドロキシ-3-ナフトエート)) 塩を生成するものである。

【0106】

10

20

30

40

50

本来酸性である式 I の化合物は、種々の薬理学的に許容可能な陽イオンとともに塩基塩を生成し得る。このような塩の例としては、アルカリ金属またはアルカリ土類金属塩、特にナトリウムおよびカリウム塩が挙げられる。これらの塩はすべて、慣用的技法により調製される。本発明の製薬上許容可能な塩基塩を調製するための試薬として用いられる化学塩基は、式 I の本明細書中に記載された酸性化合物とともに非毒性塩基塩を生成するものである。これらの非毒性塩基塩としては、ナトリウム、カリウム、カルシウムおよびマグネシウム等のような薬理学的に許容可能な陽イオンから得られるものが挙げられる。これらの塩は、所望の薬理学的に許容可能な陽イオンを含有する水性溶液で対応する酸性化合物を処理し、次にその結果生じる溶液を、好ましくは減圧下で、蒸発、乾燥することにより、容易に調製され得る。あるいはそれらは、酸性化合物および所望のアルカリ金属アルコキシドの低級アルカノール溶液と一緒に混合し、次にその結果生じる溶液を、前記と同様の方法で蒸発、乾燥することによっても調製され得る。いずれかの場合、反応の完全性および最大生成収量を保証するために、化学量論量の試薬が好ましくは用いられる。

10

20

30

40

50

【0107】

式 I の化合物およびそれらの製薬上許容可能な塩（本明細書中では以後、集合的に「活性化合物」とも呼ぶ）は、CCR1 受容体の強力なアンタゴニストである。活性化合物は、自己免疫疾患（例えば、慢性関節リウマチ、I 型糖尿病（近年開始）、狼瘡、炎症性腸疾患、視神経炎、乾癬、多発性硬化症、リウマチ性多発性筋痛、ブドウ膜炎および脈管炎）、急性および慢性炎症性症状（例えば変形性関節症、成人呼吸促進症候群、乳児期の呼吸促進症候群、虚血性再灌流障害、糸球体腎炎および慢性閉塞性肺疾患（COPD））、アレルギー症状（例えば喘息およびアトピー性皮膚炎）、感染に関連した炎症（例えばウイルス性炎症（例えばインフルエンザ、肝炎およびギラン・バレー症候群）、慢性気管支炎、慢性および急性の組織、細胞および固形器官移植片拒絶（例えば異種移植）、アテローム硬化症、再狭窄、HIV 感染性（補受容体使用）ならびに肉芽腫性疾患（例えば類肉腫症、らい病および結核）、ならびにある種の癌に関連した後遺症、例えば多発性骨髄腫の治療または予防に有用である。この一連の化合物は、細胞浸潤低減の結果としての炎症部位でのサイトカイン、例えば TNF および IL-1（これらに限定されない）の産生も限定し、TNF および IL-1 に関連した疾患、例えばうっ血性心不全、肺気腫または TNF および IL-1 に関連した呼吸困難、気腫；HIV-1、HIV-2、HIV-3；サイトメガロウイルス（CMV）、アデノウイルス、ヘルペスウイルス（帯状疱疹および単純ヘルペス）に関連した疾患のために利益を提供する。それらは、感染（この場合、このような感染は有害な炎症性サイトカイン、例えば TNF の産生を誘導する）に関連した後遺症、例えば真菌性髄膜炎、関節組織損傷、過形成、パンス形成および骨吸収、乾癬性関節炎、肝不全、細菌性髄膜炎、川崎病、心筋梗塞、急性肝不全、ライム病、敗血症性ショック、癌、外傷およびマラリア等にも利益を提供し得る。

【0108】

本発明の化合物の活性は、当業者に既知の手法により査定され得る。CCR1 誘導性移動を確定するための認識された方法の例は、Coligan, J. E., Kruisbeek, A. M., Margulies, D. H., Shevach, E. M., Strober, W. editors: Current Protocols In Immunology, 6.12.1-6.12.3 (John Wiley and Sons, NY, 1991) に見出され得る。移動を抑制するための化合物の活性の確定方法の特定の一例を、以下に詳細に説明する。

【0109】

走化性検定：

5 μ ポリカルボネートフィルターとともに標準 48 または 96 ウエル Boyden 小室を用いて、種々のケモカインに対する走化性を抑制する化合物の能力を評価し得る。試薬および細胞はすべて、1 mg/ml のウシ血清アルブミンを補充した標準 RPMI (BioWhittaker Inc.) 組織培地中で調製し得る。要するに、MIP-1 α (Peprotech, Inc., P. O. Box 275, Rocky Hill N

J) またはその他の試験アゴニストを、Boyden 小室の下部小室中に入れる。次にポリカルボネートフィルターを適用し、上部小室を固定する。選定されたアゴニストの量は、この系における走化性の最大量を生じるよう確定された量である（例えば、MIP-1 α に関しては 1 nM が適応されるべきである）。

【0110】

標準技法により単離された THP-1 (ATCC TIB-202)、一次ヒト単球または一次リンパ球は次に、種々の濃度の試験化合物と一緒に、三通りに、上部小室に付加され得る。標準血清学的技法を用いて化合物希釈物を調製し、細胞と混合した後、小室に付加する。

37℃で適切なインキュベーション期間（例えば THP-1 細胞に関しては 3.5 時間、一次単球に関しては 90 分間）後、小室を取り出し、上部小室中の細胞を吸引し、フィルターの上部を拭い取って、以下の方法により細胞移動の数を確定し得る。 10

【0111】

THP-1 細胞に関しては、小室 (Neuroprobe 製 96 ウェル種) を遠心分離して、細胞を下部小室に押出し、染料フルオレセイン二酢酸塩の色変化により、標準曲線に対して細胞の数を定量し得る。

一次ヒト単球またはリンパ球に関しては、フィルターを Diff Quik (商標) 染料 (American Scientific Products) で染色し、細胞移動の数を顕微鏡的に確定し得る。

【0112】

当該化合物の存在下での細胞移動の数を、対照ウェル（化合物無含有）中での細胞移動の数で割る。商は、化合物に関する阻害%であり、これを次に、用いた化合物の濃度に対して標準グラフ技法を用いてプロットし得る。次に、試験した全濃度に関して線適合分析を用いて 50% 阻害点を確定する。全データ点に関する線適合は、有効な検定であると考えられる >90% の相関 (R 自乗) 計数を有さなければならない。 20

【0113】

以下の実施例で例証される本発明の化合物はすべて、走化性検定において 10 μ m 未満の IC₅₀ を有した。

本発明の組成物は、1 つまたはそれ以上の製薬上許容可能な担体を用いて、慣用的方法で処方され得る。したがって本発明の活性化合物は、経口的、頬、鼻腔内、非経口的（例えば静脈内、筋内または皮下）または直腸投与のために、あるいは吸入または散布による投与に適した形態で処方され得る。本発明の活性化合物は、持続性送達のためにも処方され得る。 30

【0114】

経口投与に関しては、製剤組成物は、例えば製薬上許容可能な賦形剤、例えば結合剤（例えば前ゼラチン化トウモロコシデンプン、ポリビニルピロリドンまたはヒドロキシプロピルメチルセルロース）；充填剤（例えばラクトース、微晶質セルロースまたはリン酸カルシウム）；滑剤（例えばステアリン酸マグネシウム、タルクまたはシリカ）；崩壊剤（例えばジャガイモデンプンまたはナトリウムデンプングリコレート）；または湿潤剤（例えばラウリル硫酸ナトリウム）を用いて、慣用的手段により調製される錠剤またはカプセルの形態を取り得る。当業界で周知の方法により、錠剤を被覆し得る。経口投与のための液体製剤は、例えば溶液、シロップまたは懸濁液の形態を取り得るし、あるいはそれらは使用前に水またはその他の適切なビヒクルを用いる構成のための乾燥製品として提示され得る。このような液体製剤は、製薬上許容可能な添加剤、例えば沈殿防止剤（例えばソルビトールシロップ、メチルセルロースまたは水素化食用脂肪）；乳化剤（例えばレシチンまたはアラビアゴム）；非水性ビヒクル（例えばアーモンド油、エチルアルコールの油状エステル）；ならびに防腐剤（例えばメチルまたはプロピル p-ヒドロキシベンゾエートまたはソルビン酸）を用いて慣用的手段により調製され得る。 40

【0115】

頬投与に関しては、組成物は、慣用的方法で処方される錠剤またはロゼンジの形態を取り 50

得る。

本発明の活性化合物は、注射により、例えば慣用的カテーテル挿入技法または注入を用いて、非経口投与のために処方され得る。注射用処方物は、単位投薬形態で、例えばアンプル中に、または多用量容器中に、付加防腐剤を伴って提示され得る。組成物は、油性または水性ビヒクル中の懸濁液、溶液または乳濁液のような形態を取り得るし、そして処方剤、例えば沈殿防止剤、安定剤および／または分散剤を含有し得る。あるいは活性成分は、使用前の、適切なビヒクル、例えば滅菌発熱原無含有水を用いた再構成のために粉末形態であり得る。

本発明の活性化合物は、例えば慣用的座薬基剤、例えばココアバターまたはその他のグリセリドを含有する直腸組成物中に、例えば座薬または滞留浣腸中に処方され得る。

10

【0116】

鼻腔内投与または吸入による投与に関しては、患者が圧搾するかまたはポンプを押すポンプスプレー容器から溶液または懸濁液の形態で、あるいは適切な噴射剤、例えば時クロロジフルオロメタン、トリクロロフルオロメタン、ジクロロテトラフルオロエタン、二酸化炭素またはその他の適切なガスの使用を伴う、加圧容器またはネブライザーからのエアロゾル噴霧呈示として、本発明の活性化合物を便利に送達する。加圧エアロゾルの場合、投薬単位は、計器測定量を送達するための弁を提供することにより確定し得る。加圧容器またはネブライザーは、活性化合物の溶液または懸濁液を含入し得る。本発明の化合物および適切な粉末基剤、例えばラクトースまたはデンプンの粉末ミックスを含有する吸入器または散布器に用いるためのカプセルおよびカートリッジ（例えばゼラチン製）を処方し得る。

20

【0117】

前記の症状（例えば慢性関節リウマチ）の治療のための平均的成人に対する経口、非経口または頬投与のための本発明の活性化合物の推奨用量は、単位用量当たり0.1～1000 mgの活性成分であり、これは、例えば1日1～4回投与し得る。

平均的成人における前記の症状（例えば慢性関節リウマチ）の治療のためのエアロゾル処方物は、好ましくは、エアロゾルの各計量用量または「パフ」が20 μg～1000 μgの本発明の化合物を含有するよう、用意される。エアロゾルに関する全体的1日用量は、0.1 mg～1000 mgの範囲内である。投与は1日数回、例えば2、3、4または8回で、毎回、例えば1、2または3用量を投与し得る。

30

【0118】

活性作用物質は、当業者に周知の方法により、持続性送達のために処方し得る。このような処方物の例は、米国特許第3,538,214号、第4,060,598号、第4,173,626号、第3,119,742号および第3,492,397号に見出され得る。

本発明の化合物は、免疫抑制剤、例えばラパマイシン、シクロスポリンA、FK-506、セルセプトCellcept（商標）；アザチオプリンおよびIL-2R阻害抗体（これらに限定されない）を用いた、あるいは古典的抗炎症剤（例えばシクロオキシゲナーゼ／リポキシゲナーゼ阻害剤）、例えばテニダプ、アスピリン、アセトアミノフェン、ナプロキセンおよびピロキシカム（これらに限定されない）を用いた、あるいはサイトカイン阻害剤、例えばENBREL（これに限定されない）を用いた組合せ療法でも利用され得る。

40


【0119】

以下の実施例は本発明の化合物の調製を例証するが、これらに限定されない。

【0120】

実施例1

【化23】



10

1 - [3 - (4 - フルオロ - ベンジル) - 3 , 8 - ジアザ - ビシクロ [3 . 2 . 1] オク
ト - 8 - イル] - 2 - (2 - ニトロ - 4 - トリフルオロメチル - フェノキシ) - エタン
【 0 1 2 1 】

1 - (4 - フルオロ - ベンジル) - 5 - オキソ - ピロリジン - 2 - カルボン酸エチルエ
ステル

テトラヒドロフラン (8 0 0 m l) 中の 5 - オキソ - ピロリジン - 2 - カルボン酸エチル
エステル (1 5 g , 9 5 . 0 m m o l) および 4 - フルオロベンジルブロミド (1
9 . 7 g , 1 0 4 . 0 m m o l) の 0 ° C 溶液に、水素化ナトリウム (6 0 % 分散液、
5 . 7 g , 1 4 2 . 0 m m o l) を 4 回に分けて付加する。反応混合物を 0 ° C で 3 0
分間保持し、次に周囲温度に 3 時間暖める。その結果生じた混合物をジエチルエーテルで
希釈して、飽和水性塩化アンモニウムで抽出する。併合有機物を硫酸マグネシウム上で乾
燥し、濾過して、真空濃縮する。シリカゲルクロマトグラフィーにより、表題化合物 (1
8 . 1 1 g , 7 2 %) を得た。

20

【 0 1 2 2 】

1 - (4 - フルオロ - ベンジル) - 5 - ニトロメチレン - ピロリジン - 2 - カルボン酸エ
チルエステル

ジクロロメタン (3 0 m l) 中のトリエチルオキソニウムテトラフルオロボレート (5
. 5 2 g , 2 9 . 0 m m o l) および分子篩 (3 Å , 3 5 g) の溶液に、1 - (4
- フルオロ - ベンジル) - 5 - オキソ - ピロリジン - 2 - カルボン酸エチルエステル (7
. 0 g , 2 6 . 4 m m o l) を 1 5 分間掛けて滴下する。反応混合物を周囲温度で一
夜攪拌した後、ガラスフリットを通して濾過し、ジクロロメタンで洗浄する。収集沈殿物
を五酸化リンの存在下で一夜真空乾燥して、イミニウムテトラフルオロボレート (9 . 1
0 g , 9 5 %) を得る。

30

【 0 1 2 3 】

ドライジクロロメタン (3 5 m l) 中のイミニウムテトラフルオロボレート (9 . 1 0
g , 2 5 . 1 m m o l) の溶液に、トリエチルアミン (3 . 8 m l , 2 7 . 6 m m
o l) を付加する。反応混合物を周囲温度で 1 0 分間攪拌した後、ニトロメタン (6 . 8
m l , 1 2 5 . 0 m m o l) を付加する。その結果生じた混合物を周囲温度で一
夜攪拌し、次に真空濃縮する。残渣をクロロホルムで希釈し、1 0 % 水性塩酸、水およびブ
ラインで洗浄する。有機物を硫酸マグネシウム上で乾燥し、濾過して、真空濃縮する。シリ
カゲルクロマトグラフィーにより、回収された 1 - (4 - フルオロ - ベンジル) - 5 - オ
キソ - ピロリジン - 2 - カルボン酸エチルエステル (7 . 9 2 g , 3 2 %) のほかに、
表題化合物 (4 . 1 9 g , 5 4 %) を得た。

40

【 0 1 2 4 】

5 - アミノメチル - 1 - (4 - フルオロ - ベンジル) - ピロリジン - 2 - カルボン酸エチ
ルエステル

50

パーボトル中のメタノール (50 ml) 中の 1-(4-フルオロベンジル)-5-ニトロメチレン-ピロリジン-2-カルボン酸エチルエステル (5.24 g, 17.0 mmol) の溶液に、炭素上パラジウム (10%, 2.5 g) を付加する。その結果生じた懸濁液に水素ガス (40 psi) を一夜施して、セライトのパッドを通して濾過し、フィルターケーキをメタノールで洗浄する。濾液を真空濃縮して、表題化合物および 8-(4-フルオロベンジル)-3, 8-ジアザビシクロ [3.2.1] オクタン-2-オンの混合物を得る (3.56 g)。

【0125】

8-(4-フルオロベンジル)-3, 8-ジアザビシクロ [3.2.1] オクタン-2-オン

10

ドライメタノール (40 ml) 中の 5-アミノメチル-1-(4-フルオロベンジル)-ピロリジン-2-カルボン酸エチルエステル (2.19 g, 7.82 mmol) の溶液に、ナトリウムメトキシド (0.84 g, 15.6 mmol) を付加する。その結果生じた混合物を周囲温度で一夜攪拌し、酢酸エチルで希釈して、飽和水性炭酸水素ナトリウムで洗浄する。併合有機物を硫酸マグネシウム上で乾燥し、濾過して、真空濃縮し、表題化合物 (1.34 g, 73%) を得る。

【0126】

2-オキソ-3, 8-ジアザビシクロ [3.2.1] オクタン-8-カルボン酸 tert-ブチルエステル

パーボトル中のメタノール (50 ml) 中の 8-(4-フルオロベンジル)-3, 8-ジアザビシクロ [3.2.1] オクタン-2-オン (1.50 g, 6.40 mmol) およびジ-tert-ブチルジカルボネート (1.67 g, 7.6 mmol) の溶液に 60°C で水素ガス (40 psi) を一夜施して、セライトのパッドを通して濾過し、フィルターケーキを酢酸エチルで洗浄する。濾液を真空濃縮して、表題化合物 (1.22 g, 84%) を得る。

20

【0127】

3-(4-フルオロベンジル)-2-オキソ-3, 8-ジアザビシクロ [3.2.1] オクタン-8-カルボン酸 tert-ブチルエステル

テトラヒドロフラン (8.0 ml) 中の 2-オキソ-3, 8-ジアザビシクロ [3.2.1] オクタン-8-カルボン酸 tert-ブチルエステル (0.35 g, 1.54 mmol) の 0°C 溶液に、4-フルオロベンジルブロミド (0.21 ml, 1.70 mmol) を、その後、水素化ナトリウム (60% 分散液、0.092 g, 2.3 mmol) を付加する。その結果生じた混合物を 0°C で 30 分間攪拌し、次に周囲温度に一夜暖める。反応混合物をジエチルエーテルで希釈して、飽和水性塩化アンモニウムで洗浄する。併合有機物を硫酸マグネシウム上で乾燥し、濾過して、真空濃縮し、表題化合物を粗製で得た。

30

【0128】

3-(4-フルオロベンジル)-3, 8-ジアザビシクロ [3.2.1] オクタン-2-オン

ジクロロメタン (15.0 ml) 中の 3-(4-フルオロベンジル)-2-オキソ-3, 8-ジアザビシクロ [3.2.1] オクタン-8-カルボン酸 tert-ブチルエステルの溶液に、トリフルオロ酢酸 (3.0 ml) を付加する。その結果生じた混合物を周囲温度で 3 時間攪拌し、次に 1 N 水性水酸化ナトリウムで塩基性にして、ジクロロメタンで抽出する。併合有機物を硫酸マグネシウム上で乾燥し、濾過し、真空濃縮して、表題化合物 (2 過程で 0.297 g, 82%) を得る。

40

【0129】

3-(4-フルオロベンジル)-3, 8-ジアザビシクロ [3.2.1] オクタン-2-オン
テトラヒドロフラン (6.0 ml) 中の 3-(4-フルオロベンジル)-3, 8-ジアザビシクロ [3.2.1] オクタン-2-オン (0.284 g, 1.21 mmol) の 0°C 溶液に、水素化アルミニウムリチウム (テトラヒドロフラン中 1.0 M、6

50

． 1 m l , 6 . 1 m m o l) を滴下する。反応混合物を徐々に周囲温度に暖めて、次に一夜還流する。その結果生じた混合物を 0 °C に冷却し、水および 1 N 水性水酸化ナトリウムで徐々に抑制して、次にセライトのパッドを通して濾過し、フィルターケーキを酢酸エチルで洗浄する。濾液を真空濃縮して、表題化合物 (0 . 2 5 g , 9 4 %) を得る。

【 0 1 3 0 】

2-クロロ-1-[3-(4-フルオロベンジル)-3,8-ジアザビシクロ[3.2.1]オクト-8-イル]-エタノン

ドライジクロロメタン (5 0 m l) 中の 3-(4-フルオロベンジル)-3,8-ジアザビシクロ[3.2.1]オクタン (0 . 7 1 g , 3 . 2 2 m m o l) の溶液に、0 °C で、トリエチルアミン (0 . 4 5 m l , 3 . 2 2 m m o l) を、その後塩化クロロアセチル (0 . 2 7 m l , 3 . 5 4 m m o l) を付加する。その結果生じた反応混合物を 2 時間攪拌し、真空濃縮する。シリカゲルクロマトグラフィーにより、表題化合物 (0 . 6 6 g , 6 9 %) を得た。

10

【 0 1 3 1 】

1-[3-(4-フルオロベンジル)-3,8-ジアザビシクロ[3.2.1]オクト-8-イル]-2-(2-ニトロ-4-トリフルオロメチルフェノキシ)-エタノン
ブタノン (4 m l) 中の 2-クロロ-1-[3-(4-フルオロベンジル)-3,8-ジアザビシクロ[3.2.1]オクト-8-イル]-エタノン (0 . 1 1 g , 0 . 3 7 m m o l) の溶液に、2-ニトロ-4-トリフルオロメチルフェノール (0 . 3 0 0 g , 0 . 4 1 m m o l) 、炭酸カリウム (0 . 1 5 g , 1 . 0 9 m m o l) およびヨウ化カリウム (0 . 1 8 g , 1 . 0 9 m m o l) を付加する。その結果生じた混合物を 7 時間灌流で攪拌する。反応物を次に冷却し、酢酸エチルで希釈して、ブラインで洗浄する。有機層を硫酸マグネシウム上で乾燥し、濾過して、真空濃縮する。シリカゲルクロマトグラフィーにより、表題化合物 (0 . 1 0 g , 5 8 %) を得た。


20

【 0 1 3 2 】

実施例 1 に記載したものと類似の方法により、実施例 2 ~ 6 に関する表題化合物を調製する。

【 化 2 4 】

30



40

【 0 1 3 3 】

【 表 1 】

実施例	R ³	R ⁴
2	4-Cl	CO ₂ NH ₂
3	3-Cl	CO ₂ Et
4	4-Cl	COCH ₃
5	4-Cl	SO ₂ NH ₂
6	4-CF ₃	NO ₂
7	4-Cl	CH ₂ CO ₂ CH ₂ CH ₃


10

【0134】

実施例 8

【化25】

20



30

5-クロロ-2-{2-[8-(4-フルオロベンジル)-3,8-ジアザビシクロ
[3.2.1]オクト-3-イル]-2-オキソエトキシ}ベンゼンスルホンアミド

【0135】

8-(4-フルオロベンジル)-3,8-ジアザビシクロ[3.2.1]オクタン
テトラヒドロフラン(20 ml)中の8-(4-フルオロベンジル)-3,8-ジア
ザビシクロ[3.2.1]オクタン-2-オン(1.34 g, 5.72 mmol)
の0℃溶液に、水素化アルミニウムリチウム(テトラヒドロフラン中1.0 M、11.
4 ml, 11.4 mmol)を滴下する。反応混合物を徐々に周囲温度に暖めて、次
に3時間還流する。その結果生じた混合物を周囲温度に冷却し、水で徐々に抑制して、次
にセライトのパッドを通して濾過する。フィルターケーキを酢酸エチルで洗浄し、併合有
機物を飽和水性炭酸水素ナトリウムで洗浄して、硫酸マグネシウム上で乾燥し、濾過して
、真空濃縮して、表題化合物(0.781 g, 62%)を得る。


40

【0136】

実施例9～12に関する表題化合物は、実施例8に記載したものと類似の方法により調製
する。

50

【化 2 6】



10

【 0 1 3 7】

【表 2】

20


実施例	R ³	R ²
9	4-Cl	SO ₂ NH ₂
10	4-Cl	CONH ₂
11	3-OCH ₃	CONH ₂
12	4-Cl	NO ₂

30

【 0 1 3 8】

実施例 1 3

【化 2 7】



40

2- (5-クロロキノリン-8-イルオキシ) -1- [3- (4-フルオロベンジル)
) -3, 8-ジアザビシクロ [3. 2. 1] オクト-8-イル] -エタノン

実施例 1 3 に関する表題化合物は、実施例 1 に記載したものと類似の方法により調製する


50

。

【0139】

実施例 14

【化28】



10

1 - [3 - (4 - フルオロ - ベンジル) - 3, 8 - ジアザ - ビシクロ [3. 2. 1] オクト - 8 - イル] - 2 - (6 - メチル - 2 - ニトロ - ピリジン - 3 - イルオキシ) - エタノール


実施例 14 に関する表題化合物は、実施例 1 に記載したものと類似の方法により調製する。

20

【0140】

実施例 15

【化29】



30

2 - (5 - クロロ - 3 - ニトロ - ピリジン - 2 - イルオキシ) - 1 - [3 - (4 - フルオロ - ベンジル) - 3, 8 - ジアザ - ビシクロ [3. 2. 1] オクト - 8 - イル] - エタノール

40

【0141】

酢酸 2 - [3 - (4 - フルオロ - ベンジル) - 3, 8 - ジアザ - ビシクロ [3. 2. 1] オクト - 8 - イル] - 2 - オキソ - エチルエステル

ドライジクロロメタン (10 ml) 中の 3 - (4 - フルオロ - ベンジル) - 3, 8 - ジアザ - ビシクロ [3. 2. 1] オクト - 8 - イル (0.46 g, 2.1 mmol) の溶液に、0℃で、トリエチルアミン (0.32 ml, 2.3 mmol) を、その後、酢酸クロロカルボニルメチルエステル (0.245 ml, 2.3 mmol) を付加する。その結果生じた反応混合物を1時間攪拌し、次にジクロロメタンで希釈して、飽和水性炭酸水素ナトリウムで洗浄する。水性層をジクロロメタンで3回抽出する。併合有機物を硫酸マ

50

グネシウム上で乾燥し、真空濃縮して、表題化合物（0.67 g, 100%）を得る。

【0142】

1-[3-(4-フルオロベンジル)-3,8-ジアザビシクロ[3.2.1]オクト-8-イル]-2-ヒドロキシーエタノン

テトラヒドロフラン（8 ml）、メタノール（1 ml）および水（1 ml）中の酢酸 2-[3-(4-フルオロベンジル)-3,8-ジアザビシクロ[3.2.1]オクト-8-イル]-2-オキソエチルエステル（0.67 g, 2.1 mmol）の溶液に、水酸化リチウム水和物（0.18 g, 4.2 mmol）を付加する。反応混合物を周囲温度で一夜攪拌し、次に酢酸エチルで希釈して、飽和水性炭酸水素ナトリウムで洗浄する。水性層を酢酸エチルで3回抽出する。併合有機物を硫酸マグネシウム上で乾燥し、真空濃縮して、表題化合物（0.48 g, 82%）を得る。

10

【0143】

2-(5-クロロ-3-ニトロピリジン-2-イルオキシ)-1-[3-(4-フルオロベンジル)-3,8-ジアザビシクロ[3.2.1]オクト-8-イル]-エタノン

トルエン（8.0 ml）中の1-[3-(4-フルオロベンジル)-3,8-ジアザビシクロ[3.2.1]オクト-8-イル]-2-ヒドロキシーエタノン（0.456 g, 1.64 mmol）の0℃溶液に、水素化ナトリウム（0.072 g, 1.80 mmol）を付加する。反応混合物を0℃で30分間攪拌する。その結果生じた反応混合物に、2,5-ジクロロ-3-ニトロピリジン（0.35 g, 1.80 mmol）を付加する。反応混合物を2時間加熱、灌流して、次に周囲温度に冷却し、飽和水性炭酸水素ナトリウムおよびブラインで洗浄する。水性層を次に酢酸エチルで3回抽出する。併合有機物を硫酸マグネシウム上で乾燥し、真空濃縮し、表題化合物（0.76 g, 64%）を得る。


20

【0144】

実施例16～17の表題化合物は、実施例15に記載したものと類似の方法により調製する。

【化30】

30



40

【0145】

【表3】


実施例	R ²
16	CONH ₂
17	CO ₂ CH ₃

10

【0146】

実施例 18

【化31】



20

30

4-クロロ-2- {2- [3- (4-フルオロ-ベンジル) -3, 8-ジアザ-ビシクロ
[3. 2. 1] オクト-8-イル] -2-オキソ-エトキシ} -ベンズアミド


ドライメタノール (2. 0 ml) 中の 4-クロロ-2- {2- [3- (4-フルオロ-
ベンジル) -8-アザ-ビシクロ [3. 2. 1] オクト-8-イル] -2-オキソ-エト
キシ} -安息香酸メチルエステル (0. 030 g, 0. 067 mmol) の溶液中で
、アンモニアガスを発泡させる。次に反応混合物に蓋をして、周囲温度で2日間攪拌した
後、真空濃縮する。シリカゲルクロマトグラフィーにより、表題化合物 (0. 031 g
、100%) を得た。

40

【0147】

実施例 19

【化32】



10

N-(2-アミノエチル)-4-クロロ-2-{2-[3-(4-フルオロベンジル)-3,8-ジアザビシクロ[3.2.1]オクト-8-イル]-2-オキソエトキシ}-ベンズアミド


エタン-1,2-ジアミン (12.0 ml) 中の 4-クロロ-2-{2-[3-(4-フルオロベンジル)-3,8-ジアザビシクロ[3.2.1]オクト-8-イル]-2-オキソエトキシ}-安息香酸メチルエステル (0.160 g, 0.36 mmol) の溶液を一夜 45 °C に加熱する。次に反応混合物を周囲温度に冷却し、真空濃縮する。シリカゲルクロマトグラフィーにより表題化合物 (0.13 g, 76%) を得た。

20

【0148】

実施例 20

【化 33】



30

40

4-クロロ-2-{2-[3-(4-フルオロベンジル)-3,8-ジアザビシクロ[3.2.1]オクト-8-イル]-2-オキソエトキシ}-安息香酸

テトラヒドロフラン (2 ml)、メタノール (0.2 ml) および水 (0.4 ml) の混合物中の 4-クロロ-2-{2-[3-(4-フルオロベンジル)-3,8-ジアザビシクロ[3.2.1]オクト-8-イル]-2-オキソエトキシ}-安息香酸メチルエステル (0.080 g, 0.18 mmol) の溶液に、水酸化リチウム一水和物 (0.020 g, 0.36 mmol) を付加する。反応混合物を周囲温度で 2 時間攪拌し、次に塩化メチレンを含有するシリカゲルカラム上に載せる。シリカゲルクロマト


50

グラフィーにより、表題化合物（0.066 g, 78%）を得た。

【0149】

実施例21～25に関する表題化合物は、実施例20に記載したものと類似の方法により調製する。

【化34】



10

20

【0150】

【表4】

実施例	R ¹	R ²
20	4-Cl	CO ₂ H
21	4-CH ₃	CO ₂ H
22	4-OCH ₃	CO ₂ H
23	4-I	CO ₂ H
24	4-Br	CO ₂ H
25	4-Cl	CH ₂ CO ₂ H


30

【0151】

実施例26

【化35】

40



10

5-クロロ-2-{2-[8-(4-フルオロベンジル)-3,8-ジアザビシクロ
[3.2.1]オクト-3-イル]-2-オキソエトキシ}-安息香酸


実施例 26 に関する表題化合物は、実施例 20 に記載したものと類似の方法により調製する。

20

【0152】

実施例 27

【化36】



30

5-クロロ-2-{2-[3-(4-フルオロベンジル)-3,8-ジアザビシクロ
[3.2.1]オクト-8-イル]-2-オキソエトキシ}-ニコチン酸


40

実施例 27 に関する表題化合物は、実施例 20 に記載したものと類似の方法により調製する。

【0153】

実施例 28

【化37】



10

3-((2-((3-((4-fluorobenzyl)azabicyclo[3.2.1]octan-2-ylidene)oxy)propanoyl)oxy)naphthalen-2-yl)propanoic acid


実施例 28 に関する表題化合物は、実施例 20 に記載したものと類似の方法により調製する。

20

【0154】

実施例 29

【化 38】



30

4-chloro-1-((2-((3-((4-fluorobenzyl)azabicyclo[3.2.1]octan-2-ylidene)oxy)propanoyl)oxy)naphthalen-2-yl)propanoic acid


40

実施例 29 に関する表題化合物は、実施例 20 に記載したものと類似の方法により調製する。

【0155】

実施例 30

【化 39】



10

5-クロロ-2-{2-[3-(4-フルオロベンジル)-3,8-ジアザビシクロ[3.2.1]オクト-8-イル]-2-オキソエトキシ}-N-(1H-テトラゾール-5-イル)-ベンズアミド

テトラヒドロフラン (2.0 ml) 中の 5-クロロ-2-{2-[3-(4-フルオロベンジル)-3,8-ジアザビシクロ[3.2.1]オクト-8-イル]-2-オキソエトキシ}-安息香酸 (0.090 g, 0.21 mmol) の溶液に、カルボニルジイミダゾール (0.037 g, 0.23 mmol) を付加する。反応混合物を 3 時間還流し、次に周囲温度に冷却する。その結果生じた混合物に、1H-テトラゾール-5-イルアミン (0.0195 g, 0.23 mmol) を付加する。その結果生じた混合物を 12 時間加熱還流する。次に反応物を冷却し、ジクロロメタンで希釈して、飽和水性炭酸水素ナトリウムで洗浄する。有機層を硫酸マグネシウム上で乾燥し、濾過して、真空濃縮する。シリカゲルクロマトグラフィーにより、表題化合物 (0.10 g, 95%) を得た。


20

【0156】

実施例 31～32 に関する表題化合物は、実施例 30 に記載したものと類似の方法により調製する。

30

【化40】



40

【0157】

50


【表 5】

実施例	R ³	R ²
31	4-Cl	CONHCH ₂ CO ₂ H
32	4-Cl	CONHSO ₂ CH ₃

10

【0158】

【化41】



20

30

【0159】


【表 6】

実施例	R ³	R ²
33	4-Cl	CONHTet
34	4-Cl	CONHCH ₂ CONH ₂

40

【0160】

【化42】




10

【 0 1 6 1 】

実施例 3 5

【 化 4 3 】



20

30

N-カルバモイルメチル-5-クロロ-2-{2-[3-(4-フルオロベンジル)-3,8-ジアザビシクロ[3.2.1]オクト-8-イル]-2-オキソエトキシ}-ニコチンアミド


実施例 3 5 に関する表題化合物は、実施例 3 0 に記載したものと類似の方法により調製する。

【 0 1 6 2 】

実施例 3 6

【 化 4 4 】

40



10

4-クロロ-2-{2-[3-(4-フルオロベンジル)-3,8-ジアザビシクロ[3.2.1]オクト-8-イル]-2-オキソエトキシ}-N-(2-ウレイドーエチル)-ベンズアミド

ジクロロメタン (1.5 ml) 中の N-(2-アミノエチル)-4-クロロ-2-{2-[3-(4-フルオロベンジル)-3,8-ジアザビシクロ[3.2.1]オクト-8-イル]-2-オキソエトキシ}-ベンズアミド (0.065 g, 0.14 mmol) の溶液に、ピリジン (0.023 ml, 0.28 mmol) および 4-ニトロフェニルクロロホルメート (0.028 g, 0.14 mmol) を付加する。反応物を周囲温度で 1 時間攪拌し、次に真空濃縮する。その結果生じた残渣をメタノール中に溶解し、アンモニアガスで処理して、溶液をアンモニア雰囲気下で一夜攪拌する。反応混合物を酢酸エチルで希釈し、有機層が無色になるまで、飽和水性炭酸水素ナトリウムおよび 1 M 水性水酸化ナトリウムで洗浄する。シリカゲルクロマトグラフィーにより、表題化合物 (0.057 g, 79%) を得た。


20

【0163】

30

実施例 37～39 に関する表題化合物は、実施例 36 に記載したものと類似の方法により調製する。

【化45】



40

【0164】

50

【表 7】


実施例	R ¹	R ²
37	3-Cl	NHCONHCH ₂ CONH ₂
38	4-Cl	NHCONH ₂
39	4-Cl	NHCONHCH ₂ CH ₂ CO ₂ H

10

【0165】

実施例 40

【化 46】



20


30

(5-クロロ-2-{2-[8-(4-フルオロベンジル)-3,8-ジアザビシクロ[3.2.1]オクト-3-イル]-2-オキソエトキシ}-フェニル)-ウレア
 実施例 40 に関する表題化合物は、実施例 36 に記載したものと類似の方法により調製する。

【0166】

実施例 41

【化 47】



10

$$\frac{2 - [3 - (5 - \text{クロロ} - 2 - \{2 - [3 - (4 - \text{フルオロ} - \text{ベンジル}) - 3, 8 - \text{ジアザ} - \text{ビシクロ} [3. 2. 1] \text{オクト} - 8 - \text{イル}] - 2 - \text{オキソ} - \text{エトキシ}\} - \text{ピリジン} - 3 - \text{イル}) - \text{ウレイド}] - \text{アセトアミド}}{}$$


実施例 4 1 に関する表題化合物は、実施例 3 6 に記載したものと類似の方法により調製する。

20

【 0 1 6 7 】

实施例 42

【化 4 8】



30

40

$\frac{2 - (2 - \text{アミノ} - 5 - \text{クロロ} - \text{フェノキシ}) - 1 - [3 - (4 - \text{フルオロ} - \text{ベンジル}) - 3, 8 - \text{ジアザ} - \text{ビシクロ} [3. 2. 1] \text{オクト} - 8 - \text{イル}] - \text{エタノン}}{}$


パーボトル中のエタノール（15 ml）中の2-（5-クロロ-2-ニトロフェノキシ）-1-〔3-（4-フルオロベンジル）-3, 8-ジアザビスクロ〔3, 2, 1〕オクト-8-イル〕-エタノン（0.059 g, 0.136 mmol）の溶液に、炭素上パラジウム（5%, 0.100 g）を付加する。その結果生じた懸濁液に水素ガス（20 psi）を10分間施して、セライトのパッドを通して濾過し、フィルターケーキを酢酸エチルで洗浄する。濾液を真空濃縮して、表題化合物（0.040 g, 74%）を得る。

50

【0168】

実施例43～44に関する表題化合物は、実施例42に記載したものと類似の方法により調製する。

【化49】



10

【0169】

【表8】

20


実施例	R ¹	R ²
43	4-CF ₃	NH ₂
44	4-Cl	NH ₂

30

【0170】

実施例45

【化50】



40

50


2 - (2 - アミノ - 4 - クロロ - フェノキシ) - 1 - [8 - (4 - フルオロ - ベンジル) - 3, 8 - ジアザ - ビシクロ [3. 2. 1] オクト - 3 - イル] - エタノ

実施例 4 5 に関する表題化合物は、実施例 4 2 に記載したものと類似の方法により調製する。

【0171】

実施例 4 6

【化 5 1】



10

20


2 - (3 - アミノ - 5 - クロロ - ピリジン - 2 - イルオキシ) - 1 - [3 - (4 - フルオ
ロ - ベンジル) - 3, 8 - ジアザ - ビシクロ [3. 2. 1] オクト - 8 - イル] - エタノ
ン

実施例 4 6 に関する表題化合物は、実施例 4 2 に記載したものと類似の方法により調製する。

【0172】

実施例 4 7

【化 5 2】



30

40

2 - (2 - アミノ - 6 - メチル - ピリジン - 3 - イルオキシ) - 1 - [3 - (4 - フルオ
ロ - ベンジル) - 3, 8 - ジアザ - ビシクロ [3. 2. 1] オクト - 8 - イル] - エタノ
ン


50

実施例 47 に関する表題化合物は、実施例 42 に記載したものと類似の方法により調製する。

【0173】

実施例 48

【化53】



10

20

2-アミノ-N-(5-クロロ-2-{2-[3-(4-フルオロベンジル)-3,8-ジアザビシクロ[3.2.1]オクト-8-イル]-2-オキソエトキシ}-ピリジン-3-イル)-アセトアミド

テトラヒドロフラン (2.0 ml) 中の tert-ブトキシカルボニルアミノ酢酸 (0.061 g, 0.35 mmol) の溶液に、N-メチルモルホリン (0.038 ml, 0.35 mmol) およびイソブチルクロロホルメート (0.045 ml, 0.35 mmol) を付加する。反応混合物を 20 分間攪拌し、2 時間周囲温度に暖めて、次にテトラヒドロフラン (1.0 ml) 中の 2-(3-アミノ-5-クロロピリジン-2-イルオキシ)-1-[3-(4-フルオロベンジル)-3,8-ジアザビシクロ[3.2.1]オクト-8-イル]-エタノン (0.109 g, 0.26 mmol) で処理する。その結果生じた混合物を周囲温度で一晩攪拌した後、セライトのパッドを通して濾過し、これをテトラヒドロフランで洗浄する。濾液を酢酸エチルで希釈して、ブラインで洗浄する。有機層を硫酸マグネシウム上で乾燥して、濾過し、真空濃縮する。シリカゲルクロマトグラフィーにより、BOC 保護化表題化合物 (0.092 g, 63%) を得て、これをジクロロメタン (10 ml) 中のトリフルオロ酢酸 (1.0 ml) で処理する。反応混合物を周囲温度で一晩攪拌し、ジクロロメタンで希釈して、水性水酸化ナトリウム (1 N, 10.0 ml) で洗浄し、硫酸マグネシウム上で乾燥し、濾過して、真空濃縮し、表題化合物 (0.054 g, 73%) を得る。


30

【0174】

実施例 49

【化54】

40



10

N-(5-クロロ-2-{2-[8-(4-フルオロベンジル)-3,8-ジアザビシクロ[3.2.1]オクト-3-イル]-2-オキソ-エトキシ}-フェニル)-3-ヒドロキシ-3-メチル-ブチルアミド


実施例 49 に関する表題化合物は、実施例 48 に記載したものと類似の方法により調製する。

20

【0175】

実施例 50

【化 55】



30

N-(4-クロロ-2-{2-[3-(4-フルオロベンジル)-3,8-ジアザビシクロ[3.2.1]オクト-8-イル]-2-オキソ-エトキシ}-フェニル)-メタンスルホンアミド

40

ジクロロメタン (1.0 ml) 中の 2-(2-アミノ-5-クロロフェノキシ)-1-[3-(4-フルオロベンジル)-3,8-ジアザビシクロ[3.2.1]オクト-8-イル]-エタノン (0.040 g, 0.10 mmol) の 0℃ 溶液に、トリエチルアミン (0.028 ml, 0.20 mmol) および塩化メタンスルホン (0.010 g, 0.012 mmol) を付加する。反応混合物を 0℃ で 30 分間攪拌し、次に真空濃縮する。シリカゲルクロマトグラフィーにより、表題化合物 (0.025 g, 52%) を得た。


【0176】

実施例 51～53 の表題化合物は、実施例 50 に記載したものと類似の方法により調製す

50

る。

【化 5 6】



10

【 0 1 7 7 】

【表 9】

20


実施例	R ³	R ²
51	4-CF ₃	NHSO ₂ CH ₃
52	4-Cl	NHSO ₂ CH ₃
53	3-Cl	CONHCH ₂ CH ₂ NHSO ₂ CH ₃

30

【 0 1 7 8 】

実施例 5 4

【化 5 7】



40

50


N-(5-クロロ-2-{2-[8-(4-フルオロベンジル)-3,8-ジアザビシクロ[3.2.1]オクト-3-イル]-2-オキソエトキシ}-フェニル)-メタンスルホンアミド

実施例 54 に関する表題化合物は、実施例 50 に記載したものと類似の方法により調製する。

【0179】

実施例 55

【化 58】



10

20


N-(6-chloro-3-{2-[3-(4-fluorobenzyl)-3,8-ジアザビシクロ[3.2.1]オクト-3-イル]-2-オキソエトキシ}-ピリジン-2-イル)-メタンスルホンアミド

実施例 55 に関する表題化合物は、実施例 50 に記載したものと類似の方法により調製する。

【0180】

実施例 56

【化 59】



30

40

N-(6-methyl-3-{2-[3-(4-fluorobenzyl)-3,8-ジアザビシクロ[3.2.1]オクト-8-イル]-2-オキソエトキシ}-ピリジン-2-イル)-メタンスルホンアミド

実施例 56 に関する表題化合物は、実施例 50 に記載したものと類似の方法により調製す


50

る。

【0181】

実施例 57

【化60】



10

2-(4-クロロフェノキシ)-1-[3-(4-フルオロベンジル)-8-アザ-
ビスクロ[3.2.1]オクト-8-イル]-エタノン-8-ベンジル-8-アザ-ビス
クロ[3.2.1]オクタン-3-オン

20

水性塩酸 (0.25 M, 100 ml) 中の 2, 5-ジメトキシ-テトラヒドロフラン
(30 g, 0.23 mmol) の溶液を、0℃で一夜攪拌する。その結果生じた反応混
合物に、次にベンジルアミン塩酸塩 (39.9 g, 0.27 mmol)、3-オキソ
-ペンタンジオン酸 (33.6 g, 0.23 mmol) および水性酢酸ナトリウム (2.75 M, 200 ml, 0.55 mmol) を付加する。その結果生じた反応混
合物を周囲温度で90分間攪拌し、次に2時間、50℃に加熱する。反応混合物を次に0
℃に冷却し、6 N 水性水酸化ナトリウム (50 ml) で pH=10 の塩基性にする。反
応物を酢酸エチルで抽出し、有機層を硫酸マグネシウム上で乾燥して、濾過し、真空濃縮
する。シリカゲルクロマトグラフィーにより、表題化合物 (37.54 g, 75%) を
得た。

30

【0182】

3-オキソ-8-アザ-ビスクロ[3.2.1]オクタン-8-カルボン酸 tert-ブ
チルエステル

パーボトル中の酢酸エチル (100 ml) 中の 8-ベンジル-8-アザ-ビスクロ[3
.2.1]オクタン-3-オン (33 g, 0.153 mmol) の溶液に、ジ-tert
-ブチル-ジカルボネート (40.15 g, 0.184 mmol) および炭素上水
酸化パラジウム (20%, 20 g) を付加する。反応混合物に周囲温度で5時間、水素
ガスを施して、セライトのパッドを通して濾過し、フィルターケーキを酢酸エチルで洗浄
する。濾液を真空濃縮し、シリカゲルクロマトグラフィーにより、表題化合物 (29.3
7 g, 85%) を得た。

40

【0183】

3-(4-フルオロベンジリデン)-8-アザ-ビスクロ[3.2.1]オクタン-8
-カルボン酸 tert-ブチルエステル

トルエン (500 ml) 中の (4-フルオロベンジル)-トリフェニル-ホスホニ
ウムクロリド (27.0 g, 66.5 mmol) の溶液に、水素化ナトリウム (60%
分散液, 2.66 g, 66.5 mmol) を付加する。その結果生じた懸濁液を周囲
温度で90分間攪拌する。次に反応混合物に、3-オキソ-8-アザ-ビスクロ[3.2
.1]オクタン-8-カルボン酸 tert-ブチルエステル (13.6 g, 60.5
mmol) を付加する。その結果生じた反応混合物を一夜還流し、次に周囲温度に冷却し
て、水で希釈し、ジエチルエーテルで抽出する。有機層を硫酸マグネシウム上で乾燥し、

50

濾過して、真空濃縮する。シリカゲルクロマトグラフィーにより、表題化合物（17.61 g, 92%）を得た。

【0184】

3-（4-フルオロベンジル）-8-アザビスクロ[3.2.1]オクタン-8-カルボン酸 tert-ブチルエステル

パーボトル中のエタノール（500 ml）中の3-（4-フルオロベンジリデン）-8-アザビスクロ[3.2.1]オクタン-8-カルボン酸 tert-ブチルエステル（18.72 g, 59.0 mmol）の溶液に、炭素上パラジウム（10%、10.0 g）を付加する。反応混合物に水素ガス（40 psi）を2時間施す。反応混合物をセライトのパッドに通して濾過し、フィルターケーキをエタノールで洗浄する。濾液を真空濃縮して、表題化合物（18.12 g, 96%, ¹H NMRによるジアステレオマーの2:1混合物）を得る。キラルHPLC分離により、エキソジアステレオマー（4.24 g, 23%）をエンドジアステレオマー（11.32 g, 60%）とともに得た。

10

【0185】

3-（4-フルオロベンジル）-8-アザビスクロ[3.2.1]オクタン

ジクロロメタン（50 ml）中の3-（4-フルオロベンジル）-8-アザビスクロ[3.2.1]オクタン-8-カルボン酸 tert-ブチルエステル（4.24 g, 13.3 mmol）の溶液に、トリフルオロ酢酸（10 ml）を付加する。その結果生じた反応混合物を周囲温度で3時間拡販し、次に1 N水性水酸化ナトリウムで洗浄し、ジクロロメタンで3回抽出する。併合有機物を硫酸マグネシウム上で乾燥し、濾過して、真空濃縮して、表題化合物（2.91 g, 100%）を得る。

20

【0186】

2-（4-クロロフェノキシ）-1-〔3-（4-フルオロベンジル）-8-アザビスクロ[3.2.1]オクト-8-イル〕-エタノン


ジクロロメタン（1 ml）中の3-（4-フルオロベンジル）-8-アザビスクロ[3.2.1]オクタン（0.038 g, 0.173 mmol）の溶液に、0℃で、（4-クロロフェノキシ）-アセチルクロリド（0.042 g, 0.208 mmol）およびトリエチルアミン（0.072 ml, 0.520 mmol）を付加する。反応混合物を徐々に周囲温度に暖めて、次にジクロロメタンで希釈し、水で洗浄する。有機層を硫酸マグネシウム上で乾燥し、濾過して、真空濃縮する。シリカゲルクロマトグラフィーにより、表題化合物（0.042 g, 63%）を得た。

30

【0187】

実施例 58

【化61】



40

2-（4-クロロ-2-ニトロフェノキシ）-1-〔3-（4-フルオロベンジル）-8-アザビスクロ[3.2.1]オクト-8-イル〕-エタノン

50

【0188】

2-クロロ-1-[3-(4-フルオロベンジル)-8-アザビシクロ[3.2.1]オクタン]-エタノン

ドライジクロロメタン(30 ml)中の3-(4-フルオロベンジル)-8-アザビシクロ[3.2.1]オクタン(2.91 g, 13.28 mmol)の溶液に、0℃で、トリエチルアミン(2.10 ml, 14.60 mmol)を、その後塩化クロロアセチル(1.10 ml, 14.60 mmol)を付加する。その結果生じた混合物を60分間攪拌し、ジクロロメタンで希釈して、飽和水性炭酸水素ナトリウムで洗浄する。有機物を硫酸マグネシウム上で乾燥し、濾過して、真空濃縮する。シリカゲルクロマトグラフィーにより、表題化合物(3.58 g, 91%)を得た。

10

【0189】

2-(4-クロロ-2-ニトロフェノキシ)-1-[3-(4-フルオロベンジル)-8-アザビシクロ[3.2.1]オクト-8-イル]-エタノン


ブタノン(7 ml)中の2-クロロ-1-[3-(4-フルオロベンジル)-8-アザビシクロ[3.2.1]オクタン]-エタノン(1.0 g, 3.40 mmol)の溶液に、2-ニトロ-4-トリフルオロメチルフェノール(0.65 g, 3.74 mmol)、炭酸カリウム(0.93 g, 6.8 mmol)およびヨウ化カリウム(0.56 g, 3.40 mmol)を付加する。その結果生じた混合物を60℃で24時間攪拌する。反応物を次に冷却し、酢酸エチルで希釈して、ブラインで洗浄する。有機層を硫酸マグネシウム上で乾燥し、濾過して、真空濃縮する。シリカゲルクロマトグラフィーにより、表題化合物(1.3 g, 88%)を得た。

20

【0190】

実施例59～65に関する表題化合物は、実施例1に記載したものと類似の方法により調製する。

【化62】



30

【0191】

40

【表10】


実施例	R ³	R ²
59	4-Cl	CO ₂ CH ₃
60	4-Cl	COCH ₃
61	4-Cl	SO ₂ NH ₂
62	4-Cl	CH ₂ NPhth
63	4-CF ₃	NO ₂
64	3-Cl	CO ₂ CH ₃
65	3-CH ₃	NHCOCH ₃

10

【0192】

【化63】

20




30

【0193】

実施例 6 6

【化64】



40

5-クロロ-2- { 2 - [3 - (4 -フルオロ-ベンジル) - 8 -アザ-ビシクロ [3 . 2 . 1] オクト-8-イル] - 2-オキソ-エトキシ } -ベンズアミド
 ドライメタノール (3 . 0 m l) 中の 5-クロロ-2- { 2 - [3 - (4 -フルオロ-
 ベンジル) - 8 -アザ-ビシクロ [3 . 2 . 1] オクト-8-イル] - 2-オキソ-エト


50

キシ}-安息香酸メチルエステル (0.015 g, 0.034 mmol) の溶液中で、アンモニアガスを発泡させる。次に反応混合物に蓋をして、周囲温度で2日間攪拌した後、真空濃縮する。シリカゲルクロマトグラフィーにより、表題化合物 (0.008 mg, 55%) を得た。

【0194】

実施例 67

【化 65】



10

20


N-(2-アミノエチル)-5-クロロ-2-{2-[3-(4-フルオロベンジル)-8-アザビシクロ[3.2.1]オクト-8-イル]-2-オキソエトキシ}-ベンズアミド

エタン-1, 2-ジアミン (2.0 ml) 中の 5-クロロ-2-{2-[3-(4-フルオロベンジル)-8-アザビシクロ[3.2.1]オクト-8-イル]-2-オキソエトキシ}-安息香酸メチルエステル (0.015 g, 0.034 mmol) の溶液を一夜 45 °C に加熱する。次に反応混合物を周囲温度に冷却し、真空濃縮する。シリカゲルクロマトグラフィーにより表題化合物 (0.011 g, 69%) を得た。

【0195】

実施例 68

【化 66】



40

5-クロロ-2-{2-[3-(4-フルオロベンジル)-8-アザビシクロ[3.2.1]オクト-8-イル]-2-オキソエトキシ}-N-(2-ウレイドエチル)-ベンズアミド

ジクロロメタン (2 ml) 中の N-(2-アミノエチル)-5-クロロ-2-{2-


50

〔3-（4-フルオロベンジル）-8-アザビシクロ〔3.2.1〕オクト-8-イル〕-2-オキソエトキシ}-ベンズアミド（0.104 g, 0.22 mmol）の溶液に、ピリジン（0.035 ml, 0.44 mmol）および4-ニトロフェニルクロロホルメート（0.048 g, 0.24 mmol）を付加する。反応物を周囲温度で1時間攪拌し、次に真空濃縮する。その結果生じた残渣をメタノール中に溶解し、アンモニアガスを反応混合物中で発泡させて、溶液をアンモニア雰囲気下で一夜攪拌する。反応混合物を真空濃縮し、シリカゲルクロマトグラフィーにより、表題化合物（0.049 g, 43%）を得た。

【0196】

実施例69～71に関する表題化合物は、実施例68に記載したものと類似の方法により調製する。

【化67】



【0197】

【表11】

実施例	R ¹	R ²
69	4-Cl	NHCONH ₂
70	4-CF ₃	NHCONH ₂
71	3-Cl	NHCONH ₂

【0198】

実施例72


2-（2-アミノ-4-クロロフェノキシ）-1-〔3-（4-フルオロベンジル）-8-アザビシクロ〔3.2.1〕オクト-8-イル〕-エタノン

パーボトル中のエタノール（50 ml）中の2-（5-クロロ-2-ニトロフェノキシ）-1-〔3-（4-フルオロベンジル）-8-アザビシクロ〔3.2.1〕オクト-8-イル〕-エタノン（1.23 g, 2.84 mmol）の溶液に、炭素上パラジウム（5%, 0.500 g）を付加する。その結果生じた懸濁液に水素ガス（35 psi）を3時間施して、セライトのパッドを通して濾過し、フィルターケーキを酢酸エチルで洗浄する。濾液を真空濃縮して、表題化合物（0.95 g, 83%）を得る。

【0199】

実施例73～74に関する表題化合物は、実施例72に記載したものと類似の方法により調製する。

【化68】



10

【0200】

【表12】

実施例	R ³	R ²
73	4-CF ₃	NH ₂
74	3-Cl	NH ₂


20

30

【0201】

実施例75

【化69】



40

【0202】

50

N-（5-クロロ-2-〔2-〔3-（4-フルオロ-ベンジル）-8-アザ-ビスクロ
〔3. 2. 1〕オクト-8-イル〕-2-オキソ-エトキシ〕-フェニル）-メタン
スルホンアミド


ジクロロメタン（1. 0 ml）中の2-（2-アミノ-4-クロロ-フェノキシ）-1-
-〔3-（4-フルオロ-ベンジル）-8-アザ-ビスクロ〔3. 2. 1〕オクト-8-
イル〕-エタノン（0. 050 g, 0. 13 mmol）の溶液に、トリエチルアミン（
0. 036 ml, 0. 26 mmol）および塩化メタンスルホン（0. 011 g,
0. 014 mmol）を付加する。反応混合物を室温で1時間攪拌し、次に真空濃縮す
る。シリカゲルクロマトグラフィーにより、表題化合物（0. 034 g, 54%）を得
た。

10

【0203】

実施例76～81の表題化合物は、実施例75に記載したものと類似の方法により調製す
る。

【化70】



20

【0204】

30

【表13】


実施例	R ³	R ²
76	4-CF ₃	NHSO ₂ CH ₃
77	3-Cl	NHSO ₂ CH ₃
78	3-Cl	N(SO ₂ CH ₃) ₂
79	3-Cl	NHCH ₂ CH ₂ NHSO ₂ CH ₃
80	4-Cl	NHCH ₂ CH ₂ NHSO ₂ CH ₃
81	4-Cl	NHSO ₂ CF ₃

40

【0205】

実施例82

【化71】



10

2-(2-アミノメチル-4-クロロフェノキシ)-1-[3-(4-フルオロベンジル)-8-アザビシクロ[3.2.1]オクト-8-イル]-2-オキソエトキシ


エタノール (30 ml) 中の 2-(5-クロロ-2-{2-[3-(4-フルオロベンジル)-8-アザビシクロ[3.2.1]オクト-8-イル]-2-オキソエトキシ}-ベンジル)-イソインドール-1,3-ジオン (1.46 g, 2.67 mmol) の溶液に、ヒドラジン (35%, 5.0 ml, 54 mmol) を付加する。反応混合物を周囲温度で一晩攪拌する。次に反応混合物をガラスフリットに通して濾過し、白色沈殿をエタノールで洗浄し、併合濾液を真空濃縮する。その結果生じた残渣をジクロロメタンで粉砕し、ガラスフリットを通して濾過する。濾液を真空濃縮して、表題化合物 (1.06 g, 95.4%) を得る。

20

【0206】

実施例 83

【化72】



30

40

N-(5-クロロ-2-{2-[3-(4-フルオロベンジル)-8-アザビシクロ[3.2.1]オクト-8-イル]-2-オキソエトキシ}-ベンジル)-2-ウレイドアセトアミド

ジクロロメタン (1.5 ml) 中の 2-(2-アミノメチル-4-クロロフェノキシ)-1-[3-(4-フルオロベンジル)-8-アザビシクロ[3.2.1]オクト-8-イル]-2-オキソエトキシ (0.060 g, 0.14 mmol) の溶液に、トリエチルアミン (0.036 ml, 0.36 mmol)、tert-ブチル 1-ピペラジンカルボキシレート (0.021 g, 0.15 mmol)、塩酸 1-(3-ジメチルアミ


50

ノプロピル) - 3 - エチルカルボジイミド (0.034 g, 0.15 mmol) およ
びウレイドー酢酸 (0.017 g, 0.15 mmol) を付加する。その結果生じた
反応混合物を周囲温度で一夜攪拌し、次にジクロロメタンで希釈して、飽和水性炭酸水素
ナトリウムで洗浄する。有機物を硫酸マグネシウム上で乾燥し、濾過して、真空濃縮する
。シリカゲルクロマトグラフィーにより、表題化合物 (0.034 g, 47%) を得た
。

【0207】

実施例 84

【化73】



10

20

30

40

50

5 - クロロ - 2 - { 2 - [3 - (4 - フルオローベンジル) - 8 - アザービシクロ [3 .
2 . 1] オクトー 8 - イル] - 2 - オキソーエトキシ } - ニコチンアミド

ジクロロメタン (6 ml) 中のグリコール酸 (0.157 g, 2.07 mmol) 、
ジメチルアミノピリジン (触媒量) およびピリジン (0.327 g, 4.14 mmol)
の溶液に、クロロトリメチルシラン (0.526 ml, 4.14 mmol) を滴
下する。反応混合物を周囲温度で 4 時間攪拌し、次に触媒的ジメチルホルムアミドおよび
オキサリクロリド (ジクロロメタン中に 2 M, 1.0 ml, 2.0 mmol) を
付加する。その結果生じた反応混合物を 0℃ で 1 時間攪拌し、周囲温度に 30 分間暖めて
、次に 0℃ に冷却する。混合物に、ピリジン (0.474 g, 6.1 mmol) 中の
(4 - フルオローベンジル) - 8 - アザービシクロ [3 . 2 . 1] オクタン (0.500
g, 2.2 mmol) を付加する。次に反応混合物を 2 時間かけて徐々に室温に暖め
る。メタノール (6.0 ml) 中のクエン酸 (0.422 g, 2.2 mmol) をそ
の結果生じた反応混合物に付加し、これを次に周囲温度で 30 分間攪拌する。反応混合物
を酢酸エチルで希釈し、1 N 水性塩酸で、次に飽和水性炭酸水素ナトリウムおよびブラ
インで洗浄する。有機物を硫酸マグネシウム上で乾燥し、濾過して、真空濃縮して、1 -
[3 - (4 - フルオローベンジル) - 8 - アザービシクロ [3 . 2 . 1] オクトー 8 - イ
ル] - 2 - ヒドロキシーエタノン (0.480 g, 84%) を得る。


【0208】

トルエン (2.0 ml) 中の 1 - [3 - (4 - フルオローベンジル) - 8 - アザービシ
クロ [3 . 2 . 1] オクトー 8 - イル] - 2 - ヒドロキシーエタノン (0.075 g,
0.27 mmol) の 0℃ 溶液に、水素化ナトリウム (0.012 g, 0.29 mmol)
を付加し、反応混合物を 0℃ で 30 分間攪拌する。次に反応混合物に、2, 5 - ジ
クロロニコチンアミド (0.056 g, 0.29 mmol) を付加する。その結果
生じた混合物を 2 時間灌流して、周囲温度に冷却し、真空濃縮する。シリカゲルクロマト
グラフィーにより、表題化合物 (0.070 g, 60%) を得た。

【0209】

実施例 8 5

【化 7 4】



10

2- (3-アミノ-5-クロロピリジン-2-イルオキシ)-1- [3- (4-フルオ
 ローベンジル)-8-アザビシクロ [3. 2. 1] オクト-8-イル]-エタノン

20

トルエン (2. 0 ml) 中の 1- [3- (4-フルオロベンジル)-8-アザビシクロ [3. 2. 1] オクト-8-イル]-2-ヒドロキシーエタノン (0. 253 g, 0. 913 mmol) の 0℃ 溶液に、水素化ナトリウム (0. 042 g, 1. 1 mmol) を付加し、反応混合物を 0℃ で 30 分間攪拌する。次に反応混合物に、2, 5-ジクロロ-3-ニトロピリジン (0. 185 g, 0. 98 mmol) を付加する。損結果生じた混合物を 2 時間灌流して、周囲温度に冷却し、真空濃縮する。シリカゲルクロマトグラフィーにより、2- (3-ニトロ-5-クロロピリジン-2-イルオキシ)-1- [3- (4-フルオロベンジル)-8-アザビシクロ [3. 2. 1] オクト-8-イル]-エタノン (0. 272 g, 68%) を得た。

【0210】

30


パーボトル中のエタノール (10 ml) 中の 2- (3-ニトロ-5-クロロピリジン-2-イルオキシ)-1- [3- (4-フルオロベンジル)-8-アザビシクロ [3. 2. 1] オクト-8-イル]-エタノン (0. 269 g, 0. 621 mmol) の溶液に、二酸化白金 (0. 250 g) を付加する。反応混合物に水素ガス (35 psi) を 20 分間施して、次にセライトのパッドを通して濾過し、フィルターケーキをエタノールで洗浄し、濾液を真空濃縮する。シリカゲルクロマトグラフィーにより、表題化合物 (0. 135 g, 54%) を得た。

【0211】

実施例 8 6

【化 7 5】

40



10

2-(4-クロロフェノキシ)-1-[5-(4-フルオロベンジル)-2,5-ジアザビシクロ[2.2.2]オクト-2-イル]-エタノン

【0212】

2,5-ジアミノヘキサンジオン酸ジエチルエステル塩酸塩

エタノール (16 ml) 中の 2,5-ジブロモヘキサンジオン酸ジエチルエステル (5.0 g, 0.013 mmol) の溶液に、アジ化ナトリウム (2.4 g, 0.036 mmol) を付加する。反応混合物を一夜灌流し、次に氷水中に徐々に注ぎ入れる。生成物をジエチルエーテルで 3 回抽出し、有機物を硫酸マグネシウム上で乾燥して、濾過し、真空濃縮して、粗製生成物を得て、これをエタノール (75 ml) および濃水性塩酸 (5.5 ml) 中に溶解する。反応混合物に、酸化白金 (1.1 g) を付加する。反応混合物を水素雰囲気下 (30 psi) で一夜振盪し、次にセライトのパッドを通して濾過し、フィルターケーキをエタノールで洗浄する。濾液を真空濃縮して、表題化合物 (5.6 g, 100%) を得る。

【0213】

2,5-ジアザビシクロ[2.2.2]オクタン塩酸塩

メタノール (400 ml) 中の 2,5-ジアミノヘキサンジオン酸ジエチルエステル塩酸塩 (5.6 g, 0.013 mmol) の溶液に、ナトリウムメトキシド (2.78 g, 0.051 mmol) を付加して、溶液を pH=14 とする。反応混合物を一夜灌流し、次に真空濃縮する。その結果生じた残渣を沸騰エタノールで 2 回洗浄する。濾液を真空濃縮して、粗製生成物を得て、これをテトラヒドロフラン (100 ml) 中に溶解し、0℃で水素化アルミニウムリチウム (テトラヒドロフラン中 1.0 M, 80 ml, 0.080 mmol) で処理する。反応混合物を徐々に周囲温度に暖めて、次に一夜還流し、0℃に冷却して、水で徐々に抑制する。その結果生じた混合物をセライトのパッドを通して濾過し、フィルターケーキをジエチルエーテルおよびジクロロメタンで洗浄する。濾液を塩酸で処理し、次に真空濃縮して、表題化合物 (2 過程を通して 0.30 g, 16%) を得る。

【0214】

2-(4-フルオロベンジル)-2,5-ジアザビシクロ[2.2.2]オクタン

1,2-ジクロロエタン (3.2 ml) 中の 2,5-ジアザビシクロ[2.2.2]オクタン塩酸塩 (0.30 g, 1.60 mmol) の溶液に、トリエチルアミン (0.5 ml, 13.6 mmol) および酢酸 (0.3 ml) を付加する。反応混合物を 2 時間攪拌し、次にナトリウムトリアセトキシボロヒドリド (0.14 g, 2.72 mmol) で処理して、周囲温度で一夜攪拌する。反応混合物を水で処理し、酢酸エチルで抽出する。有機物を硫酸マグネシウム上で乾燥し、濾過して、真空濃縮し、酢酸トリエチルアンモニウムを夾雑する表題化合物を得た (NMR により 0.44 g, 66%)。

【0215】

50


2- (4-クロロフェノキシ) -1- [5- (4-フルオロベンジル) -2, 5-ジアザビシクロ [2. 2. 2] オクト-2-イル] -エタノン

ジクロロエタン (1 ml) 中の 2- (4-フルオロベンジル) -2, 5-ジアザビシクロ [2. 2. 2] オクトン (0.026 mg, 0.12 mmol) の溶液に、0℃で、(4-クロロフェノキシ) -アセチルクロリド (28 mg, 0.13 mmol) を付加する。反応混合物を徐々に室温に暖めて、次に飽和水性炭酸水素ナトリウムで抑制する。生成物を酢酸エチルで抽出し、有機物をブラインで洗浄して、硫酸マグネシウム上で乾燥し、濾過して、真空濃縮し、表題化合物 (0.023 mg, 76%) を得る。

【0216】

実施例 87

【化76】



5-クロロ-2- {2- [3- (4-フルオロベンジル) -3, 9-ジアザビシクロ [3. 3. 1] ノン-9-イル] -2-オキソエトキシ} -ベンズアミド

【0217】

ピペリジン-1, 2, 6-トリカルボン酸 1-ベンジルエステル

パーボトル中の 2 M 水性水酸化ナトリウム (150 ml) 中のピリジン-2, 6-ジカルボン酸 (20.0 g, 0.119 mol) の溶液に、アルミニウム上ロジウム (5%, 1.49 g) を付加する。その結果生じた懸濁液に水素ガス (50 psi) を 72 時間施して、セライトのパッドを通して濾過し、フィルターケーキを水で洗浄する。濾液を 0℃に冷却して、テトラヒドロフラン (100 ml) 中のベンジルククロホルメート (24.2 g, 0.142 mmol) で処理する。反応混合物を周囲温度で 5 時間攪拌する。反応混合物をジエチルエーテルで抽出し、水性層を 6 N 水性塩酸で酸性にして、次に酢酸エチルで抽出する。併合有機物を硫酸マグネシウム上で乾燥し、濾過して、真空濃縮する。酢酸エチルで粉砕して、表題化合物 (18.0 g, 48%) を得た。

【0218】

3- (4-フルオロベンジル) -2, 4-ジオキシー-3, 9-ジアザビシクロ [3. 3. 1] ノナン-9-カルボン酸ベンジルエステル

無水酢酸 (200 ml) 中のピペリジン-1, 2, 6-トリカルボン酸 1-ベンジルエステル (18.0 g, 0.059 mol) の溶液を、一夜 70℃に加熱する。反応混合物を周囲温度に冷却し、真空濃縮して、残渣をトルエンとともに共沸させる。その結果生じた油をトルエン (200 ml) 中に溶解し、4-フルオロベンジルアミン (7.3 g, 0.059 mol) で処理する。反応混合物を周囲温度で 18 時間攪拌し、次に無水酢酸 (20 ml) で処理して、16 時間、加熱灌流する。反応混合物を 0℃に冷却して、飽和水性炭酸水素ナトリウムおよびかき割り氷の混合物中に注ぎ入れ、酢酸エチルで抽出する。併合有機物を硫酸マグネシウム上で乾燥し、濾過して、真空濃縮する。シリカゲルクロマトグラフィーにより、表題化合物 (19.72 g, 84%) を得た。

【0219】

3- (4-フルオロベンジル) -3, 9-ジアザビシクロ [3. 3. 1] ノナン-2

， 4-ジオン

エタノール（100 ml）中の3-（4-フルオロベンジル）-2，4-ジオキシー
3，9-ジアザビシクロ[3.3.1]ノナン-9-カルボン酸ベンジルエステル（9
.37 g， 0.023 mol）の溶液に、シクロヘキサジエン（18.9 g， 0.
23 mol）および炭素上パラジウム（10%， 5.0 g）を付加する。反応混合物
を周囲温度で90分間攪拌し、次にセライトのパッドを通して濾過し、フィルターケーキ
をエタノールで洗浄する。濾液を濃縮して、表題化合物（5.69 g， 94%）を得る
。

【0220】

3-（4-フルオロベンジル）-3，9-ジアザビシクロ[3.3.1]ノナン
トルエン（70 ml）中の3-（4-フルオロベンジル）-3，9-ジアザビシクロ
[3.3.1]ノナン-2，4-ジオン（5.69 g， 0.0217 mol）の溶
液に、Red-Al（20 ml， 0.100 mol）を付加する。反応混合物を60
℃に4時間暖めて、次に0℃に冷却し、水（50 ml）、1 N水性水酸化ナトリウム（
50 ml）および飽和水性塩化アンモニウムで処理する。その結果生じた混合物をセラ
イトのパッドを通して濾過し、酢酸エチルで抽出し、併合有機物を硫酸マグネシウム上で
乾燥し、濾過して、真空濃縮して、表題化合物（4.51 g， 88%）を得る。

10

【0221】

2-クロロ-1-〔3-（4-フルオロベンジル）-3，9-ジアザビシクロ[3.
9.1]ノン-8-イル〕-エタノン
ドライジクロロメタン（6 ml）中の3-（4-フルオロベンジル）-3，9-ジア
ザビシクロ[3.9.1]ノナン（0.65 g， 2.77 mmol）の溶液に、ト
リエチルアミン（0.43 ml， 3.10 mmol）を、その後クロロアセチルクロ
リド（0.23 ml， 3.10 mmol）を付加する。その結果生じた反応混合物を
2時間攪拌し、真空濃縮する。シリカゲルクロマトグラフィーにより、表題化合物（0.
53 g， 61%）を得た。

20

【0222】

5-クロロ-2-〔2-〔3-（4-フルオロベンジル）-3，9-ジアザビシクロ
[3.3.1]ノン-9-イル〕-2-オキソエトキシ〕-ベンズアミド
ブタノン（4 ml）中の2-クロロ-1-〔3-（4-フルオロベンジル）-3，9
-ジアザビシクロ[3.3.1]オクト-8-イル〕-エタノン（0.095 g， 0
.30 mmol）の溶液に、2-ヒドロキシー-5-クロロベンジルアミド（0.00
57 g， 0.33 mmol）、炭酸カリウム（0.082 g， 0.60 mmol）
およびヨウ化カリウム（0.0049 g， 0.30 mmol）を付加する。その結果
生じた混合物を7時間灌流で攪拌する。反応物を次に冷却し、酢酸エチルで希釈して、ブ
ラインで洗浄する。有機層を硫酸マグネシウム上で乾燥し、濾過して、真空濃縮する。シ
リカゲルクロマトグラフィーにより、表題化合物（0.090 g， 67%）を得た。

30


【0223】

実施例88～92に関する表題化合物は、実施例1に記載したものと類似の方法により調製
する。

40

【0224】

【化77】



10

【0225】

【表14】

実施例	R ²	R ⁴
88	4-Cl	SO ₂ NH ₂
89	4-Cl	CO ₂ CH ₃
90	4-Cl	NHSO ₂ CH ₃
91	3-Cl	NO ₂
92	4-Cl	CH ₂ CO ₂ CH ₂ CH ₃


20

【0226】

実施例 93

【化78】

30



40

5-クロロ-2-{2-[3-(4-フルオロベンジル)-3,9-ジアザビシクロ[3.3.1]ノン-9-イル]-2-オキソエトキシ}-安息香酸


実施例 93 に関する表題化合物は、実施例 20 に記載したものと類似の方法により調製する。

【0227】

実施例 94

【化79】

50



10

5-クロロ-2-〔2-〔3-(4-フルオロベンジル)-3,9-ジアザビシクロ
〔3.3.1〕ノン-9-イル〕-2-オキソエトキシ〕-フェニル)-酢酸


実施例 9 4 に関する表題化合物は、実施例 2 0 に記載したものと類似の方法により調製する。

【0228】

実施例 9 5

【化80】

20



2-(5-クロロ-3-ニトロピリジン-2-イルオキシ)-1-〔3-(4-フルオ
ロベンジル)-3,9-ジアザビシクロ〔3.3.1〕ノン-9-イル〕-エタノン


30

実施例 9 5 に関する表題化合物は、実施例 1 5 に記載したものと類似の方法により調製する。

【0229】

実施例 9 6

【化81】




40

5-クロロ-2-〔2-〔3-(4-フルオロベンジル)-3,9-ジアザビシクロ
〔3.3.1〕ノン-9-イル〕-2-オキソエトキシ〕-ニコチン酸

実施例 9 6 に関する表題化合物は、実施例 1 5 に記載したものと類似の方法により調製する。


【0230】

50

実施例 9 7【化 8 2】

10

2 - (3 - アミノ - 5 - クロロ - ピリジン - 2 - イルオキシ) - 1 - [3 - (4 - フルオ
ロ - ベンジル) - 3 , 9 - ジアザ - ビシクロ [3 . 3 . 1] ノン - 9 - イル] - エタノン
 実施例 9 7 に関する表題化合物は、実施例 4 2 に記載したものと類似の方法により調製する。

【 0 2 3 1 】実施例 9 8【化 8 3】


30

N - [(5 - クロロ - 2 - { 2 - [3 - (4 - フルオロ - ベンジル) - 3 , 9 - ジアザ -
ビシクロ [3 . 3 . 1] ノン - 9 - イル] - 2 - オキソ - エトキシ } - フェニル) - アセ
チル] - メタンスルホンアミド

実施例 9 8 に関する表題化合物は、実施例 3 0 に記載したものと類似の方法により調製する。

【 0 2 3 2 】実施例 9 9【化 8 4】

40



5-クロロ-2-{2-[3-(4-フルオロベンジル)-3,98-ジアザビシクロ[3.3.1]ノン-9-イル]-2-オキソエトキシ}-N-(1H-テトラゾール-5-イル)-ベンズアミド

実施例 98 に関する表題化合物は、実施例 30 に記載したものと類似の方法により調製する。

【国際公開パンフレット】

(12) INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(19) World Intellectual Property Organization
International Bureau(43) International Publication Date
25 April 2002 (25.04.2002)

PCT

(10) International Publication Number
WO 02/32901 A2(51) International Patent Classification: C07D 487/08,
A61K 31/4995, A61P 29/00, 37/00, C07D 451/02, 471/08
// (C07D 487/08, 241:00, 209:00) (C07D 487/08, 241:00,
241:00) (C07D 471/08, 241:00, 221:00)[US/US]; Pfizer Global Research and Development, East-
ern Point Road, Groton, CT 06340 (US).

(21) International Application Number: PCT/IB01/01844

(74) Agents: LUMB, J., Trevor et al.; c/o Simpson, Alison,
Urquhart-Dykes & Lord, 39 Welbeck Street, London W1G
8ER (GB).

(22) International Filing Date: 4 October 2001 (04.10.2001)

(25) Filing Language: English

(26) Publication Language: English

(30) Priority Data: 60/241,804 19 October 2000 (19.10.2000) US

(71) Applicant (for all designated States except US): PFIZER
PRODUCTS INC. [US/US]; Eastern Point Road, Groton,
CT 06340 (US).(81) Designated States (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU,
AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU,
CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH,
GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC,
LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW,
MX, MZ, NO, NZ, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI,
SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU,
ZA, ZW.(84) Designated States (regional): ARIPO patent (GH, GM,
KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), Eurasian
patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), European
patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE,
IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI patent (BF, BJ, CF,
CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD,
TG).

(72) Inventors; and

(75) Inventors/Applicants (for US only): BLUMBERG,
Laura, Cook [US/US]; Pfizer Global Research and
Development, Eastern Point Road, Groton, CT 06340
(US). BROWN, Matthew, Frank [US/US]; Pfizer Global
Research and Development, Eastern Point Road, Groton,
CT 06340 (US). GLAUDE, Ronald, Paul [US/US]; Pfizer
Global Research and Development, Eastern Point Road,
Groton, CT 06340 (US). POSS, Christopher, StanleyPublished:
— without international search report and to be republished
upon receipt of that reportFor two-letter codes and other abbreviations, refer to the "Guid-
ance Notes on Codes and Abbreviations" appearing at the begin-
ning of each regular issue of the PCT Gazette.

WO 02/32901 A2

(54) Title: BRIDGED PIPERAZINE DERIVATIVES

(57) Abstract: A compound of the formula (I) or the pharmaceutically acceptable salt thereof; wherein a, c, d, k, l, m, w, X, Y, Z,
R¹, and R⁴ are as defined, and useful to treat inflammation and other immune disorders.

WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-1-

BRIDGED PIPERAZINE DERIVATIVESBackground of the Invention

The present invention relates to novel piperazine derivatives, methods of use and pharmaceutical compositions containing them.

5 The compounds of the invention are potent and selective inhibitors of chemokines binding to the receptor CCR1 found on inflammatory and immunomodulatory cells (preferably leukocytes and lymphocytes). The CCR1 receptor is also sometimes referred to as the CC-CKR1 receptor. These compounds also inhibit MIP-1 α (and the related chemokines shown to interact with CCR1 (e.g., RANTES, HCC-1, MCP-2 and MCP-3)) induced chemotaxis of THP-10 1 cells and human leukocytes and are potentially useful for the treatment or prevention of autoimmune diseases (such as rheumatoid arthritis, type I diabetes (recent onset), lupus, inflammatory bowel disease, optic neuritis, psoriasis, multiple sclerosis, polymyalgia rheumatica, uveitis, and vasculitis), acute and chronic inflammatory conditions (such as osteoarthritis, adult Respiratory Distress Syndrome, Respiratory Distress Syndrome of 15 infancy, ischemia reperfusion injury, glomerulonephritis, and chronic obstructive pulmonary disease (COPD)), allergic conditions (such as asthma and atopic dermatitis), inflammation associated with infection (such as viral inflammation (including influenza, hepatitis and Guillian-Barre), chronic bronchitis, tissue, cell and solid organ transplant rejection (including xeno transplantations) (chronic and acute), atherosclerosis, restenosis, HIV infectivity (co-receptor usage), and granulomatous diseases (including sarcoidosis, leprosy and tuberculosis) and sequelae associated with certain cancers such as multiple myeloma. Compounds in this series may also limit the production of cytokines at inflammatory sites, including but not limited to TNF and IL-1, as a consequence of decreasing cell infiltration, providing benefit for diseases linked to TNF and IL-1, including congestive heart failure, 25 pulmonary emphysema or dyspnea associated therewith, emphysema; HIV-1, HIV-2, HIV-3; cytomegalovirus (CMV), adenoviruses, Herpes viruses (*Herpes zoster* and *Herpes simplex*). They may also provide benefit for the sequelae associated with infection where such infection induces production of detrimental inflammatory cytokines such as TNF e.g, fungal meningitis, joint tissue damage, hyperplasia, pannus formation and bone resorption, psoriatic arthritis, 30 hepatic failure, bacterial meningitis, Kawasaki syndrome, myocardial infarction, acute liver failure, lyme disease, septic shock, cancer, trauma, and malaria, etc.

MIP-1 α and RANTES are soluble chemotactic peptides (chemokines) which are produced by inflammatory cells, in particular CD8+ lymphocytes, polymorphonuclear leukocytes (PMNs) and macrophages, *J.Biol. Chem.*, 270 (30) 29671-29675 (1995). These 35 chemokines act by inducing the migration and activation of key inflammatory and immunomodulatory cells. Elevated levels of chemokines have been found in the synovial fluid of rheumatoid arthritis patients, chronic and acute rejecting tissue from transplant patients and

WO 02/32901


PCT/IB01/01844

-2-

in the nasal secretions of allergic rhinitis patients following allergen exposure (Teran, *et al.*, *J. Immunol.*, 1806-1812 (1996), and Kuna *et al.*, *J. Allergy Clin. Immunol.* 321 (1994)). Antibodies which interfere with the chemokine/receptor interaction by neutralizing MIP1 α or gene disruption have provided direct evidence for the role of MIP-1 α and RANTES in disease by limiting the recruitment of monocytes and CD8+ lymphocytes (Smith *et al.*, *J. Immunol.*, 153, 4704 (1994) and Cook *et al.*, *Science*, 269, 1583 (1995)). Together this data demonstrates that CCR1 receptor antagonists would potentially be an effective treatment of several immune based diseases. The compounds described within are potent and selective antagonists of the CCR1 receptor.

Summary of the Invention

The present invention relates to a compound of the formula



or pharmaceutically acceptable salts and pro-drugs thereof; wherein

a is 1, 2, 3, 4 or 5;

c is 0 or 1;

d is 1, 2, 3, 4 or 5;

k is 0, 1, 2, 3 or 4; l is 0, 1, 2, 3 or 4; m is 0, 1, 2, 3, or 4; k, l and m cannot all be 0

and if m and/or k are not 0, then l must be 0;

W is CH or N;

X is C(O), C(S) or CH₂;

Y is CH₂;

Z is oxygen, NR⁹ or CR¹¹R¹²;

each R¹ is independently selected from hydrogen, hydroxy, hydroxysulfonyl, halo,

(C₁-C₆)alkyl, mercapto, mercapto(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)alkylthio, (C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₁-

C₆)alkylsulfonyl, (C₁-C₆)alkylthio(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-

C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)alkoxy, (C₆-C₁₀)aryloxy, halo(C₁-C₆)alkyl, trifluoromethyl,

formyl, formyl(C₁-C₆)alkyl, nitro, nitroso, cyano, (C₆-C₁₀)aryl(C₁-C₆)alkoxy, halo(C₁-C₆)alkoxy,

trifluoromethoxy, (C₃-C₇)cycloalkyl, (C₃-C₇)cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, hydroxy(C₃-C₇)cycloalkyl(C₁-

C₆)alkyl, (C₃-C₇)cycloalkylamino, (C₃-C₇)cycloalkylamino(C₁-C₆)alkyl, ((C₃-C₇)cycloalkyl)((C₁-

C₆)alkyl)amino, ((C₃-C₇)cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl)amino(C₁-C₆)alkyl, cyano(C₁-C₆)alkyl, (C₂-

C₇)alkenyl, (C₂-C₇)alkynyl, (C₆-C₁₀)aryl, (C₆-C₁₀)aryl(C₁-C₆)alkyl, (C₆-C₁₀)aryl(C₂-C₆)alkenyl,

hydroxy(C₁-C₆)alkyl, hydroxy(C₆-C₁₀)aryl(C₁-C₆)alkyl, hydroxy(C₁-C₆)alkylthio(C₁-C₆)alkyl,
hydroxy(C₂-C₆)alkenyl, hydroxy(C₂-C₆)alkynyl, (C₁-C₆)alkoxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)alkoxy(C₆-
C₁₀)aryl(C₁-C₆)alkyl, (C₆-C₁₀)aryloxy(C₁-C₆)alkyl, (C₆-C₁₀)aryl(C₁-C₆)alkoxy(C₁-C₆)alkyl, amino,
5 (C₁-C₆)alkylamino, ((C₁-C₆)alkyl)₂amino, (C₆-C₁₀)arylamino, (C₆-C₁₀)aryl(C₁-C₆)alkylamino,
amino(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)alkylamino(C₁-C₆)alkyl, ((C₁-C₆)alkyl)₂amino(C₁-C₆)alkyl,
hydroxy(C₁-C₆)alkylamino(C₁-C₆)alkyl, (C₆-C₁₀)arylamino(C₁-C₆)alkyl, (C₆-C₁₀)aryl (C₁-
C₆)alkylamino(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)alkylcarbonylamino, ((C₁-C₆)alkylcarbonyl)((C₁-
C₆)alkyl)amino, (C₁-C₆)alkylcarbonylamino(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)alkylcarbonyl((C₁-C₆)
C₆)alkyl)amino(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)alkoxycarbonylamino, (C₁-C₆)alkoxycarbonyl)(C₁-
10 C₆)alkylamino, (C₁-C₆)alkoxycarbonylamino(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)alkoxycarbonyl)((C₁-
C₆)alkyl)amino(C₁-C₆)alkyl, carboxy, (C₁-C₆)alkoxycarbonyl, (C₆-C₁₀)aryl(C₁-
C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)alkylcarbonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₆-
C₁₀)arylcabonyl, (C₆-C₁₀)arylcabonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₆-C₁₀)aryl(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₆-
C₁₀)aryl(C₁-C₆)alkylcarbonyl(C₁-C₆)alkyl, carboxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)alkoxycarbonyl(C₁-
15 C₆)alkyl, (C₆-C₁₀)aryl(C₁-C₆)alkylcarbonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)alkoxy(C₁-
C₆)alkylcarbonyloxy(C₁-C₆)alkyl, aminocarbonyl, (C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, ((C₁-
C₆)alkyl)₂aminocarbonyl, (C₆-C₁₀)arylamino carbonyl, (C₆-C₁₀)aryl(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl,
aminocarbonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)alkylaminocarbonyl(C₁-C₆)alkyl, ((C₁-
C₆)alkyl)₂aminocarbonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₆-C₁₀)arylamino carbonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-
20 C₆)alkylaminocarbonyl(C₁-C₆)alkyl, amidino, guanidino, ureido, (C₁-C₆)alkylureido, (C₁-
C₆)alkyl)₂ureido, ureido(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)alkylureido(C₁-C₆)alkyl, ((C₁-C₆)alkyl)₂ureido(C₁-
C₆)alkyl, (C₂-C₆)heterocyκλοalkyl, (C₂-C₆)heteroaryl, (C₂-C₆)heterocyκλοalkyl(C₁-C₆)alkyl and
(C₂-C₆)heteroaryl(C₁-C₆)alkyl;
 R^f is ($R^{(C_6)}$)(C₆-C₁₀)aryl, ($R^{(C_6)}$)(C₃-C₁₀)cycloalkyl, ($R^{(C_6)}$)(C₂-C₆)heteroaryl,
25 ($R^{(C_6)}$)(C₂-C₆)heterocyκλοalkyl,
wherein f is 0, 1, 2, 3, 4 or 5;
Q is (C₁-C₆)alkyl;
q is 0 or 1;
 R^g is independently selected from (C₂-C₆)heterocyκλοalkylcarbonyl,
30 (C₂-C₆)heteroarylcarbonyl, (C₂-C₆)heteroaryl(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₂-
C₆)heteroarylaminocarbonyl, (C₂-C₆)heterocyκλοalkyl(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₁-
C₆)alkylsulfonylaminocarbonyl, (C₁-C₆)alkylsulfonylamino(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl,
ureido(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₁-C₆)alkylureido(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, ((C₁-
C₆)alkyl)₂ureido(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, halo(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₁-
35 C₆)alkylcarbonylamino(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, hydroxy(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl,
aminosulfonyl(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, carboxy(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₁-

WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-4-

- (C_6) alkylaminosulfonyl((C_1-C_6) alkylaminocarbonyl, amino((C_1-C_6) alkylcarbonylamino, ((C_1-C_6) alkylamino((C_1-C_6) alkylcarbonylamino, carboxy((C_1-C_6) alkylcarbonylamino, carboxy((C_1-C_6) alkoxy carbonylamino, (((C_1-C_6) alkyl)₂amino((C_1-C_6) alkylcarbonylamino, acetylamino((C_1-C_6) alkylcarbonylamino, (acetyl)(((C_1-C_6) alkyl)amino((C_1-C_6) alkylcarbonylamino, ((C_1-C_6) alkylsulfonylamino((C_1-C_6) alkylcarbonylamino, cyanoguanidino((C_1-C_6) alkylcarbonylamino, ((C_1-C_6) alkylcyanoguanidino((C_1-C_6) alkylcarbonylamino, (((C_1-C_6) alkyl)₂cyanoguanidino((C_1-C_6) alkylcarbonylamino, aminocarbonyl((C_1-C_6) alkylcarbonylamino, aminocarbonylamino((C_1-C_6) alkylcarbonylamino, ((C_1-C_6) alkylaminocarbonylamino((C_1-C_6) alkylcarbonylamino, (((C_1-C_6) alkyl)₂aminocarbonylamino((C_1-C_6) alkylcarbonylamino, ((C_2-C_6) heterocycloalkyl((C_1-C_6) alkylcarbonylamino, aminosulfonyl((C_1-C_6) alkylcarbonylamino, hydroxy((C_1-C_6) alkylureido, amino((C_1-C_6) alkylureido, ((C_1-C_6) alkylamino((C_1-C_6) alkylureido, (((C_1-C_6) alkyl)₂amino((C_1-C_6) alkylureido, ((C_2-C_6) heterocycloalkyl((C_1-C_6) alkylureido, ((C_2-C_6) heteroarylureido, ((C_2-C_6) heteroaryl((C_1-C_6) alkylureido, ((C_1-C_6) alkylsulfonylureido, aminosulfonyl((C_1-C_6) alkylureido, aminocarbonyl((C_1-C_6) alkylureido, ((C_1-C_6) alkylaminocarbonyl((C_1-C_6) alkylureido, (((C_1-C_6) alkyl)₂aminocarbonyl((C_1-C_6) alkylureido, acetylamino((C_1-C_6) alkylureido, (acetyl)(((C_1-C_6) alkyl)amino((C_1-C_6) alkylureido, carboxy((C_1-C_6) alkylureido, halo((C_1-C_6) alkylsulfonylamino, amino((C_1-C_6) alkylsulfonylamino, ((C_1-C_6) alkylamino((C_1-C_6) alkylsulfonylamino, (((C_1-C_6) alkyl)₂amino((C_1-C_6) alkylsulfonylamino, acetylamino((C_1-C_6) alkylsulfonylamino, (acetyl)(((C_1-C_6) alkyl)amino((C_1-C_6) alkylsulfonylamino, ureido((C_1-C_6) alkylsulfonylamino, ((C_1-C_6) alkylureido((C_1-C_6) alkylsulfonylamino, (((C_1-C_6) alkyl)₂ureido((C_1-C_6) alkylsulfonylamino, ((C_1-C_6) alkylsulfonylamino((C_1-C_6) alkylsulfonylamino, cyanoguanidino((C_1-C_6) alkylsulfonylamino, carboxy((C_1-C_6) alkylsulfonylamino, ((C_1-C_6) alkylcyanoguanidino((C_1-C_6) alkylsulfonylamino, (((C_1-C_6) alkyl)₂cyanoguanidino((C_1-C_6) alkylsulfonylamino, aminocarbonyl((C_1-C_6) alkylsulfonylamino, ((C_1-C_6) alkoxy carbonylamino((C_1-C_6) alkylsulfonylamino, aminosulfonylaminocarbonyl, ((C_1-C_6) alkylaminosulfonylaminocarbonyl, (((C_1-C_6) alkyl)₂aminosulfonylaminocarbonyl, ((C_6-C_{10}) arylsulfonyl, ((C_1-C_6) alkylaminosulfonylamino, (((C_1-C_6) alkyl)₂aminosulfonylamino, aminocarbonyl((C_1-C_6) alkylamino((C_1-C_6) alkylsulfonylamino, ((C_2-C_6) heterocycloalkyloxycarbonylamino((C_1-C_6) alkylsulfonylamino, ((C_2-C_6) heteroarylloxycarbonylamino((C_1-C_6) alkylsulfonylamino, cyanoguanidino, ((C_1-C_6) alkylcyanoguanidino, (((C_1-C_6) alkyl)₂cyanoguanidino, ((C_2-C_6) heterocycloalkylcyanoguanidino, ((C_2-C_6) heterocycloalkyl((C_1-C_6) alkylcyanoguanidino, ((C_2-C_6) heteroaryl((C_1-C_6) alkylcyanoguanidino, amino((C_1-C_6) alkylcyanoguanidino, ((C_1-C_6) alkylamino((C_1-C_6) alkylcyanoguanidino, (((C_1-C_6) alkyl)₂amino((C_1-C_6) alkylcyanoguanidino, aminocarbonyl((C_1-C_6) alkylcyanoguanidino, carboxy((C_1-C_6) alkylcyanoguanidino, ((C_1-C_6) alkylaminocarbonyl((C_1-C_6) alkylcyanoguanidino, (((C_1-C_6) alkyl)₂aminocarbonyl((C_1-C_6) alkylcyanoguanidino,

WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-5-

- C_6 alkylcyanoguanidino, hydroxy(C_1-C_6)alkylamino, aminocarbonyl(C_1-C_6)alkylamino,
 carboxy(C_1-C_6)alkylamino, (C_1-C_6)alkylsulfonylamino(C_1-C_6)alkylamino, (C_1-C_6)alkoxycarbonylamino(C_1-C_6)alkylamino, aminosulfonyl(C_1-C_6)alkylamino, (C_2-C_6)heteroaryl(C_1-C_6)alkylamino, acetylamino(C_1-C_6)alkylamino, (acetyl)(C_1-C_6)alkylamino(C_1-C_6)alkylamino, (C_2-C_6)heterocycloalkyl(C_1-C_6)alkylamino, ((C_1-C_6)alkyl)₂amino(C_1-C_6)alkylamino, (C_1-C_6)alkylamino(C_1-C_6)alkylamino, (C_1-C_6)alkoxy(C_1-C_6)alkylamino, (C_1-C_6)alkoxycarbonyl(C_1-C_6)alkylamino, cyano(C_1-C_6)alkylamino, (C_2-C_6)heterocycloalkyloxycarbonylamino(C_1-C_6)alkylamino, (C_2-C_6)heteroaryloxycarbonylamino(C_1-C_6)alkylamino, cyanoguanidino(C_1-C_6)alkylamino, (C_1-C_6)alkylcyanoguanidino(C_1-C_6)alkylamino, ((C_1-C_6)alkyl)₂cyanoguanidino(C_1-C_6)alkylamino, ureido(C_1-C_6)alkylamino, (C_1-C_6)alkylureido(C_1-C_6)alkylamino, ((C_1-C_6)alkyl)₂ureido(C_1-C_6)alkylamino, aminocarbonyloxy(C_1-C_6)alkylamino, hydroxy(C_1-C_6)alkylcarbonylamino, (C_1-C_6)alkylaminocarbonyl(C_1-C_6)alkylcarbonylamino, ((C_1-C_6)alkyl)₂aminocarbonyl(C_1-C_6)alkylcarbonylamino, (C_1-C_6)alkoxycarbonylamino(C_1-C_6)alkylcarbonylamino, hydroxy(C_1-C_6)alkylamino(C_1-C_6)alkylcarbonylamino, aminosulfonyl(C_1-C_6)alkylcarbonylamino, hydroxy(C_1-C_6)alkylamino(C_1-C_6)alkylcarbonylamino, ((C_1-C_6)alkyl)₂amino(C_1-C_6)alkylamino(C_1-C_6)alkylcarbonylamino, (C_1-C_6)alkylamino(C_1-C_6)alkylamino(C_1-C_6)alkylcarbonylamino, amino(C_1-C_6)alkylamino(C_1-C_6)alkylcarbonylamino, (C_1-C_6)alkoxy(C_1-C_6)alkylamino(C_1-C_6)alkylcarbonylamino, (C_2-C_6)heterocycloalkyloxycarbonylamino, (C_2-C_6)heteroarylcarbonylamino(C_1-C_6)alkylcarbonylamino, (C_2-C_6)heteroarylcarbonylamino, (C_2-C_6)heterocycloalkylcarbonylamino, (C_2-C_6)heteroaryl(C_1-C_6)alkylcarbonylamino, (C_2-C_6)heterocycloalkyl(C_1-C_6)alkylcarbonylamino, (C_2-C_6)heterocycloalkylcarbonylamino(C_1-C_6)alkylcarbonylamino, cyano(C_1-C_6)alkylcarbonylamino, (C_1-C_6)alkylsulfonylamino(C_1-C_6)alkylaminocarbonylamino, (C_1-C_6)alkoxycarbonylamino(C_1-C_6)alkylaminocarbonylamino, (C_2-C_6)heterocycloalkyloxycarbonylamino(C_1-C_6)alkylaminocarbonylamino, (C_2-C_6)heteroaryloxycarbonylamino(C_1-C_6)alkylaminocarbonylamino, ureido(C_1-C_6)alkylureido, (C_1-C_6)alkylureido(C_1-C_6)alkylureido, ((C_1-C_6)alkyl)₂ureido(C_1-C_6)alkylureido, cyanoguanidino(C_1-C_6)alkylureido, (C_2-C_6)heteroaryl(cyanoguanidino), aminosulfonyl, amino(C_1-C_6)alkylsulfonyl, (C_1-C_6)alkylamino(C_1-C_6)alkylsulfonyl, ((C_1-C_6)alkyl)₂amino(C_1-C_6)alkylsulfonyl, (C_1-C_6)alkylaminosulfonyl, ((C_1-C_6)alkyl)₂aminosulfonyl, (C_2-C_6)heterocycloalkylsulfonyl, amino(C_1-C_6)alkylaminosulfonyl, (C_1-C_6)alkylamino(C_1-C_6)alkylaminosulfonyl, ((C_1-C_6)alkyl)₂amino(C_1-C_6)alkylaminosulfonyl, (C_2-C_6)heteroarylaminosulfonyl, hydroxy(C_1-C_6)alkylaminosulfonyl, (C_1-C_6)alkoxy(C_1-C_6)alkylaminosulfonyl, ureido(C_1-C_6)alkylaminosulfonyl, (C_1-C_6)alkylureido(C_1-C_6)alkylaminosulfonyl, ((C_1-C_6)alkyl)₂ureido(C_1-C_6)alkylaminosulfonyl, (C_1-C_6)alkylsulfonylamino(C_1-C_6)alkylaminosulfonyl, (C_1-C_6)alkoxycarbonylamino(C_1-C_6)alkylaminosulfonyl,

C₈)alkylaminosulfonyl, (C₂-C₉)heterocycloalkyloxycarbonylamino(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl,
(C₂-C₉)heteroaryloxy carbonylamino(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl, aminocarbonyl(C₁-
C₆)alkylaminosulfonyl, cyanoguanidino(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl, (C₂-
C₉)heteroarylaminosulfonyl, (C₂-C₉)heteroaryl(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl, (C₂-
C₉)heterocycloalkylaminosulfonyl, (C₁-C₆)alkylcarbonylaminosulfonyl, halo(C₁-
C₆)alkylcarbonylaminosulfonyl, (C₁-C₆)alkoxy carbonylaminosulfonyl, ureidosulfonyl, (C₁-
C₆)alkylureidosulfonyl, ((C₁-C₆)alkyl)₂ureidosulfonyl, hydrogen, hydroxy, hydroxysulfonyl, halo,
mercapto, (C₁-C₆)alkylalkylthio, (C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₁-C₆)alkylsulfonfyl, carboxy(C₁-
C₆)alkylsulfonyl, (C₆-C₁₀)aryl sulfonyl, (C₂-C₉)heteroarylsulfonyl, (C₁-C₆)alkoxy, hydroxy(C₁-
C₆)alkoxy, (C₆-C₁₀)aryl oxy, trifluoro(C₁-C₆)alkyl, formyl, nitro, nitroso, cyano, halo(C₁-
C₆)alkoxy, trifluoro(C₁-C₆)alkoxy, amino(C₁-C₆)alkoxy, (C₃-C₁₀)cycloalkylhydroxy(C₃-
C₁₀)cycloalkyl (C₃-C₁₀)cycloalkylamino(C₂-C₉)alkenyl, (C₂-C₉)alkenyl, (C₆-C₁₀)aryl, (C₆-
C₁₀)aryl(C₂-C₉)alkenyl, hydroxy(C₆-C₁₀)aryl, ((C₁-C₆)alkylamino)(C₆-C₁₀)aryl, hydroxy(C₁-
C₆)alkylthio, hydroxy(C₂-C₉)alkenyl, hydroxy(C₂-C₉)alkynyl, (C₁-C₆)alkoxy(C₆-C₁₀)aryl, (C₆-
C₁₀)aryl(C₁-C₆)alkoxy, amino, (C₁-C₆)alkylamino, ((C₁-C₆)alkyl)amino, (C₆-C₁₀)aryl amino, (C₆-
C₁₀)aryl(C₁-C₆)alkylamino, amino(C₁-C₆)alkylamino, (C₂-C₉)heterocycloalkylamino, (C₂-
C₉)heteroaryl amino, (C₂-C₉)heteroaryl(C₁-C₆)alkylamino, , (C₂-C₉)heterocycloalkyl(C₁-
C₆)alkylamino, (C₃-C₁₀)cycloalkyl(C₁-C₆)alkylamino, (C₁-C₆)alkylcarbonylamino, (C₁-
C₆)alkoxycarbonylamino, (C₂-C₉)alkenylcarbonylamino, (C₃-C₁₀)cycloalkylcarbonylamino, (C₆-
C₁₀)arylcarbonylamino, (C₂-C₉)heterocycloalkylcarbonylamino, (C₂-
C₉)heteroaryloxy carbonylamino, (C₂-C₉)heterocycloalkoxy carbonylamino, halo(C₁-
C₆)alkylcarbonylamino, (C₁-C₆)alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonylamino, (C₁-C₆)alkoxy carbonyl(C₁-
C₆)alkylcarbonylamino, ((C₁-C₆)alkylcarbonyl)((C₁-C₆)alkyl)amino, ((C₁-
C₆)alkoxy carbonyl)((C₁-C₆)alkyl)amino, (C₁-C₆)alkylsulfonylamino, ((C₁-C₆)alkylcarbonyl)((C₁-
C₆)alkyl)amino, (C₃-C₁₀)cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl)amino, ((C₁-C₆)alkylsulfonyl)((C₁-
C₆)alkyl)amino, (C₂-C₉)heteroarylsulfonylamino, (C₆-C₁₀)arylsulfonylamino, ((C₆-
C₁₀)arylsulfonyl)((C₁-C₆)alkyl)amino, carboxy, (C₁-C₆)alkoxycarbonyl, (C₆-C₁₀)aryl(C₁-
C₆)alkoxycarbonyl, (C₁-C₆)alkylcarbonyl, carboxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, amino(C₁-
C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)alkylamino(C₁-C₆)alkylcarbonyl, ((C₁-C₆)alkyl)amino(C₁-
C₆)alkylcarbonyl, (C₆-C₁₀)arylcabonyl, (C₂-C₉)heteroaryl(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₆-C₁₀)aryl(C₁-
C₆)alkylcarbonyl, hydroxy(C₁-C₆)alkoxycarbonyl, (C₁-C₆)alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyloxy, ((C₁-
C₆)alkyl)amino carbonyloxyaminocarbonyl, hydroxyaminocarbonyl, (C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, ((C₁-C₆)alkyl)amino carbonyl, (C₆-C₁₀)arylamino carbonyl, (C₆-
C₁₀)aryl(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (aminocarbonyl(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, ((C₁-
C₆)alkylaminocarbonyl(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (carboxy(C₁-C₆)alkyl)aminocarbonyl, ((C₁-
C₆)alkoxy carbonyl(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (amino(C₁-C₆)alkyl)aminocarbonyl, (hydroxy(C₁-
C₆)alkyl)aminocarbonyl, (hydroxy(C₁-C₆)alkyl)aminocarbonyl, (hydroxy(C₁-C₆)alkyl)aminocarbonyl,

WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-7-

C_6 alkylaminocarbonylamidino, hydroxyamidino, guanidino, ureido, (C_1-C_6) alkylureido, (C_6-C_{10}) arylureido, $((C_6-C_{10})aryl)_2$ ureido, $(C_6-C_{10})aryl(C_1-C_6)alkylureido$, halo $(C_1-C_6)alkylureido$, $((C_1-C_6)alkyl)((C_6-C_{10})aryl)ureido$, $((C_1-C_6)alkyl)_2$ ureido, halo $(C_1-C_6)alkylcarbonylureido$, halo $(C_1-C_6)alkyl((C_1-C_6)alkyl)ureido$, $((C_1-C_6)alkoxycarbonyl(C_1-C_6)alkyl)ureido$, glycinamido, $(C_1-C_6)alkylglycinamido$, aminocarbonylglycinamido, $(C_1-C_6)alkoxy(C_1-C_6)alkylcarbonylglycinamido$, (aminocarbonyl) $((C_1-C_6)alkyl)glycinamido$, $((C_1-C_6)alkoxycarbonyl(C_1-C_6)alkylcarbonyl)((C_1-C_6)alkyl)glycinamido$, $((C_1-C_6)alkoxycarbonylamino(C_1-C_6)alkylcarbonyl)glycinamido$, $(C_6-C_{10})arylcarbonylglycinamido$, $((C_6-C_{10})arylcarbonyl)((C_1-C_6)alkyl)glycinamido$, $((C_6-C_{10})aryl(C_1-C_6)alkylaminocarbonyl)glycinamido$, $(C_6-C_{10})aryl((C_1-C_6)alkylaminocarbonyl)((C_1-C_6)alkyl)glycinamido$, $(C_6-C_{10})arylaminocarbonylglycinamido$, $((C_6-C_{10})arylaminocarbonyl)((C_1-C_6)alkyl)glycinamido$, alaninamido, $(C_1-C_6)alkylalaninamido$, $(C_2-C_9)heteroaryl$, amino $(C_2-C_9)heteroaryl$, $(C_1-C_6)alkylamino(C_2-C_9)heteroaryl$, $((C_1-C_6)alkyl)_2$ amino $(C_2-C_9)heteroaryl$, $(C_2-C_9)heteroaryl$, $(C_2-C_9)heterocycloalkyl$, carboxy $(C_1-C_6)alkoxy$, $(C_1-C_6)alkylsulfonylaminocarbonyl(C_1-C_6)alkoxy$, $(C_1-C_6)alkylsulfonylamino(C_1-C_6)alkoxy$, $(C_2-C_9)heteroaryl(C_1-C_6)alkoxy$, carboxy $(C_1-C_6)alkylamino(C_2-C_9)alkoxy$, amino $(C_2-C_9)alkoxy$, (aminocarbonyl)(hydroxy)amino, $(C_1-C_6)alkylamino(C_2-C_9)alkoxy$, $((C_1-C_6)alkyl)_2$ amino $(C_2-C_9)alkoxy$, $(C_1-C_6)alkylcarbonylamino(C_2-C_9)alkoxy$, aminocarbonylamino $(C_2-C_9)alkoxy$, $(C_1-C_6)alkylaminocarbonylamino(C_2-C_9)alkoxy$, $((C_1-C_6)alkyl)_2$ aminocarbonylamino $(C_2-C_9)alkoxy$, amino $(C_2-C_9)alkoxycarbonylamino$, $(C_1-C_6)alkylamino(C_2-C_9)alkoxycarbonylamino$, $((C_1-C_6)alkyl)_2$ amino $(C_2-C_9)alkoxycarbonylamino$, $(C_2-C_9)heteroarylamino(C_2-C_9)alkoxy$, barbituryl, $(C_1-C_6)alkylcarbonylamino(C_1-C_6)alkylaminocarbonyl$, amino $(C_1-C_6)alkylcarbonylamino$ where the $(C_1-C_6)alkyl$ is optionally substituted with one or two groups selected from but not limited to hydrogen, amino, hydroxyl, $(C_1-C_6)alkoxy$, carboxy, further substituted $(C_2-C_9)heteroaryl$, $(C_6-C_{10})aryl$, $(C_2-C_9)heterocycloalkyl$, and cycloalkyl, or the two groups together make up a carbocycle; and R^{18} carbonylamino where R^{18} is a nitrogen containing $(C_2-C_9)heterocycloalkyl$ which is optionally substituted further with one or two groups selected from but not limited to $(C_1-C_6)alkyl$, $(C_2-C_9)alkoxy$ and hydroxy;

R^8 is selected from the group consisting of hydrogen, $(C_1-C_6)alkyl$, $(C_6-C_{10})aryl$, $(C_6-C_{10})aryl(C_1-C_6)alkyl$, $(C_1-C_6)alkylcarbonyl$, $(C_1-C_6)alkylcarbonyl(C_1-C_6)alkyl$, $(C_6-C_{10})aryl(C_1-C_6)alkylcarbonyl$, $(C_6-C_{10})aryl(C_1-C_6)alkylcarbonyl(C_1-C_6)alkyl$, aminocarbonyl, $(C_1-C_6)alkylaminocarbonyl$, $((C_1-C_6)alkyl)_2$ aminocarbonyl and $(C_1-C_6)alkoxycarbonyl$;

R^{11} and R^{12} are each independently selected from the group consisting of hydrogen, $(C_1-C_6)alkyl$, $(C_6-C_{10})aryl$, $(C_6-C_{10})aryl(C_1-C_6)alkyl$, hydroxy, $(C_1-C_6)alkoxy$, hydroxy $(C_1-C_6)alkyl$, $(C_1-C_6)alkoxy(C_1-C_6)alkyl$, amino, $(C_1-C_6)alkylamino$, $((C_1-C_6)alkyl)_2$ amino, $(C_1-C_6)alkylcarbonylamino$, $(C_3-C_6)cycloalkylcarbonylamino$, $(C_3-C_6)cycloalkyl(C_1-$

WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-8-

C_6 alkylcarbonylamino, (C_1-C_6) alkoxycarbonylamino, (C_1-C_6) alkylsulfonylamino, (C_6-C_{10}) arylcarbonylamino, (C_1-C_6) alkoxycarbonyl (C_1-C_6) alkylcarbonylamino, (C_6-C_{10}) aryl (C_1-C_6) alkylcarbonylamino, $((C_6-C_{10})$ aryl (C_1-C_6) alkylcarbonyl) (C_1-C_6) alkylamino, (C_1-C_6) alkylcarbonylamino (C_1-C_6) alkyl, (C_3-C_6) cycloalkylcarbonylamino (C_1-C_6) alkyl, (C_1-C_6) alkoxycarbonylamino (C_1-C_6) alkyl, (C_2-C_6) heterocycloalkylcarbonylamino (C_1-C_6) alkyl, (C_6-C_{10}) aryl (C_1-C_6) alkylcarbonylamino (C_1-C_6) alkyl, (C_2-C_6) heteroarylcarbonylamino (C_1-C_6) alkyl, (C_6-C_{10}) arylsulfonylamino, (C_1-C_6) alkylsulfonylamino (C_1-C_6) alkyl, aminocarbonylamino, (C_1-C_6) alkylaminocarbonylamino, halo (C_1-C_6) alkylaminocarbonylamino, $((C_1-C_6)$ alkyl) $_2$ aminocarbonylamino, aminocarbonylamino (C_1-C_6) alkyl, (C_1-C_6) alkylaminocarbonylamino (C_1-C_6) alkyl, $((C_1-C_6)$ alkyl) $_2$ aminocarbonylamino (C_1-C_6) alkyl, halo (C_1-C_6) alkylaminocarbonylamino (C_1-C_6) alkyl, amino (C_1-C_6) alkyl, (C_1-C_6) alkylamino (C_1-C_6) alkyl, $((C_1-C_6)$ alkyl) $_2$ amino (C_1-C_6) alkyl, carboxy (C_1-C_6) alkyl, (C_1-C_6) alkoxycarbonyl (C_1-C_6) alkyl, aminocarbonyl (C_1-C_6) alkyl and (C_1-C_6) alkylaminocarbonyl (C_1-C_6) alkyl.

Preferred compounds of formula I include those wherein R^1 is hydrogen, halo, cyano, nitro, trifluoromethyl, trifluoromethoxy, (C_1-C_6) alkyl, hydroxy or (C_1-C_6) alkylcarbonyloxy.

Other preferred compounds of formula I include those wherein c is 1; X is C(O); d is 1; and Z is oxygen.

Other preferred compounds of formula I include those wherein c is 1; X is C(O); d is 1; and Z is NR^8 wherein R^8 is hydrogen or (C_1-C_6) alkyl.

Other preferred compounds of formula I include those wherein c is 1; X is CH_2 ; d is 1; and Z is oxygen.

Other preferred compounds of formula I include those wherein c is 1; X is CH_2 ; d is 1; and Z is NR^8 wherein R^8 is hydrogen or (C_1-C_6) alkyl.

Other preferred compounds of formula I include those wherein c is 1; X is C(O); d is 1; and Z is $CR^{11}R^{12}$.

Other preferred compounds of formula I include those wherein c is 1; X is CH_2 ; d is 1; and Z is $CR^{11}R^{12}$.

Other preferred compounds of formula I include those wherein R^4 is $(R^5)_f(C_6-C_{10})$ aryl or $(R^5)_f(C_2-C_6)$ heteroaryl wherein f is 1 or 2.

Other preferred compounds of formula I include those wherein c is 1; X is C(O); d is 1; Z is oxygen, l and m are zero, k is 2, and W is CH.

Other preferred compounds of formula I include those wherein c is 1; X is C(O); d is 1; Z is oxygen, l and m are zero, k is 2, and W is nitrogen.

Other preferred compounds of formula I include those wherein c is 1; X is C(O); d is 1; Z is oxygen, l and m are zero, k is 3, and W is CH.

WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-9-

Other preferred compounds of formula I include those wherein c is 1; X is C(O); d is 1; Z is oxygen, l and m are zero, k is 3, and W is nitrogen.

Other preferred compounds of formula I include those wherein c is 1; X is C(O); d is 1; Z is NR⁹ wherein R⁹ is hydrogen or (C₁-C₆)alkyl, l and m are zero, k is 2, and W is CH.

5 Other preferred compounds of formula I include those wherein c is 1; X is C(O); d is 1; Z is NR⁹ wherein R⁹ is hydrogen or (C₁-C₆)alkyl, l and m are zero, k is 2, and W is nitrogen.

Other preferred compounds of formula I include those wherein c is 1; X is C(O); d is 1; Z is NR⁹ wherein R⁹ is hydrogen or (C₁-C₆)alkyl, l and m are zero, k is 3, and W is CH.

Other preferred compounds of formula I include those wherein c is 1; X is C(O); d is 1; Z is NR⁹ wherein R⁹ is hydrogen or (C₁-C₆)alkyl, l and m are zero, k is 3, and W is nitrogen.

10 Other preferred compounds of formula I include those wherein c is 1; X is C(O); d is 1; Z is oxygen, k and l are zero, m is 2, and W is CH.

Other preferred compounds of formula I include those wherein c is 1; X is C(O); d is 1; Z is oxygen, k and l are zero, m is 2, and W is nitrogen.

15 Other preferred compounds of formula I include those wherein c is 1; X is C(O); d is 1; Z is oxygen, k and l are zero, m is 3, and W is CH.

Other preferred compounds of formula I include those wherein c is 1; X is C(O); d is 1; Z is oxygen, k and l are zero, m is 3, and W is nitrogen.

20 Other preferred compounds of formula I include those wherein c is 1; X is C(O); d is 1; Z is NR⁹ wherein R⁹ is hydrogen or (C₁-C₆)alkyl, k and l are zero, m is 2, and W is CH.

Other preferred compounds of formula I include those wherein c is 1; X is C(O); d is 1; Z is NR⁹ wherein R⁹ is hydrogen or (C₁-C₆)alkyl, k and l are zero, m is 2, and W is nitrogen.

Other preferred compounds of formula I include those wherein c is 1; X is C(O); d is 1; Z is NR⁹ wherein R⁹ is hydrogen or (C₁-C₆)alkyl, k and l are zero, m is 3, and W is CH.

25 Other preferred compounds of formula I include those wherein c is 1; X is C(O); d is 1; Z is NR⁹ wherein R⁹ is hydrogen or (C₁-C₆)alkyl, k and l are zero, m is 3, and W is nitrogen.

Other preferred compounds of formula I include those wherein R⁴ is phenyl, q is 0 or 1, Q is (C₁-C₆)alkyl, and at least one R⁵ is selected from the following list of functional groups:

30 (C₂-C₆)heteroarylaminocarbonyl, (C₂-C₆)heteroarylcarbonylamino, (C₁-C₆)alkylsulfonylaminocarbonyl, aminosulfonylaminocarbonyl, carboxy(C₁-C₆)alkylcyanoguanidino, carboxy, (C₂-C₆)heteroarylamino, (C₂-C₆)heteroarylsulfonyl, (C₂-C₆)heteroaryl (C₂-C₆)heteroaryloxy, (C₂-C₆)heteroarylcarbonyl, (C₂-C₆)heteroaryl(C₁-C₆)alkylcarbonyl, carboxy(C₁-C₆)alkylaminocarbonylamino, (C₂-C₆)heteroarylaminocarbonylamino, carboxy(C₁-C₆)alkylcarbonylamino, (C₂-C₆)heteroaryl(C₁-C₆)alkylamino, carboxy(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, carboxy(C₁-C₆)alkylsulfonylamino, (C₂-C₆)heteroarylaminosulfonyl, carboxy(C₁-C₆)alkylsulfonyl, carboxy(C₁-C₆)alkylamino,

Other preferred compounds of formula I include those wherein R^4 is phenyl, q is 0 or 1, q is (C_1-C_6) alkyl, and at least one R^5 is selected from the following list of functional groups:

amino(C_1-C_6)alkylcarbonyl, (C_1-C_6)alkylamino(C_1-C_6)alkylcarbonyl, $((C_1-C_6)alkyl)_2amino$ (C_1-C_6)alkylcarbonyl, amino(C_1-C_6)alkylcarbonyl, amino(C_1-C_6)alkylcarbonylamino, (C_1-C_6)alkylamino(C_1-C_6)alkylcarbonylamino, $((C_1-C_6)alkyl)_2amino$ (C_1-C_6)alkylcarbonylamino, amino(C_1-C_6)alkylureido, (C_1-C_6)alkylamino(C_1-C_6)alkylureido, $((C_1-C_6)alkyl)_2amino$ (C_1-C_6)alkylureido, amino(C_1-C_6)alkylsulfonylamino, (C_1-C_6)alkylamino(C_1-C_6)alkylsulfonylamino, $((C_1-C_6)alkyl)_2amino$ (C_1-C_6)alkylsulfonylamino, amino(C_1-C_6)alkylsulfonyl, (C_1-C_6)alkylamino(C_1-C_6)alkylsulfonyl, $((C_1-C_6)alkyl)_2amino$ (C_1-C_6)alkylsulfonyl, amino(C_1-C_6)alkylcyanoguanidino, (C_1-C_6)alkylamino(C_1-C_6)alkylcyanoguanidino, $((C_1-C_6)alkyl)_2amino$ (C_1-C_6)alkylcyanoguanidino, amino(C_1-C_6)alkylaminosulfonyl, (C_1-C_6)alkylamino(C_1-C_6)alkylaminosulfonyl, $((C_1-C_6)alkyl)_2amino$ (C_1-C_6)alkylaminosulfonyl, (C_1-C_6)alkylamino(C_6-C_{10})aryl(C_1-C_6)alkyl, amino, amino(C_1-C_6)alkoxy, amino(C_1-C_6)alkoxycarbonylamino, (C_1-C_6)alkylamino, $((C_1-C_6)alkyl)_2amino$, (C_6-C_{10})arylamino, (C_6-C_{10})aryl(C_1-C_6)alkylamino, amino(C_1-C_6)alkylamino, (C_2-C_6)heterocycloalkylamino, (C_2-C_6)heteroarylamino, (C_3-C_{10})cycloalkyl(C_1-C_6)alkylamino, (amino(C_1-C_6)alkyl)aminocarbonyl, glycnamido, (C_1-C_6)alkylglycnamido, alaninamido, (C_1-C_6)alkylalaninamido, $((C_1-C_6)alkyl)_2$ amino(C_1-C_6)alkylcarbonylamino,

Other preferred compounds of formula I include those wherein R⁴ is phenyl, q is 0 or
25 1, Q is (C₁-C₆)alkyl, and at least one R⁵ is selected from the following list of functional groups:
aminocarbonyl(C₁-C₆)alkylureido, (C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)alkylsulfonylamino, (C₁-
C₆)alkylsulfonylamino(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, aminosulfonyl, aminocarbonyl, ureido(C₁-
C₆)alkylaminocarbonyl, aminocarbonyl(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, aminocarbonyl(C₁-
C₆)alkylcarbonylamino, ureido(C₁-C₆)alkylcarbonylamino, (C₁-C₆)alkylcarbonylamino(C₁-
30 C₆)alkylcarbonylamino, (C₁-C₆)alkylcarbonylamino(C₁-C₆)alkylamino carbonylamino,
ureido(C₁-C₆)alkylcarbonylamino, ureido, halo(C₁-C₆)alkylsulfonylamino, (C₁-
C₆)alkylcarbonylamino(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl.

Other preferred compounds of formula I include those wherein R⁴ is pyridyl, q is 0 or 1, Q is (C₁-C₆)alkyl, and at least one R⁵ is selected from the following list of functional groups: (C₂-C₆)heteroarylaminocarbonyl, (C₂-C₆)heteroarylcarbonylamino, (C₁-C₆)alkyl/sulfonylaminocarbonyl, aminosulfonylaminocarbonyl, carboxy(C₁-

10 Other preferred compounds of formula I include those wherein R⁴ is pyridyl, q is 0 or 1, Q is (C₁-C₆)alkyl, and at least one R⁵ is selected from the following list of functional groups: amino(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)alkylamino(C₁-C₆)alkylcarbonyl, ((C₁-C₆)alkyl)₂amino(C₁-C₆)alkylcarbonyl, amino(C₁-C₆)alkylcarbonylamino, (C₁-C₆)alkylamino(C₁-C₆)alkylcarbonylamino, ((C₁-C₆)alkyl)₂amino(C₁-C₆)alkylcarbonylamino, amino(C₁-C₆)alkylureido, (C₁-C₆)alkylamino(C₁-C₆)alkylureido, ((C₁-C₆)alkyl)₂amino(C₁-C₆)alkylureido, amino(C₁-C₆)alkylalkylsulfonamino, (C₁-C₆)alkylamino(C₁-C₆)alkylsulfonamino, ((C₁-C₆)alkyl)₂amino(C₁-C₆)alkylsulfonamino, amino(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₁-C₆)alkylamino(C₁-C₆)alkylsulfonyl, ((C₁-C₆)alkyl)₂amino(C₁-C₆)alkylsulfonyl, amino(C₁-C₆)alkylcyanoguanidino, (C₁-C₆)alkylamino(C₁-C₆)alkylcyanoguanidino, ((C₁-C₆)alkyl)₂amino(C₁-C₆)alkylcyanoguanidino, amino(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl, (C₁-C₆)alkylamino(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl, ((C₁-C₆)alkyl)₂amino(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl, (C₁-C₆)alkylamino(C₁-C₆)alkylamino, amino(C₁-C₆)alkoxy, amino(C₁-C₆)alkoxycarbonylamino, (C₁-C₆)alkylamino, ((C₁-C₆)alkyl)₂amino, (C₆-C₁₀)aryl, (C₆-C₁₀)aryl(C₁-C₆)alkylamino, amino(C₁-C₆)alkylamino, (C₂-C₆)heterocycloalkylamino, (C₂-C₆)heteroaryl, (C₃-C₁₀)cycloalkyl(C₁-C₆)alkylamino, (amino(C₁-C₆)alkyl)aminocarbonyl, glycynamido, (C₁-C₆)alkylglycynamido, alaninamido, (C₁-C₆)alkylalaninamido, ((C₁-C₆)alkyl)₂ amino(C₁-C₆)alkylcarbonylamino.

[illegible]

WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-12-

C₆alkylcarbonylamino(C₁-C₆)alkylaminocarbonylamino, ureido(C₁-C₆)alkylcarbonylamino, ureido, halo(C₁-C₆)alkylsulfonfylamino, (C₁-C₆)alkylcarbonylamino(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl.

The present invention also relates to the pharmaceutically acceptable acid addition salts of compounds of the formula I. The acids which are used to prepare the pharmaceutically acceptable acid addition salts of the aforementioned base compounds of this invention are those which form non-toxic acid addition salts, i.e., salts containing pharmacologically acceptable anions, such as the hydrochloride, hydrobromide, hydroiodide, nitrate, sulfate, bisulfate, phosphate, acid phosphate, acetate, lactate, citrate, acid citrate, tartrate, bitartrate, succinate, maleate, fumarate, gluconate, saccharate, benzoate, methanesulfonate, ethanesulfonate, benzenesulfonate, p-toluenesulfonate and pamoate [i.e., 1,1'-methylene-bis-(2-hydroxy-3-naphthoate)]salts.

The invention also relates to base addition salts of formula I. The chemical bases that may be used as reagents to prepare pharmaceutically acceptable base salts of those compounds of formula I that are acidic in nature are those that form non-toxic base salts with such compounds. Such non-toxic base salts include, but are not limited to those derived from such pharmacologically acceptable cations such as alkali metal cations (e.g., potassium and sodium) and alkaline earth metal cations (e.g., calcium and magnesium), ammonium or water-soluble amine addition salts such as N-methylglucamine-(meglumine), and the lower alkanolammonium and other base salts of pharmaceutically acceptable organic amines. Also included are pharmaceutically acceptable salts of basic compounds including hydrochloride, hydrobromide, hydroiodide, nitrate, sulfate, bisulfate, phosphate, acid phosphate, acetate, lactate, citrate, acid citrate, tartrate, bitartrate, succinate, maleate, fumarate, gluconate, saccharate, benzoate, methanesulfonate, ethanesulfonate, benzenesulfonate, p-toluenesulfonate and pamoate [i.e., 1,1'-methylene-bis-(2-hydroxy-3-naphthoate)].

The compounds of this invention may contain olefin-like double bonds. When such bonds are present, the compounds of the invention exist as cis and trans configurations and as mixtures thereof.

Unless otherwise indicated, the alkyl, alkenyl and alkynyl groups referred to herein, as well as the alkyl moieties of other groups referred to herein (e.g., alkoxy), may be linear or branched, and they may also be cyclic (e.g., cyclopropyl, cyclobutyl, cyclopentyl, cyclohexyl or cycloheptyl) or be linear or branched and contain cyclic moieties. Unless otherwise indicated, halogen includes fluorine, chlorine, bromine, and iodine.

(C₃-C₁₀)Cycloalkyl when used herein refers to cycloalkyl groups containing zero to two levels of unsaturation such as cyclopropyl, cyclobutyl, cyclopentyl, cyclopentenyl, cyclohexyl, cyclohexenyl, 1,3-cyclohexadiene, cycloheptyl, cycloheptenyl, bicyclo[3.2.1]octane, norbornanyl etc.

WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-13-

(C₂-C₈)Heterocycloalkyl when used herein refers to, including but not limited to, pyrrolidinyl, tetrahydrofuranyl, dihydrofuranyl, tetrahydropyranyl, pyranyl, thiopyranyl, aziridinyl, oxiranyl, methylenedioxy, chromenyl, barbituryl, isoxazolidinyl, 1,3-oxazolidin-3-yl, isothiazolidinyl, 1,3-thiazolidin-3-yl, 1,2-pyrazolidin-2-yl, 1,3-pyrazolidin-1-yl, piperidinyl, thiomorpholinyl, 1,2-tetrahydrothiazin-2-yl, 1,3-tetrahydrothiazin-3-yl, tetrahydrothiadiazinyl, morpholinyl, 1,2-tetrahydrodiazin-2-yl, 1,3-tetrahydrodiazin-1-yl, tetrahydroazepinyl, piperazinyl, chromanyl, etc, wherein the heterocycloalkyl group is optionally substituted by a group, including but not limited to, (C₁-C₈)alkyl, (C₁-C₈)alkoxy, halo, trifluoromethyl, trifluoromethoxy, or (C₁-C₈)alkylamino.


10 (C₂-C₈)Heteroaryl when used herein refers to, including but not limited to, furyl, thienyl, thiazolyl, pyrazolyl, isothiazolyl, oxazolyl, isoxazolyl, pyrrolyl, triazolyl, tetrazolyl, imidazolyl, 1,3,5-oxadiazolyl, 1,2,4-oxadiazolyl, 1,2,3-oxadiazolyl, 1,3,5-thiadiazolyl, 1,2,3-thiadiazolyl, 1,2,4-thiadiazolyl, pyridyl, pyrimidyl, pyrazinyl, pyridazinyl, 1,2,4-triazinyl, 1,2,3-triazinyl, 1,3,5-triazinyl, pyrazolo[3,4-b]pyridinyl, cinnolinyl, pteridinyl, purinyl, 6,7-dihydro-5H-[1]pyrindinyl, benzo[b]thiophenyl, 5, 6, 7, 8-tetrahydro-quinolin-3-yl, benzoxazolyl, benzothiazolyl, benzisothiazolyl, benzisoxazolyl, benzimidazolyl, thianaphthenyl, isothianaphthenyl, benzofuranyl, isobenzofuranyl, isoindolyl, indolyl, indolizyl, indazolyl, isoquinolyl, quinolyl, quinolonyl, phthalazinyl, quinoxalinyl, quinazolinyl, benzoxazinyl; etc, wherein the heteroaryl group is optionally substituted by a group, including but not limited to, (C₁-C₈)alkyl, (C₁-C₈)alkoxy, halo, trifluoromethyl, trifluoromethoxy, or (C₁-C₈)alkylamino.

Aryl when used herein refers to phenyl or naphthyl.


The term "ureido", as used herein, refers to an "amino-carbonyl-amino" moiety.

The term "acetyl", as used herein, refers to an "alkyl-carbonyl" moiety wherein alkyl is defined as above.

25 The term "cyanoguanidino", as used herein, refers to a functional group having the following formula:



The term "(C₂-C₈)heterocycloalkyl(C=N-CN)amino", as used herein refers to a functional group having the following formula:



30

WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-14-

wherein "HET" refers to a (C₂-C₉)heterocyloalkyl or (C₂-C₉)heteroaryl group wherein the nitrogen of said group is the place of attachment.

The term "barbituryl", as used herein refers to a functional group having the following formula



5

The term "mercapto", as used herein, refers to a "HS-" moiety.

The term "alkoxy" refers to a radical of the formula OR_a where R_a is an alkyl radical as define above, e.g., methoxy, ethoxyl.

The term "carboxy" refers to a radical of the formula -COOH.

10

The term "glycinamido" refers to a radical of the formul -NH-C(O)-CH₂-NH₂.

The term "cyano" refers to a radical of the formula -CN.

The term "nitro" refers to a radical of the formula -NO₂.

The term "nitroso" refers to a radical of the formula -NO.

The term "amidino" refers to a radical of the formula -C(NH)-NH₂.

15

The term "sulfonyl" refers to a radical of the formula -SO₂-.

The term "sulfinyl" refers to a radical of the formula -S(O)-.

The term "thio" refers to a radical of the formula -S-.

The term "oxo" refers to a radical of the formula =O.

The term "formyl" refers to a radical of the formula -CHO.

20

The term "guanidino" refers to a radical of the formula -N(H)-C(NH)-NH₂.

The term "alaninamido" refers to a radical of the formul -NH-C(O)-CH(CH₃)-NH₂.

The compounds of this invention include all conformational isomers (e.g., cis and trans isomers) and all optical isomers of compounds of the formula I (e.g., enantiomers and diastereomers), as well as racemic, diastereomeric and other mixtures of such isomers.

25

Compounds containing isotopic substitutions of atoms, such as deuterium substitution of hydrogen, are also included in the scope of the present invention.

The present invention also relates to a pharmaceutical composition for treating or preventing autoimmune diseases (such as rheumatoid arthritis, type I diabetes (recent onset), lupus, inflammatory bowel disease, optic neuritis, psoriasis, multiple sclerosis, polymyalgia rheumatica, uveitis, and vasculitis), acute and chronic inflammatory conditions (such as osteoarthritis, adult Respiratory Distress Syndrome, Respiratory Distress Syndrome of infancy, ischemia reperfusion injury, glomerulonephritis, and chronic obstructive pulmonary disease (COPD)), allergic conditions (such as asthma and atopic dermatitis), inflammation

30

WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-15-

associated with infection (such as viral inflammation (including influenza, hepatitis and Guillian-Barre), chronic bronchitis, tissue, cell, and chronic & acute solid organ transplant rejection (including xeno-transplantation), atherosclerosis, restenosis, HIV infectivity (co-receptor usage), and granulomatous diseases (including sarcoidosis, leprosy and tuberculosis) and sequelae associated with certain cancers such as multiple myeloma, comprising an amount of a compound of the formula I, a pharmaceutically acceptable salt or pro-drug thereof effective in treating or preventing such disorder or condition and a pharmaceutically acceptable carrier.

The compositions of the present invention may also limit the production of cytokines at inflammatory sites, including but not limited to TNF and IL-1, as a consequence of decreasing cell infiltration, providing benefit for diseases linked to TNF and IL-1 including congestive heart failure, pulmonary emphysema or dyspnea associated therewith, emphysema; HIV-1, HIV-2, HIV-3; cytomegalovirus (CMV), adenoviruses, Herpes viruses (*Herpes zoster* and *Herpes simplex*). They may also provide benefit for the sequelae associated with infection where such infection induces production of detrimental inflammatory cytokines such as TNF, e.g. fungal meningitis, joint tissue damage, hyperplasia, pannus formation and bone resorption, psoriatic arthritis, hepatic failure, bacterial meningitis, Kawasaki syndrome, myocardial infarction, acute liver failure, Lyme disease, septic shock, cancer, trauma, and malaria, etc. The present invention also relates to a pharmaceutical composition for treating or preventing a disorder or condition that can be treated or prevented by inhibiting chemokine binding to the receptor CCR1 in a mammal, preferably a human, comprising an amount of a compound of the formula I, a pharmaceutically acceptable salt or pro-drug thereof, effective in treating or preventing such disorder or condition and a pharmaceutically acceptable carrier. Examples of such disorders and conditions are those enumerated in the preceding paragraph.

The present invention also relates to a method for treating or preventing a disorder or condition selected from autoimmune diseases (such as rheumatoid arthritis, type I diabetes (recent onset), lupus, inflammatory bowel disease, optic neuritis, psoriasis, multiple sclerosis, polymyalgia rheumatica, uveitis, and vasculitis), acute and chronic inflammatory conditions (such as osteoarthritis, adult Respiratory Distress Syndrome, Respiratory Distress Syndrome of infancy, ischemia reperfusion injury, glomerulonephritis, and chronic obstructive pulmonary disease (COPD)), allergic conditions (such as asthma and atopic dermatitis), inflammation associated with infection (such as viral inflammation (including influenza, hepatitis and Guillian-Barre), chronic bronchitis, tissue, cell, and chronic and acute solid organ transplant rejection (including xeno-transplantation), atherosclerosis, restenosis, HIV infectivity (co-receptor usage), and granulomatous diseases (including sarcoidosis, leprosy and

WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-16-

- tuberculosis) and sequelae associated with certain cancers such as multiple myeloma, comprising administering to a mammal in need of such treatment or prevention an amount of a compound of the formula I, or a pharmaceutically acceptable salt thereof, that is effective in treating or preventing such disorder or condition, including limiting the production of cytokines
- 5 at inflammatory sites, including but not limited to TNF and IL-1, as a consequence of decreasing cell infiltration, thereof providing benefit for diseases linked to TNF and IL-1 including congestive heart failure, pulmonary emphysema or dyspnea associated therewith, emphysema; HIV-1, HIV-2, HIV-3; cytomegalovirus (CMV), adenoviruses, Herpes viruses (*Herpes zoster* and *Herpes simplex*). They may also provide benefit for the sequelae
- 10 associated with infection where such infection induces production of detrimental inflammatory cytokines such as TNF e.g. fungal meningitis, joint tissue damage, hyperplasia, pannus formation and bone resorption, psoriatic arthritis, hepatic failure, bacterial meningitis, Kawasaki syndrome, myocardial infarction, acute liver failure, lyme disease, septic shock, cancer, trauma, and malaria, etc. The present invention also relates to a method for treating or
- 15 preventing a disorder or condition that can be treated or prevented by antagonizing the CCR1 receptor in a mammal, preferably a human, comprising administering to a mammal in need of such treatment or prevention an amount of a compound of the formula I, a pharmaceutically acceptable salt or pro-drug thereof, that is effective in treating or preventing such disorder or condition.
- 20 The present invention also relates to a pharmaceutical composition for treating or preventing a disorder or condition selected from autoimmune diseases (such as rheumatoid arthritis, type I diabetes (recent onset), lupus, inflammatory bowel disease, optic neuritis, psoriasis, multiple sclerosis, polymyalgia rheumatica, uveitis, and vasculitis), acute and chronic inflammatory conditions (such as osteoarthritis, adult Respiratory Distress Syndrome,
- 25 Respiratory Distress Syndrome of infancy, ischemia reperfusion injury, glomerulonephritis, and chronic obstructive pulmonary disease (COPD)), allergic conditions (such as asthma and atopic dermatitis), inflammation associated with infection (such as viral inflammation (including influenza, hepatitis and Guillian-Barre), chronic bronchitis, tissue, cell, and solid organ transplant rejection (including xeno-transplantation), atherosclerosis, restenosis, HIV infectivity (co-receptor usage), and granulomatous diseases (including sarcoidosis, leprosy
- 30 and tuberculosis) and sequelae associated with certain cancers such as multiple myeloma, in a mammal, preferably a human, comprising a CCR1 receptor antagonizing effective amount of a compound of the formula I, or a pharmaceutically acceptable salt thereof, and a pharmaceutically acceptable carrier. Also included are using the pharmaceutical compositions
- 35 to limit the production of cytokines at inflammatory sites, including but not limited to TNF and IL-1, as a consequence of decreasing cell infiltration, providing benefit for diseases linked to

WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-17-

TNF and IL-1, including congestive heart failure, pulmonary emphysema or dyspnea associated therewith, emphysema; HIV-1, HIV-2, HIV-3; cytomegalovirus (CMV), adenoviruses, Herpes viruses (*Herpes zoster* and *Herpes simplex*). They may also provide benefit for the sequelae associated with infection where such infection induces production of detrimental inflammatory cytokines such as TNF e.g, fungal meningitis, joint tissue damage, , hyperplasia, pannus formation and bone resorption, psoriatic arthritis, hepatic failure, bacterial meningitis, Kawasaki syndrome, myocardial infarction, acute liver failure, Lyme disease; septic shock, cancer, trauma, and malaria, etc. The present invention also relates to a pharmaceutical composition for treating or preventing a disorder or condition that can be treated or prevented by antagonizing the CCR1 receptor in a mammal, preferably a human, comprising a CCR1 receptor antagonizing effective amount of a compound of the formula I, a pharmaceutically acceptable salt or pro-drug thereof, and a pharmaceutically acceptable carrier.

The present invention also relates to a method for treating or preventing a disorder or condition selected from autoimmune diseases (such as rheumatoid arthritis, type I diabetes (recent onset), lupus, inflammatory bowel disease, optic neuritis, psoriasis, multiple sclerosis, polymyalgia rheumatica, uveitis, and vasculitis), acute and chronic inflammatory conditions (such as osteoarthritis, adult Respiratory Distress Syndrome, Respiratory Distress Syndrome of infancy, ischemia reperfusion injury, glomerulonephritis, and chronic obstructive pulmonary disease (COPD)), allergic conditions (such as asthma and atopic dermatitis), inflammation associated with infection (such as viral inflammation (including influenza, hepatitis and Guillian-Barre), chronic bronchitis, tissue, cell, and solid organ transplant rejection (including xeno-transplantation) (chronic and acute), atherosclerosis, restenosis, HIV infectivity (co-receptor usage), and granulomatous diseases (including sarcoidosis, leprosy and tuberculosis) and sequelae associated with certain cancers such as multiple myeloma, The method of treatment of the present inventions also includes limiting the production of cytokines at inflammatory sites, including but not limited to TNF and IL-1, as a consequence of decreasing cell infiltration, providing benefit for diseases limited to TNF and IL-1 including congestive heart failure, pulmonary emphysema or dyspnea associated therewith, emphysema; HIV-1, HIV-2, HIV-3; cytomegalovirus (CMV), adenoviruses, Herpes viruses (*Herpes zoster* and *Herpes simplex*). They may also provide benefit for the sequelae associated with infection where such infection induces production of detrimental inflammatory cytokines such as TNF e.g, fungal meningitis, joint tissue damage, hyperplasia, pannus formation and bone resorption, psoriatic arthritis, hepatic failure, bacterial meningitis, Kawasaki syndrome, myocardial infarction, acute liver failure, Lyme disease, septic shock, cancer, trauma, and malaria, etc., in a mammal, preferably a human, comprising administering to a mammal in need of such treatment or prevention a CCR1 receptor

WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-18-

antagonizing effective amount of a compound of formula I, a pharmaceutically acceptable salt or pro-drug thereof.

Detailed Description of the Invention

5 The following reaction Schemes illustrate the preparation of the compounds of the present invention. Unless otherwise indicated a, c, d, f, k, l, m, W, X, Y, Z, R¹, and R⁴ in the reaction Schemes and the discussion that follow are defined as above.

R¹⁶ refers to an amino radical that can be unsubstituted, monosubstituted, disubstituted, cyclic or acyclic.


10 The reactions in Preparation D and Schemes 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 are described in commonly assigned co-pending provisional application serial no. 60/193789, filed March 31, 2000, the disclosure of which is incorporated herein by reference thereto.

WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-19-

PREPARATION A




WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-20-

PREPARATION A (CONTINUED)




WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-21-

PREPARATION B




WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-22-

PREPARATION C




WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-23-

PREPARATION D




WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-24-


PREPARATION E



WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-25-


PREPARATION F

WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-26-

SCHEME 1




WO 02/32901

PCT/IB01/01844


-27-

SCHEME 2




-28-

SCHEME 3



-29-

SCHEME 4




WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-30-

SCHEME 5




WO 02/32901

PCT/IB01/01844


-31-

SCHEME 6



-32-

SCHEME 7



WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-33-

In reaction 1 of Preparation A, the compound of formula II, wherein k is 1, 2, 3, or 4, is treated with a base, such as sodium hydride, and an electrophile, such as an optionally substituted benzyl bromide, in the presence of an aprotic solvent, such as tetrahydrofuran. The reaction mixture is stirred at ambient temperature for a time period between about 1 hour to about 12 hours, preferably about 10 hours. The resulting lactam is then converted to the corresponding compound of formula III by reacting with triethyloxonium tetrafluoroborate, in the presence of an aprotic solvent, such as dichloromethane. The reaction mixture is stirred at ambient temperature for a time period between about 1 hour to about 12 hours, preferably about 10 hours.

10 In reaction 2 of Preparation A the compound of formula III wherein k is 1, 2, 3, or 4, is converted to the corresponding compound of formula IV, by condensing III with nitromethane in the presence of a base, such as triethylamine, in the presence of an aprotic solvent, such as dichloromethane. The reaction mixture is stirred at ambient temperature for a time period between about 1 hour to about 16 hours, preferably about 10 hours.

15 In reaction 3 of Preparation A, the compound of formula IV wherein k is 1, 2, 3, or 4, is converted to the corresponding compound of formula V, wherein k is 1, 2, 3, or 4, and W is nitrogen, by first treating IV with a catalyst, such as palladium on carbon, in the presence of a protic solvent, such as methanol. The reaction mixture is shaken under a positive pressure of hydrogen gas for a time period between about 4 hours and about 16 hours, preferably about 12 hours. The resulting amino ester is then treated with a base, such as sodium methoxide, in an anhydrous protic solvent, such as methanol. The reaction mixture is stirred at ambient temperature for a time period between about 4 hours and about 16 hours, preferably about 10 hours.

20 In reaction 4 of Preparation A, the compound of formula V, wherein k is 1, 2, 3, or 4, and W is nitrogen, is converted to the corresponding compound of formula VII, wherein m is 1, 2, 3, or 4, k and l are 0, and W is nitrogen, by reducing V with a reducing agent, such as lithium aluminum hydride. The reaction is refluxed for a time period between about 2 hours and about 12 hours, preferably about 10 hours.

25 In reaction 5 of Preparation A, the compound of formula V, wherein k is 1, 2, 3, or 4, and W is nitrogen is converted to the corresponding compound of formula VI wherein k is 1, 2, 3, or 4, and W is nitrogen, by reacting V with an acylating agent, such as di-tert-butyl-dicarbonate, in the presence of a catalyst, such as 20% palladium hydroxide on carbon, and a protic solvent, such as methanol. The reaction is shaken under a positive pressure of hydrogen at a temperature between about ambient temperature and about 80 °C, preferably about 60 °C, for a time period between about 3 hours and about 13 hours, preferably about 10 hours.

WO 02/32901


PCT/IB01/01844

-34-

In reaction 6 of Preparation A, the compound of formula VI, wherein k is 1, 2, 3, or 4, and W is nitrogen, is first reacted with an alkylating agent, such as an optionally substituted benzyl bromide, in the presence of a base, such as sodium hydride, and an aprotic solvent, such as tetrahydrofuran. The reaction is stirred for a time period between about 2 hours and about 12 hours, preferably about 10 hours. The resulting carbamate is then deprotected by treatment with an acid, such as trifluoroacetic acid, in the presence of an aprotic solvent, such as dichloromethane. The reaction is stirred at ambient temperature for a time period between about 1 hour and about 4 hours, preferably about 2 hours. The resulting amide is converted to the corresponding compound of formula VII, wherein k is 1, 2, 3, or 4, m and l are 0 and W is nitrogen, by reducing with a reducing agent, such as lithium aluminum hydride, in the presence of an aprotic solvent, such as tetrahydrofuran. The reaction is refluxed for a time period between about 2 hours and about 12 hours, preferably about 10 hours.

In reaction 1 of Preparation B, the compound of formula VIII, wherein k is 1, 2, 3, or 4, is converted to the corresponding compound of formula IX by reacting with an amine, such as benzyl amine, and 3-oxo-pentanedioic acid in the presence of an acid such as 0.25 M aqueous hydrochloric acid. The reaction is stirred at ambient temperature for a period of time between about 30 minutes to about 2 hours, preferably 1.5 hours, and then heated to 50 °C for a period of time between about 1 hour and about 4 hours, preferably 2 hours.

In reaction 2 of Preparation B the compound of formula IX, where l is 1, 2, 3, or 4, is converted to the corresponding compound of formula VII, wherein k is 1, 2, 3, or 4, l and m are 0 and W is CH, by first reacting with a phosphonium ylide of the formula



The reaction is refluxed for a period of time between about 4 hours and about 16 hours, preferably about 10 hours. The resulting olefin is then reduced by shaking under a positive pressure of hydrogen gas in the presence of a catalyst, such as 20% palladium hydroxide on carbon in the presence of a protic solvent, such as ethanol.

In reaction 1 Preparation C the compound of formula X wherein l is 1, 2, 3, or 4, is converted to the corresponding compound of formula XI by first reacting with sodium azide in the presence of a protic solvent such as ethanol. The reaction is refluxed for a period of time between about 3 hours and about 12 hours, preferably about 10 hours. The resulting diazide is then reduced in the presence of platinum oxide and a polar solvent such as ethanol. The reaction is shaken under a positive pressure of hydrogen for a period of time between about 3 hours and about 12 hours, preferably about 10 hours.


WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-35-

In reaction 2 of Preparation C the compound of formula XI, wherein I is 1,2, 3, or 4, is converted to the corresponding compound of formula XII by first treating compound XI with a base, such as sodium methoxide, in the presence of a protic solvent such as methanol. The reaction is refluxed for a period of time between about 3 hours and about 12 hours, preferably about 10 hours. The resulting piperazine-dione is converted to the corresponding compound of the formula XII by treating with a reducing agent, such as lithium aluminum hydride, in an aprotic solvent, such as tetrahydrofuran. The reaction is refluxed for a period of time between about 3 hours and about 12 hours, preferably about 10 hours.

In reaction 3 of Preparation C the compound of the formula XII, wherein I is 1,2, 3, or 4, is converted to the corresponding compound of formula VII, wherein I is 1,2, 3, or 4, k and m are 0, and W is nitrogen, by reacting with an optionally substituted benzaldehyde compound of the formula



in the presence of a base, such as triethylamine, and a reducing agent, such as sodium triacetoxyborohydride, in an aprotic solvent, such as 1,2-dichloroethane. The reaction mixture is stirred at ambient temperature for a time period between about 1 hour to about 12 hours, preferably about 10 hours.

In reaction 1 of the Preparation D, the compound of formula XIII is converted to the corresponding compound of formula XV by reacting XIII with an appropriate amine of the formula, HR^{16} in the presence of a polar aprotic solvent, such as methylene chloride. The reaction mixture is stirred, at ambient temperature, for a time period between about 1 hour to about 24 hours, preferably about 12 hours.

In reaction 2 of Preparation D, the compound of formula XV is converted to the corresponding compound of formula XVII by reacting XV with thiophenol in the presence of a base, such as sodium hydride, and a polar aprotic solvent, such as dimethylformamide. The reaction is heated to reflux for a time period between about 1 hour to about 10 hours, preferably about 4 hours.

In reaction 3 of Preparation D, the compound of formula XIII is converted to the corresponding compound of formula XIV by reacting XIII with sodium cyanate in the presence of pyridine and a polar aprotic solvent, such as acetonitrile. The reaction is stirred, at ambient temperature, for a time period between about 2 hours to about 18 hours, preferably about 10 hours. An appropriate amine of the formula HR^{16} , is then added and the reaction mixture so

WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-36-

formed is stirred, at ambient temperature, for a time period between about 2 hours to about 24 hours, preferably about 8 hours.

In reaction 4 of Preparation D, the compound of formula XIV is converted to the corresponding compound of formula XVI according to the procedure described above in reaction 2 of Preparation D.

In reaction 1 of Preparation E the compound of formula XXXI wherein k is 1, 2, 3, or 4, is treated with an anhydride, such as acetic anhydride. The reaction mixture is heated to 70 °C for a time period between 8 and 15 hours, preferably about 12 hours. The resulting mixture is then concentrated and the anhydride is treated with an optionally substituted benzyl amine in the presence of an aprotic solvent such as toluene. The reaction mixture is stirred at ambient temperature for a time period between 1 and 16 hours, preferably about 10 hours, and then treated with an anhydride, such as acetic anhydride, and heated to reflux for a time period between 1 and 20 hours, preferably about 16 hours.

In reaction 2 of Preparation E the compound of formula XXXII, wherein k is 1, 2, 3, or 4, is converted to the corresponding compound of formula VII, wherein k is 1, 2, 3, or 4, l and m are 0, and W is nitrogen, by first treating XXXII with a catalyst, such as palladium on carbon, in the presence of a hydrogen source, such as cyclohexadiene, and a protic solvent, such as ethanol. The reaction mixture is stirred at ambient temperature for a time period between 1 hour and 4 hours, preferably about 1.5 hours. The resulting compound is then treated with a reducing agent, such as Red-Al in an aprotic solvent such as toluene. The reaction is heated to 60 °C for time period between 2 hours and 6 hours, preferably about 4 hours.

In reaction 1 of Preparation F the compound of formula XXXVI is converted to the corresponding compound of the formula XXXVII by treating with a reducing agent, such as lithium aluminum hydride, in an aprotic solvent, such as tetrahydrofuran. The reaction mixture is heated to reflux for a time period between 1 hour and 6 hours, preferably about 2 hours.

In reaction 2 of Preparation F the compound of formula XXXVII is converted to the corresponding compound of the formula XXXVIII by first treating with an activating agent such as sulfonyl chloride, in the presence of an aprotic solvent, such as chloroform. The reaction is heated to reflux, for a time period between about 1 hour to about 10 hours, preferably about 3 hours. The resulting alkyl chloride is then treated with a cyanide source, such as potassium cyanide, in the presence of an aprotic solvent, such as acetonitrile. The reaction mixture is stirred at ambient temperature for a time period between about 1 hour to about 10 hours, preferably about 3 hours.

In reaction 3 of Preparation F the compound of formula XXXVIII is converted to the compound of formula XXXIX, wherein j is 1, by first treating the cyanide with base, such as


WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-37-

potassium hydroxide in water. The reaction mixture is heated to reflux for a time period between about 1 hour to about 10 hours, preferably about 6 hours. The resulting methyl ether is deprotected by treatment with acid, such as 47% aqueous hydrogen bromide. The reaction mixture is heated to reflux for a time period between about 10 hours to about 30 hours, preferably about 24 hours. The deprotected phenol acid is finally converted to the corresponding compound of formula XXXIX, wherein j is 1, by refluxing in ethanol in the presence of an acid, such as sulfuric acid, for a time period between about 8 hours to about 16 hours, preferably about 12 hours.

In reaction 4 of Preparation F the compound of formula XXXVI is converted to the corresponding compound of formula XXXIX, where in j is 2 or 3, by first treating the ester with a reducing agent, such as diisobutylaluminum hydride, in the presence of an aprotic solvent, such as toluene. The resulting aldehyde is treated with a phosphonium ylide derived from the phosphonium salt of the formula



wherein g is 1 or 2, in the presence of an aprotic solvent, such as tetrahydrofuran. The reaction is refluxed for a time period between about 4 hours to about 16 hours, preferably about 10 hours. The resulting olefin is then reduced by shaking under a positive pressure of hydrogen in the presence of a catalyst, such as 20% palladium hydroxide on carbon, in the presence of a protic solvent such as ethanol. The methyl ether is deprotected according to the procedure described for reaction 2 of Scheme D.

In reaction 1 of Scheme 1, the compound of formula VII is converted to the corresponding compound of formula XVIII by reacting VII with a compound of the formula, A-(X)_d-(Y)_d-A, wherein A is chloro or bromo, in the presence of a base, such as triethylamine, and a polar aprotic solvent, such as methylene chloride. The reaction is stirred at a temperature between about -10°C to about 10°C, for a time period between about 15 minutes to about 90 minutes, preferably about 30 minutes.

In reaction 2 of Scheme 1, the compound of formula XVIII is converted to the corresponding compound of formula I by reacting XVIII with a compound of the formula, H-(Z)-R^d wherein d Z is oxygen, which is either commercially available or is prepared as in Preparations D and F, in the presence of potassium carbonate, potassium iodide and an aprotic solvent, such as butanone. The reaction is heated to reflux for a time period between about 4 hours to about 8 hours, preferably about 6 hours.

In reaction 1 of Scheme 2, the compound of formula VII is converted to the corresponding compound of formula I by reacting VII with a compound of the formula, A-(X)_d-

WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-38-

(Y)_a-(Z)-R⁴, wherein A is chloro or bromo, in the presence of a base, such as triethylamine, and a polar aprotic solvent, such as methylene chloride. The reaction is stirred at a temperature between about -10°C to about 10°C, for a time period between about 15 minutes to about 90 minutes, preferably about 30 minutes.

5 In reaction 1 of Scheme 3, the compound of formula VII is converted to the corresponding compound of formula XIX according to the procedure described above in reaction 2 of Scheme 1.

10 In reaction 2 of Scheme 3, the compound of formula XIX is converted to the corresponding compound of formula XX by reacting XIX with lithium hydroxide monohydrate in the presence of methanol, tetrahydrofuran and water. The reaction mixture is stirred overnight at ambient temperature.

15 In reaction 3 of Scheme 3, the compound of formula XX is converted to the corresponding amide or acylsulfonamide of formula I, by reacting XX with an appropriate amine or sulfonamide in the presence of 4-dimethylaminopyridine, 1-(3-dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide and a polar aprotic solvent, such as methylene chloride. The resulting reaction mixture is stirred overnight at ambient temperature.

In reaction 1 of Scheme 4, the compound of formula VII is converted to the corresponding compound of formula XXII according to the procedure described above in reaction 2 of Scheme 1.

20 In reaction 2 of Scheme 4, the compound of formula XXII is converted to the corresponding compound of formula XXIII by hydrogenating XXII in the presence of a catalyst, such as platinum on carbon, and a polar protic solvent, such as ethanol. The reaction is carried out under a pressure between about 30 psi to about 40 psi, preferably about 35 psi, for a time period between about 15 minutes to about 1 hour, preferably 30 minutes.

25 In reaction 3 of Scheme 4, for urea formation, the compound of formula XXIII is converted to the corresponding urea of formula I, by first reacting XXIII with 4-nitrophenyl chloroformate in the presence of a base, such as pyridine, and a polar aprotic solvent, such as methylene chloride, followed by reacting the intermediate so formed with an appropriate amine. The reaction mixture, so formed, is allowed to stir overnight at ambient temperature. 30 The compound of formula XXIII is reacted with an appropriate sulfonyl chloride to form the sulfonamides of formula I, in the presence of a base, such as triethylamine, and a polar aprotic solvent, such as methylene chloride. The reaction is stirred overnight at ambient temperature. For cyanoguanidine formation, the compound of formula I is first treated with 35 sodium hydride in an aprotic solvent, such as tetrahydrofuran, followed by reacting, the intermediate so formed with dimethyl-N-cyanodithio iminocarbonate. The resulting reaction

WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-39-

mixture is heated to reflux overnight. The N-cyano-S-methyl-isothiourea intermediate is then reacted with an appropriate amine in the presence of a polar protic solvent, such as methanol, to form the cyanoguanidine of formula I. For amide formation, the compound of formula XXIII is reacted with an acid, such as 3-tert-butoxycarbonylaminopropionic acid in the presence of N-methylmorpholine, O-benzotriazole-1-yl-N,N,N', N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate and a polar aprotic solvent, such as methylene chloride, to form the amide of formula I. For secondary amine formation the compound of formula XXIII is reacted with an appropriate aldehyde to form the amine of formula I according to the procedure described above in reaction 1 of Preparation B.

10 In reaction 1 of Scheme 5, the compound of formula VII is converted to the corresponding compound of formula XXV, wherein n is 0, 1, 2, 3 or 4, according to the procedure described above in reaction 2 of Scheme 1.

In reaction 2 of Scheme 5, the compound of formula XXV is converted to the corresponding amine of formula I by reacting XXV with an appropriate amine in the presence of a 10:1 ratio solution of dichloroethane/acetic acid. The reaction mixture is stirred, at ambient temperature, for a time period between about 30 minutes to about 2 hours, preferably about 1 hour. A reducing agent, such as sodium cyanoborohydride is then added to the mixture and the reaction is allowed to stir overnight at ambient temperature. If the amine thus formed is secondary, the compound of formula I may further be reacted according to the procedure described above in reaction 3 of Scheme 4, to provide ureas, sulfonamides, cyanoguanidinos, or amides.

20 In reaction 1 of Scheme 6, the acid compound of formula XX is converted to the corresponding compound of formula XXIX by treating XX with thionyl chloride neat or in an aprotic solvent, at ambient temperature, for a time period between about 1 hour to about 24 hours, preferably 1 hour. The acid chloride so formed is dissolved in a polar aprotic solvent with a compound of the formula, $(\text{H}_3\text{CO})(\text{H}_3\text{C})\text{NH}\cdot\text{HCl}$, in the presence of an amine base, such as triethylamine. The reaction mixture is stirred, at ambient temperature, for a time period between about 1 hour to about 48 hours, preferably about 12 hours.

30 In reaction 2 of Scheme 6, the amide compound of formula XXIX is converted to the corresponding compound of formula I by reacting XXIX with a $(\text{C}_2\text{-C}_6)$ heteroaryl lithium reagent in the presence of a polar aprotic solvent at a temperature between about -100°C to ambient temperature, preferably about -78°C . The resulting reaction mixture is stirred for a time period between about 1 hour to about 24 hours, preferably about 12 hours, at a temperature between about -78°C to about 50°C , preferably about 20°C .

WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-40-

In reaction 1 of Scheme 7, the compound of formula VII is converted to the corresponding compound of formula XXXIII, wherein j is 1, 2, or 3, according to the procedure described above in reaction 2 of Scheme 1.

In reaction 2 of Scheme 7, the compound of formula XXXIII, wherein j is 1, 2, or 3, is converted to the corresponding compound of formula XXXIV, wherein j is 1, 2, or 3, according to the procedure described above in reaction 2 of Scheme 3.

In reaction 3 of Scheme 7 the compound of formula XXXIV, wherein j is 1, 2, or 3, is converted to the corresponding amide or acylsulfonamide of the formula I, wherein j is 1, 2, or 3, by treating with an appropriate amine or sulfonamide according to the procedure described above in reaction 3 of Scheme 3. The compound of formula XXXIV, wherein j is 1, 2, or 3, is converted to the corresponding compound of formula I according to the procedures described above for Scheme 6.

Unless indicated otherwise, the pressure of each of the above reactions is not critical. Generally, the reactions will be conducted at a pressure of about one to about three atmospheres, preferably at ambient pressure (about one atmosphere).

The compounds of the formula I which are basic in nature are capable of forming a wide variety of different salts with various inorganic and organic acids. Although such salts must be pharmaceutically acceptable for administration to animals, it is often desirable in practice to initially isolate a compound of the formula I from the reaction mixture as a pharmaceutically unacceptable salt and then simply convert the latter back to the free base compound by treatment with an alkaline reagent, and subsequently convert the free base to a pharmaceutically acceptable acid addition salt. The acid addition salts of the base compounds of this invention are readily prepared by treating the base compound with a substantially equivalent amount of the chosen mineral or organic acid in an aqueous solvent medium or in a suitable organic solvent such as methanol or ethanol. Upon careful evaporation of the solvent, a solid salt is obtained.

The acids which are used to prepare the pharmaceutically acceptable acid addition salts of the base compounds of this invention are those which form non-toxic acid addition salts, i.e., salts containing pharmacologically acceptable anions, such as hydrochloride, hydrobromide, hydroiodide, nitrate, sulfate or bisulfate, phosphate or acid phosphate, acetate, lactate, citrate or acid citrate, tartrate or bitartrate, succinate, maleate, fumarate, gluconate, saccharate, benzoate, methanesulfonate and pamoate [i.e., 1,1'-methylene-bis-(2-hydroxy-3-naphthoate)] salts.

Those compounds of the formula I which are also acidic in nature, are capable of forming base salts with various pharmacologically acceptable cations. Examples of such salts include the alkali metal or alkaline-earth metal salts and particularly, the sodium and

potassium salts. These salts are all prepared by conventional techniques. The chemical bases which are used as reagents to prepare the pharmaceutically acceptable base salts of this invention are those which form non-toxic base salts with the herein described acidic compounds of formula I. These non-toxic base salts include those derived from such pharmacologically acceptable cations as sodium, potassium, calcium and magnesium, etc. These salts can easily be prepared by treating the corresponding acidic compounds with an aqueous solution containing the desired pharmacologically acceptable cations, and then evaporating the resulting solution to dryness, preferably under reduced pressure. Alternatively, they may also be prepared by mixing lower alkanolic solutions of the acidic compounds and the desired alkali metal alkoxide together, and then evaporating the resulting solution to dryness in the same manner as before. In either case, stoichiometric quantities of reagents are preferably employed in order to ensure completeness of reaction and maximum product yields.

Compounds of the formula I and their pharmaceutically acceptable salts (hereinafter also referred to, collectively, as "the active compounds") are potent antagonists of the CCR1 receptor. The active compounds are useful in the treatment or prevention of autoimmune diseases (such as rheumatoid arthritis, type I diabetes (recent onset), lupus, inflammatory bowel disease, optic neuritis, psoriasis, multiple sclerosis, polymyalgia rheumatica, uveitis, and vasculitis), acute and chronic inflammatory conditions (such as osteoarthritis, adult Respiratory Distress Syndrome, Respiratory Distress Syndrome of infancy, ischemia reperfusion injury, glomerulonephritis, and chronic obstructive pulmonary disease (COPD)), allergic conditions (such as asthma and atopic dermatitis), inflammation associated with infection (such as viral inflammation (including influenza, hepatitis and Guillian-Barre), chronic bronchitis, chronic and acute tissue, cell, and solid organ transplant rejection (including xenotransplantation), atherosclerosis, restenosis, HIV infectivity (co-receptor usage), and granulomatous diseases (including sarcoidosis, leprosy and tuberculosis) and sequelae associated with certain cancers such as multiple myeloma. Compounds in this series may also limit the production of cytokines at inflammatory sites, including but not limited to TNF and IL-1, as a consequence of decreasing cell infiltration, providing benefit for diseases linked to TNF and IL-1 including congestive heart failure, pulmonary emphysema or dyspnea associated therewith, emphysema; HIV-1, HIV-2, HIV-3; cytomegalovirus (CMV), adenoviruses, Herpes viruses (*Herpes zoster* and *Herpes simplex*). They may also provide benefit for the sequelae associated with infection where such infection induces production of detrimental inflammatory cytokines such as TNF e.g. fungal meningitis, joint tissue damage, hyperplasia, pannus formation and bone resorption, psoriatic arthritis, hepatic failure, bacterial

WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-42-

meningitis, Kawasaki syndrome, myocardial infarction, acute liver failure, lyme disease, septic shock, cancer, trauma, and malaria, etc.

The activity of the compounds of the invention can be assessed according to procedures known to those of ordinary skill in the art. Examples of recognized methods for determining CCR1 induced migration can be found in Coligan, J. E., Kruisbeek, A.M., Margulies, D.H., Shevach, E.M., Strober, W. editors: *Current Protocols in Immunology*, 6.12.1-6.12.3. (John Wiley and Sons, NY, 1991). One specific example of how to determine the activity of a compound for inhibiting migration is described in detail below.

Chemotaxis Assay:

The ability of compounds to inhibit the chemotaxis to various chemokines can be evaluated using standard 48 or 96 well Boyden Chambers with a 5 micron polycarbonate filter. All reagents and cells can be prepared in standard RPMI (BioWhittaker Inc.) tissue culture medium supplemented with 1 mg/ml of bovine serum albumin. Briefly, MIP-1 α (Peprotech, Inc., P.O. Box 275, Rocky Hill NJ) or other test agonists, are placed into the lower chambers of the Boyden chamber. A polycarbonate filter is then applied and the upper chamber fastened. The amount of agonist chosen is that determined to give the maximal amount of chemotaxis in this system (e.g., 1 nM for MIP-1 α should be adequate).

THP-1 cells (ATCC TIB-202), primary human monocytes, or primary lymphocytes, isolated by standard techniques can then be added to the upper chambers in triplicate together with various concentrations of the test compound. Compound dilutions can be prepared using standard serological techniques and are mixed with cells prior to adding to the chamber.

After a suitable incubation period at 37 degrees centigrade (e.g. 3.5 hours for THP-1 cells, 90 minutes for primary monocytes), the chamber is removed, the cells in the upper chamber aspirated, the upper part of the filter wiped and the number of cells migrating can be determined according to the following method.

For THP-1 cells, the chamber (a 96 well variety manufactured by Neuroprobe) can be centrifuged to push cells off the lower chamber and the number of cells can be quantitated against a standard curve by a color change of the dye fluorocein diacetate.

For primary human monocytes, or lymphocytes, the filter can be stained with Dif Quik® dye (American Scientific Products) and the number of cells migrating can be determined microscopically.

The number of cells migrating in the presence of the compound are divided by the number of cells migrating in control wells (without the compound). The quotient is the % inhibition for the compound which can then be plotted using standard graphics techniques against the concentration of compound used. The 50% inhibition point is then determined

WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-43-

using a line fit analysis for all concentrations tested. The line fit for all data points must have an coefficient of correlation (R squared) of > 90% to be considered a valid assay.

All of the compounds of the invention illustrated in the following examples had IC₅₀ of less than 10 μ M, in the Chemotaxis assay.

5 The compositions of the present invention may be formulated in a conventional manner using one or more pharmaceutically acceptable carriers. Thus, the active compounds of the invention may be formulated for oral, buccal, intranasal, parenteral (e.g., intravenous, intramuscular or subcutaneous) or rectal administration or in a form suitable for administration by inhalation or insufflation. The active compounds of the invention may also be formulated for sustained delivery.

10 For oral administration, the pharmaceutical compositions may take the form of, for example, tablets or capsules prepared by conventional means with pharmaceutically acceptable excipients such as binding agents (e.g., pregelatinized maize starch, polyvinylpyrrolidone or hydroxypropyl methylcellulose); fillers (e.g., lactose, microcrystalline cellulose or calcium phosphate); lubricants (e.g., magnesium stearate, talc or silica);
15 disintegrants (e.g., potato starch or sodium starch glycolate); or wetting agents (e.g., sodium lauryl sulphate). The tablets may be coated by methods well known in the art. Liquid preparations for oral administration may take the form of, for example, solutions, syrups or suspensions, or they may be presented as a dry product for constitution with water or other suitable vehicle before use. Such liquid preparations may be prepared by conventional means with pharmaceutically acceptable additives such as suspending agents (e.g., sorbitol syrup, methyl cellulose or hydrogenated edible fats); emulsifying agents (e.g., lecithin or acacia); non-aqueous vehicles (e.g., almond oil, oily esters or ethyl alcohol); and
20 preservatives (e.g., methyl or propyl p-hydroxybenzoates or sorbic acid).

25 For buccal administration, the composition may take the form of tablets or lozenges formulated in conventional manner.

The active compounds of the invention may be formulated for parenteral administration by injection, including using conventional catheterization techniques or infusion. Formulations for injection may be presented in unit dosage form, e.g., in ampules or
30 in multi-dose containers, with an added preservative. The compositions may take such forms as suspensions, solutions or emulsions in oily or aqueous vehicles, and may contain formulating agents such as suspending, stabilizing and/or dispersing agents. Alternatively, the active ingredient may be in powder form for reconstitution with a suitable vehicle, e.g., sterile pyrogen-free water, before use.

WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-44-

The active compounds of the invention may also be formulated in rectal compositions such as suppositories or retention enemas, e.g., containing conventional suppository bases such as cocoa butter or other glycerides.

For intranasal administration or administration by inhalation, the active compounds of the invention are conveniently delivered in the form of a solution or suspension from a pump spray container that is squeezed or pumped by the patient or as an aerosol spray presentation from a pressurized container or a nebulizer, with the use of a suitable propellant, e.g., dichlorodifluoromethane, trichlorofluoromethane, dichlorotetrafluoroethane, carbon dioxide or other suitable gas. In the case of a pressurized aerosol, the dosage unit may be determined by providing a valve to deliver a metered amount. The pressurized container or nebulizer may contain a solution or suspension of the active compound. Capsules and cartridges (made, for example, from gelatin) for use in an inhaler or insufflator may be formulated containing a powder mix of a compound of the invention and a suitable powder base such as lactose or starch.

A proposed dose of the active compounds of the invention for oral, parenteral or buccal administration to the average adult human for the treatment of the conditions referred to above (e.g., rheumatoid arthritis) is 0.1 to 1000 mg of the active ingredient per unit dose which could be administered, for example, 1 to 4 times per day.

Aerosol formulations for treatment of the conditions referred to above (e.g., rheumatoid arthritis) in the average adult human are preferably arranged so that each metered dose or "puff" of aerosol contains 20 µg to 1000 µg of the compound of the invention. The overall daily dose with an aerosol will be within the range 0.1 mg to 1000 mg. Administration may be several times daily, for example 2, 3, 4 or 8 times, giving for example, 1, 2 or 3 doses each time.

The active agents can be formulated for sustained delivery according to methods well known to those of ordinary skill in the art. Examples of such formulations can be found in United States Patents 3,538,214, 4,060,598, 4,173,626, 3,119,742, and 3,492,397.

The compounds of the invention can also be utilized in combination therapy with immunosuppressant agents including but not limited to rapamycin, cyclosporin A, FK-506, Celcept®; azathioprine, and IL-2R inhibitory antibodies or with classical anti-inflammatory agents (e.g. cyclooxygenase/lipoxygenase inhibitors) such as but not limited to, tenidap, aspirin, acetaminophen, naproxen and piroxicam or with cytokine inhibitory agents including but not limited to ENBREL.


The following Examples illustrate, but are not limited to, the preparation of the compounds of the present invention.

WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-45-

Example 1



1-[3-(4-Fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-2-(2-nitro-4-trifluoromethyl-phenoxy)-ethanone

5 1-(4-Fluoro-benzyl)-5-oxo-pyrrolidine-2-carboxylic acid ethyl ester

To a 0°C solution of 5-oxo-pyrrolidine-2-carboxylic acid ethyl ester (15 g, 95.0 mmol) and 4-fluorobenzylbromide (19.7 g, 104.0 mmol) in tetrahydrofuran (800 ml) is added sodium hydride (60% dispersion, 5.7 g, 142.0 mmol) in four portions. The reaction mixture is held at 0°C for thirty minutes and then warmed to ambient temperature for 3 hours. The resulting mixture is diluted with diethyl ether and extracted with saturated aqueous ammonium chloride. The combined organics are dried over magnesium sulfate, filtered and concentrated in vacuo. Silica gel chromatography gave the title compound (18.11 g, 72%).

1-(4-Fluoro-benzyl)-5-nitromethylene-pyrrolidine-2-carboxylic acid ethyl ester

15 To a solution of triethyloxonium tetrafluoroborate (5.52 g, 29.0 mmol) and molecular sieves (3 angstroms, 35 g) in dry dichloromethane (30 ml) is added 1-(4-fluoro-benzyl)-5-oxo-pyrrolidine-2-carboxylic acid ethyl ester (7.0 g, 26.4 mmol) dropwise over fifteen minutes. The reaction mixture is stirred at ambient temperature overnight, then filtered through a glass frit and washed with dichloromethane. The collected precipitate is dried in vacuo overnight in the presence of phosphorus pentoxide to give the iminium tetrafluoroborate (9.10 g, 95%).

20 To a solution of the iminium tetrafluoroborate (9.10 g, 25.1 mmol) in dry dichloromethane (35 ml) is added triethylamine (3.8 ml, 27.6 mmol). The reaction mixture is stirred at ambient temperature for ten minutes, and then nitromethane (6.8 ml, 125.0 mmol) is added. The resulting mixture is stirred at ambient temperature overnight, then concentrated in vacuo. The residue is diluted with chloroform, washed with 10% aqueous hydrochloric acid, water, and brine. The organics are dried over magnesium sulfate, filtered, and concentrated in vacuo. Silica gel chromatography gave the title compound (4.19 g, 54%) in addition to recovered 1-(4-fluoro-benzyl)-5-oxo-pyrrolidine-2-carboxylic acid ethyl ester (7.92 g, 32%).

WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-46-

5-Aminomethyl-1-(4-fluoro-benzyl)-pyrrolidine-2-carboxylic acid ethyl ester

To a solution of 1-(4-fluoro-benzyl)-5-nitromethylene-pyrrolidine-2-carboxylic acid ethyl ester (5.24 g, 17.0 mmol) in methanol (50 ml) in a par bottle is added palladium on carbon (10%, 2.5 g). The resulting suspension is subjected to hydrogen gas (40 psi) overnight, filtered through a pad of celite, the filter cake is washed with methanol. The filtrate is concentrated in vacuo to give a mixture of the title compound and 8-(4-fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]octan-2-one (3.56 g).

8-(4-Fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]octan-2-one

To a solution of a mixture of 5-aminomethyl-1-(4-fluoro-benzyl)-pyrrolidine-2-carboxylic acid ethyl ester (2.19 g, 7.82 mmol) in dry methanol (40 ml) is added sodium methoxide (0.84 g, 15.6 mmol). The resulting mixture is stirred at ambient temperature overnight, diluted with ethyl acetate, and washed with saturated aqueous sodium hydrogen carbonate. The combined organics are dried over magnesium sulfate, filtered and concentrated in vacuo to give the title compound (1.34 g, 73 %).

2-Oxo-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester

To a solution 8-(4-fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]octan-2-one (1.50 g, 6.40 mmol) and di-tert-butyl-dicarbonate (1.67 g, 7.6 mmol) in ethanol (50 ml) in a par bottle is added palladium hydroxide on carbon (20%, 1.0 g). The resulting suspension is subjected to hydrogen gas (40 psi) at 60°C overnight, filtered through a pad of celite, the filter cake is washed with ethyl acetate. The filtrate is concentrated in vacuo to give the title compound (1.22 g, 84 %).

3-(4-Fluoro-benzyl)-2-oxo-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester

To a 0°C solution of 2-oxo-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester (0.35 g, 1.54 mmol) in tetrahydrofuran (8.0 ml) is added 4-fluorobenzylbromide (0.21 ml, 1.70 mmol) followed by sodium hydride (60% dispersion, 0.092 g, 2.3 mmol). The resulting mixture is stirred at 0°C for 30 minutes and then warmed to ambient temperature overnight. The reaction mixture is diluted with diethyl ether and washed with saturated aqueous ammonium chloride. The combined organics are dried over magnesium sulfate, filtered and concentrated in vacuo to give the title compound, which is taken on crude.

3-(4-Fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]octan-2-one

To a solution of 3-(4-fluoro-benzyl)-2-oxo-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester in dichloromethane (15.0 ml) is added trifluoroacetic acid (3.0 ml). The resulting mixture is stirred at ambient temperature for three hours, then basified with 1N aqueous sodium hydroxide and extracted with dichloromethane. The combined organics are

WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-47-

dried over magnesium sulfate, filtered and concentrated in vacuo to give the title compound (0.297 g, 82% over 2 steps).

3-(4-Fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]octane

To a 0°C solution of 3-(4-fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]octan-2-one (0.284 g, 1.21 mmol) in tetrahydrofuran (6.0 ml) is added lithium aluminum hydride (1.0 M in tetrahydrofuran, 6.1 ml, 6.1 mmol) dropwise. The reaction mixture is slowly warmed to ambient temperature and then refluxed over night. The resulting mixture is cooled to 0°C and slowly quenched with water and 1N aqueous sodium hydroxide, then filtered through a pad of celite, the filter cake is washed with ethyl acetate. The filtrate is concentrated in vacuo to give the title compound (0.25 g, 94 %).


2-chloro-1-[3-(4-fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-ethanone

To a solution of 3-(4-fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]octane (0.71 g, 3.22 mmol) in dry dichloromethane (30 ml) at 0°C is added triethylamine (0.45 ml, 3.22 mmol) followed by chloroacetyl chloride (0.27 ml, 3.54 mmol). The resulting reaction mixture is stirred for two hours and concentrated in vacuo. Silica gel chromatography gave the title compound (0.66 g, 69%).

1-[3-(4-Fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-2-(2-nitro-4-trifluoromethyl-phenoxy)-ethanone

To a solution of 2-chloro-1-[3-(4-fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-ethanone (0.11 g, 0.37 mmol) in butanone (4 ml) is added 2-nitro-4-trifluoromethyl-phenol (0.300 g, 0.41 mmol), potassium carbonate (0.15 g, 1.09 mmol) and potassium iodide (0.18 g, 1.09 mmol). The resulting mixture is stirred at reflux for 7 hours. The reaction is then cooled, diluted with ethyl acetate and washed with brine. The organic layers are dried over magnesium sulfate, filtered and concentrated in vacuo. Silica gel chromatography gave the title compound (0.10 g, 58%).

The title compounds for Examples 2-6 are prepared by a method analogous to that described in Example 1.




WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-48-

Example	R ³	R ⁴
2	4-Cl	CO ₂ NH ₂
3	3-Cl	CO ₂ Et
4	4-Cl	COCH ₃
5	4-Cl	SO ₂ NH ₂
6	4-CF ₃	NO ₂
7	4-Cl	CH ₂ CO ₂ CH ₂ CH ₃

Example 8




5-Chloro-2-{2-[8-(4-fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]oct-3-yl]-2-oxo-ethoxy}-

benzenesulfonamide

8-(4-Fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]octane

To a 0°C solution of 8-(4-fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]octan-2-one (1.34 g, 5.72 mmol) in tetrahydrofuran (20 ml) is added lithium aluminum hydride (1.0 M in tetrahydrofuran, 11.4 ml, 11.4 mmol) dropwise. The reaction mixture is slowly warmed to ambient temperature and then refluxed for 3 hours. The resulting mixture is cooled to ambient temperature, quenched slowly with water and then filtered through a pad of celite. The filter cake is washed with ethyl acetate, and the combined organics are washed with saturated aqueous sodium hydrogen carbonate, dried over sodium sulfate, filtered and concentrated in vacuo to give the title compound (0.781 g, 62%).

The title compound for example 9 – 12 are prepared by a method analogous to that described in Example 8.




WO 02/32901

PCT/IB01/01844


-49-

Example	R ³	R ⁴
9	4-Cl	SO ₂ NH ₂
10	4-Cl	CONH ₂
11	3-OCH ₃	CONH ₂
12	4-Cl	NO ₂

Example 13


5 2-(5-Chloro-quinolin-8-yloxy)-1-[3-(4-fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-ethanone

The title compound for Example 13 is prepared by a method analogous to that described in Example 1.

Example 14

10 1-[3-(4-Fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-2-(6-methyl-2-nitro-pyridin-3-yloxy)-ethanone

The title compound for Example 14 is prepared by a method analogous to that described in Example 1.

Example 15

15 2-(5-Chloro-3-nitro-pyridin-2-yloxy)-1-[3-(4-fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-ethanone

WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-50-

Acetic acid 2-[3-(4-fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-2-oxo-ethyl ester

To a solution of 3-(4-fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]octane (0.46g, 2.1 mmol) in dry dichloromethane (10 ml) at 0°C is added triethylamine (0.32 ml, 2.3 mmol) followed by acetic acid chloroacetyl ester (0.245 ml, 2.3 mmol). The resulting reaction mixture is stirred for 1 hour, then diluted with dichloromethane and washed with saturated aqueous sodium hydrogen carbonate. The aqueous layer is extracted three times with dichloromethane. The combined organics are dried over magnesium sulfate and concentrated in vacuo to give the title compound (0.67 g, 100%).


1-[3-(4-Fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-2-hydroxy-ethanone

To a solution of acetic acid 2-[3-(4-fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-2-oxo-ethyl ester (0.67 g, 2.1 mmol) in tetrahydrofuran (8 ml), methanol (1 ml), and water (1 ml) is added lithium hydroxide monohydrate (0.18 g, 4.2 mmol). The reaction mixture is stirred at ambient temperature overnight and then diluted with ethyl acetate and washed with saturated aqueous sodium hydrogen carbonate. The aqueous layer is extracted three times with ethyl acetate. The combined organics are dried over magnesium sulfate and concentrated in vacuo to give the title compound (0.48 g, 82%).

2-(5-Chloro-3-nitro-pyridin-2-yloxy)-1-[3-(4-fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-ethanone

To a 0°C solution of 1-[3-(4-fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-2-hydroxy-ethanone (0.456 g, 1.64 mmol) in toluene (8.0 ml) is added sodium hydride (0.072 g, 1.80 mmol). The reaction mixture is stirred at 0°C for 30 minutes. To the resulting reaction mixture is added 2,5-dichloro-3-nitro-pyridine (0.35 g, 1.80 mmol). The reaction mixture is heated to reflux for 2 hours, then cooled to ambient temperature, washed with saturated aqueous sodium hydrogen carbonate and brine. The aqueous layers are then extracted three times with ethyl acetate. The combined organics are dried over magnesium sulfate and concentrated in vacuo to give the title compound (0.76 g, 64%).

The title compounds for Examples 16 - 17 are prepared by a method analogous to that described in Example 15.




WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-51-

Example	R ¹
16	CONH ₂
17	CO ₂ CH ₃

Example 18




4-Chloro-2-[2-[3-(4-fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-2-oxo-ethoxy]-

5 benzamide

Ammonia gas is bubbled through a solution of 4-chloro-2-[2-[3-(4-fluoro-benzyl)-8-aza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-2-oxo-ethoxy]-benzoic acid methyl ester (0.030 g, 0.067 mmol) in dry methanol (2.0 ml). The reaction mixture is then capped and stirred at ambient temperature for two days, and then concentrated in vacuo. Silica gel chromatography gave

10 the title compound (0.031 mg, 100 %).

Example 19



N-(2-Amino-ethyl)-4-chloro-2-[2-[3-(4-fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-

2-oxo-ethoxy]-benzamide


15 A solution of 4-chloro-2-[2-[3-(4-fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-2-oxo-ethoxy]-benzoic acid methyl ester (0.160 g, 0.36 mmol) in ethane-1,2-diamine (12.0 ml) is

WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-52-


heated to 45°C overnight. The reaction mixture is then cooled to ambient temperature and concentrated in vacuo. Silica gel chromatography gave the title compound (0.13 g, 76 %).

Example 20

5 4-Chloro-2-[2-[3-(4-fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-2-oxo-ethoxy]-
benzoic acid

To a solution of 4-chloro-2-[2-[3-(4-fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-2-oxo-ethoxy]-benzoic acid methyl ester (0.080 g, 0.18 mmol) in a mixture of tetrahydrofuran (2 ml), methanol (0.2 ml) and water (0.4 ml) is added lithium hydroxide monohydrate (0.020 g, 0.36 mmol). The reaction is stirred at ambient temperature for 2 hours and then loaded on a silica gel column with methylene chloride. Silica gel chromatography gave the title compound (0.066 g, 78%).

The title compounds for Examples 21 - 25 are prepared by a method analogous to that described in Example 20.




15

Example	R ^a	R ^b
20	4-Cl	CO ₂ H
21	4-CH ₃	CO ₂ H
22	4-OCH ₃	CO ₂ H
23	4-I	CO ₂ H
24	4-Br	CO ₂ H
25	4-Cl	CH ₂ CO ₂ H

WO 02/32901


PCT/IB01/01844

-53-

Example 26


5-Chloro-2-(2-[3-(4-fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]oct-3-yl]-2-oxo-ethoxy)-benzoic acid

- 5 The title compound for Example 26 is prepared by a method analogous to that described in Example 20.

Example 27

- 10 5-Chloro-2-(2-[3-(4-fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]oct-3-yl]-2-oxo-ethoxy)-nicotinic acid

The title compound for Example 27 is prepared by a method analogous to that described in Example 20.

Example 28

WO 02/32901

PCT/IB01/01844


-54-

3-[2-[3-(4-Fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-2-oxo-ethoxy]-naphthalene-2-carboxylic acid

The title compound for Example 28 is prepared by a method analogous to that described in Example 20.

5

Example 29




4-Chloro-1-[2-[3-(4-fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-2-oxo-ethoxy]-naphthalene-2-carboxylic acid

The title compound for Example 29 is prepared by a method analogous to that described in Example 20.

10

Example 30



5-Chloro-2-[2-[3-(4-fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-2-oxo-ethoxy]-N-(1H-tetrazol-5-yl)-benzamide

15

To a solution of 5-chloro-2-[2-[3-(4-fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-2-oxo-ethoxy]-benzoic acid (0.090 g, 0.21 mmol) in tetrahydrofuran (2.0 ml) is added carbonyl diimidazole (0.037 g, 0.23 mmol). The reaction mixture is refluxed for 3 hours and then cooled to ambient temperature. To the resulting reaction mixture is added 1H-tetrazol-5-ylamine (0.0195 g, 0.23 mmol). The resulting mixture is heated to reflux for 12 hours. The reaction is then cooled, diluted with dichloromethane and washed with saturated aqueous sodium hydrogen carbonate. The organic layers are dried over magnesium sulfate, filtered and concentrated in vacuo. Silica gel chromatography gave the title compound (0.10 g, 95%).


20

WO 02/32901


PCT/IB01/01844

-55-

The title compounds for Examples 31 - 32 are prepared by a method analogous to that described in Example 30.




Example	R ²	R ³
31	4-Cl	CONHCH ₂ CO ₂ H
32	4-Cl	CONHSO ₂ CH ₃



5

Example	R ²	R ³
33	4-Cl	CONHTet
34	4-Cl	CONHCH ₂ CONH ₂




WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-56-


Example 35



N-Carbamoylmethyl-5-chloro-2-{2-[3-(4-fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-2-oxo-ethoxy}-nicotinamide

5 The title compound for Examples 35 is prepared by a method analogous to that described in Example 30.

Example 36



10 4-Chloro-2-{2-[3-(4-fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-2-oxo-ethoxy}-N-(2-ureido-ethyl)-benzamide


To a solution of N-(2-amino-ethyl)-4-chloro-2-{2-[3-(4-fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-2-oxo-ethoxy}-benzamide (0.065 g, 0.14 mmol) in dichloromethane (1.5 ml) is added pyridine (0.023 ml, 0.28 mmol) and 4-nitrophenyl chloroformate (0.026 g, 0.14mmol). The reaction is stirred at ambient temperature for 1 hour and then concentrated in vacuo. The resulting residue is dissolved in methanol, treated with ammonia gas, and the solution is stirred under an atmosphere of ammonia over night. The reaction mixture is diluted with ethyl acetate, washed with saturated aqueous sodium hydrogen carbonate and 1M aqueous sodium hydroxide until the organic layer is colorless. Silica gel chromatography gave the title compound (0.057 mg, 79 %).

20 The title compounds for Examples 37 - 39 are prepared by a method analogous to that described in Example 36.


WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-57-



Example	R ³	R ⁴
37	3-Cl	NHCONHCH ₂ CONH ₂
38	4-Cl	NHCONH ₂
39	4-Cl	NHCONHCH ₂ CH ₂ CO ₂ H


Example 40

5

(5-Chloro-2-(2-[8-(4-fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]oct-3-yl]-2-oxo-ethoxy)-phenyl)-urea

The title compound for Example 40 is prepared by a method analogous to that described in Example 36.

10

Example 41

WO 02/32901


PCT/IB01/01844

-58-

2-[3-(5-Chloro-2-[2-[3-(4-fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-2-oxo-ethoxy]-pyridin-3-yl)-ureido]-acetamide

The title compound for Example 41 is prepared by a method analogous to that described in Example 36.


5

Example 42

2-(2-Amino-5-chloro-phenoxy)-1-[3-(4-fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-ethanone

To a solution of 2-(5-chloro-2-nitro-phenoxy)-1-[3-(4-fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-ethanone (0.059 g, 0.136 mmol) in ethanol (15 ml) in a par bottle is added platinum on carbon (5%, 0.100 g). The resulting suspension is subjected to hydrogen gas (20 psi) for 10 minutes, filtered through a pad of celite, the filter cake is washed with ethyl acetate. The filtrate is concentrated in vacuo to give the title compound (0.040 g, 74%).

The title compounds for Examples 43-44 are prepared by a method analogous to that described in Example 42.




Example	R ¹	R ²
43	4-CF ₃	NH ₂
44	4-Cl	NH ₂

WO 02/32901


PCT/IB01/01844

-59-

Example 45

2-(2-Amino-4-chloro-phenoxy)-1-[8-(4-fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]oct-3-yl]-ethanone

5 The title compound for Examples 45 is prepared by a method analogous to that described in Example 42.

Example 46

2-(3-Amino-5-chloro-pyridin-2-yloxy)-1-[3-(4-fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-ethanone


10 The title compound for Examples 46 is prepared by a method analogous to that described in Example 42.

WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-60-


Example 47



2-(2-Amino-6-methyl-pyridin-3-yloxy)-1-[3-(4-fluoro-benzyl)-3,8-diazabicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-ethanone

5 The title compound for Examples 47 is prepared by a method analogous to that described in Example 42.

Example 48



2-Amino-N-(5-chloro-2-[2-[3-(4-fluoro-benzyl)-3,8-diazabicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-2-oxo-ethoxy]-pyridin-3-yl)-acetamide


10 To a solution of tert-butoxycarbonylamino-acetic acid (0.061 g, 0.35 mmol) in tetrahydrofuran (2.0 ml) at 0 °C is added N-methyl morpholine (0.038 ml, 0.35 mmol) and isobutylchloroformate (0.045 ml, 0.35 mmol). The reaction mixture is stirred for 20 minutes, warmed to ambient temperature for 2 hours, and then treated with 2-(3-amino-5-chloro-15 pyridin-2-yloxy)-1-[3-(4-fluoro-benzyl)-3,8-diazabicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-ethanone (0.109 g, 0.26 mmol) in tetrahydrofuran (1.0 ml). The resulting mixture is stirred over night at ambient temperature and then filtered through a pad of celite, which is washed with tetrahydrofuran. The filtrate is diluted with ethyl acetate and washed with brine. The organic layer is dried over magnesium sulfate, filtered and concentrated in vacuo. Silica gel chromatography gave the BOC-protected title compound (0.092 g, 63%), which is then treated with trifluoroacetic acid 20 (1.0 ml) in dichloromethane (10 ml). The reaction mixture is stirred at ambient temperature

WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-61-

overnight, diluted with dichloromethane, washed with aqueous sodium hydroxide (1N, 10.0 ml), dried over magnesium sulfate, filtered and concentrated in vacuo to give the title compound (0.054 g, 73%).


Example 49

5

N-(5-Chloro-2-{2-[8-(4-fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]oct-3-yl]-2-oxo-ethoxy}-phenyl)-3-hydroxy-3-methyl-butylamide

The title compound for Example 49 is prepared by a method analogous to that described in Example 48.

10

Example 50

N-(4-Chloro-2-{2-[3-(4-fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-2-oxo-ethoxy}-phenyl)-methanesulfonamide

To a 0°C solution of 2-(2-amino-5-chloro-phenoxy)-1-[3-(4-fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-ethanone (0.040 g, 0.10 mmol) in dichloromethane (1.0 ml) is added triethylamine (0.028 ml, 0.20 mmol) and methanesulfonyl chloride (0.010 ml, 0.012 mmol). The reaction mixture is stirred at 0°C for 30 minutes and then concentrated in vacuo. Silica gel chromatography gave the title compound (0.025 mg, 52 %)


The title compounds for Examples 51 - 53 are prepared by a method analogous to that described in Example 50.

20

WO 02/32901


PCT/IB01/01844

-62-



Example	R ¹	R ²
51	4-CF ₃	NHSO ₂ CH ₃
52	4-Cl	NHSO ₂ CH ₃
53	3-Cl	CONHCH ₂ CH ₂ NHSO ₂ CH ₃


Example 54



5 N-(5-Chloro-2-{2-[3-(4-fluorobenzyl)-3,8-diazabicyclo[3.2.1]oct-3-yl]-2-oxo-ethoxy}-phenyl)-methanesulfonamide

The title compound for Example 54 is prepared by a method analogous to that described in Example 50.

Example 55



10 N-(6-Chloro-3-{2-[3-(4-fluorobenzyl)-3,8-diazabicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-2-oxo-ethoxy}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide


WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-63-

The title compound for Examples 55 is prepared by a method analogous to that described in Example 50.


Example 56



5 N-(6-methyl-3-(2-[3-(4-fluoro-benzyl)-3,8-diaza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-2-oxo-ethoxy)-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide

The title compound for Examples 56 is prepared by a method analogous to that described in Example 50.

Example 57



10 2-(4-Chloro-phenoxy)-1-[3-(4-fluoro-benzyl)-8-aza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-ethanone8-benzyl-8-aza-bicyclo[3.2.1]octan-3-one

A solution of 2,5-dimethoxy-tetrahydrofuran (30 g, 0.23 mmol) in aqueous hydrochloric acid (0.25 M, 100 ml) is stirred at 0°C overnight. To the resulting reaction mixture is then added benzylamine hydrochloride salt (39.9 g, 0.27 mmol), 3-oxo-pentanedioic acid (33.6 g, 0.23 mmol) and aqueous sodium acetate (2.75 M, 200 ml, 0.55 mmol). The resulting reaction mixture is stirred at ambient temperature for 90 minutes, and then heated to 50°C for 2 hours. The reaction mixture is then cooled to 0°C and basified with 6N aqueous sodium hydroxide (50 ml) to pH = 10. The reaction is extracted with ethyl acetate, the organic layers are dried over magnesium sulfate, filtered and concentrated in vacuo. Silica gel chromatography gave the title compound (37.54 g, 75%).

3-Oxo-8-aza-bicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester

To a solution of 8-benzyl-8-aza-bicyclo[3.2.1]octan-3-one (33 g, 0.153 mmol) in ethyl acetate (100 ml) in a par bottle is added di-tert-butyl-dicarbonate (40.15 g, 0.184 mmol) and palladium hydroxide on carbon (20%, 20 g). The reaction mixture is subjected to hydrogen gas (50 psi) at ambient temperature for 5 hours, filtered through a pad of celite, and the filter cake is washed with ethyl acetate. The filtrate is concentrated in vacuo and silica gel chromatography gave the title compound (29.37 g, 85%).

3-(4-Fluoro-benzylidene)-8-aza-bicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester

To a solution of (4-fluoro-benzyl)-triphenyl-phosphonium chloride (27.0 g, 66.5 mmol) in toluene (500 ml) is added sodium hydride (60% dispersion, 2.66 g, 66.5 mmol). The resulting suspension is stirred at ambient temperature for 90 minutes. To the reaction mixture is then added 3-oxo-8-aza-bicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester (13.6 g, 60.5 mmol). The resulting reaction mixture is refluxed overnight, and then cooled to ambient temperature, diluted with water and extracted with diethyl ether. The organic layers are dried over magnesium sulfate, filtered and concentrated in vacuo. Silica gel chromatography gave the title compound (17.61 g, 92 %).

3-(4-Fluoro-benzyl)-8-aza-bicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester

To a solution 3-(4-fluoro-benzylidene)-8-aza-bicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester (18.72 g, 59.0 mmol) in ethanol (500 ml) in a par bottle is added palladium on carbon (10%, 10.0 g). The reaction mixture is subjected to hydrogen gas (40 psi) for 2 hours. The reaction mixture is filtered through a pad of celite, and the filter cake is washed with ethanol. The filtrate is concentrated in vacuo to give the title compound (18.12 g, 96%, 2:1 mixture of diastereomers by ¹H NMR). Chiral HPLC separation gave the exo diastereomer (4.24 g, 23%) along with the endo diastereomer (11.32 g, 60%).

3-(4-Fluoro-benzyl)-8-aza-bicyclo[3.2.1]octane

To a solution of 3-(4-fluoro-benzyl)-8-aza-bicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester (4.24 g, 13.3 mmol) in dichloromethane (50 ml) is added trifluoroacetic acid (10 ml). The resulting reaction mixture is stirred at ambient temperature for 3 hours, then washed with 1N aqueous sodium hydroxide, and extracted with dichloromethane three times. The combined organics are dried over magnesium sulfate, filtered and concentrated in vacuo to give the title compound (2.91 g, 100%).

2-(4-Chloro-phenoxy)-1-[3-(4-fluoro-benzyl)-8-aza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-ethanone


To a solution of 3-(4-fluoro-benzyl)-8-aza-bicyclo[3.2.1]octane (0.038 g, 0.173 mmol) in dichloromethane (1 ml) at 0°C is added (4-chloro-phenoxy)-acetyl chloride (0.042 g, 0.208 mmol) and triethylamine (0.072 ml, 0.520 mmol). The reaction mixture is slowly warmed to ambient temperature, and then diluted with dichloromethane and washed with water. The

WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-65-

organics are dried over magnesium sulfate, filtered and concentrated in vacuo. Silica gel chromatography gave the title compound (0.042 g, 63%).

Example 58

5 2-(4-Chloro-2-nitro-phenoxy)-1-[3-(4-fluoro-benzyl)-8-aza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-ethanone


2-chloro-1-[3-(4-fluoro-benzyl)-8-aza-bicyclo[3.2.1]octane]-ethanone

To a solution of 3-(4-fluoro-benzyl)-8-aza-bicyclo[3.2.1]octane (2.91 g, 13.28 mmol) in dry dichloromethane (30 ml) at 0°C is added triethylamine (2.10 ml, 14.60 mmol) followed by chloroacetyl chloride (1.10 ml, 14.60 mmol). The resulting reaction mixture is stirred for 60 minutes, diluted with dichloromethane and washed with saturated aqueous sodium hydrogen carbonate. The organics are dried over magnesium sulfate, filtered and concentrated in vacuo. Silica gel chromatography gave the title compound (3.58 g, 91 %).

15 2-(4-Chloro-2-nitro-phenoxy)-1-[3-(4-fluoro-benzyl)-8-aza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-ethanone

To a solution of 2-chloro-1-[3-(4-fluoro-benzyl)-8-aza-bicyclo[3.2.1]octane]-ethanone (1.0 g, 3.40 mmol) in butanone (7 ml) is added 2-nitro-4-trifluoromethyl-phenol (0.65 g, 3.74 mmol), potassium carbonate (0.93 g, 6.8 mmol) and potassium iodide (0.56 g, 3.40 mmol). The resulting mixture is stirred at 60°C for 24 hours. The reaction is then cooled, diluted with ethyl acetate and washed with brine. The organic layers are dried over magnesium sulfate, filtered and concentrated in vacuo. Silica gel chromatography gave the title compound (1.3 g, 88%).

The title compounds for Examples 59-65 are prepared by a method analogous to that described in Example 58




25

WO 02/32901


PCT/IB01/01844

-66-

Example	R ³	R ²
59	4-Cl	CO ₂ CH ₃
60	4-Cl	COCH ₃
61	4-Cl	SO ₂ NH ₂
62	4-Cl	CH ₂ NPhth
63	4-CF ₃	NO ₂
64	3-Cl	CO ₂ CH ₃
65	3-CH ₃	NHCOCH ₃



Example 66




5-Chloro-2-{2-[3-(4-fluoro-benzyl)-8-aza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-2-oxo-ethoxy}-

5 benzamide

Ammonia gas is bubbled through a solution of 5-chloro-2-{2-[3-(4-fluoro-benzyl)-8-aza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-2-oxo-ethoxy}-benzoic acid methyl ester (0.015 g, 0.034 mmol) in dry methanol (3.0 ml). The reaction mixture is then capped and stirred at ambient temperature for two days, and then concentrated in vacuo. Silica gel chromatography gave the title compound (0.008 mg, 55 %).

Example 67



N-(2-Amino-ethyl)-5-chloro-2-{2-[3-(4-fluoro-benzyl)-8-aza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-2-oxo-ethoxy}-benzamide


A solution of 5-chloro-2-{2-[3-(4-fluoro-benzyl)-8-aza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-2-oxo-ethoxy}-benzoic acid methyl ester (0.015 g, 0.034 mmol) in ethane-1,2-diamine (2.0 ml) is

WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-67-


heated to 45°C overnight. The reaction mixture is then cooled to ambient temperature and concentrated in vacuo. Silica gel chromatography gave the title compound (0.011 g, 69 %).

Example 68

5 5-Chloro-2-(2-[3-(4-fluorobenzyl)-8-aza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-2-oxo-ethoxy)-N-(2-ureido-ethyl)-benzamide

To a solution of N-(2-Amino-ethyl)-5-chloro-2-(2-[3-(4-fluorobenzyl)-8-aza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-2-oxo-ethoxy)-benzamide (0.104 g, 0.22 mmol) in dichloromethane (2 ml) is added pyridine (0.035 ml, 0.44 mmol) and 4-nitrophenyl chloroformate (0.048 g, 0.24mmol). The reaction is stirred at ambient temperature for 1 hour and then concentrated in vacuo. The resulting residue is dissolved in methanol, ammonia gas is bubbled through the reaction mixture, and the solution is stirred under an atmosphere of ammonia overnight. The reaction mixture is concentrated in vacuo and silica gel chromatography gave the title compound (0.049 mg, 43 %).

15 The title compounds for Examples 69-71 are prepared by a method analogous to that described in Example 68.



Example	R ⁴	R ⁵
69	4-Cl	NHCONH ₂
70	4-CF ₃	NHCONH ₂
71	3-Cl	NHCONH ₂

Example 72

20 2-(2-Amino-4-chloro-phenoxy)-1-[3-(4-fluorobenzyl)-8-aza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-ethanone

To a solution of 2-(4-chloro-2-nitro-phenoxy)-1-[3-(4-fluorobenzyl)-8-aza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-ethanone (1.23 g, 2.84 mmol) in ethanol (50 ml) in a par bottle is added


WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-68-


platinum on carbon (5%, 0.500 g). The resulting suspension is subjected to hydrogen gas (35 psi) for 3 hours, filtered through a pad of celite, the filter cake is washed with ethyl acetate. The filtrate is concentrated in vacuo to give the title compound (0.95 g, 83 %).

The title compounds for Examples 73- 74 are prepared by a method analogous to that described in Example 72.



Example	R ²	R ²
73	4-CF ₃	NH ₂
74	3-Cl	NH ₂

Example 75



10

N-(5-Chloro-2-[2-[3-(4-fluoro-benzyl)-8-aza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-2-oxo-ethoxy]-phenyl)-methanesulfonamide


To a solution of 2-(2-amino-4-chloro-phenoxy)-1-[3-(4-fluoro-benzyl)-8-aza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-ethanone (0.050 g, 0.13 mmol) in dichloromethane (1.0 ml) is added triethylamine (0.036 ml, 0.26 mmol) and methanesulfonyl chloride (0.011ml, 0.014 mmol). The reaction mixture is stirred at ambient temperature for 1 hour and then concentrated in vacuo. Silica gel chromatography gave the title compound (0.034 mg, 54%)

The title compounds for Examples 76-81 are prepared by a method analogous to that described in Example 75.


WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-69-



Example	R ³	R ⁴
76	4-CF ₃	NHSO ₂ CH ₃
77	3-Cl	NHSO ₂ CH ₃
78	3-Cl	N(SO ₂ CH ₃) ₂
79	3-Cl	NHCH ₂ CH ₂ NHSO ₂ CH ₃
80	4-Cl	NHCH ₂ CH ₂ NHSO ₂ CH ₃
81	4-Cl	NHSO ₂ CF ₃

Example 82

5

2-(2-Aminomethyl-4-chloro-phenoxy)-1-[3-(4-fluoro-benzyl)-8-aza-bicyclo[3.2.1]oct-6-yl]-ethanone

To a solution of 2-(5-chloro-2-[2-[3-(4-fluoro-benzyl)-8-aza-bicyclo[3.2.1]oct-6-yl]-2-oxo-ethoxy]-benzyl)-isindole-1,3-dione (1.46 g, 2.67 mmol) in ethanol (30 ml) is added hydrazine (35%, 5.0 ml, 54 mmol). The reaction mixture is stirred at ambient temperature overnight. The reaction mixture is then filtered through a glass frit, the white precipitate is washed with ethanol, and the combined filtrates are concentrated in vacuo. The resulting residue is triterated with dichloromethane and filtered through a glass frit. The filtrate is concentrated in vacuo to give the title compound (1.06 g, 95.4%).


10

WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-70-


Example 83



N-(5-Chloro-2-{2-[3-(4-fluoro-benzyl)-8-aza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-2-oxo-ethoxy}-benzyl)-2-ureido-acetamide

- 5 To a solution of 2-(2-aminomethyl-4-chloro-phenoxy)-1-[3-(4-fluoro-benzyl)-8-aza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-ethanone (0.060 g, 0.14 mmol) in dichloromethane (1.5 ml) is added triethylamine (0.036 mg, 0.36 mmol), *tert*-butyl 1-piperazinecarboxylate (0.021 g, 0.15 mmol), 1-(3-dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride (0.034 g, 0.15 mmol) and ureido-acetic acid (0.017 g, 0.15 mmol). The resulting reaction mixture is stirred at ambient
- 10 temperature overnight, then diluted with dichloromethane and washed with saturated aqueous sodium hydrogen carbonate. The organics are dried over magnesium sulfate, filtered and concentrated in vacuo. Silica gel chromatography gave the title compound (0.034 g, 47%).

Example 84



- 15 5-Chloro-2-{2-[3-(4-fluoro-benzyl)-8-aza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-2-oxo-ethoxy}-nicotinamide

To a solution of glycolic acid (0.157 g, 2.07mmol), dimethylamino pyridine (catalytic), and pyridine (0.327g, 4.14 mmol), in dichloromethane (6 ml) is added dropwise chloro trimethylsilane (0.526 ml, 4.14 mmol). The reaction mixture is stirred at ambient temperature

20 for 4 hours, and then catalytic dimethylformamide and oxalyl chloride (2 M in dichloromethane, 1.0 ml, 2.0 mmol) are added. The resulting reaction mixture is stirred at 0°C for 1 hour, warmed to ambient temperature for 30 minutes, and then cooled to 0°C. To the mixture is added (4-fluoro-benzyl)-8-aza-bicyclo[3.2.1]octane (0.500 g, 2.2 mmol) in

WO 02/32901


PCT/IB01/01844

-71-

pyridine (0.474 g, 6.1 mmol). The reaction mixture is then slowly warmed to ambient temperature over 2 hours. Citric acid (0.422 g, 2.2 mmol) in methanol (6.0 ml) is added to the resulting reaction mixture, which is then stirred for 30 minutes at ambient temperature. The reaction mixture is diluted with ethyl acetate, washed with 1N aqueous hydrochloric acid, then saturated aqueous sodium hydrogen carbonate and brine. The organics are dried over magnesium sulfate, filtered and concentrated in vacuo to give 1-[3-(4-fluoro-benzyl)-8-aza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-2-hydroxy-ethanone (0.480 g, 84 %).

To a 0°C solution of 1-[3-(4-fluoro-benzyl)-8-aza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-2-hydroxy-ethanone (0.075 g, 0.27 mmol) in toluene (2.0 ml) is added sodium hydride (0.012 g, 0.29 mmol), and the reaction mixture is stirred at 0°C for 30 minutes. To the reaction mixture is then added 2,5-dichloro-nicotinamide (0.056 g, 0.29 mmol). The resulting mixture is refluxed for 2 hours, cooled to ambient temperature and concentrated in vacuo. Silica gel chromatography gave the title compound (0.070 g, 60 %).

Example 85



15 2-(3-Amino-5-chloro-pyridin-2-yloxy)-1-[3-(4-fluoro-benzyl)-8-aza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-ethanone

To a 0°C solution of 1-[3-(4-fluoro-benzyl)-8-aza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-2-hydroxy-ethanone (0.253 g, 0.913 mmol) in toluene (2.0 ml) is added sodium hydride (0.042 g, 1.1 mmol), and the reaction mixture is stirred at 0°C for 30 minutes. To the reaction mixture is then 2,5-dichloro-3-nitro-pyridine (0.185 g, 0.98 mmol). The resulting mixture is refluxed for 2 hours, cooled to ambient temperature and concentrated in vacuo. Silica gel chromatography gave 2-(3-nitro-5-chloro-pyridin-2-yloxy)-1-[3-(4-fluoro-benzyl)-8-aza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-ethanone (0.272 g, 68 %).


25 To a solution of 2-(3-nitro-5-chloro-pyridin-2-yloxy)-1-[3-(4-fluoro-benzyl)-8-aza-bicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-ethanone (0.269 g, 0.621 mmol) in ethanol (10 ml) in par bottle is added platinum dioxide (0.250 g). The reaction mixture is subjected to hydrogen gas (35 psi) for 20 minutes, then filtered through a pad of celite, the filter cake is washed with ethanol, and the filtrate is concentrated in vacuo. Silica gel chromatography gave the title compound (0.135 g, 54 %).

WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-72-

Example 86



2-(4-Chloro-phenoxy)-1-[5-(4-fluoro-benzyl)-2,5-diaza-bicyclo[2.2.2]oct-2-yl]-ethanone
2,5-Diamino-hexanedioic acid diethyl ester hydrochloride salt

- 5 To a solution of 2,5-dibromo-hexanedioic acid diethyl ester (5.0 g, 0.013 mmol) in ethanol (16 ml) is added sodium azide (2.4 g, 0.036 mmol). The reaction mixture is refluxed overnight and then poured slowly into ice water. The product is extracted with diethyl ether three times; the organics are dried over magnesium sulfate, filtered and concentrated in vacuo to give crude product, which is dissolved in ethanol (75 ml) and concentrated aqueous
- 10 hydrochloric acid (5.5 ml). To the reaction mixture is added platinum oxide (1.1 g). The reaction mixture is shaken under an atmosphere of hydrogen (30 psi) overnight, then filtered through a pad of celite, and the filter cake is washed with ethanol. The filtrate is concentrated in vacuo to give the title compound (5.6 g, 100%).

2,5-Diaza-bicyclo[2.2.2]octane hydrochloride salt

- 15 To a solution of 2,5-diamino-hexanedioic acid diethyl ester hydrochloride salt (5.6 g, 0.013 mmol) in methanol (400 ml) is added sodium methoxide (2.78 g, 0.051 mmol) giving a solution with pH = 14. The reaction mixture is refluxed overnight, and then concentrated in vacuo. The resulting residue is washed twice with boiling ethanol. The filtrate is concentrated in vacuo to give the crude product, which is dissolved in tetrahydrofuran (100 ml) and treated
- 20 with lithium aluminum hydride (1.0M in tetrahydrofuran, 80 ml, 0.080 mmol) at 0°C. The reaction mixture is slowly warmed to ambient temperature and then refluxed overnight, cooled to 0°C and slowly quenched with water. The resulting mixture is filtered through a pad of celite, and the filter cake is washed with diethyl ether and dichloromethane. The filtrate is treated with hydrochloric acid and then concentrated in vacuo to give the title compound (0.30 g, 16 % over 2 steps)

2-(4-Fluoro-benzyl)-2,5-diaza-bicyclo[2.2.2]octane

- To a solution of 2,5-diaza-bicyclo[2.2.2]octane hydrochloride salt (0.30 g, 1.60 mmol) in 1,2-dichloroethane (3.2 ml) is added 4-fluoro-benzaldehyde (0.043 ml, 0.40 mmol), triethylamine (0.5 ml, 13.6 mmol) and acetic acid (0.3 ml). The reaction mixture is stirred for 2
- 30 hours, and then treated with sodium triacetoxy borohydride (0.14 g, 2.72 mmol) and stirred at

WO 02/32901


PCT/IB01/01844

-73-

ambient temperature overnight. The reaction mixture is treated with water and extracted with ethyl acetate. The organics are dried over magnesium sulfate, filtered and concentrated in vacuo to give the title compound contaminated with triethylammonium acetate (0.44g, 66% by NMR).

- 5 2-(4-Chloro-phenoxy)-1-[5-(4-fluoro-benzyl)-2,5-diaza-bicyclo[2.2.2]oct-2-yl]-ethanone
 To a solution of 2-(4-fluoro-benzyl)-2,5-diaza-bicyclo[2.2.2]octane (0.026 mg, 0.12 mmol) in dichloroethane (1 ml) at 0°C is added (4-chloro-phenoxy)-acetyl chloride (28 mg, 0.13 mmol). The reaction mixture is slowly warmed to ambient temperature, and then quenched with saturated aqueous sodium hydrogen carbonate. The product is extracted with
 10 ethyl acetate, the organics are washed with brine, dried over magnesium sulfate, filtered and concentrated in vacuo to give the title compound (0.023 mg, 76%).

Example 87



- 15 5-Chloro-2-[2-[3-(4-fluoro-benzyl)-3,9-diaza-bicyclo[3.3.1]non-9-yl]-2-oxo-ethoxy]-benzamide

Piperidine-1,2,6-tricarboxylic acid 1-benzyl ester

- To a solution of pyridine-2,6-dicarboxylic acid (20.0 g, 0.119 mol) in 2M aqueous sodium hydroxide (150 ml) in a *par* bottle is added rhodium on aluminum (5%, 1.49 g). The resulting suspension is subjected to hydrogen gas (50 psi) for 72 hours, filtered through a pad
 20 of celite, the filter cake is washed with water. The filtrate is cooled to 0 °C and treated with benzyl chloro formate (24.2 g, 0.142 mol) in tetrahydrofuran (100 ml). The reaction mixture is stirred at ambient temperature for 5 hours. The reaction mixture is extracted with diethyl ether, the aqueous layer is acidified with 6N aqueous hydrochloric acid and then extracted with ethylacetate. The combined organics are dried over magnesium sulfate, filtered and
 25 concentrated in vacuo. Titration with ethylacetate gave the title compound (18.0 g, 48%).

3-(4-Fluoro-benzyl)-2,4-dioxo-3,9-diaza-bicyclo[3.3.1]nonane-9-carboxylic acid benzyl ester

- A solution of piperidine-1,2,6-tricarboxylic acid 1-benzyl ester (18.0 g, 0.059 mol) in acetic anhydride (200 ml) is heated to 70 °C overnight. The reaction mixture is cooled to
 30 ambient temperature, concentrated in vacuo, and the residue is azeotroped with toluene. The resulting oil is dissolved in toluene (200 ml) and treated with 4-fluorobenzyl amine (7.3 g, 0.059 mol). The reaction mixture is stirred at ambient temperature for 18 hours and then treated with acetic anhydride (20 ml) and heated to reflux for 16 hours. The reaction mixture

WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-74-

is cooled to 0 °C, poured into a mixture of saturated aqueous sodium hydrogen carbonate and crushed ice, and extracted with ethyl acetate. The combined organics are dried over magnesium sulfate, filtered and concentrated in vacuo. Silica gel chromatography gave the title compound (19.72 g, 84%)

5 3-(4-Fluoro-benzyl)-3,9-diaza-bicyclo[3.3.1]nonane-2,4-dione

To a solution of 3-(4-fluoro-benzyl)-2,4-dioxo-3,9-diaza-bicyclo[3.3.1]nonane-9-carboxylic acid benzyl ester (9.37 g, 0.023 mol) in ethanol (100 ml) is added cyclohexadiene (18.9 g, 0.23 mol) and palladium on carbon (10%, 5.0 g). The reaction mixture is stirred at ambient temperature for 90 minutes, then filtered through a pad of celite, the filter cake is washed with ethanol. The filtrate is concentrated to give the title compound (5.69 g, 94%).

10 3-(4-Fluoro-benzyl)-3,9-diaza-bicyclo[3.3.1]nonane

To a solution 0 °C of 3-(4-fluoro-benzyl)-3,9-diaza-bicyclo[3.3.1]nonane-2,4-dione (5.69 g, 0.0217 mol) in toluene (70 ml) is added Red-Al (20 ml, 0.100 mol). The reaction mixture is warmed to 60 °C for 4 hours, and then cooled to 0 °C and treated with water (50 ml), 1N aqueous sodium hydroxide (50 ml) and saturated aqueous ammonium chloride. The resulting mixture is filtered through a pad of celite, extracted with ethylacetate, and the combined organics are dried over magnesium sulfate, filtered and concentrated in vacuo to give the title compound (4.51 g, 88%).

15 2-chloro-1-[3-(4-fluoro-benzyl)-3,9-diaza-bicyclo[3.9.1]non-8-yl]-ethanone

20 To a solution of 3-(4-fluoro-benzyl)-3,9-diaza-bicyclo[3.9.1]nonane (0.65g, 2.77mmol) in dry dichloromethane (6 ml) at 0°C is added triethylamine (0.43 ml, 3.10 mmol) followed by chloroacetyl chloride (0.23 ml, 3.10 mmol). The resulting reaction mixture is stirred for two hours and concentrated in vacuo. Silica gel chromatography gave the title compound (0.53 g, 61%).

25 5-Chloro-2-[2-[3-(4-fluoro-benzyl)-3,9-diaza-bicyclo[3.3.1]non-9-yl]-2-oxo-ethoxy]-benzamide

To a solution of 2-chloro-1-[3-(4-fluoro-benzyl)-3,9-diaza-bicyclo[3.3.1]oct-8-yl]-ethanone (0.095g, 0.30 mmol) in butanone (4 ml) is added 2-hydroxy-5-chloro-benzamide (0.0057 g, 0.33 mmol), potassium carbonate (0.082 g, 0.60 mmol) and potassium iodide (0.0049 g, 0.30 mmol). The resulting mixture is stirred at reflux for 7 hours. The reaction is then cooled, diluted with ethyl acetate and washed with brine. The organic layers are dried over magnesium sulfate, filtered and concentrated in vacuo. Silica gel chromatography gave the title compound (0.090 g, 67%).


30 The title compounds for Examples 88-92 are prepared by a method analogous to that described in Example 87.

35


WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-75-



Example	R ¹	R ²
88	4-Cl	SO ₂ NH ₂
89	4-Cl	CO ₂ CH ₃
90	4-Cl	NHSO ₂ CH ₃
91	3-Cl	NO ₂
92	4-Cl	CH ₂ CO ₂ CH ₂ CH ₃


Example 93

5

5-Chloro-2-[2-[3-(4-fluoro-benzyl)-3,9-diaza-bicyclo[3.3.1]non-9-yl]-2-oxo-ethoxy]-benzoic acid

The title compound for Example 93 is prepared by a method analogous to that described in Example 20.

10

Example 94

(5-Chloro-2-[2-[3-(4-fluoro-benzyl)-3,9-diaza-bicyclo[3.3.1]non-9-yl]-2-oxo-ethoxy]-phenyl)-acetic acid

The title compound for Example 94 is prepared by a method analogous to that described in Example 20.


15

WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-76-


Example 95



2-(6-Chloro-3-nitro-pyridin-2-yloxy)-1-[3-(4-fluoro-benzyl)-3,9-diaza-bicyclo[3.3.1]non-9-yl]-ethanone

- 5 The title compound for Example 95 is prepared by a method analogous to that described in Example 15.


Example 96



5-Chloro-2-[2-[3-(4-fluoro-benzyl)-3,9-diaza-bicyclo[3.3.1]non-9-yl]-2-oxo-ethoxy]-nicotinamide

- 10 The title compound for Example 96 is prepared by a method analogous to that described in Example 15.

Example 97




2-(3-Amino-5-chloro-pyridin-2-yloxy)-1-[3-(4-fluoro-benzyl)-3,9-diaza-bicyclo[3.3.1]non-9-yl]-ethanone

- 15 The title compound for Example 97 is prepared by a method analogous to that described in Example 42.

WO 02/32901


PCT/IB01/01844

-77-

Example 98

N-((5-Chloro-2-(2-(3-(4-fluoro-benzyl)-3,9-diaza-bicyclo[3.3.1]non-9-yl)-2-oxo-ethoxy)-phenyl)-acetyl)-methanesulfonamide

- 5 The title compound for Example 98 is prepared by a method analogous to that described in Example 30.

Example 99

- 10 5-Chloro-2-(2-(3-(4-fluoro-benzyl)-3,9-diaza-bicyclo[3.3.1]non-9-yl)-2-oxo-ethoxy)-N-(1H-tetrazol-5-yl)-benzamide

The title compound for Example 98 is prepared by a method analogous to that described in Example 30.


WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-78-

CLAIMS

1. A compound of the formula



5 or the pharmaceutically acceptable salt and pro-drugs thereof; wherein

a is 1, 2, 3, 4 or 5;

c is 0 or 1;

d is 1, 2, 3, 4 or 5;

k is 0, 1, 2, 3 or 4; l is 0, 1, 2, 3 or 4; m is 0, 1, 2, 3, or 4; k, l and m cannot all be 0

10 and if m and/or k are not 0, then l must be 0;

W is CH or N;

X is C(O), C(S) or CH₂;Y is CH₂;Z is oxygen, NR⁹ or CR¹¹R¹²;15 each R¹ is independently selected from hydrogen, hydroxy, hydroxysulfonyl, halo,(C₁-C₆)alkyl, mercapto, mercapto(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)alkylthio, (C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₁-C₆)alkylthio(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)alkoxy, (C₆-C₁₀)aryloxy, halo(C₁-C₆)alkyl, trifluoromethyl,formyl, formyl(C₁-C₆)alkyl, nitro, nitroso, cyano, (C₆-C₁₀)aryl(C₁-C₆)alkoxy, halo(C₁-C₆)alkoxy,20 trifluoromethoxy, (C₃-C₇)cycloalkyl, (C₃-C₇)cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, hydroxy(C₃-C₇)cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, (C₃-C₇)cycloalkylamino, (C₃-C₇)cycloalkylamino(C₁-C₆)alkyl, ((C₃-C₇)cycloalkyl)((C₁-C₆)alkyl)amino, ((C₃-C₇)cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl)amino(C₁-C₆)alkyl, cyano(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₇)alkenyl, (C₂-C₇)alkynyl, (C₆-C₁₀)aryl, (C₆-C₁₀)aryl(C₁-C₆)alkyl, (C₆-C₁₀)aryl(C₂-C₆)alkenyl,hydroxy(C₁-C₆)alkyl, hydroxy(C₆-C₁₀)aryl(C₁-C₆)alkyl, hydroxy(C₁-C₆)alkylthio(C₁-C₆)alkyl,25 hydroxy(C₂-C₆)alkenyl, hydroxy(C₂-C₆)alkynyl, (C₁-C₆)alkoxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)alkoxy(C₆-C₁₀)aryl(C₁-C₆)alkyl, (C₆-C₁₀)aryloxy(C₁-C₆)alkyl, (C₆-C₁₀)aryl(C₁-C₆)alkoxy(C₁-C₆)alkyl, amino,(C₁-C₆)alkylamino, ((C₁-C₆)alkyl)₂amino, (C₆-C₁₀)arylamino, (C₆-C₁₀)aryl(C₁-C₆)alkylamino,amino(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)alkylamino(C₁-C₆)alkyl, ((C₁-C₆)alkyl)₂amino(C₁-C₆)alkyl,hydroxy(C₁-C₆)alkylamino(C₁-C₆)alkyl, (C₆-C₁₀)arylamino(C₁-C₆)alkyl, (C₆-C₁₀)aryl(C₁-30 C₆)alkylamino(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)alkylcarbonylamino, ((C₁-C₆)alkylcarbonyl)((C₁-C₆)alkyl)amino, (C₁-C₆)alkylcarbonylamino(C₁-C₆)alkyl, ((C₁-C₆)alkylcarbonyl)((C₁-

C₆)alkyl)amino(C₁-C₈)alkyl, (C₁-C₈)alkoxycarbonylamino, (C₁-C₈)alkoxycarbonyl)(C₁-C₈)alkylamino, (C₁-C₈)alkoxyxcarbonylamino(C₁-C₈)alkyl, (C₁-C₈)alkoxyxcarbonyl)((C₁-C₈)alkyl)amino(C₁-C₈)alkyl, alkoxy, (C₁-C₈)alkoxycarbonyl, (C₉-C₁₀)aryl(C₁-C₈)alkylalkoxycarbonyl, (C₁-C₈)alkylcarbonyl, ((C₁-C₈)alkylamino(C₁-C₈)alkyl, (C₉-C₁₀)arylcabonyl, (C₉-C₁₀)arylcabonyl(C₁-C₈)alkyl, (C₉-C₁₀)aryl((C₁-C₈)alkylcarbonyl, (C₉-C₁₀)aryl(C₁-C₈)alkylcarbonyl(C₁-C₈)alkyl, carboxy(C₁-C₈)alkyl, (C₁-C₈)alkoxyxcarbonyl(C₁-C₈)alkyl, (C₉-C₁₀)aryl(C₁-C₈)alkoxycarbonyl(C₁-C₈)alkyl, (C₁-C₈)alkoxy(C₁-C₈)alkylalcoholoxyl(C₁-C₈)alkyl, aminocarbonyl, (C₁-C₈)alkylaminocarbonyl, ((C₁-C₈)alkyl)₂aminocarbonyl, (C₉-C₁₀)arylaminoacarbonyl, (C₉-C₁₀)aryl(C₁-C₈)alkylaminocarbonyl, aminocarbonyl(C₁-C₈)alkyl, (C₁-C₈)alkylaminocarbonyl(C₁-C₈)alkyl, ((C₁-C₈)alkyl)₂aminocarbonyl(C₁-C₈)alkyl, (C₉-C₁₀)arylaminoacarbonyl(C₁-C₈)alkyl, (C₁-C₈)alkylaminocarbonyl(C₁-C₈)alkyl, amidino, guanidino, ureido, (C₁-C₈)alkylureido, ((C₁-C₈)alkyl)₂ureido, ureido(C₁-C₈)alkyl, (C₁-C₈)alkylureido(C₁-C₈)alkyl, ((C₁-C₈)alkyl)₂ureido(C₁-C₈)alkyl, (C₂-C₇)heterocyaloalkyl, (C₂-C₇)heteroaryl, (C₂-C₇)heterocycloalkyl(C₁-C₈)alkyl and (C₂-C₇)heteroaryl(C₁-C₈)alkyl;

R⁴ is (R⁵Q₆)(C₂-C₁₀)afly, (R⁵Q₆)(C₂-C₁₀)cycloalkyl, (R⁵Q₆)(C₂-C₈)heteroaryl, (R⁵Q₆)(C₂-C₉)heterocycloalkyl,

wherein f is 0, 1, 2, 3, 4 or 5;

Q is (C₁-C₈)alkyl;

q is 0 or 1;

R⁵ is independently selected from: (C₂-C₉)heterocycloalkylcarbonyl, (C₂-C₉)heteroarylcarbonyl, (C₂-C₉)heteroaryl((C₁-C₈)alkylaminocarbonyl, (C₂-C₉)heteroarylaminocarbonyl, (C₂-C₉)heterocycloalkyl(C₁-C₈)alkylaminocarbonyl, (C₁-C₈)alkylsulfonylaminoacarbonyl, (C₁-C₈)alkylsulfonylamino(C₁-C₈)alkylaminocarbonyl, (C₁-C₈)alkylureido(C₁-C₈)alkylaminocarbonyl, ((C₁-C₈)alkyl)₂ureido(C₁-C₈)alkylaminocarbonyl, halo(C₁-C₈)alkylaminocarbonyl, (C₁-C₈)alkylcarbonylamino(C₁-C₈)alkylaminocarbonyl, hydroxy(C₁-C₈)alkylaminocarbonyl, amino(sulfonyl)(C₁-C₈)alkylaminocarbonyl, carboxy(C₁-C₈)alkylaminocarbonyl, (C₁-C₈)alkylaminosulfonyl(C₁-C₈)alkylaminocarbonyl, amino(C₁-C₈)alkylcarbonylamino, (C₁-C₈)alkylamino(C₁-C₈)alkylcarbonylamino, carboxy(C₁-C₈)alkylcarbonylamino, carboxy(C₁-C₈)alkoxycarbonylamino, ((C₁-C₈)alkyl)₂amino(C₁-C₈)alkylcarbonylamino, acetylmino(C₁-C₈)alkylcarbonylamino, (acetyl)((C₁-C₈)alkyl)amino(C₁-C₈)alkylcarbonylamino, (C₁-C₈)alkylsulfonylamino(C₁-C₈)alkylcarbonylamino, cyanoguanidin(C₁-C₈)alkylcarbonylamino, (C₁-C₈)alkylcyanoguanidin(C₁-C₈)alkylcarbonylamino, ((C₁-C₈)alkyl)₂cyanoguanidino(C₁-C₈)alkylcarbonylamino, aminocarbonyl(C₁-C₈)alkylcarbonylamino, aminocarbonylamino(C₁-C₈)alkylcarbonylamino, (C₁-C₈)alkylaminocarbonylamino(C₁-C₈)alkylcarbonylamino, ((C₁-C₈)alkyl)₂

- C_6 alkyl) $_2$ aminocarbonylamino(C_1 - C_6)alkylcarbonylamino, (C_2 - C_6)heteroaryl(C_1 - C_6)alkylcarbonylamino, (C_2 - C_6)heterocycloalkyl(C_1 - C_6)alkylcarbonylamino, aminosulfonyl(C_1 - C_6)alkylcarbonylamino, hydroxy(C_1 - C_6)alkylureido, amino(C_1 - C_6)alkylureido, (C_1 - C_6)alkylamino(C_1 - C_6)alkylureido, ((C_1 - C_6)alkyl) $_2$ amino(C_1 - C_6)alkylureido, (C_2 - C_6)heterocycloalkyl(C_1 - C_6)alkylureido, (C_2 - C_6)heteroarylureido, (C_2 - C_6)heteroaryl(C_1 - C_6)alkylureido, (C_1 - C_6)alkylsulfonyleido, aminosulfonyl(C_1 - C_6)alkylureido, aminocarbonyl(C_1 - C_6)alkylureido, (C_1 - C_6)alkylaminocarbonyl(C_1 - C_6)alkylureido, ((C_1 - C_6)alkyl) $_2$ aminocarbonyl(C_1 - C_6)alkylureido, acetylamino(C_1 - C_6)alkylureido, (acetyl)((C_1 - C_6)alkyl)amino(C_1 - C_6)alkylureido, carboxy(C_1 - C_6)alkylureido, halo(C_1 - C_6)alkylsulfonyleido, amino(C_1 - C_6)alkylsulfonyleido, (C_1 - C_6)alkylamino(C_1 - C_6)alkylsulfonyleido, ((C_1 - C_6)alkyl) $_2$ amino(C_1 - C_6)alkylsulfonyleido, acetylamino(C_1 - C_6)alkylsulfonyleido, (acetyl)((C_1 - C_6)alkyl)amino(C_1 - C_6)alkylsulfonyleido, ureido(C_1 - C_6)alkylsulfonyleido, (C_1 - C_6)alkylureido(C_1 - C_6)alkylsulfonyleido, ((C_1 - C_6)alkyl) $_2$ ureido(C_1 - C_6)alkylsulfonyleido, (C_1 - C_6)alkylsulfonyleido(C_1 - C_6)alkylsulfonyleido, cyanoguanidino(C_1 - C_6)alkylsulfonyleido, carboxy(C_1 - C_6)alkylsulfonyleido, (C_1 - C_6)alkylcyanoguanidino(C_1 - C_6)alkylsulfonyleido, ((C_1 - C_6)alkyl) $_2$ cyanoguanidino(C_1 - C_6)alkylsulfonyleido, aminocarbonyl(C_1 - C_6)alkylsulfonyleido, (C_1 - C_6)alkoxy carbonylamino(C_1 - C_6)alkylsulfonyleido, aminosulfonylamino carbonyl, (C_1 - C_6)alkylaminosulfonylamino carbonyl, ((C_1 - C_6)alkyl) $_2$ aminosulfonylamino carbonyl, (C_6 - C_{10})arylsulfonyl, (C_1 - C_6)alkylaminosulfonylamino, ((C_1 - C_6)alkyl) $_2$ aminosulfonylamino, aminocarbonyl(C_1 - C_6)alkylamino(C_1 - C_6)alkylsulfonyleido, (C_2 - C_6)heterocycloalkyloxycarbonylamino(C_1 - C_6)alkylsulfonyleido, (C_2 - C_6)heteroaryloxycarbonylamino(C_1 - C_6)alkylsulfonyleido, cyanoguanidino, (C_1 - C_6)alkylcyanoguanidino, ((C_1 - C_6)alkyl) $_2$ cyanoguanidino, (C_2 - C_6)heterocycloalkylcyanoguanidino, (C_2 - C_6)heterocycloalkyl(C_1 - C_6)alkylcyanoguanidino, (C_2 - C_6)heteroaryl(C_1 - C_6)alkylcyanoguanidino, amino(C_1 - C_6)alkylcyanoguanidino, (C_1 - C_6)alkylamino(C_1 - C_6)alkylcyanoguanidino, ((C_1 - C_6)alkyl) $_2$ amino(C_1 - C_6)alkylcyanoguanidino, aminocarbonyl(C_1 - C_6)alkylcyanoguanidino, carboxy(C_1 - C_6)alkylcyanoguanidino; (C_1 - C_6)alkylaminocarbonyl(C_1 - C_6)alkylcyanoguanidino, ((C_1 - C_6)alkyl) $_2$ aminocarbonyl(C_1 - C_6)alkylcyanoguanidino, hydroxy(C_1 - C_6)alkylamino, aminocarbonyl(C_1 - C_6)alkylamino, carboxy(C_1 - C_6)alkylamino, (C_1 - C_6)alkylsulfonyleido(C_1 - C_6)alkylamino, (C_1 - C_6)alkoxy carbonylamino(C_1 - C_6)alkylamino, aminosulfonyl(C_1 - C_6)alkylamino, (C_2 - C_6)heteroaryl(C_1 - C_6)alkylamino, acetylamino(C_1 - C_6)alkylamino, (acetyl)((C_1 - C_6)alkyl)amino(C_1 - C_6)alkylamino, (C_2 - C_6)heterocycloalkyl(C_1 - C_6)alkylamino, ((C_1 - C_6)alkyl) $_2$ amino(C_1 - C_6)alkylamino, (C_1 - C_6)alkylamino(C_1 - C_6)alkylamino, (C_1 - C_6)alkoxy(C_1 - C_6)alkylamino, (C_1 - C_6)alkoxy carbonyl(C_1 - C_6)alkylamino, cyano(C_1 - C_6)alkylamino, (C_2 - C_6)heterocycloalkyloxycarbonylamino(C_1 - C_6)alkylamino, (C_2 -

[illegible]

C_6 alkylsulfonyl, (C_6-C_{10}) arylsulfonyl, (C_2-C_6) heteroarylsulfonyl, (C_1-C_6) alkoxy, hydroxy(C_1-C_6)alkoxy, (C_6-C_{10}) aryloxy, trifluoro(C_1-C_6)alkyl, formyl, nitro, nitroso, cyano halo(C_1-C_6)alkoxy, trifluoro(C_1-C_6)alkoxy, amino(C_1-C_6)alkoxy, (C_3-C_{10}) cycloalkylhydroxy(C_3-C_{10})cycloalkyl (C_3-C_{10})cycloalkylamino(C_2-C_6)alkenyl, (C_2-C_6) alkynyl, (C_6-C_{10}) aryl, (C_6-C_{10}) aryl(C_2-C_6)alkenyl, hydroxy(C_6-C_{10})aryl, $((C_1-C_6)$ alkylamino)(C_6-C_{10})aryl, hydroxy(C_1-C_6)alkylthio, hydroxy(C_2-C_6)alkenyl, hydroxy(C_2-C_6)alkynyl, (C_1-C_6) alkoxy(C_6-C_{10})aryl, (C_6-C_{10}) aryl(C_1-C_6)alkoxy, amino, (C_1-C_6) alkylamino, $((C_1-C_6)$ alkyl) $_2$ amino, (C_6-C_{10}) arylamino, (C_6-C_{10}) aryl(C_1-C_6)alkylamino, amino(C_1-C_6)alkylamino, (C_2-C_6) heterocycloalkylamino, (C_2-C_6) heteroarylamino, (C_2-C_6) heteroaryl(C_1-C_6)alkylamino, (C_2-C_6) heterocycloalkyl(C_1-C_6)alkylamino, (C_3-C_{10}) cycloalkyl(C_1-C_6)alkylamino, (C_1-C_6) alkylcarbonylamino, (C_1-C_6) alkoxycarbonylamino, (C_2-C_6) alkenylcarbonylamino, (C_3-C_{10}) cycloalkylcarbonylamino, (C_6-C_{10}) arylcarbonylamino, (C_2-C_6) heterocycloalkylcarbonylamino, (C_2-C_6) heteroaryloxy carbonylamino, (C_2-C_6) heterocycloalkoxy carbonylamino, halo(C_1-C_6)alkylcarbonylamino, (C_1-C_6) alkoxy(C_1-C_6)alkylcarbonylamino, (C_1-C_6) alkoxycarbonyl(C_1-C_6)alkylcarbonylamino, $((C_1-C_6)$ alkylcarbonyl)(C_1-C_6)alkylamino, $((C_1-C_6)$ alkoxy carbonyl)(C_1-C_6)alkylamino, (C_1-C_6) alkylsulfonylamino, $((C_1-C_6)$ alkylcarbonyl)(C_1-C_6)alkylamino, (C_3-C_{10}) cycloalkyl(C_1-C_6)alkylamino, $((C_1-C_6)$ alkylsulfonyl)(C_1-C_6)alkylamino, (C_2-C_6) heteroarylsulfonylamino, (C_6-C_{10}) arylsulfonylamino, $((C_6-C_{10})$ arylsulfonyl)(C_1-C_6)alkylamino, carboxy, (C_1-C_6) alkoxycarbonyl, (C_6-C_{10}) aryl(C_1-C_6)alkoxycarbonyl, (C_1-C_6) alkylcarbonyl, carboxy(C_1-C_6)alkylcarbonyl, amino(C_1-C_6)alkylcarbonyl, (C_1-C_6) alkylamino(C_1-C_6)alkylcarbonyl, $((C_1-C_6)$ alkyl) $_2$ amino(C_1-C_6)alkylcarbonyl, (C_6-C_{10}) arylcarbonyl, (C_2-C_6) heteroaryl(C_1-C_6)alkylcarbonyl, (C_6-C_{10}) aryl(C_1-C_6)alkylcarbonyl, hydroxy(C_1-C_6)alkoxycarbonyl, (C_1-C_6) alkoxy(C_1-C_6)alkylcarbonyloxy, $((C_1-C_6)$ alkyl) $_2$ aminocarbonyloxyaminocarbonyl, hydroxyaminocarbonyl, (C_1-C_6) alkylaminocarbonyl, $((C_1-C_6)$ alkyl) $_2$ aminocarbonyl, (C_6-C_{10}) arylaminocarbonyl, (C_6-C_{10}) aryl(C_1-C_6)alkylaminocarbonyl, (aminocarbonyl)(C_1-C_6)alkylaminocarbonyl, $((C_1-C_6)$ alkylaminocarbonyl)(C_1-C_6)alkylaminocarbonyl, (carboxy(C_1-C_6)alkyl)aminocarbonyl, $((C_1-C_6)$ alkoxycarbonyl(C_1-C_6)alkylaminocarbonyl, (amino(C_1-C_6)alkyl)aminocarbonyl, (hydroxy(C_1-C_6)alkylaminocarbonyl)amido, hydroxyamidino, guanidino, ureido, (C_1-C_6) alkylureido, (C_6-C_{10}) arylureido, $((C_6-C_{10})$ aryl) $_2$ ureido, (C_6-C_{10}) aryl(C_1-C_6)alkylureido, halo(C_1-C_6)alkylureido, $((C_1-C_6)$ alkyl)($C_6-C_{10})$ arylureido, $((C_1-C_6)$ alkyl) $_2$ ureido, halo(C_1-C_6)alkylcarbonylureido, (halo(C_1-C_6)alkyl)(C_1-C_6)alkylureido, $((C_1-C_6)$ alkoxycarbonyl(C_1-C_6)alkyl)ureido, glycnamido, (C_1-C_6) alkylglycinamido, aminocarbonylglycinamido, (C_1-C_6) alkoxy(C_1-C_6)alkylcarbonylglycinamido, (aminocarbonyl)(C_1-C_6)alkylglycinamido, $((C_1-C_6)$ alkoxycarbonyl(C_1-C_6)alkylcarbonyl)(C_1-C_6)alkylglycinamido, $((C_1-C_6)$ alkoxycarbonylamino(C_1-C_6)alkylcarbonyl)glycinamido, (C_6-C_{10}) arylcarbonylglycinamido,

((C₆-C₁₀)arylcarbonyl)((C₁-C₆)alkyl)glycinamido, ((C₆-C₁₀)aryl(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl)glycinamido, (C₆-C₁₀)aryl((C₁-C₆)alkylaminocarbonyl)((C₁-C₆)alkyl)glycinamido, (C₆-C₁₀)arylaminoacetylaminoglycinamido, ((C₆-C₁₀)arylaminoacetylaminocarbonyl)((C₁-C₆)alkyl)glycinamido, alaninamido, (C₁-C₆)alkylalaninamido, (C₂-C₆)heteroaryl, amino(C₂-C₆)heteroaryl, (C₁-C₆)alkylamino(C₂-C₆)heteroaryl, ((C₁-C₆)alkyl)₂amino(C₂-C₆)heteroaryl, (C₂-C₆)heteroaryloxy, (C₂-C₆)heterocycloalkyl, carboxy(C₁-C₆)alkoxy, (C₁-C₆)alkylsulfonylaminoacetylaminocarbonyl(C₁-C₆)alkoxy, (C₁-C₆)alkylsulfonylamino(C₁-C₆)alkoxy, (C₂-C₆)heteroaryl((C₁-C₆)alkoxy, carboxy(C₁-C₆)alkylamino(C₂-C₆)alkoxy, amino(C₂-C₆)alkoxy, (aminocarbonyl)(hydroxy)amino, (C₁-C₆)alkylamino(C₂-C₆)alkoxy, ((C₁-C₆)alkyl)₂amino(C₂-C₆)alkoxy, (C₁-C₆)alkylcarbonylamino(C₂-C₆)alkoxy, aminocarbonylamino(C₂-C₆)alkoxy, (C₁-C₆)alkylaminocarbonylamino(C₂-C₆)alkoxy, ((C₁-C₆)alkyl)₂aminocarbonylamino(C₂-C₆)alkoxy, amino(C₂-C₆)alkoxycarbonylamino, (C₁-C₆)alkylamino(C₂-C₆)alkoxycarbonylamino, ((C₁-C₆)alkyl)₂amino(C₂-C₆)alkoxycarbonylamino, (C₂-C₆)heteroarylamino(C₂-C₆)alkoxy, barbituryl, (C₁-C₆)alkylcarbonylamino(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, amino(C₁-C₆)alkylcarbonylamino where the (C₁-C₆)alkyl is optionally substituted with one or two groups selected from hydrogen, amino, hydroxyl, (C₁-C₆)alkoxy, carboxy, further substituted (C₂-C₆)heteroaryl, (C₆-C₁₀)aryl, (C₂-C₆)heterocycloalkyl, and cycloalkyl, or the two groups together make up a carbocycle; and R¹⁹ carbonylamino where R¹⁹ is a nitrogen containing (C₂-C₆)heterocycloalkyl which is optionally substituted further with one or two groups selected from (C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)alkoxy and hydroxy;

R⁸ is selected from the group consisting of hydrogen, (C₁-C₆)alkyl, (C₆-C₁₀)aryl, (C₆-C₁₀)aryl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)alkylcarbonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₆-C₁₀)aryl(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₆-C₁₀)aryl(C₁-C₆)alkylcarbonyl(C₁-C₆)alkyl, aminocarbonyl, (C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, ((C₁-C₆)alkyl)₂aminocarbonyl and (C₁-C₆)alkoxycarbonyl; and

R¹¹ and R¹² are each independently selected from the group consisting of hydrogen, (C₁-C₆)alkyl, (C₆-C₁₀)aryl, (C₆-C₁₀)aryl(C₁-C₆)alkyl, hydroxy, (C₁-C₆)alkoxy, hydroxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)alkoxy(C₁-C₆)alkyl, amino, (C₁-C₆)alkylamino, ((C₁-C₆)alkyl)₂amino, (C₁-C₆)alkylcarbonylamino, (C₃-C₆)cycloalkylcarbonylamino, (C₃-C₆)cycloalkyl(C₁-C₆)alkylcarbonylamino, (C₁-C₆)alkoxycarbonylamino, (C₁-C₆)alkylsulfonylamino, (C₆-C₁₀)arylcarbonylamino, (C₁-C₆)alkoxycarbonyl(C₁-C₆)alkylcarbonylamino, (C₆-C₁₀)aryl(C₁-C₆)alkylcarbonylamino, ((C₆-C₁₀)aryl(C₁-C₆)alkylcarbonyl)((C₁-C₆)alkyl)amino, (C₁-C₆)alkylcarbonylamino(C₁-C₆)alkyl, (C₃-C₆)cycloalkylcarbonylamino(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)alkoxycarbonylamino(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)heterocycloalkylcarbonylamino(C₁-C₆)alkyl, (C₆-C₁₀)aryl(C₁-C₆)alkylcarbonylamino(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)heteroarylcarbonylamino(C₁-C₆)alkyl, (C₆-C₁₀)aryl(C₁-C₆)alkylsulfonylamino, (C₁-C₆)alkylsulfonylamino(C₁-C₆)alkyl, aminocarbonylamino, (C₁-C₆)alkylaminocarbonylamino, halo(C₁-C₆)alkylaminocarbonylamino, ((C₁-C₆)alkylaminocarbonyl)glycinamido,

WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-84-

- C_6 alkyl)₂aminocarbonylamino, aminocarbonylamino(C_1 - C_6)alkyl, (C_1 - C_6)alkylaminocarbonylamino(C_1 - C_6)alkyl, ((C_1 - C_6)alkyl)₂aminocarbonylamino(C_1 - C_6)alkyl, halo(C_1 - C_6)alkylaminocarbonylamino(C_1 - C_6)alkyl, amino(C_1 - C_6)alkyl, (C_1 - C_6)alkylamino(C_1 - C_6)alkyl, ((C_1 - C_6)alkyl)₂amino(C_1 - C_6)alkyl, carboxy(C_1 - C_6)alkyl, (C_1 - C_6)alkoxycarbonyl(C_1 - C_6)alkyl, aminocarbonyl(C_1 - C_6)alkyl and (C_1 - C_6)alkylaminocarbonyl(C_1 - C_6)alkyl.
2. A compound according to claim 1, wherein R^1 is hydrogen, halo, cyano, nitro, trifluoromethyl, trifluoromethoxy, (C_1 - C_6)alkyl, hydroxy or (C_1 - C_6)alkylcarbonyloxy.
3. A compound according to claim 1, wherein c is 1; X is C(O) or CH₂; d is 1; and Z is oxygen, NH, (C_1 - C_6)alkyl, or CR¹¹R¹².
- 10 4. A compound according to claim 1, wherein R⁴ is (R⁵)₁(C₆-C₁₀)aryl or (R⁵)₁(C₂-C₉)heteroaryl, wherein f is 1 or 2.
5. A compound according to claim 1, wherein c is 1; X is C(O); d is 1; Z is oxygen or (C_1 - C_6)alkyl; W is nitrogen or CH; and l, m and k are zero, zero and 2 or 3 respectively, or k, l, and m are zero, zero and 2 or 3 respectively.
- 15 6. A compound according to claim 1, wherein R⁴ is phenyl, Q is (C_1 - C_6)alkyl, q is 0 or 1, and at least one R⁵ is selected from: (C₂-C₉)heteroarylaminocarbonyl, (C₂-C₉)heteroarylcarbonylamino, (C_1 -C₆)alkylsulfonylamino, aminosulfonylamino, carboxy(C_1 -C₆)alkylcyanoguanidino, carboxy, (C₂-C₉)heteroaryl, (C₂-C₉)heteroarylsulfonyl, (C₂-C₉)heteroaryl (C₂-C₉)heteroaryloxy, (C₂-C₉)heteroarylcarbonyl, (C₂-C₉)heteroaryl(C C_1 -C₆)alkylcarbonyl, carboxy(C_1 -C₆)alkylaminocarbonylamino, (C₂-C₉)heteroarylaminocarbonylamino, carboxy(C_1 -C₆)alkylcarbonylamino, (C₂-C₉)heteroaryl(C_1 -C₆)alkylamino, carboxy(C_1 -C₆)alkylaminocarbonyl, carboxy(C_1 -C₆)alkylsulfonylamino, (C₂-C₉)heteroarylaminosulfonyl, carboxy(C_1 -C₆)alkylsulfonyl, carboxy(C_1 -C₆)alkylamino, carboxy(C_1 -C₆)alkylcarbonyl, carboxy(C_1 -C₆)alkoxy, carboxy(C_1 -C₆)alkoxycarbonylamino, hydroxyaminocarbonyl, (C_1 -C₆)alkylsulfonylamino, (C_1 -C₆)alkoxy, (C₂-C₉)heteroaryl(C_1 -C₆)alkoxy, carboxy(C_1 -C₆)alkylamino(C₂-C₆)alkoxy, (C₂-C₉)heteroaryl(C₂-C₆)alkoxy, amino(C_1 -C₆)alkylcarbonyl, (C_1 -C₆)alkylamino(C_1 -C₆)alkylcarbonyl, ((C_1 -C₆)alkyl)₂amino(C_1 -C₆)alkylcarbonyl, amino(C_1 -C₆)alkylcarbonylamino, (C_1 -C₆)alkylamino(C_1 -C₆)alkylcarbonylamino, ((C_1 -C₆)alkyl)₂amino(C_1 -C₆)alkylcarbonylamino, amino(C_1 -C₆)alkylureido, (C_1 -C₆)alkylamino(C_1 -C₆)alkylureido, ((C_1 -C₆)alkyl)₂amino(C_1 -C₆)alkylureido, amino(C_1 -C₆)alkylsulfonylamino, (C_1 -C₆)alkylamino(C_1 -C₆)alkylsulfonylamino, ((C_1 -C₆)alkyl)₂amino(C_1 -C₆)alkylsulfonylamino, amino(C_1 -C₆)alkylsulfonyl, (C_1 -C₆)alkylamino(C_1 -C₆)alkylsulfonyl, ((C_1 -C₆)alkyl)₂amino(C_1 -C₆)alkylsulfonyl, amino(C_1 -C₆)alkylcyanoguanidino, (C_1 -C₆)alkylamino(C_1 -C₆)alkylcyanoguanidino, ((C_1 -C₆)alkyl)₂amino(C_1 -C₆)alkylcyanoguanidino, amino(C_1 -C₆)alkylaminosulfonyl, (C_1 -C₆)alkylamino(C_1 -C₆)alkylaminosulfonyl, ((C_1 -C₆)alkyl)₂amino(C_1 -C₆)alkylaminosulfonyl, ((C_1 -C₆)alkylamino)(C₆-

C₁₀)aryl(C₁-C₆)alkyl, amino, amino(C₁-C₆)alkoxy, amino(C₁-C₆)alkoxycarbonylamino, (C₁-C₆)alkylamino, ((C₁-C₆)alkyl)₂amino, (C₆-C₁₀)arylamino, (C₆-C₁₀)aryl(C₁-C₆)alkylamino, amino(C₁-C₆)alkylamino, (C₂-C₆)heterocycloalkylamino, (C₂-C₆)heteroarylamino, (C₃-C₁₀)cycloalkyl(C₁-C₆)alkylamino, (amino(C₁-C₆)alkyl)aminocarbonyl, glycylamido, (C₁-C₆)alkylglycylamido, alaninamido, (C₁-C₆)alkylalaninamido, ((C₁-C₆)alkyl)₂ amino(C₁-C₆)alkylcarbonylamino, halo, (C₁-C₆)alkoxy, (C₁-C₆)alkyl, halo(C₁-C₆)alkyl, aminocarbonyl(C₁-C₆)alkylureido, (C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)alkylsulfonylamino, (C₁-C₆)alkylsulfonylamino(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, aminosulfonyl, aminocarbonyl, ureido(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, aminocarbonyl(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, aminocarbonyl(C₁-C₆)alkylcarbonylamino, ureido(C₁-C₆)alkylcarbonylamino, (C₁-C₆)alkylcarbonylamino(C₁-C₆)alkylcarbonylamino, (C₁-C₆)alkylcarbonylamino(C₁-C₆)alkylaminocarbonylamino, ureido(C₁-C₆)alkylaminocarbonylamino, ureido(C₁-C₆)alkylcarbonylamino, ureido, halo(C₁-C₆)alkylsulfonylamino, (C₁-C₆)alkylcarbonylamino(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl.

7. A compound according to claim 1, wherein R⁴ is pyridyl, Q is (C₁-C₆)alkyl, q is 0 or 1, and at least one R⁶ is selected from: (C₂-C₆)heteroarylaminocarbonyl, (C₂-C₆)heteroarylcarbonylamino, (C₁-C₆)alkylsulfonylamino, aminosulfonylamino, carboxy(C₁-C₆)alkylcyanoguanidino, carboxy, (C₂-C₆)heteroarylamine, (C₂-C₆)heteroarylsulfonyl, (C₂-C₆)heteroaryl (C₂-C₆)heteroaryloxy, (C₂-C₆)heteroarylcarbonyl, (C₂-C₆)heteroaryl(C₁-C₆)alkylcarbonyl, carboxy(C₁-C₆)alkylaminocarbonylamino, (C₂-C₆)heteroarylaminocarbonylamino, carboxy(C₁-C₆)alkylcarbonylamino, (C₂-C₆)heteroaryl(C₁-C₆)alkylamino, carboxy(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, carboxy(C₁-C₆)alkylsulfonylamino, (C₂-C₆)heteroarylaminosulfonyl, carboxy(C₁-C₆)alkylsulfonyl, carboxy(C₁-C₆)alkylamino, carboxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, carboxy(C₁-C₆)alkoxy, carboxy(C₁-C₆)alkoxycarbonylamino, hydroxyaminocarbonyl, (C₁-C₆)alkylsulfonylamino, (C₁-C₆)alkoxy, (C₂-C₆)heteroaryl(C₁-C₆)alkoxy, carboxy(C₁-C₆)alkylamino(C₂-C₆)alkoxy, (C₂-C₆)heteroarylamine(C₂-C₆)alkoxy, amino(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)alkylamino(C₁-C₆)alkylcarbonyl, ((C₁-C₆)alkyl)₂amino(C₁-C₆)alkylcarbonyl, amino(C₁-C₆)alkylcarbonylamino, (C₁-C₆)alkylamino(C₁-C₆)alkylcarbonylamino, ((C₁-C₆)alkyl)₂amino(C₁-C₆)alkylcarbonylamino, amino(C₁-C₆)alkylureido, (C₁-C₆)alkylamino(C₁-C₆)alkylureido, ((C₁-C₆)alkyl)₂amino(C₁-C₆)alkylureido, amino(C₁-C₆)alkylsulfonylamino, (C₁-C₆)alkylamino(C₁-C₆)alkylsulfonylamino, ((C₁-C₆)alkyl)₂amino(C₁-C₆)alkylsulfonylamino, amino(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₁-C₆)alkylamino(C₁-C₆)alkylsulfonyl, ((C₁-C₆)alkyl)₂amino(C₁-C₆)alkylsulfonyl, amino(C₁-C₆)alkylcyanoguanidino, (C₁-C₆)alkylamino(C₁-C₆)alkylcyanoguanidino, ((C₁-C₆)alkyl)₂amino(C₁-C₆)alkylcyanoguanidino, amino(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl, (C₁-C₆)alkylamino(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl, ((C₁-C₆)alkyl)₂amino(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl, ((C₁-C₆)alkylamino)(C₆-C₁₀)aryl(C₁-C₆)alkyl, amino, amino(C₁-C₆)alkoxy, amino(C₁-C₆)alkoxycarbonylamino, (C₁-C₆)alkylamino, ((C₁-C₆)alkyl)₂amino, (C₆-C₁₀)arylamino, (C₆-C₁₀)aryl(C₁-C₆)alkylamino,

WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-86-

amino(C₁-C₆)alkylamino, (C₂-C₆)heterocycloalkylamino, (C₂-C₆)heteroarylamino, (C₃-C₁₀)cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl)amino, (amino(C₁-C₆)alkyl)aminocarbonyl, glycinamido, (C₁-C₆)alkylglycinamido, alaninamido, (C₁-C₆)alkylalaninamido, ((C₁-C₆)alkyl)₂ amino(C₁-C₆)alkylcarbonylamino, aminocarbonyl(C₁-C₆)alkylureido, (C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)alkylsulfonfylamino, (C₁-C₆)alkylsulfonfylamino(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, aminosulfonfyl, aminocarbonyl, ureido(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, aminocarbonyl(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, aminocarbonyl(C₁-C₆)alkylcarbonylamino, ureido(C₁-C₆)alkylcarbonylamino, (C₁-C₆)alkylcarbonylamino(C₁-C₆)alkylcarbonylamino, (C₁-C₆)alkylcarbonylamino(C₁-C₆)alkylaminocarbonylamino, ureido(C₁-C₆)alkylcarbonylamino, ureido, halo(C₁-C₆)alkylsulfonfylamino, (C₁-C₆)alkylcarbonylamino(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl.

8. Salts of a compound according to claim 1, where pharmaceutically acceptable counter-ions for acidic compounds are selected from alkali metal cations, alkaline earth metal cations ammonium or water-soluble amine addition salts, N-methylglucamine-(meglumine), the lower alkanolammonium and other base salts of pharmaceutically acceptable organic amines; and pharmaceutically acceptable salts selected from hydrochloride, hydrobromide, hydriodide, nitrate, sulfate, bisulfate, phosphate, acid phosphate, acetate, lactate, citrate, acid citrate, tartrate, bitartrate, succinate, maleate, fumarate, gluconate, saccharate, benzoate, methanesulfonate, ethanesulfonate, benzenesulfonate, p-toluenesulfonate and pamoatesalts.

9. A pharmaceutical composition for treating or preventing a disorder or condition selected from autoimmune diseases, rheumatoid arthritis, type 1 diabetes (recent onset), lupus, inflammatory bowel disease, optic neuritis, psoriasis, multiple sclerosis, polymyalgia rheumatica, uveitis, and vasculitis, acute and chronic inflammatory conditions osteoarthritis, adult Respiratory Distress Syndrome, Respiratory Distress Syndrome of Infancy, ischemia reperfusion injury, glomerulonephritis, and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) allergic conditions, asthma and atopic dermatitis, inflammation associated with infection, viral inflammation, Influenza, hepatitis and Guillian-Barre, chronic bronchitis, chronic or acute tissue, cell, and solid organ transplant rejection, xeno-transplantation, atherosclerosis, restenosis, HIV infectivity (co-receptor usage), and granulomatous diseases, sarcoidosis, leprosy and tuberculosis, and sequelae associated with cancers, multiple myeloma; limiting the production of cytokines and/or TNF at inflammatory sites, as a consequence of decreasing cell infiltration; for treating diseases and/or congestive heart failure, linked to TNF and IL-1 and for treating pulmonary emphysema or dyspnea associated therewith, emphysema; HIV-1, HIV-2, HIV-3; cytomegalovirus (CMV), adenoviruses, Herpes viruses (*Herpes zoster* and *Herpes simplex*), for treating sequelae associated with infection where such infection induces production of detrimental inflammatory cytokines and/or TNF, fungal

WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-87-

meningitis, joint tissue damage, hyperplasia, pannus formation and bone resorption, psoriatic arthritis, hepatic failure, bacterial meningitis, Kawasaki syndrome, myocardial infarction, acute liver failure, Lyme disease, septic shock, cancer, trauma, and malaria, in a mammal, comprising an amount of a compound according to claim 1, or a pharmaceutically acceptable salt or pro-drug thereof, that is effective in treating or preventing such disorder or condition and a pharmaceutically acceptable carrier.

10. A pharmaceutical composition for treating or preventing a disorder or condition that can be treated or prevented by inhibiting chemokine binding to the receptor CCR1 in a mammal, comprising an amount of a compound according to claim 1, or a pharmaceutically acceptable salt or pro-drug thereof, effective in treating or preventing such disorder or condition and a pharmaceutically acceptable carrier.

11. A method for treating or preventing a disorder or condition selected from autoimmune diseases, rheumatoid arthritis, type I diabetes (recent onset), lupus, inflammatory bowel disease, optic neuritis, psoriasis, multiple sclerosis, polymyalgia rheumatica, uveitis, and vasculitis, acute and chronic inflammatory conditions osteoarthritis, adult Respiratory Distress Syndrome, Respiratory Distress Syndrome of Infancy, ischemia reperfusion injury, glomerulonephritis, and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) allergic conditions, asthma and atopic dermatitis, inflammation associated with infection, viral inflammation, influenza, hepatitis and Guillian-Barre, chronic bronchitis, chronic or acute tissue, cell, and solid organ transplant rejection, xeno-transplantation, atherosclerosis, restenosis, HIV infectivity (co-receptor usage), and granulomatous diseases, sarcoidosis, leprosy and tuberculosis, and sequelae associated with cancers, multiple myeloma; limiting the production of cytokines and/or TNF at inflammatory sites, as a consequence of decreasing cell infiltration; for treating diseases and/or congestive heart failure, linked to TNF and IL-1 and for treating pulmonary emphysema or dyspnea associated therewith, emphysema; HIV-1, HIV-2, HIV-3; cytomegalovirus (CMV), adenoviruses, Herpes viruses (*Herpes zoster* and *Herpes simplex*), for treating sequelae associated with infection where such infection induces production of detrimental inflammatory cytokines and/or TNF, fungal meningitis, joint tissue damage, hyperplasia, pannus formation and bone resorption, psoriatic arthritis, hepatic failure, bacterial meningitis, Kawasaki syndrome, myocardial infarction, acute liver failure, Lyme disease, septic shock, cancer, trauma, and malaria, in a mammal, comprising administering to a mammal in need of such treatment or prevention an amount of a compound according to claim 1, or a pharmaceutically acceptable salt or pro-drug thereof, that is effective in treating or preventing such disorder or condition.

12. A method for treating or preventing a disorder or condition that can be treated or prevented by antagonizing the CCR1 receptor in a mammal, comprising administering to a

WO 02/32901

PCT/IB01/01844

-88-

mammal in need of such treatment or prevention an amount of a compound according to claim 1, or a pharmaceutically acceptable salt or pro-drug thereof, that is effective in treating or preventing such disorder or condition.

13. A pharmaceutical composition for treating or preventing a disorder or condition
 5 selected from autoimmune diseases, rheumatoid arthritis, type I diabetes (recent onset), lupus, inflammatory bowel disease, optic neuritis, psoriasis, multiple sclerosis, polymyalgia rheumatica, uveitis, and vasculitis; acute and chronic inflammatory conditions osteoarthritis, adult Respiratory Distress Syndrome, Respiratory Distress Syndrome of infancy, ischemia reperfusion injury, glomerulonephritis, and chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
 10 allergic conditions, asthma and atopic dermatitis, inflammation associated with infection, viral inflammation, influenza, hepatitis and Guillian-Barre, chronic bronchitis, chronic or acute tissue, cell, and solid organ transplant rejection, xeno-transplantation, atherosclerosis, restenosis, HIV infectivity (co-receptor usage), and granulomatous diseases, sarcoidosis, leprosy and tuberculosis, and sequelae associated with cancers, multiple myeloma; limiting
 15 the production of cytokines and/or TNF at inflammatory sites, as a consequence of decreasing cell infiltration; for treating diseases and/or congestive heart failure, linked to TNF and IL-1 and for treating pulmonary emphysema or dyspnea associated therewith, emphysema; HIV-1, HIV-2, HIV-3; cytomegalovirus (CMV), adenoviruses, Herpes viruses (*Herpes zoster* and *Herpes simplex*), for treating sequelae associated with infection where
 20 such infection induces production of detrimental inflammatory cytokines and/or TNF, fungal meningitis, joint tissue damage, hyperplasia, pannus formation and bone resorption, psoriatic arthritis, hepatic failure, bacterial meningitis, Kawasaki syndrome, myocardial infarction, acute liver failure, Lyme disease, septic shock, cancer, trauma, and malaria, in a mammal, comprising a CCR1 receptor antagonizing effective amount of a compound according to claim
 25 1, or a pharmaceutically acceptable salt thereof, and a pharmaceutically acceptable carrier.

14. A pharmaceutical composition for treating or preventing a disorder or condition that can be treated or prevented by antagonizing the CCR1 receptor in a mammal, comprising a CCR1 receptor antagonizing effective amount of a compound according to claim 1, or a pharmaceutically acceptable salt or pro-drug thereof, and a pharmaceutically acceptable carrier.

【国際公開パンフレット（コレクトバージョン）】

(12) INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(19) World Intellectual Property Organization
International Bureau(43) International Publication Date
25 April 2002 (25.04.2002)

PCT

(10) International Publication Number
WO 02/032901 A3(51) International Patent Classification: C07D 487/08
A61K 31/4995, A61P 29/00, 57/00, C07D 451/02, 471/08
// (C07D 487/08, 241:00, 209:00) (C07D 487/08, 241:00,
241:00) (C07D 471/08, 241:00, 221:00)

(21) International Application Number: PCT/IB01/01844

(22) International Filing Date: 4 October 2001 (04.10.2001)

(25) Filing Language: English

(26) Publication Language: English

(30) Priority Data: 60/241,804 19 October 2000 (19.10.2000) US

(71) Applicant (for all designated States except US): **PFIZER
PRODUCTS INC.** [US/US]; Eastern Point Road, Groton,
CT 06340 (US).


(72) Inventors; and

(75) Inventors/Applicants (for US only): **BLUMBERG,
Laura, Cook** [US/US]; Pfizer Global Research and
Development, Eastern Point Road, Groton, CT 06340
(US). **BROWN, Matthew, Frank** [US/US]; Pfizer Global
Research and Development, Eastern Point Road, Groton,
CT 06340 (US). **GLAUDE, Ronald, Paul** [US/US]; Pfizer
Global Research and Development, Eastern Point Road,
Groton, CT 06340 (US). **POSS, Christopher, Stanley**
[US/US]; Pfizer Global Research and Development, Eastern
Point Road, Groton, CT 06340 (US).(74) Agents: **LUMB, J., Trevor** et al.; c/o Simpson, Alison,
Urquhart-Dykes & Lord, 39 Welbeck Street, London W1G
8ER (GB).(81) Designated States (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU,
AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU,
CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH,
GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC,
LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW,
MX, MZ, NO, NZ, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI,
SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU,
ZA, ZW.(84) Designated States (regional): ARIPO patent (GI, GM,
KL, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), Eurasian
patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), European
patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE,
IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI patent (BF, BJ, CF,
CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD,
TG).

Published:

with international search report
before the expiration of the time limit for amending the
claims and to be republished in the event of receipt of
amendments(88) Date of publication of the international search report:
25 July 2002For two-letter codes and other abbreviations, refer to the "Guid-
ance Notes on Codes and Abbreviations" appearing at the begin-
ning of each regular issue of the PCT Gazette.

(54) Title: BRIDGED PIPERAZINE DERIVATIVES

(57) Abstract: A compound of the formula (I) or the pharmaceutically acceptable salt thereof; wherein a, c, d, k, l, m, W, X, Y, Z, R¹, and R⁴ are as defined, and useful to treat inflammation and other immune disorders.

WO 02/032901 A3

【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		Inventor's Application No. PCT/IB 01/01844
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 C07D487/08 A61K31/4995 A61P29/00 A61P37/00 C07D451/02 C07D471/08 //(C07D487/08, 241:00, 209:00), (C07D487/08, 241:00, 241:00), (C07D471/08, 241:00, 221:00) According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 C07D A61K A61P Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data, CHEM ABS Data		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	PENNING, THOMAS D. ET AL: "Structure-Activity Relationship Studies on 1-(2-(4-Phenylphenoxy)ethyl)pyrrolidine (SC-22716), a Potent Inhibitor of Leukotriene A4 (LTA4) Hydrolase" JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY (2000), 43(4), 721-735 XP002197495 abstract and table 1, compound 31	1,9
X	WO 00 051984 A (MERCK SHARP & DOHME LIMITED, UK) 8 September 2000 (2000-09-08) page 12, line 21 -page 13, line 2; claims 1,12; example 23 --- -/--	1,9
☒ Further documents are listed in the continuation of box C. ☒ Patent family members are listed in annex.		
* Special categories of cited documents: *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance *E* earlier document but published on or after the international filing date *L* document which may throw doubts on priority claims or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed *I* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art *B* document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search		Date of mailing of the international search report
25 April 2002		16/05/2002
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5618 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel: (+31-70) 340-3040, Tx: 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016		Authorized officer Alfaro Faus, I

Form PCT/ISA/21C (second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

 International Application No.
 PCT/IB 01/01844

C (Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 0 324 543 A (PFIZER LTD., UK) 19 July 1989 (1989-07-19) page 11, preparation 10 ---	1
X	WO 97 40049 A (SANOCHEMIA) 30 October 1997 (1997-10-30) page 17; example 109 ---	1
X	DATABASE CA 'Online! CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US; NIKITSKAYA, E. S. ET AL: "Synthesis and pharmacological properties of 9-alkylaminoalkyl- substituted 3-benzyl-3,9-diazabicyclo[3.3.1]nonanes" retrieved from STN Database accession no. 71:30448 XP002197496 abstract and compounds 1 - 10 & KHIM.-FARM. ZH. (1969), 3(2), 7-10 , ---	1,9
X	DATABASE CA 'Online! CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US; NIKITSKAYA, E. S. ET AL: "The synthesis and pharmacological study of symmetric bisquaternary salts of 3-benzyl-3,9-diazabicyclo[3.3.1]nonane" retrieved from STN Database accession no. 69:34567 XP002197497 compounds 1 - 6 & KHIM.-FARM. ZH. (1968), 2(4), 9-12 , ---	1
P,X	VILLA S ET AL: "3,8-Diazabicyclo-[3.2.1]-octane derivatives as analogues of ambasilide, a Class III antiarrhythmic agent" EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, EDITIONS SCIENTIFIQUE ELSEVIER, PARIS, FR, vol. 36, no. 6, 1 June 2001 (2001-06-01), pages 495-506, XP004302689 ISSN: 0223-5234 compounds 2e-2g, tables I and II ---	1
P,X	WO 01 32179 A (MERCK + CO., INC., USA) 10 May 2001 (2001-05-10) examples 13-19, 22, 23 ---	1
A	WO 98 56771 A (SCHERING AG) 17 December 1998 (1998-12-17) page 1, paragraph 1; claim 1 ---	1,9

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No
PCT/IB 01/01844

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 00051984 4 A		NONE	
EP 0324543 A	19-07-1989	DK 11089 A EP 0324543 A2 FI 890147 A ,B, JP 1216992 A PT 89422 A ,B	14-07-1989 19-07-1989 14-07-1989 30-08-1989 08-02-1990
WO 9740049 A	30-10-1997	AT 403803 B AT 71696 A WO 9740049 A1 AU 2498597 A BG 102836 A CZ 9803324 A3 EP 0897387 A1 NO 984852 A PL 329411 A1	25-05-1998 15-10-1997 30-10-1997 12-11-1997 30-09-1999 12-05-1999 24-02-1999 16-11-1998 29-03-1999
WO 0132179 A	10-05-2001	AU 1654401 A WO 0132179 A1	14-05-2001 10-05-2001
WO 9856771 A	17-12-1998	US 6207665 B1 AU 735462 B2 AU 8625898 A EE 9900565 A WO 9856771 A2 EP 0988292 A2 HU 0003929 A2 JP 2002503239 T NO 996068 A PL 337758 A1 SK 171399 A3 TR 9903034 T2	27-03-2001 12-07-2001 30-12-1998 15-06-2000 17-12-1998 29-03-2000 28-05-2001 29-01-2002 11-02-2000 11-09-2000 12-09-2000 21-06-2000

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)

フロントページの続き

(51)Int.Cl. ⁷	F I	テーマコード (参考)
A 6 1 P 3/10	A 6 1 P 3/10	
A 6 1 P 9/04	A 6 1 P 9/04	
A 6 1 P 9/08	A 6 1 P 9/08	
A 6 1 P 9/10	A 6 1 P 9/10	
A 6 1 P 11/00	A 6 1 P 9/10	1 0 1
A 6 1 P 11/04	A 6 1 P 11/00	
A 6 1 P 11/06	A 6 1 P 11/04	
A 6 1 P 11/16	A 6 1 P 11/06	
A 6 1 P 13/12	A 6 1 P 11/16	
A 6 1 P 17/00	A 6 1 P 13/12	
A 6 1 P 17/06	A 6 1 P 17/00	
A 6 1 P 19/02	A 6 1 P 17/06	
A 6 1 P 19/08	A 6 1 P 19/02	
A 6 1 P 21/00	A 6 1 P 19/08	
A 6 1 P 25/00	A 6 1 P 21/00	
A 6 1 P 27/02	A 6 1 P 25/00	
A 6 1 P 29/00	A 6 1 P 27/02	
A 6 1 P 31/04	A 6 1 P 29/00	
A 6 1 P 31/06	A 6 1 P 29/00	1 0 1
A 6 1 P 31/08	A 6 1 P 31/04	
A 6 1 P 31/14	A 6 1 P 31/06	
A 6 1 P 31/16	A 6 1 P 31/08	
A 6 1 P 31/18	A 6 1 P 31/14	
A 6 1 P 31/20	A 6 1 P 31/16	
A 6 1 P 31/22	A 6 1 P 31/18	
A 6 1 P 33/06	A 6 1 P 31/20	
A 6 1 P 35/00	A 6 1 P 31/22	
A 6 1 P 37/02	A 6 1 P 33/06	
A 6 1 P 37/06	A 6 1 P 35/00	
A 6 1 P 37/08	A 6 1 P 37/02	
A 6 1 P 43/00	A 6 1 P 37/06	
C O 7 D 471/08	A 6 1 P 37/08	
C O 7 D 487/08	A 6 1 P 43/00	1 1 1
	C O 7 D 471/08	
	C O 7 D 487/08	

(81)指定国 AP(GH,GM,KE,LS,MW,MZ,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),EP(AT,BE,CH,CY,DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,IT,LU,MC,NL,PT,SE,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EC,EE,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KP,KR,KZ,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MZ,NO,NZ,PH,PL,PT,R,0,RU,SD,SE,SG,SI,SK,SL,TJ,TM,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VN,YU,ZA,ZW

(72)発明者 ブランバーク, ローラ クック
 アメリカ合衆国, コネチカット 0 6 3 4 0, グロトン, イースタン ポイント ロード, ファイ
 ザー グローバル リサーチ アンド ディベロップメント
 (72)発明者 ブラウン, マシュー フランク
 アメリカ合衆国, コネチカット 0 6 3 4 0, グロトン, イースタン ポイント ロード, ファイ

ザー グローバル リサーチ アンド ディベロップメント

(72)発明者 グラデュー, ロナルド ポール

アメリカ合衆国, コネチカット 06340, グロトン, イースタン ポイント ロード, ファイ

ザー グローバル リサーチ アンド ディベロップメント

(72)発明者 ポス, クリストファー スタンレー

アメリカ合衆国, コネチカット 06340, グロトン, イースタン ポイント ロード, ファイ

ザー グローバル リサーチ アンド ディベロップメント

F ターム(参考) 4C050 AA03 BB04 CC07 EE02 FF01 GG01 HH01

4C064 AA01 AA22 CC01 DD01 EE01 FF06 GG03

4C065 AA09 BB12 CC01 DD02 EE02 HH01 JJ01 KK01 LL01 PP03

4C086 AA01 AA02 AA03 BC50 CB15 MA01 MA04 NA14 ZA01 ZA33

ZA36 ZA39 ZA45 ZA59 ZA60 ZA66 ZA75 ZA81 ZA89 ZA96

ZB07 ZB08 ZB11 ZB13 ZB15 ZB26 ZB32 ZB33 ZB35 ZB38

ZC02 ZC35 ZC55