



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104474125 A

(43) 申请公布日 2015. 04. 01

(21) 申请号 201410681026. 7

(22) 申请日 2014. 11. 25

(71) 申请人 四川金堂海纳生物医药技术研究所
地址 610499 四川省成都市金堂县赵镇新生
村三组 1 幢 2 楼

(72) 发明人 夏瑜

(51) Int. Cl.

A61K 36/815(2006. 01)

A61P 5/06(2006. 01)

A61K 35/586(2015. 01)

权利要求书1页 说明书5页

(54) 发明名称

一种治疗席汉氏综合征的内服中药液及其制备方法

(57) 摘要

一种治疗席汉氏综合征的内服中药液及其制备方法,所述中药液的各个组分及其质量份比为:肉苁蓉、枸杞子、巴戟天、锁阳、菟丝子、女贞子、旱莲草、龟板、丹参、川芎、炙黄芪、焦山楂、炙甘草各1-3份。该中药液的制备方法包括如下步骤:按照质量份比选购优质干净的一级肉苁蓉、枸杞子、巴戟天、锁阳、菟丝子、女贞子、旱莲草、龟板、丹参、川芎、炙黄芪、焦山楂、炙甘草,分别拣去残余杂质后,于冷开水中浸泡半小时后备用;将浸泡好的药物和浸泡药物的澄清液一并放入到煎药机内,注入适量的冷开水煎制两次,第一次煎制55分钟,滤取药液后,再次注入微温开水进行第二次煎制50分钟,合并浓缩成50%的中药液1665毫升,装袋密封即可。

1. 一种治疗席汉氏综合征的内服中药液,其特征在於,所述中药液各个组分及其质量份比如下所示:

肉苁蓉	1-3 份;
枸杞子	1-3 份;
巴戟天	1-3 份;
锁阳	1-3 份;
菟丝子	1-3 份;
女贞子	1-3 份;
旱莲草	1-3 份;
龟板	1-3 份;
丹参	1-3 份;
川芎	1-3 份;
炙黄芪	1-3 份;
焦山楂	1-3 份;
炙甘草	1-3 份。

2. 根据权利要求 1 所述的治疗席汉氏综合征的内服中药液,其特征在於,所述中药液各个组分及其质量份比如下所示:

肉苁蓉	1 份;
枸杞子	1 份;
巴戟天	1 份;
锁阳	1 份;
菟丝子	1 份;
女贞子	1 份;
旱莲草	1 份;
龟板	1 份;
丹参	1 份;
川芎	1 份;
炙黄芪	1 份;
焦山楂	1 份;
炙甘草	1 份。

3. 一种权利要求 1 或 2 所述的治疗席汉氏综合征的内服中药液及其制备方法,其特征在於,所述方法包括如下步骤:

A、按照质量份比选购优质干净的一级肉苁蓉、枸杞子、巴戟天、锁阳、菟丝子、女贞子、旱莲草、龟板、丹参、川芎、炙黄芪、焦山楂、炙甘草,分别拣去残余杂质后,于冷开水中浸泡半小时后备用;

B、将浸泡好的药物和浸泡药物的澄清液一并放入到煎药机内,注入适量的冷开水煎制两次,第一次煎制 55 分钟,滤取药液后,再次注入微温开水进行第二次煎制 50 分钟,合并浓缩成 50% 的中药液 1665 毫升,装袋密封即可。

一种治疗席汉氏综合征的内服中药液及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及中草药技术领域,具体涉及一种治疗席汉氏综合征的内服中药液,特别是供人类席汉氏综合征患者使用的内服中药液及其制备方法的领域。

背景技术

[0002] 席汉氏综合症,是由一百多年前席汉氏 (Sheehan) 发现的一种综合症,当产后发生大出血,休克时间过长,就可造成脑垂体前叶功能减退的后遗症,表现为消瘦,乏力,脱发,畏寒,闭经,乳房萎缩等,严重者可致死,临床上称之为席汉氏综合症,其症状是:a、有原发病因可查:如产后大出血、垂体肿瘤、垂体手术或放射治疗、颅脑外伤、感染或炎症(结核、梅毒、脑膜脑炎)、全身性疾病(白血病、淋巴瘤、脑动脉硬化、营养不良)以及免疫性垂体炎等;b、促性腺激素和泌乳素分泌不足症群:产后无乳,闭经,阴、腋、眉毛脱落、稀疏(男性胡须稀少)、性欲减退、消失,外生殖器萎缩,子宫、乳房萎缩(男性阳痿,睾丸、前列腺萎缩);c、促甲状腺激素不足症群:少气懒言、表情淡漠、智力减退、动作迟缓、食欲减退、畏寒、少汗、皮肤干燥、面部虚肿苍黄、甚至出现粘液性水肿等;d、促肾上腺皮质激素不足症群:头晕、虚弱无力、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、体重减轻、血压下降、易感染和晕厥、甚至休克、昏迷等;e、垂体危象:如有各种应激、感染、手术、外伤、精神刺激、消化道疾病、某些药物(镇静、麻醉剂和降糖药等)均可使原发病加重而诱发危象发生。

[0003] 那么,就如何找到一种可有效治疗席汉氏综合征的中草药,是我们目前急需解决的问题。

发明内容

[0004] 本发明的目的是提供一种治疗席汉氏综合征的内服中药液及其制备方法,以解决席汉氏综合征患者早日康复的问题。该药物是以常见的中草药为原料,具有配伍完善,药力强大,充分体现了温肾补阳和下暖胞宫的治疗原则。

[0005] 为达到上述发明的目的,本发明所采用的技术方案为:提供一种治疗席汉氏综合征的内服中药液,其特征在于,所述中药液的各个组分及其质量份比如下所示:

肉苁蓉	1-3 份;
枸杞子	1-3 份;
巴戟天	1-3 份;
锁阳	1-3 份;
菟丝子	1-3 份;
女贞子	1-3 份;
旱莲草	1-3 份;
龟板	1-3 份;
丹参	1-3 份;
川芎	1-3 份;

炙黄芪 1-3 份；
焦山楂 1-3 份；
炙甘草 1-3 份。

[0006] 按照本发明所提供的治疗席汉氏综合征的内服中药液，其特征在于，所述中药液的各个组分及其质量份比如下所示：

肉苁蓉 1 份；
枸杞子 1 份；
巴戟天 1 份；
锁阳 1 份；
菟丝子 1 份；
女贞子 1 份；
旱莲草 1 份；
龟板 1 份；
丹参 1 份；
川芎 1 份；
炙黄芪 1 份；
焦山楂 1 份；
炙甘草 1 份。

[0007] 一种治疗席汉氏综合征的内服中药液及其制备方法，其特征在于，所述方法包括如下步骤：

A、选购优质干净的一级肉苁蓉 1 份、枸杞子 1 份、巴戟天 1 份、锁阳 1 份、菟丝子 1 份、女贞子 1 份、旱莲草 1 份、龟板 1 份、丹参 1 份、川芎 1 份、炙黄芪 1 份、焦山楂 1 份、炙甘草 1 份，分别拣去残余杂质后，于冷开水中浸泡半小时后备用；

B、将浸泡好的药物和浸泡药物的澄清液一并放入到煎药机内，注入适量的冷开水煎制两次，第一次煎制 55 分钟，滤取药液后，再次注入微温开水进行第二次煎制 50 分钟，合并浓缩成 50% 的中药液 1665 毫升，装袋密封即可。

[0008] 一种治疗席汉氏综合征的内服中药液及其制备方法，其特征在于，所述服用方法为：将煎制好的中药液分 3 天服用，早中晚各服一次，给药量 185 毫升 / 次，饭前服。服药 25-32 剂后，病获痊愈。

[0009] 本发明所提供的中药液为内服中药组合物，其以常见的中草药为原料，充分发挥各组分的药性：

肉苁蓉，性味：甘、咸、温，具有补肾阳、益精血、润肠通便之功效，用于治疗肾虚阳痿、不孕、遗精早泄及腰膝冷痛、筋骨痿弱、肠燥便秘；

枸杞子，性味：味甘、性平，具有滋补肝肾、益精养血、明目消翳、润肺止咳之功效，用于治疗肾虚骨痿、阳痿遗精、久不生育、早老早衰、须发早白、血虚萎黄、产后乳少、目暗不明、内外障眼、内热消渴、劳热骨蒸、虚癆咳嗽、干咳少痰等病证；

巴戟天，性味：味辛、甘、性微温，具有补肾助阳、强筋壮骨、祛风除湿之功效，用于治疗肾虚、少腹冷痛、小便不禁、宫冷、风寒湿痹、腰膝酸软、风湿肢气；

锁阳，性味：甘、温，锁阳又名“不老药”，为纯天然沙生药材，锁阳富含多种活性成份和

对人体有益的 15 种氨基酸，生长于戈壁沙漠地带，主产于我国西部地区，能补阴扶阳，男女通用，因其疗效神奇，故为历代名医所珍重，锁阳的作用早在明代《本草纲目》就有记述：补肾壮阳固精、强腰膝、益精血、润燥养筋和治萎弱之功效，临床主治阳痿早泄、血枯便秘、尿频、腰膝酸软、女子不孕、失眠脱发等病症，对于中老年尿频和早泄有着独特的效果，目前没有替代的药物，最新国内外研究发现：锁阳还具有明显的防癌、抗病毒、延缓衰老的作用；

菟丝子，性味：味甘、性温，具有滋补肝肾、固精缩尿、安胎、明目、止泻之功效，用于治疗阳痿遗精、尿有余沥、遗尿尿频、腰膝酸软、目昏耳鸣、肾虚胎漏、胎动不安、脾肾虚泻，外治白癜风；

女贞子，性味：甘、苦、平，具有补益肝肾、清虚热、强腰膝、明耳目、乌须发之功效，用于治疗头昏目眩、腰膝酸软、遗精、耳鸣、须发早白、目暗不明等病；

旱莲草，性味：性凉、味甘、酸，具有养阴补肾、凉血止血之功效，用于治疗肝肾阴虚之眩晕、须发早白、吐血、尿血、衄血、便血、带下、淋浊等；

龟板，性味：咸甘、平，具有滋阴、潜阳、补肾、健骨之功效，用于治疗肾阴不足、骨蒸劳热、吐血、衄血、久咳、遗精、崩漏、带下、腰痛、骨痿、阴虚风动、久痢、久疟，痔疮、小儿囟门不合；

丹参，性味：苦、微寒，具有活血调经、祛瘀止痛、凉血消痈、清心除烦、养血安神之功效，用于治疗月经不调、经闭痛经、症瘕积聚、胸腹刺痛、热痹疼痛、疮疡肿痛、心烦不眠、肝脾肿大、心绞痛等症；

川芎，性味：味辛、性温，具有活血祛瘀、行气开郁、祛风止痛之功效，用于治疗月经不调、经闭痛经、产后瘀滞腹痛、症瘕肿块、胸胁疼痛、头痛眩晕、风寒湿痹、跌打损伤、痈疽疮疡；

炙黄芪，性味：甘、温，具有补气固表、利尿托毒、排脓、敛疮生肌之功效，用于治疗气虚乏力、食少便溏、中气下陷、久泻脱肛、便血崩漏、表虚自汗、气虚水肿、痈疽难溃、久溃不敛、血虚痿黄、内热消渴，慢性肾炎蛋白尿，糖尿病；

焦山楂，性味：酸、甘、微温，具有消食积、散瘀血、驱绦虫之功效，治肉积、癥瘕、痰饮、痞满、吞酸、泻痢、肠风、腰痛、疝气产后儿枕痛、恶露不尽、小儿乳食停滞，消食健胃、行气散瘀，用于肉食积滞、胃皖胀满、泻痢腹痛、瘀血经闭、产后瘀阻、心腹刺痛、疝气疼痛、高血脂症；

炙甘草，性味：甘、平，具有补脾和胃、益气复脉之功效，用于治疗脾胃虚弱、倦怠乏力、心动悸、脉结代。

[0010] 服用时，将煎制好的中药液分 3 天服用，早中晚各服一次，给药量 185 毫升 / 次，饭前服。服药 25-32 剂后，病获痊愈。该中药液是以常见的中草药为原料，具有配伍完善，药力强大，充分体现了温肾补阳和下暖胞宫的治疗原则。

具体实施方式

[0011] 下面对本发明的实施方式进行详细的描述

席汉氏综合症，是由一百多年前席汉氏 (Sheehan) 发现的一种综合症，当产后发生大出血，休克时间过长，就可造成脑垂体前叶功能减退的后遗症，表现为消瘦，乏力，脱发，畏寒，闭经，乳房萎缩等，严重者可致死，临床上称之为席汉氏综合症，其症状是：a、有原发病

因可查：如产后大出血、垂体肿瘤、垂体手术或放射治疗、颅脑外伤、感染或炎症（结核、梅毒、脑膜脑炎）、全身性疾病（白血病、淋巴瘤、脑动脉硬化、营养不良）以及免疫性垂体炎等；b、促性腺激素和泌乳素分泌不足症群：产后无乳，闭经，阴、腋、眉毛脱落、稀疏（男性胡须稀少）、性欲减退、消失，外生殖器萎缩，子宫、乳房萎缩（男性阳痿，睾丸、前列腺萎缩）；c、促甲状腺激素不足症群：少气懒言、表情淡漠、智力减退、动作迟缓、食欲减退、畏寒、少汗、皮肤干燥、面部虚肿苍黄、甚至出现粘液性水肿等；d、促肾上腺皮质激素不足症群：头晕、虚弱无力、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、体重减轻、血压下降、易感染和晕厥甚至休克、昏迷等；e、垂体危象：如有各种应激、感染、手术、外伤、精神刺激、消化道疾病、某些药物（镇静、麻醉剂和降糖药等）均可使原发病加重而诱发危象发生。

[0012] 本发明就是针对上述席汉氏综合征的治疗而提出的一种中草药配方，采用该配方制备的中药液，药效好，疗效显著，毒副作用小，可有效治疗席汉氏综合征。下面对本发明所提供的具体实施例进行详细的描述。

[0013] 实施例 1：

选购优质干净的一级肉苁蓉 15 克、枸杞子 15 克、巴戟天 15 克、锁阳 13 克、菟丝子 13 克、女贞子 15 克、旱莲草 13 克、龟板 15 克、丹参 15 克、川芎 13 克、炙黄芪 18 克、焦山楂 13 克、炙甘草 13 克，分别拣去残余杂质后，于冷开水中浸泡半小时后备用；将浸泡好的药物和浸泡药物的澄清液一并放入到煎药机内，注入适量的冷开水煎制两次，第一次煎制 55 分钟，滤取药液后，再次注入微温开水进行第二次煎制 50 分钟，合并浓缩成 50% 的中药液 1665 毫升，装袋密封即可。使用时，将煎制好的中药液分 3 天服用，早中晚各服一次，给药量 185 毫升 / 次，饭前服。服药 25-28 剂后，病获痊愈。

[0014] 实施例 2：

选购优质干净的一级肉苁蓉 13 克、枸杞子 13 克、巴戟天 13 克、锁阳 10 克、菟丝子 10 克、女贞子 13 克、旱莲草 10 克、龟板 13 克、丹参 13 克、川芎 10 克、炙黄芪 16 克、焦山楂 10 克、炙甘草 10 克，分别拣去残余杂质后，于冷开水中浸泡半小时后备用；将浸泡好的药物和浸泡药物的澄清液一并放入到煎药机内，注入适量的冷开水煎制两次，第一次煎制 55 分钟，滤取药液后，再次注入微温开水进行第二次煎制 50 分钟，合并浓缩成 50% 的中药液 1665 毫升，装袋密封即可。使用时，将煎制好的中药液分 3 天服用，早中晚各服一次，给药量 185 毫升 / 次，饭前服。服药 25-32 剂后，病获痊愈。

[0015] 实施例 3：

选购优质干净的一级肉苁蓉 15 克、枸杞子 15 克、巴戟天 15 克、锁阳 13 克、菟丝子 13 克、女贞子 15 克、旱莲草 13 克、龟板 15 克、丹参 15 克、川芎 13 克、炙黄芪 18 克、焦山楂 13 克、炙甘草 13 克，分别拣去残余杂质后，于冷开水中浸泡半小时后备用；将浸泡好的药物和浸泡药物的澄清液一并放入到煎药机内，注入适量的冷开水煎制两次，第一次煎制 55 分钟，滤取药液后，再次注入微温开水进行第二次煎制 50 分钟，合并浓缩成 50% 的中药液 1665 毫升，装袋密封即可。使用时，将煎制好的中药液分 3 天服用，早中晚各服一次，给药量 185 毫升 / 次，饭前服。服药 25-29 剂后，病获痊愈。

[0016] 实施例 4：

选购优质干净的一级肉苁蓉 13 克、枸杞子 13 克、巴戟天 13 克、锁阳 10 克、菟丝子 10 克、女贞子 13 克、旱莲草 10 克、龟板 13 克、丹参 13 克、川芎 10 克、炙黄芪 16 克、焦山楂 10

克、炙甘草 10 克,分别拣去残余杂质后,于冷开水中浸泡半小时后备用;将浸泡好的药物和浸泡药物的澄清液一并放入到煎药机内,注入适量的冷开水煎制两次,第一次煎制 55 分钟,滤取药液后,再次注入微温开水进行第二次煎制 50 分钟,合并浓缩成 50% 的中药液 1665 毫升,装袋密封即可。使用时,将煎制好的中药液分 3 天服用,早中晚各服一次,给药量 185 毫升/次,饭前服。服药 25-31 剂后,病获痊愈。

[0017] 本发明经过对数百例患者的治疗,治疗效果显著,毒副作用小,部份典型病例如下。

[0018] 1、患者:林 XX、女、37 岁,住址:四川省简阳市

患病症状:于 2006 年 7 月 15 日初诊,患者结婚后孕二产一,人工流产多次,其末次人流为 2000 年 4 月 11 日。术后流血较多,月经量亦逐渐减少,形体日瘦,神疲乏力,畏寒怕冷,四肢不温,头晕耳鸣,腰膝酸软,声音嘶哑,毛发脱落,性欲减退。近期月经不行,经妇科检查,宫颈光滑,宫体萎缩如枣大小,经某医院诊治,诊断为席汉氏综合征。

[0019] 治疗:投以上方治疗,每日一剂,服药 15 剂后复诊,症状逐渐减轻,服药 10 剂,症状基本消失,嘱其再巩固服药 6 剂后,诸症消失,病获痊愈。随访 6 年,未见复发。

[0020] 2、患者:林 XX、女、28 岁,住址:四川省成都市

患病症状:患者于就诊前四个月分娩第二胎,产时大出血,曾多次血晕,产后十一天即感头晕,畏寒、食欲减退,举步伐力,乳汁缺少,恶心呕吐,继后乳房萎缩,头发脱落。时过两月,上述诸症加重,终日蜷卧床上,性欲减退,月经闭止,在病程中则见腋毛及阴毛脱落,经某医院诊治无效而前来求治。

[0021] 治疗:投以上方治疗,每日一剂,服药 15 剂后复诊,症状减轻过半,嘱其再继续服药 15 剂后,诸症全部消失,并痊愈。随访 5 年,未见复发。

[0022] 3、患者:周 XX、女、37 岁,住址:绵阳市

患病症状:患者于 2005 年 3 月 15 日初诊,患者结婚后产有一女婴,曾人工流产三次,其末次人流为 2011 年 5 月 7 日。术后流血过多,经量逐渐减少,并伴有神疲乏力、畏寒怕冷、四肢不温、头晕耳鸣、腰膝酸软、声音嘶哑、毛发脱落,性欲减退等,经某医院确为席汉氏综合征。

[0023] 治疗:投以上方治疗,每日一剂,服药 12 剂后复诊,症状亦逐渐减轻,服药 10 剂,症状基本消失,嘱其再巩固服药 8 剂后,诸症消失而痊愈。随访 3 年,未见复发。

[0024] 4、患者:陈 XX、女、34 岁,住址:四川省双流县

患病症状:就诊前半年分娩第一胎,产时发生大出血,曾三次血晕,产后几天即感头晕,畏寒、举步费力,乳汁欠缺,恶心呕吐,继后乳房萎缩,头发脱落,经镇医院诊治无效而前来求治。

[0025] 治疗:予以上方治疗,每日一剂,服药 20 剂后复诊,症状基本消失,嘱其再进药 10 剂后,诸症消失,并痊愈。随访 9 年,未见复发。