



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104306532 A

(43) 申请公布日 2015. 01. 28

(21) 申请号 201410479456. 0

(22) 申请日 2014. 09. 09

(71) 申请人 宋永花

地址 036800 山西省朔州市平鲁区榆岭乡上梨园村

(72) 发明人 宋永花

(51) Int. Cl.

A61K 36/804 (2006. 01)

A61P 9/14 (2006. 01)

权利要求书1页 说明书2页

(54) 发明名称

一种用于治疗下肢静脉曲张的中药

(57) 摘要

一种用于治疗下肢静脉曲张的中药,是由下列药物制备而成的:黄芪、党参、乳香、没药、当归、丹参、伸筋草、生地、白芍、甘草、荆芥、防风、羌活、紫草、金银花,将上述药物第一剂加水 700 毫升煎至 200 毫升,第二剂加水 500 毫升煎至 200 毫升,每日两次,早晚空腹。

1. 一种用于治疗下肢静脉曲张的中药,是由以下重量的药物制成的:

黄芪 15 克、党参 12 克、乳香 9 克、没药 9 克、当归 12 克、丹参 12 克、伸筋草 15 克、生地 30 克、白芍 15 克、甘草 9 克、荆芥 9 克、防风 9 克、羌活 9 克、紫草 9 克、金银花 12 克。

2. 根据权利要求 1 所述一种用于治疗下肢静脉曲张的中药,其特征是将所述药物用水煎服成汤剂口服。

一种用于治疗下肢静脉曲张的中药

技术领域：

[0001] 本发明涉及一种中药（属于中药技术领域），特别是涉及一种用于治疗下肢静脉曲张的中药。

背景技术：

[0002] 下肢静脉曲张多由于长久站立工作，致使血液循环障碍而使大隐或小隐静脉扩张、伸长和弯曲，患肢浮肿压之可陷的血管性皮肤病。与中医的“筋瘤”相似。《外科正宗》记载：“筋瘤者，坚而色紫，累累青筋盘曲，甚者结若蚯蚓”。又如《医宗金鉴·外科心法》记载：“坚硬紫色，累累青筋盘曲，若蚯蚓状者名筋瘤”。本病多因气滞血瘀，筋聚络阻所致。

[0003] 临床上治疗下肢静脉曲张较为棘手，一般的治疗口服舒筋活血类药物或中成药，治疗时间长，达不到治疗的目的。

发明内容：

[0004] 本发明是一种见效快、疗效好，无任何副作用的中药制剂。

[0005] 本发明的技术方案是由以下重量的中药为原料制备而成的：

[0006] 黄芪 15 克、党参 12 克、乳香 9 克、没药 9 克、当归 12 克、丹参 12 克、伸筋草 15 克、生地 30 克、白芍 15 克、甘草 9 克、荆芥 9 克、防风 9 克、羌活 9 克、紫草 9 克、金银花 12 克。

[0007] 可以将上述药物制成药剂学上的任何一种内服剂型，本发明优选的剂型是汤剂。

[0008] 本发明的药物的具体制备方法是：将上述药物第一剂加水 700 毫升煎至 200 毫升，第二剂加水 500 毫升煎至 200 毫升。

[0009] 使用方法是：将煎好的汤剂口服，每日两次，早晚空腹。

[0010] 中医认为治疗下肢静脉曲张应以益气活血、舒筋通络、散风消肿为治疗原则。方中黄芪、党参、乳香、没药、当归、丹参益气活血；伸筋草、生地、白芍、甘草舒筋通络；荆芥、防风、羌活、紫草、金银花散风消肿；上述药物配伍使用，协同作用，从而达到治疗的目的。

[0011] 本发明的药物疗效好、见效快、服用方便、无副作用，对下肢静脉曲张有很好的治疗效果。

[0012] 为进一步证明本发明药物的临床疗效和安全性。选择 72 例患者对本发明药物进行临床观察。

[0013] 72 例病人中，一个月为一个疗程，一个疗程痊愈者 20 例，二个疗程痊愈者 21 例，二个疗程以上痊愈者 29 例，无效 2 例。全部使用本发明进行治疗，每日一剂，每日两次，早晚空腹。

[0014] 疗效标准：显效：静脉扩张、伸长和弯曲症状消失；有效：静脉扩张、伸长和弯曲症状减轻或消失；无效：治疗前后无明显变化。

[0015] 表 1 治疗后疗效统计结果

[0016]

患者	例数	显效 (%)	有效 (%)	无效 (%)	总有效率 (%)
一个疗程痊愈者	20	18(90)	2(10)	0(0)	20(100)
二个疗程痊愈者	21	15(71.4)	6(29.6)	0(0)	21(100)
二个疗程以上痊愈者	31	15(48.4)	14(45.2)	2(6.4)	26(93.6)
总计	72	48(66.7)	22(30.6)	2(2.7)	67(97.3)

具体实施方式：

[0017] 黄芪 15 克、党参 12 克、乳香 9 克、没药 9 克、当归 12 克、丹参 12 克、伸筋草 15 克、生地 30 克、白芍 15 克、甘草 9 克、荆芥 9 克、防风 9 克、羌活 9 克、紫草 9 克、金银花 12 克。

[0018] 将上述药物混合后煎成汤剂，第一剂加水 700 毫升煎至 200 毫升，第二剂加水 500 毫升煎至 200 毫升，每日两次，早晚空服。