



(22) Date de dépôt/Filing Date: 2002/11/28

(41) Mise à la disp. pub./Open to Public Insp.: 2003/06/07

(30) Priorité/Priority: 2001/12/07 (0115858) FR

(51) Cl.Int.⁷/Int.Cl.⁷ A61K 7/42

(71) Demandeur/Applicant:
L'OREAL, FR

(72) Inventeur/Inventor:
CANDAU, DIDIER, FR


(74) Agent: ROBIC

(54) Titre : COMPOSITION FILTRANTE CONTENANT UN FILTRE DU TYPE DERIVE DU DIBENZOYLMETHANE ET UN
FILTRE DU TYPE DERIVE DE 2-HYDROXYBENZOPHENONE AMINOSUBSTITUE

(54) Title: FILTERING COMPOSITION CONTAINING A DIBENZOYLMETHANE DERIVED FILTER TYPE AND A 2-
HYDROXYBENZOPHENONE AMINOSUBSTITUTED DERIVED FILTER TYPE

(57) **Abrégé/Abstract:**

L'invention se rapporte à une composition cosmétique ou dermatologique, à usage topique, caractérisée par le fait qu'elle comprend au moins, dans un support cosmétiquement acceptable (a) au moins un filtre UV du type dérivé du dibenzoylméthane et (b) au moins un dérivé de 2-hydroxybenzophénone aminosubstitué particulier ; ladite composition ne contenant pas de p-méthylbenzylidénecamphre. L'invention se rapporte également à un procédé pour améliorer la stabilité vis-à-vis du rayonnement UV d'au moins un dérivé du dibenzoylméthane dans une composition cosmétique ou dermatologique ne contenant pas de p-méthylbenzylidénecamphre consistant à associer audit dérivé de dibenzoylméthane une quantité efficace d'au moins un dérivé de 2-hydroxybenzophénone aminosubstitué particulier.



ABREGE DESCRIPTIF

L'invention se rapporte à une composition cosmétique ou dermatologique, à usage topique, caractérisée par le fait qu'elle comprend au moins, dans un support cosmétiquement acceptable :

- (a) au moins un filtre UV du type dérivé du dibenzoylméthane et
 - (b) au moins un dérivé de 2-hydroxybenzophénone aminosubstitué particulier ;
- ladite composition ne contenant pas de p-méthylbenzylidèncamphre.

L'invention se rapporte également à un procédé pour améliorer la stabilité vis-à-vis du rayonnement UV d'au moins un dérivé du dibenzoylméthane dans une composition cosmétique ou dermatologique ne contenant de p-méthylbenzylidèncamphre consistant à associer audit dérivé de dibenzoylméthane une quantité efficace d'au moins un dérivé de 2-hydroxybenzophénone aminosubstitué particulier.

COMPOSITION FILTRANTE CONTENANT UN FILTRE DU TYPE DÉRIVÉ DU
DIBENZOYLMÉTHANE ET UN FILTRE DU TYPE DÉRIVÉ DE 2-
HYDROXYBENZOPHÉNONE AMINOSUBSTITUÉ

L'invention se rapporte à une composition cosmétique ou dermatologique, à usage topique, caractérisée par le fait qu'elle comprend au moins, dans un support cosmétiquement acceptable comprend :

- (a) au moins un filtre UV du type dérivé du dibenzoylméthane et
 - (b) au moins un dérivé de 2-hydroxybenzophénone aminosubstitué particulier ;
- ladite composition ne contenant pas de p-méthylbenzylidènenecamphre.

- 10 L'invention se rapporte également à un procédé pour améliorer la stabilité vis-à-vis du rayonnement UV d'au moins un dérivé du dibenzoylméthane présent dans une composition cosmétique ou dermatologique ne contenant de p-méthylbenzylidènenecamphre consistant à associer audit dérivé de dibenzoylméthane une quantité efficace d'au moins un dérivé de 2-hydroxybenzophénone aminosubstitué particulier.

On sait que les radiations lumineuses de longueurs d'onde comprises entre 280 nm et 400 nm permettent le brunissement de l'épiderme humain, et que les rayons de longueurs d'onde plus particulièrement comprises entre 280 et 320 nm, connus sous la dénomination UV-B, provoquent des érythèmes et des brûlures cutanées qui peuvent nuire au développement du bronzage naturel. Pour ces raisons ainsi que pour des raisons esthétiques, il existe une demande constante de moyens de contrôle de ce bronzage naturel en vue de contrôler ainsi la couleur de la peau ; il convient donc de filtrer ce rayonnement UV-B.

- 20 On sait également que les rayons UV-A, de longueurs d'onde comprises entre 320 et 400 nm, qui provoquent le brunissement de la peau, sont susceptibles d'induire une altération de celle-ci, notamment dans le cas d'une peau sensible ou d'une peau continuellement exposée au rayonnement solaire. Les rayons UV-A provoquent en particulier une perte d'élasticité de la peau et l'apparition de rides conduisant à un vieillissement cutané prématuré. Ils favorisent le déclenchement de la réaction érythémateuse ou amplifient cette réaction chez certains sujets et peuvent même être à l'origine de réactions phototoxiques ou photo-allergiques. Ainsi, pour des raisons esthétiques et cosmétiques telles que la conservation de l'élasticité naturelle de la peau par exemple, de plus en plus de gens désirent contrôler l'effet des rayons UV-A sur leur peau. Il est donc souhaitable de filtrer aussi le rayonnement UV-A.

- 30 A cet égard, une famille de filtres UV-A particulièrement intéressante est actuellement constituée par les dérivés du dibenzoylméthane, et notamment le 4-ter-butyl-4'-méthoxydibenzoyl méthane, qui présentent en effet un fort pouvoir d'absorption intrinsèque. Ces dérivés du dibenzoylméthane, qui sont maintenant des produits bien connus en soi à titre de filtres actifs dans les UV-A, sont notamment décrits dans les demandes de brevets français FR-A-2326405 et

FR-A-2440933, ainsi que dans la demande de brevet européen EP-A-0114607 ; le 4-ter-butyl- 4'-méthoxydibenzoyl méthane est par ailleurs actuellement proposé à la vente sous la dénomination commerciale de "PARSOL 1789" par la Société HOFFMANN LAROCHE.

5

Malheureusement, il se trouve que les dérivés du dibenzoylméthane sont des produits relativement sensibles au rayonnement ultraviolet (surtout UV-A), c'est-à-dire, plus précisément, qu'ils présentent une fâcheuse tendance à se dégrader plus ou moins rapidement sous l'action de ce dernier. Ainsi, ce manque
10 substantiel de stabilité photochimique des dérivés du dibenzoylméthane face au rayonnement ultraviolet auquel ils sont par nature destinés à être soumis, ne permet pas de garantir une protection constante durant une exposition solaire prolongée, de sorte que des applications répétées à intervalles de temps réguliers et rapprochés doivent être effectuées par l'utilisateur pour obtenir une protection
15 efficace de la peau contre les rayons UV.

20

La photostabilisation des dérivés du dibenzoylméthane vis-à-vis du rayonnement UV constitue, à ce jour, un problème qui n'a pas encore été résolu de manière complètement satisfaisante.

25

On connaît dans les demandes de brevet DE 100 12 408 et EP1046391 des compositions solaires de dérivés de 2-hydroxybenzophénone aminosubstitués pouvant contenir d'autres filtres complémentaires comme les dérivés de dibenzoylméthane en présence du p-méthylbenzylidèncamphre.

30

Or, la Demanderesse vient maintenant de découvrir, de façon surprenante, qu'en associant aux dérivés du dibenzoylméthane mentionnés ci-dessus une quantité d'au moins un dérivé de 2-hydroxybenzophénone aminosubstitué particulier, il était possible d'améliorer de manière substantielle et remarquable, la stabilité photochimique (ou photostabilité) de ces mêmes dérivés du dibenzoylméthane.

35

Ainsi, conformément à l'un des objets de la présente invention, il est maintenant proposé une nouvelle composition cosmétique ou dermatologique, à usage topique, caractérisée par le fait qu'elle comprend au moins, dans un support cosmétiquement acceptable :

- (a) au moins un filtre UV du type dérivé du dibenzoylméthane et
- (b) au moins un dérivé de 2-hydroxybenzophénone aminosubstitué de formule (I) que l'on définira plus loin ; ladite composition ne contenant pas de p-méthylbenzylidène camphre.

40

L'invention se rapporte également à un procédé pour améliorer la stabilité vis-à-vis du rayonnement UV d'au moins un dérivé du dibenzoylméthane dans une composition cosmétique ou dermatologique ne contenant de p-méthylbenzylidèncamphre consistant à associer audit dérivé de
45 dibenzoylméthane une quantité efficace d'au moins un dérivé de 2-hydroxybenzophénone aminosubstitué particulier.

50

Par quantité efficace de dérivé de 2-hydroxybenzophénone aminosubstitué conforme à l'invention, on entend une quantité suffisante pour obtenir une


amélioration notable et significative de la photostabilité du ou des dérivés du dibenzoylméthane de la composition cosmétique photoprotectrice. Cette quantité minimale en agent photostabilisant à mettre en œuvre, qui peut varier selon la nature du support cosmétiquement acceptable retenu pour la composition, peut être déterminée sans aucune difficulté au moyen d'un test classique de mesure de photostabilité.

La présente invention a également enfin pour objet l'utilisation d'un dérivé de 2-hydroxybenzophénone aminosubstitué de formule (I) dans la préparation d'une composition cosmétique ou dermatologique comprenant au moins un dérivé du dibenzoylméthane et ne contenant pas de p-méthylbenzylidènenecamphre dans le but de d'améliorer la stabilité vis-à-vis des rayons UV dudit dérivé de dibenzoylméthane contenu.

D'autres caractéristiques, aspects et avantages de la présente invention apparaîtront à la lecture de la description détaillée qui va suivre.

De façon préférentielle, le rapport en poids du dérivé de 2-hydroxybenzophénone aminosubstitué sur le dérivé de dibenzoylméthane est supérieur à 1

Les dérivés de 2-hydroxybenzophénone aminosubstitués conformes à l'invention répondent à la formule (I) suivante :



25

dans laquelle :

R¹ et R², identiques ou différents, désignent un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C₁-C₂₀, un radical alcényle en C₂-C₁₀, un radical cycloalkyle en C₃-C₁₀, un radical cycloalcényle en C₃-C₁₀ ;

30 R¹ et R² peuvent également former avec l'atome d'azote avec lequel ils sont liés un cycle à 5 ou 6 chaînons ;

R³ et R⁴, identiques ou différents, désignent un radical alkyle en C₁-C₂₀, un radical alcényle en C₂-C₁₀, un radical cycloalkyle en C₃-C₁₀, un radical cycloalcényle en C₃-C₁₀, un radical alcoxy en C₁-C₁₂, un radical (C₁-C₂₀)alcoxycarbonyle, un radical alkylamino en C₁-C₁₂, un radical dialkylamino en C₁-C₁₂, un radical aryle ou un hétéroaryle éventuellement substitué, un substituant hydrosolubilisant choisi parmi un groupe carboxylate, un groupe sulfonate ou un reste ammonium ;

35 X désigne un atome d'hydrogène, un groupe COOR⁵ ou CONR⁶R⁷ ;
R⁵, R⁶ et R⁷, identiques ou différents, désignent un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C₁-C₂₀, un radical alcényle en C₂-C₁₀, un radical cycloalkyle en C₃-C₁₀, un radical cycloalcényle en C₃-C₁₀, un groupe -(YO)₀-Z ou un groupe aryle ;

40 Y désigne -(CH₂)₂-, -(CH₂)₃-, -(CH₂)₄-, -CH-CH₃-CH₂- ;

Z représente -CH₂-CH₃, -CH₂CH₂CH₃, -CH₂-CH₂-CH₂-CH₃, -CH(CH₃)-CH₃ ;

m est un entier variant de 0 à 3 ;

n est un entier variant de 0 à 3 ;

o est un entier variant de 1 à 2.

5 Comme radicaux alkyle en C₁-C₂₀, on peut citer par exemple : méthyle, éthyle, n-propyle, 1-méthyléthyle, n-butyle, 1-méthylpropyle, 2-méthylpropyle, 1,1-diméthyléthyle, n-pentyle, 1-méthylbutyle, 2-méthylbutyle, 3-méthylbutyle, 2,2-diméthylpropyle, 1-éthylpropyle, n-hexyle, 1,1-diméthylpropyle, 1,2-diméthylpropyle, 1-méthylpentyle, 2-méthylpentyle, 3-méthylpentyle, 4-méthylpentyle, 1,1-diméthylbutyle, 1,2-diméthylbutyle, 1,3-diméthylbutyle, 2,2-diméthylbutyle, 2,3-diméthylbutyle, 3,3-diméthylbutyle, 1-éthylbutyle, 2-éthylbutyle, 1,2,2-triméthylpropyle, 1-éthyl-1-méthylpropyle, 1-éthyl-2-méthylpropyle, n-heptyle, n-octyle, n-nonyle, n-décyle, n-undécyle, n-dodécyle, n-tridécyle, n-tétradécyle, n-pentadécyle, n-hexadécyle, n-heptadécyle, n-octadécyle, n-nonadécyle ou n-eicosyle.

Comme groupes alcényle en C₂-C₁₀, on peut citer par exemple : vinyle, n-propényle, isopropényle, 1-butényle, 2-butényle, 1-pentényle, 2-pentényle, 2-méthyl-1-butényle, 2-méthyl-2-butényle, 3-méthyl-1-butényle, 1-hexényle, 2-hexényle, 1-heptényle, 2-heptényle, 1-octényle, 2-octényle.

Comme radicaux alcoxy en C₁-C₁₂, on peut citer : méthoxy, éthoxy, n-propoxy, n-butoxy, n-pentoxy, 1-méthylpropoxy, 3-méthylbutoxy, 2,2-diméthylpropoxy, 1-méthyl-1-éthylpropoxy, octoxy, 2-méthylpropoxy, 1,1-diméthylpropoxy, hexoxy, heptoxy, 2-éthylhexoxy.

Comme radicaux cycloalkyles en C₃-C₁₀, on peut citer par exemple : cyclopropyle, cyclobutyle, cyclopentyle, cyclohexyle, cycloheptyle, 1-méthylcyclopropyle, 1-éthylcyclopropyle, 1-propylcyclopropyle, 1-butylcyclopropyle, 1-pentylcyclopropyle, 1-méthyl-1-butylcyclopropyle, 1,2-diméthylcyclopropyle, 1-méthyl-2-éthylcyclopropyle, cyclooctyle, cyclononyle ou cyclodécyle.

Comme radicaux cycloalcényles en C₃-C₁₀ ayant une ou plusieurs doubles liaisons, on peut citer : cyclopropényle, cyclobutényle, cyclopentényle, cyclopentadiényle, cyclohexényle, 1,3-cyclohexadiényle, 1,4-cyclohexadiényle, cycloheptényle, cycloheptatriényle, cyclooctényle, 1,5-cyclooctadiényle, cyclooctatétrényle, cyclononényle ou cyclodécényle.

40 Les radicaux cycloalkyles ou cycloalcényles peuvent comporter un ou plusieurs substituants (de préférence de 1 à 3) choisis par exemple parmi halogène comme chlore, fluor ou brome ; cyano ; nitro ; amino ; C₁-C₄-alkylamino ; C₁-C₄-dialkylamino ; C₁-C₄-alkyle ; C₁-C₄-alcoxy ; hydroxy ; ils peuvent également comporter de 1 à 3 hétéroatomes comme soufre, oxygène ou azote dont les valences libres peuvent être occupées par un hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₄.

Les groupes aryles sont de préférence choisis parmi les cycles phényle ou naphthyle, lesquels pouvant comporter un ou plusieurs substituants (de préférence de 1 à 3) choisis par exemple parmi halogène comme chlore, fluor ou brome ;

cyano ; nitro ; amino ; C₁-C₄-alkylamino ; C₁-C₄ dialkylamino ; C₁-C₄alkyle ; C₁-C₄-alcoxy ; hydroxy. On préfère plus particulièrement phényle, méthoxyphényle et naphthyle.


- 5 Les groupes hétéroaryles comportent en général un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi soufre, oxygène ou azote.

Les groupes hydrosolubilisants sont par exemple des groupes carboxylates, sulfonates et plus particulièrement leurs sels avec des cations physiologiquement acceptables comme les sels de métaux alcalins ou les sels de trialkylammonium
10 comme les sels de tri(hydroxyalkyl)ammonium ou de 2-méthylpropan-1-ol-2-ammonium. On peut également citer les groupes ammonium comme les alkylammoniums et leurs formes salifiées avec des anions physiologiquement acceptables.

15 Comme exemples de cycle à 5 ou 6 chaînons formé par les radicaux R¹ et R² avec l'atome d'azote, on peut citer en particulier pyrrolidine ou pipéridine.

20 Les groupes amino peuvent être fixés sur le noyau benzénique en position ortho, méta ou para par rapport au radical carbonyle et plus préférentiellement en para.

Une famille de composés de formule (I) préférentiels comprend ceux choisis parmi ceux de formule (Ia) suivante :



25 dans laquelle :
R¹ et R², identiques ou différents, désignent un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C₁-C₁₂ ou forment avec l'atome d'azote avec lequel ils sont liés un cycle à 5 ou 6 chaînons ;

X désigne COOR⁵ ou CONR⁶R⁷ ;
30 R⁵ désigne un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C₁-C₁₂, un radical cycloalkyle en C₃-C₆.

R⁶ et R⁷, identiques ou différents, désignent un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C₁-C₁₂, un radical cycloalkyle en C₅-C₆.

35 Les composés de formule (Ia) plus particulièrement préférés sont ceux pour lesquels :


R¹ et R², identiques ou différents, désignent un radical alkyle en C₁-C₄ et plus particulièrement éthyle ;

R⁵ désigne un radical alkyle en C₃-C₈,

40 R⁶ et R⁷, identiques ou différents, désignent un radical alkyle en C₁-C₈,

Une autre famille de composés de formule (I) préférentiels comprend ceux choisis parmi ceux de formule (Ib) suivante :

6



dans laquelle :

R^1 et R^2 , identiques ou différents, désignent un radical alkyle en C_1-C_{12} ou forment avec l'atome d'azote avec lequel ils sont liés un cycle à 5 ou 6 chaînons.


5

Parmi les composés de formule (Ib), on peut citer plus particulièrement :

- le (4-diéthylamino-2-hydroxyphényl)-phénylcétone.
- le (4-pyrrolidino-2-hydroxyphényl)-phénylcétone.

10

Une famille de composés de formule (I) plus particulièrement préférés comprend ceux choisis parmi ceux de formule (Ic) suivante :



dans laquelle :

R^1 et R^2 , identiques ou différents, désignent un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C_1-C_8 ou forment avec l'atome d'azote avec lequel ils sont liés un cycle à 5 ou 6 chaînons ;

15

R^5 désigne un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C_1-C_{12} , un radical cycloalkyle en C_3-C_6 .

Parmi les composés de formule (Ic), on peut citer :

20

- le 2-(4-pyrrolidino-2-hydroxybenzoyl)-benzoate
- le 2-(4-diéthylamino-2-hydroxybenzoyl)-benzoate de méthyle
- le 2-(4-diéthylamino-2-hydroxybenzoyl)-benzoate de 2-éthylhexyle
- le 2-(4-diéthylamino-2-hydroxybenzoyl)-benzoate de cyclohexyle
- le 2-(4-diéthylamino-2-hydroxybenzoyl)-benzoate de n-hexyle
- le 2-(4-dibutylamino-2-hydroxybenzoyl)-benzoate
- le 2-(4-dibutylamino-2-hydroxybenzoyl)-benzoate de méthyle
- le 2-(4-dibutylamino-2-hydroxybenzoyl)-benzoate d'isobutyle.

25

30

Un composé de formule (I) tout particulièrement préféré est le 2-(4-diéthylamino-2-hydroxybenzoyl)-benzoate de n-hexyle.

Les composés de formule (I) tels que définis ci-dessus sont connus en eux-mêmes et leurs structures et leurs synthèses sont décrites dans les demandes de

brevet EP-A-1046391 et DE100 12 408 (faisant partie intégrante du contenu de la description).

Les dérivés de 2-hydroxybenzophénone aminosubstitués conformes à l'invention sont présents de préférence dans la composition de l'invention dans des proportions allant plus préférentiellement de 0,1 à 15% en poids et plus préférentiellement de 1 à 10% en poids et plus particulièrement de 2 à 8% en poids par rapport au poids total de la composition.


Comme indiqué précédemment, les dérivés du dibenzoylméthane destinés à être photostabilisés dans le cadre de la présente invention sont des produits déjà bien connus en soi et décrits notamment dans les documents FR2326405, FR2440933 et EP0114607 précités, documents dont les enseignements sont, pour ce qui touche à la définition même de ces produits, totalement inclus à titre de références dans la présente description.

Selon la présente invention, on peut bien entendu mettre en œuvre un ou plusieurs dérivés du dibenzoylméthane.


Parmi les dérivés du dibenzoylméthane rentrant particulièrement bien dans le cadre de la présente invention, on peut notamment citer, de manière non limitative :

- le 2-méthyldibenzoylméthane
- le 4-méthyldibenzoylméthane
- 25 - le 4-isopropyldibenzoylméthane
- le 4-tert.-butyldibenzoylméthane
- le 2,4-diméthyldibenzoylméthane
- le 2,5-diméthyldibenzoylméthane
- le 4,4'-diisopropyldibenzoylméthane
- 30 - le 4,4'-diméthoxydibenzoylméthane
- le 4-tert.-butyl-4'-méthoxydibenzoylméthane
- le 2-méthyl-5-isopropyl-4'-méthoxydibenzoylméthane
- le 2-méthyl-5-tert.-butyl-4'-méthoxydibenzoylméthane
- le 2,4-diméthyl-4'-méthoxydibenzoylméthane
- 35 - le 2,6-diméthyl-4-tert.-butyl-4'-méthoxydibenzoylméthane

Parmi les dérivés du dibenzoylméthane mentionnés ci-dessus, on préfère tout particulièrement, selon la présente invention, mettre en œuvre le 4-(ter.-butyl) 4'-méthoxy dibenzoylméthane, notamment celui proposé à la vente sous la dénomination commerciale de "PARSOL 1789" par la Société HOFFMANN LAROCHE, ce filtre répondant donc à la formule développée suivante :



Un autre dérivé du dibenzoylméthane préféré selon la présente invention est le 4-isopropyl-dibenzoylméthane, filtre vendu sous la dénomination de "EUSOLEX 8020" par la Société MERCK, et répondant à la formule développée suivante :



5

Le ou les dérivés du dibenzoylméthane peuvent être présents dans les compositions conformes à l'invention à des teneurs qui varient de préférence de 0,5 à 15% en poids et plus préférentiellement de 1 à 10% en poids et plus particulièrement de 2 à 8% en poids par rapport au poids total de la composition.

10

Les compositions conformes à l'invention peuvent comporter en plus d'autres filtres UV organiques complémentaires actifs dans l'UVA et/ou l'UVB (absorbeurs), hydrosolubles ou liposolubles ou bien insolubles dans les solvants cosmétiques couramment utilisés.

15

Les filtres UV organiques complémentaires sont notamment choisis parmi les anthranilates ; les dérivés salicyliques, les dérivés cinnamiques, les dérivés du camphre autres que le p-méthylbenzylidénecamphre ; les dérivés de triazine tels que ceux décrits dans les demandes de brevet US 4367390, EP863145, EP517104, EP570838, EP796851, EP775698, EP878469 et EP933376 ; les dérivés de la benzophénone autres que ceux de formule (I) ; les dérivés de β,β -diphénylacrylate, les dérivés de benzotriazole, les dérivés de benzimidazole ; les imidazolines ; les dérivés de l'acide p-aminobenzoïque (PABA) ; les dérivés de méthylène bis-(hydroxyphényl benzotriazole) tels que décrits dans les demandes US5,237,071, US5,166,355, GB2303549, DE19726184 et EP893119 ; les polymères filtres et silicones filtres tels que ceux décrits notamment dans la demande WO93/04665 ; les dimères dérivés d' α -alkylstyrène tels que ceux décrits dans la demande de brevet DE19855649 ; les 4,4-diarylbutadiènes tels que décrits dans les demandes EP0967200, DE19746654, DE19755649, EP-A-1008586.

20

25

30

Comme exemples de filtres organiques, on peut citer désignés ci-dessous sous leur nom INCI :

35

Dérivés de l'acide para-aminobenzoïque :

- PABA,
- Ethyl PABA,
- Ethyl Dihydroxypropyl PABA,
- Ethylhexyl Diméthyl PABA vendu notamment sous le nom « ESCALOL 507 » par ISP,
- Glyceryl PABA,
- PEG-25 PABA vendu sous le nom « UVINUL P25 » par BASF,

40

Dérivés salicyliques :

- Homosalate vendu sous le nom « EUSOLEX HMS » par RONA/EM INDUSTRIES,
- 5 - Ethylhexyl Salicylate vendu sous le nom « NEO HELIOPAN OS » par HAARMANN et REIMER,
- Dipropyleneglycol Salicylate vendu sous le nom « DIPSAL » par SCHER,
- TEA Salicylate, vendu sous le nom « NEO HELIOPAN TS » par HAARMANN et REIMER,

10

Dérivés cinnamiques :

- Ethylhexyl Methoxycinnamate vendu notamment sous le nom commercial « PARSOL MCX » par HOFFMANN LA ROCHE,
- Isopropyl Methoxy cinnamate,
- 15 - Isoamyl Methoxy cinnamate vendu sous le nom commercial « NEO HELIOPAN E 1000 » par HAARMANN et REIMER,
- Cinoxate,
- DEA Methoxycinnamate,
- Diisopropyl Methylcinnamate,
- 20 - Glyceryl Ethylhexanoate Dimethoxycinnamate

Dérivés de β,β' -diphénylacrylate :

- Octocrylene vendu notamment sous le nom commercial « UVINUL N539 » par BASF,
- 25 - Etocrylene, vendu notamment sous le nom commercial « UVINUL N35 » par BASF,

Dérivés de la benzophénone :

- Benzophenone-1 vendu sous le nom commercial « UVINUL 400 » par BASF,
- 30 - Benzophenone-2 vendu sous le nom commercial « UVINUL D50 » par BASF
- Benzophenone-3 ou Oxybenzone, vendu sous le nom commercial « UVINUL M40 » par BASF,
- Benzophenone-4 vendu sous le nom commercial « UVINUL MS40 » par BASF,
- 35 - Benzophenone-5
- Benzophenone-6 vendu sous le nom commercial « HELISORB 11 » par NORQUAY
- Benzophenone-8 vendu sous le nom commercial « SPECTRA-SORB UV-24 » PAR AMERICAN CYANAMID
- 40 - Benzophenone-9 vendu sous le nom commercial « UVINUL DS-49 » par BASF,
- Benzophenone-12

Dérivés du benzylidène camphre :

- 3-Benzylidene camphor fabriqué sous le nom « MEXORYL SD » par CHIMEX,
- 45 - Benzylidene Camphor Sulfonic Acid fabriqué sous le nom « MEXORYL SL » par CHIMEX,
- Camphor Benzalkonium Methosulfate fabriqué sous le nom « MEXORYL SO » par CHIMEX,
- Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid fabriqué sous le nom « MEXORYL SX » par CHIMEX,
- 50

- Polyacrylamidomethyl Benzylidene Camphor fabriqué sous le nom « MEXORYL SW » par CHIMEX,

Dérivés du phenyl benzimidazole :

- 5 - Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid vendu notamment sous le nom commercial « EUSOLEX 232 » par MERCK,
- Disodium Phenyl Dibenzimidazole Tetra-sulfonate vendu sous le nom commercial « NEO HELIOPAN AP » par HAARMANN et REIMER,

10 Dérivés de triazine :

- Anisotriazine vendu sous le nom commercial « TINOSORB S » par CIBA SPECIALTY CHEMICALS
- Ethylhexyl triazone vendu notamment sous le nom commercial « UVINUL T150 » par BASF,
- 15 - Diethylhexyl Butamido Triazone vendu sous le nom commercial « UVASORB HEB » par SIGMA 3V,
- la 2,4,6-tris-(4'-amino benzalmalonate de diisobutyle)-s- triazine.

Dérivés du phenyl benzotriazole :

- 20 - Drometrizole Trisiloxane vendu sous le nom « SILATRIZOLE » par RHODIA CHIMIE ,
- Methylène bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphénol, vendu sous forme solide sous le nom commercial « MIXXIM BB/100 » par FAIRMOUNT CHEMICAL ou sous forme micronisé en dispersion aqueuse sous le nom commercial
- 25 « TINOSORB M » par CIBA SPECIALTY CHEMICALS,

Dérivés anthraniliques :

- Menthyl anthranilate vendu sous le nom commercial commercial « NEO HELIOPAN MA » par HAARMANN et REIMER,

30

Dérivés d'imidazolines :

- Ethylhexyl Dimethoxybenzylidene Dioxoimidazoline Propionate,

Dérivés du benzalmalonate :

- 35 - Polyorganosiloxane à fonctions benzalmalonate vendu sous la dénomination commerciale « PARSOL SLX » par HOFFMANN LA ROCHE

Dérivés de 4,4-diarylbutadiene

1,1-dicarboxy (2,2'-diméthyl-propyl)-4,4-diphénylbutadiène.

40

et leurs mélanges.

Les filtres UV organiques plus particulièrement préférés sont choisis parmi les composés suivants :

- 45 - Ethylhexyl Salicylate,
- Ethylhexyl Methoxycinnamate
- Octocrylene,
- Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid,
- Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic,
- 50 - Benzophenone-3,

- Benzophenone-4,
 - Benzophenone-5,
 - 4-Methylbenzylidene camphor,
 - Disodium Phenyl Dibenzimidazole Tetra-sulfonate
 - 5 - Anisotriazine,
 - Ethylhexyl triazone,
 - Diethylhexyl Butamido Triazone,
 - la 2,4,6-tris-(4'-amino benzalmalonate de diisobutyle)-s- triazine
 - Methylene bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol,
 - 10 - Drometrizole Trisiloxane,
 - 1,1-dicarboxy (2,2'-diméthyl-propyl)-4,4-diphénylbutadiène.
- et leurs mélanges.

15 Les compositions cosmétiques selon l'invention peuvent encore contenir des pigments ou bien encore des nanopigments (taille moyenne des particules primaires: généralement entre 5 nm et 100 nm, de préférence entre 10 nm et 50 nm) d'oxydes métalliques enrobés ou non comme par exemple des nanopigments d'oxyde de titane (amorphe ou cristallisé sous forme rutil et/ou anatase), de fer, de zinc, de zirconium ou de cérium qui sont tous des agents photoprotecteurs UV

20 bien connus en soi. Des agents d'enrobage classiques sont par ailleurs l'alumine et/ou le stéarate d'aluminium. De tels nanopigments d'oxydes métalliques, enrobés ou non enrobés, sont en particulier décrits dans les demandes de brevets EP-A-0518772 et EP-A-0518773.

25 Les compositions selon l'invention peuvent également contenir des agents de bronzage et/ou de brunissage artificiels de la peau (agents autobronzants), tels que par exemple de la dihydroxyacétone (DHA).

30 Les compositions de l'invention peuvent comprendre en outre des adjuvants cosmétiques classiques notamment choisis parmi les corps gras, les solvants organiques, les épaississants ioniques ou non ioniques, les adoucissants, les antioxydants, les agents anti radicaux libres, les opacifiants, les stabilisants, les émoullients, les silicones, les α -hydroxyacides, les agents anti-mousse, les agents hydratants, les vitamines, les agents répulsifs contre les insectes, les parfums, les

35 conservateurs, les tensioactifs, les anti-inflammatoires, les antagonistes de substance P, les charges, les polymères, les propulseurs, les agents alcalinisants ou acidifiants, les colorants ou tout autre ingrédient habituellement utilisé en cosmétique, en particulier pour la fabrication de compositions antisolaires sous forme d'émulsions.

40 Les corps gras peuvent être constitués par une huile ou une cire ou leurs mélanges. Par huile, on entend un composé liquide à température ambiante. Par cire, on entend un composé solide ou substantiellement solide à température ambiante, et dont le point de fusion est généralement supérieur à 35°C. Ils

45 comprennent également les acides gras, les alcools gras et les esters d'acides gras, linéaires ou cycliques tels que les dérivés d'acide benzoïque, trimellitique et hydroxy-benzoïque.

50 Comme huiles, on peut citer les huiles minérales (paraffine); végétales (huile d'amande douce, de macadamia, de pépin de cassis, de jojoba) ; synthétiques

comme le perhydrosqualène, les alcools, les acides ou les esters gras (comme le benzoate d'alcools en C₁₂-C₁₅ vendu sous la dénomination commerciale « Finsolv TN » par la société Finetex, le palmitate d'octyle, le lanolate d'isopropyle, les triglycérides dont ceux des acides caprique/caprylique), les esters et éthers gras oxyéthylénés ou oxypropylénés; siliconées (cyclométhicone, polydiméthysiloxanes ou PDMS) ou fluorées, les polyalkylènes.

Comme composés cireux, on peut citer la paraffine, la cire de carnauba, la cire d'abeille, l'huile de ricin hydrogénée.

Parmi les solvants organiques, on peut citer les alcools et polyols inférieurs.

Bien entendu, l'homme de l'art veillera à choisir ce ou ces éventuels composés complémentaires et/ou leurs quantités de manière telle que les propriétés avantageuses, en particulier la photostabilité, attachées intrinsèquement aux compositions conformes à l'invention ne soient pas, ou substantiellement pas, altérées par la ou les adjonctions envisagées.

Les compositions de l'invention peuvent être préparées selon les techniques bien connues de l'homme de l'art, en particulier celles destinées à la préparation d'émulsions de type huile-dans-eau ou eau-dans-huile.

Ces compositions peuvent se présenter en particulier sous forme d'émulsion, simple ou complexe (H/E, E/H, H/E/H ou E/H/E) telle qu'une crème, un lait, un gel ou un gel crème, de poudre, de bâtonnet solide et éventuellement être conditionnée en aérosol et se présenter sous forme de mousse ou de spray.

Lorsqu'il s'agit d'une émulsion, la phase aqueuse de celle-ci peut comprendre une dispersion vésiculaire non ionique préparée selon des procédés connus (Bangham, Standish and Watkins. J. Mol. Biol. 13, 238 (1965), FR2315991 et FR2416008).

La composition cosmétique de l'invention peut être utilisée comme composition protectrice de l'épiderme humain ou des cheveux contre les rayons ultraviolets, comme composition antisolaire ou comme produit de maquillage.

Lorsque la composition cosmétique selon l'invention est utilisée pour la protection de l'épiderme humain contre les rayons UV, ou comme composition antisolaire, elle peut se présenter sous forme de suspension ou de dispersion dans des solvants ou des corps gras, sous forme de dispersion vésiculaire non ionique ou encore sous forme d'émulsion, de préférence de type huile-dans-eau, telle qu'une crème ou un lait, sous forme de pommade, de gel, de gel crème, de bâtonnet solide, de poudre, de stick, de mousse aérosol ou de spray.

Lorsque la composition cosmétique selon l'invention est utilisée pour la protection des cheveux contre les rayons UV, elle peut se présenter sous forme de shampooing, de lotion, de gel, d'émulsion, de dispersion vésiculaire non ionique et constituer par exemple une composition à rincer, à appliquer avant ou après shampooing, avant ou après coloration ou décoloration, avant, pendant ou après permanente ou défrisage, une lotion ou un gel coiffants ou traitants, une lotion ou

un gel pour le brushing ou la mise en plis, une composition de permanente ou de défrisage, de coloration ou décoloration des cheveux.

5 Lorsque la composition est utilisée comme produit de maquillage des cils, des sourcils ou de la peau, tel que crème de traitement de l'épiderme, fond de teint, bâton de rouge à lèvres, fard à paupières, fard à joues, mascara ou ligneur encore appelé "eye liner", elle peut se présenter sous forme solide ou pâteuse, anhydre ou aqueuse, comme des émulsions huile dans eau ou eau dans huile, des dispersions vésiculaires non ioniques ou encore des suspensions.

10 A titre indicatif, pour les formulations antisolaires conformes à l'invention qui présentent un support de type émulsion huile-dans-eau, la phase aqueuse (comprenant notamment les filtres hydrophiles) représente généralement de 50 à 95% en poids, de préférence de 70 à 90% en poids, par rapport à l'ensemble de la
15 formulation, la phase huileuse (comprenant notamment les filtres lipophiles) de 5 à 50% en poids, de préférence de 10 à 30% en poids, par rapport à l'ensemble de la formulation, et le ou les (co)émulsionnant(s) de 0,5 à 20% en poids, de préférence de 2 à 10% en poids, par rapport à l'ensemble de la formulation.

20 Comme indiqué en début de description, un objet de l'invention est l'utilisation d'une composition telle que définie précédemment pour la fabrication d'une composition cosmétique ou dermatologique destinées à la protection de la peau et/ou des cheveux contre le rayonnement ultraviolet, en particulier le rayonnement solaire.

25 Un autre objet de la présente invention réside dans un procédé pour améliorer la stabilité d'au moins un dérivé du dibenzoylméthane vis-à-vis du rayonnement UV consistant à associer au dit dérivé de dibenzoylméthane une quantité efficace d'au moins un dérivé de 2-hydroxybenzophénone aminosubstitué de formule (I)
30 tel que défini ci-dessus.

Un autre objet de la présente invention consiste en l'utilisation d'un filtre UV du type un dérivé de 2-hydroxybenzophénone aminosubstitué de formule (I) tel que défini ci-dessus dans la préparation d'une composition cosmétique ou
35 dermatologique comprenant au moins un filtre UV du type dérivé du dibenzoylméthane dans le but de d'améliorer la stabilité vis-à-vis des rayons UV dudit dérivé du dibenzoylméthane.

40 Des exemples concrets, mais nullement limitatifs, illustrant l'invention, vont maintenant être donnés.

Exemple 1

Mélange d'alcool cétylstéarylique et d'alcool cétylstéarylique oxyéthyléné (33 OE) 80/20 (SINNOWAX AO -HENKEL)	7g
Mélange de mono et distéarate de glycérol (CERASYNT SD-V ISP)	2g
Alcool cétylique	1.5g
Polydiméthyl siloxane (DOW CORNING 200 FLUID -DOW CORNING)	1g
Benzoate d'alcools en C ₁₂ -C ₁₅ (WITCONOL TN -WITCO)	15g
2-(4-diethylamino-2-hydroxybenzoyl)-benzoate de n-hexyle	2g
Butyl methoxydibenzoylmethane (PARSOL 1789 – HOFFMAN – LAROCHE)	1.5g
Glycérine	10g
Conservateurs	qs
Eau déminéralisée qsp	100 g

Exemple 2

Mélange mono /distéarate de glycerol / stéarate de polyéthylène glycol (100 OE) (ARLACEL 165 FL - ICI)	2g
Alcool stéarylique (LANETTE 18 - HENKEL)	1g
Acide stéarique d'huile de palme (STEARINE TP - STEARINERIE DUBOIS)	2.5g
Poly diméthylsiloxane (DOW CORNING 200 FLUID - DOW CORNING)	0.5g
Benzoate d'alcools en C12/C15 (WITCONOL TN -WITCO)	15g
Triéthanolamine	0.5g
2-(4-diethylamino-2-hydroxybenzoyl)-benzoate de n-hexyle	1.5g
Butyl methoxydibenzoylmethane (PARSOL 1789 – HOFFMAN – LAROCHE)	1g
Glycérine	5g
Phosphate d'alcool hexadécylique, sel de potassium (AMPHISOL K - HOFFMAN LAROCHE)	1g
Acide polyacrylique (SYNTHALEN K - 3V)	0.3g
Hydroxypropyl méthyl cellulose (METHOCEL F4M -DOW CHEMICAL)	0.1
Triethanolamine	qs pH 7
Conservateurs	qs
Eau déminéralisée	qsp 100 g


REVENDICATIONS

1. Composition cosmétique ou dermatologique à usage topique, caractérisée par le fait qu'elle comprend, dans un support cosmétiquement acceptable:

(a) au moins un filtre UV du type dérivé du dibenzoylméthane; et

(b) au moins un dérivé de 2-hydroxybenzophénone aminosubstitué de formule (I) suivante:

10



dans laquelle:

R¹ et R², identiques ou différents, désignent un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C₁-C₂₀, un radical alcényle en C₂-C₁₀, un radical cycloalkyle en C₃-C₁₀ ou un radical cycloalcényle en C₃-C₁₀; ou

R¹ et R² forment avec l'atome d'azote avec lequel ils sont liés un cycle à 5 ou 6 chaînons;

R³ et R⁴, identiques ou différents, désignent un radical alkyle en C₁-C₂₀, un radical alcényle en C₂-C₁₀, un radical cycloalkyle en C₃-C₁₀, un radical cycloalcényle en C₃-C₁₀, un radical alcoxy en C₁-C₁₂, un radical (C₁-C₂₀) alcoxy-carbonyle, un radical alkylamino en C₁-C₁₂, un radical dialkylamino en C₁-C₁₂, un radical aryle ou un hétéroaryle

éventuellement substitué, un substituant hydrosolubilisant choisi parmi un groupe carboxylate, un groupe sulfonate et un reste ammonium;

X désigne un atome d'hydrogène ou un groupe COOR^5 ou CONR^6R^7 ;

R^5 , R^6 et R^7 , identiques ou différents, désignent un atome d'hydrogène, un radical alkyle en $\text{C}_1\text{-C}_{20}$, un radical alcényle en $\text{C}_2\text{-C}_{10}$, un radical cycloalkyle en $\text{C}_3\text{-C}_{10}$, un radical cycloalcényle en $\text{C}_3\text{-C}_{10}$, un groupe $-(\text{YO})_o\text{-Z}$ ou un

10 groupe aryle;

Y désigne $-(\text{CH}_2)_2-$, $-(\text{CH}_2)_3-$, $-(\text{CH}_2)_4-$ ou $-\text{CH}-\text{CH}_3-\text{CH}_2-$;

Z représente $-\text{CH}_2-\text{CH}_3$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$, $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ ou $-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_3$;

m est un entier variant de 0 à 3;

n est un entier variant de 0 à 3; et


o est un entier variant de 1 à 2;

ladite composition ne contenant pas de p-méthylbenzylidène-camphre.

2. Composition selon la revendication 1, dans laquelle le

20 rapport en poids du dérivé de 2-hydroxybenzophénone aminosubstitué de formule (I) sur le dérivé de dibenzoylméthane est supérieur à 1.

3. Composition selon la revendication 1 ou 2, dans laquelle le ou les composés de formule (I) sont choisis parmi ceux de formule (Ia) suivante:



dans laquelle:

R¹ et R², identiques ou différents, désignent un atome d'hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₁₂ ou R¹ et R² forment avec l'atome d'azote avec lequel ils sont liés un cycle à 5 ou 6 chaînons;

X désigne COOR⁵ ou CONR⁶R⁷;

R⁵ désigne un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C₁-C₁₂ ou un radical cycloalkyle en C₃-C₆;

10 R⁶ et R⁷, identiques ou différents, désignent un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C₁-C₁₂ ou un radical cycloalkyle en C₅-C₆.

4. Composition selon la revendication 3, dans laquelle les composés de formule (Ia) sont ceux pour lesquels:


R¹ et R², identiques ou différents, désignent un radical alkyle en C₁-C₄;

R⁵ désigne un radical alkyle en C₃-C₈; et

R⁶ et R⁷, identiques ou différents, désignent un radical alkyle en C₁-C₈.

20 5. Composition selon la revendication 4, dans laquelle R¹ et R² désignent un radical éthyle.

6. Composition selon la revendication 1 ou 2, dans laquelle le ou les composés de formule (I) sont choisis parmi ceux de formule (Ib) suivante:




dans laquelle:

R¹ et R², identiques ou différents, désignent un radical alkyle en C₁-C₁₂ ou forment avec l'atome d'azote avec lequel ils sont liés un cycle à 5 ou 6 chaînons.

10 7. Composition selon la revendication 6, dans laquelle le composé de formule (Ib) est choisi parmi:

- le (4-diéthylamino-2-hydroxyphényl)-phénylcétone, et
- le (4-pyrrolidino-2-hydroxyphényl)-phénylcétone.

8. Composition selon la revendication 1 ou 2, dans laquelle le ou les composés de formule (I) sont choisis parmi ceux de formule (Ic) suivante:



dans laquelle:

R^1 et R^2 , identiques ou différents, désignent un atome d'hydrogène ou un radical alkyle en C_1 - C_8 ou R^1 et R^2 forment avec l'atome d'azote avec lequel ils sont liés un cycle à 5 ou 6 chaînons;

R^5 désigne un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C_1 - C_{12} ou un radical cycloalkyle en C_3 - C_6 .

10 9. Composition selon la revendication 8, dans laquelle le composé de formule (Ic) est choisi parmi:

- le 2-(4-pyrrolidino-2-hydroxybenzoyl)-benzoate,
- le 2-(4-diéthylamino-2-hydroxybenzoyl)-benzoate de méthyle,
- le 2-(4-diéthylamino-2-hydroxybenzoyl)-benzoate de 2-éthylhexyle,
- le 2-(4-diéthylamino-2-hydroxybenzoyl)-benzoate de cyclohexyle,
- le 2-(4-diéthylamino-2-hydroxybenzoyl)-benzoate de n-hexyle,
- 20 - le 2-(4-dibutylamino-2-hydroxybenzoyl)-benzoate,
- le 2-(4-dibutylamino-2-hydroxybenzoyl)-benzoate de méthyle,
- et
- le 2-(4-dibutylamino-2-hydroxybenzoyl)-benzoate d'isobutyle.

10. Composition selon la revendication 9, dans laquelle le composé de formule (Ic) est le 2-(4-diéthylamino-2-hydroxybenzoyl)-benzoate de n-hexyle.

11. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, dans laquelle le ou les dérivés de 2-hydroxybenzophénone aminosubstitués de formule (I) sont présents dans une proportion allant de 0,1% à 15% en poids par rapport au poids total de la composition.

10 12. Composition selon la revendication 11, dans laquelle le ou les dérivés de 2-hydroxybenzophénone aminosubstitués de formule (I) sont présents dans une proportion allant de 1 à 10% en poids par rapport au poids total de la composition.

13. Composition selon la revendication 12, dans laquelle le ou les dérivés de 2-hydroxybenzophénone aminosubstitués de formule (I) sont présents dans une proportion allant de 2 à 8% en poids par rapport au poids total de la composition.

20 14. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 13, dans laquelle le dérivé du dibenzoylméthane est présent à une teneur allant de 0,5% à 15% en poids par rapport au poids total de la composition.

15. Composition selon la revendication 14, dans laquelle le dérivé du dibenzoylméthane est présent à une teneur allant de 1% à 10% en poids par rapport au poids total de la composition.

16. Composition selon la revendication 15, où le dérivé du dibenzoylméthane est présent à une teneur allant de 1% à 10% en poids par rapport au poids total de la composition.

17. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 16, caractérisée par le fait qu'elle comprend en outre en plus d'autres filtres organiques actifs dans l'UV-A et/ou l'UV-B.

18. Composition selon la revendication 17, dans laquelle le ou les filtres UV organiques complémentaires sont
10 choisis parmi les anthranilates; les dérivés cinnamiques; les dérivés salicyliques, les dérivés du camphre autres que le pméthylbenzylidènecamphre; les dérivés de la benzophénone autres que ceux de formule (I); les dérivés de β,β -diphénylacrylate, les dérivés de benzotriazole; les dérivés de benzalmalonate; les dérivés de benzimidazole; les imidazolines; les dérivés bis-benzoazole; les dérivés de l'acide p-aminobenzoïque (PABA); les dérivés de méthylène bis-(hydroxyphényl benzotriazole); les polymères
filtres et silicones filtres; les dimères dérivés d' α -
20 alkylstyrène; les 4,4-diarylbutadiènes et leurs mélanges.

19. Composition selon la revendication 17, caractérisée par le fait que le ou les filtres UV organiques sont choisis parmi les composés suivants:

- éthylhexyl salicylate,
- éthylhexyl méthoxycinnamate,
- octocrylène,
- phénylbenzimidazole sulfonic acid,
- terephthalylidène dicamphor sulfonic,
- benzophénone-3,

- benzophénone-4,
 - benzophénone-5,
 - 4-méthylbenzylidène camphor,
 - disodium phényl dibenzimidazole tetra-sulfonate,
 - anisotriazine,
 - éthylhexyl triazone,
 - diéthylhexyl butamido triazone,
 - la 2,4,6-tris-(4'-amino benzalmalonate de diisobutyle)-s-triazine,
 - 10 - méthylène bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol,
 - drométrizole trisiloxane,
 - 1,1-dicarboxy (2,2'-diméthyl-propyl)-4,4-diphénylbutadiène,
- et leurs mélanges.

20. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 19, caractérisée par le fait qu'elle comprend en outre, des pigments ou des nanopigments d'oxydes métalliques, enrobés ou non.

20 21. Composition selon la revendication 20, caractérisée par le fait que lesdits pigments ou nanopigments sont choisis parmi les oxydes de titane, de zinc, de fer, de zirconium, de cérium et leurs mélanges, enrobés ou non.

22. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 21, caractérisée par le fait qu'elle comprend en outre au moins un agent de bronzage et/ou de brunissage artificiel de la peau.

23. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 22, caractérisée par le fait qu'elle comprend en outre

au moins un adjuvant choisi parmi les corps gras, les solvants organiques, les épaississants ioniques ou non ioniques, les adoucissants, les antioxydants, les agents anti radicaux libres, les opacifiants, les stabilisants, les émoullients, les silicones, les α -hydroxyacides, les agents anti-mousse, les agents hydratants, les vitamines, les agents répulsifs contre les insectes, les parfums, les conservateurs, les tensioactifs, les anti-nflamatoires, les antagonistes de substance P, les charges, les polymères, les propulseurs, les agents alcalinisants ou acidifiants et les colorants.

24. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 23, caractérisée par le fait qu'il s'agit d'une composition protectrice de l'épiderme humain ou d'une composition antisolaire et qu'elle se présente sous forme d'une dispersion vésiculaire non ionique, d'une émulsion, d'une crème, d'un lait, d'un gel, d'un gel crème, d'une suspension, d'une dispersion, d'une poudre, d'un bâtonnet solide, d'une mousse ou d'un spray.

20 25. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 23, caractérisée par le fait qu'il s'agit d'une composition de maquillage des cils, des sourcils ou de la peau et qu'elle se présente sous forme solide ou pâteuse, anhydre ou aqueuse, d'une émulsion, d'une suspension ou d'une dispersion.

26. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 23, caractérisée par le fait qu'il s'agit d'une composition destinée à la protection des cheveux contre les rayons ultraviolets et qu'elle se présente sous la forme

d'un shampoing, d'une lotion, d'un gel, d'une émulsion, d'une dispersion vésiculaire non ionique.

27. Utilisation d'une composition telle que définie dans les revendications 1 à 23, pour la fabrication de compositions cosmétiques ou dermatologiques destinées à la protection de la peau et/ou des cheveux contre le rayonnement ultraviolet.

28. Utilisation selon la revendication 26, dans laquelle le rayonnement ultraviolet est le rayonnement solaire.

10 29. Procédé pour améliorer la stabilité vis-à-vis du rayonnement UV d'au moins un dérivé du dibenzoylméthane dans une composition cosmétique ou dermatologique ne contenant de p-méthylbenzylidènecamphre consistant à associer audit dérivé de dibenzoylméthane une quantité efficace d'au moins un dérivé de 2-hydroxybenzophénone aminosubstitué tel que défini dans l'une quelconque des revendications 1 et 3 à 10.

20 30. Utilisation d'un dérivé de 2-hydroxybenzophénone aminosubstitué de formule (I) tel que défini dans l'une quelconque des revendications 1 et 3 à 10, dans la préparation d'une composition cosmétique ou dermatologique comprenant au moins un dérivé du dibenzoylméthane et ne contenant pas de p-méthylbenzylidènecamphre dans le but de d'améliorer la stabilité vis-à-vis des rayons UV dudit dérivé de dibenzoylméthane contenu.