



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102018765 A

(43) 申请公布日 2011. 04. 20

(21) 申请号 201010232147. 5

(22) 申请日 2010. 07. 15

(71) 申请人 北京绿源求证科技发展有限公司

地址 100040 北京市石景山区双锦园小区
16 号楼 2 单元 1102 室

(72) 发明人 刘新壮

(51) Int. Cl.

A61K 36/59 (2006. 01)

A61P 3/10 (2006. 01)

A61P 17/00 (2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 2 页

(54) 发明名称

一种治疗糖尿病肢端坏死的中药

(57) 摘要

一种治疗糖尿病肢端坏死的中药,属治疗外科病的中药领域;其目的是效果好、见效快;本发明采用宽筋藤、三七、当归、灵芝等原料制成;它具有扶正培本,益气养血,活血化瘀,清热利湿,舒筋活络的作用,具有效果显著,药效确切,见效较快的优点。

1. 一种治疗糖尿病肢端坏死的中药，其特征在于是由包含下列中药组方制成的：宽筋藤 5——40 份，三七 3——20 份，当归 5——40 份，灵芝 2——12 份。

一种治疗糖尿病肢端坏死的中药

技术领域

[0001] 本发明属于治疗外科病的中药领域。

背景技术

[0002] 目前用于治疗糖尿病肢端坏死的西药和中药，存在一些明显的不足：一是效果不明显，二是见效较迟缓，大量患者面对糖尿病肢端坏死束手无策，患肢久治不愈，不断恶化，最后不得不做截肢手术处理。

[0003] 针对以上提出的问题，本发明提供一种治疗糖尿病肢端坏死的中药，它能解决以往此类中药治疗中效果不够明显，见效比较迟缓的问题，效果好、见效快，具有效果显著，药效确切，见效较快的优点。

发明内容

[0004] 本发明是通过以下技术方案来实现的：

[0005] 1、一种治疗糖尿病肢端坏死的中药，采用中药原料制备，配方为（按重量比）：

[0006] 宽筋藤 5——40 份 三七 3——20 份 当归 5——40 份

[0007] 灵芝 2——12 份

[0008] 这种治疗糖尿病肢端坏死的中药是由下列方法制成的：

[0009] （1）按上述重量比，将宽筋藤、当归常规水提取工艺提取，制成浸膏细粉；

[0010] （2）按上述重量比，将三七、灵芝分别研成细粉，与上述浸膏细粉混合，搅拌均匀；根据需要，可制成中药冲剂、颗粒剂、散剂、胶囊剂、水丸剂、片剂等剂型。

[0011] 本发明是根据民间传统配方，根据中医扶正培本、活血化瘀的理论，精心研制而成。方中灵芝扶正培本，益气养血，补益五脏，增强机体免疫力；当归、三七补血养血，活血化瘀止痛；伍以宽筋藤清热利湿，舒筋活络。诸药配伍，相得益彰，共奏扶正培本，益气养血，活血化瘀，清热利湿，舒筋活络之功，效果好，见效快，具有效果显著，药效确切，见效较快的优点。

具体实施方式

[0012] 通过以下实施方式对本发明做具体说明：

[0013] 1、取以下配方（重量按克为单位）：

[0014] 宽筋藤 60 克 三七 30 克 当归 60 克

[0015] 灵芝 20 克

[0016] 按规定重量，用常规水提取工艺将宽筋藤、当归提取，制成浸膏细粉 36 克，将三七、灵芝分别研成细粉，与上述浸膏细粉混合，搅拌均匀，制成细小颗粒，装入 0 号胶囊，制成中药胶囊 307 粒，每粒胶囊内含中药细粉及提取物 0.28 克。

[0017] 2、取以下配方（重量按克为单位）：

[0018] 宽筋藤 200 克 三七 90 克 当归 200 克

[0019] 灵芝 60 克

[0020] 按上述同样的方法，制成中药胶囊 964 粒，每粒胶囊内含中药细粉及提取物 0.28 克。

[0021] 3、取以下配方（重量按克为单位）：

[0022] 宽筋藤 400 克 三七 200 克 当归 400 克

[0023] 灵芝 120 克

[0024] 按上述同样的方法，制成中药胶囊 2000 粒，每粒胶囊内含中药细粉及提取物 0.28 克。

[0025] 4、取以下配方（按重量比）：

[0026] 宽筋藤 8 份 三七 5 份 当归 8 份

[0027] 灵芝 3 份

[0028] 按上述同样的方法，制成中药胶囊，每粒胶囊内含中药细粉及提取物 0.28 克。

[0029] 5、取以下配方（按重量比）：

[0030] 宽筋藤 18 份 三七 9 份 当归 18 份

[0031] 灵芝 6 份

[0032] 按上述同样的方法，制成中药胶囊，每粒胶囊内含中药细粉及提取物 0.28 克。

[0033] 临床资料：

[0034] 本发明以中医糖尿病肢端坏死为例，经 6 例临床观察。选择中医诊断糖尿病肢端坏死为标准：糖尿病患者形体消瘦，肢软乏力；患肢发凉，血液循环不畅；肌肉萎缩；下肢脉搏微弱，间歇性跛行；腿脚皮肤发红、发黑、发紫，组织坏死；肢体麻木，患肢肢端疼痛；患肢肢端溃疡、溃烂，流血流脓，久不愈合。如上症状，即可确诊。在确诊观察的对象中，男性 4 例，女性 2 例，无其它严重疾病，年龄为 43 岁 -79 岁，平均年龄 63.6 岁。

[0035] 疗效判定：

[0036] 1、显效：体质增强，身上有劲；肢体温暖，发凉消失；皮肤颜色由黑紫逐步变白（正常皮肤颜色），血液循环明显改善；患肢麻木、肢端疼痛明显减轻；肢端溃烂缓解、愈合。

[0037] 2、有效：体质增强，身上有劲，肢体温暖，血液循环改善；肢体麻木、疼痛有所缓解。

[0038] 3、无效：病症无变化。

[0039] 临床实验时，除降糖药物以外，停用其它药物和保健营养品。服用本发明中药胶囊，观察 6 个月，为一个疗程。服用方法：每日 2 次，每次 3 粒胶囊，每粒胶囊内含中药细粉及提取物 0.28 克，饭后温开水送服，1 个月后症状即有缓解，服用 6 个月后，症状明显改善。临床实验的 6 人中，显效 3 人，有效 2 人，无效 1 人，总有效率 83.3%。