

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 200510107474.7

[51] Int. Cl.

A61K 36/902 (2006.01)

A61K 36/232 (2006.01)

A61P 15/14 (2006.01)

[43] 公开日 2006年5月17日

[11] 公开号 CN 1772236A

[22] 申请日 2005.10.17

[21] 申请号 200510107474.7

[71] 申请人 李亚萍

地址 311400 浙江省富阳市桂花路38号

[72] 发明人 李亚萍

权利要求书1页 说明书2页

[54] 发明名称

治疗冲任失调型乳腺增生的中草药汤剂及制备方法

[57] 摘要

一种治疗冲任失调型乳腺增生的中草药汤剂及制备方法，涉及治疗冲任失调型乳腺增生的中草药配方。其主要成分为当归、知母、黄柏、仙茅、仙灵脾、三棱、巴戟天、黄芪、党参、香附。本发明把具有调理冲任功效的中草药，通过辨证配伍，起到温阳化痰的作用，从而使乳房肿块及伴随症状消失。本汤剂特点：制备容易、服用方便、治愈率较高。

1、一种治疗冲任失调型乳腺增生的中草药汤剂及制备方法，其特征是：中草药配方为当归 20 克，知母 15 克，黄柏 10 克，仙茅 10 克，仙灵脾 15 克，三棱 10 克，巴戟天 10 克，黄芪 30 克，党参 15 克，香附 10 克。

2、根据权利要求 1 所述的一种治疗冲任失调型乳腺增生的中草药汤剂及制备方法，其特征是：汤剂制备方法为：先将以上配方中草药放入煎药器具（砂锅、瓦罐或铝锅均可）内，再加入符合生活饮用水标准的洁净水，加水量以能浸过药面 2-3cm 为宜。入煎前先将药物浸泡半小时，使药物充分湿润，以利药汁充分煎出。然后，用武（猛）火煮沸再改用文（微）火煎熬，当煎熬 20 分钟左右（以每剂煎成药汁 250~300 毫升为准）停止，除去药渣，取汤剂即成。

治疗冲任失调型乳腺增生的中草药汤剂及制备方法

技术领域:

本发明涉及治疗冲任失调型乳腺增生的中草药配方。

背景技术:

乳腺增生亦称乳腺囊性增生病，它是一种非炎症、非肿瘤的腺内组织增生，是妇女乳房多发病。其特点是以乳房肿块、经前肿痛加重、经后减轻为主要症状，多发于中年妇女。病因多因肝郁气滞，脾失健运，痰湿内蕴致肝脾两伤，痰气互结瘀滞而成；或肝肾不足，冲任失调，阳虚痰湿内结而致。冲任失调型乳腺增生的症状表现为：乳房肿块，伴有月经不调，腰酸乏力，经少色淡，或闭经，苔白质淡红，脉弦或沉细。目前，国内外治疗本病的方法较多，如西药治疗法、手术法、中药治疗法、中西医结合治疗法等等，但在治愈率方面难以达到满意的效果。

本发明的目的在于克服以上治疗冲任失调型乳腺增生的不足之处，并提供一种治愈率较高的中草药汤剂及制备方法。

本发明是通过如下配方来实现的：治疗冲任失调型乳腺增生的中草药汤剂及制备方法，其中草药配方为：当归 20 克，知母 15 克，黄柏 10 克，仙茅 10 克，仙灵脾 15 克，三棱 10 克，巴戟天 10 克，黄芪 30 克，党参 15 克，香附 10 克。其汤剂制备方法为：先将以上配方中草药放入煎药器具（砂锅、瓦罐或铝锅均可）内，再加入符合生活饮用水标准的洁净水，加水量以能浸过药面 2-3cm 为宜。入煎前先将药物浸泡半小时，使药物充分湿润，以利药汁充分煎出。然后，用武（猛）火煮沸再改用文（微）火煎熬，当煎熬 20 分钟左右（以每剂煎成药汁 250~300 毫升为准）停止，除去药渣，取汤剂即成。

本发明把具有调理冲任功效的中草药通过辨证配伍，起到温阳化痰的作用，从而达到治愈冲任失调型乳腺增生的目的。本配方药材均为成品，易得价廉，汤剂制备简单，患者服用方便，对本病治愈率较高。

治疗实施方式:

冲任失调型乳腺增生的症状表现：乳房肿块，伴有月经不调，腰酸乏力，经少

色淡，或闭经，苔白质淡红，脉弦或沉细。

治疗冲任失调型乳腺增生的中草药配方：当归 20 克，知母 15 克，黄柏 10 克，仙茅 10 克，仙灵脾 15 克，三棱 10 克，巴戟天 10 克，黄芪 30 克，党参 15 克，香附 10 克。

治疗冲任失调型乳腺增生的中草药汤剂制备方法：先将以上配方中草药放入煎药器具（砂锅、瓦罐或铝锅均可）内，再加入符合生活饮用水标准的洁净水，加水量以能浸过药面 2-3cm 为宜。入煎前先将药物浸泡半小时，使药物充分湿润，以利药汁充分煎出。然后，用武（猛）火煮沸再改用文（微）火煎熬，当煎熬 20 分钟左右（以每剂煎成药汁 250~300 毫升为准）停止，除去药渣，取汤剂即成。

服用方法：

1、服药量：每日一剂。宜将头煎、二煎两次煎成并搅均的汤剂混合后，分两次服用。

2、服药时间：上、下午各一次，在饭后两小时服药。

3、药温控制：温服。

禁忌事项：

治疗、服药期间禁忌食油炸粘腻、寒冷固硬、不易消化及有刺激性的食物。

临床治疗效果：

疗效标准：本病之疗效判断主要依据于乳房肿块及伴随症状是否消失。服药 30 天为 1 个疗程。具体分以下三级：治愈——肿块及伴随症状消失；好转——肿块减小，伴随症状部分消失；无效——服药 1 个疗程后，肿块不减小，伴随症状无消失。

效果：用本中草药汤剂治疗冲任失调型乳腺增生患者 19 例，服药 1 个疗程，其中治愈 15 例，好转 4 例，治愈率为 79%，有效率 100%。