



MD 865 Z 2015.09.30

REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală

(11) **865** (13) **Z**
(51) Int.Cl: A23C 9/12 (2006.01)
A23C 9/127 (2006.01)
A23C 1/00 (2006.01)
A23C 1/08 (2006.01)
A23C 23/00 (2006.01)
C12R 1/46 (2006.01)
C12R 1/225 (2006.01)

(12) BREVET DE INVENȚIE
DE SCURTĂ DURATĂ

(21) Nr. depozit: s 2014 0097 (22) Data depozit: 2014.06.30	(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: 2015.01.31, BOPI nr. 1/2015
(71) Solicitant: INSTITUȚIA PUBLICĂ INSTITUTUL ȘTIINȚIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ȘI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD (72) Inventatori: CARTAȘEV Anatolii, MD; BUREȚ Elena, MD; COEV Ghenadii, MD (73) Titular: INSTITUȚIA PUBLICĂ INSTITUTUL ȘTIINȚIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ȘI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD (74) Mandatar autorizat: ȘURGALSCHI Ecaterina	

(54) Procedeu de obținere a produsului lactat fermentat praf

(57) Rezumat:

1
Invenția se referă la industria laptelui, și
anume la un procedeu de obținere a unui
produs lactat fermentat sub formă de praf.

Procedeul, conform invenției, include
inocularea substratului lactic cu 5% de cultură
starter cu o concentrație de 10^{10} celule/ml
suspensie, ce conține un amestec de o tulpină
Streptococcus thermophilus producătoare de
exopolizaharide cu o tulpină neproducătoare de
exopolizaharide *Streptococcus thermophilus*
sau *Lactobacillus bulgaricus*, după care
urmează fermentarea substratului la

2
temperatura de 40...42°C până la pH-ul de
4,7...4,6, congelarea produsului lactat
fermentat până la temperatura de minus
10...12°C în interiorul masei produsului și
liofilizarea timp de 20...22 ore, la presiunea
reziduală de 57 Pa, până la atingerea
temperaturii de 24...26°C și măcinarea
produsului finit.

Revendicări: 2

Figuri: 1

MD 865 Z 2015.09.30

(54) Process for producing a powdery fermented dairy product

(57) Abstract:

1

The invention relates to the dairy industry, namely to a process for producing a powdery fermented dairy product.

The process, according to the invention, involves inoculation of the lactic substrate with 5% starter culture at a concentration of 10^{10} cells/ml suspension, containing a mixture of a *Streptococcus thermophilus* strain producing exopolysaccharides with a strain non-producing exopolysaccharides *Streptococcus thermophilus* or *Lactobacillus bulgaricus*,

2

followed by fermentation of the substrate at a temperature of 40...42°C to the pH of 4.7...4.6, freezing of the fermented dairy product to a temperature of minus 10...12°C inside the product mass and lyophilization for 20...22 hours, at a residual pressure of 57 Pa, to the attainment of a temperature of 24...26°C and milling of the finished product.

Claims: 2

Fig.: 1

(54) Способ получения порошкообразного сброженного молочного продукта

(57) Реферат:

1

Изобретение относится к молочной промышленности, а именно к способу получения порошкообразного сброженного молочного продукта.

Способ, согласно изобретению, включает инокуляцию молочного субстрата 5% стартовой культурой при концентрации 10^{10} клеток/мл суспензии, которая содержит смесь штамма *Streptococcus thermophilus*, вырабатывающего экзополисахариды, со штаммом не вырабатывающим экзополисахариды *Streptococcus thermophilus* или

2

Lactobacillus bulgaricus, после чего следует ферментация субстрата при температуре 40...42°C до pH 4,7...4,6, замораживание сброженного молочного продукта до температуры минус 10...12°C внутри массы продукта и лиофилизация в течение 20...22 часов, при остаточном давлении 57 Па, до достижения температуры 24...26°C и размалывание готового продукта.

П. формулы: 2

Фиг.: 1

Descriere:

Invenția se referă la industria laptelui, și anume la un procedeu de obținere a unui produs lactat fermentat sub formă de praf.

- 5 În industria laptelui o problemă majoră prezintă obținerea produselor lactate fermentate, care suportă termene îndelungate de depozitare, păstrându-și stabile caracteristicile organoleptice, fizico-chimice și microbiologice.

O cale de soluționare a acestei probleme este fabricarea produselor lactate fermentate uscate sub formă de praf. Tehnologia de fabricare a acestor produse se realizează prin mai multe procedee.

10 În Republica Moldova nu sunt cunoscute procedee de obținere a produselor lactate fermentate uscate praf cu utilizarea materiei prime și culturilor autohtone de bacterii lactice. De aceea, astfel de elaborări sunt actuale pentru țara noastră, cu atât mai mult că aceste produse sunt necesare pentru armată, diferite situații excepționale și turism.

15 Este cunoscut procedeul care prevede obținerea băuturii lactate fermentate în baza preparatului probiotic uscat, care conține în % mas.: lapte liofilizat praf 98...99,5, stabilizator Твин 80 0,1...1,0, maia bacteriană de tulpini *Lactobacillus acidophilus* – restul. Procedeul prevede că în laptele natural se introduce în prealabil un stabilizator, se supune uscării prin liofilizare pe parcursul a 48 ore, se fărâmițează până la dimensiunea particulelor de 20...150
20 μm și se amestecă cu maiua uscată fărâmițată într-un anumit raport. Amestecul obținut se rehidratează cu adăugarea apei până la concentrația predeterminată și se termostatează 18...20 ore la temperatura de 37±2° C [1].

Dezavantajul acestui procedeu este că în laptele natural se introduce un strabilizator de origine sintetică Твин-80 (Polyoxyethylene Sorbitan Monooleate); bacteriile lactice din specia
25 *Lactobacillus acidophilus* utilizate redau produsului aciditate înaltă (până la 130° T și mai mare), ceea ce este inacceptabil pentru consumatorii cu aciditatea majorată a sucului gastric; procesul uscării prin liofilizare durează relativ mult – cel puțin 48 ore, termostatarea ulterioară durează încă 18...20 ore, ceea ce sporește cheltuielile pentru energia electrică.

Este cunoscut procedeul de fabricare a unui produs lactat fermentat praf sau a iaurtului,
30 care prevede inocularea masivă a substratului lactat cu cel puțin o tulpină de *Streptococcus thermophilus* și cu cel puțin o tulpină de *Lactobacillus bulgaricus*, fermentarea lactică a substratului lactat, obținerea produsului praf la temperatura favorabilă pentru supraviețuirea tulpinilor de bacterii lactice menționate în cantități mari; uscarea adăugătoare a produsului praf prin efectuarea a cel puțin unei etape suplimentare la temperatura de 25...85°C până la
35 obținerea produsului cu A_w 0,25 sau mai puțin [2].

Dezavantajul procedeuului de obținere a acestui produs constă în utilizarea cantităților
40 excesive a culturilor lactice pentru inocularea masivă a substratului de lapte și în efectuarea cel puțin a unei operațiuni tehnologice adăugătoare pentru uscarea suplimentară a produsului, utilizarea echipamentului tehnic complicat, ceea ce duce la creșterea volumului de cheltuieli pentru producere.

Problema pe care o rezolvă prezenta invenție constă în simplificarea procesului tehnologic,
ameliorarea calității și obținerea produsului lactat fermentat praf cu concentrație înaltă de bacterii lactice viabile și benefice pentru organismul uman, cu aciditatea moderată, stabil din
45 punct de vedere organoleptic, fizico-chimic și microbiologic și cu un termen îndelungat de păstrare la temperatura de cameră.

Invenția propusă soluționează problema prin aceea că procedeul de obținere a produsului
lactat fermentat praf include inocularea substratului lactic cu 5% de cultură starter cu o
concentrație de 10¹⁰ celule/ml suspensie, ce conține un amestec de o tulpină *Streptococcus
50 thermophilus* producătoare de exopolizaharide cu o tulpină neproducătoare de exopolizaharide *Streptococcus thermophilus* sau *Lactobacillus bulgaricus*, tulpinile fiind luate în raport de 1:1; fermentarea substratului la temperatura de 40...42°C până la pH-ul de 4,7...4,6, congelarea produsului lactat fermentat până la temperatura de minus 10...12°C în interiorul masei
produsului și liofilizarea timp de 20...22 ore, la presiunea reziduală de 57 Pa, până la atingerea
temperaturii de 24...26°C și măcinarea produsului finit. După care acesta se ambalează și se
55 depozitează la temperatura de maximum 20°C.

Totodată, în calitate de tulpină producătoare de exopolizaharide se utilizează tulpina *Streptococcus thermophilus* CNMN-LB-50 sau *Streptococcus thermophilus* CNMN-LB-51, iar

in calitate de tulpină neproducătoare de exopolizaharide se utilizează tulpina *Streptococcus thermophilus* CNMN-LB-52 sau *Lactobacillus bulgaricus* CNMN-LB-42.

- 5 Rezultatul invenției constă în obținerea produsului lactat fermentat praf cu concentrație înaltă de bacterii lactice viabile, cu aciditatea moderată, stabil din punct de vedere organoleptic, fizico-chimic și microbiologic, fără adăugarea substanțelor stabilizatoare, cu termen îndelungat de păstrare la temperatura de cameră, care la rehidratare își restabilește structura coagulului și gustul produsului proaspăt cu simplificarea concomitentă a procesului tehnologic.

Procedeul revendicat are următoarele avantaje:

- 10 1. Simplificarea procesului tehnologic prin reducerea dozei de inoculare a substratului lactic cu cultură starter compusă din tulpini autohtone de bacterii lactice ce se caracterizează prin activitate fermentativă înaltă și rezistență sporită, deoarece sunt adaptate la condițiile materiei prime autohtone.
 - 15 2. Reducerea duratei de uscare prin realizarea unui ciclu tehnologic de uscare continuu, fără etape suplimentare.
 3. Utilizarea tulpinilor autohtone de *Streptococcus thermophilus* adaptate la calitatea materiei prime autohtone, producătoare de exopolizaharide care redau produsului fermentat o structură stabilă.
 4. Tulpinile folosite au activitate fermentativă înaltă la inocularea substratului lactat tradițional.
 - 20 5. Produsele lactate fermentate praf sunt naturale, deoarece nu conțin adaosuri și stabilizatori.
 6. Termenul de păstrare constituie 6 luni la temperatura de 20°C, fără utilizarea utilajului frigorific.
 - 25 7. Produsele lactate fermentate praf sunt stabile la depozitare îndelungată, cu concentrație înaltă de bacterii lactice viabile benefice pentru organismul uman.
- Din figură se vede că în procesul de fermentare creșterea acidității active până la pH 4,7...4,6 – nivelul de precipitare a cazeinei și formarea coagulului lactic, are loc în 4 ore, ceea ce demonstrează că cultura bacteriană utilizată se caracterizează prin activitate acidifiantă înaltă.
- 30 Caracteristicile organoleptice, fizico-chimice și microbiologice ale iaurtului praf și laptelui covăsit praf sunt prezentate în tabel.

Tabel

Caracteristicile produselor lactate fermentate praf

Indici	Iaurt		Lapte covăsit	
	La finalul procesului de liofilizare	După 6 luni de păstrare la temperatura 20°C	La finalul procesului de liofilizare	După 6 luni de păstrare la temperatura 20°C
Caracteristici organoleptice	Praf omogen fără impurități străine, cu bulgărași care se fărâmă ușor la atingere, de culoare albă cu nuanță crem uniformă, cu gust și miros specific de lapte, puțin acrișor	Praf omogen fără impurități străine, cu bulgărași care se fărâmă ușor la atingere, de culoare albă cu nuanță crem uniformă, cu gust și miros specific de lapte, puțin acrișor	Praf omogen fără impurități străine, cu bulgărași care se fărâmă ușor la atingere, de culoare albă cu nuanță crem uniformă, cu gust și miros specific de lapte, puțin acrișor	Praf omogen fără impurități străine, cu bulgărași care se fărâmă ușor la atingere, de culoare albă cu nuanță crem uniformă, cu gust și miros specific de lapte, puțin acrișor
Umiditatea, %	3,1	3,1	3,0	3,0
Cantitatea de bacterii lactice exprimată prin UFC/g	5,0x10 ⁹	4,0x10 ⁹	3,5x10 ⁹	3,2x10 ⁹

Datele din tabel demonstrează că produsele obținute prin procedeul revendicat se caracterizează prin proprietăți organoleptice, fizico-chimice și microbiologice stabile pe parcursul păstrării.

Exemple de realizare a invenției

5 Exemplul 1. Obținerea iaurtului praf

În 10 litri de substrat lactic tradițional pentru iaurt se inoculează 0,5 litri (5%) cultură starter cu concentrația de 10^{10} celule/ml suspensie, obținută prin combinarea în raport de 1:1 a tulpinii de origine autohtonă din specia *Streptococcus thermophilus* CNMN-LB-51 producătoare de exopolizaharide cu cel puțin o tulpină autohtonă compatibilă din punct de vedere biologic din specia *Lactobacillus bulgaricus* CNMN-LB-42, se fermentează la temperatura de 40°C până la aciditatea activă pH 4,7 timp de 4 ore. Coagulul format se toarnă într-o cuvetă cu grosimea stratului până la 1,5 cm, care se introduce în camera liofilizatorului pe raftul răcit până la temperatura de congelare minus 40 °C. În centrul geometric al produsului se instalează un termocuplu. Stratul se congelează până la temperatura de minus 10°C în interiorul masei (în centrul geometric) și cu pompa de vid se stabilește presiunea în camera liofilizatorului de 57 Pa, se programează temperatura pozitivă a raftului 24 °C, liofilizarea continuă până la atingerea temperaturii în interiorul produsului de 24°C. Procesul de liofilizare durează 22 ore. După liofilizare camera instalației se devacuuimează. Produsul obținut cu masa de 2,9 kg se macină până la obținerea prafului cu umiditate reziduală de maximum 4%.

20 Produsul obținut prin acest procedeu se ambalează în pachete termosudabile din foiță de aluminiu, cu acoperire polimerică și se păstrează la temperatura 20°C cel puțin 6 luni fără schimbarea caracteristicilor organoleptice, fizico-chimice și microbiologice.

Exemplul 2. Obținerea laptelui covăsit praf

În 10 litri de substrat lactic tradițional pentru iaurt se inoculează 0,5 litri (5%) de cultură starter cu concentrația de 10^{10} celule/ml suspensie, obținută prin combinarea în raport de 1:1 a tulpinii de origine autohtonă din specia *Streptococcus thermophilus* producătoare de exopolizaharide CNMN-LB-50 cu o tulpină autohtonă din specia *Streptococcus thermophilus* CNMN-LB-52 care nu produce exopolizaharide, se fermentează la temperatura de 41°C până la aciditatea activă pH de 4,6 timp de 4 ore. Coagulul format se toarnă într-o cuvetă cu grosimea stratului de până la 1,5 cm, care se introduce în camera liofilizatorului pe raftul răcit până la temperatura de congelare minus 40°C. În centrul geometric al produsului se instalează un termocuplu. Stratul se congelează până la temperatura de minus 12°C în interiorul masei (în centrul geometric) și cu pompa de vid se stabilește presiunea în camera liofilizatorului de 57 Pa, se programează temperatura pozitivă a raftului de 25 °C, liofilizarea continuă până la atingerea temperaturii în interiorul produsului de 25°C. Procesul de liofilizare durează 21 ore.

35 După liofilizare camera instalației se devacuuimează. Produsul obținut cu masa de 2,9 kg se macină până la obținerea prafului cu umiditate reziduală de maximum 4%. Produsul obținut prin acest procedeu se ambalează în pachete termosudabile din foiță de aluminiu cu acoperire polimerică și se păstrează la temperatura de 20°C cel puțin 6 luni fără schimbarea caracteristicilor organoleptice, fizico-chimice și microbiologice.

40

(56) Referințe bibliografice citate în descriere:

1. RU 2425576 C1 2011.08.10
2. RU 2452185 C2 2012.06.10

(57) Revendicări:

1. Procedeu de obținere a produsului lactat fermentat praf, care include inocularea substratului lactic cu 5% de cultură starter cu o concentrație de 10^{10} celule/ml suspensie, ce conține un amestec de o tulpină *Streptococcus thermophilus* producătoare de exopolizaharide cu o tulpină neproducătoare de exopolizaharide *Streptococcus thermophilus* sau *Lactobacillus bulgaricus*, tulpinile fiind luate în raport de 1:1; fermentarea substratului la temperatura de 40...42°C până la pH-ul de 4,7...4,6, congelarea produsului lactat fermentat până la temperatura de minus 10...12°C în interiorul masei produsului și liofilizarea timp de 20...22 ore, la presiunea reziduală de 57 Pa, până la atingerea temperaturii de 24...26°C și măcinarea produsului finit.

2. Procedeu, conform revendicării 1, în care în calitate de tulpină producătoare de exopolizaharide se utilizează tulpina *Streptococcus thermophilus* CNMN-LB-50 sau *Streptococcus thermophilus* CNMN-LB-51, iar în calitate de tulpină neproducătoare de exopolizaharide se utilizează tulpina *Streptococcus thermophilus* CNMN-LB-52 sau *Lactobacillus bulgaricus* CNMN-LB-42.

Șef Direcție Brevete:


GUȘAN Ala

Șef Secție Examinare:

GROSU Petru

Examinator:

COLESNIC Inesa



RAPORT DE DOCUMENTARE

I. Datele de identificare a cererii

(21) Nr. depozit: s 2014 0097 (32) Data de prioritate recunoscută:
 (22) Data depozit: 2014.06.30 Raport de documentare internațională: ☐ da
 (67)* Nr. și data transformării cererii: ,
 (71) Solicitant: **INSTITUȚIA PUBLICĂ INSTITUTUL ȘTIINȚIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ȘI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD**
 (54) Titlul: **PROCEDEU DE OBȚINERE A PRODUSELOR LACTATE FERMENTATE PRAF**

II. Clasificarea obiectului invenției:

(51) **Int.Cl:** *A23C 1/00* (2006.01) *A23C 23/00* (2006.01)
A23C 1/08 (2006.01) *C12R 1/46* (2006.01)
A23C 9/12 (2006.01) *C12R 1/225* (2006.01)
A23C 9/127 (2006.01)

III. Colecții și Baze de date de brevete cercetate (denumirea, termeni caracteristici, ecuații de căutare reprezentative)

MD - Intern « Documentare Invenții » (inclusiv cereri nepublicate; trunchiere automată stanga/dreapta):

A23C 1/00 A23C 23/00
A23C 1/08 C12R 1/46
A23C 9/12 C12R 1/225
A23C 9/127

produs lactat, praf, exopolizaharide, *Streptococcus thermophilus*, *Lactobacillus bulgaricus*

EA, (Eapatis):

A23C 1/00 A23C 23/00
A23C 1/08 C12R 1/46
A23C 9/12 C12R 1/225
A23C 9/127

молочный продукт, сухой, порошкообразный, экзополисахариды, *Streptococcus thermophilus*, *Lactobacillus bulgaricus*

IV. Baze de date și colecții de literatură nonbrevet cercetate

V. Documente considerate a fi relevante

Categoria*	Date de identificare ale documentelor citate si, unde este	Numărul revendicării
------------	--	----------------------

	cazul, indicarea pasajelor pertinente	vizate
A	MD 3022 G2 2006.04.30	1-2
A	MD 190 Z 2010.04.30	1-2
A	MD 706 Z 2013.12.31	1-2
A	MD 3091 G2 2006.07.31	1-2
A	EA 011075 B1 2008.12.30	1-2
A	EA 013461 B1 2010.04.30	1-2
A, D	RU 2425576 C1 2011.08.10	1-2
C	RU 2452185 C2 2012.06.10	1-2
* categoriile speciale ale documentelor citate:		
A – document care definește stadiul anterior general	T – document publicat după data depozitului sau a priorității invocate, care nu aparține stadiului pertinent al tehnicii, dar care este citat pentru a pune în evidența principiul sau teoria pe care se bazează invenția	
X – document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată nouă sau implicând activitate inventivă când documentul este luat în considerație de unul singur	E – document anterior dar publicat la data depozit național reglementar sau după aceasta dată	
Y – document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată ca implicând activitate inventivă când documentul este asociat cu unul sau mai multe documente de aceeași categorie	D – document menționat în descrierea cererii de brevet	
O - document referitor la o divulgare orală, un act de folosire, la o expoziție sau la orice alte mijloace de divulgare	C – document considerat ca cea mai apropiată soluție	
	& – document, care face parte din aceeași familie de brevete	
P - document publicat înainte de data de depozit, dar după data priorității invocate	L – document citat cu alte scopuri	
Data finalizării documentării 2014.09.15		
Examinator COLESNIC Inesa		