(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 102441138 B
(45)授权公告日 2013.05.15

(21)申请号 201110384136.3

(22)申请日 2011.11.18

(73)专利权人 葛夫军
地址 276000 山东省临沂市兰山区金坛路80号山东医专附属医院

(72)发明人 葛夫军

(51)Int.Cl.
A61K 36/9066(2006.01)
A61P 15/14(2006.01)

(56)对比文件
CN 1966045 A,2007.05.23,
姚青等编著．妇科常见病验方精编．《妇科常见病验方精编》.2003,
姚青等编著．妇科常见病验方精编．《妇科常见病验方精编》.2003,

审查员 许淼

权利要求书1页 说明书2页

(54)发明名称

一种治疗急性乳腺炎的中药祛炎康汤剂

(57)摘要

本发明公开了一种治疗急性乳腺炎的中药祛炎康汤剂，急生乳腺炎中医称为乳痈，多由乳汁郁积、情致不畅、肝气郁滞，使乳络闭阻不畅、气滞血瘀而成，因此，中药治疗以疏肝理气，解毒散结，活血化瘀为治则。为此，本发明选择牛膝、益母草、川芎、延胡索、郁金、苏木、赤芍、连翘、桂枝、青皮，经科学配伍，由我院制剂室制成汤剂，经临床试验，其有效率达到96.7%，而且副作用小，治疗成本低。

CN 102441138 B

1. 一种治疗急性乳腺炎的中药祛炎康汤剂，其特征在于该中药祛炎康汤剂由以下重量份的中药制成：牛膝 20g、益母草 20g、川芎 13g、延胡索 13g、郁金 10g、苏木 11g、赤芍 11g、连翘 13g、桂枝 20g、青皮 20g。

一种治疗急性乳腺炎的中药祛炎康汤剂

技术领域

[0001] 本发明涉及一种中药组合物，尤其涉及一种治疗急性乳腺炎的中药祛炎康汤剂。

背景技术

[0002] 急性乳腺炎是乳腺的急性化脓性感染，是乳腺管内和周围结缔组织炎症，常在短期内形成脓肿，多由金葡球菌或链球菌沿淋巴管入侵所致。多发生于产后哺乳期的妇女，尤其是初产妇更为多见。病菌一般从乳头破口或皲裂处侵入，也可直接侵入引起感染。有文献报道急性乳腺炎初产妇患病占 50％，初产妇与经产妇之比为 2.4 ： 1。哺乳期的任何时间均可发生，但以产后 3 ～ 4 周最为常见，故又称产褥期乳腺炎。其临床症状为 :哺乳期妇女出现一侧乳房局部胀痛，皮肤红、肿、热或有肿块、压痛，甚至出现寒战、高热、全身疲乏无力，局部形成脓肿时有波动感。

[0003] 目前，急性乳腺炎的治疗主要以西药治疗为主，多是利用抗生素治疗，治疗时间一长，往往产生副作用。

发明内容

[0004] 本发明的目的是提供一种治疗急性乳腺炎的中药祛炎康汤剂，急生乳腺炎中医称为乳痈，多由乳汁郁积、情致不畅、肝气郁滞，使乳络闭阻不畅、气滞血瘀而成，因此，中药治疗以疏肝理气，解毒散结，活血化瘀为治则。

[0005] 本发明的目的是通过以下技术方案实现的，该治疗急性乳腺炎的中药祛炎康汤剂由以下重量份的中药制成 :牛膝 15-25 份、益母草 15-25 份、川芎 10-15 份、延胡索 10-15 份、郁金 7-13 份、苏木 9-13 份、赤芍 9-13 份、连翘 10-15 份、桂枝 15-25 份、青皮 15-25 份。

[0006] 优选的，该治疗急性乳腺炎的中药祛炎康汤剂由以下重量份的中药制成 :牛膝 20 份、益母草 20 份、川芎 13 份、延胡索 13 份、郁金 10 份、苏木 11 份、赤芍 11 份、连翘 13 份、桂枝 20 份、青皮 20 份。

[0007] 将以上中药按传统方法制成汤剂。

[0008] 方中牛膝补肝肾，强筋骨，活血通经，引血下行，利尿通淋 ;益母草活血调经，利水消肿，清热解毒 ;川芎活血祛瘀，行气开郁，祛风止痛 ;赤芍清热凉血，散瘀止痛 ;连翘清热解毒，消肿散结，疏散风热 ;桂枝发汗解肌，温通经脉，助阳化气，平冲降气 ;青皮疏肝破气、消积化滞 ;延胡索活血散瘀，行气止痛 ;郁金行气化瘀，清心解郁，利胆退黄 ;苏木活血祛瘀，消肿定痛。

[0009] 临床资料

[0010] 1、一般资料

[0011] 120 例均为急性乳腺炎患者，随机分为治疗组与对照组。其中治疗组 60 例，年龄 24 ～ 34 岁，平均 27 岁。产后 1 个月内发病者 37 例，1 个月后发病者 23 例，平均发病时间为产后 21 天。单侧病变 43 例，双侧病变 17 例。肿块直径最小 2.5cm，最大 8cm。病程 3 天以内者 25 例，3 ～ 7 天者 28 例，7 天以上者 7 例。对照组 60 例，年龄 24 ～ 35 岁，平均 28

岁。产后 1 个月内发病者 36 例，1 个月后发病者 24 例，平均发病时间为产后 22 天。单侧病变 41 例，双侧病变 19 例。肿块最小直径 2cm，最大直径 7cm。病程 3 天以内者 27 例，3 ～ 7 天者 28 例，7 天以上者 5 例。两组一般资料经统计学处理无显著性差异，具有可比性。

[0012] 2、诊断标准

[0013] 参照《实用妇产科学》诊断标准为依据，全部病例均符合急性乳腺炎的诊断标准。确诊为早期急性乳腺炎的患者：(1) 哺乳期妇女，乳房肿胀疼痛，出现界限不清的肿块，伴有明显的触痛，局部出现红肿；(2) 畏寒、发热伴白细胞明显增高。

[0014] 3、治疗方法

[0015] 治疗组采用本发明所述的中药祛炎康汤剂，牛膝 20g、益母草 20g、川芎 13g、延胡索 13g、郁金 10g、苏木 11g、赤芍 11g、连翘 13g、桂枝 20g、青皮 20g。用法：每日 1 剂，水煎 2 次，取汁 400mL，早晚分服。5 天为一个疗程。对照组采用头孢呋辛钠 115g 加入生理盐水 20mL 静脉推注，每日 2 次。5 天为一个疗程。

[0016] 4、疗效评定标准

[0017] 参考国家中医药管理局制定的《中医病症诊断疗效标准》。痊愈：全身症状消失，肿块消散，血常规检验恢复正常；好转：全身症状消失，局部肿块减轻；无效：全身局部症状无好转消失，需外科切开排脓。

[0018] 5、治疗结果

[0019] 两组治疗 5 天后统计治疗结果显示，治疗组 60 例中，痊愈 35 例 (58.3％)，好转 23 例 (38.3％)，无效 2 例 (3.3％)，总有效率为 96.7％；

[0020] 对照组 60 例中，痊愈 28 例 (46.7％)，好转 21 例 (35.0％)，无效 11 例 (18.3％)，总有效率为 81.7％；两组疗效比较具有显著差异。

[0021] 典型病例

[0022] 患者李某，28 岁，右乳房有硬块红肿热痛 2 天，近 2 天来右乳头处上方有鸭蛋大硬块作痛，微有红肿，时恶寒发热 (T38℃) 舌苔白厚，脉滑数有力。查血象 WBC1.38×10 9/L，N0.86，诊断为急性乳腺炎。服用本发明所述的祛炎康汤剂五天后，红肿热消失，体温降至正常，继服 3 剂巩固疗效。

具体实施方式

[0023] 实施例一：称取牛膝 20g、益母草 20g、川芎 13g、延胡索 13g、郁金 10g、苏木 11g、赤芍 11g、连翘 13g、桂枝 20g、青皮 20g。水煎取汁，供患者服用。

[0024] 实施例二：称取牛膝 25g、益母草 15g、川芎 15g、延胡索 15g、郁金 13g、苏木 13g、赤芍 9g、连翘 10g、桂枝 25g、青皮 25g。水煎取汁，供患者服用。

[0025] 实施例三：称、取牛膝 15g、益母草 25g、川芎 10g、延胡索 10g、郁金 7g、苏木 9g、赤芍 13g、连翘 15g、桂枝 15g、青皮 15g。水煎取汁，供患者服用。