(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105147971 A
(43)申请公布日 2015.12.16

(21)申请号 201510678345.7

(22)申请日 2015.10.20

(71)申请人 张军
地址 230051 安徽省合肥市包河区骆岗街道王大郢社居委幸福村11付1号

(72)发明人 不公告发明人

(51)Int.Cl.
A61K 36/8966(2006.01)
A61P 31/04(2006.01)
A61P 11/04(2006.01)

权利要求书1页 说明书2页

(54)发明名称

一种治疗小儿化脓性扁桃体炎的中药制剂

(57)摘要

本发明公开了一种治疗小儿化脓性扁桃体炎的中药制剂，由如下重量的中药材组成：丹参8g、五加皮5g、平贝母5g、玄参3g、菊花3g、茜草3g、枳实3g、柏子仁3g、墨旱莲2g、熟大黄2g、胖大海15g、茯苓7g、五味子3g、升麻3g、大蓟3g、女贞子3g、桔梗2g、桑枝2g。本发明的有益效果在于：与目前其他治疗小儿化脓性扁桃体炎的中药相比，不仅见效快、治疗效果好、治疗彻底，并且无毒副作用。

CN 105147971 A

1.一种治疗小儿化脓性扁桃体炎的中药制剂，其特征在于：由如下重量的中药材制成：丹参8g、五加皮5g、平贝母5g、玄参3g、菊花3g、茜草3g、枳实3g、柏子仁3g、墨旱莲2g、熟大黄2g、胖大海15g、茯苓7g、五味子3g、升麻3g、大蓟3g、女贞子3g、桔梗2g、桑枝2g。

2.根据权利要求1所述的一种治疗小儿化脓性扁桃体炎的中药制剂，其特征在于，其制备方法为：称取所述重量的中药材放入煎药器具内，加入符合生活饮用水标准的洁净水，加水量以超过药面2-3cm为度，入煎前将上述中药材浸泡半小时，使其充分湿润，以利药汁充分煎出，然后，用武火煮沸再改用文火煎熬，煎熬20分钟停止，除去药渣，取汤剂即成。

一种治疗小儿化脓性扁桃体炎的中药制剂

技术领域

[0001] 本发明涉及中药技术领域，具体是指一种治疗小儿化脓性扁桃体炎的中药制剂。

背景技术

[0002] 化脓性扁桃体炎是儿科常见病、多发病，它包括急性滤泡性扁桃体炎和急性隐窝性扁桃体炎，属于细菌感染所致的上呼吸道疾病，临床以咽喉疼痛、肿胀、化脓为特征。小儿化脓性扁桃体炎治疗起来也有一定的困难，越早发现接受治疗效果就会越好。传统药物治疗急性扁桃体炎的方式一般是采用抗菌消炎药治疗，这种局部治疗方式的缺点在于只消炎，而不能清除扁桃体陷窝内的细菌，一旦身体抵抗力降低极易反复发作，日久则形成慢性病灶。

[0003] 目前治疗化脓性扁桃体炎的药物主要分为西药、中药以及中西药结合。但上述药物的治疗，存在疗效差、疗程长、不能彻底根除、治疗后易复发等不足之处。

发明内容

[0004] 本发明的目的是提供一种治疗小儿化脓性扁桃体炎的中药制剂，本发明是通过以下技术方案实现的：

一种治疗小儿化脓性扁桃体炎的中药制剂，由如下重量的中药材制成：丹参 8g、五加皮 5g、平贝母 5g、玄参 3g、菊花 3g、茜草 3g、枳实 3g、柏子仁 3g、墨旱莲 2g、熟大黄 2g、胖大海 15g、茯苓 7g、五味子 3g、升麻 3g、大蓟 3g、女贞子 3g、桔梗 2g、桑枝 2g。

[0005] 本发明还提供了一种治疗小儿化脓性扁桃体炎的中药制剂的制备方法：称取所述重量的中药材放入煎药器具内，加入符合生活饮用水标准的洁净水，加水量以超过药面 2-3cm 为度，入煎前将上述中药材浸泡半小时，使其充分湿润，以利药汁充分煎出，然后，用武火煮沸再改用文火煎熬，煎熬 20 分钟停止，除去药渣，取汤剂即成。

[0006] 本发明的有益效果在于：与目前其他治疗小儿化脓性扁桃体炎的中药相比，不仅见效快、治疗效果好、治疗彻底，并且无毒副作用。

[0007] 具体实施方式：

下面结合实施例和病例对本发明作进一步的说明。

[0008] 实施例 1：

一种治疗小儿化脓性扁桃体炎的中药制剂，由如下中药材制成：丹参 8g、五加皮 5g、平贝母 5g、玄参 3g、菊花 3g、茜草 3g、枳实 3g、柏子仁 3g、墨旱莲 2g、熟大黄 2g、胖大海 15g、茯苓 7g、五味子 3g、升麻 3g、大蓟 3g、女贞子 3g、桔梗 2g、桑枝 2g。

[0009] 上述治疗小儿化脓性扁桃体炎的中药制剂，制备方法：称取所述重量的中药材放入煎药器具内，加入符合生活饮用水标准的洁净水，加水量以超过药面 2-3cm 为度，入煎前将上述中药材浸泡半小时，使其充分湿润，以利药汁充分煎出，然后，用武火煮沸再改用文火煎熬，煎熬 20 分钟停止，除去药渣，取汤剂即成。

[0010] 对比实施例 1：

一种治疗小儿化脓性扁桃体炎的中药制剂，由如下中药材制成：丹参 8g、五加皮 5g、平贝母 5g、玄参 3g、菊花 3g、茜草 3g、枳实 3g、柏子仁 3g、墨旱莲 2g、熟大黄 2g。

[0011] 上述治疗小儿化脓性扁桃体炎的中药制剂的制备方法：称取所述重量的中药材放入煎药器具内，加入符合生活饮用水标准的洁净水，加水量以超过药面 2-3cm 为度，入煎前将上述中药材浸泡半小时，使其充分湿润，以利药汁充分煎出，然后，用武火煮沸再改用文火煎熬，煎熬 20 分钟停止，除去药渣，取汤剂即成。

[0012] 对比实施例 2：

一种治疗小儿化脓性扁桃体炎的中药制剂，由如下中药材制成：胖大海 15g、茯苓 7g、五味子 3g、升麻 3g、大蓟 3g、女贞子 3g、桔梗 2g、桑枝 2g。

[0013] 上述治疗小儿化脓性扁桃体炎的中药制剂的制备方法：称取所述重量的中药材放入煎药器具内，加入符合生活饮用水标准的洁净水，加水量以超过药面 2-3cm 为度，入煎前将上述中药材浸泡半小时，使其充分湿润，以利药汁充分煎出，然后，用武火煮沸再改用文火煎熬，煎熬 20 分钟停止，除去药渣，取汤剂即成。

[0014] 本发明治疗小儿化脓性扁桃体炎的中药制剂的临床试验资料：

为检验本发明的治疗效果，选取安徽省亳州市经医院确诊的 72 例小儿化脓性扁桃体炎患者，年龄范围为 2~9 岁，平均年龄 3.9 岁。诊断标准：参照《诸福棠实用儿科学》诊断标准：发热，咽痛及吞咽困难，伴或不伴咳嗽，扁桃体肿大，有脓点或脓苔，双肺未闻及啰音，白细胞总数和中性粒细胞升高，并排除下呼吸道感染。

[0015] 试验方案：将以上 72 例患者随机平均分成三个治疗组，每个治疗组 24 例，其中治疗组 1 采用实施例 1 制备的中药制剂进行治疗，治疗组 2 采用对比实施例 1 制备的中药制剂进行治疗，治疗组 3 采用对比实施例 2 制备的中药制剂进行治疗。

[0016] 治疗方法：每日一剂，一剂分早晚两次服用，连续治疗 3 天，治疗期间禁用其他药物。

[0017] 疗效标准：

治愈：体温恢复正常，咽痛、咽充血、扁桃体脓性物消失。

[0018] 有效：体温较首诊有所降低，但未恢复正常，咽痛、咽充血、扁桃体脓性物等症状、体征减轻。

[0019] 无效：临床症状、体征无改善或病情加重。

[0020] 治疗结果：

治疗组 1：治愈：21 例，有效：3 例，无效 0 例，治愈率为 87.5%，总有效率为 100%；并且未观察到不良反应。

[0021] 治疗组 2：治愈：2 例，有效：14 例，无效 8 例，治愈率为 8.3%，总有效率为 66.7%；并且未观察到不良反应。

[0022] 治疗组 3：治愈：0 例，有效：10 例，无效 14 例，治愈率为 0，总有效率为 41.7%；并且未观察到不良反应。

[0023] 通过以上临床试验可知，本发明的中药制剂对小儿化脓性扁桃体炎有显著疗效，其中实施例 1 的中药制剂对于小儿化脓性扁桃体炎疗效最好，治愈率高达 87.5%，明显优于对比实施例 1 和对比实施例 2，可见实施例 1 通过中药组合物的配伍，对于小儿化脓性扁桃体炎疾病的治疗产生了协同增效的作用，取得了意料不到的技术效果。