



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104587131 A

(43) 申请公布日 2015.05.06

(21) 申请号 201510078467.2

(22) 申请日 2015.02.15

(71) 申请人 孙红梅

地址 264300 山东省威海市荣成市成山大道
东段 101 号

(72) 发明人 孙红梅

(51) Int. Cl.

A61K 36/8905(2006.01)

A61P 15/00(2006.01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗月经后期的中药组合物

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗月经后期的中药组合物,其中药原料及重量份配比为:柴胡 10~20 份,菟蔚子 10~20 份,红花菜 10~30 份,杜鹃花 10~20 份,白术 10~30 份,香附 10~20 份,虎杖 5~15 份,月季花 10~30 份,桔梗 5~15 份,半夏 5~15 份,陈皮 5~15 份,丹参 20~40 份,兰石草果 10~30 份,女娄菜 5~15 份,龙船花 10~20 份,川牛膝 10~30 份,王不留行 5~15 份,鸡血藤 20~40 份,八月札 10~20 份,玫瑰花 5~15 份,甘草 3~9 份。本发明的中药组合物具有补肾助阳、温经散寒、补血调经、行气活血的功效,其治月经后期疗效显著,作用可靠。

1. 一种治疗月经后期的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:柴胡 10~20 份,茺蔚子 10~20 份,红花菜 10~30 份,杜鹃花 10~20 份,白术 10~30 份,香附 10~20 份,虎杖 5~15 份,月季花 10~30 份,桔梗 5~15 份,半夏 5~15 份,陈皮 5~15 份,丹参 20~40 份,兰石草果 10~30 份,女娄菜 5~15 份,龙船花 10~20 份,川牛膝 10~30 份,王不留行 5~15 份,鸡血藤 20~40 份,八月札 10~20 份,玫瑰花 5~15 份,甘草 3~9 份。

2. 根据权利要求 1 所述一种治疗月经后期的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:柴胡 15 份,茺蔚子 15 份,红花菜 20 份,杜鹃花 15 份,白术 20 份,香附 15 份,虎杖 10 份,月季花 20 份,桔梗 10 份,半夏 10 份,陈皮 10 份,丹参 30 份,兰石草果 20 份,女娄菜 10 份,龙船花 15 份,川牛膝 20 份,王不留行 10 份,鸡血藤 30 份,八月札 15 份,玫瑰花 10 份,甘草 6 份。

一种治疗月经后期的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种传统草药的未确定结构的医药配制品,尤其是一种治疗月经后期的中药组合物。

背景技术

[0002] 月经后期是女性在临床中的一种常见病症,是指月经周期后 7 天以上,同时连续三个月鉴定为月经后期,又称“经行后期”、“月经延后”、“月经落后”、“经迟”等。一般认为需连续出现两个周期以上,若每次仅延后三五天,或偶然延后一次,下次仍如期来潮者,均不作月经后期论。月经后期的主要伴随症状有:月经量少(个别量多);经色可深红、淡红或黯红;经质可有粘稠、稀薄或伴有血块;还有人出现胃寒肢冷、小腹隐痛、面色苍白、头昏目眩或胸闷不适、乳胀胁痛等。月经后期及时治疗,一般情况预后良好,可恢复正常月经周期。如不及时治疗,本病可发展成闭经,尤其是 40 岁以上妇女,影响子宫内膜功能和卵巢功能,久而卵巢早衰,提早绝经。目前,市场上治疗月经后期多采用中成药,但存在疗效不理想的不足。

[0003] 中医认为,月经后期系由气血亏损、阳虚、寒凝、气滞、冲任不畅所致。

[0004] 根据中医理论,针对月经后期的发病机理,采用温经散寒、补血调经、行气活血的治法进行辨证配伍组方,以达到标本兼治的目的。

发明内容

[0005] 为了克服现有的中成药治疗月经后期存在疗效不理想的不足,本发明提供一种配制简便、成本低、疗效显著、无副作用的治疗月经后期的中药组合物。

[0006] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种治疗月经后期的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:柴胡 10~20 份,菟蔚子 10~20 份,红花菜 10~30 份,杜鹃花 10~20 份,白术 10~30 份,香附 10~20 份,虎杖 5~15 份,月季花 10~30 份,桔梗 5~15 份,半夏 5~15 份,陈皮 5~15 份,丹参 20~40 份,兰石草果 10~30 份,女娄菜 5~15 份,龙船花 10~20 份,川牛膝 10~30 份,王不留行 5~15 份,鸡血藤 20~40 份,八月札 10~20 份,玫瑰花 5~15 份,甘草 3~9 份。

[0007] 本发明的优选技术方案是:一种治疗月经后期的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:柴胡 15 份,菟蔚子 15 份,红花菜 20 份,杜鹃花 15 份,白术 20 份,香附 15 份,虎杖 10 份,月季花 20 份,桔梗 10 份,半夏 10 份,陈皮 10 份,丹参 30 份,兰石草果 20 份,女娄菜 10 份,龙船花 15 份,川牛膝 20 份,王不留行 10 份,鸡血藤 30 份,八月札 15 份,玫瑰花 10 份,甘草 6 份。

[0008] 本发明中药组合物是在传统中医理论和临床经验指导下,精选药物组方。本发明中药组合物中:柴胡具有疏散退热、升阳舒肝的功效;菟蔚子具有活血调经、清肝明目的功效;红花菜具有清热解毒的功效;杜鹃花具有和血、调经、祛风湿之功效;白术具有燥湿行水、益气、健脾胃的功效;香附具有理气解郁、调经止痛的功效;虎杖具有清热解毒、利胆退

黄、祛风利湿、散瘀定痛、止咳化痰的功效；月季花有活血调经、消肿解毒之功效；桔梗具有宣肺祛痰、养气补血、利五脏、补五劳的功效；半夏具有燥湿化痰、降逆止呕、消痞散结的功效；陈皮具有理气健脾、调中利水、燥湿化痰的功效；丹参具有活血调经、祛瘀消痈、清心除烦、养血安神的功效；兰石草果具有行气活血、调经止痛的功效；女娄菜具有活血调经、健脾行水的功效；龙船花具有散瘀止血、调经、降压的功效；川牛膝具有逐瘀通经、通利关节、利尿通淋的功效；王不留行具有活血通经、消肿止痛、催生下乳的功效；鸡血藤具有补血活血、舒经通络的功效；八月札具有舒肝理气、活血止痛、除烦利尿的功效；玫瑰花具有行气解郁、活血调经的功效；甘草具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、调和诸药的功效。本发明精选药物组方，其药物组分经辩证配伍，在作用上相互佐助，共奏补肾助阳、温经散寒、补血调经、行气活血的功效，对月经后期的治疗达到标本兼治。

[0009] 本发明组合物的组分均采用天然的中药原料，其配制简便、药源广、成本低。本发明遵循中医的处方用药原则，各种组分药物采用水煎服用。经临床应用验证，其疗效显著可靠，药性平和，未出现毒副作用，有效率达 90%，治愈率 64%。

具体实施方式

[0010] 下面结合实施例对本发明作进一步说明。

[0011] 实施例 1

一种治疗月经后期的中药组合物，其中药原料及重量配比为：柴胡 15g，茺蔚子 15g，红花菜 20g，杜鹃花 15g，白术 20g，香附 15g，虎杖 10g，月季花 20g，桔梗 10g，半夏 10g，陈皮 10g，丹参 30g，兰石草果 20g，女娄菜 10g，龙船花 15g，川牛膝 20g，王不留行 10g，鸡血藤 30g，八月札 15g，玫瑰花 10g，甘草 6g。

[0012] 实施例 2

一种治疗月经后期的中药组合物，其中药原料及重量配比为：柴胡 10g，茺蔚子 20g，红花菜 10g，杜鹃花 20g，白术 10g，香附 20g，虎杖 5g，月季花 30g，桔梗 5g，半夏 15g，陈皮 5g，丹参 40g，兰石草果 10g，女娄菜 15g，龙船花 10g，川牛膝 30g，王不留行 5g，鸡血藤 40g，八月札 10g，玫瑰花 15g，甘草 3g。

[0013] 实施例 3

一种治疗月经后期的中药组合物，其中药原料及重量配比为：柴胡 20g，茺蔚子 10g，红花菜 30g，杜鹃花 10g，白术 30g，香附 10g，虎杖 15g，月季花 10g，桔梗 15g，半夏 5g，陈皮 15g，丹参 20g，兰石草果 30g，女娄菜 5g，龙船花 20g，川牛膝 10g，王不留行 15g，鸡血藤 20g，八月札 20g，玫瑰花 5g，甘草 9g。

[0014] 实施例 4

一种治疗月经后期的中药组合物，其中药原料及重量配比为：柴胡 12g，茺蔚子 18g，红花菜 15g，杜鹃花 18g，白术 15g，香附 18g，虎杖 8g，月季花 25g，桔梗 8g，半夏 13g，陈皮 8g，丹参 35g，兰石草果 15g，女娄菜 13g，龙船花 12g，川牛膝 25g，王不留行 8g，鸡血藤 35g，八月札 12g，玫瑰花 13g，甘草 4g。

[0015] 实施例 5

一种治疗月经后期的中药组合物，其中药原料及重量配比为：柴胡 18g，茺蔚子 12g，红花菜 25g，杜鹃花 12g，白术 25g，香附 12g，虎杖 13g，月季花 15g，桔梗 13g，半夏 8g，陈皮 13g，

丹参 25g, 兰石草果 25g, 女娄菜 8g, 龙船花 18g, 川牛膝 15g, 王不留行 13g, 鸡血藤 25g, 八月札 18g, 玫瑰花 8g, 甘草 8g。

[0016] 本发明实施例中的中药组合物按常规的水煎法制取药剂。具体方法如下:将组方的中药原料放入容器中,加冷水漫过药面,浸泡 15~20 分钟,再加水没过药面约 6 厘米,进行第一次煎煮,未沸前采用武火煎煮,沸后用文火煎煮 20~30 分钟;第二次煎煮,加水没过药面约 4 厘米,进行煎煮,水沸后煎煮 15~20 分钟。两次煎煮取汁,合并。

[0017] 本发明以实施例 1 所给出的一种治疗月经后期的中药组合物,做临床疗效总结如下:

一、一般性资料:本中药组合物应用于临床观察病例 100 例,年龄 15~45 岁。

[0018] 二、诊断依据:参照中华人民共和国中医药行业标准《中医病证诊断疗效标准》中月经后期的诊断标准:

- 1、月经周期超过 35 天,连续 2 个月经周期以上;
- 2、育龄妇女周期延后,应与妊娠、青青期、更年期月经后期相鉴别;
- 3、妇科检查,B 超或气腹造影,以排除子宫及卵巢器质性疾病。

[0019] 三、用法用量:临床应用时,一日一剂,水煎两遍取汁约 300ml,分早、晚两次温服。五天为一疗程。

[0020] 四、疗效标准:参照中华人民共和国中医药行业标准《中医病证诊断疗效标准》中的月经后期疗效评定标准:

- (1) 痊愈:月经周期恢复正常,维持 3 个月以上;
- (2) 有效:月经周期恢复正常,但不能维持 3 个月以上;
- (3) 无效:月经周期未见好转。

[0021] 五、治疗效果:该临床观察病例中,服药 3~10 个疗程,痊愈 64 例,随访未见复发;有效 26 例,无效 10 例。治疗期间未发生毒副作用。

[0022] 六、典型病例:

病例 1:李某,38 岁。主诉:月经后期近一年。一般 2 至 3 个月来潮一次,且无规律可循,经期 3~4 天,或 6~7 天,经期伴下腹空坠隐痛,乳房胀痛、头昏眼花,疲乏无力。诊见:面色黄无华,舌淡,脉细。服用本发明中药组合物制备的药剂 2 个疗程,头晕乏力不适感明显减轻;继续服 2 个疗程,症状及体征均消失,下月月经正常,月经量正常,随访 3 个月无复发,治愈。

[0023] 病例 2:汤某,女,26 岁。主诉:月经后期 2 年。月经常延后 10 余天,且量中有血块。末次月经延后 15 天,经行 2 天,量少色暗,伴腰酸痛小腹疼痛、腹泻、乳房胀痛。诊见:面部色斑明显,苔薄白,脉细弦。服用本发明中药组合物制备的药剂 2 个疗程,面色好转;继续服用 3 个疗程,下月月经间隔 28 天,经行 5 天,色清红,无血块,有轻微腰酸感但无腹痛腹泻。后随访 3 个月月经周期正常,治愈。