



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105920542 A

(43)申请公布日 2016.09.07

(21)申请号 201610468611.8

(22)申请日 2016.06.25

(71)申请人 董艳丽

地址 264309 山东省威海市荣成市石岛新
城区双榜东路199号

(72)发明人 董艳丽

(51)Int.Cl.

A61K 36/9066(2006.01)

A61P 15/14(2006.01)

权利要求书1页 说明书3页

(54)发明名称

一种治疗乳痛的中药组合物

(57)摘要

本发明公开了一种治疗乳痛的中药组合物,其中药原料及重量份配比为:全瓜蒌10-30份,王不留行10-20份,金银花10-20份,茵陈5-15份,墨旱莲10-20份,倒生莲10-20份,小肺筋草10-20份,乳香5-15份,益母草10-20份,半枝莲10-20份,香橼5-15份,咸虾花10-20份,牛蒡10-20份,郁金10-20份,川贝母5-15份,凤尾草10-20份,当归10-20份,藏红花5-15份,珍珠菜10-20份,蒲公英10-20份,仙人掌10-20份,党参5-15份,赶山鞭10-20份,甘草5-15份。其具有清热解毒、行气活血、化瘀散结、消痈止痛的功效,治疗乳痛疗效显著,作用可靠。

1. 一种治疗乳痛的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:全瓜蒌10-30份,王不留行10-20份,金银花10-20份,茵陈5-15份,墨旱莲10-20份,倒生莲10-20份,小肺筋草10-20份,乳香5-15份,益母草10-20份,半枝莲10-20份,香橼5-15份,咸虾花10-20份,牛蒡10-20份,郁金10-20份,川贝母5-15份,凤尾草10-20份,当归10-20份,藏红花5-15份,珍珠菜10-20份,蒲葵子10-20份,仙人掌10-20份,党参5-15份,赶山鞭10-20份,甘草5-15份。

2. 根据权利要求1所述的一种治疗乳痛的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:全瓜蒌20份,王不留行15份,金银花15份,茵陈10份,墨旱莲15份,倒生莲15份,小肺筋草15份,乳香10份,益母草15份,半枝莲15份,香橼10份,咸虾花15份,牛蒡15份,郁金15份,川贝母10份,凤尾草15份,当归15份,藏红花10份,珍珠菜15份,蒲葵子15份,仙人掌15份,党参10份,赶山鞭15份,甘草10份。

一种治疗乳痛的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种传统草药的未确定结构的医用配制品,尤其是一种治疗乳痛的中药组合物。

背景技术

[0002] 乳痛是乳房常见的一种疾病,乳痛的表现是乳房红肿而且伴随着疼痛,乳痛还会出现乳汁排不出或者是排出受阻的症状并导致了结脓成痈。其多发于产后哺乳的产妇,尤其是初产妇更为多见,未分娩时、非哺乳期或妊娠后期也可偶见本病。其临床上常见症状有:乳房肿块胀痛、皮肤不红或微红、乳汁排泄不畅,伴恶寒发热,头痛,胸闷不舒,口干口苦等。目前,临床上治疗乳痛一般以口服抗生素类药物为主,虽然具有一定效果,但药物的副作用会对人体产生很大的伤害,尤其不适合哺乳期的女性。

[0003] 中医认为,乳痛的病因多为正虚邪侵,因初产妇人体虚,汗出受风,外邪侵袭;或乳头畸形、凹陷,婴儿吮吸导致乳头破碎,护理不当,毒邪外侵,可使乳络郁滞不通,化热成痈。

[0004] 根据中医理论,针对乳痛的发病机理,以化瘀散结、消痈止痛为治则,进行辨证配伍组方,以达到标本兼治的目的。

发明内容

[0005] 为了克服现有技术中采用抗生素类药物治疗乳痛存在副作用大的不足,本发明提供一种配制方便、药源广、疗效显著、作用可靠、无副作用的治疗乳痛的中药组合物。

[0006] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种治疗乳痛的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:全瓜蒌10-30份,王不留行10-20份,金银花10-20份,茵陈5-15份,墨旱莲10-20份,倒生莲10-20份,小肺筋草10-20份,乳香5-15份,益母草10-20份,半枝莲10-20份,香橼5-15份,咸虾花10-20份,牛蒡10-20份,郁金10-20份,川贝母5-15份,凤尾草10-20份,当归10-20份,藏红花5-15份,珍珠菜10-20份,蒲葵子10-20份,仙人掌10-20份,党参5-15份,赶山鞭10-20份,甘草5-15份。

[0007] 本发明的优选技术方案是:一种治疗乳痛的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:全瓜蒌20份,王不留行15份,金银花15份,茵陈10份,墨旱莲15份,倒生莲15份,小肺筋草15份,乳香10份,益母草15份,半枝莲15份,香橼10份,咸虾花15份,牛蒡15份,郁金15份,川贝母10份,凤尾草15份,当归15份,藏红花10份,珍珠菜15份,蒲葵子15份,仙人掌15份,党参10份,赶山鞭15份,甘草10份。

[0008] 本发明中药组合物是在传统中医理论和临床经验指导下,精选药物组方。本发明中药组合物中:全瓜蒌具有清热涤痰、宽胸散结、润燥滑肠的功效;王不留行具有行血通经、催生下乳、消肿敛疮的功效;金银花具有清热解毒、凉散风热的功效;茵陈具有清热利湿、退黄疸的功效;墨旱莲具有滋补肝肾、凉血止血的功效;倒生莲具有清热除湿、化瘀止血的功效;小肺筋草具有清热、润肺止咳、活血调经、杀虫的功效;乳香具有活血行气、止痛、消肿生肌的功效;益母草具有活血调经、利尿消肿、清热解毒的功效;半枝莲具有清热解毒、散瘀止

血、消肿定痛的功效；香橼具有舒肝理气、宽中化痰的功效；咸虾花具有清风清热、利湿解毒、散瘀消肿的功效；牛蒡具有疏散风热、宣肺透疹、利咽散结、解毒消肿的功效；郁金具有行气化瘀、清心解郁的功效；川贝母具有清热润肺、化痰止咳的功效；凤尾草具有清热利湿、凉血止血、消肿解毒的功效；当归具有补血活血、调经止痛，润肠通便的功效；藏红花具有活血化瘀、凉血解毒、解郁安神的功效；珍珠菜具有清热利湿、活血散瘀、解毒消痛的功效；蒲葵子具有活血化瘀、软坚散结的功效；仙人掌具有行气活血、清热解毒、凉血止血、清肺止咳的功效；党参具有补中益气、健脾益肺的功效；赶山鞭具有凉血止血、活血止痛、解毒消肿的功效；甘草具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、调和诸药的功效。本发明组合物中的药物组分经辩证配伍，在作用上相辅相成，具有协同作用，共奏清热解毒、行气活血、化瘀散结、消痛止痛之功效，对乳痛达到标本兼治的目的。

[0009] 本发明组合物的组分均采用天然的中药原料，其配制简便、药源广、成本低。其遵循中医的处方用药原则，各种组分药物采用水煎服用。经临床应用验证，其疗效显著，作用可靠，药性平和，未出现毒副作用，总有效率90%，治愈率达77%。

具体实施方式

[0010] 下面结合实施例对本发明做进一步说明。

[0011] 实施例1

一种治疗乳痛的中药组合物，其中药原料及重量配比为：全瓜蒌20g，王不留行15g，金银花15g，茵陈10g，墨旱莲15g，倒生莲15g，小肺筋草15g，乳香10g，益母草15g，半枝莲15g，香橼10g，咸虾花15g，牛蒡15g，郁金15g，川贝母10g，凤尾草15g，当归15g，藏红花10g，珍珠菜15g，蒲葵子15g，仙人掌15g，党参10g，赶山鞭15g，甘草10g。

[0012] 实施例2

一种治疗乳痛的中药组合物，其中药原料及重量配比为：全瓜蒌30g，王不留行10g，金银花20g，茵陈5g，墨旱莲20g，倒生莲10g，小肺筋草20g，乳香5g，益母草20g，半枝莲10g，香橼15g，咸虾花10g，牛蒡20g，郁金10g，川贝母15g，凤尾草10g，当归20g，藏红花5g，珍珠菜20g，蒲葵子10g，仙人掌20g，党参5g，赶山鞭20g，甘草5g。

[0013] 实施例3

一种治疗乳痛的中药组合物，其中药原料及重量配比为：全瓜蒌10g，王不留行20g，金银花10g，茵陈15g，墨旱莲10g，倒生莲20g，小肺筋草10g，乳香15g，益母草10g，半枝莲20g，香橼5g，咸虾花20g，牛蒡10g，郁金20g，川贝母5g，凤尾草20g，当归10g，藏红花15g，珍珠菜10g，蒲葵子20g，仙人掌10g，党参15g，赶山鞭10g，甘草-15g。

[0014] 实施例4

一种治疗乳痛的中药组合物，其中药原料及重量配比为：全瓜蒌23g，王不留行12g，金银花18g，茵陈7g，墨旱莲18g，倒生莲12g，小肺筋草18g，乳香7g，益母草18g，半枝莲12g，香橼13g，咸虾花12g，牛蒡18g，郁金12g，川贝母13g，凤尾草12g，当归18g，藏红花7g，珍珠菜18g，蒲葵子12g，仙人掌18g，党参7g，赶山鞭18g，甘草7g。

[0015] 实施例5

一种治疗乳痛的中药组合物，其中药原料及重量配比为：全瓜蒌17g，王不留行18g，金银花12g，茵陈13g，墨旱莲12g，倒生莲18g，小肺筋草12g，乳香13g，益母草12g，半枝莲18g，

香橼7g,咸虾花18g,牛蒡12g,郁金18g,川贝母7g,凤尾草18g,当归12g,藏红花13g,珍珠菜12g,蒲葵子18g,仙人掌12g,党参13g,赶山鞭12g,甘草13g。

[0016] 本发明实施例中的中药组合物按常规的水煎法制取药剂。具体方法如下:将组方的中药原料放入容器中,加冷水漫过药面,浸泡15~20分钟,再加水没过药面约8厘米,进行第一次煎煮,未沸前采用武火煎煮,沸后用文火煎煮20~30分钟;第二次煎煮,加水没过药面约6厘米,水沸后煎煮15~20分钟。两次煎煮去渣取汁,合并。

[0017] 本发明以实施例1所给出的一种治疗乳痛的中药组合物,做临床疗效总结如下:

一、一般性资料:本发明中药组合物应用于临床观察病例女52例,年龄20~45岁。

[0018] 二、诊断标准:

1、初起乳房内有疼痛性肿块,皮肤不红或微红,排乳不畅,可有乳头破裂糜烂;化脓时乳房肿痛加重,肿块变软,有应指感,溃破或切开引流后,肿痛减轻;如脓液流出不畅,肿痛不消,可有“传囊”之变;溃后不收口,渗流乳汁或脓液,可形成乳漏;

2、多有恶寒发热,头痛,周身不适等症;

3、患侧腋下可有髂核肿大疼痛;

4、患者多数为哺乳妇女,尤以未满月的初产妇为多见;

5、血白细胞总数及中性粒细胞增高。

[0019] 三、用法用量:临床应用时,一天一剂,水煎两遍取汁约300ml,分早、晚两次温热服用,六天为一疗程。服药期间忌食生冷、辛辣之物。

[0020] 四、疗效标准:

1、治愈:全身症状消失,肿块消散,疮口愈合;

2、好转:全身症状消失,局部肿痛减轻,或疮口尚未愈合;

3、未愈:反复“传囊”或形成乳漏。

[0021] 五、治疗效果:该临床观察病例中,服药3-10个疗程,治愈40例,好转7例,未愈5例。治疗期间未发生毒副作用。

[0022] 六、典型病例:

病例1:林某,26岁。患者自述:初起时右侧腋下乳房有肿胀感,有疼痛感,后病情加重,乳汁不通,乳头破裂流脓,乳房肿胀加重。口服抗生素药物,效果并不明显。服用本发明中药组合物制备的药剂3个疗程后,自觉不适感减轻,疮口逐渐愈合;继续服用3个疗程,症状消失,治愈。

[0023] 病例2:曲某,女,34岁。患者自述:初产后40天,由于工作原因出差三日未哺乳,后感觉乳房肿胀疼痛,乳汁不通,不敢触碰,乳头有脓性分泌物流出,并伴有恶寒发热,全身不适。服用本发明的中药组合物制备的药剂3个疗程,肿痛感明显减轻,排乳通畅;继续服用3个疗程后,各症状消失,治愈。