



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

На основании пункта 1 статьи 1366 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладатель обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и уведомил об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

(21)(22) Заявка: 2011121260/12, 27.05.2011

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
27.05.2011

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: **27.05.2011**

(45) Опубликовано: **27.09.2012** Бюл. № 27

(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 2248160 C2, 20.03.2005. RU 2248161 C2, 10.05.2005. RU 2251378 C2, 10.05.2005. RU 2356459 C1, 27.05.2005. САКИЕВ А.Э. Совершенствование технологии комплексной переработки табака и махорки в условиях Кыргызской Республики: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. - Краснодар, 2003, с.14, 15. МОЖАЕВ Е.Ю. (см. прод.)

Адрес для переписки:
115583, Москва, ул. Генерала Белова, 55, кв.247, О.И. Квасенкову

(72) Автор(ы):

Квасенков Олег Иванович (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Квасенков Олег Иванович (RU)

R U 2 4 6 2 1 0 6 C 1

(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НЕКУРИТЕЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТАБАКА (ВАРИАНТЫ)

(57) Реферат:

Группа изобретений относится к технологии производства некурительных никотинсодержащих изделий типа водного насвая. Способ предусматривает подготовку рецептурных компонентов, экстрагирование ароматического сырья, выбранного из заданной группы, жидкой двуокисью углерода с отделением соответствующей мисцеллы, резку и сушку в поле СВЧ при заданных параметрах процесса табака и топинамбура, их смешивание, пропитку отделенной мисцеллой с одновременным повышением давления, сброс давления до атмосферного с одновременным

замораживанием смеси, возгонку и удаление двуокиси углерода с одновременным вспучиванием смеси, добавление к ней концентрата персикового сока, сахарного сиропа, цитрата кальция и/или магния и воды и формование полученной смеси с получением целевого продукта. Группа изобретений позволяет получить новое некурительное никотинсодержащее изделие из табака, обладающее улучшенными органолептическими свойствами и увеличенным сроком хранения, при сокращении потерь ароматических веществ и никотина исходного сырья. 13 н.п. ф-лы.

(56) (продолжение):

Разработка технологии газожидкостной обработки табачного сырья: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. - Краснодар, 2003, с.16-21. US 4624269 A, 24.11.1986.

R U 2 4 6 2 1 0 6 C 1

R U 2 4 6 2 1 0 6 C 1

FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY**(12) ABSTRACT OF INVENTION**

According to Art. 1366, par. 1 of the Part IY of the Civil Code of the Russian Federation, the patent holder shall be committed to conclude a contract on alienation of the patent under the terms, corresponding to common practice, with any citizen of the Russian Federation or Russian legal entity who first declared such a willingness and notified this to the patent holder and the Federal Executive Authority for Intellectual Property.

(21)(22) Application: 2011121260/12, 27.05.2011

(24) Effective date for property rights:
27.05.2011

Priority:

(22) Date of filing: 27.05.2011

(45) Date of publication: 27.09.2012 Bull. 27

Mail address:
115583, Moskva, ul. Generala Belova, 55, kv.247,
O.I. Kvasenkovu

(72) Inventor(s):

Kvasenkov Oleg Ivanovich (RU)

(73) Proprietor(s):

Kvasenkov Oleg Ivanovich (RU)

(54) METHOD FOR PRODUCTION OF NON-SMOKING PRODUCTS OF TOBACCO (VERSIONS)

(57) Abstract:

FIELD: tobacco industry.

SUBSTANCE: inventions group relates to a technology for production of non-smoking nicotine-containing products like water naswar. The method envisages preparation of recipe components, extraction of aromatic raw material chosen from the specified group with liquid carbon dioxide to separate corresponding miscella; one performs cutting and drying tobacco and girasol in microwave field at preset process parameters, their blending, impregnation with separated miscella with simultaneous pressure boost, depressurisation to

atmospheric value with simultaneous freezing of the mixture, subliming and removal of carbon dioxide with simultaneous swelling of the mixture, addition of peach juice concentrate, sugar syrup, calcium and/or magnesium citrate and water and moulding the produced mixture to produce the end product.

EFFECT: inventions group allows to produce a non-smoking nicotine-containing tobacco product with improved organoleptic properties and extended storage life combined with decreasing losses of flavouring substances and initial raw material nicotine.

13 cl

R U 2 4 6 2 1 0 6 C 1

R U 2 4 6 2 1 0 6 C 1

Группа изобретений относится к технологии производства некурительных никотинсодержащих изделий типа водного насыща.

Известен способ получения некурительного изделия из махорки, предусматривающий подготовку рецептурных компонентов, экстрагирование махорки жидким диоксидом углерода, ее измельчение и смешивание с порошком из корня солодки, пектином, фруктозой и CO₂-экстрактом мяты перечной и формование полученной смеси (Сакиев А.Э. Совершенствование технологии комплексной переработки табака и махорки в условиях Кыргызской Республики. Автореферат дис. к.т.н. - Краснодар: КубГТУ-БГУ, 2003, с.13-15).

Недостатками этого способа являются высокие потери ароматических веществ и никотина махорки, низкие органолептические свойства целевого продукта и малый срок его хранения.

Техническим результатом группы изобретений является получение нового некурительного никотинсодержащего изделия из табака, обладающего улучшенными органолептическими свойствами и увеличенным сроком хранения, при сокращении потерь ароматических веществ и никотина исходного сырья.

Этот результат достигается тем, что способ получения некурительного изделия из табака предусматривает подготовку рецептурных компонентов, экстрагирование ванили жидким диоксидом углерода с отделением соответствующей мисцеллы, резку табака и топинамбура, их сушку в поле СВЧ до остаточной влажности около 20% при мощности поля СВЧ, обеспечивающей разогрев сырья до температуры внутри кусочков 80-90°C, в течение не менее 1 часа, их смешивание, пропитку отделенной мисцеллой с содержанием экстракта 0,03% от массы смеси с одновременным повышением давления, сброс давления до атмосферного с одновременным замораживанием смеси, возгонку и удаление диоксида углерода с одновременным вспучиванием смеси, добавление к ней концентрата персикового сока, сахарного сиропа, цитрата кальция и/или магния и воды и формование полученной смеси, при этом смесь готовят при следующем соотношении компонентов по массе с точностью ±2%:

35	табак	530
	топинамбур	170
	концентрат персикового сока, в пересчете на 70%-ное содержание сухих веществ	90
	сахарный сироп, в пересчете на 70%-ную концентрацию	90
40	цитрат кальция и/или магния	70
	вода	до 1000.

Тот же результат достигается тем, что способ получения некурительного изделия из табака предусматривает подготовку рецептурных компонентов, экстрагирование гвоздики жидким диоксидом углерода с отделением соответствующей мисцеллы, резку табака и топинамбура, их сушку в поле СВЧ до остаточной влажности около 20% при мощности поля СВЧ, обеспечивающей разогрев сырья до температуры внутри кусочков 80-90°C, в течение не менее 1 часа, их смешивание, пропитку отделенной мисцеллой с содержанием экстракта 0,03% от массы смеси с одновременным повышением давления, сброс давления до атмосферного с одновременным замораживанием смеси, возгонку и удаление диоксида углерода с одновременным вспучиванием смеси, добавление к ней концентрата персикового сока, сахарного сиропа, цитрата кальция и/или магния и воды и формование полученной смеси, при

этом смесь готовят при следующем соотношении компонентов по массе с точностью ±2%:

5	табак	530
	топинамбур	170
	концентрат персикового сока, в пересчете на 70%-ное содержание сухих веществ	90
	сахарный сироп, в пересчете на 70%-ную концентрацию	90
10	цитрат кальция и/или магния	70
	вода	до 1000.

15 Тот же результат достигается тем, что способ получения некурительного изделия из табака предусматривает подготовку рецептурных компонентов, экстрагирование корицы жидкой двуокисью углерода с отделением соответствующей мисцеллы, резку табака и топинамбура, их сушку в поле СВЧ до остаточной влажности около 20% при мощности поля СВЧ, обеспечивающей разогрев сырья до температуры внутри кусочков 80-90°C, в течение не менее 1 часа, их смешивание, пропитку отделенной мисцеллой с содержанием экстракта 0,03% от массы смеси с одновременным повышением давления, сброс давления до атмосферного с одновременным замораживанием смеси, возгонку и удаление двуокиси углерода с одновременным вспучиванием смеси, добавление к ней концентрата персикового сока, сахарного сиропа, цитрата кальция и/или магния и воды и формование полученной смеси, при этом смесь готовят при следующем соотношении компонентов по массе с точностью ±2%:

30	табак	530
	топинамбур	170
	концентрат персикового сока, в пересчете на 70%-ное содержание сухих веществ	90
	сахарный сироп, в пересчете на 70%-ную концентрацию	90
	цитрат кальция и/или магния	70
	вода	до 1000.

35 Тот же результат достигается тем, что способ получения некурительного изделия из табака предусматривает подготовку рецептурных компонентов, экстрагирование фенхеля жидкой двуокисью углерода с отделением соответствующей мисцеллы, резку табака и топинамбура, их сушку в поле СВЧ до остаточной влажности около 20% при мощности поля СВЧ, обеспечивающей разогрев сырья до температуры внутри кусочков 80-90°C, в течение не менее 1 часа, их смешивание, пропитку отделенной мисцеллой с содержанием экстракта 0,03% от массы смеси с одновременным повышением давления, сброс давления до атмосферного с одновременным замораживанием смеси, возгонку и удаление двуокиси углерода с одновременным вспучиванием смеси, добавление к ней концентрата персикового сока, сахарного сиропа, цитрата кальция и/или магния и воды и формование полученной смеси, при этом смесь готовят при следующем соотношении компонентов по массе с точностью ±2%:

50	табак	530
	топинамбур	170
	концентрат персикового сока, в пересчете на	

70%-ное содержание сухих веществ	90
сахарный сироп, в пересчете на 70%-ную	
концентрацию	90
цитрат кальция и/или магния	70
вода	до 1000.

5

Тот же результат достигается тем, что способ получения некурительного изделия из табака предусматривает подготовку рецептурных компонентов, экстрагирование эстрагона жидкой двуокисью углерода с отделением соответствующей мисцеллы,

10 резку табака и топинамбура, их сушку в поле СВЧ до остаточной влажности около 20% при мощности поля СВЧ, обеспечивающей разогрев сырья до температуры внутри кусочков 80-90°C, в течение не менее 1 часа, их смешивание, пропитку отделенной мисцеллой с содержанием экстракта 0,03% от массы смеси с одновременным повышением давления, сброс давления до атмосферного с

15 одновременным замораживанием смеси, возгонку и удаление двуокиси углерода с одновременным вспучиванием смеси, добавление к ней концентрата персикового сока, сахарного сиропа, цитрата кальция и/или магния и воды и формование полученной смеси, при этом смесь готовят при следующем соотношении компонентов по массе с точностью ±2%:

25

табак	530
топинамбур	170
концентрат персикового сока, в пересчете на	
70%-ное содержание сухих веществ	90
сахарный сироп, в пересчете на 70%-ную	
концентрацию	90
цитрат кальция и/или магния	70
вода	до 1000.

30

Тот же результат достигается тем, что способ получения некурительного изделия из табака предусматривает подготовку рецептурных компонентов, экстрагирование кардамона жидкой двуокисью углерода с отделением соответствующей мисцеллы, резку табака и топинамбура, их сушку в поле СВЧ до остаточной влажности

около 20% при мощности поля СВЧ, обеспечивающей разогрев сырья до температуры внутри кусочков 80-90°C, в течение не менее 1 часа, их смешивание, пропитку отделенной мисцеллой с содержанием экстракта 0,03% от массы смеси с одновременным повышением давления, сброс давления до атмосферного с одновременным замораживанием смеси, возгонку и удаление двуокиси углерода с

одновременным вспучиванием смеси, добавление к ней концентрата персикового сока, сахарного сиропа, цитрата кальция и/или магния и воды и формование полученной смеси, при этом смесь готовят при следующем соотношении компонентов по массе с точностью ±2%:

45

табак	530
топинамбур	170
концентрат персикового сока, в пересчете на	
70%-ное содержание сухих веществ	90
сахарный сироп, в пересчете на 70%-ную	
концентрацию	90
цитрат кальция и/или магния	70
вода	до 1000.

50

Тот же результат достигается тем, что способ получения некурительного изделия из

табака предусматривает подготовку рецептурных компонентов, экстрагирование лавра коричного жидким углеродом с отделением соответствующей мисцеллы, резку табака и топинамбура, их сушку в поле СВЧ до остаточной влажности около 20% при мощности поля СВЧ, обеспечивающей разогрев сырья до температуры внутри кусочков 80-90°C, в течение не менее 1 часа, их смешивание, пропитку отделенной мисцеллой с содержанием экстракта 0,03% от массы смеси с одновременным повышением давления, сброс давления до атмосферного с одновременным замораживанием смеси, возгонку и удаление двуокиси углерода с одновременным вспучиванием смеси, добавление к ней концентрата персикового сока, сахарного сиропа, цитрата кальция и/или магния и воды и формование полученной смеси, при этом смесь готовят при следующем соотношении компонентов по массе с точностью ±2%:

15	табак	530
	топинамбур	170
	концентрат персикового сока, в пересчете на 70%-ное содержание сухих веществ	90
	сахарный сироп, в пересчете на 70%-ную концентрацию	90
20	цитрат кальция и/или магния	70
	вода	до 1000.

Тот же результат достигается тем, что способ получения некурительного изделия из табака предусматривает подготовку рецептурных компонентов, экстрагирование лимонника китайского жидким углеродом с отделением соответствующей мисцеллы, резку табака и топинамбура, их сушку в поле СВЧ до остаточной влажности около 20% при мощности поля СВЧ, обеспечивающей разогрев сырья до температуры внутри кусочков 80-90°C, в течение не менее 1 часа, их смешивание, пропитку отделенной мисцеллой с содержанием экстракта 0,03% от массы смеси с одновременным повышением давления, сброс давления до атмосферного с одновременным вспучиванием смеси, добавление к ней концентрата персикового сока, сахарного сиропа, цитрата кальция и/или магния и воды и формование полученной смеси, при этом смесь готовят при следующем соотношении компонентов по массе с точностью ±2%:

40	табак	530
	топинамбур	170
	концентрат персикового сока, в пересчете на 70%-ное содержание сухих веществ	90
	сахарный сироп, в пересчете на 70%-ную концентрацию	90
45	цитрат кальция и/или магния	70
	вода	до 1000.

Тот же результат достигается тем, что способ получения некурительного изделия из табака предусматривает подготовку рецептурных компонентов, экстрагирование перца душистого жидким углеродом с отделением соответствующей мисцеллы, резку табака и топинамбура, их сушку в поле СВЧ до остаточной влажности около 20% при мощности поля СВЧ, обеспечивающей разогрев сырья до температуры внутри кусочков 80-90°C, в течение не менее 1 часа, их смешивание, пропитку отделенной мисцеллой с содержанием экстракта 0,03% от массы смеси с

одновременным повышением давления, сброс давления до атмосферного с одновременным замораживанием смеси, возгонку и удаление двуокиси углерода с одновременным вспучиванием смеси, добавление к ней концентрата персикового сока, сахарного сиропа, цитрата кальция и/или магния и воды и формование полученной смеси, при этом смесь готовят при следующем соотношении компонентов по массе с точностью $\pm 2\%$:

	табак	530
	топинамбур	170
10	концентрат персикового сока, в пересчете на 70%-ное содержание сухих веществ	90
	сахарный сироп, в пересчете на 70%-ную концентрацию	90
	цитрат кальция и/или магния	70
15	вода	до 1000.

Тот же результат достигается тем, что способ получения некурительного изделия из табака предусматривает подготовку рецептурных компонентов, экстрагирование мяты перечной жидким углеродом с отделением соответствующей мисцеллы, резку табака и топинамбура, их сушку в поле СВЧ до остаточной влажности около 20% при мощности поля СВЧ, обеспечивающей разогрев сырья до температуры внутри кусочков 80-90°C, в течение не менее 1 часа, их смешивание, пропитку отделенной мисцеллой с содержанием экстракта 0,03% от массы смеси с одновременным повышением давления, сброс давления до атмосферного с одновременным замораживанием смеси, возгонку и удаление двуокиси углерода с одновременным вспучиванием смеси, добавление к ней концентрата персикового сока, сахарного сиропа, цитрата кальция и/или магния и воды и формование полученной смеси, при этом смесь готовят при следующем соотношении компонентов по массе с точностью $\pm 2\%$:

	табак	530
	топинамбур	170
	концентрат персикового сока, в пересчете на 70%-ное содержание сухих веществ	90
35	сахарный сироп, в пересчете на 70%-ную концентрацию	90
	цитрат кальция и/или магния	70
	вода	до 1000.

40 Тот же результат достигается тем, что способ получения некурительного изделия из табака предусматривает подготовку рецептурных компонентов, экстрагирование мелиссы лекарственной жидким углеродом с отделением соответствующей мисцеллы, резку табака и топинамбура, их сушку в поле СВЧ до остаточной влажности около 20% при мощности поля СВЧ, обеспечивающей разогрев сырья до температуры внутри кусочков 80-90°C, в течение не менее 1 часа, их смешивание, пропитку отделенной мисцеллой с содержанием экстракта 0,03% от массы смеси с одновременным повышением давления, сброс давления до атмосферного с одновременным замораживанием смеси, возгонку и удаление двуокиси углерода с одновременным вспучиванием смеси, добавление к ней концентрата персикового сока, сахарного сиропа, цитрата кальция и/или магния и воды и формование полученной смеси, при этом смесь готовят при следующем соотношении компонентов по массе с точностью $\pm 2\%$:

	табак	530
	топинамбур	170
	концентрат персикового сока, в пересчете на 70%-ное содержание сухих веществ	90
5	сахарный сироп, в пересчете на 70%-ную концентрацию	90
	цитрат кальция и/или магния	70
	вода	до 1000.

10 Тот же результат достигается тем, что способ получения некурительного изделия из табака предусматривает подготовку рецептурных компонентов, экстрагирование мелиссы лимонной жидкостью двуокисью углерода с отделением соответствующей мисцеллы, резку табака и топинамбура, их сушку в поле СВЧ до остаточной влажности около 20% при мощности поля СВЧ, обеспечивающей разогрев сырья до температуры внутри кусочков 80-90°C, в течение не менее 1 часа, их смешивание, пропитку отделенной мисцеллой с содержанием экстракта 0,03% от массы смеси с одновременным повышением давления, сброс давления до атмосферного с одновременным замораживанием смеси, возгонку и удаление двуокиси углерода с одновременным вспучиванием смеси, добавление к ней концентрата персикового сока, сахарного сиропа, цитрата кальция и/или магния и воды и формование полученной смеси, при этом смесь готовят при следующем соотношении компонентов по массе с точностью ±2%:

25	табак	530
	топинамбур	170
	концентрат персикового сока, в пересчете на 70%-ное содержание сухих веществ	90
	сахарный сироп, в пересчете на 70%-ную концентрацию	90
30	цитрат кальция и/или магния	70
	вода	до 1000.

35 Тот же результат достигается тем, что способ получения некурительного изделия из табака предусматривает подготовку рецептурных компонентов, экстрагирование цедры цитрусовых жидкостью двуокисью углерода с отделением соответствующей мисцеллы, резку табака и топинамбура, их сушку в поле СВЧ до остаточной влажности около 20% при мощности поля СВЧ, обеспечивающей разогрев сырья до температуры внутри кусочков 80-90°C, в течение не менее 1 часа, их смешивание, пропитку отделенной мисцеллой с содержанием экстракта 0,03% от массы смеси с одновременным повышением давления, сброс давления до атмосферного с одновременным замораживанием смеси, возгонку и удаление двуокиси углерода с одновременным вспучиванием смеси, добавление к ней концентрата персикового сока, сахарного сиропа, цитрата кальция и/или магния и воды и формование полученной смеси, при этом смесь готовят при следующем соотношении компонентов по массе с точностью ±2%:

50	табак	530
	топинамбур	170
	концентрат персикового сока, в пересчете на 70%-ное содержание сухих веществ	90
	сахарный сироп, в пересчете на 70%-ную концентрацию	90

цитрат кальция и/или магния
вода

70
до 1000.

Способы реализуются следующим образом.

- ⁵ Рецептурные компоненты подготавливают по традиционной технологии.
 Ваниль, или гвоздику, или корицу, или фенхель, или эстрагон, или кардамон, или лавр коричный, или лимонник китайский, или перец душистый, или мяту перечную, или мелиссу лекарственную, или мелиссу лимонную, или цедру цитрусовых экстрагируют жидкой двуокисью углерода и отделяют мисцеллу по известной ¹⁰ технологии (Касьянов Г.И., Кvasенков О.И., Нематуллаев И., Нестеров В.В. Обработка растительного сырья сжиженными и сжатыми газами. - М.: АгроНИИТЭИПП, 1993, с.7-15).

- Табак и топинамбур нарезают и раздельно сушат в поле СВЧ до остаточной ¹⁵ влажности около 20% в течение не менее 1 часа. При этом по известным зависимостям (Губиев Ю.К. Научно-практические основы теплотехнологических процессов пищевых производств в электромагнитном поле СВЧ. Автореферат дис. д.т.н. - М.: МТИПП, 1990, с.7-11) рассчитывают значения мощности поля СВЧ, позволяющие обеспечить время сушки каждого вида сырья 1 час и разогрев до ²⁰ температуры внутри кусочков 80 и 90°C. Мощность поля СВЧ для каждого вида сырья задают больше или равной второму значению и меньше или равной меньшему из первого и третьего значений рассчитанных мощностей.

- Сушка в поле СВЧ при температуре выше 90°C приводит к карамелизации сахаров. ²⁵ Сушка в поле СВЧ при температуре ниже 80°C и сокращение времени сушки менее 1 часа приводят к ухудшению консистенции целевого продукта. Поскольку увеличение времени сушки автоматически приводит к увеличению удельных энергозатрат, максимальное значение времени сушки определяют по функции желательности Харрингтона для наилучшей консистенции целевого продукта при минимальных ³⁰ удельных затратах энергии.

- Затем табак и топинамбур смешивают в рецептурном соотношении и заливают для пропитки отделенной мисцеллой. Соотношение мисцеллы и пропитываемого сырья рассчитывают по концентрации экстракта в мисцелле для достижения содержания ³⁵ экстракта в мисцелле, равного 0,03% от массы пропитываемой смеси. Пропитку осуществляют в герметичной емкости, давление в которой автоматически повышается до значения, соответствующего давлению насыщенных паров двуокиси углерода при температуре пропитки. Время пропитки рассчитывают по известным закономерностям массообмена (Космодемьянский Ю.В. Процессы и аппараты ⁴⁰ пищевых производств. Учебник для студентов техникумов. - М.: Колос, 1997, с.135-162). При этом происходит впитывание двуокиси углерода и насыщение смеси растительных компонентов содержащимися в мисцелле ароматическими веществами.

- После завершения пропитки давление в емкости сбрасывают до атмосферного, что ⁴⁵ обеспечивает испарение части двуокиси углерода и замораживание смеси растительных компонентов и оставшейся части двуокиси углерода.

- Затем осуществляют возгонку и удаление двуокиси углерода, что приводит к вспучиванию растительных компонентов в соответствии с известной технологией (RU 2290000 C1, 2006).

- ⁵⁰ К вспученной смеси в рецептурных количествах добавляют концентрат персикового сока, сахарный сироп, цитрат кальция и/или магния и воду с точностью, соответствующей точности используемого в отрасли дозирующего оборудования. При использовании концентрата персикового сока с содержанием сухих веществ, не

совпадающим с рецептурным, и/или сахарного сиропа с концентрацией, не совпадающей с рецептурной, осуществляют пересчет их рецептурного количества на эквивалентное содержание сухих веществ и/или сахара соответственно по известным зависимостям (Сборник технологических инструкций по производству консервов.

5 Том I. - М.: АППП "Консервплодоовощ", 1990, с.124). Компоненты перемешивают, а полученную в итоге смесь формуют, например в виде гранул, как традиционный водный насвай, от которого полученный продукт отличается выраженным сладким вкусом и фруктовым оттенком аромата. Выбор катиона кальция или магния цитрата

10 не влияет на качество целевого продукта.

По сравнению с наиболее близким аналогом потери ароматических веществ исходного сырья сокращены на 92-95%, потери никотина исключены полностью.

Полученные по описанной технологии и по наиболее близкому аналогу гранулы с диаметром около 2 мм расфасовывали в стеклянные пузырьки с резиновыми 15 пробками по 50 г. Гранулы отбирали для дегустационной оценки непосредственно после изготовления и через каждые 2 дня в течение 2 месяцев.

Продукт, полученный по наиболее близкому аналогу, имел выраженный сладкий мятым вкус и легкий мятым аромат, легко разжевывался, напоминая по 20 консистенции помадные конфеты, теряя вкус и аромат за 10-15 с, рассасывался до состояния кашицы и терял вкус и аромат за 30-45 с, через 8 дней хранения гранулы начинали слипаться, через 10-12 дней комковались и прилипали к стенкам тары, то есть приходили в непригодное для употребления состояние.

25 Продукт, полученный по описанной технологии, имел выраженный сладкий вкус и характерные табачные тона с фруктовым оттенком во вкусе и аромате, разжевывался до состояния кашицы и терял вкус и аромат за 30-45 с, рассасывался до состояния кашицы и терял вкус и аромат за 5-7 минут, гранулы неслипались в течение всего срока испытаний.

30 Таким образом, предлагаемая группа изобретений позволяет получить новое некурительное никотинсодержащее изделие из табака, обладающее улучшенными органолептическими свойствами и увеличенным сроком хранения, при сокращении потерь ароматических веществ и никотина исходного сырья.

35 Формула изобретения

1. Способ получения некурительного изделия из табака, предусматривающий подготовку рецептурных компонентов, экстрагирование ванили жидкой двуокисью углерода с отделением соответствующей мисцеллы, резку табака и топинамбура, их 40 сушку в поле СВЧ до остаточной влажности около 20% при мощности поля СВЧ, обеспечивающей разогрев сырья до температуры внутри кусочков 80-90°C, в течение не менее 1 ч, их смешивание, пропитку отделенной мисцеллой с содержанием экстракта 0,03% от массы смеси с одновременным повышением давления, сброс давления до атмосферного с одновременным замораживанием смеси, возгонку и 45 удаление двуокиси углерода с одновременным вскипанием смеси, добавление к ней концентрата персикового сока, сахарного сиропа, цитрата кальция и/или магния и воды и формование полученной смеси, при этом смесь готовят при следующем соотношении компонентов по массе с точностью ±2%:

50	табак	530
	топинамбур	170
	концентрат персикового сока, в пересчете на	
	70%-ное содержание сухих веществ	90

сахарный сироп, в пересчете на 70%-ную	
концентрацию	90
цитрат кальция и/или магния	70
вода	до 1000

5 2. Способ получения некурительного изделия из табака, предусматривающий подготовку рецептурных компонентов, экстрагирование гвоздики жидкой двуокисью углерода с отделением соответствующей мисцеллы, резку табака и топинамбура, их сушку в поле СВЧ до остаточной влажности около 20% при мощности поля СВЧ,
10 обеспечивающей разогрев сырья до температуры внутри кусочков 80-90°C, в течение не менее 1 ч, их смешивание, пропитку отделенной мисцеллой с содержанием экстракта 0,03% от массы смеси с одновременным повышением давления, сброс давления до атмосферного с одновременным замораживанием смеси, возгонку и
15 удаление двуокиси углерода с одновременным всучиванием смеси, добавление к ней концентрата персикового сока, сахарного сиропа, цитрата кальция и/или магния и воды и формование полученной смеси, при этом смесь готовят при следующем соотношении компонентов по массе с точностью ±2%:

20	табак	530
	топинамбур	170
	концентрат персикового сока, в пересчете на 70%-ное содержание сухих веществ	90
	сахарный сироп, в пересчете на 70%	
	концентрацию	90
25	цитрат кальция и/или магния	70
	вода	до 1000

3. Способ получения некурительного изделия из табака, предусматривающий подготовку рецептурных компонентов, экстрагирование корицы жидкой двуокисью углерода с отделением соответствующей мисцеллы, резку табака и топинамбура, их сушку в поле СВЧ до остаточной влажности около 20% при мощности поля СВЧ, обеспечивающей разогрев сырья до температуры внутри кусочков 80-90°C, в течение не менее 1 ч, их смешивание, пропитку отделенной мисцеллой с содержанием экстракта 0,03% от массы смеси с одновременным повышением давления, сброс давления до атмосферного с одновременным замораживанием смеси, возгонку и удаление двуокиси углерода с одновременным всучиванием смеси, добавление к ней концентрата персикового сока, сахарного сиропа, цитрата кальция и/или магния и воды и формование полученной смеси, при этом смесь готовят при следующем соотношении компонентов по массе с точностью ±2%:

40	табак	530
	топинамбур	170
	концентрат персикового сока, в пересчете на 70%-ное содержание сухих веществ	90
	сахарный сироп, в пересчете на 70%-ную	
	концентрацию	90
45	цитрат кальция и/или магния	70
	вода	до 1000

50 4. Способ получения некурительного изделия из табака, предусматривающий подготовку рецептурных компонентов, экстрагирование фенхеля жидкой двуокисью углерода с отделением соответствующей мисцеллы, резку табака и топинамбура, их

сушку в поле СВЧ до остаточной влажности около 20% при мощности поля СВЧ, обеспечивающей разогрев сырья до температуры внутри кусочков 80-90°C, в течение не менее 1 ч, их смешивание, пропитку отделенной мисцеллой с содержанием экстракта 0,03% от массы смеси с одновременным повышением давления, сброс давления до атмосферного с одновременным замораживанием смеси, возгонку и удаление двуокиси углерода с одновременным вспучиванием смеси, добавление к ней концентрата персикового сока, сахарного сиропа, цитрата кальция и/или магния и воды и формование полученной смеси, при этом смесь готовят при следующем соотношении компонентов по массе с точностью ±2%:

	табак	530
	топинамбур	170
	концентрат персикового сока, в пересчете на 70%-ное содержание сухих веществ	90
	сахарный сироп, в пересчете на 70%-ную концентрацию	90
	цитрат кальция и/или магния	70
	вода	до 1000

5. Способ получения некурительного изделия из табака, предусматривающий подготовку рецептурных компонентов, экстрагирование эстрагона жидкой двуокисью углерода с отделением соответствующей мисцеллы, резку табака и топинамбура, их сушку в поле СВЧ до остаточной влажности около 20% при мощности поля СВЧ, обеспечивающей разогрев сырья до температуры внутри кусочков 80-90°C, в течение не менее 1 ч, их смешивание, пропитку отделенной мисцеллой с содержанием экстракта 0,03% от массы смеси с одновременным повышением давления, сброс давления до атмосферного с одновременным замораживанием смеси, добавление к ней концентрата персикового сока, сахарного сиропа, цитрата кальция и/или магния и воды и формование полученной смеси, при этом смесь готовят при следующем соотношении компонентов по массе с точностью ±2%:

	табак	530
	топинамбур	170
	концентрат персикового сока, в пересчете на 70%-ное содержание сухих веществ	90
	сахарный сироп, в пересчете на 70%-ную концентрацию	90
	цитрат кальция и/или магния	70
	вода	до 1000

6. Способ получения некурительного изделия из табака, предусматривающий подготовку рецептурных компонентов, экстрагирование кардамона жидкой двуокисью углерода с отделением соответствующей мисцеллы, резку табака и топинамбура, их сушку в поле СВЧ до остаточной влажности около 20% при мощности поля СВЧ, обеспечивающей разогрев сырья до температуры внутри кусочков 80-90°C, в течение не менее 1 ч, их смешивание, пропитку отделенной мисцеллой с содержанием экстракта 0,03% от массы смеси с одновременным повышением давления, сброс давления до атмосферного с одновременным замораживанием смеси, возгонку и удаление двуокиси углерода с одновременным вспучиванием смеси, добавление к ней концентрата персикового сока, сахарного сиропа, цитрата кальция и/или магния и воды и формование полученной смеси, при

этом смесь готовят при следующем соотношении компонентов по массе с точностью $\pm 2\%$:

5	табак	530
	топинамбур	170
	концентрат персикового сока, в пересчете на 70%-ное содержание сухих веществ	90
	сахарный сироп, в пересчете на 70%-ную концентрацию	90
10	цитрат кальция и/или магния	70
	вода	до 1000

7. Способ получения некурительного изделия из табака, предусматривающий подготовку рецептурных компонентов, экстрагирование лавра коричного жидкой двуокисью углерода с отделением соответствующей мисцеллы, резку табака и топинамбура, их сушку в поле СВЧ до остаточной влажности около 20% при мощности поля СВЧ, обеспечивающей разогрев сырья до температуры внутри кусочков 80-90°C, в течение не менее 1 ч, их смешивание, пропитку отделенной мисцеллой с содержанием экстракта 0,03% от массы смеси с одновременным повышением давления, сброс давления до атмосферного с одновременным замораживанием смеси, возгонку и удаление двуокиси углерода с одновременным вспучиванием смеси, добавление к ней концентрата персикового сока, сахарного сиропа, цитрата кальция и/или магния и воды и формование полученной смеси, при этом смесь готовят при следующем соотношении компонентов по массе с точностью $\pm 2\%$:

30	табак	530
	топинамбур	170
	концентрат персикового сока, в пересчете на 70%-ное содержание сухих веществ	90
	сахарный сироп, в пересчете на 70%-ную концентрацию	90
	цитрат кальция и/или магния	70
	вода	до 1000

8. Способ получения некурительного изделия из табака, предусматривающий подготовку рецептурных компонентов, экстрагирование лимонника китайского жидкой двуокисью углерода с отделением соответствующей мисцеллы, резку табака и топинамбура, их сушку в поле СВЧ до остаточной влажности около 20% при мощности поля СВЧ, обеспечивающей разогрев сырья до температуры внутри кусочков 80-90°C, в течение не менее 1 ч, их смешивание, пропитку отделенной мисцеллой с содержанием экстракта 0,03% от массы смеси с одновременным повышением давления, сброс давления до атмосферного с одновременным замораживанием смеси, возгонку и удаление двуокиси углерода с одновременным вспучиванием смеси, добавление к ней концентрата персикового сока, сахарного сиропа, цитрата кальция и/или магния и воды и формование полученной смеси, при этом смесь готовят при следующем соотношении компонентов по массе с точностью $\pm 2\%$:

50	табак	530
	топинамбур	170
	концентрат персикового сока, в пересчете на	

70%-ное содержание сухих веществ	90
сахарный сироп, в пересчете на 70%-ную	
концентрацию	90
цитрат кальция и/или магния	70
вода	до 1000

5

9. Способ получения некурительного изделия из табака, предусматривающий подготовку рецептурных компонентов, экстрагирование перца душистого жидкой двуокисью углерода с отделением соответствующей мисцеллы, резку табака и топинамбура, их сушку в поле СВЧ до остаточной влажности около 20% при мощности поля СВЧ, обеспечивающей разогрев сырья до температуры внутри кусочков 80-90°C, в течение не менее 1 ч, их смешивание, пропитку отделенной мисцеллой с содержанием экстракта 0,03% от массы смеси с одновременным повышением давления, сброс давления до атмосферного с одновременным замораживанием смеси, возгонку и удаление двуокиси углерода с одновременным вспучиванием смеси, добавление к ней концентрата персикового сока, сахарного сиропа, цитрата кальция и/или магния и воды и формование полученной смеси, при этом смесь готовят при следующем соотношении компонентов по массе с точностью ±2%:

табак	530
топинамбур	170
концентрат персикового сока, в пересчете на	
70%-ное содержание сухих веществ	90
сахарный сироп, в пересчете на 70%-ную	
концентрацию	90
цитрат кальция и/или магния	70
вода	до 1000

10. Способ получения некурительного изделия из табака, предусматривающий подготовку рецептурных компонентов, экстрагирование мяты перечной жидкой двуокисью углерода с отделением соответствующей мисцеллы, резку табака и топинамбура, их сушку в поле СВЧ до остаточной влажности около 20% при мощности поля СВЧ, обеспечивающей разогрев сырья до температуры внутри кусочков 80-90°C, в течение не менее 1 ч, их смешивание, пропитку отделенной мисцеллой с содержанием экстракта 0,03% от массы смеси с одновременным повышением давления, сброс давления до атмосферного с одновременным замораживанием смеси, возгонку и удаление двуокиси углерода с одновременным вспучиванием смеси, добавление к ней концентрата персикового сока, сахарного сиропа, цитрата кальция и/или магния и воды и формование полученной смеси, при этом смесь готовят при следующем соотношении компонентов по массе с точностью ±2%:

табак	530
топинамбур	170
концентрат персикового сока, в пересчете на	
70%-ное содержание сухих веществ	90
сахарный сироп, в пересчете на 70%-ную	
концентрацию	90
цитрат кальция и/или магния	70
вода	до 1000

11. Способ получения некурительного изделия из табака, предусматривающий

подготовку рецептурных компонентов, экстрагирование мелиссы лекарственной
жидкой двуокисью углерода с отделением соответствующей мисцеллы, резку табака и
топинамбура, их сушку в поле СВЧ до остаточной влажности около 20% при
мощности поля СВЧ, обеспечивающей разогрев сырья до температуры внутри
5 кусочков 80-90°C, в течение не менее 1 ч, их смешивание, пропитку отделенной
мисцеллой с содержанием экстракта 0,03% от массы смеси с одновременным
повышением давления, сброс давления до атмосферного с одновременным
замораживанием смеси, возгонку и удаление двуокиси углерода с одновременным
10 вспучиванием смеси, добавление к ней концентрата персикового сока, сахарного
сиропа, цитрата кальция и/или магния и воды и формование полученной смеси, при
этом смесь готовят при следующем соотношении компонентов по массе с точностью
 $\pm 2\%$:

15	табак	530
	топинамбур	170
	концентрат персикового сока, в пересчете на 70%-ное содержание сухих веществ	90
	сахарный сироп, в пересчете на 70%-ную концентрацию	90
20	цитрат кальция и/или магния	70
	вода	до 1000

12. Способ получения некурительного изделия из табака, предусматривающий
подготовку рецептурных компонентов, экстрагирование мелиссы лимонной жидкой
25 двуокисью углерода с отделением соответствующей мисцеллы, резку табака и
топинамбура, их сушку в поле СВЧ до остаточной влажности около 20% при
мощности поля СВЧ, обеспечивающей разогрев сырья до температуры внутри
кусочков 80-90°C, в течение не менее 1 ч, их смешивание, пропитку отделенной
30 мисцеллой с содержанием экстракта 0,03% от массы смеси с одновременным
повышением давления, сброс давления до атмосферного с одновременным
замораживанием смеси, возгонку и удаление двуокиси углерода с одновременным
вспучиванием смеси, добавление к ней концентрата персикового сока, сахарного
сиропа, цитрата кальция и/или магния и воды и формование полученной смеси, при
35 этом смесь готовят при следующем соотношении компонентов по массе с точностью
 $\pm 2\%$:

40	табак	530
	топинамбур	170
	концентрат персикового сока, в пересчете на 70%-ное содержание сухих веществ	90
	сахарный сироп, в пересчете на 70%-ную концентрацию	90
45	цитрат кальция и/или магния	70
	вода	до 1000

13. Способ получения некурительного изделия из табака, предусматривающий
подготовку рецептурных компонентов, экстрагирование цедры цитрусовых жидкой
25 двуокисью углерода с отделением соответствующей мисцеллы, резку табака и
топинамбура, их сушку в поле СВЧ до остаточной влажности около 20% при
мощности поля СВЧ, обеспечивающей разогрев сырья до температуры внутри
кусочков 80-90°C, в течение не менее 1 ч, их смешивание, пропитку отделенной
30 мисцеллой с содержанием экстракта 0,03% от массы смеси с одновременным
повышением давления, сброс давления до атмосферного с одновременным
замораживанием смеси, возгонку и удаление двуокиси углерода с одновременным
вспучиванием смеси, добавление к ней концентрата персикового сока, сахарного
сиропа, цитрата кальция и/или магния и воды и формование полученной смеси, при
35 этом смесь готовят при следующем соотношении компонентов по массе с точностью
 $\pm 2\%$:

повышением давления, сброс давления до атмосферного с одновременным замораживанием смеси, возгонку и удаление двуокиси углерода с одновременным вспучиванием смеси, добавление к ней концентрата персикового сока, сахарного сиропа, цитрата кальция и/или магния и воды и формование полученной смеси, при этом смесь готовят при следующем соотношении компонентов по массе с точностью ±2%:

5 10 15	табак	530
	топинамбур	170
	концентрат персикового сока, в пересчете на 70%-ное содержание сухих веществ	90
	сахарный сироп, в пересчете на 70%-ную концентрацию	90
	цитрат кальция и/или магния	70
	вода	до 1000

20

25

30

35

40

45

50