



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103877286 A

(43) 申请公布日 2014. 06. 25

(21) 申请号 201410087269. 8

(22) 申请日 2014. 03. 11

(71) 申请人 四川金堂海纳生物医药技术研究所
地址 610499 四川省成都市金堂县赵镇新生
村三组 1 幢 2 楼

(72) 发明人 罗兴富

(51) Int. Cl.

A61K 36/86 (2006. 01)

A61P 31/04 (2006. 01)

A61K 33/06 (2006. 01)

权利要求书2页 说明书7页

(54) 发明名称

一种治疗丹毒的内服药物及其制备方法

(57) 摘要

一种治疗丹毒的内服药物及其制备方法,所述药物的各个组分及其质量份比为:蛇倒退、连翘、茯苓、紫草、大青叶、金银花、蒲公英、地丁、赤芍、生地、黄柏、牛膝、丹皮、栀子、黄芩、柴胡、马齿苋、乳香、黄连和生石膏各 1-4 份;该药物的制备方法包括如下步骤:A、选择优质的蛇倒退、连翘、茯苓、紫草、大青叶、金银花、蒲公英、地丁、赤芍、生地、黄柏、牛膝、丹皮、栀子、黄芩、柴胡、马齿苋、乳香、黄连和生石膏各 1 份,分别粉碎成颗粒状;B、将颗粒状药物盛装到布袋内,同时将布袋放入到容器中浸泡 30 分钟后,再将浸泡好的药物放入到煎药机中的煎药煲内,注入净水,用武火和文火煎制 48 分钟,浓缩成 50% 的中药液 528 毫升包装密封即可。

1. 一种治疗丹毒的内服药物,其特征在于,所述药物的各个组分及其质量份比如下所示:

蛇倒退	1-4 份;
连翘	1-4 份;
茯苓	1-4 份;
紫草	1-4 份;
大青叶	1-4 份;
金银花	1-4 份;
蒲公英	1-4 份;
地丁	1-4 份;
赤芍	1-4 份;
生地	1-4 份;
黄柏	1-4 份;
牛膝	1-4 份;
丹皮	1-4 份;
栀子	1-4 份;
黄芩	1-4 份;
柴胡	1-4 份;
马齿苋	1-4 份;
乳香	1-4 份;
黄连	1-4 份;
生石膏	1-4 份。

2. 根据权利要求 1 所述的治疗丹毒的内服药物,其特征在于,所述药物的各个组分及其质量份比如下所示:

蛇倒退	1 份;
连翘	1 份;
茯苓	1 份;
紫草	1 份;
大青叶	1 份;
金银花	1 份;
蒲公英	1 份;
地丁	1 份;
赤芍	1 份;
生地	1 份;
黄柏	1 份;
牛膝	1 份;
丹皮	1 份;
栀子	1 份;
黄芩	1 份;

柴胡	1 份；
马齿苋	1 份；
乳香	1 份；
黄连	1 份；
生石膏	1 份。

3. 一种权利要求 1 或 2 所述的治疗丹毒的内服药物及其制备方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤:

A、按照质量份比选择优质干净的蛇倒退、连翘、茯苓、紫草、大青叶、金银花、蒲公英、地丁、赤芍、生地、黄柏、牛膝、丹皮、栀子、黄芩、柴胡、马齿苋、乳香、黄连、生石膏,分别粉碎成颗粒状(粒度为 5-6mm)待用;

B、将粉碎好的颗粒状药物盛装到布袋内扎口,同时将装好药物的布袋放入到容器中浸泡 30 分钟后,再将浸泡好的药物放入到专用煎药机中的煎药煲内,注入适量的净水,用武火和文火煎制 48 分钟,待药物煎制好后,浓缩成 50% 的中药液 528 毫升包装密封即可。

一种治疗丹毒的内服药物及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及中药技术领域,具体涉及一种治疗丹毒的内服药物,特别是供丹毒患者使用的内服药物及其制备方法的领域。

背景技术

[0002] 丹毒俗称“流火”,是皮肤和网状淋巴管的急性炎症,其发病是因溶血性链球菌通过皮肤、粘膜的细小伤口处侵犯皮肤和粘膜网状淋巴管而引起的,丹毒好发于下肢和面部,蔓延很快,很少有组织坏死,有反复发作的倾向、局部表现为片状红疹,颜色鲜红,中间较淡,边缘清楚并稍隆起,手指按压可使红色消退,手指离开后,红色可迅速恢复,红肿向四周蔓延时,中央的红色消退、脱屑,颜色转为棕黄,足癣或丝虫感染可引起下肢丹毒的反复发作,有时可引起皮下淋巴管阻塞、增生而形成橡皮腿,并可伴有局部淋巴结肿大。

[0003] 中医学认为,丹毒的病因以火毒为主,可由风湿热诸邪化火而致,其中发于颜面者,又称抱头火丹或大头瘟;发于下肢者,称为流火;发生于新生儿或小儿的丹毒,称赤游丹或游火。辨证论治可分为以下四型:a、风热火炽证见于头面、耳项、臂膊等处,灼红,重则双目合缝,不能睁开,伴见口渴引饮,大便干结,舌红,苔薄黄,脉滑数,治以散风清热解毒为主,方以化斑解毒汤加减;b、肝经郁火证发于胸腹、腰背、胁肋、脐周等处,红肿,向四周扩展,舌红,苔薄黄,脉弦数,治以清肝利湿解热为法,方以清肝汤加减;c、湿热火盛证常发于下肢腿股、足背等处,红肿灼热,向上蔓延,腹股沟淋巴结肿大,行走困难,伴见纳少,渴不欲饮,舌红,苔黄腻,脉滑数,治以清热利湿解毒为法,方以利水渗湿汤加减;d、毒热入营证重证者范围较大,可见神昏谵语,躁动不安,恶心呕吐等诸逆证,治以凉血解毒,清心开窍,方用清瘟败毒饮加减。

[0004] 那么,就如何找到一种可有效彻底治疗上述丹毒的中草药,并且能有效保证在治愈恢复后不会复发,是我们目前要解决的问题。

发明内容

[0005] 本发明的目的是提供一种治疗丹毒的内服药物及其制备方法,以解决丹毒患者治愈后不会复发的的问题。该药物是以常见的中草药为原料,具有配伍科学,主从有序,纵观全方,切中病机,充分体现了疏风解毒、凉血通腑、利湿清热、凉血解毒、散风清热解毒、清肝利湿解热、清热利湿解毒的治疗原则。

[0006] 为达到上述发明的目的,本发明所采用的技术方案为:提供一种治疗丹毒的内服药物,其特征在于,所述药物的各个组分及其质量份比如下所示:

蛇倒退	1-4 份;
连翘	1-4 份;
茯苓	1-4 份;
紫草	1-4 份;
大青叶	1-4 份;

金银花	1-4 份；
蒲公英	1-4 份；
地丁	1-4 份；
赤芍	1-4 份；
生地	1-4 份；
黄柏	1-4 份；
牛膝	1-4 份；
丹皮	1-4 份；
栀子	1-4 份；
黄芩	1-4 份；
柴胡	1-4 份；
马齿苋	1-4 份；
乳香	1-4 份；
黄连	1-4 份；
生石膏	1-4 份。

[0007] 按照本发明所提供的治疗丹毒的内服药物,其特征在于,所述药物的各个组分及其质量份比如下所示:

蛇倒退	1 份；
连翘	1 份；
茯苓	1 份；
紫草	1 份；
大青叶	1 份；
金银花	1 份；
蒲公英	1 份；
地丁	1 份；
赤芍	1 份；
生地	1 份；
黄柏	1 份；
牛膝	1 份；
丹皮	1 份；
栀子	1 份；
黄芩	1 份；
柴胡	1 份；
马齿苋	1 份；
乳香	1 份；
黄连	1 份；
生石膏	1 份。

一种上述治疗丹毒的内服药物及其制备方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤:

A、选择优质干净的蛇倒退 1 份、连翘 1 份、茯苓 1 份、紫草 1 份、大青叶 1 份、金银花 1

份、蒲公英 1 份、地丁 1 份、赤芍 1 份、生地 1 份、黄柏 1 份、牛膝 1 份、丹皮 1 份、栀子 1 份、黄芩 1 份、柴胡 1 份、马齿苋 1 份、乳香 1 份、黄连 1 份、生石膏 1 份,分别粉碎成颗粒状(粒度为 5-6mm)待用;

B、将粉碎好的颗粒状药物盛装到布袋内扎口,同时将装好药物的布袋放入到容器中浸泡 30 分钟后,再将浸泡好的药物放入到专用煎药机中的煎药煲内,注入适量的净水,用武火和文火煎制 48 分钟,待药物煎制好后,浓缩成 50% 的中药液 528 毫升包装密封即可。

[0008] 一种上述治疗丹毒的内服药物及其制备方法,其特征在于,所述服用方法为:将煎制好的中药液以每天一剂服用,早、中、晚各服药一次,给药量 178 毫升/次,饭前服。

[0009] 本发明所提供的治疗丹毒的内服药物为中药组合物,其以常见的中草药为原料,充分发挥各组分的药性:

蛇倒退,性味:酸、苦、性平,具有清热解毒、利湿消肿、散瘀止血之功效,用于治疗疔疮痈肿、丹毒、癰腮、乳腺炎、聤耳、喉蛾、感冒发热、肺热咳嗽、百日咳、瘰癧、痔疾、鱼口便毒、泻痢、黄疸、臃胀、水肿、淋浊、带下、疟疾、风火赤眼、跌打肿痛、吐血、便血、蛇虫咬伤等症;

连翘,性味:苦、微寒,具有清热解毒、消肿散结之功效,用于治疗痈疽、瘰癧、乳痈、丹毒、风热感冒、温病初起、温热入营、高热烦渴、神昏发斑、热淋尿闭;

茯苓,性味:味甘、淡、性平,具有利水渗湿、健脾和胃、宁心安神之功效,用于治疗水肿、尿少、痰饮眩悸、脾虚食少、便溏泄泻、心宁不安、惊悸失眠;

紫草,性味:味甘、咸、性寒,具有凉血、活血、清热、解毒透疹之功效,用于治疗麻疹不透、急慢性肝炎、便秘、吐血、衄血、血小板减少性紫癜、尿血、血痢、丹毒、烧烫伤、下肢溃疡、冻伤、痈肿、湿疹等病症;

大青叶,性味:苦、咸、大寒,具有清热凉血、解心、胃热毒之功效,用于治疗流感、热病发斑、咽喉炎、扁桃腺炎、腮腺炎、流脑、肠炎、菌痢;

金银花,性味:性寒、味甘、气平,具有清热解毒之功效,用于治疗热毒肿疡、痈疽疔疮等症,由于兼有宣散作用,故又可治疗外感风热和温病初起;

蒲公英,性味:性寒、味苦、甘,具有清热解毒、消肿散结、利尿通淋之功效,用于治疗乳痈、瘰癧、疔疮肿毒、咽痛、肺痈、肠痈、目赤、湿热黄疸、热淋涩痛;

地丁,性味:苦、寒,具有清热利湿、解毒消肿之功效,用于治疗疔疮、痈肿、瘰癧、黄疸、痢疾、腹泻、目赤、喉痹、毒蛇咬伤等病症;

赤芍,性味:苦、微寒,具有清热凉血、散瘀止痛之功效,用于治疗温毒发斑、吐血衄血、目赤肿痛、肝郁胁痛、经闭痛经、症瘕腹痛、跌扑损伤、痈肿疮疡;

生地,性味:味甘而苦,具有清热凉血、养阴生津、质润降泄之功效,用于治疗热病、舌绛烦渴舌、阴虚内热、骨蒸消渴、吐血、月经不调、胎动不安、阴伤便秘等症;

黄柏,性味:苦、寒,具有清热燥湿、泻火解毒、除骨蒸清虚热之功效,用于治疗湿热泻痢、黄疸、带下、热淋、脚气、痿痹、骨蒸劳热、盗汗、遗精、疮疡肿毒、湿疹瘙痒;

牛膝,性味:苦、酸、平,具有补肝肾强筋骨、逐瘀通经、引血下行之功效,用于治疗腰膝酸痛、筋骨无力、经闭症瘕、肝阳眩晕等等症;

丹皮,性味:性微寒、味苦辛,具有清血、活血散瘀之功效,用于治疗斑疹吐血、血滞经闭、经前发势、痈肿疮毒、损伤瘀血、阴虚发势、无汗骨蒸;

栀子,性味:苦、寒,果实:具有泻火除烦、清热利尿、凉血解毒之功效,用于治疗热病心

烦、黄疸尿赤、血淋涩痛、血热吐衄、目赤肿痛、火毒疮疡；

黄芩，性味：苦、寒，具有清热燥湿、泻火解毒、止血、安胎之功效，用于治疗湿温、暑温胸闷呕恶、湿热痞满、泻痢、黄疸、肺热咳嗽、高热烦渴、血热吐衄、痈肿疮毒、胎动不安；

柴胡，性味：苦、平，具有发热退热、疏肝解郁、升阳之功效，用于感冒发烧、寒热往来、疟疾、胸胁胀痛、月经不调；

马齿苋，性味：味酸、性寒，具有清热解毒、凉血及止痢之功效，用于肠炎、菌痢、疔疮肿毒、蛇咬伤、皮炎、带状疱疹等症；

乳香，性味：辛苦、温，具有调气活血、定痛及追毒之功效，用于治疗气血凝滞、心腹疼痛、痈疮肿毒、跌打损伤、痛经、产后瘀血刺痛；

黄连，性味：苦、寒，具有泻火解毒、清热燥湿、清心除烦、止吐杀虫之功效，用于治疗高热、时行热毒、伤寒、泻痢、蛔虫病、咽喉肿痛、口疮、痈疽、烧烫伤等各种热证、湿热证、寒热错杂的证候和各种血证，并具有显著的抗心力衰竭、抗心律失常、降低胆固醇、抗制血管平滑肌增殖、改善胰岛素抵抗、抗血小板、抗炎等；

生石膏，性味：味辛、甘、性寒，具有解肌清热、除烦止渴、清热解毒、泻火之功效，用于治疗热病壮热不退、心烦神昏、谵语发狂、口渴咽干、肺热喘急、中暑自汗、胃火头痛、牙痛、热毒壅盛、发斑发疹、口舌生疮、煅敷生肌敛疮。

[0010] 服用时，首先将煎制好的成品中药液以每天一剂服用，早、中、晚各服药一次，给药量 178 毫升 / 次，饭前服。该药物是以常见的中草药为原料，具有配伍科学，主从有序，纵观全方，切中病机，充分体现了疏风解毒、凉血通腑、利湿清热、凉血解毒、散风清热解毒、清肝利湿解热、清热利湿解毒的治疗原则。

具体实施方式

[0011] 下面对本发明的实施方式进行详细的描述

中医学认为，丹毒的病因以火毒为主，可由风湿热诸邪化火而致，其中发于颜面者，又称抱头火丹或大头瘟；发于下肢者，称为流火；发生于新生儿或小儿的丹毒，称赤游丹或游火。辨证论治可分为以下四型：a、风热火炽证见于头面、耳项、臂膊等处，灼红，重则双目合缝，不能睁开，伴见口渴引饮，大便干结，舌红，苔薄黄，脉滑数，治以散风清热解毒为主，方以化斑解毒汤加减；b、肝经郁火证发于胸腹、腰背、胁肋、脐周等处，红肿，向四周扩展，舌红，苔薄黄，脉弦数，治以清肝利湿解热为法，方以清肝汤加减；c、湿热火盛证 常发于下肢腿股、足背等处，红肿灼热，向上蔓延，腹股沟淋巴结肿大，行走困难，伴见纳少，渴不欲饮，舌红，苔黄腻，脉滑数，治以清热利湿解毒为法，方以利水渗湿汤加减；d、毒热入营证重证者范围较大，可见神昏谵语，躁动不安，恶心呕吐等诸逆证，治以凉血解毒，清心开窍，方用清温败毒饮加减。

[0012] 本发明就是针对上述丹毒的治疗而提出的一种中草药配方，采用该配方制备的成品内服药物药效好，疗程短，见效快，无任何毒副作用，可以彻底根治上述丹毒。下面对本发明所提供的具体实施例进行详细的描述。

[0013] 实施例 1：

选择优质干净的蛇倒退 15 克、连翘 10 克、茯苓 15 克、紫草 12 克、大青叶 15 克、金银花 15 克、蒲公英 12 克、地丁 15 克、赤芍 7 克、生地 9 克、黄柏 6 克、牛膝 6 克、丹皮 4 克、栀子 7

克、黄芩 7 克、柴胡 9 克、马齿苋 12 克、乳香 10 克、黄连 10 克和生石膏 16, 分别粉碎成颗粒状(粒度为 5-6mm)待用;将粉碎好的颗粒状药物盛装到布袋内扎口,同时将装好药物的布袋放入到容器中浸泡 30 分钟后,再将浸泡好的药物放入到专用煎药机中的煎药煲内,注入适量的净水,用武火和文火煎制 48 分钟,待药物煎制好后,浓缩成 50% 的中药液 528 毫升包装密封即可。服用时,将煎制好的成品中药液以每天一剂服用,早、中、晚各服药一次,给药量 178 毫升 / 次,饭前服,3 剂而痊愈。

[0014] 实施例 2:

选择优质干净的蛇倒退 17 克、连翘 12 克、茯苓 17 克、紫草 14 克、大青叶 17 克、金银花 17 克、蒲公英 14 克、地丁 17 克、赤芍 9 克、生地 11 克、黄柏 8 克、牛膝 8 克、丹皮 6 克、栀子 9 克、黄芩 9 克、柴胡 11 克、马齿苋 14 克、乳香 12 克、黄连 12 克和生石膏 18, 分别粉碎成颗粒状(粒度为 5-6mm)待用;将粉碎好的颗粒状药物盛装到布袋内扎口,同时将装好药物的布袋放入到容器中浸泡 30 分钟后,再将浸泡好的药物放入到专用煎药机中的煎药煲内,注入适量的净水,用武火和文火煎制 48 分钟,待药物煎制好后,浓缩成 50% 的中药液 528 毫升包装密封即可。服用时,将煎制好的成品中药液以每天一剂服用,早、中、晚各服药一次,给药量 178 毫升 / 次,饭前服,2.5 剂而痊愈。

[0015] 实施例 3:

选择优质干净的蛇倒退 16 克、连翘 11 克、茯苓 15 克、紫草 13 克、大青叶 16 克、金银花 16 克、蒲公英 13 克、地丁 16 克、赤芍 8 克、生地 10 克、黄柏 7 克、牛膝 7 克、丹皮 5 克、栀子 8 克、黄芩 8 克、柴胡 10 克、马齿苋 13 克、乳香 11 克、黄连 11 克和生石膏 17, 分别粉碎成颗粒状(粒度为 5-6mm)待用;将粉碎好的颗粒状药物盛装到布袋内扎口,同时将装好药物的布袋放入到容器中浸泡 30 分钟后,再将浸泡好的药物放入到专用煎药机中的煎药煲内,注入适量的净水,用武火和文火煎制 48 分钟,待药物煎制好后,浓缩成 50% 的中药液 528 毫升包装密封即可。服用时,将煎制好的成品中药液以每天一剂服用,早、中、晚各服药一次,给药量 178 毫升 / 次,饭前服,3 剂而痊愈。

[0016] 实施例 4:

选择优质干净的蛇倒退 15 克、连翘 10 克、茯苓 15 克、紫草 12 克、大青叶 15 克、金银花 15 克、蒲公英 12 克、地丁 15 克、赤芍 7 克、生地 9 克、黄柏 6 克、牛膝 6 克、丹皮 4 克、栀子 7 克、黄芩 7 克、柴胡 9 克、马齿苋 12 克、乳香 10 克、黄连 10 克和生石膏 16, 分别粉碎成颗粒状(粒度为 5-6mm)待用;将粉碎好的颗粒状药物盛装到布袋内扎口,同时将装好药物的布袋放入到容器中浸泡 30 分钟后,再将浸泡好的药物放入到专用煎药机中的煎药煲内,注入适量的净水,用武火和文火煎制 48 分钟,待药物煎制好后,浓缩成 50% 的中药液 528 毫升包装密封即可。服用时,将煎制好的成品中药液以每天一剂服用,早、中、晚各服药一次,给药量 178 毫升 / 次,饭前服,3.5 剂而痊愈。

[0017] 本发明经过对数仟例患者的治疗,治疗效果显著,无任何毒副作用,部份典型病例如下。

[0018] 1、患者:范××、女、35 岁,住址:成都市龙泉区

患病症状:患者自前天晚上开始,左脚面外侧部感觉疼痛,但未曾介意,于昨日早晨开始,突然发冷发热,体温 38℃ 以上,局部红肿疼痛,伴有头疼,食纳不佳,大便不干,尿黄,过去未曾有类似病史。检查体温 38.7℃,左足背靠外踝处有 9×7 厘米大小区域皮肤为鲜红

色,边界清楚,中央有少量水疱,明显触疼,脉弦数,舌苔薄白,经检查后诊断为足背部丹毒。

[0019] 治疗:每日一剂,早、中、晚各服药一次,治疗两天后,症状减轻,红肿疼痛亦缓,嘱续服叁天后,体温恢复正常,头疼、红肿和疼痛消失而痊愈。至今两年,未见复发。

[0020] 2、患者:周××、男、15岁,住址:四川省南充市

患病症状:患者三天前开始自觉面部瘙痒,如虫行之状,嗣后面部皮肤隐现欣红,即痒且痛,常感恶寒发热,头痛恶呕,胸闷不舒,呼吸急促,大便干结已三天未行,检查眼睑、前额和鼻梁三处皮肤欣红,赤色如丹,形如云片,体温 38.4℃,余诊见舌赤,少苔,脉浮数,经诊断为颜面部丹毒。

[0021] 治疗:每日一剂,早、中、晚各服一次,治疗两天后,症状减轻,瘙痒、红肿和疼痛亦缓,续服叁天后,体温恢复正常,诸症皆除,病获痊愈。至今叁年,未见复发。

[0022] 3、患者:高××、女、37岁,住址:四川省资阳市

患病症状:患者自昨日开始,腰胯部感觉疼痛,未曾介意,于次日早晨开始,突然发冷发热,局部红肿疼痛,伴有食纳不佳及尿黄,过去无类似病史。检查体温 38.6℃,腰部有 15×12 厘米大小区域皮肤为鲜红色,边界清楚,并有少量水疱,明显触疼,脉弦数,舌苔薄白,经诊断为腰胯部丹毒。

[0023] 治疗:每日一剂,早中晚各服药一次,治疗两天后,症状减轻,红肿疼痛亦缓,嘱续服四天后,体温恢复正常,红肿疼痛消失,并痊愈。至今四年,未见复发。

[0024] 4、患者:杨××、女、15岁,住址:四川省成都市

患病症状:患者两天前面部发生瘙痒,如虫行之状,嗣后面部皮肤隐现欣红,又痒又痛,常感恶寒发热,胸闷不舒,头痛恶呕,呼吸急促,大便干结,眼睑、前额和鼻梁三处皮肤欣红,赤色如丹,形如云片,体温 38.3℃,余诊见舌红,苔薄黄,脉滑数,经诊断为面部丹毒。

[0025] 治疗:每日一剂,早中晚各服一次,治疗两天后,症状减轻,瘙痒和疼痛亦缓,续服叁天后,体温正常,诸症皆除,病获痊愈。至今两年,未见复发。

[0026] 5、患者:赵××、女、5岁,住址:四川省崇州市

患病症状:患者自昨日晚开始,耳项及臂膊处均感疼痛,痛哭难眠,于次日早晨开始,突然发冷发热,局部红肿疼痛,伴见口渴引饮,大便干结,尿黄,舌红,苔薄黄,脉滑数,以前无此病史,经诊断为耳项及臂膊处丹毒。

[0027] 治疗:每日一剂,早中晚各服药一次,治疗两天后,症状减轻,红肿疼痛亦缓,续服叁天后,红肿疼痛消失而痊愈。至今一年,未见复发。

[0028] 6、患者:张××、女、7岁,住址:四川省广汉市

患病症状:患者昨晚觉得身体不适,脐周部感觉疼痛瘙痒,难以入睡,次日早晨开始发冷发热,脐周红肿疼痛,并有扩展之势,大便干结,尿黄,舌红,苔薄黄,脉弦数,过去无此病史,经诊断为脐周部丹毒。

[0029] 治疗:每日一剂,早、中、晚各服药一次,治疗两天后,症状减轻,瘙痒、红肿及疼痛亦缓,续服叁天后,瘙痒、红肿和疼痛消失,并痊愈。至今两年,未见复发。

[0030] 7、患者:邓××、男、11岁,住址:四川省成都市

患病症状:患者自前天下午开始,右下肢腿股及足背部感觉疼痛,于次日早晨,突然发冷发热,体温 38℃以上,局部红肿灼热,向上蔓延,腹股沟淋巴结肿大,行走困难,伴见纳少,渴不欲饮,舌红,苔黄腻,脉滑数,并伴有头疼,经检查后诊断为右下肢腿股及足背部丹毒。

[0031] 治疗 :每日一剂,早中晚各服药一次,治疗两天后, 症状减轻,红肿疼痛亦缓,嘱续服四天后,体温恢复正常,诸症皆除,病获痊愈。至今五年,未见复发。