

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2011 年 3 月 10 日(10.03.2011)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2011/027573 A1

- (51) 国際特許分類:
G01N 33/50 (2006.01) G01N 33/15 (2006.01)
G01N 27/62 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2010/005434
- (22) 国際出願日: 2010 年 9 月 3 日(03.09.2010)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2009-205033 2009 年 9 月 4 日(04.09.2009) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 国立大学法人東北大学 (TOHOKU UNIVERSITY) [JP/JP]; 〒9808577 宮城県仙台市青葉区片平二丁目 1 番 1 号 Miyagi (JP). 学校法人 慶應義塾 (KEIO UNIVERSITY) [JP/JP]; 〒1088345 東京都港区三田二丁目 1 5 番 4 5 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 阿部 高明 (ABE, Takaaki) [JP/JP]; 〒9808577 宮城県仙台市青葉区片平二丁目 1 番 1 号国立大学法人東北大学内 Miyagi (JP). 曽我 朋義 (SOGA, Tomoyoshi) [JP/JP]; 〒9970017 山形県鶴岡市大宝寺字日本国 4 0 3 - 1 慶應義塾大学 先端生命科学研究所内 Yamagata (JP).
- (74) 代理人: 廣田 雅紀 (HIROTA, Masanori); 〒1070052 東京都港区赤坂二丁目 8 番 5 号若林ビル 3 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: NOVEL RENAL DISEASE MARKER SUBSTANCE IN HUMAN

(54) 発明の名称: ヒトにおける新たな腎疾患マーカー物質

(57) Abstract: Disclosed are: a method for accurately detecting a renal disease that cannot be detected by various conventional renal disease test methods, with implementing reduced burden on a subject (a donor of a test sample); a method for determining an early renal disease, which focuses on a renal disease marker substance that has a small blind GFR area; and a method for screening for a novel prophylactic/therapeutic agent for renal diseases, which can screen a novel prophylactic/therapeutic agent for renal diseases with high efficiency and focuses on a novel renal disease marker substance to which attention has not been given heretofore. These methods employ a step of detecting or quantifying at least one above-mentioned renal disease marker substance that occurs in a blood sample to be tested.

(57) 要約: 本発明は、これまでの腎疾患に対する様々な検査手段では検出することができなかった腎疾患についても、正確にかつ被験者 (被検試料の提供者) への負担が少なく、腎疾患を判定することのできる方法を提供することを目的とする。また、本発明は、ブラインド GFR エリアの少ない腎疾患マーカー物質に着目した、早期腎疾患を判定することのできる方法を提供することを目的とする。また、本発明は、これまでに着目されていなかった新たな腎疾患マーカー物質に着目した新規な腎疾患予防・治療剤を効率よくスクリーニングすることができる新たな腎疾患予防・治療剤のスクリーニング方法を提供することを目的とする。本発明は、これらの目的を達成するために、被検血液試料中に存在する、1 種又は 2 種以上の本件腎疾患マーカー物質を検出又は定量する工程を利用する。



WO 2011/027573 A1

明 細 書

発明の名称： ヒトにおける新たな腎疾患マーカー物質

技術分野

[0001] 本発明は、ヒトにおける新たな腎疾患マーカー物質を利用した腎疾患の判定方法や、かかる腎疾患マーカー物質を利用した腎疾患の予防・治療剤のスクリーニング方法に関する。

背景技術

[0002] 腎不全患者等の腎疾患を有する患者、特に腎透析を受ける患者の数は年々増加の一途を辿っており、現在20万人の患者が維持透析治療を行っており、さらに毎年3万人以上が新たに透析導入に至っている。透析療法には、一人あたり年間約500万円の費用がかかるため、20万人に対して約1兆円の医療費が恒常的に必要となっている。また、近年、慢性腎臓病（Chronic Kidney Disease：CKD）という疾患概念が提唱され、その予防・治療の重要性に対する認識が高まりを見せている。CKDはCommon Diseaseであり、糸球体濾過量（glomerular filtration rate：GFR）60未満の人口が1926万人にも上ることから、CKD対策が急務の課題となっている。以上のような状況下において、腎不全やCKD等の腎疾患の症状の予防法や、そのような症状を緩和し、透析導入を遅らせる治療法が開発されれば、患者のQOL（クオリティオブライフ）に資するだけでなく、医療費の大幅な削減が可能となり社会に大きく貢献することが出来る。

[0003] 腎不全に罹患すると、健常の場合では腎臓より排泄される様々な物質が体内に蓄積する。これらの物質は、腎不全の病態を診断するマーカー物質として利用されることもある。例えば、尿中に排泄されるアルブミン等の腎疾患マーカータンパク質の増加を指標として腎疾患の検出・診断する方法等が一般的に用いられている。この他の方法として、例えば、腎疾患患者の血液中ヒトリポカリン型プロスタグランジンD合成酵素の濃度が上昇することを利用した腎疾患の検出方法（特許文献1参照）や、腎不全等の患者の血液中

や尿中でENDO 180受容体ポリペプチドの濃度が上昇することを利用した腎症の診断方法（特許文献2参照）が知られている。

[0004] また、腎不全に罹患すると体内に蓄積する前述の物質の中でも、生体に毒性を有する物質は、いわゆる腎不全物質と呼ばれ、腎不全の病態自体を悪化させる物質として報告されてきた。しかしながら現在使用されているクレアチニン（creatinine）などの腎不全マーカー物質は腎機能の一部である糸球体濾過量（GFR）を反映した物質がほとんどであり、尿細管機能などの他の腎機能を反映したものは少ない。また、クレアチニンの場合、腎機能を反映しないクレアチニンブラインドGFRエリア（腎機能が悪化してきても、クレアチニンの上昇がまだ認められない時期）があるため、腎不全マーカー物質として十分ではなかった。さらに既存のマーカー物質では、腎不全の多彩な症状を一元的に評価する事は困難である。また、腎不全の悪化に関与する物質が何であるか、及び、腎不全悪化のメカニズムには不明な点が多かった。

[0005] 一方、キャピラリー電気泳動質量分析計（capillary electrophoresis mass spectrometry: CE-MS）は近年開発され、少量のサンプルから500種類以上の物質を同時測定できる新たなシステムである。

先行技術文献

特許文献

[0006] 特許文献1：特開2003-146980号公報

特許文献2：特表2007-519394号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0007] 本発明の課題は、これまでの腎疾患に対する様々な検査手段では検出することができなかった腎疾患についても、正確にかつ被験者（被検試料の提供者）への負担が少なく、腎疾患を判定することのできる方法を提供することにある。また、本発明の別の課題は、ブラインドGFRエリアの少ない腎疾

患マーカー物質に着目した、早期腎疾患を判定することのできる方法を提供することにある。また、本発明の別の課題は、これまでに着目されていなかった新たな腎疾患マーカー物質に着目した新規な腎疾患予防・治療剤を効率よくスクリーニングすることができる新たな腎疾患予防・治療剤のスクリーニング方法を提供することにある。

課題を解決するための手段

- [0008] 本発明者らは、腎疾患患者の血漿中の物質（陽イオン物質及び陰イオン物質）をCE-MSを用いて網羅的に解析し、推定糸球体濾過量（estimated glomerular filtration rate: eGFR）との間に正又は負の相関が有意に認められる物質を同定した。本発明者らは、これらの物質の中に、腎疾患との関連がこれまで知られていなかった物質や、eGFRとの相関式が一次式に近似する物質が存在していることを見出し、本発明を完成するに至った。
- [0009] すなわち、本発明は、（１）被検血液試料中に存在するシスアコニット酸（cis-aconitate）を検出又は定量する工程を有することを特徴とする腎疾患の判定方法や、（２）被検血液試料中に存在するシスアコニット酸の検出結果又は定量結果をコントロールと比較することにより、被検血液試料の提供者が腎疾患であるかどうか、又は、該提供者の腎疾患の症状の程度を評価する工程をさらに有することを特徴とする上記（１）に記載の腎疾患の判定方法や、（３）被検血液試料中に存在するシスアコニット酸の濃度がコントロールよりも高い場合に、被検血液試料の提供者が腎疾患であると評価し、又は、被検血液試料中に存在するシスアコニット酸の濃度がコントロールよりも高い程度を、該提供者の腎疾患の症状の重さの程度であると評価することを特徴とする上記（２）に記載の腎疾患の判定方法や、（４）腎疾患が、腎不全であることを特徴とする上記（１）～（３）のいずれかに記載の腎疾患の判定方法や、（５）被検血液試料中に存在するシスアコニット酸を検出又は定量する工程を有することを特徴とする早期腎疾患の判定方法や、（６）腎疾患が、腎不全であることを特徴とする上記（５）に記載の早期腎疾患の判定方法に関する。

[0010] また、本発明は、(7)以下の工程A～Dを有することを特徴とする腎疾患予防・治療剤のスクリーニング方法；腎機能が低下した非ヒト動物に被検物質を投与する工程A；該非ヒト動物から血液試料を採取する工程B；該血液試料中に存在するシスーアコニット酸を検出又は定量する工程C；血液試料中に存在するシスーアコニット酸の検出結果又は定量結果をコントロールと比較することにより、前記非ヒト動物の腎機能を評価する工程D；に関する。

なお、本明細書における「被験者」、「被検試料の提供者」、「腎疾患非罹患者」、「健常者」は、便宜上、ヒトだけでなく、他の非ヒト動物含むが、ヒト及び非ヒト哺乳動物が好ましく、ヒトがより好ましい。

発明の効果

[0011] 本発明の腎疾患の判定方法によれば、これまでの腎疾患に対する様々な検査手段では検出することができなかった腎疾患についても、正確にかつ被験者（被検試料の提供者）への負担が少なく、腎疾患を判定することができる。また、本発明により初めて見いだされた腎疾患マーカー物質についてさらに研究が進めば、腎疾患の様々な病態や症状に対応した腎疾患マーカー物質となり得ると考えられる。また、本発明の早期腎疾患の判定方法によれば、従来の腎疾患マーカー物質では十分になし得なかった、早期腎疾患の判定が可能となる。また、本発明の腎疾患予防・治療剤のスクリーニング方法によれば、これまでに着目されていなかった新たな腎疾患マーカー物質に着目した新規な腎疾患予防・治療剤を効率よくスクリーニングすることが可能となる。

図面の簡単な説明

[0012] [図1]腎疾患患者（慢性腎臓患者）41人の患者背景を示す図である。

[図2]血漿中において、eGFRと正又は負の相関が見いだされたカチオンを示す図である。左側の表は、スピアマンの相関係数によりeGFRと有意な負の相関が見いだされたカチオンを表し、右側の表は、eGFRと有意な正の相関が見いだされたカチオンを表す。なお、物質名の背景が灰色の物質は

、e G F Rとの相関が有意であり、かつ、その相関が新規に見い出された物質である。

[図3] 血漿中において、e G F Rと正又は負の相関が見い出されたアニオンを示す図である。左側の表は、e G F Rと負の相関が見い出されたアニオンを表し、右側の表は、e G F Rと正の相関が見い出されたアニオンを表す。なお、物質名の背景が灰色の物質は、e G F Rとの相関が新規に見い出された物質である。ところで、e G F Rと負の相関がある物質とは、腎機能の改善に伴って、濃度が低下する物質であり、すなわち、腎機能の悪化に伴って、濃度が上昇する物質である。また、e G F Rと正の相関がある物質とは、腎機能の改善に伴って、濃度が上昇する物質であり、すなわち、腎機能の悪化に伴って、濃度が低下する物質である。

[図4] e G F Rと負の相関が見い出されたカチオンについて、そのカチオンの濃度とe G F Rとの相関関係を示し、一次式で近似した図である。

[図5] e G F Rと負の相関が見い出されたカチオンについて、そのカチオンの濃度とe G F Rとの相関関係を示し、一次式で近似した図である。なお、「*」は、e G F Rとの負の相関が新規に発見されたものであることを示す。

[図6] e G F Rと負の相関が見い出されたカチオンについて、そのカチオンの濃度とe G F Rとの相関関係を示し、一次式で近似した図である。なお、「*」は、e G F Rとの負の相関が新規に発見されたものであることを示す。

[図7] e G F Rと負の相関が見い出されたカチオンについて、そのカチオンの濃度とe G F Rとの相関関係を示し、一次式で近似した図である。

[図8] e G F Rと負の相関が見い出されたカチオンについて、そのカチオンの濃度とe G F Rとの相関関係を示し、一次式で近似した図である。

[図9] e G F Rと負の相関が見い出されたカチオンについて、そのカチオンの濃度とe G F Rとの相関関係を示し、一次式で近似した図である。

[図10] e G F Rと負の相関が見い出されたカチオンについて、そのカチオンの濃度とe G F Rとの相関関係を示し、一次式で近似した図である。

[図11] e G F Rと負の相関が見い出されたカチオンについて、そのカチオン

の濃度と e G F R との相関関係を示し、一次式で近似した図である。なお、「*」は、e G F R との負の相関が新規に発見されたものであることを示す。

[図12] e G F R と負の相関が見い出されたカチオンについて、そのカチオンの濃度と e G F R との相関関係を示し、一次式で近似した図である。

[図13] e G F R と負の相関が見い出されたカチオンについて、そのカチオンの濃度と e G F R との相関関係を示し、一次式で近似した図である。

[図14] e G F R と負の相関が見い出されたカチオンについて、そのカチオンの濃度と e G F R との相関関係を示し、一次式で近似した図である。なお、「*」は、e G F R との負の相関が新規に発見されたものであることを示す。

[図15] e G F R と負の相関が見い出されたカチオンについて、そのカチオンの濃度と e G F R との相関関係を示し、一次式で近似した図である。

[図16] e G F R と負の相関が見い出されたカチオンについて、そのカチオンの濃度と e G F R との相関関係を示し、一次式で近似した図である。なお、「*」は、e G F R との負の相関が新規に発見されたものであることを示す。

[図17] e G F R と負の相関が見い出されたカチオンについて、そのカチオンの濃度と e G F R との相関関係を示し、一次式で近似した図である。なお、「*」は、e G F R との負の相関が新規に発見されたものであることを示す。

[図18] e G F R と負の相関が見い出されたカチオンについて、そのカチオンの濃度と e G F R との相関関係を示し、一次式で近似した図である。なお、「*」は、e G F R との負の相関が新規に発見されたものであることを示す。

[図19] e G F R と負の相関が見い出されたカチオンについて、そのカチオンの濃度と e G F R との相関関係を示し、二次式で近似した図である。

[図20] e G F R と負の相関が見い出されたカチオンについて、そのカチオン

の濃度と e G F R との相関関係を示し、二次式で近似した図である。

[図21] e G F R と負の相関が見い出されたカチオンについて、そのカチオンの濃度と e G F R との相関関係を示し、二次式で近似した図である。

[図22] e G F R と負の相関が見い出されたカチオンについて、そのカチオンの濃度と e G F R との相関関係を示し、二次式で近似した図である。

[図23] e G F R と負の相関が見い出されたカチオンについて、そのカチオンの濃度と e G F R との相関関係を示し、二次式で近似した図である。なお、「*」は、e G F R との負の相関が新規に発見されたものであることを示す。

[図24] e G F R と負の相関が見い出されたカチオンについて、そのカチオンの濃度と e G F R との相関関係を示し、二次式で近似した図である。

[図25] e G F R と負の相関が見い出されたカチオンについて、そのカチオンの濃度と e G F R との相関関係を示し、二次式で近似した図である。なお、「*」は、e G F R との負の相関が新規に発見されたものであることを示す。

[図26] e G F R と正の相関が見い出されたカチオンについて、そのカチオンの濃度と e G F R との相関関係を示し、一次式で近似した図である。なお、
[図27] e G F R と正の相関が見い出されたカチオンについて、そのカチオンの濃度と e G F R との相関関係を示し、一次式で近似した図である。なお、「*」は、e G F R との負の相関が新規に発見されたものであることを示す。

[図28] e G F R と正の相関が見い出されたカチオンについて、そのカチオンの濃度と e G F R との相関関係を示し、一次式で近似した図である。

[図29] e G F R と正の相関が見い出されたカチオンについて、そのカチオンの濃度と e G F R との相関関係を示し、一次式で近似した図である。なお、「*」は、e G F R との負の相関が新規に発見されたものであることを示す。

[図30] e G F R と正の相関が見い出されたカチオンについて、そのカチオン

の濃度と e G F R との相関関係を示し、一次式で近似した図である。

[図31] e G F R と正の相関が見い出されたカチオンについて、そのカチオンの濃度と e G F R との相関関係を示し、二次式で近似した図である。

[図32] e G F R と正の相関が見い出されたカチオンについて、そのカチオンの濃度と e G F R との相関関係を示し、二次式で近似した図である。

[図33] e G F R と負の相関が見い出されたアニオンについて、そのアニオンの濃度と e G F R との相関関係を示し、一次式で近似した図である。なお、「*」は、e G F R との負の相関が新規に発見されたものであることを示す。

[図34] e G F R と負の相関が見い出されたアニオンについて、そのアニオンの濃度と e G F R との相関関係を示し、一次式で近似した図である。なお、「*」は、e G F R との負の相関が新規に発見されたものであることを示す。

[図35] e G F R と負の相関が見い出されたアニオンについて、そのアニオンの濃度と e G F R との相関関係を示し、一次式で近似した図である。なお、「*」は、e G F R との負の相関が新規に発見されたものであることを示す。

[図36] e G F R と負の相関が見い出されたアニオンについて、そのアニオンの濃度と e G F R との相関関係を示し、一次式で近似した図である。なお、「*」は、e G F R との負の相関が新規に発見されたものであることを示す。

[図37] e G F R と負の相関が見い出されたアニオンについて、そのアニオンの濃度と e G F R との相関関係を示し、一次式で近似した図である。なお、「*」は、e G F R との負の相関が新規に発見されたものであることを示す。

[図38] e G F R と負の相関が見い出されたアニオンについて、そのアニオンの濃度と e G F R との相関関係を示し、一次式で近似した図である。なお、「*」は、e G F R との負の相関が新規に発見されたものであることを示す。

。

[図39] e G F R と負の相関が見い出されたアニオンについて、そのアニオンの濃度と e G F R との相関関係を示し、一次式で近似した図である。なお、「*」は、e G F R との負の相関が新規に発見されたものであることを示す

。

[図40] e G F R と負の相関が見い出されたアニオンについて、そのアニオンの濃度と e G F R との相関関係を示し、一次式で近似した図である。なお、「*」は、e G F R との負の相関が新規に発見されたものであることを示す

。

[図41] e G F R と負の相関が見い出されたアニオンについて、そのアニオンの濃度と e G F R との相関関係を示し、一次式で近似した図である。なお、「*」は、e G F R との負の相関が新規に発見されたものであることを示す

。

[図42] e G F R と負の相関が見い出されたアニオンについて、そのアニオンの濃度と e G F R との相関関係を示し、一次式で近似した図である。なお、「*」は、e G F R との負の相関が新規に発見されたものであることを示す

。

[図43] e G F R と負の相関が見い出されたアニオンについて、そのアニオンの濃度と e G F R との相関関係を示し、一次式で近似した図である。なお、「*」は、e G F R との負の相関が新規に発見されたものであることを示す

。

[図44] e G F R と負の相関が見い出されたアニオンについて、そのアニオンの濃度と e G F R との相関関係を示し、一次式で近似した図である。なお、「*」は、e G F R との負の相関が新規に発見されたものであることを示す

。

[図45] e G F R と負の相関が見い出されたアニオンについて、そのアニオンの濃度と e G F R との相関関係を示し、一次式で近似した図である。

[図46] e G F R と負の相関が見い出されたアニオンについて、そのアニオン

の濃度と e G F R との相関関係を示し、一次式で近似した図である。なお、
「*」は、e G F R との負の相関が新規に発見されたものであることを示す。
。

[図47] e G F R と負の相関が見い出されたアニオンについて、そのアニオンの濃度と e G F R との相関関係を示し、一次式で近似した図である。なお、
「*」は、e G F R との負の相関が新規に発見されたものであることを示す。
。

[図48] e G F R と負の相関が見い出されたアニオンについて、そのアニオンの濃度と e G F R との相関関係を示し、一次式で近似した図である。なお、
「*」は、e G F R との負の相関が新規に発見されたものであることを示す。
。

[図49] e G F R と負の相関が見い出されたアニオンについて、そのアニオンの濃度と e G F R との相関関係を示し、一次式で近似した図である。なお、
「*」は、e G F R との負の相関が新規に発見されたものであることを示す。
。

[図50] e G F R と負の相関が見い出されたアニオンについて、そのアニオンの濃度と e G F R との相関関係を示し、一次式で近似した図である。なお、
「*」は、e G F R との負の相関が新規に発見されたものであることを示す。
。

[図51] e G F R と負の相関が見い出されたアニオンについて、そのアニオンの濃度と e G F R との相関関係を示し、一次式で近似した図である。なお、
「*」は、e G F R との負の相関が新規に発見されたものであることを示す。
。

[図52] e G F R と負の相関が見い出されたアニオンについて、そのアニオンの濃度と e G F R との相関関係を示し、二次式で近似した図である。なお、
「*」は、e G F R との負の相関が新規に発見されたものであることを示す。
。

[図53] e G F R と負の相関が見い出されたアニオンについて、そのアニオン

の濃度と e G F R との相関関係を示し、二次式で近似した図である。なお、
「*」は、e G F R との負の相関が新規に発見されたものであることを示す。
。

[図54] e G F R と負の相関が見い出されたアニオンについて、そのアニオンの濃度と e G F R との相関関係を示し、二次式で近似した図である。なお、
「*」は、e G F R との負の相関が新規に発見されたものであることを示す。
。

[図55] e G F R と負の相関が見い出されたアニオンについて、そのアニオンの濃度と e G F R との相関関係を示し、二次式で近似した図である。なお、
「*」は、e G F R との負の相関が新規に発見されたものであることを示す。
。

[図56] e G F R と負の相関が見い出されたアニオンについて、そのアニオンの濃度と e G F R との相関関係を示し、二次式で近似した図である。

[図57] e G F R と負の相関が見い出されたアニオンについて、そのアニオンの濃度と e G F R との相関関係を示し、二次式で近似した図である。なお、
「*」は、e G F R との負の相関が新規に発見されたものであることを示す。
。

[図58] e G F R と負の相関が見い出されたアニオンについて、そのアニオンの濃度と e G F R との相関関係を示し、二次式で近似した図である。なお、
「*」は、e G F R との負の相関が新規に発見されたものであることを示す。
。

[図59] e G F R と負の相関が見い出されたアニオンについて、そのアニオンの濃度と e G F R との相関関係を示し、二次式で近似した図である。なお、
「*」は、e G F R との負の相関が新規に発見されたものであることを示す。
。

[図60] e G F R と負の相関が見い出されたアニオンについて、そのアニオンの濃度と e G F R との相関関係を示し、二次式で近似した図である。なお、
「*」は、e G F R との負の相関が新規に発見されたものであることを示す。

。

[図61] e G F Rと負の相関が見い出されたアニオンについて、そのアニオンの濃度と e G F Rとの相関関係を示し、二次式で近似した図である。なお、「*」は、e G F Rとの負の相関が新規に発見されたものであることを示す

。

[図62] e G F Rと負の相関が見い出されたアニオンについて、そのアニオンの濃度と e G F Rとの相関関係を示し、二次式で近似した図である。

[図63] e G F Rと正の相関が見い出されたアニオンについて、そのアニオンの濃度と e G F Rとの相関関係を示し、一次式で近似した図である。なお、「*」は、e G F Rとの負の相関が新規に発見されたものであることを示す

。

[図64] e G F Rと正の相関が見い出されたアニオンについて、そのアニオンの濃度と e G F Rとの相関関係を示し、一次式で近似した図である。なお、「*」は、e G F Rとの負の相関が新規に発見されたものであることを示す

。

[図65] e G F Rと正の相関が見い出されたアニオンについて、そのアニオンの濃度と e G F Rとの相関関係を示し、一次式で近似した図である。なお、「*」は、e G F Rとの負の相関が新規に発見されたものであることを示す

。

[図66] e G F Rと正の相関が見い出されたアニオンについて、そのアニオンの濃度と e G F Rとの相関関係を示し、一次式で近似した図である。なお、「*」は、e G F Rとの負の相関が新規に発見されたものであることを示す

。

[図67] e G F Rと正の相関が見い出されたアニオンについて、そのアニオンの濃度と e G F Rとの相関関係を示し、二次式で近似した図である。なお、「*」は、e G F Rとの負の相関が新規に発見されたものであることを示す

。

[図68] e G F Rとの相関について、本件早期腎疾患マーカー物質と、シスタ

チンCとを比較した結果を示す図である。

[図69] e G F Rとの相関について、本件早期腎疾患マーカー物質と、1-メチルアデノシンとを比較した結果を示す図である。

[図70] e G F Rとの相関について、本件早期腎疾患マーカー物質と、N-アセチルグルコサミンとを比較した結果を示す図である。

[図71] e G F Rとの相関について、本件早期腎疾患マーカー物質と、 γ -ブチロベタインとを比較した結果を示す図である。

[図72] e G F Rとの相関について、本件早期腎疾患マーカー物質と、セバシン酸とを比較した結果を示す図である。

[図73] e G F Rとの相関について、本件早期腎疾患マーカー物質と、シス-アコニット酸とを比較した結果を示す図である。

[図74] e G F Rとの相関について、本件早期腎疾患マーカー物質と、ホモバニリン酸とを比較した結果を示す図である。

[図75] 血漿サンプル中の本件早期腎疾患マーカー物質（ γ -ブチロベタイン、N-アセチルグルコサミン）の濃度を、e G F R値に応じたグループ毎に示した図である。

[図76] 血漿サンプル中の本件早期腎疾患マーカー物質（N-アセチルグルコサミン、1-メチルアデノシン）の濃度を、e G F R値に応じたグループ毎に示した図である。

[図77] 血漿サンプル中の本件早期腎疾患マーカー物質（シス-アコニット酸、セバシン酸）の濃度を、e G F R値に応じたグループ毎に示した図である。

[図78] 血漿サンプル中の本件早期腎疾患マーカー物質（ホモバニリン酸）の濃度を、e G F R値に応じたグループ毎に示した図である。

発明を実施するための形態

[0013] 本発明の腎疾患の判定方法（本発明の第1の発明）

本発明の腎疾患の判定方法としては、被検血液試料中に存在する、以下の腎疾患マーカー物質（以下、「本件腎疾患マーカー物質」とも表示する。）

から選ばれる 1 種又は 2 種以上の腎疾患マーカー物質を検出又は定量する工程を有する方法であれば特に制限されない。

(e G F R との負の相関を持つカチオンである腎疾患マーカー物質) : N-アセチルグルコサミン (N-acetylglucosamine)、 γ -ブチロベタイン (γ -butyrobetaine)、オフタルム酸 (ophthalmate)、N- ϵ -アセチルリジン (N-epsilon-acetyllysine)、シトシン (cytosine)、ヒポタウリン (hypotaurine)、7-メチルグアニン (7-methylguanine)、メチオニンスルホキシド (methionine sulfoxide)、アスパラギン (Asn) ;

(e G F R との正の相関を持つカチオンである腎疾患マーカー物質) : 2-アミノ酪酸 (2-aminobutyrate)、グルタミン酸 (Glu) ;

(e G F R との負の相関を持つアニオンである腎疾患マーカー物質) : イセチオン酸 (isethionate)、グルコン酸 (gluconate)、トランス-アコニット酸 (trans-aconitate)、ピメリン酸 (pimelate)、イソクエン酸 (isocitrate)、N-アセチル- β -アラニン (N-acetyl-beta-alanine)、N-アセチルグルタミン酸 (N-acetylglutamate)、セバシン酸 (sebacate)、4-オキソペンタン酸 (4-oxopentanoate)、シス-アコニット酸 (cis-aconitate)、ホモバニリン酸 (homovanillate)、アジピン酸 (adipate)、シトラマレイン酸 (citramalate)、2-イソプロピルマレイン酸 (2-isopropylmalate)、トレオン酸 (threonate)、N-アセチルアスパラギン酸 (N-acetylaspargate)、4-ヒドロキシ-3-メトキシマンデル酸 (4-hydroxy-3-methoxymandelate)、オキサミン酸 (oxamate)、グルタル酸 (glutarate)、アゼテート (azetate)、フタル酸 (phthalate)、マロン酸 (malonate)、シトラコン酸 (citraconate)、キナ酸 (quinate)、コハク酸 (succinate)、システイン-S-硫酸 (cysteine S-sulfate)、4-ヒドロキシ-3-メトキシ安息香酸 (4-hydroxy-3-methoxybenzoate) ;

(e G F R との正の相関を持つアニオンである腎疾患マーカー物質) : 4-メチル-2-オキソペンタン酸 (4-methyl-2-oxopentanoate)、2-オキソイソペンタン酸 (2-oxoisopentanoate)、乳酸 (lactate)、オクタン酸 (oc

tanoate)、2-オキソグルタル酸(2-oxoglutarate)。なお、本発明の腎疾患の判定方法の精度をより高める観点からは、2種以上の本件腎疾患マーカー物質を併用する方法もある。

[0014] 本発明の腎疾患の判定方法によれば、被検血液試料の提供者が腎疾患であるかどうかや、該提供者の腎疾患の症状の程度を判定することができる。

[0015] 前述の本件腎疾患マーカー物質の中でも、推定糸球体濾過量(estimated glomerular filtration rate: eGFR)との相関係数がより高い点で、N-アセチルグルコサミン、 γ -ブチロベタイン、N- ϵ -アセチルリジン、シトシン、オキサミン酸；2-アミノ酪酸、グルタミン酸；イセチオン酸、グルコン酸、トランス-アコニット酸、ピメリン酸、イソクエン酸、N-アセチル- β -アラニン、N-アセチルグルタミン酸、セバシン酸、4-オキソペンタン酸、シス-アコニット酸、ホモバニリン酸、アジピン酸、シトラマレイン酸、2-イソプロピルマレイン酸、トレオン酸、N-アセチルアスパラギン酸、4-ヒドロキシ-3-メトキシマンデル酸；4-メチル-2-オキソペンタン酸、2-オキソイソペンタン酸；を好適に例示することができる。

[0016] また、クレアチニンをはじめとする現在使用されている腎不全マーカー物質は、主に糸球体濾過率を指標としたマーカーである点、eGFRを計算しなければならない点など不十分な点が多い。しかし、本件腎疾患マーカー物質の中でも、N-アセチルグルコサミン(図5)、 γ -ブチロベタイン(図6)、N- ϵ -アセチルリジン(図11)、ヒポタウリン(図14)、7-メチルグアニン(図16)、メチオニンスルホキシド(図17)、アスパラギン(図18)、2-アミノ酪酸(図27)、グルタミン酸(図29)、セバシン酸(図33)、シス-アコニット酸(図34)、ホモバニリン酸(図35)、アジピン酸(図36)、シトラマレイン酸(図37)、2-イソプロピルマレイン酸(図38)、N-アセチルアスパラギン酸(図39)、4-ヒドロキシ-3-メトキシマンデル酸(図40)、オキサミン酸(図41)、グルタル酸(図42)、アゼテート(図43)、フタル酸(図44)、

マロン酸（図４６）、シトラコン酸（図４７）、キナ酸（図４８）、コハク酸（図４９）、システイン－Ｓ－硫酸（図５０）、４－ヒドロキシ－３－メトキシ安息香酸（図５１）、４－メチル－２－オキソペンタン酸（図６３）、２－オキソイソペンタン酸（図６４）、乳酸（図６５）、オクタン酸（図６６）の３１種類の腎疾患マーカー物質は、 $eGFR$ との相関式が一次式に近似しており、被験者（被検血液試料の提供者）の $eGFR$ の複雑な計算式を必要とせず、腎疾患の判定に用いることができるため、より簡便な腎疾患マーカー物質として好適に用いることができる。また、上記の３１種類の腎疾患マーカー物質は、早期の腎疾患の判定・検出に好適に用い得ると考えられる。

[0017] なお、上記の本件腎疾患マーカー物質のうち、腎機能の悪化に伴って濃度が上昇する本件腎疾患マーカー物質（ $eGFR$ の低下と共に血液中に有意に蓄積する物質）としては、 N －アセチルグルコサミン、 γ －ブチロベタイン、オフタルム酸、 N － ϵ －アセチルリジン、シトシン、ヒポタウリン、７－メチルグアニン、メチオニンスルホキシド、アスパラギンからなる陽イオン群や、イセチオン酸、グルコン酸、トランス－アコニット酸、ピメリン酸、イソクエン酸、 N －アセチル－ β －アラニン、 N －アセチルグルタミン酸、セバシン酸、４－オキソペンタン酸、シス－アコニット酸、ホモバニリン酸、アジピン酸、シトラマレイン酸、２－イソプロピルマレイン酸、トレオン酸、 N －アセチルアスパラギン酸、４－ヒドロキシ－３－メトキシマンデル酸、オキサミン酸、グルタル酸、アゼテート、フタル酸、マロン酸、シトラコン酸、キナ酸、コハク酸、システイン－Ｓ－硫酸、４－ヒドロキシ－３－メトキシ安息香酸からなる陰イオン群を例示することができ、腎機能の悪化に伴って濃度が低下する本件腎疾患マーカー物質（ $eGFR$ の低下と共に血液中に有意に減少する物質）としては、２－アミノ酪酸、グルタミン酸からなる陽イオン群や、４－メチル－２－オキソペンタン酸、２－オキソイソペンタン酸、乳酸、オクタン酸、２－オキソグルタル酸からなる陰イオン群を例示することができる。

[0018] また、本件腎疾患マーカー物質のうち、1-メチルアデノシン、シスーアコニット酸、ホモバニリン酸は、eGFRが少し低下したグループ（eGFR 30-59）においても、健常者における濃度と有意差が見られたため、早期腎疾患の判定・検出や、腎疾患の高感度での判定・検出に特に好適に用いることができ、中でも、シスーアコニット酸、ホモバニリン酸、中でも特にシスーアコニット酸は、健常者における濃度がかなり低いため、早期腎疾患の判定・検出や、腎疾患の高感度での判定・検出のために、とりわけ優れた腎疾患マーカーとなる。

[0019] また、上記の被検血液試料としては、被験者（被検血液試料の提供者）の血液に由来する試料である限り特に制限されず、血液試料そのものであってもよいし、その血液試料から得られた血清試料や血漿試料であってもよいが、検出や定量のより高い精度を得る観点から、血漿試料を好適に例示することができる。

[0020] 上記の本件腎疾患マーカー物質の検出又は定量方法としては、本件腎疾患マーカー物質を検出又は定量し得る限り、物理化学的方法であっても生物学的方法であってもよいが、検出感度の点で物理化学的方法を好適に例示することができ、中でも、液体クロマトグラフ質量分析計（LC/MS）、ガスクロマトグラフ質量分析計（GC/MS）やキャピラリー電気泳動質量分析計（CE-MS）等の質量分析計（MS）を用いた方法をより好適に例示することができ、少量のサンプルから数百種類以上の物質を同時測定できることから、CE-MSを用いた方法を特に好適に例示することができる。

[0021] 本発明の腎疾患の判定方法においては、本件腎疾患マーカー物質の検出結果又は定量結果をコントロールと比較することにより、被検血液試料の提供者が腎疾患であるかどうか、又は、該提供者の腎疾患の症状の程度を評価する工程をさらに有することが好ましい。上記のコントロールとしては、腎疾患非罹患者（好ましくは健常者）の血液試料（より好適には、被検血液試料と同種の血液試料）中の本件マーカー物質の検出結果又は定量結果（好ましくは、後述の「基準値」）を好適に例示することができる。例えば、上記方

法にて定量した被検血液試料中の本件腎疾患マーカー物質を濃度換算し、その濃度を、腎疾患非罹患者の血液試料中の本件腎疾患マーカー物質濃度より設定した基準値と比較することによって、被検血液試料の提供者が腎疾患であるかどうかを評価することができる。ここで、「基準値」とは、陽性又は陰性を判定するための値をいう。この基準値は、例えば、腎機能の悪化に伴って濃度が上昇する本件腎疾患マーカー物質の場合は、「腎疾患非罹患者の血液試料中の特定の本件腎疾患マーカー物質の濃度の平均値」＋（ $\alpha \times$ 標準偏差（SD））という数式において、 α として、0.5、1、2又は5を用いることによって、設定することができ、腎機能の悪化に伴って濃度が低下する本件腎疾患マーカー物質の場合は、「腎疾患非罹患者の血液試料中の特定の本件腎疾患マーカー物質の濃度の平均値」－（ $\alpha \times$ 標準偏差（SD））という数式において、 α として0.5、1、2又は5を用いることによって、設定することができる。なお、濃度の分布が正規分布である集団では、いずれの数式においても、 α として2を用いることが多い。

[0022] 具体的には、腎疾患非罹患者の集団を対象として、その血液試料中の本件腎疾患マーカー物質を定量して、上記の式により基準値を設定し、その本件腎疾患マーカー物質が腎機能の悪化に伴って濃度が上昇するもの（N－アセチルグルコサミン、 γ －ブチロベタイン、オフタルム酸、N－ ϵ －アセチルリジン、シトシン、ヒポタウリン、7－メチルグアニン、メチオニンスルホキシド、アスパラギン、イセチオン酸、グルコン酸、トランス－アコニット酸、ピメリン酸、イソクエン酸、N－アセチル－ β －アラニン、N－アセチルグルタミン酸、セバシン酸、4－オキソペンタン酸、シス－アコニット酸、ホモバニリン酸、アジピン酸、シトラマレイン酸、2－イソプロピルマレイン酸、トレオン酸、N－アセチルアスパラギン酸、4－ヒドロキシ－3－メトキシマンデル酸、オキサミン酸、グルタル酸、アゼテート、フタル酸、マロン酸、シトラコン酸、キナ酸、コハク酸、システイン－S－硫酸、4－ヒドロキシ－3－メトキシ安息香酸）である場合は、被検血液試料中のその本件腎疾患マーカー物質の濃度が、コントロール（好ましくは基準値）より

高い値を示した場合に、被検血液試料の提供者を陽性（腎疾患に罹患）と評価することができ、また、前述の被検血液試料中のその本件腎疾患マーカー物質の濃度がコントロールよりも高い程度を、該提供者の腎疾患の症状の重さの程度であると評価することができる。

[0023] 一方、用いる本件腎疾患マーカー物質が腎機能の悪化に伴って濃度が低下するもの（2-アミノ酪酸、グルタミン酸、4-メチル-2-オキソペンタン酸、2-オキソイソペンタン酸、乳酸、オクタン酸、2-オキソグルタル酸）である場合は、被検血液試料中のその本件腎疾患マーカー物質の濃度がコントロール（好ましくは基準値）より低い値を示した場合に、被検血液試料の提供者を陽性（腎疾患に罹患）と評価することができ、また、前述の被検血液試料中のその本件腎疾患マーカー物質の濃度がコントロールよりも低い程度を、該提供者の腎疾患の症状の重さの程度であると評価することができる。なお、基準値は、被検血液試料中の本件腎疾患マーカー物質を検出する度に毎回算出する必要はなく、例えば、様々な種類の血液試料についてあらかじめ基準値を測定しておき、血液試料の種類毎に検量線を作成しておけば、被検血液試料と同種の血液試料の基準値を検索するなどしてすぐに用いることができる。なお、本件腎疾患マーカー物質が検出できない場合は濃度0として扱えばよい。

[0024] また、本件腎疾患マーカー物質は、腎疾患の病態の管理に利用することもできる。腎疾患の病態を管理するには、例えば、上記方法にて定量した被検血液試料中の本件腎疾患マーカー物質を濃度換算し、その濃度からeGFRを評価すること等によって行なうことができる。本明細書において病態の管理とは、病状の重篤度の把握及び予後の観察をいう。

[0025] 本発明の腎疾患の判定方法により判定することができ、又は、病態の管理を行なうことのできる腎疾患としては、慢性腎不全、急性腎不全、糸球体腎炎、ネフローゼ症候群、腎硬化症、免疫複合体腎症、ループス腎炎、糖尿病性腎症、薬剤性腎障害、高血圧性腎障害、多発性嚢胞腎、IgA腎症などを好適に例示することができ、中でも、慢性腎不全、急性腎不全、糖尿病性腎

症などをより好適に例示することができる。

[0026] 本発明の早期腎疾患の判定方法（本発明の第2の発明）

現在一般的に使用されている公知の腎疾患マーカー物質としては、クレアチニンやシスタチンCが挙げられる。これらの公知の腎疾患マーカー物質の尿中の濃度は、GFRの低下と共に徐々に上昇するものの、特に末期の腎疾患では急激に上昇する二次曲線に近い上昇カーブを描く（図68～74参照）。また、上記の公知の腎疾患マーカー物質は、早期の腎疾患ではその濃度の上昇が緩やかであることから、早期の腎疾患を検出するには不向きであった。また、上記の公知の腎疾患マーカー物質の濃度からeGFRを算出する際にも複雑な計算式を必要とした。そこで、本発明者らは、eGFRと有意な相関がある64種類の腎疾患マーカー物質に関して、eGFRとの関係をより詳細に検討し、eGFRとの相関が一次式に近似する早期腎疾患マーカー物質を見い出した。

[0027] 本発明の早期腎疾患の判定方法としては、被検血液試料中に存在する、以下の早期腎疾患マーカー物質から選ばれる1種又は2種以上の腎疾患マーカー物質（以下、「本件早期腎疾患マーカー物質」とも表示する。）を検出又は定量する工程を有することを特徴とする判定方法であれば特に制限されない。

（eGFRとの負の相関を持つカチオンである早期腎疾患マーカー物質）：
1-メチルアデノシン、N-アセチルグルコサミン、 γ -ブチロベタイン、3-メチルヒスチジン、ヒドロキシプロリン、トリメチルアミン-N-オキシド、アシンメトリックジメチルアルギニン（ADMA）、N- ϵ -アセチルリジン、キヌレニン、インドール-3-酢酸、ヒポタウリン、N,N-ジメチルグリシン、7-メチルグアニン、メチオニンスルホキシド、アスパラギン；

（eGFRとの正の相関を持つカチオンである早期腎疾患マーカー物質）：
バリン、2-アミノ酪酸、グアニド酢酸、グルタミン酸、ロイシン；

（eGFRとの負の相関を持つアニオンである早期腎疾患マーカー物質）：

セバシン酸、シスーアコニット酸、ホモバニリン酸、アジピン酸、シトラマレイン酸、2-イソプロピルマレイン酸、N-アセチルアスパラギン酸、4-ヒドロキシ-3-メトキシマンデル酸、オキサミン酸、グルタル酸、アゼテート、フタル酸、クエン酸、マロン酸、シトラコン酸、キナ酸、コハク酸、システイン-S-硫酸、4-ヒドロキシ-3-メトキシ安息香酸；

（eGFRとの正の相関を持つアニオンである早期腎疾患マーカー物質）：
4-メチル-2-オキソペンタン酸、2-オキソイソペンタン酸、乳酸、オクタン酸；

なお、本発明の早期腎疾患の判定方法の精度をより高める観点からは、2種以上の本件早期腎疾患マーカー物質を併用する方法もある。

[0028] また、本件早期腎疾患マーカー物質のうち、1-メチルアデノシン、シスーアコニット酸、ホモバニリン酸は、eGFRが少し低下したグループ（eGFR 30-59）においても、健常者における濃度と有意差が見られたため、早期腎疾患の判定・検出や、腎疾患の高感度での判定・検出に特に好適に用いることができ、中でも、シスーアコニット酸、ホモバニリン酸、中でも特にシスーアコニット酸は、健常者における濃度がかなり低いため、早期腎疾患の判定・検出や、腎疾患の高感度での判定・検出のために、とりわけ優れた腎疾患マーカーとなる。

[0029] 本発明の早期腎疾患の判定方法によれば、被検血液試料の提供者が早期腎疾患であるかどうかや、該提供者の早期腎疾患の症状の程度を判定することができる。

[0030] 前述の本件早期腎疾患マーカー物質のうち、1-メチルアデノシン、3-メチルヒスチジン、ヒドロキシプロリン、トリメチルアミン-N-オキシド、アシンメトリックジメチルアルギニン（ADMA）、キヌレニン、インドール-3-酢酸、N,N-ジメチルグリシン、バリン、グアニド酢酸、ロイシン、クエン酸は、腎疾患との関連は知られていたが、eGFRとの相関式が一次式に近似する事、すなわち、早期腎疾患マーカー物質として用い得ることは本発明者らが初めて明らかにしたものである。

[0031] 本発明の腎疾患予防・治療剤のスクリーニング方法（本発明の第3の発明）

本発明の腎疾患予防・治療剤のスクリーニング方法としては、腎機能が低下した非ヒト動物に被検物質を投与する工程A；該非ヒト動物から血液試料を採取する工程B；該血液試料中に存在する、腎疾患マーカー物質（N-アセチルグルコサミン、 γ -ブチロベタイン、オフタルム酸、N- ϵ -アセチルリジン、シトシン、ヒポタウリン、7-メチルグアニン、メチオニンスルホキシド、アスパラギン、2-アミノ酪酸、グルタミン酸、イセチオン酸、グルコン酸、トランス-アコニット酸、ピメリン酸、イソクエン酸、N-アセチル- β -アラニン、N-アセチルグルタミン酸、セバシン酸、4-オキソペンタン酸、シス-アコニット酸、ホモバニリン酸、アジピン酸、シトラマレイン酸、2-イソプロピルマレイン酸、トレオン酸、N-アセチルアスパラギン酸、4-ヒドロキシ-3-メトキシマンデル酸、オキサミン酸、グルタル酸、アゼテート、フタル酸、マロン酸、シトラコン酸、キナ酸、コハク酸、システイン-S-硫酸、4-ヒドロキシ-3-メトキシ安息香酸、4-メチル-2-オキソペンタン酸、2-オキソイソペンタン酸、乳酸、オクタノ酸、2-オキソグルタル酸）から選ばれる1種又は2種以上の腎疾患マーカー物質を検出又は定量する工程C；血液試料中に存在する腎疾患マーカー物質の検出結果又は定量結果をコントロールと比較することにより、前記非ヒト動物の腎機能を評価する工程D；を有している限り特に制限されないが、前記工程Dとしては、腎機能の悪化に伴って濃度が上昇する本件腎疾患マーカー物質の濃度が、コントロールよりも低い場合、又は、腎機能の悪化に伴って濃度が低下する本件腎疾患マーカー物質の濃度が、コントロールよりも高い場合に、前述の被検物質を腎疾患の予防・治療剤と評価する工程D'を好適に例示することができる。

[0032] 上記非ヒト動物としては、非ヒト哺乳動物を好適に例示することができ、中でも、マウス、ラット、ハムスター、モルモット、サル、ウシ、ブタ、ウマ、ウサギ、ヒツジ、ヤギ、ネコ、イヌ等を好適に例示することができる。

実施例 1

[0033] [腎疾患患者の背景]

東北大学病院受診中の慢性腎臓病患者 41 人から、後述の C E - M S 解析の対象となる血漿サンプルを採取した。なお、本研究計画は東北大学倫理委員会にて予め承認を受けており、患者個人各々に情報提供した後、患者各々から承認を得て血漿サンプルの採取を行った。これらの患者の背景は、平均年齢が 62.9 ± 14.6 歳であり、41 人中 26 人が男性、15 人が女性であった。これらの患者の推定糸球体濾過量 (estimated glomerular filtration rate: e G F R) を、日本腎臓学会により推奨される推定式を用いて算出したところ、平均で $24.4 \pm 13.9 \text{ ml/min/1.73m}^2$ であり、また、全ての患者が C K D (慢性腎不全) の基準である $60 \text{ ml/min/1.73m}^2$ 以下に分類されていた。なお、e G F R を算出するための上記推定式は男性の場合は、「 $e G F R = 194 \times [\text{年齢}]^{-0.287} \times [\text{血中クレアチニン (mg/dl)}]^{-1.094}$ 」であり、女性の場合は、「 $e G F R = 194 \times [\text{年齢}]^{-0.287} \times [\text{血中クレアチニン (mg/dl)}]^{-1.094} \times [0.739]$ 」である。これらの慢性腎臓病患者 41 人の患者背景を図 1 に示す。

[0034] 図 1 に示されているように、これらの患者の慢性腎臓病の原因 (原疾患) としては、アルポート症候群が 1 人 (2.4%)、アレルギー性腎症が 1 人 (2.4%)、A N C A 関連腎症が 1 人 (2.4%)、大動脈炎症候群が 1 人 (2.4%)、両側腎梗塞が 1 人 (2.4%)、糖尿病性腎症が 8 人 (19.5%)、巣状糸球体硬化症が 3 人 (7.3%)、糸球体硬化症が 4 人 (9.7%)、水腎症が 1 人 (2.4%)、I g A 腎症が 9 人 (21.9%)、リポ蛋白糸球体症が 1 人 (2.4%)、ループス腎症が 2 人 (4.8%)、膜性増殖性糸球体炎が 1 人 (2.4%)、膜性腎症が 2 人 (4.8%)、多発嚢胞腎が 1 人 (2.4%)、原発性腎症が 2 人 (4.8%)、腎結核が 1 人 (2.4%)、サルコイドーシスが 1 人 (2.4%) であった。また、これらの患者の基礎疾患としては、10 人が心血管病、12 人が糖尿病、40 人が高血圧を罹患していた。さらに、これらの患者 41 人中 11 人が喫煙

者であった。これらの患者が内服している薬剤の種類としては、アロプリノールが12人(29.2%)、アンジオテンシン受容体拮抗薬が30人(73.1%)、AST-120が5人(12.1%)、エリスロポエチンが6人(14.6%)、スタチンが8人(19.5%)であった。

実施例 2

[0035] [腎疾患患者の血漿中の物質の解析]

本発明者らは、実施例1で採取した腎疾患患者全員の血漿サンプルについて、CE-MSを用いて網羅的解析を行い、これら血漿サンプルに含まれる物質の分析を行なった。具体的には以下のような方法で行なった。

[0036] 内標準物質を調整したメタノール溶液を、実施例1で得られた各血漿サンプルに添加して攪拌し、さらにクロロホルムを加えて攪拌し、4600gで5分間遠心分離した後、上清を限外ろ過フィルター(分画分子量5000)にとり、4℃、9100gで2時間遠心分離した後、ろ液を遠心濃縮してCE-TOFMSにて測定を行った。その際、312種類の陽イオンと193種類の陰イオンを網羅的に同時測定した。その結果、66種類の陽イオンと50種類の陰イオンが、慢性腎不全患者の血漿中より検出された。検出された物質(以下、「検出物質」と表示する。)の分子量は73.0m/zから460.1m/zの間であった。検出物質のうち、腎不全時に蓄積する物質を検索するために、本発明者らは、検出物質とeGFRの相関を、スピアマン順位相関検定を用いて解析した。検出物質のうち陽イオン(Cation)の結果を図2に示し、陰イオン(Anion)の結果を図3に示す。なお、図2及び図3はそれぞれ相関係数の高い順に上から表示している。これらの検出物質のうち、相関関係についてのP値が0.05以下であった物質を、eGFRと有意な相関があると見なした。そしてさらに解析を進め、eGFRと有意な相関がある陰イオン、陽イオンの中でも、eGFRの低下とともに有意に蓄積する物質30種類と、eGFR低下とともに有意に減少する物質35種類の合計65種類の物質が同定された。

[0037] 図2に示すように、陽イオンでeGFRの低下とともに有意に蓄積する物

質として、クレアチニン (creatinine)、シンメトリックジメチルアルギニン (SDMA)、グアジニノコハク酸 (guanidino succinate)、シトルリン (citrulline)、1-メチルアデノシン (1-methyladenosine)、N-アセチルグルコサミン (N-acetylglucosamine)、 γ -ブチロベタイン (γ -butyrobetaine)、オフタルム酸 (ophthalmate)、3-メチルヒスチジン (3-methylhistidine)、ヒドロキシプロリン (hydroxyproline)、トリメチルアミン-N-オキシド (trimethylamine N-oxide)、アラントイン (allantoin)、アシンメトリックジメチルアルギニン (ADMA)、N- ϵ -アセチルリジン (N-epsilon-acetyllysine)、キヌレニン (kynurenine)、シトシン (cytosine)、インドール-3-酢酸 (indole-3-acetate)、ヒポタウリン (hypotaurine)、N,N-ジメチルグリシン (n,n-dimethylglycine)、7-メチルグアニン (7-methylguanine)、メチオニンスルホキシド (methionine sulfoxide)、アスパラギン (Asn) が同定された。また、図2に示すように、陽イオンで eGFR の低下とともに有意に減少する物質として、トリプトファン (Trp)、バリン (Val)、チロシン (Tyr)、2-アミノ酪酸 (2-aminobutyrate)、グアニド酢酸 (guanidoacetate)、グルタミン酸 (Glu)、ロイシン (Leu) が同定された。

[0038] 一方、図3に示すように、陰イオンで eGFR の低下とともに有意に蓄積する物質として、イセチオン酸 (isethionate)、グルコン酸 (gluconate)、トランス-アコニット酸 (trans-aconitate)、ピメリン酸 (pimelate)、3-インドキシル硫酸 (3-indoxylsulfate)、イソクエン酸 (isocitrate)、N-アセチル- β -アラニン (N-acetyl-beta-alanine)、N-アセチルグルタミン酸 (N-acetylglutamate)、セバシン酸 (sebacate)、4-オキソペンタン酸 (4-oxopentanoate)、シス-アコニット酸 (cis-aconitate)、ホモバニリン酸 (homovanillate)、アジピン酸 (adipate)、シトラマレイン酸 (citramalate)、2-イソプロピルマレイン酸 (2-isopropylmalate)、トレオン酸 (threonate)、馬尿酸 (hippurate)、N-アセチルアスパラギン酸 (N-acetylaspartate)、4-ヒドロキシ-3-メトキシマンデル酸 (4-

hydroxy-3-methoxymandelate)、オキサミン酸 (oxamate)、グルタル酸 (glutarate)、アゼテート (azetate)、フタル酸 (phthalate)、クエン酸 (citrate)、マロン酸 (malonate)、シトラコン酸 (citraconate)、キナ酸 (quininate)、コハク酸 (succinate)、システインーS-硫酸 (cysteine S-sulfate)、4-ヒドロキシー-3-メトキシ安息香酸 (4-hydroxy-3-methoxybenzoate) が同定された。

また、図3に示すように、陰イオンでeGFRの低下とともに有意に減少する物質として、4-メチルー2-オキソペンタン酸 (4-methyl-2-oxopentanoate)、2-オキソイソペンタン酸 (2-oxoisopentanoate)、乳酸 (lactate)、オクタン酸 (octanoate)、ピルビン酸 (pyruvate)、2-オキソグルタル酸 (2-oxoglutarate) が同定された。

[0039] eGFRと有意な相関が認められたこれらの64種類の物質 (陽イオン及び陰イオン) のうち、クレアチニン (creatinine) を始めとするいくつかの物質は、これまでに腎不全との相関が報告されている物質であった。これらの64種類の物質のうち、eGFRとの有意な相関関係が新規に見い出された合計43種類 (11種類の陽イオン、32種類の陰イオン) の物質については、図2又は3において、物質名の背景を灰色とした。例えば、陽イオンでeGFRの低下とともに有意に蓄積する物質の中でも、N-アセチルグルコサミン (N-acetylglucosamine)、 γ -ブチロベタイン (γ -butyrobetaine)、オフタルム酸 (ophthalmate)、N- ϵ -アセチルリジン (N-epsilon-acetyllysine)、シトシン (cytosine)、ヒポタウリン (hypotaurine)、7-メチルグアニン (7-methylguanine)、メチオニンスルホキシド (methionine sulfoxide)、アスパラギン (Asn) は、今回の研究で、腎不全との相関が初めて見い出された物質であった。

[0040] また、陽イオンでeGFRの低下とともに有意に減少する物質の中でも、2-アミノ酪酸 (2-aminobutyrate)、グルタミン酸 (Glu) は、今回の研究で、腎不全との相関が初めて見い出された物質であった。

[0041] 一方、陰イオンでeGFRの低下とともに有意に蓄積する物質に関しては

、その大部分が今回新たに腎不全との相関が発見された物質であった。具体的には、イセチオン酸 (isethionate)、グルコン酸 (gluconate)、トランスーアコニット酸 (trans-aconitate)、ピメリン酸 (pimelate)、イソクエン酸 (isocitrate)、N-アセチル-β-アラニン (N-acetyl-beta-alanine)、N-アセチルグルタミン酸 (N-acetylglutamate)、セバシン酸 (sebacate)、4-オキソペンタン酸 (4-oxopentanoate)、シスーアコニット酸 (cis-aconitate)、ホモバニリン酸 (homovanillate)、アジピン酸 (adipate)、シトラマレイン酸 (citramalate)、2-イソプロピルマレイン酸 (2-isopropylmalate)、トレオン酸 (threonate)、N-アセチルアスパラギン酸 (N-acetylaspargate)、4-ヒドロキシ-3-メトキシマンデル酸 (4-hydroxy-3-methoxymandelate)、オキサミン酸 (oxamate)、グルタル酸 (glutarate)、アゼテート (azetate)、フタル酸 (phthalate)、マロン酸 (malonate)、シトラコン酸 (citraconate)、キナ酸 (quinate)、コハク酸 (succinate)、システイン-S-硫酸 (cysteine S-sulfate)、4-ヒドロキシ-3-メトキシ安息香酸 (4-hydroxy-3-methoxybenzoate) が、今回の研究で、腎不全との相関が初めて見いだされた物質であった。

[0042] また、陰イオンで e G F R の低下とともに有意に減少する物質の中では、4-メチル-2-オキソペンタン酸 (4-methyl-2-oxopentanoate)、2-オキソイソペンタン酸 (2-oxoisopentanoate)、乳酸 (lactate)、オクタン酸 (octanoate)、2-オキソグルタル酸 (2-oxoglutarate) が、今回の研究で、腎不全との相関が初めて見いだされた物質であった。

[0043] 以上のように、e G F R の低下と有意に相関のある合計 43 種類のこれらの物質は、腎疾患マーカー物質として使用し得ることが新たに示された。

実施例 3

[0044] [早期腎疾患マーカー物質の検索]

現在一般的に使用されている公知の腎疾患マーカー物質としては、クレアチニンやシスタチン C が挙げられる。これらの公知の腎疾患マーカー物質の尿中の濃度は、G F R の低下と共に徐々に上昇するものの、特に末期の腎疾

患では急激に上昇する二次曲線に近い上昇カーブを描く。また、上記の公知の腎疾患マーカー物質は、早期の腎疾患ではその濃度の上昇が緩やかであることから、早期の腎疾患を検出するには不向きであった。また、上記の公知の腎疾患マーカー物質の濃度から e G F R を算出する際にも複雑な計算式を必要とした。そこで、本発明者らは、上記実施例 2 で e G F R と有意な相関があると認められた 64 種類の腎疾患マーカー物質に関して、e G F R との関係をもより詳細に検討し、より早期に腎不全等の腎疾患を検出し得る腎疾患マーカー物質や、e G F R をより簡単に算出し得る腎疾患マーカー物質の選抜を試みた。

[0045] 具体的には、実施例 2 で見いだされた 64 種類の腎疾患マーカー物質のそれぞれについて、横軸を e G F R の値とし、縦軸をその腎疾患マーカー物質の血漿中濃度としたグラフを作成し（図 4 ～ 67）、その腎疾患マーカー物質の血漿中濃度と e G F R との間のスピアマンの相関係数が高く、かつ、その相関式一次式に近似して増減する物質を選抜した。なお、一次式に近似する変化を示す腎疾患マーカー物質の場合、e G F R との関係は、その腎疾患マーカー物質の血漿中濃度を $\ln(C_p)$ で表した際に、 $\ln(C_p) = \beta_1(eGFR) + \alpha$ と示される。一方、クレアチニンやシスタチン C のように二次式に近似する物質の場合、血漿中濃度は $\ln(C_p) = \beta_1(eGFR)^2 + \beta_2(eGFR) + \alpha$ として示される。ここで、 $(eGFR)^2$ を独立の変数として扱い、その際の対数尤度比 (log likelihood ratio) を計算する事によって、相関式が一次式あるいは二次式のどちらにより近似するかを評価した。この結果、陽イオンで e G F R が低下するとともに体内に有意に蓄積する 22 種類の物質（図 4 ～ 25）の中でも、1-メチルアデノシン、N-アセチルグルコサミン、 γ -ブチロベタイン、3-メチルヒスチジン、ヒドロキシプロリン、トリメチルアミン-N-オキシド、アシンメトリックジメチルアルギニン (ADMA)、N- ϵ -アセチルリジン、キヌレニン、インドール-3-酢酸、ヒポタウリン、N,N-ジメチルグリシン、7-メチルグアニン、メチオニンスルホキシド、アスパラギンは、e G F R との

相関式が一次式に近似する事が分かった。また、陽イオンで $eGFR$ が低下するとともに有意に減少する 7 種類の物質（図 26～32）の中でも、バリン、2-アミノ酪酸、グアニド酢酸、グルタミン酸、ロイシンは $eGFR$ との相関式が一次式に近似する事が分かった。一方、陰イオンで $eGFR$ が低下するとともに有意に蓄積する 30 種類の物質（図 33～62）の中でも、セバシン酸、シス-アコニット酸、ホモバニリン酸、アジピン酸、シトラマレイン酸、2-イソプロピルマレイン酸、N-アセチルアスパラギン酸、4-ヒドロキシ-3-メトキシマンデル酸、オキサミン酸、グルタル酸、アゼテート、フタル酸、クエン酸、マロン酸、シトラコン酸、キナ酸、コハク酸、システイン-S-硫酸、4-ヒドロキシ-3-メトキシ安息香酸は、 $eGFR$ との相関式が一次式に近似する事が分かった。さらに、陰イオンで $eGFR$ が低下するとともに有意に減少する 5 種類の物質（図 63～67）のなかでも、4-メチル-2-オキソペンタン酸、2-オキソイソペンタン酸、乳酸、オクタン酸は、 $eGFR$ との相関式が一次式に近似する事が分かった。

[0046] 以上のことから、1-メチルアデノシン、N-アセチルグルコサミン、 γ -ブチロベタイン、3-メチルヒスチジン、ヒドロキシプロリン、トリメチルアミン-N-オキシド、アシンメトリックジメチルアルギニン（ADMA）、N- ϵ -アセチルリジン、キヌレニン、インドール-3-酢酸、ヒポタウリン、N,N-ジメチルグリシン、7-メチルグアニン、メチオニンスルホキシド、アスパラギン、バリン、2-アミノ酪酸、グアニド酢酸、グルタミン酸、ロイシン、セバシン酸、シス-アコニット酸、ホモバニリン酸、アジピン酸、シトラマレイン酸、2-イソプロピルマレイン酸、N-アセチルアスパラギン酸、4-ヒドロキシ-3-メトキシマンデル酸、オキサミン酸、グルタル酸、アゼテート、フタル酸、クエン酸、マロン酸、シトラコン酸、キナ酸、コハク酸、システイン-S-硫酸、4-ヒドロキシ-3-メトキシ安息香酸、4-メチル-2-オキソペンタン酸、2-オキソイソペンタン酸、乳酸、オクタン酸は、 $eGFR$ との相関式が一次式に近似する腎疾患マ

一カー物質であることが示された。腎疾患マーカー物質の中でも、腎疾患の初期から濃度が変化し、腎疾患が進行するにつれて、一次式に近い形で直線的に濃度が上昇する上記の43種類の腎疾患マーカー物質は、早期腎疾患の判定・検出に好適に用い得る早期腎疾患マーカー物質と考えられる。なお、早期腎疾患マーカー物質のうち、1-メチルアデノシン、3-メチルヒスチジン、ヒドロキシプロリン、トリメチルアミン-N-オキシド、アシンメトリックジメチルアルギニン（ADMA）、キヌレニン、インドール-3-酢酸、N,N-ジメチルグリシン、バリン、グアニド酢酸、ロイシン、クエン酸は、腎疾患との関連は知られていたが、eGFRとの相関式が一次式に近似する事、すなわち、早期腎疾患マーカー物質として用い得ることは本発明者らが初めて明らかにしたものである。また、かかる43種類の早期腎疾患マーカー物質は、被験者（被検血液試料の提供者）のeGFRの複雑な計算式を必要とせずに、腎疾患の判定に用いることができるため、より簡便な腎疾患マーカー物質として好適に用いることができると考えられる。

実施例 4

[0047] [シスタチンCとの比較]

現在一般的に使用されている公知の腎疾患マーカー物質のうち、クレアチニンについては既に図19において、eGFRとの相関式が二次式に近似することを示した。そこで、現在、クレアチニンに代わる腎不全マーカー物質と言われているシスタチンCについても、eGFRとの相関式を調べることとした。具体的には、実施例1で採取した腎疾患患者全員の血漿サンプルについて、実施例2と同様にCE-MSを用いて、これら血漿サンプルに含まれるシスタチンCの分析を行った。次いで、この分析結果を利用して、eGFRとシスタチンCとの相関関係を調べた。その結果を図68に示す。この結果から分かるように、シスタチンCもまた、eGFRの低下と共に徐々に血中濃度が上昇するものの、特に末期の腎疾患では急激に上昇する二次曲線に近い上昇カーブを描いた。したがって、クレアチニンだけでなく、シスタチンCもまた、本件早期腎疾患マーカー物質のように、早期腎疾患の判定

には不向きであることが示された。なお、参考のため、図69～74に、eGFRとの相関について、本件早期腎疾患マーカー物質と、公知の腎疾患マーカー物質（クレアチニン及びシスタチンC）とを比較した図を6つ示す。これらの図に示されるように、本件早期腎疾患マーカー物質は、eGFRの落ち込みに対して、クレアチニンやシスタチンCよりも敏感な濃度変化を示した。以上の結果から、本件早期腎疾患マーカー物質は、従来の腎疾患マーカー物質と比較して、早期腎疾患の判定において、特に優れていることが示された。

実施例 5

[0048] [腎疾患患者の血漿中の腎疾患マーカー物質濃度と、健常者の血漿中のかかる濃度との比較]

前述の実施例2や3において、腎疾患患者の血漿中の腎疾患マーカー物質の濃度や、かかる患者のeGFRの解析を行った。この解析結果を、健常者場合と比較するために、健常者の血漿中の腎疾患マーカー物質の濃度を測定することとした。

[0049] まず、健常者18人から、前述のCE-MS解析の対象となる血漿サンプルを採取した。これらの健常者の背景は、平均年齢が55歳であり、全員が男性であった。これらの健常者のeGFRを、日本腎臓学会により推奨される前述の推定式を用いて算出したところ、全ての健常者が正常の基準である $60\text{ ml/min/1.73 m}^2$ 以上に分類されていた。

[0050] これらの健常者から採取した血漿サンプルについて、前述の実施例2記載の方法と同じ方法でCE-MS解析を行い、 γ -ブチロベタイン、N-アセチルグルコサミン、1-メチルアデノシン、シス-アコニット酸、セバシン酸、ホモバニリン酸の計6種類の物質の濃度を測定した。次いで、これらの各物質の濃度の平均値を算出した。また、前述の実施例2で腎疾患患者の血漿サンプル中の濃度を測定した物質のうち、前述の6種類の各物質の濃度について、腎疾患患者のeGFR値に応じた3つのグループ（eGFR30-59、eGFR15-29、eGFR15>）毎に平均値を算出した。前述

の6種類の各物質について、健常者のグループ（normal）、eGFRが30-59の腎疾患患者のグループ（eGFR 30-59）、eGFRが15-29の腎疾患患者のグループ（eGFR 15-29）、eGFRが15以下の腎疾患患者のグループ（eGFR 15<）ごとに表示した結果を図75~78に示す。なお、図75の下段において、健常者のうちの2人のN-アセチルグルコサミン濃度が他の全員の該濃度と極端に離れていたため、この2人のN-アセチルグルコサミン濃度を異常値として除外したものを図76の上段に示している。また、図75~78の左側のパネルは、測定濃度を個別にドットとして表したものであり、右側のパネルは、グループ毎に平均した棒グラフを表したものである。

- [0051] 図75~78の結果から分かるように、6種類の物質のうち、1-メチルアデノシン、シス-アコニット酸、ホモバニリン酸は、eGFRが低下するにつれて物質濃度が上昇する傾向が見られた上に、eGFRが少し低下したグループ（eGFR 30-59）においても、健常者における濃度と有意差が見られ、中でも、シス-アコニット酸、ホモバニリン酸、中でも特にシス-アコニット酸は、健常者における濃度がかなり低かったため（図77及び78）、特に優れた腎疾患マーカーとなることが示された。

産業上の利用可能性

- [0052] 本発明は、腎疾患の判定の分野や、腎疾患の予防・治療剤のスクリーニングの分野に好適に利用することができる。

請求の範囲

- [請求項1] 被検血液試料中に存在するシスーアコニット酸 (cis-aconitate) を検出又は定量する工程を有することを特徴とする腎疾患の判定方法。
- [請求項2] 被検血液試料中に存在するシスーアコニット酸の検出結果又は定量結果をコントロールと比較することにより、被検血液試料の提供者が腎疾患であるかどうか、又は、該提供者の腎疾患の症状の程度を評価する工程をさらに有することを特徴とする請求項1に記載の腎疾患の判定方法。
- [請求項3] 被検血液試料中に存在するシスーアコニット酸の濃度がコントロールよりも高い場合に、被検血液試料の提供者が腎疾患であると評価し、又は、被検血液試料中に存在するシスーアコニット酸の濃度がコントロールよりも高い程度を、該提供者の腎疾患の症状の重さの程度であると評価することを特徴とする請求項2に記載の腎疾患の判定方法。
- [請求項4] 腎疾患が、腎不全であることを特徴とする請求項1～3のいずれかに記載の腎疾患の判定方法。
- [請求項5] 被検血液試料中に存在するシスーアコニット酸を検出又は定量する工程を有することを特徴とする早期腎疾患の判定方法。
- [請求項6] 腎疾患が、腎不全であることを特徴とする請求項5に記載の早期腎疾患の判定方法。
- [請求項7] 以下の工程A～Dを有することを特徴とする腎疾患予防・治療剤のスクリーニング方法。腎機能が低下した非ヒト動物に被検物質を投与する工程A；
該非ヒト動物から血液試料を採取する工程B；
該血液試料中に存在するシスーアコニット酸を検出又は定量する工程C；
血液試料中に存在するシスーアコニット酸の検出結果又は定量結果をコントロールと比較することにより、前記非ヒト動物の腎機能を評価

する工程D；

[図1]

CKD患者の背景

年齢	62.8 ± 14.6 (27-84)	
性別(男/女)	25/25	
クレアチニン	2.64 ± 1.60 (0.8-7.4)	
eGFR	24.4 ± 13.9(5.9-57.0)	
CKDの原疾患	Alport syndrome	1 (2.4%)
	analgesic-induced nephropathy	1 (2.4%)
	ANCA related nephropathy	1 (2.4%)
	aortitis syndrome	1 (2.4%)
	bilateral renal infarction	1 (2.4%)
	DM nephropathy	8 (19.5%)
	FSGS	3 (7.3%)
	glomerulosclerosis	4 (9.7%)
	hydronephrosis	1 (2.4%)
	IgA nephropathy	9 (21.9%)
	lipoprotein glomerulopathy	1 (2.4%)
	lupus nephropathy	2 (4.8%)
	membrane proliferative glomerulonephritis	1 (2.4%)
	membranous nephropathy	2 (4.8%)
	polycystic kidney	1 (2.4%)
	primary renal disease	2 (4.8%)
	renal tuberculosis	1 (2.4%)
	sarcoidosis	1 (2.4%)
基礎疾患	cardiovascular disease	10 (24.3%)
	diabetes mellitus	12 (29.2%)
	hypertension	40 (97.5%)
	smoking	11 (26.8%)
内服薬	allopurinol	12 (29.2%)
	ARB	30 (73.1%)
	AST-120	5 (12.1%)
	erythropoietin	6 (14.6%)
	statin	8 (19.5%)

[図2]

Cation

eGFRの減少とともに蓄積する物質

Compound	Spearman correlation coefficients	p value
Creatinine	-0.982	<0.001
3DMA	-0.946	<0.001
Guanidinosuccinate	-0.931	<0.001
Citulline	-0.881	<0.001
1-Methyladenosine	-0.772	<0.001
N-Acetylglutamate	-0.751	<0.001
gamma-Butyrobetaine	-0.734	<0.001
Ophthalmate	-0.687	<0.001
3-Methylhistidin	-0.669	<0.001
Hydroxyproline	-0.666	<0.001
Trimethylamine N-oxide	-0.665	<0.001
Allantoin	-0.603	<0.001
ADMA	-0.614	<0.001
N-acetyl/acetylestere	-0.602	<0.001
Pyruvate	-0.579	<0.001
Cysteine	-0.570	<0.001
Indole-3-acetate	-0.475	0.002
Hypoxanthine	-0.447	0.004
N,N-Dimethylglycine	-0.428	0.006
7-Methylguanine	-0.408	0.010
Methionine sulfoxide	-0.405	0.010
Asn	-0.337	0.021
Cysteine-glutathione disulfide	-0.276	0.077
Gln	-0.273	0.083
Arg	-0.271	0.087
His	-0.267	0.091
Ethanolamine phosphate	-0.261	0.096
Gly	-0.258	0.102
Piperazine	-0.258	0.110
beta-Ala	-0.243	0.131
Ornithine	-0.182	0.241
Homocysteine ; N6-N6-N6-Triethyllysine	-0.185	0.248
Galactose	-0.182	0.250
Pipicorate	-0.122	0.435
o-Acetylcamitine	-0.118	0.453
Pro	-0.113	0.474
Glutamate	-0.101	0.481
5-Methyltetrahydrofolate	-0.088	0.676
Ala	0.070	0.635
5-Oxoproline	-0.032	0.827
Taurine	-0.024	0.876
Ser	-0.003	0.998

eGFRの減少とともに減少する物質

Compound	Spearman correlation coefficients	p value
Tip	0.688	<0.001
Val	0.478	0.002
Tyr	0.453	0.008
3-Aminocaproate	0.451	0.004
Glutondacetate	0.441	0.005
Glu	0.422	0.007
Leu	0.386	0.014
Asp	0.262	0.067
Hypoxanthine	0.258	0.101
Ile	0.225	0.153
Lys	0.219	0.166
Glycophosphorylcholine	0.211	0.182
Glucose	0.207	0.180
1-Methyl-5-pyrrolidone	0.207	0.190
Camitine	0.202	0.201
Inosine	0.193	0.223
Urocanate	0.181	0.251
1-Methylnicotinamide	0.165	0.286
Tyr	0.152	0.306
Met	0.121	0.441
Beetaine	0.098	0.505
Oxalate	0.084	0.593
Phe	0.068	0.712
alpha-Aminoadipate	0.045	0.775

過去に報告のない物質 (P<0.05)

[図3]

Anion eGFRの減少とともに蓄積する物質


Compound	Spearman correlation coefficients	p value
Isobutrate	-0.823	<0.001
Glucuronate	-0.823	<0.001
trans-Aconitate	-0.808	<0.001
Formate	-0.847	<0.001
3-Hydroxy sulfate	-0.834	<0.001
isobutrate	-0.825	<0.001
N-Acetylhistidine	-0.805	<0.001
N-Acetylglutamate	-0.782	<0.001
Gebacate	-0.751	<0.001
4-Carboxanose	-0.725	<0.001
cis-Aconitate	-0.713	<0.001
Hemovanilate	-0.711	<0.001
Adipate	-0.677	<0.001
Glutamate	-0.670	<0.001
2-Hydroxyisovalate	-0.663	<0.001
Thiosulfate	-0.631	<0.001
Hippurate	-0.606	<0.001
N-Acetylsuccinate	-0.581	<0.001
4-Hydroxy-3-methoxymandelate	-0.572	<0.001
Oxamate	-0.536	<0.001
Glutarate	-0.465	0.003
Acetate	-0.463	0.003
phthalate	-0.456	0.003
citrate	-0.454	0.004
Malonate	-0.440	0.005
Citronate	0.401	0.011
Quinate	-0.392	0.013
Succinate	-0.362	0.021
Cysteine Sulfate	-0.343	0.030
4-Hydroxy-3-methoxymandelate	-0.322	0.041
Glycophosphate	-0.284	0.072
3-Hydroxyoctonate	-0.206	0.163
Malate	-0.157	0.321
2-Hydroxypentamate	-0.139	0.379
Heptanoate	-0.126	0.416
Laurate	-0.100	0.527
5-Oxoproline	-0.067	0.671
Murate	0.064	0.686

eGFRの減少とともに減少する物質


Compound	Spearman correlation coefficients	p value
4-Methyl-2-oxopentanoate	0.673	<0.001
2-Chloropentanoate	0.646	<0.001
Lactate	0.349	0.027
Octanoate	0.348	0.027
2-Chloroglutarate	0.331	0.036
Pyrvalate	0.305	0.053
2-Hydroxyisobutyrate, 2-Hydroxybutyrate	0.226	0.152
Fumarate	0.195	0.327
3-Hydroxybutyrate	0.094	0.593
Pelargonate	0.063	0.686
Pentanoate, 3-Methylbutanoate	0.021	0.862
Decanoate	0.015	0.923
Hexanoate	0.011	0.946

過去に報告のない物質 (P<0.05)


[図4]




[図5]




[図6]




[図7]




[図8]




[図9]




[図10]




[図11]




[図12]




[図13]




[図14]




[図15]




[図16]




[図17]




[図18]




[図19]




[図20]




[図21]




[図22]




[図23]




[図24]




[図25]




[図26]




[図27]




[図28]




[図29]




[図30]




[図31]




[図32]




[図33]




[図34]




[図35]




[図36]




[図37]




[図38]




[図39]




[図40]




[図41]



[図42]




[図43]




[図44]


*




[図45]




[図46]




[図47]




[図48]




[図49]




[図50]




[図51]




[図52]




[図53]




[図54]




[図55]




[図56]




[図57]




[図58]




[図59]




[図60]




[図61]




[図62]




[図63]




[図64]




[図65]



[図66]




[図67]




[図68]

Creatinine, cystatin C




[図69]

1-methyladenosine




[図70]

N-acetylglucosamine




[図71]


γ -butyrobetaine



[図72]




[図73]



[図74]

Homovanillate



Left Graph: Individual Data Points

Age Group	Homocysteine (μ M)
60 $\leq$	1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 10.0
30-59	1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 10.0
15-29	1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 10.0
15 >	1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 10.0

Right Graph: Mean Homocysteine Levels

Condition	Mean Homocysteine (μ M)
normal	~2.2
eGFR 30-59	~2.5
eGFR 15-29	~2.8
eGFR 15 >	~3.2

Figure 1 consists of two bar charts. The left chart shows the number of samples (μ M) for different age groups (60≤, 30-59, 15-29, 15>) with a significant difference indicated by an asterisk. The right chart shows the number of samples (μ M) for different age groups (normal, eGFR 30-59, eGFR 15-29, eGFR 15>) with a significant difference indicated by an asterisk.

Left Chart: N-acetylglucosamine

Y-axis: μ M (0 to 10). X-axis: 60≤, 30-59, 15-29, 15>.

Approximate values (μ M):

Age Group	μ M
60≤	~10.5
30-59	~2.5
15-29	~3.5
15>	~4.5

Significance: * (ANOVA on rank).

Right Chart: N-acetylglucosamine


Y-axis: μ M (0 to 6). X-axis: normal, eGFR 30-59, eGFR 15-29, eGFR 15>.

Approximate values (μ M):


Age Group	μ M
normal	~4.5
eGFR 30-59	~2.5
eGFR 15-29	~3.5
eGFR 15>	~4.5

Significance: * (ANOVA on rank).


[図76]



[図77]



[図78]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2010/005434

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

G01N33/50(2006.01)i, G01N27/62(2006.01)i, G01N33/15(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

G01N33/50, G01N27/62, G01N33/15

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2010
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2010	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2010

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

JSTPlus/JMEDPlus/JST7580(JDREAMII), CAPLUS (STN), BIOSIS (STN), MEDLINE (STN)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2000-146980 A (Japan Science and Technology Corp.), 26 May 2000 (26.05.2000), entire text; all drawings & US 7109044 B1 & EP 1111387 A1 & WO 2000/014543 A1 & DE 69939544 D & AU 5449199 A & AU 750574 B & CA 2342897 A & AT 408145 T	1-7
A	JP 2007-519394 A (Quark Biotech, Inc.), 19 July 2007 (19.07.2007), entire text; all drawings & US 2007/0072244 A1 & US 2009/0202566 A1 & EP 1624788 A & WO 2004/100759 A2	1-7

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
27 September, 2010 (27.09.10)

Date of mailing of the international search report
12 October, 2010 (12.10.10)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2010/005434

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2008-538173 A (Raven Biotechnologies, Inc.), 16 October 2008 (16.10.2008), & US 2006/0172349 A1 & EP 1846032 A & WO 2006/083852 A2 & CA 2596115 A	1-7
A	Alberghini A, Recalcatti S, Tacchini L, Santambrogio P, Campanella A, Cairo G., Loss of the von Hippel Lindau tumor suppressor disrupts iron homeostasis in renal carcinoma cells., J Biol Chem., 2005, Vol.280, No.34, Page.30120-30128	1-7
P,A	Takafumi TOYOHARA et al., "CKD Kanja no Nyodokusho Busshitsu to Soki Shindan Marker no Morateki Kaiseki", The Japanese Journal of Nephrology, 25 May 2010 (25.05.2010), vol.52, no.3, page 340	1-7
P,A	Yasutoshi AKIYAMA et al., "CE-MS o Mochiita Ketsueki Toseki Zengo no Nyodokusho Busshitsu Jokyo Koritsu no Morateki Kaiseki", The Japanese Journal of Nephrology, 25 May 2010 (25.05.2010), vol.52, no.32, page 378	1-7

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (I P C))

Int.Cl. G01N33/50(2006.01)i, G01N27/62(2006.01)i, G01N33/15(2006.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (I P C))

Int.Cl. G01N33/50, G01N27/62, G01N33/15

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1 9 2 2 - 1 9 9 6 年
日本国公開実用新案公報	1 9 7 1 - 2 0 1 0 年
日本国実用新案登録公報	1 9 9 6 - 2 0 1 0 年
日本国登録実用新案公報	1 9 9 4 - 2 0 1 0 年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

JSTPlus/JMEDPlus/JST7580(JDreamII), CAplus(STN), BIOSIS(STN), MEDLINE(STN)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	JP 2000-146980 A (科学技術振興事業団) 2000.05.26, 全文、全図 & US 7109044 B1 & EP 1111387 A1 & WO 2000/014543 A1 & DE 69939544 D & AU 5449199 A & AU 750574 B & CA 2342897 A & AT 408145 T	1-7
A	JP 2007-519394 A (クアーク・バイオテック・インコーポレイテッド) 2007.07.19, 全文、全図 & US 2007/0072244 A1 & US 2009/0202566 A1 & EP 1624788 A & WO 2004/100759 A2	1-7

☒ C 欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

2 7 . 0 9 . 2 0 1 0

国際調査報告の発送日

1 2 . 1 0 . 2 0 1 0

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (I S A / J P)

郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

草川 貴史

電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 2 5 2

2 J

4 0 7 5

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	JP 2008-538173 A (レイベン バイオテクノロジーズ, インコーポレイテ ィド) 2008.10.16, & US 2006/0172349 A1 & EP 1846032 A & WO 2006/083852 A2 & CA 2596115 A	1-7
A	Alberghini A, Recalcati S, Tacchini L, Santambrogio P, Campanella A, Cairo G., Loss of the von Hippel Lindau tumor suppressor disrupts iron homeostasis in renal carcinoma cells., J Biol Chem., 2005, Vol. 280, No. 34, Page. 30120-30128	1-7
P, A	豊原敬文 他, C K D 患者の尿毒症物質と早期診断マーカーの網羅的解 析, 日本腎臓学会誌, 2010.05.25, Vol.52, No.3, Page.340	1-7
P, A	秋山泰利 他, C E - M S を用いた血液透析前後の尿毒症物質除去効率の 網羅的解析, 日本腎臓学会誌, 2010.05.25, Vol.52, No.32, Page.378	1-7