



(51) МПК
 A61K 35/66 (2006.01)
 A61P 33/00 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
 ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
 ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(21), (22) Заявка: 2004129974/14, 18.10.2004

(43) Дата публикации заявки: 27.03.2006 Бюл. № 9

Адрес для переписки:
 119361, Москва, ул. Озерная, 44, ЗАО
 "Агроветсервис", С.В. Березкиной

(71) Заявитель(и):

Закрытое акционерное общество
 "Агроветсервис" (RU),
 Государственное учреждение Центральный
 научно-исследовательский институт
 эпидемиологии Министерства
 Здравоохранения (RU)

(72) Автор(ы):

Юрков Василий Андреевич (RU),
 Ястреб Валерий Брониславович (RU),
 Березкина Светлана Викторовна (RU),
 Черкасова Татьяна Дмитриевна (RU),
 Покровский Валентин Иванович (RU)

(54) СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ФИЛЯРИАТОЗОВ

(57) Формула изобретения

1. Способ лечения филяриатозов, включающий введение авермектиносодержащего препарата, отличающийся тем, что в качестве авермектиносодержащего препарата используют абиктин, который вводят в дозе (по ДВ) 0,05-0,2 мг/кг массы тела животного или человека 1-2 раза в месяц в течение 6-8 месяцев в период лета насекомых.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при диروفилляриозе плотоядных абиктин вводят в дозе (по ДВ) 0,05-0,2 мг/кг массы один раз в месяц с апреля по сентябрь в северных районах или с марта по октябрь в южных районах.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что при филяриатозах лошадей абиктин вводят в дозе (по ДВ) 0,1-0,2 мг/кг массы 1-2 раза в месяц с апреля по сентябрь в северных районах или с марта по октябрь в южных районах.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что при филяриатозах крупного рогатого скота абиктин вводят в дозе (по ДВ) 0,1-0,2 мг/кг массы 1-2 раза в месяц с апреля по сентябрь в северных районах или с марта по октябрь в южных районах.

5. Способ по п.1, отличающийся тем, что при филяриатозах человека абиктин вводят в дозе (по ДВ) 0,2 мг/кг массы 1-2 раза в месяц с апреля по сентябрь в северных районах или с марта по октябрь в южных районах.

6. Способ по п.5, отличающийся тем, что при филяриатозах человека абиктин вводят 2 раза в месяц с интервалом 24 ч.

7. Способ по п.1, отличающийся тем, что абиктин вводят в виде инъекций, порошка или таблеток.