



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106362002 A

(43)申请公布日 2017.02.01

(21)申请号 201610865316.6

(22)申请日 2016.09.30

(71)申请人 马建国

地址 273100 山东省济宁市曲阜市鼓楼大街北首曲阜市第二人民医院

(72)发明人 马建国 马龙

(51)Int.Cl.

A61K 36/8984(2006.01)

A61K 9/06(2006.01)

A61P 17/06(2006.01)

权利要求书1页 说明书2页

(54)发明名称

一种治疗红皮病型银屑病的药膏及其制备方法

(57)摘要

本发明公开了一种治疗红皮病型银屑病的药膏及其制备方法,它是由下述重量配比的原料制成:白薇100—10份,石斛100—10份,拳参100—10份,桑叶100—10份,凡士林3000—150份。制备方法是:先将凡士林加热化开,将白薇、石斛、拳参、桑叶,入凡士林中浸泡6天,然后加热将药炸至褐色,温度150—100℃时,捞出药渣,药油待凉凝后即成膏状,分装塑料盒中备用。有益效果是:该药膏最大特点是直接涂抹于病变部位,发挥清热凉血,滋阴润肤,祛风止痒良效。患者反应,搽上此药膏后,肌肤均感舒适滋润,并可软化鳞屑,使干燥脱屑性皮损逐渐得以消退,对皮肤无任何刺激性,且具保护皮肤功效。

1. 一种治疗红皮病型银屑病的药膏, 其特征在于它是由下述重量配比的原料制成: 白薇100—10份, 石斛100—10份, 拳参100—10份, 桑叶100—10份, 凡士林3000—150份。

2. 如权利要求1所述的治疗红皮病型银屑病的药膏, 其特征在于它是由下述重量配比的原料制成: 白薇10份, 石斛10份, 拳参10份, 桑叶10份, 凡士林150份。

3. 一种治疗红皮病型银屑病的药膏制备方法, 其特征在于包括如下步骤: 先将凡士林加热化开, 将白薇、石斛、拳参、桑叶, 入凡士林中浸泡6天, 然后加热将药炸至褐色, 温度150—100℃时, 捞出药渣, 药油待凉凝后即成膏状, 分装盒中备用。

一种治疗红皮病型银屑病的药膏及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种中药药膏,具体为一种治疗红皮病型银屑病的药膏及其制备方法。

背景技术

[0002] 红皮病型银屑病是一种常见的皮肤病变,病因是内服某些药物,多数患者是由急性荨麻疹、寻常型银屑病进行期、过敏性皮炎、急性湿疹等,外用强烈刺激皮肤药物,如风油精、酒精、碘伏、六神花露水、红花油,及其它含有樟脑、冰片、硫黄、薄荷、水杨酸、焦油类药物等外用制剂所引起。常在身体某一部位先有片状红斑,在数日内可迅速蔓延至周身,急性期可有发热全身不适等症状。全身皮肤弥漫性潮红,干燥,上覆较多鳞屑,自觉微痒,肌肤觉有紧绷感。

[0003] 中医认为,本病是肌肤有热,加之外来刺激,伤及阴血化燥,皮肤失其润养,而呈干燥鳞屑脱落。

[0004] 常规治疗此病,西医用皮质类固醇激素如泼尼松、地塞米松内服,外用数种激素类霜膏,如派瑞松、艾洛松、哈西奈德乳膏、醋酸肤轻松软膏搽于患处。

[0005] 中医治疗此病,用养血润肤,祛风止痒中药内服,但不少患者认为,服中药味苦显效较慢,难以坚持服用,外用激素类药物,对机体皮肤造成明显副作用。因此至今仍乏一种治疗红皮病型银屑病,既能使皮损逐渐消退,又简便易行外用中药膏剂。

发明内容

[0006] 本发明目的,为了解除红皮病型银屑病患者肌肤潮红干燥,痒热脱屑痛苦,按中医理论观点,宜研制出一种清血热滋润肌肤,止痒中药膏外搽。

[0007] 本发明是这样实现的:一种治疗红皮病型银屑病的药膏,它是由下述重量配比的原料制成:白薇100—150份,石斛100—150份,拳参100—150份,桑叶100—150份,凡士林3000—5000份。

[0008] 具体地,最佳重量配比范围是:白薇10份,石斛10份,拳参10份,桑叶10份,凡士林150份。

[0009] 本发明所述药膏的制备方法是:先将凡士林加热化开,将白薇、石斛、拳参、桑叶,入凡士林中浸泡6天,然后加热将药炸至褐色,温度150—100℃时,捞出药渣,药油待凉凝后即成膏状,分装塑料盒中备用。

[0010] 本发明的用药依据是:白薇,味苦、咸,性寒。含白薇油,其性凉降,可清血热;石斛,味甘,性寒。现代研究,含多量粘液,为滋阴清热常用要药,《本草便读》:“逐皮肤邪热”。临床验之,取其外治,对皮肤有良好滋阴清热润燥作用;拳参,味苦、酸,性微寒。苦能降泄,酸则收敛,寒可清热凉血;桑叶,味苦、甘,性寒。轻清发散,甘寒清润。可清热凉血祛风止痒。《本草经疏》:“甘所以益血,寒所以凉血”。《本草从新》:“滋燥凉血”。凡士林作为基质,加工制成药膏后药效尽在其中。

[0011] 本发明的有益效果是：该药膏治疗红皮病型银屑病，所选药物均是取其新用外治，最大特点是直接涂抹于病变部位，发挥清热凉血，滋阴润肤，祛风止痒良效。据临床观察及患者反应，搽上此药膏后，肌肤均感舒适滋润，并可软化鳞屑，使干燥脱屑性皮炎逐渐得以消退，对皮肤无任何刺激性，且具保护皮肤功效。不用服药，使用方便，与其它外用药物相比，确具一定优越性和实用性。嘱患者治疗期间或愈后一个时期，减少洗澡次数，不食腥辣之物，多食新鲜蔬菜水果，多饮水，以利皮损较快消退。

[0012] 药膏的使用方法：用膏板涂搽皮损处，日2—3次，至皮疹全部消退，干燥痒感消失，皮肤恢复正常。

[0013] 临床疗效观察：临床治疗143例，男92例，女51例，年龄25—74岁，所有病例均符合红皮病型银屑病诊断标准。

[0014] 疗效评定：参照中医红皮病型银屑病诊断疗效标准，痊愈：皮损完全消退。好转：皮损消退50%以上。未愈：皮损消退不足30%。均在治疗30天后进行疗效统计。

[0015] 治疗结果：痊愈127例，好转16例。

具体实施方式

[0016] 下面用具体实施例来说明本发明的技术特征。

实施例1：白薇10g，石斛10g，拳参10g，桑叶10，凡士林150g。

[0017] 该药膏的制备过程是：先将凡士林加热化开，将白薇、石斛、拳参、桑叶，入凡士林中浸泡6天，将药加热炸至淡褐色，温度150—100℃时，捞出药渣，药油待凉凝后即成膏状，分装塑料盒中即可。

[0018] 实施例2：白薇30g，石斛30g，拳参30g，桑叶30g，凡士林900g。

[0019] 实施例3：白薇60g，石斛60g，拳参60g，桑叶60g，凡士林2300g。

[0020] 该药油的制备过程，按上述实施例1的制备工艺加工即可。

[0021] 从实践中对3个实施例方案进行疗效比较，认为实施例1疗效优于实施例2、实施例3，所以实施例1为最佳实施例。