

(i) 機能的 AAV p5 プロモーターに作動可能に関連しておらず；かつ
(iii) 機能的 AAV p40 プロモーターを含まず、かつ、前記機能的アデノウイルス
阻害配列を含まない、
という特徴を有する、請求項 1～3 のいずれか一項に記載のアデノウイルスベクター。

【請求項 5】

前記 Rep 78 ポリペプチドは、野生型 AAV rep 遺伝子の野生型 p5 プロモーター
と作動可能に関連する野生型 Rep 78 ポリペプチドの発現レベルの 10%未満である発
現レベルで発現される、請求項 2 に記載のアデノウイルスベクター。

【請求項 6】

前記 Rep 52 ポリペプチドおよび／または Rep 40 ポリペプチドは発現できない、
請求項 1～5 のいずれか一項に記載のアデノウイルスベクター。

【請求項 7】

前記アデノウイルス阻害配列は転写できない、請求項 1～6 のいずれか一項に記載のア
デノウイルスベクター。

【請求項 8】

宿主細胞における前記アデノウイルス阻害配列の転写が、前記宿主細胞中の野生型アデ
ノウイルスの複製を阻害しないように、前記アデノウイルス阻害配列が修飾される、請求
項 1～7 のいずれか一項に記載のアデノウイルスベクター。

【請求項 9】

前記核酸分子が、アデノウイルス初期遺伝子のうちの一つに位置する、請求項 1～8 の
いずれか一項に記載のアデノウイルスベクター。

【請求項 10】

前記核酸分子が、E4、E2A および E2B 発現カセットと同じ転写方向で、E1 領域
に位置する、請求項 1～9 のいずれか一項に記載のアデノウイルスベクター。

【請求項 11】

前記核酸分子が上流のプロモーターと作動可能に関連しない、請求項 9 または 10 に記
載のアデノウイルスベクター。

【請求項 12】

前記アデノウイルスベクターがさらに AAV cap 遺伝子を含む、請求項 1～11 のい
ずれか一項に記載のアデノウイルスベクター。

【請求項 13】

前記アデノウイルスベクターが、さらに、単純ヘルペスウイルス由来の VP16 転写ア
クチベーターまたは p53 タンパク質由来のトランスアクチベータードメインをコードす
る、請求項 1～12 のいずれか一項に記載のアデノウイルスベクター。

【請求項 14】

前記アデノウイルスベクターが、抑制可能な主要後期プロモーター (MLP) を含む、
請求項 1～13 のいずれか一項に記載のアデノウイルスベクター。

【請求項 15】

(A) 請求項 1～14 のいずれか一項に記載のアデノウイルスベクターである第 1 のア
デノウイルスベクターと、

(B) 第 2 のアデノウイルスベクターであって、

(i) AAV Cap ポリペプチドをコードする核酸分子、および／または

(ii) 組み換え AAV ゲノムをコードする核酸分子、

を含む第 2 のアデノウイルスベクターと、

を含む、キット。

【請求項 16】

前記第 1 のアデノウイルスベクターが、前記第 2 のアデノウイルスベクターに存在する
プロモーターを転写的に活性化することができるポリペプチドを、さらにコードする、請
求項 15 に記載のキット。

【請求項 17】

10

20

30

40

50

AAV粒子を製造するためのプロセスであって、
前記プロセスが、

- (a) 哺乳類宿主細胞に、請求項1～14のいずれか一項に記載のアデノウイルスベクターである第1のアデノウイルスベクターを感染させる工程と、
- (b) 前記宿主細胞に第2のアデノウイルスベクターを感染させる工程であって、前記第2のアデノウイルスベクターが導入遺伝子を含む組み換えAAVゲノムを含み、前記第1のアデノウイルスベクターおよび前記第2のアデノウイルスベクターのうちの少なくとも一つがAAV cap遺伝子を含む、工程と、
- (c) 前記哺乳類宿主細胞を、培地で、導入遺伝子を含むAAV粒子が産生されるような条件下で、培養する工程と、
- (d) AAV粒子を前記宿主細胞または前記細胞培地から単離または精製する工程とを含む、製造するためのプロセス。

【請求項18】

AAV粒子を製造するためのプロセスであって、前記プロセスが、

- (a) 哺乳類宿主細胞に、請求項1～14のいずれか一項に記載のアデノウイルスベクターである第1のアデノウイルスベクターを感染させる工程であって、前記哺乳類宿主細胞は、前記宿主細胞ゲノムに安定的に組み込まれた組み換えAAVゲノムを含み、前記組み換えAAVゲノムは導入遺伝子を含み、
 - (i) 前記アデノウイルスベクターはさらにAAV cap遺伝子を含むか、または
 - (ii) AAV cap遺伝子が前記哺乳類宿主細胞ゲノムに安定的に組み込まれるか、または

(iii) 前記細胞が、AAV cap遺伝子を含む第2のアデノウイルスベクターに感染している、工程と

- (b) 前記哺乳類宿主細胞を、培地で、前記導入遺伝子を含むAAV粒子が産生されるような条件下で、培養する工程と、
- (c) AAV粒子を前記細胞または前記細胞培地から単離または精製する工程と、を含む、製造するためのプロセス。

【請求項19】

組み換えAAV粒子を製造するためのプロセスであって、前記プロセスが、

- (a) 哺乳類宿主細胞に、請求項1～14のいずれか一項に記載のアデノウイルスベクターである第1のアデノウイルスベクターを感染させる工程であって、
 - (i) 前記第1のアデノウイルスベクターはさらにAAV cap遺伝子を含むか、または

(ii) 前記細胞が、AAV cap遺伝子を含む第2のアデノウイルスベクターに感染している、工程と

- (b) 前記哺乳類宿主細胞に導入遺伝子を含む組み換えAAVを感染させる工程と、
- (c) 前記哺乳類宿主細胞を、培地で、前記導入遺伝子を含むAAV粒子が産生されるような条件下で、培養する工程と、
- (d) AAV粒子を前記細胞または前記細胞培地から単離および／または精製する工程と、を含む、製造するためのプロセス。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、少なくとも1つのAAV Repポリペプチドをコードする核酸分子に関し、AAV p5プロモーター、AAV p19プロモーターおよびAAV p40プロモーターの一つ以上がRepポリペプチドの一つ以上の発現を低減もしくは除去するように修飾されるか、前記核酸分子が機能的Rep 52ポリペプチドもしくは機能的Rep 40ポリペプチドをコードしないか、または、前記核酸分子が機能的アデノウイルス阻害配列 (inhibitor sequence) をコードしない。

【0002】

本発明はまた、２－アデノウイルス系を使用することにより組み換えＡＡＶベクターを製造するプロセスに関し、ＡＡＶ複製とパッケージングとに必要な遺伝子のすべて（すなわち、本発明のＡＡＶＲｅｐ配列、ＡＡＶｃａｐ、および、導入遺伝子を含むＡＡＶトランスファベクター）が、二つのアデノウイルス内にコードされてもよい。

【０００３】

アデノ随伴ウイルス（ＡＡＶ）は、パルボウイルス科に属する単鎖ＤＮＡウイルスである。このウイルスは、分裂細胞および非分裂細胞の両方を含む広い範囲の宿主細胞に感染することができる。また、このウイルスは、ほとんどの患者において限定的な免疫応答のみを引き起こす、非病原性ウイルスである。

【０００４】

ここ数年間、ＡＡＶ由来のベクターが、遺伝子送達の非常に有用かつ有望な形態として浮上している。これは、これらのベクターの下記の特性による。

- ＡＡＶは、小さいノンエンベロープウイルスであり、その内在遺伝子は二つのみ（ｒｅｐおよびｃａｐ）である。したがって、様々な遺伝子療法用のベクターを開発するために容易に操作できる。これは、ＡＡＶゲノムのｒｅｐ遺伝子およびｃａｐ遺伝子の除去によって、また、これらの配列を患者に治療効果を提供しうる外因性配列（導入遺伝子）に置き換えることによって、達成される。
- ＡＡＶ粒子は、剪断力、酵素、または溶媒によって容易に分解されない。このことは、これらのウイルスベクターの精製および最終製剤化を容易にする。
- ＡＡＶは非病原性であり、免疫原性が低い。これらのベクターを使用することにより、好ましくない炎症反応のリスクをさらに低減する。レンチウイルス、ヘルペスウイルスおよびアデノウイルスなどの他のウイルスベクターとは違い、ＡＡＶは害がなく、なんらかのヒトの疾患を起こす原因となるとは考えられていない。
- ＡＡＶベクターを使用して、患者に約４５００ｂｐ以下の遺伝子配列を送達することができる。
- 野生型ＡＡＶベクターはヒト染色体１９へ遺伝物質を挿入する時があることが示されている一方で、この特性は、ｒｅｐ遺伝子およびｃａｐ遺伝子をウイルスゲノムから取り除くことにより、ＡＡＶ遺伝子治療ベクターから一般的には除去されている。かかる場合に、前記ウイルスは、宿主細胞内でエピソーム形態のままである。これらエピソームは非分裂細胞中で保全されるが、分裂細胞中では細胞分裂の間に失われる。

【０００５】

天然型ＡＡＶゲノムは、それぞれが複数のオープンリーディングフレーム（ＯＲＦ）をコードする、ｒｅｐ遺伝子とｃａｐ遺伝子との二つの遺伝子を含み、ｒｅｐ遺伝子は、ウイルスゲノムの、ＡＡＶのライフサイクルおよび部位特異的な組み込みに必要な非構造的タンパク質をコードし、ｃａｐ遺伝子は構造カプシドタンパク質をコードする。

【０００６】

また、これらの二つの遺伝子の両側には、ヘアピン構造を構成する能力がある１４５個の塩基からなる末端逆位反復配列（ＩＴＲ）がある。これらのヘアピン配列は、第２のＤＮＡ鎖のプライマーゼ独立性合成と、ウイルスＤＮＡの宿主細胞ゲノムへの組み込みとのために必要である。

【０００７】

ウイルスの組み込み能力を除去するために、組み換えＡＡＶベクターはウイルスゲノムのＤＮＡからｒｅｐおよびｃａｐを除去する。かかるベクターを製造するために、導入遺伝子（単数または複数）の転写を駆動するためのプロモーターとともに、所望の導入遺伝子（単数または複数）が、末端逆位反復配列（ＩＴＲ）の間に挿入され、前記ｒｅｐ遺伝子およびｃａｐ遺伝子が第２のプラスミドにトランスに提供される。アデノウイルスＥ４、Ｅ２ａおよびＶＡ遺伝子などのヘルパー遺伝子も提供される。ｒｅｐ遺伝子、ｃａｐ遺伝子、およびヘルパー遺伝子は、細胞にトランスフェクトされた追加のプラスミド上に提供されてもよい。

【０００８】

従来、AAVベクターの産生は異なる多数の経路から達成されている。

当初、AAVは野生型(WT)アデノウイルス血清型5を用い、rep遺伝子およびcap遺伝子とAAVゲノムとをコードするプラスミドを細胞にトランスフェクトして生成された。これにより、WTアデノウイルスがウイルス複製を容易にする数多くの因子をトランスに提供できるようになった。しかしこの手法には数多くの限界があった。たとえば、AAVの各バッチは純粋な生成物を提供するためには製造後にアデノウイルス(AV)粒子から分離しなければならないが、全てのAd5を確実に除去することは困難である。さらに、製造中に、細胞がAAVよりむしろアデノウイルス粒子の産生に膨大なリソースを充当していることも望ましくない。

【0009】

他の系では、rep遺伝子およびcap遺伝子を発現する安定的なパッケージ細胞株が使用されてきた。かかる系では、前記rep遺伝子およびcap遺伝子は細胞ゲノムに組み込まれ、したがってプラスミドベースのrep遺伝子およびcap遺伝子が不要になる。しかしながら、これらの遺伝子は、通常、その固有の毒性のせいで、組み込まれる頻度が低い(たとえば、細胞あたり1~2コピー)。これらの系はアデノウイルスベクターでの感染を必要とする。

【0010】

さらに最近では、アデノウイルスに基づく系は、AAV産生に必要なアデノウイルスゲノムの部分をコードするプラスミドに置き換えられた。これにより、最終ウイルス製剤に存在するアデノウイルス粒子に関する懸念の一部は解決したが、数多くの問題が残っている。その問題には、製造細胞株のトランスフェクションに十分なプラスミドを予め製造することが必要であることや、トランスフェクションのプロセスそれ自体が本質的に非効率であること、などがある。これらの系の収率も、Ad5に基づく手法と比べて低い。

【0011】

AAV遺伝子(repおよびcap)およびAAVトランスファーベクターをアデノウイルスにコードすることが、過去に広く調査されてきた(Fisher, K.J et al., 1996; Liu, X.L. et al., 1999)。AAVゲノムおよびAAV Cap DNA配列はアデノウイルスのゲノム内に挿入されたときには許容される一方、AAV Repタンパク質およびDNA配列は、アデノウイルスに対し致死性であり、その複製を阻害する。アデノウイルス複製におけるAAV Repの毒性にもかかわらず、AAV Repポリペプチドをコードするアデノウイルスの産生が成功したと報告した論文もいくつかある。しかしながら、これらのアデノウイルスは、産生での低い力価や、ウイルスの複数継代後のrep遺伝子の消失とあいまって、一般的に不安定である(Zhang, H.G et al. 2001; Zhang, X and Li, C-Y, Mol. Ther. 2001)。

【0012】

AAV Repによるアデノウイルスの阻害は、二つの主要なメカニズムにより引き起こされる。第一に、AAV Repタンパク質は、アデノウイルスプロモーター(MLP、E2B、E4を含む)の、潜在的な阻害剤である(Timpe J.M. et al., 2006)。第二に、アデノウイルス阻害配列は、(cap遺伝子の発現を駆動するためのウイルスによって普通は使用されるp40プロモーターの中に位置する)AAV rep DNA中にコードされる。この「阻害的」p40 DNA配列を組み換える(scrambling)ことにより、AAV rep遺伝子がアデノウイルス内に許容できることが、論文に示されている(Sitaraman, V. et al., 2011; Weger, S. et al., J. Virol. 2016)。

【0013】

本発明は、AAV rep遺伝子がアデノウイルスベクターに安定的にコードされることを可能にする工程の組み合わせに基づく。AAV rep遺伝子をアデノウイルスベクターに挿入し維持することが成功したことはこれまでに無かった。特に、一部の実施形態において、AAV rep遺伝子プロモーターp5、p19およびp40はすべて修飾されるか除去されている。p5プロモーターが除去されて、Rep78ポリペプチドおよびRep68ポリペプチドの発現を低減し、したがってその毒性を低減している。p19プロモ-

10

20

30

40

50

ターが除去されて、Rep 52 ポリペプチドおよびRep 40 ポリペプチドの発現を停止し、p 40 プロモーター内のAV 阻害配列が除去されるか修飾され、またはその転写が妨げられている。

【0014】

AV を使用してAAV を製造する際に、遺伝学的に異なる、望ましいAAV のそれぞれのために1つのAV を修飾するだけでよいことが好ましい。しかしながら、rep 遺伝子、cap 遺伝子、およびトランスファーAAV ゲノムを組み合わせた分子のサイズは、E 1 / E 3 欠失AV ベクターのパッケージング能力を超えてしまう。

【0015】

本発明者らは、二つのAV を使用することによって利点が得られることを発見した。遺伝学的に異なるAAV がユニークなカプシドおよびトランスファーAAV ゲノムを含みうるので、本発明の一つの態様は、細胞を二つのAV ベクターに接触させることに関し、二つのAV ベクターの一つは、AAV Rep コーディング配列を含むものであり、もう一つは、Cap コーディング配列およびトランスファーAAV ゲノム配列（後者はAAV 末端逆位反復配列が隣接する配列として定義される）を含むものである。

【0016】

本発明者らは、また、Rep コーディング配列およびAAV ITR 配列が同じAV に存在することが、AV の増殖に有害であると判断した。かかるAV は回収できる一方で、その収量は典型的には、AV が各配列をそれぞれ独立して含む場合の5 ~ 10 倍低い。

【0017】

したがって、本発明の他の態様では、Rep コーディング配列はその発現を駆動するプロモーターを含まず、かつ、その転写方向は、AV ゲノムのE 2 A 転写ユニット、E 2 B 転写ユニット、およびE 4 転写ユニットの転写方向と合致している。これによって、Rep ポリペプチドが、細胞に対する毒性を低減するために低レベル、基準レベルまたは最小レベルで発現されること、および、Rep ポリペプチドが、アデノウイルスパッケージングシグナルエレメントに埋め込まれた強力なE 1 A プロモーターから転写リードスルーを介して、高レベルで転写されないことが確実になる。

【0018】

さらに他の態様では、rep 遺伝子を含む第1のAV が、場合によっては、cap 遺伝子の発現を駆動している第2のAV 中のプロモーターを転写的に活性化させることができるタンパク質をもコードしてもよい。これによって、両方のAV が同じ細胞内に存在する場合にのみcap 遺伝子の転写が誘導され、AV の製造中にAAV cap 遺伝子を発現する負担を軽減する。

【0019】

本発明の目的は、AAV rep 遺伝子を含む核酸分子であって、アデノウイルスベクターへの前記核酸分子の組み込み、および／またはその後の発現による毒性の低減のために、前記rep 遺伝子プロモーターが修飾されるかまたは除去されている核酸分子を提供することである。

【0020】

本発明の他の目的は、本発明の核酸分子を含むアデノウイルスベクター、および本発明の核酸分子を含む宿主細胞を提供することである。

【0021】

本発明の他の目的は、本発明の核酸分子を含む改変された宿主細胞(modified host cell) およびアデノウイルスベクターを製造するプロセス、ならびにAAV を製造するプロセスを提供することである。

【0022】

一実施形態において、本発明は核酸分子を提供し、前記核酸分子のヌクレオチド配列は、少なくとも1つのAAV Rep ポリペプチドをコードし、前記Rep ポリペプチドコーティング配列は下記特徴のうちの二つまたは三つを有する。

(i) 機能的AAV p 5 プロモーターに作動可能に関連していない。

10

20

30

40

50

(i i) 機能的 A A V p 1 9 プロモーターを含まないか、または、機能的 R e p 5 2 ポリペプチドおよび機能的 R e p 4 0 ポリペプチドをコードしない。

(i i i) 機能的 A A V p 4 0 プロモーターを含まないか、または、機能的アデノウイルス阻害配列を含まない。

【0023】

好ましくは、前記ヌクレオチド配列は機能的 A A V R e p 7 8 ポリペプチドおよび機能的 A A V R e p 6 8 ポリペプチドをコードする。好ましくは、前記核酸分子は、作動可能に関連 (operably-associated) するプロモーターの非存在下で、機能的 A A V R e p 5 2 ポリペプチドまたは機能的 A A V R e p 4 0 ポリペプチドを発現することができない。

【0024】

本発明の核酸分子は、DNA または RNA であってもよい。それは、一本鎖または二本鎖であってもよい。

【0025】

本明細書において、「r e p 遺伝子」という用語は、1つ以上のオープンリーディングフレーム (ORF) をコードする遺伝子のことをいい、前記 ORF の各々は A A V R e p 非構造タンパク質またはその変異体もしくは誘導体をコードする。これらの A A V R e p 非構造タンパク質 (またはその変異体もしくは誘導体) は、A A V ゲノムコピーおよび／または A A V ゲノムパッケージングに参与している。

【0026】

野生型 r e p 遺伝子は、p 5、p 1 9 および p 4 0 の3つのプロモーターを含む。異なる長さの、二つの重複するメッセンジャーリボ核酸 (mRNA) は、p 5 から、および p 1 9 から、産生することができる。これらの mRNA の各々は、1つのスプライスドナー部位と2つの異なるスプライスアクセプター部位とを使用し、スプライスアウトできるイントロンを含むか、またはスプライスアウトできないイントロンを含む。。このように、6つの異なる mRNA が形成でき、そのうち4つのみが機能的である。前記イントロンを除去していない二つの mRNA (p 5 から転写されたものと、p 1 9 から転写されたもの) は、共通ターミネーター配列まで読み取られ、かつ R e p 7 8 および R e p 5 2 をそれぞれコードする。前記イントロンの除去、および前記 5' モストスプライスアクセプター部位 (5'-most splice acceptor site) の使用は、なんらかの機能的な R e p タンパク質の産生をもたらすわけではない—前記配列の残りのフレームがシフトするから正しい R e p 6 8 タンパク質または R e p 4 0 タンパク質を産生できず、R e p 7 8 または R e p 5 2 のターミネーターがスプライスアウトされるのでそれらの正しい C 末端を産生することもないだろう。逆に、前記イントロンの除去、および前記 3' スプライスアクセプターの使用は、R e p 6 8 および R e p 4 0 の正しい C 末端を産生し、R e p 7 8 および R e p 5 2 のターミネーターをスプライスアウトすることになるだろう。したがって、前記機能的スプライシングのみとすることは、イントロンをまとめてスプライスアウトすることを回避する (R e p 7 8 および R e p 5 2 を産生する) か、または、前記 3' スプライスアクセプターを使用する (R e p 6 8 および R e p 4 0 を産生する) かのどちらかになる。その結果、重複した配列を持つ4つの異なる機能的 R e p タンパク質が、これらのプロモーターから合成できる。

【0027】

野生型 r e p 遺伝子では、前記 p 4 0 プロモーターは3'末端に位置する。C a p タンパク質 (V P 1、V P 2、および V P 3) の転写は、野生型 A A V ゲノムでは、このプロモーターから開始される。

【0028】

前記4つの野生型 R e p タンパク質は、R e p 7 8、R e p 6 8、R e p 5 2、および R e p 4 0 である。したがって、前記野生型 r e p 遺伝子は、前記4つの R e p タンパク質 R e p 7 8、R e p 6 8、R e p 5 2 および R e p 4 0 をコードする遺伝子である。

【0029】

10

20

30

40

50

本明細書において、「rep 遺伝子」という用語は、野生型 rep 遺伝子およびその誘導体、ならびに、同等の機能を有する人工の rep 遺伝子を含む。前記野生型 rep 遺伝子は、機能的 Rep 78 ポリペプチド、機能的 Rep 68 ポリペプチド、機能的 Rep 52 ポリペプチド、および機能的 Rep 40 ポリペプチドをコードする。

【0030】

特に好ましい実施形態において、前記ヌクレオチド配列は機能的 Rep 78 ポリペプチドおよび機能的 Rep 68 ポリペプチドをコードする。

【0031】

本明細書において、Rep 78 ポリペプチドという用語は、配列番号 22 のポリペプチドのことをいうか、またはその変異体であって、配列番号 22 のポリペプチドに対する配列同一性が少なくとも 80%、85%、90%、95% または 99% であり、かつ機能的 Rep 78 ポリペプチドをコードする変異体のことをいう。本明細書において、Rep 68 ポリペプチドという用語は、配列番号 23 のポリペプチドのことをいうか、またはその変異体であって、配列番号 23 のポリペプチドに対する配列同一性が少なくとも 80%、85%、90%、95% または 99% であり、かつ機能的 Rep 68 ポリペプチドをコードする変異体のことをいう。

【0032】

AAV の産生において、十分な機能的 Rep ポリペプチドの非存在下で、低い力価（たとえばゲノムコピー）が観察される（qPCR により測定できる）。これは、パッケージされる ITR プラスミドがほとんど無く、効果的にパッケージされないという事実のためである。また、誇張された不完全体／完全体粒子比率（exaggerated empty:full particle ratio）を観察してもよい。これは ELISA や光学密度測定によって測定できる。

【0033】

前記 Rep 78 ポリペプチド／Rep 68 ポリペプチドは、ATP と結合し、かつ、ヘリカーゼ活性を有し、かつ、一本鎖のゲノム前駆体の蓄積の支援および予め形成された AAV カプシドへの新たに形成された DNA 鎖のパッケージの支援に関与してもよい。

【0034】

Rep 78 ポリペプチド変異体または Rep 68 ポリペプチド変異体が発現しているかどうかをウエスタンブロットで判定し、これらのポリペプチドが正しい分子量で産生されているかを判定することが可能である。

【0035】

これらのポリペプチドの機能は、その精製された形態で、ATP の消費を判定する生物発光 ATP アッセイを使用して判定してもよい。Rep 78 および Rep 68 はどちらもヘリカーゼ活性を有するので、適切なヘリカーゼアッセイも使用してもよい。

【0036】

生物発光 ATP アッセイにおいて、野生型 Rep 78 ポリペプチド（たとえば、配列番号 22 のもの）の ATP 消費のレベルの少なくとも 80%（好ましくは少なくとも 90%）のレベルの ATP 消費を有する試験 Rep 78 ポリペプチドは、機能的 Rep 78 ポリペプチドであるとみなすことができる。

【0037】

生物発光 ATP アッセイにおいて、野生型 Rep 68 ポリペプチド（たとえば、配列番号 23 のもの）の ATP 消費のレベルの少なくとも 80%（好ましくは少なくとも 90%）のレベルの ATP 消費を有する試験 Rep 68 ポリペプチドは、機能的 Rep 68 ポリペプチドであるとみなすことができる。

【0038】

野生型 Rep 78 ポリペプチド（たとえば、配列番号 22 のもの）のヘリカーゼ活性レベルの少なくとも 80%（好ましくは少なくとも 90%）のレベルのヘリカーゼ活性を有する試験 Rep 78 ポリペプチドは、機能的 Rep 78 ポリペプチドであるとみなすことができる。

【0039】

野生型 Rep 68 ポリペプチド（たとえば、配列番号 23 のもの）のヘリカーゼ活性レベルの少なくとも 80%（好ましくは少なくとも 90%）のレベルのヘリカーゼ活性を有する試験 Rep 68 ポリペプチドは、機能的 Rep 68 ポリペプチドであるとみなすことができる。

【0040】

前記野生型 AAV（血清型 2）rep 遺伝子ヌクレオチド配列は、配列番号 1 に記載されている。

【0041】

一実施形態において、前記「rep 遺伝子」または Rep ポリペプチドコーディング配列は、配列番号 1 に対する配列同一性が少なくとも 70%、80%、85%、90%、95%、99% または 100% であるヌクレオチド配列であって、Rep 78 ポリペプチド、Rep 68 ポリペプチド、Rep 52 ポリペプチドおよび Rep 40 ポリペプチドの一つ以上をコードし、好ましくは、機能的 Rep 78 ポリペプチドおよび機能的 Rep 68 ポリペプチドをコードするヌクレオチド配列のことをいう。

【0042】

前記 Rep 52 ヌクレオチド配列および Rep 40 ヌクレオチド配列は、本明細書において配列番号 16 および 17 に記載されている。前記 Rep 78 ヌクレオチド配列および Rep 68 ヌクレオチド配列は、本明細書において配列番号 20 および 21 に記載されている。

【0043】

本明細書において、「cap 遺伝子」という用語は、1 つ以上のオープンリーディングフレーム（ORF）をコードする遺伝子のことをいい、前記 ORF の各々は AAV Cap 構造タンパク質またはその変異体もしくは誘導体をコードする。これら AAV Cap 構造タンパク質（またはその変異体もしくは誘導体）は、AAV カプシドを形成する。

【0044】

前記 3 つの Cap タンパク質は、好適な細胞に感染することができる感染 AAV ウイルス粒子の産生を可能にするよう機能しなければならない。前記 3 つの Cap タンパク質は、VP1、VP2、および VP3 であり、これらのサイズは、一般的にはそれぞれ 87 kDa、72 kDa、および 62 kDa である。したがって、前記 cap 遺伝子は、3 つの Cap タンパク質 VP1、VP2 および VP3 をコードする遺伝子である。

【0045】

野生型 AAV において、これらの 3 つのタンパク質は p40 プロモーターから翻訳され、1 つの mRNA を形成する。この mRNA が合成されたのちに、長いイントロンまたは短いイントロンを切り取ることができ、その結果 2.3 kb または 2.6 kb の mRNA を形成する。

【0046】

前記 AAV カプシドは、60 のカプシドタンパク質サブユニット（VP1、VP2、および VP3）で構成され、前記サブユニットは、1:1:10 の比率の正二十面体対称で配置され、3.9 MDa の推定サイズを有する。

【0047】

本明細書において、「cap 遺伝子」という用語は、野生型 cap 遺伝子およびその誘導体、ならびに、同等の機能を有する人工の cap 遺伝子を含む。前記 AAV（血清型 2）cap 遺伝子ヌクレオチド配列および Cap ポリペプチド配列は、それぞれ、配列番号 2 および 3 に記載されている。本明細書において、「cap 遺伝子」という用語は、好ましくは、配列番号 2 に記載の配列を有するヌクレオチド配列、または配列番号 3 のポリペプチドをコードするヌクレオチド配列のことをいうか、または配列番号 2 に対する配列同一性が少なくとも 70%、80%、85%、90%、95% または 99%、もしくは配列番号 3 のポリペプチドをコードするヌクレオチド配列に対するヌクレオチド配列同一性が少なくとも 80%、90%、95% または 99% であり、VP1、VP2 および VP3 ポリペプチドをコードするヌクレオチド配列のことをいう。

【0048】

前記 rep 遺伝子および cap 遺伝子は、好ましくはウイルス遺伝子であるか、またはウイルス遺伝子から由来する。より好ましくは、それらは AAV 遺伝子であるか、または AAV 遺伝子から由来する。一部の実施形態において、前記 AAV は、アデノ随伴デンドパルボウイルス A である。他の実施形態において、前記 AAV は、アデノ随伴デンドパルボウイルス B である。

【0049】

11 の異なる AAV 血清型が公知である。前記公知の血清型はすべて、多様な組織タイプの細胞に感染することができる。組織特異性は、カプシド血清型によって決定される。前記 AAV は、血清型 1、血清型 2、血清型 3、血清型 4、血清型 5、血清型 6、血清型 7、血清型 8、血清型 9、血清型 10、または血清型 11 由来であってもよい。好ましくは、前記 AAV は、血清型 1、血清型 2、血清型 5、血清型 6、血清型 7、血清型 8、または血清型 9 であってもよい。最も好ましくは、前記 AAV 血清型は 5 である（すなわち、AAV5）。

【0050】

前記 rep 遺伝子および cap 遺伝子（および、その中のタンパク質コーディング ORF の各々）は、1 つ以上の異なるウイルス（たとえば、2 つ、3 つ、または 4 つの異なるウイルス）由来であってもよい。たとえば、前記 rep 遺伝子が AAV2 由来であってもよく、一方で前記 cap 遺伝子が AAV5 由来であってもよい。

【0051】

AAV の rep 遺伝子および cap 遺伝子が系統や分離株によって異なることは、当業者に認識されている。かかる系統や分離株のすべてから由来するこれら遺伝子の配列が本明細書において含まれ、またそれらの誘導体も含まれる。

【0052】

本明細書において、「組み換え AAV ゲノム」という用語は、AAV 末端逆位反復配列（ITR）に隣接する導入遺伝子を（rep 遺伝子および cap 遺伝子の代わりに）含む AAV ゲノムのことをいう。本明細書において、「AAV ゲノム」、「AAV トランスファベクター」、および「トランスファプラスミド」という用語は、本明細書において交換可能に使用される。それらはすべて、導入遺伝子に隣接する 5'-および 3'-ウイリス性（好ましくは AAV）末端逆位反復配列（ITR）を含むベクターのことをいう。

【0053】

前記導入遺伝子はコーディング配列であっても、非コーディング配列であってもよく、ゲノム DNA であっても cDNA であってもよい。好ましくは、前記導入遺伝子は、ポリペプチドまたはその断片をコードする。

好ましくは、導入遺伝子は 1 つ以上の転写制御エレメントおよび／または翻訳制御エレメント（たとえば、エンハンサー配列、プロモーター配列、ターミネーター配列など）と作動可能に関連する。

【0054】

一部の実施形態において、前記導入遺伝子は、治療ポリペプチドまたはその断片をコードする。好ましい治療ポリペプチドの例は、抗体、CAR-T 分子、scFV、BiTE、DARPin および T 細胞受容体を含む。

【0055】

一部の実施形態においては、治療ポリペプチドは DRD1 などの G タンパク質共役受容体（GPCR）である。一部の実施形態においては、治療ポリペプチドは、免疫療法ターゲット、たとえば CD19、CD40 または CD38 などである。一部の実施形態においては、治療ポリペプチドは、ヒトの視覚または網膜機能に関与する遺伝子の機能的コピー、たとえば RPE65 または REP などの機能的コピーである。一部の実施形態においては、治療ポリペプチドは、ヒトの血液生成に関与する遺伝子の機能的コピーであるか、または第 IX 因子などの血液成分であるか、または β または α サラセミアまたは鎌形赤血球貧血に関与するものである。一部の実施形態においては、治療ポリペプチドは、重症複合

10

20

30

40

50

免疫不全（SCID）またはアデノシンデアミナーゼ欠損症（ADA-SCID）におけるものなどの免疫機能に関与する遺伝子の機能的コピーである。一部の実施形態においては、治療ポリペプチドは、細胞、たとえば増殖因子受容体の増殖を増加／減少させるタンパク質である。一部の実施形態においては、治療ポリペプチドはイオンチャネルポリペプチドである。

【0056】

一部の実施形態においては、治療ポリペプチドは免疫チェックポイント分子である。好ましくは、免疫チェックポイント分子は腫瘍壊死因子（TNF）受容体スーパーファミリーメンバー（たとえば、CD27、CD40、OX40、GITRまたはCD137など）またはB7-CD28スーパーファミリーメンバー（たとえば、CD28、CTLA4またはICOSなど）である。好ましくは、免疫チェックポイント分子は、PD1、PDL1、CTLA4、Lag1、またはGITRである。

【0057】

一部の好ましい実施形態においては、導入遺伝子は、CRISPR酵素（たとえば、Cas9、dCas9、Cpf1、またはその変異体もしくは誘導体）またはCRISPRsgRNAをコードする。

【0058】

野生型AAV p5プロモーターは、Rep78ポリペプチドおよびRep68ポリペプチドの発現を促進する。前記p5プロモーターは、前記野生型rep遺伝子の5'末端に位置する。

【0059】

野生型AAV2 p5プロモーターは、配列番号4に記載のヌクレオチド配列を有する。コア配列はボールドで強調表示されている。

【0060】

本明細書において、「機能的p5プロモーター」という用語は、配列番号4のヌクレオチド配列からなるかもしくはそれを含むヌクレオチド配列、あるいは、その変異体であって配列番号4に対する配列同一性が少なくとも80%、85%、90%、95%または99%である変異体からなるかもしくはそれを含み、かつ一つ以上のAAV Repポリペプチドをコードする、好ましくはRep78ポリペプチドおよびRep68ポリペプチドをコードする作動可能に関連するヌクレオチド分子の転写を促進することができるヌクレオチド配列のことをいう。

【0061】

p5プロモーターの活性レベルは、試験p5プロモーター配列を好適な導入遺伝子と作動可能に関連付けし、そして前記導入遺伝子の発現レベルについて解析することにより判定されてもよい。

【0062】

野生型p5プロモーター（同じ導入遺伝子と作動可能に関連付けられた場合）の発現レベルの5%未満（好ましくは1%未満）である発現レベルは、機能的ではないとみなされてもよい。

【0063】

一部の実施形態において、本発明の核酸分子において、（i）前記Repポリペプチドコーディング配列は、機能的AAV p5プロモーターに作動可能に関連していない。好ましくは、このヌクレオチド配列は、前記Repポリペプチドコーディング配列の上流（5'）に位置し、より好ましくは前記Repポリペプチドコーディング配列のすぐ上流に位置する（すなわち、Repポリペプチドコーディング配列の5'末端に連続して連結している）。このようにして、Rep78ポリペプチドおよびRep68ポリペプチドの発現が低減され、したがってこれらのポリペプチドのアデノウイルスに対する毒性が低減される。

【0064】

作動可能に関連するプロモーターの非存在下で、前記Rep78ポリペプチドおよび／またはRep68ポリペプチドは、低レベル、ベースラインレベルまたは最小限レベルで

10

20

30

40

50

のみ、本発明の核酸分子から発現できる。

【0065】

たとえば、野生型 AAV p5 プロモーター配列（たとえば、配列番号 4）は、前記コア領域（上記強調表示されている）における変異の存在により非機能的にされてもよく、または、プロモーターの TATA エLEMENT における変異を有していてもよく、それによって TATA ELEMENT は TATA 結合タンパク質および／または転写開始に必要である他の転写因子によって結合されることができない。

【0066】

したがって、一実施形態において、前記 Rep ポリペプチドコーディング配列は、コア領域および／または TATA ELEMENT に 1 つ以上の変異を有する AAV p5 プロモーターと作動可能に関連する。好ましくは、これらの変異は、AAV p5 プロモーターのプロモーター活性を、配列番号 4 のプロモーターと比較して低減し、最も好ましくは、低減してそれを非機能的（上記に定義されたように）にする。

【0067】

一部の好ましい実施形態において、前記 Rep ポリペプチドコーディング配列は、配列番号 4 に対する配列同一性が少なくとも 80%、85%、90%、95% または 99% である配列番号 4 のヌクレオチド配列の変異体からなるかまたはそれを含むヌクレオチド配列と作動可能に関連し、ここで、前記変異体が導入遺伝子と作動可能に関連している場合、当該導入遺伝子の発現レベルは、配列番号 4 の配列を有するプロモーターが当該導入遺伝子と作動可能に関連付けられている場合の発現レベルの 5% 未満（好ましくは 1% 未満）である。

【0068】

他の実施形態において、前記 Rep ポリペプチドコーディング配列は、機能的または非機能的 AAV p5 プロモーターに作動可能に関連していない。

【0069】

この実施形態において、前記 Rep ポリペプチドコーディング配列は、配列番号 4 に対する配列同一性が少なくとも 99%、95%、90% または 85% 未満であるヌクレオチド配列と作動可能に関連していてもよく、好ましくはプロモーター活性が全く無いかまたは本質的に無い前記ヌクレオチド配列と作動可能に関連していてもよい。

【0070】

一部の実施形態において、前記 Rep ポリペプチドコーディング配列は、IRES ELEMENT に作動可能に関連していない。一部の実施形態において、前記 p5 プロモーターは IRES に置換されない。

本発明のこの態様の一部の実施形態において、前記 Rep ポリペプチドコーディング配列は、配列番号 5（ヒト β グロブリン遺伝子の 5' 非翻訳領域（UTR）の部分）を形成する配列）と作動可能に関連している。

【0071】

野生型 AAV p19 プロモーターは、Rep52 ポリペプチドおよび Rep40 ポリペプチドの発現を促進する。p19 プロモーターは、前記野生型 rep 遺伝子内に位置する。

【0072】

野生型 AAV2 p19 プロモーターは、配列番号 6 に記載のヌクレオチド配列を有する。強調表示された部分は、TATA ボックスおよび TSS ELEMENT である。

【0073】

本明細書において、「機能的 p19 プロモーター」という用語は、配列番号 6 のヌクレオチド配列からなるかもしくはそれを含むヌクレオチド配列、あるいは、その変異体であって配列番号 6 に対する配列同一性が少なくとも 80%、85%、90%、95% または 99% である変異体からなるかもしくはそれを含み、かつ一つ以上の AAV Rep ポリペプチドをコードする、好ましくは Rep52 ポリペプチドおよび Rep40 ポリペプチドをコードする作動可能に関連するヌクレオチド分子の転写を促進することができるヌクレオチド配列のことをいう。

【0074】

p19プロモーターの活性レベルは、試験p19プロモーター配列を好適な導入遺伝子に作動可能に関連付けし、そして前記導入遺伝子の発現レベルについて解析することにより判定されてもよい。野生型p19プロモーター（同じ導入遺伝子に作動可能に関連付けられた場合）の発現レベルの5%未満（好ましくは1%未満）の発現レベルは、機能的ではないとみなされてもよい。

【0075】

一部の実施形態において、本発明の核酸分子において、(ii)前記Repポリペプチドコーディング配列は、機能的AAV p19プロモーターを含んでいない。作動可能に関連するプロモーターの非存在下で、前記Rep52ポリペプチドおよび／またはRep40ポリペプチドは、本発明の核酸分子から発現できない。このようにして、Rep52ポリペプチドおよび／またはRep40ポリペプチドの発現が防止または阻害される。これらのポリペプチドは、組み換えAAV粒子の産生に必須ではないが、アデノウイルス産生を阻害することができる。その結果、Rep52ポリペプチドおよび／またはRep40ポリペプチドの発現の防止または阻害により、アデノウイルスが本発明の核酸分子を含む系においてアデノウイルスの産生を増加させる。

【0076】

たとえば、野生型AAV p19プロモーター配列（たとえば、配列番号6）は、前記TSSエレメントにおける変異の存在により非機能的にされていてもよいし、または、プロモーターのTATAエレメントにおける変異を有していてもよく、それによってTATAエレメントは、TATA結合タンパク質および／または転写開始に必要である他の転写因子によって結合されることができない。

【0077】

したがって、一実施形態において、前記Repポリペプチドコーディング配列は、TSSエレメントおよび／またはTATAエレメントに1つ以上の変異を有するAAV p19プロモーターと作動可能に関連する。好ましくは、これらの変異は、AAV p19プロモーターのプロモーター活性を、配列番号6のプロモーターと比較して低減し、最も好ましくは、低減してそれを非機能的（上記に定義されたように）にする。

【0078】

一部の実施形態において、前記AAV p19プロモーターは、TATAボックスの一部またはすべてを含む欠失を有する。より好ましくは、前記Repポリペプチドコーディング配列はp19プロモーターを有し、TATAボックスのヌクレオチドの1つ以上（たとえば1つ、2つ、3つ、または4つ）を代替りのヌクレオチドと置換することによって、たとえばTATA配列をTTTTに変換することにより、TATAボックスが切除され（ablated）ている。好ましくは、前記変更は同義変異であるか、または前記変更はコーディング配列のフレームを保存している。これら実施形態において、前記p19プロモーターは機能的であってもよく、非機能的であってもよい。

【0079】

非機能的p19配列の一例が、配列番号7に記載されている。強調表示された配列は、前記プロモーターを非機能的にする、変異したTATAボックスエレメントである。

【0080】

一部の好ましい実施形態において、前記Repポリペプチドコーディング配列は、配列番号6に対する配列同一性が少なくとも80%、85%、90%、95%または99%である配列番号6のヌクレオチド配列の変異体からなるかまたはそれを含むヌクレオチド配列と作動可能に関連し、ここで、前記変異体が導入遺伝子と作動可能に関連している場合、前記導入遺伝子の発現レベルは、配列番号6の配列を有するプロモーターが導入遺伝子と作動可能に関連付けられている場合の発現レベルの5%未満（好ましくは1%未満）である。

【0081】

他の実施形態において、前記Repコーディングポリペプチド配列は、機能的AAV p

10

20

30

40

50

19プロモーターをコードするが、機能的Rep52ポリペプチドおよび／または機能的Rep40ポリペプチドをコードしない。

好ましくは、前記Rep78ポリペプチド／Rep68ポリペプチドの活性は、有意な影響を受けることはない。

【0082】

たとえば、Rep52ポリペプチド／Rep40ポリペプチドの開始コドンは、これらのポリペプチドの発現を排除するよう変異してもよい。一例において、前記開始コドン（メチオニン）をコードするヌクレオチド配列が変異してもよく、好ましくは、前記Rep78ポリペプチド／Rep68ポリペプチドの発現に有意な影響を及ぼすことなく変異してもよい。

【0083】

非機能的Rep52配列の例としては、配列番号16のヌクレオチド配列の変異体または配列番号18のアミノ酸配列をコードするヌクレオチド配列の変異体からなるヌクレオチド配列または該変異体を含むヌクレオチド配列であって、それに対する配列同一性が少なくとも80%、85%、90%、95%または99%であり、かつ機能的Rep52ポリペプチド配列をコードしないヌクレオチド配列がある。

【0084】

非機能的Rep40配列の例としては、配列番号17のヌクレオチド配列の変異体または配列番号19のアミノ酸配列をコードするヌクレオチド配列の変異体からなるヌクレオチド配列または該変異体を含むヌクレオチド配列であって、それに対する配列同一性が少なくとも80%、85%、90%、95%または99%であり、かつ機能的Rep40ポリペプチド配列をコードしないヌクレオチド配列がある。

【0085】

前記Rep52ポリペプチド／Rep40ポリペプチドは、ATPと結合し、かつヘリカーゼ活性を有し、かつ一本鎖のゲノム前駆体の蓄積の支援、および予め形成されたAAVカプシドへの新たに形成されたDNA鎖のパッケージの支援に関与してもよい。これらはRep78やRep68とは異なり、AAVの産生用のための使い捨て（disposable）であるとみなされることがよくある。

【0086】

Rep52ポリペプチド変異体またはRep40ポリペプチド変異体が発現しているかどうかをウエスタンブロットで判定し、これらのポリペプチドが正しい分子量で産生されているかを判定することが可能である。これらのポリペプチドの機能は、その精製された形態で、ATPの消費を判定する生物発光ATPアッセイを使用して判定してもよい。Rep52およびRep40はどちらもヘリカーゼ活性を有するので、適切なヘリカーゼアッセイも使用してもよい。

【0087】

野生型Rep52ポリペプチド（たとえば、配列番号18のもの）のヘリカーゼ活性レベルの5%未満（好ましくは1%未満）のレベルのヘリカーゼ活性を有する試験Rep52ポリペプチドは、非機能的Rep52ポリペプチドであると考えてよい。

【0088】

野生型Rep40ポリペプチド（たとえば、配列番号19のもの）のヘリカーゼ活性レベルの5%未満（好ましくは1%未満）のレベルのヘリカーゼ活性を有する試験Rep40ポリペプチドは、非機能的Rep40ポリペプチドであると考えてよい。

【0089】

野生型AAVp40プロモーターは、AAVCapポリペプチドの発現を促進する。p40プロモーターは、前記野生型AAVrep遺伝子の3'末端の近くに位置する。

【0090】

野生型AAV2p40プロモーターは、配列番号8に記載のヌクレオチド配列を有する。強調表示されたエレメントは、TATAエレメントである。

【0091】

10

20

30

40

50

本明細書において、「機能的 p 4 0 プロモーター」という用語は、配列番号 8 のヌクレオチド配列からなるかもしくはそれを含むヌクレオチド配列、あるいは、その変異体であって配列番号 8 に対する配列同一性が少なくとも 8 0 %、8 5 %、9 0 %、9 5 %または 9 9 %である変異体からなるかもしくはそれを含み、かつ、1 つ以上の A A V R e p ポリペプチドをコードする、好ましくは 1 つ以上の A A V C a p ポリペプチドをコードする作動可能に関連するヌクレオチド分子の転写を促進することができるヌクレオチド配列のことをいう。

【0092】

p 4 0 プロモーターの活性レベルは、試験 p 4 0 プロモーター配列を好適な導入遺伝子に作動可能に関連付け、前記導入遺伝子の発現レベルについて解析することにより判定されてもよい。野生型 p 4 0 プロモーター（同じ導入遺伝子に作動可能に関連付けられた場合）の発現レベルの 5 %未満（好ましくは 1 %未満）の発現レベルは、機能的ではないとみなされてもよい。

10

【0093】

一部の実施形態において、本発明の核酸分子において、(i i) 前記 R e p ポリペプチドコーディング配列は、機能的 A A V p 4 0 プロモーターを含んでいない。このように、アデノウイルス阻害配列は転写されない。

【0094】

たとえば、野生型 A A V p 4 0 プロモーター配列（たとえば、配列番号 8）は、プロモーターの T A T A エLEMENTにおける変異の存在により非機能的にされていてもよく、それによって T A T A エLEMENTは T A T A 結合タンパク質および／または転写開始に必要な他の転写因子によって結合されることができない。

20

【0095】

したがって、一実施形態において、前記 R e p ポリペプチドコーディング配列は、T A T A エLEMENTに 1 つ以上の変異を有する A A V p 4 0 プロモーターと作動可能に関連する。好ましくは、これらの変異は、A A V p 4 0 プロモーターのプロモーター活性を、配列番号 8 のプロモーターと比較して低減し、最も好ましくは、低減してそれを非機能的（上記に定義されたように）にする。

【0096】

一部の好ましい実施形態において、前記 R e p ポリペプチドコーディング配列は、配列番号 8 に対する配列同一性が少なくとも 8 0 %、8 5 %、9 0 %、9 5 %または 9 9 %である配列番号 8 のヌクレオチド配列の変異体からなるかまたはそれを含むヌクレオチド配列と作動可能に関連し、ここで、前記変異体が導入遺伝子と作動可能に関連している場合、当該導入遺伝子の発現レベルは、配列番号 8 の配列を有するプロモーターが当該導入遺伝子と作動可能に関連付けられている場合の発現レベルの 5 %未満（好ましくは 1 %未満）である。

30

【0097】

他の実施形態において、前記 R e p ポリペプチドコーディング配列は、機能的または非機能的 A A V p 4 0 プロモーターに作動可能に関連していない。この実施形態において、前記 R e p ポリペプチドコーディング配列は、配列番号 8 に対する配列同一性が少なくとも 9 9 %、9 5 %、9 0 %または 8 5 %未満であるヌクレオチド配列であって、好ましくはプロモーター活性が全く無い本質的に無いヌクレオチド配列と作動可能に関連していてもよい。

40

【0098】

好ましい非機能的 p 4 0 プロモーター配列が、配列番号 9 に記載されている。この配列において、T A T A ボックスELEMENT、転写開始部位および転写因子結合部位が変異し、その一方で、R e p 7 8 ポリペプチドコーディング配列および R e p 6 8 ポリペプチドコーディング配列は維持されている。

【0099】

野生型 A A V p 4 0 プロモーター配列は、アデノウイルス阻害配列を含む。本明細書に

50

において、「機能的アデノウイルス阻害配列 (inhibitor sequence)」という用語は、アデノウイルスゲノムのシスに存在する場合に、そのアデノウイルスの複製を著しく阻害するヌクレオチド配列のことをいう。野生型 AAV2 アデノウイルス阻害配列は、配列番号 10 の配列を有する。この配列は、前記 p40 プロモーターおよびアデノウイルス阻害配列を形成する。前記 TATA エlement および転写開始部位は、阻害配列のコアを形成する。

【0100】

好ましくは、機能的アデノウイルス阻害配列は、配列番号 10 に示される配列を有するもの、または、配列番号 10 に対する配列同一性が少なくとも 80%、85%、90% または 95% であり、かつ、宿主細胞中でアデノウイルスベクターの複製を阻害することができる変異体として、定義される。

10

【0101】

アデノウイルス阻害配列の活性レベルは、分子クローニングによってアデノウイルス阻害配列を (シスまたはトランスに) AV ベクターの配列に含め、その後前記 AV を哺乳類細胞中に回収しようとするることにより、判定してもよい。野生型アデノウイルス阻害配列を AV に挿入することにより、いかなる AV ベクターの回収や増殖 (outgrowth) をも完全に防止するであろう。アデノウイルス阻害配列の配列修飾により、AV ベクターを回収できるかもしれないが、その成功の度合いはまちまちである。これは回収された AV の感染力価を測定することにより算出でき、阻害のレベルを判定する。AV 力価を測定するために使用できるアッセイには、TCID₅₀ 法や、プラークアッセイ法などがある。

20

【0102】

野生型アデノウイルス阻害配列の活性レベルの 5% 未満 (好ましくは 1% 未満) の活性レベル (同じ条件下で) は、機能的ではないとみなされてもよい。

【0103】

野生型 AAV rep 遺伝子は、アデノウイルス阻害配列を含む p40 プロモーター配列を含む。

【0104】

一部の実施形態において、本発明の核酸分子において、(iii) 前記 Rep ポリペプチドコーディング配列は、機能的アデノウイルス阻害剤配列を含んでいない。

【0105】

たとえば、アデノウイルス阻害配列が Rep ポリペプチドコーディング配列から除去されてもよく、またはアデノウイルス阻害配列が (たとえば、アデノウイルス阻害配列に 1 つ以上の変異をつくることにより) 非機能的にされてもよい。

30

【0106】

宿主細胞においてアデノウイルス阻害配列の転写が宿主細胞中の野生型アデノウイルスの複製を著しく阻害しないように、前記アデノウイルス阻害配列が修飾されていてもよい。

【0107】

好ましくは、Rep ポリペプチドコーディング配列は機能的 Rep78 ポリペプチドおよび機能的 Rep68 ポリペプチドをコードし、すなわち、アデノウイルス阻害配列の除去、またはアデノウイルス阻害配列を非機能的にすることは、Rep78 ポリペプチドおよび Rep68 ポリペプチドのアミノ酸コーディング配列に影響しない。

40

【0108】

好ましくは、同義コドン交換により、p40 プロモーター内の AV 阻害配列を除去し、Rep コーディングアミノ酸を維持する。これにより、AV 遺伝子の阻害が低減される。

【0109】

一部の実施形態において、Rep52 ポリペプチドおよび／または Rep40 ポリペプチドのための正しいコーディング配列を保持する必要が無い。

【0110】

一実施形態において、前記 Rep ポリペプチドコーディング配列は、機能的 p40 プロモーター配列を含み、すなわち、アデノウイルス阻害配列の除去、またはアデノウイルス

50

阻害配列を非機能的にすることは、p 4 0 プロモーターの機能に影響せず、p 4 0 プロモーターの機能を著しく低減せず、または完全に除去したりしない。

【0 1 1 1】

他の実施形態において、前記 R e p ポリペプチドコーディング配列は、機能的 p 4 0 プロモーター配列を含まず、すなわち、アデノウイルス阻害配列の除去、またはアデノウイルス阻害配列を非機能的にすることは、p 4 0 プロモーターの機能を完全に除去する。

【0 1 1 2】

好ましくは、機能的 p 4 0 プロモーター配列を有していないヌクレオチド配列は、配列番号 1 1 に記載の配列を有する。配列番号 1 1 において、同義コドン交換により、p 4 0 プロモーター内の A V 阻害配列を除去して、R e p コーディングアミノ酸を維持し、A V 遺伝子の阻害を低減する。

10

【0 1 1 3】

一部の実施形態において、本発明の核酸分子は、A A V R e p ポリペプチドコーディング配列と作動可能に関連する異種プロモーターを含んでいない。

【0 1 1 4】

他の実施形態において、本発明の核酸分子は、A A V R e p ポリペプチドコーディング配列と近接するプロモーターを含んでいない。

【0 1 1 5】

本明細書において、プロモーターおよび遺伝子という文脈での「作動可能に関連する」という用語は、問題となっているプロモーターと遺伝子とが、前記プロモーターが前記遺伝子の発現を促進できるほど互いに十分に近い距離で位置しているということを意味する。一部の実施形態において、前記プロモーターと前記遺伝子とは、並んでいるか (juxtaposed)、または近接している (contiguous)。

20

【0 1 1 6】

好ましくは、R e p ポリペプチドコーディング配列 (r e p 遺伝子) は、配列番号 1 2 に記載の配列を有するか、または、配列番号 1 2 に対するヌクレオチド配列同一性が少なくとも 8 0 %、8 5 %、9 0 % または 9 5 % である配列番号 1 2 の変異体を有し、ここで、p 1 9 プロモーターは非機能的であり、かつ p 4 0 プロモーターは非機能的であり、かつアデノウイルス阻害配列は非機能的である。配列番号 1 2 において、p 1 9 プロモーターおよび p 4 0 プロモーターは切除され、R e p 7 8 コーディング配列および R e p 6 8 コーディング配列が保持されている。

30

【0 1 1 7】

他の好ましい実施形態において、R e p ポリペプチドコーディング配列は下記の特徴を有する。

(i) 機能的 A A V p 5 プロモーターに作動可能に関連しておらず、かつ

(i i i) 機能的 A A V p 4 0 プロモーターを含まず、かつ、機能的アデノウイルス阻害配列を含まない。

【0 1 1 8】

より好ましくは、前記 R e p ポリペプチドコーディング配列は、p 1 9 プロモーターを有し、ここで、T A T A ボックスは、たとえば T A T A ボックスのヌクレオチドの 1 つ以上 (たとえば 1 つ、2 つ、3 つ、または 4 つ) を代替りのヌクレオチドと置換することによって切除され (ablated) ており、たとえば T A T A 配列を T T T T に変換することによって切除され (ablated) ている。

40

【0 1 1 9】

一部の実施形態において、前記 A A V p 1 9 プロモーターは、T A T A ボックスの一部またはすべてを含む欠失を含むか、または T A T A 塩基の 1 つ以上が T A T A から代替りのヌクレオチドに変わっている。好ましくは、前記変更は同義変異であるか、または前記変更はコーディング配列のフレームを保存している。

【0 1 2 0】

p 1 9 プロモーターは機能的であってもよく、すなわち R e p 4 0 ポリペプチドおよび

50

Rep 52ポリペプチドはp 19プロモーターから発現できる。または、p 19プロモーターは非機能的であってもよい。

【0121】

さらなる実施形態において、本発明は、本発明の核酸分子を含むアデノウイルスベクターを提供する。本発明の核酸分子は、アデノウイルスゲノムに安定的に組み込まれている。

【0122】

本発明の核酸分子を適応させるために、1つ以上のアデノウイルス遺伝子の一部またはすべて（好ましくはアデノウイルスヘルパー遺伝子ではない遺伝子）を欠失してもよい。

【0123】

たとえば、本発明の核酸分子は、アデノウイルス初期遺伝子のうちの一つに挿入されていてもよく、または、初期遺伝子がアデノウイルスから欠失した部位に挿入されていてもよい。後者の例では、欠失した初期遺伝子は、前記欠失した遺伝子を含む細胞株によって、たとえばアデノウイルスE 1 A領域およびE 1 B領域を含むHEK 293細胞によって、トランス補完されてもよい。

【0124】

本発明の核酸分子は、アデノウイルスゲノムのE 1欠失を含む領域に挿入されていてもよい。他の例では、アデノウイルスに必須ではない遺伝子もまた欠失することができ、これらの部位は本発明の核酸分子を挿入するために使用できる。たとえば、アデノウイルスベクターではE 3遺伝子の大半が欠失できるので、本発明の核酸分子はE 3領域に挿入されていてもよい。

【0125】

本発明の核酸分子は、（アデノウイルス遺伝子の転写の方向に対して）センスの向きで、またはアンチセンスの向きで、アデノウイルス遺伝子に挿入されていてもよい。本発明の好ましい実施形態は、本発明の核酸分子をE 1領域に挿入する場合、本発明の核酸分子がE 4、E 2 AおよびE 2 B発現カセットと同じ転写方向であることである。これは、（E 1欠失AV中によく保持されている）E 1 Aプロモーターが、rep遺伝子発現を駆動するプロモーターとして動作しないようにするためである。前記E 1 Aプロモーターは、AVパッケージングシグナルを含んでいるので、除去できない。

【0126】

本発明の好ましい実施形態は、Repコーディング配列が上流プロモーターを含まないことである。

【0127】

一部の好ましい実施の形態において、本発明の核酸分子が、アデノウイルスE 1遺伝子に挿入され、好ましくはE 1遺伝子の一部が欠失している。好ましくは、前記E 1遺伝子は、E 1 Aおよび／またはE 1 Bである。

【0128】

一実施形態において、本発明は、本発明の核酸分子を含むアデノウイルスベクターを提供し、（本発明の核酸分子によってコードされる）前記Repポリペプチドは、低レベル、ベースラインレベルまたは最小限レベルで発現する。

好ましくは、Repポリペプチドコーディング配列は、いかなる機能的プロモーターとも作動可能に関連していない。本明細書において、「低レベル、ベースラインレベル、または最小限レベル」という用語は、（野生型AAV rep遺伝子の）野生型p 5プロモーターと作動可能に関連する野生型Rep 78ポリペプチドの発現レベルの50%未満、40%未満、30%未満、20%未満または10%未満である、本発明の核酸分子のRep 78ポリペプチドの発現レベルのことをいう。このようにして、少なくともいくつかのAAVの産生を可能にするために、十分なRepポリペプチドが提供されるが、Repポリペプチドの発現レベルはアデノウイルスの複製を完全に阻害するには不十分である。

【0129】

一部の実施形態において、本発明の核酸分子は、本発明の核酸分子の発現がアデノウイルスプロモーターによって駆動されるように、好ましくは低レベルまたは最小レベルで駆

10

20

30

40

50

動されるように、アデノウイルスゲノムに組み込まれる。

【0130】

他の実施形態において、本発明の核酸分子は、本発明の核酸分子の発現が作動可能に関連した異種プロモーターによって駆動されるように、好ましくは低レベルまたは最小レベルで駆動されるように、アデノウイルスゲノムに組み込まれる。

【0131】

作動可能に関連するプロモーターは、構成型プロモーターであってもよく、または誘導性プロモーターであってもよい。一部の実施形態において、前記プロモーターは構成型プロモーターである。他の実施形態において、前記プロモーターは、誘導性または抑制性である。

【0132】

構成型プロモーターの例としては、CMV、SV40、PGK（ヒトまたはマウス）、HSV TK、SFFV、ユビキチン、伸長因子アルファ、CHEF-1、FerH、Grp78、RSV、アデノウイルスE1A、CAG、もしくはCMVベータグロブリンプロモーター、またはそれらから誘導されたプロモーターなどがある。

【0133】

好ましくは、rep遺伝子プロモーターは、SV40プロモーター、または、それから誘導されたプロモーター、または、ヒト細胞およびヒト細胞株（たとえばHEK-293細胞）中のSV40プロモーターと比較して同等の強度のプロモーターもしくはそれより小さい強度のプロモーターである。

【0134】

一部の実施形態において、前記プロモーターは、誘導性または抑制性の制御性（プロモーター）エレメントを含むことにより、誘導性または抑制性である。

【0135】

たとえば、前記プロモーターは、ドキシサイクリン、テトラサイクリン、IPTGまたはラクトースで誘導可能なものであってもよい。

【0136】

本発明の一部の実施形態において、本発明の核酸分子は、いかなる機能的プロモーターも含まず、かついかなる機能的プロモーターとも作動可能に関連していない。

【0137】

一部の実施形態において、本発明のアデノウイルスベクターは、AAV cap遺伝子をコードするヌクレオチド分子をさらに含む。

【0138】

好ましくは、前記AAV cap遺伝子は、AAV rep遺伝子または本発明の核酸分子とは並んでいない。特に、AAV cap遺伝子は、好ましくは、rep遺伝子p40プロモーター（野生型AAV p40プロモーターまたは本発明のp40プロモーター配列）と作動可能に関連していない。

【0139】

たとえば、好ましくは、前記AAV cap遺伝子は、AAV rep遺伝子（またはrep遺伝子プロモーター）または本発明の核酸分子の、1 kb、2 kb、3 kb、4 kb、または5 kb以内のアデノウイルスゲノム中には存在しない。

【0140】

好ましくは、AAV cap遺伝子は異種プロモーターと作動可能に関連している。

好ましくは、AAV cap遺伝子は構成型プロモーターまたは誘導性プロモーターと作動可能に関連している。

【0141】

一部の実施形態において、AAV cap遺伝子はプロモーターと作動可能に関連していないか、または、最小のプロモーター、たとえば、CMVプロモーター、RSVプロモーター、SV40プロモーターの最小のプロモーター領域と作動可能に関連するか、または、TATAボックスと、TATAボックスの下流で基礎転写を開始するために十分な制

10

20

30

40

50

御性結合部位とを含む複合コアプロモーター領域と作動可能に関連する。プロモーターが使用されない場合は、T A T Aボックスは存在しない。これにより、c a p 遺伝子の低レベル、ベースラインレベルまたは最小限レベルでの発現が維持される。

【0142】

本明細書において、「低レベル、ベースラインレベル、または最小限レベル」という用語は、（たとえば野生型 A A V 中の）野生型 p 4 0 プロモーターと作動可能に関連する野生型 c a p 遺伝子の発現レベルの 5 0 % 未満、4 0 % 未満、3 0 % 未満、2 0 % 未満または 1 0 % 未満である、c a p 遺伝子の発現レベルのことをいう。

【0143】

本明細書において、「異種」という用語は、問題となっている遺伝子が、生来的（natu rally）に関連しているわけではない遺伝エレメントのことをいう。

10

【0144】

本発明の好ましい実施形態において、前記 A A V c a p 遺伝子は、A A V r e p 遺伝子または本発明の核酸分子とは並んでいない。

【0145】

特に、A A V c a p 遺伝子は、アクチベータータンパク質および r e p 遺伝子の両方をコードする A V にコードされたタンパク質によって活性化されるプロモーターの制御下で、A V に組み込まれる。

【0146】

本発明のさらなる実施形態において、本発明の核酸分子を含むアデノウイルスベクター（第 1 のアデノウイルスベクター）は、（遠隔）プロモーター、たとえば第 2 のアデノウイルスベクターに存在するプロモーターを転写的に活性化することができるポリペプチドを、さらにコードする。好ましくは、前記第 2 のアデノウイルスベクターのプロモーターは、A A V c a p 遺伝子と作動可能に関連する（すなわち、その発現を駆動する）プロモーターである。

20

【0147】

一部の実施形態において、アデノウイルスベクターは、当該アデノウイルスベクターに存在しないプロモーターを転写的に活性化することができるポリペプチドをコードする。

【0148】

かかるポリペプチドの例としては、単純ヘルペスウイルス由来の V P 1 6 転写アクチベーター、および p 5 3 タンパク質由来のトランスアクチベータードメインなどがある。これらの配列は、D N A 結合ドメイン、クメート（cumate）結合部位またはテトラサイクリン結合部位に結合するものなどに連結してもよい。

30

【0149】

これによって、第 1 のアデノウイルスベクターと第 2 のアデノウイルスベクターとの両方が同じ細胞内に存在する場合にのみ c a p 遺伝子の転写が誘導され、アデノウイルスの製造中に A A V c a p 遺伝子を発現する負担を軽減する。

【0150】

本発明は、また、本発明の核酸分子を含む宿主細胞も提供し、前記核酸分子は宿主細胞内にエピソームに存在する。前記宿主細胞は単離細胞であってもよく、たとえばそれらは生存する動物または生存する哺乳動物内に存在しない。好ましくは、前記宿主細胞は哺乳類細胞である。

40

哺乳類細胞の例は、ヒト、マウス、ラット、ハムスター、サル、ウサギ、ロバ、ウマ、ヒツジ、ウシおよび類人猿に由来する任意の臓器または組織に由来するものを含む。

好ましくは、前記細胞はヒト細胞である。前記細胞は、初代細胞であってもよく、または不死化細胞であってもよい。

好ましい細胞には、H E K - 2 9 3、H E K 2 9 3 T、H E K - 2 9 3 E、H E K - 2 9 3 F T、H E K - 2 9 3 S、H E K - 2 9 3 S G、H E K - 2 9 3 F T M、H E K - 2 9 3 S G G D、H E K - 2 9 3 A、M D C K、C 1 2 7、A 5 4 9、H e L a、C H O、マウス骨髄腫、P e r C 6、9 1 1、および V e r o 細胞株がある。H E K - 2 9 3 細

50

胞はE 1 Aタンパク質およびE 1 Bタンパク質を含むよう改変されており、このため、これらのタンパク質がヘルパープラスミドに供給される必要が無い。同様に、P e r C 6細胞および9 1 1細胞はより小さな改変を含み、これもまた使用することができる。

【0 1 5 1】

最も好ましくは、ヒト細胞は、H E K 2 9 3、H E K 2 9 3 T、H E K 2 9 3 A、P e r C 6、9 1 1、またはH e L a R C 3 2である。他の好ましい細胞には、H e L a細胞、C H O細胞およびV E R O細胞などがある。

【0 1 5 2】

本発明者らは、R e pコーディング配列およびA A V I T R配列が同じアデノウイルスに存在することが、アデノウイルスの増殖に有害であると判断した。かかるアデノウイルスは回収できる一方で、その収量は典型的には、A Vが各配列をそれぞれ独立して含む場合の5～10倍低い。したがって、R e pコーディング配列およびA A V I T R s配列を分離すること、すなわちそれらを二つの別々のアデノウイルスベクターに配置することにより、利点が得られる。

【0 1 5 3】

さらに他の実施形態において、本発明は、下記を含むキットを提供する：

(A) 本発明の核酸分子を含む第1のアデノウイルスベクター、および

(B) 下記を含む第2のアデノウイルスベクター、

(i) A A V C a pポリペプチドをコードする核酸分子、および／または

(ii) 組み換えA A Vゲノムをコードする核酸分子。

【0 1 5 4】

好ましくは、前記第1のアデノウイルスベクターは、前記第2のアデノウイルスベクターに存在するプロモーターを転写的に活性化することができるポリペプチドを、さらにコードする。好ましくは、前記第2のアデノウイルスベクター中のプロモーターは、A A V c a p遺伝子と作動可能に関連する（すなわち、その発現を駆動する）プロモーターである。

【0 1 5 5】

W O 2 0 1 9 / 0 2 0 9 9 2は、後期アデノウイルス遺伝子の転写が、リプレッサーエレメントの主要後期プロモーターへの挿入により調節（阻害など）できることを開示している。アデノウイルス後期遺伝子の発現の「スイッチを切る」ことにより、細胞のタンパク質製造能力を所望の組み換えタンパク質またはA A V粒子の産生に転用することができる。好ましくは、本発明のアデノウイルスベクターは抑制可能な主要後期プロモーター（M L P）を含み、より好ましくは、前記M L Pがアデノウイルス後期遺伝子の転写を調節または制御することのできる1つ以上のリプレッサーエレメントを含み、かつ前記リプレッサーエレメントの1つ以上がM L P T A T Aボックスの下流に挿入される。

【0 1 5 6】

ウイルス（好ましくはA A V）粒子の産生に好ましい特徴は、下記のものがある。

－M L P T A T Aボックスと転写＋1位との間に1つ以上のリプレッサーエレメントが挿入される。

－前記リプレッサーエレメントが、リプレッサータンパク質と結合することのできるものである。

－リプレッサーエレメントと結合することのできるリプレッサータンパク質をコードする遺伝子が、アデノウイルスゲノム内でコードされる。

－前記リプレッサータンパク質が、前記M L Pの制御下で転写される。

－前記リプレッサータンパク質が、テトラサイクリンリプレッサー、ラクトースリプレッサーまたはエクジソンリプレッサーであり、好ましくはテトラサイクリンリプレッサー（T e t R）である。

－前記リプレッサーエレメントが、配列番号13に示す配列を含むかまたはこれからなるテトラサイクリンリプレッサー結合部位である。

－前記M L Pのヌクレオチド配列が、配列番号14または配列番号15に示す配列を含む

10

20

30

40

50

かまたはこれからなる。

ー リプレッサーエレメントの存在は、アデノウイルス E 2 B タンパク質の産生に影響しない。

ー 前記アデノウイルスベクターが、アデノウイルス L 4 1 0 0 K タンパク質をコードし、かつ前記 L 4 1 0 0 K タンパク質は前記 M L P の制御下でない。

ー 導入遺伝子が、アデノウイルス初期領域の一つに挿入され、好ましくはトランスファープラスミドの代わりにアデノウイルス E 1 領域の中に挿入される。

ー 前記導入遺伝子は、その 5' - U T R に三分節系リーダー (T P L) を含む。

ー 前記導入遺伝子は、治療ポリペプチドをコードする。

ー 前記導入遺伝子は、ウイルスタンパク質をコードし、好ましくは細胞の中または外に集まってウイルス様粒子を産生することができるタンパク質をコードし、好ましくは前記導入遺伝子はノロウイルス V P 1 または肝炎 B H B s A G をコードする。

【 0 1 5 7 】

さらなる実施形態においては、本発明はまた、改変された宿主細胞を生成するためのプロセスを提供し、前記プロセスは、

(a) 本発明の核酸分子を宿主細胞に導入する工程を含み、

前記核酸分子は、

(i) 前記宿主細胞のゲノムに安定的に組み込まれるか、または

(i i) 前記宿主細胞内にエピソーマルに存在する。

【 0 1 5 8 】

好ましくは、本発明の核酸分子は前記宿主細胞内にエピソーマルに存在する。

【 0 1 5 9 】

本発明の一部の実施形態において、前記細胞中の本発明の核酸分子は、いかなる機能的プロモーターも含まず、かついかなる機能的プロモーターとも作動可能に関連していない。

【 0 1 6 0 】

一部の実施形態において、前記宿主細胞は、 C a p ポリペプチドおよび／または A A V ゲノムを発現する宿主細胞であるか、または C a p ポリペプチドおよび／または A A V ゲノムを発現することができる宿主細胞である。

【 0 1 6 1 】

たとえば、前記宿主細胞は、 C a p ポリペプチドおよび／または A A V ゲノムをコードするヌクレオチド配列を含む 1 つ以上の D N A 分子が安定的に組み込まれる宿主細胞であってもよい。 C a p ポリペプチドおよび／または A A V ゲノムをコードする前記ヌクレオチド配列は、好ましくは、好適な調節エレメントと作動可能に関連し、たとえば誘導性プロモーターまたは構成型プロモーターと作動可能に関連する。

【 0 1 6 2 】

たとえば、前記宿主細胞は、 C a p ポリペプチドおよび／または A A V ゲノムをコードするヌクレオチド配列を含む 1 つ以上の D N A プラスミドまたはベクターを含む宿主細胞であってもよい。 C a p ポリペプチドおよび／または A A V ゲノムをコードする前記ヌクレオチド配列は、好ましくは、好適な調節エレメントと作動可能に関連し、たとえば誘導性プロモーターまたは構成型プロモーターと作動可能に関連する。

【 0 1 6 3 】

前記宿主細胞は、 A A V パッケージング細胞または A A V 産生細胞であってもよい。

【 0 1 6 4 】

本明細書において、 1 つ以上のプラスミドまたはベクターを細胞に「導入する」という用語は、形質転換を含み、特に、エレクトロポレーション、接合、感染、形質導入またはトランスフェクションのいずれの形態をも含む。

【 0 1 6 5 】

さらなる実施形態においては、本発明は、改変されたアデノウイルスベクターを産生するためのプロセスを提供し、前記プロセスは、

(a) 本発明の核酸分子をアデノウイルスベクターに導入する工程を含む。

10

20

30

40

50

【0166】

好ましくは、前記核酸分子は、アデノウイルスベクターゲノムに安定的に組み込まれている。

【0167】

本発明の一部の実施形態において、前記アデノウイルスベクターゲノムの本発明の核酸分子は、いかなる機能的プロモーターも含まず、かついかなる機能的プロモーターとも作動可能に関連していない。

【0168】

さらなる実施形態においては、本発明は、AAV粒子を産生するためのプロセスを提供し、前記プロセスは、

- (a) 哺乳類宿主細胞に本発明の第1のアデノウイルスベクターを感染させる工程と、
- (b) 前記宿主細胞に第2のアデノウイルスベクターを感染させる工程であって、

前記第2のアデノウイルスベクターは、導入遺伝子を含む組み換えAAVゲノムを含み、前記第1のアデノウイルスベクターおよび第2のアデノウイルスベクターのうちの少なくとも一つはAAV cap 遺伝子を含む工程と、

(c) 前記哺乳類宿主細胞を、培地で、導入遺伝子を含むAAV粒子が産生されるような条件下で、培養する工程と、

- (d) AAV粒子を前記細胞または前記細胞培地から単離または精製する工程と、を含む。

【0169】

前記アデノウイルスベクターの少なくとも一つはまた、AAVゲノムをパッケージするために十分なヘルパー遺伝子（たとえば、E4、E1、E2a、およびVA）を含む。

【0170】

さらなる実施形態においては、本発明は、AAV粒子を産生するためのプロセスを提供し、前記プロセスは、

(a) 哺乳類宿主細胞にアデノウイルスベクターを感染させる工程であって、前記ベクターは、

- (i) 導入遺伝子を含む組み換えAAVゲノムと、
- (ii) AAV cap 遺伝子とを含み、

前記哺乳類宿主細胞は、前記宿主細胞内にエピソーム的存在するかまたは前記宿主細胞ゲノムに安定的に組み込まれた本発明の核酸分子を含む、工程と、

(b) 前記哺乳類宿主細胞を、培地で、導入遺伝子を含むAAV粒子が産生されるような条件下で、培養する工程と、

(c) AAV粒子を前記宿主細胞または前記細胞培地から単離または精製する工程と、を含む。

【0171】

前記アデノウイルスベクターはまた、AAVゲノムをパッケージするために十分なヘルパー遺伝子（たとえば、E2A遺伝子を含む、E4、E2aおよびVA）を含む。

【0172】

さらなる実施形態においては、本発明は、AAV粒子を産生するためのプロセスを提供し、前記プロセスは、

(a) 哺乳類宿主細胞に本発明の第1のアデノウイルスベクターを感染させる工程であって、

前記哺乳類宿主細胞は、前記宿主細胞ゲノムに安定的に組み込まれた組み換えAAVゲノムを含み、前記組み換えAAVゲノムは導入遺伝子を含み、ここで、

(i) 前記アデノウイルスベクターは、さらにAAV cap 遺伝子を含むか、または
(ii) AAV cap 遺伝子が、前記哺乳類宿主細胞ゲノムに安定的に組み込まれるか、または

(iii) 前記細胞が、AAV cap 遺伝子を含む第2のアデノウイルスベクターに感染している、工程と

- (b) 前記哺乳類宿主細胞を、培地で、導入遺伝子を含むAAV粒子が産生されるような

10

20

30

40

50

条件下で、培養する工程と、

(c) AAV粒子を前記細胞または前記細胞培地から単離または精製する工程と、を含む。

【0173】

前記細胞に存在する前記アデノウイルスベクターの少なくとも一つはまた、AAVゲノムをパッケージするために十分なヘルパー遺伝子（たとえば、E4、E1A、E1BおよびVA、ならびに場合によってはE2A遺伝子）を含む。

【0174】

さらなる実施形態においては、本発明は、組み換えAAV粒子を産生するためのプロセスを提供し、前記プロセスは、

(a) 哺乳類宿主細胞に本発明の第1のアデノウイルスベクターを感染させる工程であって、

(i) 前記第1のアデノウイルスベクターは、さらにAAVcap遺伝子を含むか、または

(ii) 前記細胞が、AAVcap遺伝子を含む第2のアデノウイルスベクターに感染している、工程と

(b) 前記哺乳類宿主細胞に導入遺伝子を含む組み換えAAVを感染させる工程と、

(c) 前記哺乳類宿主細胞を、培地で、導入遺伝子を含むAAV粒子が産生されるような条件下で、培養する工程と、

(d) AAV粒子を前記細胞または前記細胞培地から単離および／または精製する工程と、を含む。

【0175】

前記細胞に導入された（感染させた）前記アデノウイルスベクターの少なくとも一つはまた、AAVゲノムをパッケージするために十分なヘルパー遺伝子（たとえば、E4、E1A、E1BおよびVA、ならびに場合によってはE2A遺伝子）を含む。

【0176】

前記工程(a)および工程(b)における工程は、どのような順序で行われてもよい。導入遺伝子を含む前記初期組み換えAAVは、最初に、なんらかの好適な手段によって作成されればよい。

【0177】

上記の実施形態において、導入遺伝子および前記アデノウイルスベクターを含む前記初期組み換えAAVは、前記プロセスを繰り返すために、引き続きさらなる宿主細胞に再導入され（たとえば、再感染させ）てもよい。アデノウイルスの主要後期プロモーターが調節される例では、主にAAVが産生される。したがって、上記実施形態から産生されたAAV（の一部など）にくわえて、さらなるアデノウイルスベクターを前記宿主細胞に加えることにより、前記プロセスを繰り返すことができ、このように、さらなるアデノウイルスベクターを追加することを通じてAAVを継代培養する。このように、前記工程(a)および／または工程(b)を必要に応じて繰り返してもよい。

【0178】

二つのアミノ酸配列または核酸配列を整合するために利用できるアルゴリズムは、多数確立されている。典型的には、一つの配列が参照配列となり、参照配列に対して試験配列を比較すればよい。配列比較アルゴリズムは、試験配列の参照配列に対する百分率配列同一性を、指定されたプログラムパラメータに基づいて算出する。比較を目的としたアミノ酸配列または核酸配列の整合(alignment)は、たとえば、コンピュータ実行アルゴリズム（たとえば、GAP、BESTFIT、FASTAまたはTFASTA）、またはBLASTおよびBLAST 2.0アルゴリズムなどによって実施されてもよい。

【0179】

百分率アミノ酸配列同一性および百分率ヌクレオチド配列同一性は、BLAST整合法を使用して判定してもよい(Altschul et al. (1997), "Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search programs", Nucleic Acids Res. 25:3389-3402; and <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST>)。好ましくは、標準ま

10

20

30

40

50

たはデフォルトの整合パラメータを用いる。

【0180】

タンパク質データベース内の類似した配列を見つけるために、標準タンパク質-タンパク質BLAST (blastp) を使用してもよい。他のBLASTプログラムと同様に、blastpは類似した局所的な領域を発見することができるように設計されている。配列の類似性が全配列に及ぶ場合、blastpは全般的整合も報告し、これはタンパク質同定の目的には好ましい結果である。好ましくは、標準またはデフォルトの整合パラメータを用いる。一部の 경우에는、「低複雑度フィルター」を外してもよい。

【0181】

BLASTタンパク質検索は、BLASTXプログラム、スコア=50、ワード長=3で実施することもある。比較を目的としたギャップ整合を得るために、Altschul et al. (1997) Nucleic Acids Res. 25: 3389の記載に従ってギャップBLAST (BLAST 2.0に含まれる) を利用することができる。またその代わりに、PSI-BLAST (BLAST 2.0に含まれる) を用いて、分子間の遠隔関係を検出する累次検索を実施することができる (Altschul et al. (1997) 上記参照)。BLAST、ギャップBLAST、PSI-BLASTを利用する場合、それぞれのプログラムのデフォルトパラメータを用いてもよい。

【0182】

ヌクレオチド配列の比較については、MEGABLAST、不連続megablastおよびblastnを用いてこの目標を達成してもよい。好ましくは、標準またはデフォルトの整合パラメータを用いる。MEGABLASTは、非常に類似した配列間で長い整合を効率よく発見するよう特に設計されている。不連続MEGABLASTを用いて、本発明の核酸と類似しているが、同一ではないヌクレオチド配列を発見することができる。

【0183】

BLASTヌクレオチドアルゴリズムは、クエリをワードと呼ばれる短いサブ配列に分解することによって類似した配列を発見する。プログラムは、始めにクエリワードとの完全一致を特定する (ワードヒット)。次に、BLASTプログラムはこれらのワードヒットを多段階で拡張し、最終ギャップ整合を生成する。一部の実施形態においては、BLASTヌクレオチド検索はBLASTNプログラム、スコア=100、ワード長=12で実施することができる。

【0184】

BLAST検索の精度を支配する重要なパラメータの一つはワードサイズである。blastnがMEGABLASTよりも感度が高い最も重要な理由は、より短いデフォルトワードサイズ (11) を用いることである。このためblastnは、他の生物に由来する関連ヌクレオチド配列に対する整合発見において、MEGABLASTよりも優れている。blastnではワードサイズを調節することが可能であり、デフォルト値より短縮して最小で7とし、検索感度を高めることができる。

【0185】

新たに導入された不連続megablastページを用いることにより、より感度の高い検索を遂行することができる (www.ncbi.nlm.nih.gov/Web/Newsltr/FallWinter02/blastlab.html)。このページでは、Maら (Bioinformatics. 2002 Mar; 18(3): 440-5) によって報告されたものと同様のアルゴリズムを用いる。不連続megablastは、整合拡張のシードとして完全ワードマッチを必要とするのではなく、テンプレートのより長いウィンドウ内で非連続ワードを用いる。コーディングモードでは、第1および第2コドン位置での一致の発見に注目する一方で、第3位の不一致を無視することにより、第3塩基のゆれを考慮に入れる。同じワードサイズを用いた不連続MEGABLASTにおける検索は、同じワードサイズを用いた標準的blastnよりも感度および効率が低い。不連続megablastに固有のパラメータは：ワードサイズ：11または12；テンプレート：16、18、または21；テンプレートタイプ：コーディング (0)、非コーディング (1)、または両方 (2) である。

【0186】

一部の実施形態においては、デフォルトパラメータを用いてBLASTP2.5.0+アルゴリズム（NCBIから入手できるものなど）を用いる。

【0187】

他の実施形態においては、ギャップコスト：Existence 11およびExtension 1による二つのタンパク質配列のNeedleman-Wunsch整合を用いたBLAST Global Alignmentプログラムを用いる（NCBIから入手できるものなど）。

【0188】

本願に記載された各参照文献の開示はすべて、この参照により本明細書に具体的に組み込まれる。

【図面の簡単な説明】

【0189】

【図1】図1は、rep遺伝子内の様々なAAVプロモーターを示した、野生型AAVゲノムの構造を示す。

【図2A】図2：AAV Repタンパク質は、アデノウイルス主要後期プロモーターからの基礎転写を抑制することができる。

【図2B】図2：AAV Repタンパク質は、アデノウイルス主要後期プロモーターからの基礎転写を抑制することができる。

【図3A】図3：AAV Rep DNAは、アデノウイルスゲノムへ安定的に組み込まれ複製される。

【図3B】図3：AAV Rep DNAは、アデノウイルスゲノムへ安定的に組み込まれ複製される。

【図4A】図4：TERAベクターとの共感染は、ヘルパーフリープラスミドトランスフェクション法と比較して、HEK293細胞におけるAAVの産生を著しく増大させる。

【図4B】図4：TERAベクターとの共感染は、ヘルパーフリープラスミドトランスフェクション法と比較して、HEK293細胞におけるAAVの産生を著しく増大させる。

【図5】図5：AAVトランスファージェノムとAAV2 capとをコードするTERAベクターと、AAV Rep 78-68をコードするTERAベクターとの共感染は、ヘルパーフリープラスミドトランスフェクション法と比較して、HEK293細胞におけるAAVの産生を著しく増大させる。

【図6】図6：HEK293細胞にTERA-AAVおよびTERA-RepCapを共感染させることによるAAVの産生、または、ヘルパーフリープラスミドトランスフェクション法によるAAVの産生。結果として、全AAV感染粒子と、AAV粒子を含む全ゲノムに対する形質導入粒子の比率とを示す。定量化は、AAVの段階希釈をHEK293細胞に加えてGFP陽性細胞を最も低い希釈でカウントする、改定TCID50法を介して行う。その後TCID50法にしたがいAAV力価を反転演算処理する。

【図7】図7：本発明がWO2019/020992に開示されているような抑制可能なアデノウイルス系を妨げないことを示す。全感染アデノウイルス粒子が示され、AAV Rep遺伝子およびAAV Cap遺伝子がアデノウイルスベクターに組み込まれても、AAV製剤のアデノウイルス混入を防止するためにこの手法が使用できることを表している。アデノウイルスヘキソン配列に対してQPCRにより定量化を行う。

【図8】図8：アデノウイルスベクターへのAAV Rep、Capおよびゲノムの組み込みが、プラスミドフリーのAAV産生を可能にし、プラスミドに基づく産生方法と比較して収率を著しく改善することを示す。定量化は、AAVベクターにおけるEGFP発現カセットに対してQPCRを使用する。

【図9】図9：AAV rep遺伝子およびAAV Cap遺伝子をコードするアデノウイルスベクターの連続継代。アデノウイルスヘキソン配列と比較したこれらの配列のQPCR定量化は、これらの遺伝子が安定的に挿入されており、長期にわたって伝播可能であることを示す。

10

20

30

40

50

【図10】図10：TERA-RepCapからのAAV Rep発現を示すウエスタンブロットであり、AAV Repの全主要アイソフォームの発現を示す。

【図11】図11：AAV Rep (TERA-RepCap、TERA2.0またはTERA2.0+Dox) をコードするアデノウイルスベクターを感染させた細胞、またはAAV2参照物質のウエスタンブロット

【図12】図12：AAV血清型5からのRepおよびCapをコードするものと、AAVゲノムをコードするものとの二つのアデノウイルスベクター (TERA2.0) を細胞に感染させた場合に、ヘルパーフリー法と比較して、AAV産生が高いことを示す。

【図13】図13：AAV血清型6からのRepおよびCapをコードするものと、AAVゲノムをコードするものとの二つのアデノウイルスベクター (TERA2.0) を細胞に感染させた場合に、ヘルパーフリー法と比較して、AAV産生が高いことを示す。

【図14】図14：AAV血清型9からのRepおよびCapをコードするものと、AAVゲノムをコードするものとの二つのアデノウイルスベクター (TERA2.0) を細胞に感染させた場合に、ヘルパーフリー法と比較して、AAV産生が高いことを示す。

【図15】図15Aは、Repコーディング配列をアデノウイルスベクターに組み込むことにより、Repをコードするプラスミドまたはトリプルプラスミド/ヘルパーフリー手法と比較して、AAVの収量を著しく増加させることを示す。図15Bは、Repプロモーターが強力なCMVプロモーターから駆動される場合でも、AAV生産性に関してアデノウイルスベクターへの組み込みが著しく優れていることを示す。

【実施例】

【0190】

本発明は以下の実施例によってさらに例示され、別段の言及がない限りその部および割合は重量によるものであり、温度は摂氏である。これらの実施例は、本発明の好ましい実施形態を示す一方で、例示を目的としてのみ提示されることを理解すべきである。上記の考察およびこれらの実施例により、当業者は本発明の本質的特性を確認し、その主旨および範囲を逸脱することなく、本発明に多様な変更および変法を行って多様な用途および条件に適合させることができる。したがって、本願に提示および記載するものに加えて、本発明の多様な変法が、先行する記述により当業者に明らかになるであろう。そのような変法もまたは付属の請求項の範囲内となることを意図している。

【0191】

下記の実施例では、「TERAベクター」とは、WO2019/020992に記載のように、主要後期プロモーターからの後期アデノウイルス遺伝子の転写が調節されているアデノウイルスベクターのことをいう。WO2019/020992は、後期アデノウイルス遺伝子の転写が、主要後期プロモーターへのリプレッサーエレメントの挿入により調節（阻害など）できることを開示している。アデノウイルス後期遺伝子の発現の「スイッチを切る」ことにより、細胞のタンパク質製造能力を所望の組み換えタンパク質またはAAV粒子の産生に転用することができる。

【0192】

WO2019/020992は、主要後期プロモーターにリプレッサーエレメントを含むアデノウイルスベクターが、下流に、かつ主要後期プロモーターの転写制御下で、TetRタンパク質をコードすることもできることを開示している。ドキシサイクリンの非存在下で、前記TetRタンパク質は、主要後期プロモーターリプレッサーエレメントに結合し、プロモーターの活性を抑制する。ドキシサイクリンの存在下で、前記TetRタンパク質は、主要後期プロモーター中の主要後期プロモーターリプレッサーエレメントに結合できない。その結果、ドキシサイクリンの存在下で、アデノウイルスの主要後期プロモーターが活性化し、アデノウイルスの構造遺伝子が発現し、前記ウイルスの複製が起こりうる。

ベクター「TERA-AAV」は、AAVトランスファーゲノムをコードする。

【0193】

ベクター「TERA-RepCap」は、AAV RepおよびAAV Capをコード

する。このコンストラクトにおいて、機能的Rep p5プロモーターまたは機能的p40プロモーターは存在せず、Repアデノウイルス阻害配列は存在せず、かつRep p19プロモーターが修飾されてTATAボックスが欠失しているが、前記プロモーターは機能を維持している。rep遺伝子がアデノウイルスのE1領域に挿入されている。CapはCMVプロモーターから発現している。cap遺伝子がアデノウイルスのE1領域に挿入されている。CMVプロモーターの転写方向は、Repコーディング配列に向かってはいない。

【0194】

TERA2.0の手法とは、TERA-AAVおよびTERA-RepCapを細胞に加えるプロセスのことをいう。

【0195】

ベクターTERA-RepCap5、TERA-RepCap6、およびTERA-RepCap9は、AAV5、AAV6、またはAAV9からのAAV Rep遺伝子およびAAV Cap遺伝子を、それぞれコードする。TERA-RepCap5において、前記Cap遺伝子は最小のCMVプロモーター領域によって駆動される。TERA-RepCap6およびTERA-RepCap9において、前記Cap遺伝子は全長のCMVプロモーターによって駆動される。これらのコンストラクトにおいて、機能的Rep p5プロモーターまたは機能的p40プロモーターは存在せず、Repアデノウイルス阻害配列は存在せず、かつRep p19プロモーターが修飾されてTATAボックスが切除されているが、前記プロモーターは機能を維持している。rep遺伝子がアデノウイルスのE1領域に挿入されている。Cap遺伝子発現カセットがアデノウイルスのE1領域に挿入されている。前記最小のCMVプロモーターまたは前記全長のCMVプロモーターの転写方向は、Repコーディング配列に向かってはいない。

【0196】

トリプルプラスミドトランスフェクションまたはヘルパーフリーの手法とは、（アデノウイルスの使用とは違って）アデノウイルスヘルパープラスミド、天然に見出されるようなAAV RepおよびAAV Capをコードするプラスミド、およびCMV駆動EGFP発現カセットがAAV ITRの間に挿入されているようなAAVゲノムを含むプラスミドのトランスフェクションのことをいう。

【0197】

前記プラスミドpRepCap2、pRepCap5、pRepCap6、pRepCap9は、AAV2、AAV5、AAV6、またはAAV9からのAAV Rep遺伝子およびAAV Cap遺伝子を、それぞれコードする。これらのコンストラクトにおいて、前記AAV rep遺伝子およびAAV Cap遺伝子は、天然に見出されるような構成である。

【0198】

前記プラスミドpAAV-EGFPは、AAVゲノムの左右のITRをコードする。EGFPレポーター遺伝子の発現を駆動するCMVプロモーターがITRの間に挿入され、それにポリアデニル化シグナルが続く。

【0199】

前記プラスミドpHelperは、AAVヘルパーに必要なアデノウイルス配列を含む。これは、E4領域、E2A領域、およびVA遺伝子を含む。本明細書に記載される研究に使用されるHEK293細胞に見出されるからといって、このプラスミドはアデノウイルスE1領域をコードするわけではない。

【0200】

実施例1: AAV Repタンパク質は、アデノウイルス主要後期プロモーターからの転写を抑制する。

アデノウイルス主要後期プロモーター（MLP）からの転写に対するAAV Repタンパク質の効果を判定するために、分子クロニング法によって、野生型MLP配列またはTetR抑制可能MLP配列を、EGFPレポータータンパク質を発現するプラスミドに

10

20

30

40

50

挿入した。M L Pプロモータープラスミドを、コントロールC M Vプラスミド、またはC M Vプロモーターの制御下でA A V R e p 7 8、A A V R e p 6 8、A A V R e p 5 2もしくはA A V R e p 4 0を発現するプラスミドコンストラクトとともに、H E K 2 9 3細胞に共トランスフェクトした。E G F Pレポーターの発現を、トランスフェクションの48時間後にフローサイトメトリーによって定量化した。

その結果を図2 Aおよび2 Bに示す。これらの結果は、R e pタンパク質の高発現が、アデノウイルス主要後期プロモーターまたはT e t R結合部位を含む主要後期プロモーターの修飾型の活性を阻害することを示している。

【0201】

実施例2:A A V r e p DNAは、アデノウイルスゲノムへ安定的に組み込まれ複製される。

10

A A V R e p 7 8ポリペプチドおよびA A V R e p 6 8ポリペプチドをコードするアデノウイルスベクターを構築するために、p 5プロモーターおよびp 1 9プロモーター（A A V R e p 5 2およびA A V R e p 4 0の転写に参与）、ならびにp 4 0アデノウイルス阻害配列を、（A A V R e p 7 8ポリペプチドおよびA A V R e p 6 8ポリペプチドは維持したまま）スクランブルし（scramble）、かつ、分子クローニング法でアデノウイルスベクターのE 1欠失領域に挿入した。

この結果、アデノウイルスベクターがR e pコーディング配列とE G F Pを発現するA A Vゲノムとをコードする図3 Bに示すベクターの産生が起こった。

前記アデノウイルスベクターゲノムを、H E K 2 9 3細胞にトランスフェクトし、完全な細胞変性効果を観察した後、トランスフェクションの15日後までにウイルスベクターを回収した。その後H E K 2 9 3細胞でベクターを継代し（>5）、アデノウイルス粒子をD N a s eで処理してカプセル化DNAを分解した。A A V R e p遺伝子配列およびアデノウイルスヘキソン遺伝子配列の存在を、Q P C Rによって判定した。その結果を図3 Aに示し、前記ベクターを図3 Bに示す。

20

図3 Aは、A A V R e pコーディングDNAの頻度と、アデノウイルスヘキソンDNAの頻度が同数で存在することを示し、アデノウイルスゲノムへのR e p DNAの挿入が安定的であることを表している。

【0202】

実施例3:T E R Aベクターとの共感染は、ヘルパーフリープラスミドトランスフェクション法と比較して、H E K 2 9 3細胞におけるA A Vの産生を著しく増大させる。

30

H E K 2 9 3細胞を、48ウェル組織培養プレートフォーマットに9 e 4細胞／ウェルで24時間播種した。ヘルパーフリーのプラスミドで細胞をトリプルトランスフェクトするか、または、ドキシサイクリン0.5 u g／m LまたはD M S Oの存在下で、A）M O I 1 0 0で、E G F P発現カセットとC M Vプロモーターによって駆動させたA A V 2 C a p 2遺伝子とともに、A A VトランスファージェノムをコードするT E R A（T E R A - A A V - C a p）と、B）M O I 5 0で、E G F P発現カセットとA A V R e p 7 8 - 6 8 sとともに、A A VトランスファージェノムをコードするT E R A（T E R A - A A V - R e p）との共感染で、細胞をトリプルトランスフェクトした。A A Vベクターを、形質導入の96時間後に回収し、カプセル化A A V粒子と混入しているアデノウイルス粒子とをQ P C Rで定量化した。

40

その結果を図4 Aに示し、前記ベクターを図4 Bに示す。これらの結果は、T E R A - A A V - C a pおよびT E R A - A A V - R e pの組み合わせを使用して、A A Vが高力価で産生されうること示している。図4 Aは、得られた力価が、ヘルパーフリーの手法のトリプルトランスフェクションで得られた力価よりもかなり高いことを示す。図4 Bは、T E R A - A A V - R e pおよびT E R A - A A V - C a pについて、A A V成分を含むアデノウイルスゲノムの模式図を示す。

【0203】

実施例4:A A VトランスファージェノムおよびA A V 2 C a pをコードするT E R Aベクターと、A A V R e p 7 8 - 6 8をコードするT E R Aベクターとの共感染は、ヘルパ

50

ーフリープラスミドトランスフェクション法と比較して、HEK293細胞におけるAAVの産生を著しく増大させる。

HEK293細胞を48ウェル組織培養プレートフォーマットに9e4細胞／ウェルで24時間播種した。ヘルパーフリーのプラスミドで細胞をトリプルトランスフェクトするか、または、ドキシサイクリン0.5ug／mLまたはDMSOの存在下で、A) TERA-AAV-Capと、B) TERA-AAV-RepまたはC) AAV Rep78-68sをコードするTERA (TERA-Rep78-68) との (示されたMOIでの) 共感染で細胞をトリプルトランスフェクトした。AAVベクターを、形質導入の96時間後に回収し、カプセル化AAV粒子と混入しているアデノウイルス粒子とをQPCRで定量化した。

10

その結果を図5に示す。これらの結果は、AAV成分すべてを含む二つのウイルスが、AAV力価を改善し、これら力価はヘルパーフリー／トリプルプラスミドトランスフェクション手法で得られた力価よりもかなり高いことを示している。様々なウイルスベクターの組み合わせが図5に示され、前記手法の柔軟性および多能性を示している。各産生において、少なくとも一つのウイルスベクターが本発明のRepコンストラクトを含む。

【0204】

実施例5：二つのTERAベクター、すなわちAAVトランスファージゲノムをコードするTERAベクターと、AAV repおよびAAV capをコードするTERAベクターとからなるTERA2.0システムを使用した、HEK293細胞におけるAAV2ベクターの産生

20

本明細書に記載の本発明の開発まで、AAV RepおよびAAV Capの両方を単一のアデノウイルスベクター内にコードすることは不可能だった。AAV製造の手法を単純化するために、血清型2からAAV RepとAAVカプシドとの両方をコードする新たなアデノウイルスベクターを構築した (TERA-RepCap)。この実施例において、この新たなアデノウイルスベクター (TERA-RepCap) をTERA-AAVと組み合わせて使用してのAAV産生を試験した。この手法をTERA-2.0と呼ぶ。この手法を、トリプルプラスミドトランスフェクション/ヘルパーフリー方法と比較した。

HEK293細胞にTERA-AAVおよびTERA-RepCapをそれぞれMOI25で感染させて、TERA2.0を実現させた。

さらに、HEK293細胞をヘルパーフリープラスミド (pAAV-EGFP; pRepCap2; pHelper) でトリプルトランスフェクトした。細胞をベクターの回収前に4日間培養した。サンプルをDNaseで2時間37℃で処理し、EGFP導入遺伝子に対するプライマーおよびプローブを使用してqPCRで定量化した。これら二つの手法で産生されたAAVベクターを使用して、新鮮なHEK293細胞に感染させ、形質導入ユニットをTCID50アッセイによって定量化した。

30

その結果を図6に示す。右の軸に示されるゲノムコピー (GC) と形質導入ユニット (TU) との比率は、qPCRによって判定された無傷のAAV粒子を、TCID50アッセイから測定された形質導入ユニットによって除することにより決定した。この実施例の結果は、TERA2.0を使用した細胞の感染 (TERA-AAVおよびTERA-RepCapとの共感染) が、トリプルプラスミドトランスフェクションから産生された製剤と比較して、形質導入の能力のあるAAVベクターの産生を1000倍に増加できたことを示す。

40

【0205】

実施例6：TERA2.0手法を使用したAAV2産生プロセスからの混入アデノウイルスのレベルの判定

TERA2.0手法 (TERA-AAVおよびTERA-RepCapとの共感染、それぞれMOI25) を使用して感染させ、そしてドキシサイクリン0.5ug／mLまたはDMSO (-DOX) とともに4日間培養したHEK293細胞中でAAV産生を行い、た。ドキシサイクリン (DMSO処理群) の非存在下で、アデノウイルス後期遺伝子は抑制され、ウイルス複製サイクルが切断される (truncated)。さらに、増殖培地中のド

50

キシサイクリンの存在は、TERAベクターからの後期アデノウイルス遺伝子の発現と、アデノウイルスの産生を可能にする。ベクターを3回凍結融解することにより回収し、混入アデノウイルスを新鮮なHEK293細胞に感染させることによるTCID50アッセイによって検出し、ドキシサイクリン0.5 µg/mlを使用して培養した。

この実施例は、二つのTERAベクター、すなわちAAVトランスファージェノムをコードするTERAベクターと、AAV RepおよびAAV CapをコードするTERAベクターとを使用した、ドキシサイクリン非存在下のAAVベクターの産生が、アデノウイルスの複製を著しく抑制し、混入の無いAAV製剤を生成したことを示す。ドキシサイクリン存在下でのAAV産生と比較して、混入アデノウイルスの99.999999%を超える減少(9 log reduction)が見られた。

【0206】

実施例7：1 L攪拌タンクバイオリアクターでのトリプルプラスミドトランスフェクション法と比較した、TERA2.0システムを使用したHEK293細胞におけるAAV2ベクター産生

懸濁HEK293細胞をTERA2.0手法(TERA-AAVおよびTERA-Rep Capを共感染)を使用してそれぞれMOI 25で感染させた。TCID50 Units/cell。

さらに、HEK293細胞をヘルパーフリープラスミド(pAAV-EGFP; pRep Cap2; pHelper)でトリプルトランスフェクトした。細胞をベクターの回収前に4日間培養した。サンプルをDNaseで2時間37℃で処理し、EGFP導入遺伝子に対するプライマーおよびプローブを使用してqPCRで定量化し、無傷の粒子(ウイルスゲノム(VG))の力価を判定した。

この実施例は、AAVトランスファージェノムをコードするTERAベクターとAAV RepおよびAAV CapをコードするTERAベクターとの共感染を利用して、懸濁適合HEK293細胞中で、AAV2ベクターが産生できることを示す。この手法から得られたAAV2ベクターの力価は、無傷の粒子において100倍を超える増加であった。

【0207】

実施例8：AAV repおよびAAV capをコードするTERAベクターのqPCRによる遺伝安定性の評価

TERA-Rep CapをコードするプラスミドDNAを、ベクターの回収のためにHEK293細胞にトランスフェクトし、さらに連続継代によって増殖した。HYPERFLASK細胞培養容器中で、HEK293細胞を感染させた(MOI 15)。3日後にベクターを回収し、塩化セシウム超遠心法によって精製し、連続継代4代を生成した。このプロセスを繰り返し、ベクター継代5、6、7代を作成した。各代で精製したTERA-Rep CapベクターからDNAを抽出し、AAV2 rep遺伝子およびAAV2 cap遺伝子、ならびにAd5ヘキソン遺伝子をqPCRによって定量化した。図9のデータは、Ad5ヘキソンに対するAAV2 rep遺伝子およびAAV2 cap遺伝子のコピー数を示し、TERA-Rep CapをコードするDNAプラスミドと比較した(n.s、2要因分散分析(two-way ANOVA))。

この実施例は、AAV Rep遺伝子およびAAV Cap遺伝子が、HEK293細胞内での連続継代中に、TERAベクター内で安定的に伝播されることを示す。

【0208】

実施例9：AAV repおよびAAV capをコードするTERAベクターからのAAV Rep発現の評価。TERA2.0法を使用したAAV産生プロセスからのRepタンパク質のウエスタンブロット検出。

AAVトランスファージェノムをコードするTERAベクター(TERA-AAV)ならびにAAV RepおよびAAV CapをコードするTERAベクター(TERA-Rep Cap)で、HEK293細胞を共感染させた(MOI 各25)。感染の24時間および48時間後にサンプルを回収し、ウエスタンブロットによってAAV2 Rep抗体で、全細胞抽出物(25 µL)を探索した。データは生物学的反復実験(duplicate biological

10

20

30

40

50

replicates) として示す。

その結果を図 10 に示す。この実施例は、AAV Rep および AAV Cap をコードする TERA ベクターから高レベルの AAV Rep 52 および AAV Rep 40 が発現し、低レベルの Rep 78 および Rep 68 もまた発現することを示している。

【0209】

実施例 10：AAV rep および AAV cap をコードする TERA ベクターを使用して産生される粒子からの AAV 2 カプシドタンパク質の評価

HEK293 細胞に、(ドキシサイクリン $0.5 \mu\text{g}/\text{mL}$ の存在下または非存在下で) TERA-AAV および TERE-RepCap を (MOI 各 25) 共感染させるか、または 50 GC/細胞での AAV 2 粒子 (TERA 2.0 から作成) の TERA-RepCap (MOI 25) との共感染を経て共感染させた。感染の 96 時間後にサンプルを回収し、抗 AAV 2 VP1/2/3 抗体で細胞ライセート (25 μL) を探索した。

その結果を図 11 に示す。AAV 2 標準 (ATCC VR-1616) も示される。この結果は、AAV 2 カプシドサブユニット VP1、VP2 および VP3 の相対的組成が、参照標準の AAV 2 ベクターと同じであり、また、トリプルプラスミドトランスフェクション法で産生される物質とも同じであることを示す。

【0210】

実施例 11：二つの TERA ベクター、すなわち AAV トランスファージェノムをコードする TERA ベクターと、AAV rep および AAV cap 5 をコードする TERA ベクターとからなる TERA 2.0 システムを使用した、HEK293 細胞における AAV 5 ベクターの産生。AAV 産生を、トリプルプラスミドトランスフェクション法と比較する。

上述した TERA 2.0 手法を使用して HEK293 細胞を感染させるが、AAV 2 カプシドを AAV 血清型 5 からのカプシドと交換した (TERA-AAV および TERA-RepCap 5、Rep は異種プロモーターからは発現せず、Cap 5 は最小の CMV プロモーターから発現する)。TERA-AAV は MOI 25 で使用し、TERA-RepCap 5 は細胞あたり 75 個のゲノムコピー (GC) で使用した。または、HEK293 細胞をヘルパーフリープラスミド (pAAV-EGFP; pRepCap 5; pHelper) でトリプルトランスフェクトした。細胞をベクターの回収前に 4 日間培養した。サンプルを DNAse で 2 時間 37°C で処理し、EGFP 導入遺伝子に対するプライマーおよびプローブを使用して qPCR で定量化した。

その結果を図 12 に示す。この実施例からの結果は、AAV トランスファージェノムをコードする TERA ベクターと AAV rep 遺伝子および AAV cap 5 遺伝子をコードする TERA ベクターとの二つの TERA ベクターとの共感染が、トリプルプラスミドトランスフェクション/ヘルパーフリー法と比較して、無傷の AAV 5 粒子の 16 倍を超える増加を可能にしたことを示す。

【0211】

実施例 12：二つの TERA ベクター、すなわち AAV トランスファージェノムをコードする TERA ベクターと、AAV Rep および AAV Cap 6 をコードする TERA ベクターとからなる TERA 2.0 システムを使用した、HEK293 細胞における AAV 6 ベクターの産生。AAV 産生を、トリプルプラスミドトランスフェクション法と比較する。

上述した TERA 2.0 手法を使用して HEK293 細胞を感染させるが、AAV 2 カプシドを AAV 血清型 6 からのカプシドと交換した (TERA-AAV および TERA-RepCap 6)。TERA-AAV は MOI 25 で使用し、TERA-RepCap 6 は細胞あたり 75 個のゲノムコピー (GC) で使用した。さらに、HEK293 細胞をヘルパーフリープラスミド (pAAV-EGFP; pRepCap 6; pHelper) でトリプルトランスフェクトした。細胞をベクターの回収前に 4 日間培養した。サンプルを DNAse で 2 時間 37°C で処理し、EGFP 導入遺伝子に対するプライマーおよびプローブを使用して qPCR で定量化した。

その結果を図13に示す。この実施例からの結果は、AAVトランスファーゲノムをコードするTERAベクターとAAV Rep遺伝子およびAAV Cap6遺伝子をコードするTERAベクターとの二つのTERAベクターとの共感染が、トリプルプラスミドトランスフェクション法と比較して、無傷のAAV6粒子の18倍を超える増加を可能にしたことを示す。

【0212】

実施例13：二つのTERAベクター、すなわちAAVトランスファーゲノムをコードするTERAベクターと、AAV RepおよびAAV Cap9をコードするTERAベクターとからなるTERA2.0システムを使用した、HEK293細胞におけるAAV9ベクターの産生。AAV産生を、トリプルプラスミドトランスフェクション法と比較する。

10

上述したTERA2.0手法を使用してHEK293細胞を感染させるが、AAV2カプシドをAAV血清型9からのカプシドと交換した(TERA-AAVおよびTERA-RepCap9)。TERA-AAVはMOI 25で使用し、TERA-RepCap9は細胞あたり50個のゲノムコピー(GC)で使用した。さらに、HEK293細胞をヘルパーフリープラスミド(pAAV-EGFP; pRepCap9; pHelper)でトリプルトランスフェクトした。細胞をベクターの回収前に4日間培養した。サンプルをDNaseで2時間37℃で処理し、EGFP導入遺伝子に対するプライマーおよびプローブを使用してqPCRで定量化した。

その結果を図14に示す。これらの結果は、AAVトランスファーゲノムをコードするTERAベクターとAAV rep遺伝子およびAAV Cap9遺伝子をコードするTERAベクターとの二つのTERAベクターとの共感染が、トリプルプラスミドトランスフェクション法と比較して、無傷のAAV9粒子の8.5倍を超える増加を可能にしたことを示す。

20

【0213】

実施例14：I) AAV RepをコードするTERAベクター(TERA-Rep)と、II) AAV-EGFPとCMVプロモーターで駆動されるAAV Cap2発現カセットとをコードするTERAベクター(TERA-AAV-EGFP-Cap2)との、二つのTERAベクターを使用した、HEK293細胞におけるAAV2ベクターの産生を、ヘルパーフリープラスミド法と比較し、または、TERA-Repを、天然型AAV p5プロモーターによって駆動されるRepコーディング配列をコードするプラスミドと交換したものと比較した。

30

AAV2-EGFPベクターを産生するために、HEK293細胞にTERA-Rep(MOI 5、10、または50)と、TERA-AAV-EGFP-Cap2(MOI 100)とを共感染させた。これを、プラスミドp5-RepをトランスフェクトしたHEK293細胞と比較した。この場合、Rep78ポリペプチド/Rep68ポリペプチドは天然型p5プロモーターから発現し、TERA-AAV-EGFP-Cap2と感染させた(MOI 100)。細胞をベクターの回収前に4日間培養した。サンプルをDNaseで2時間37℃で処理し、EGFP導入遺伝子に対するプライマーおよびプローブを使用してqPCRで定量化した。無傷のAAV2-EGFPの生産性を、ヘルパーフリートランスフェクション法(HF)と比較した。この場合、HEK293細胞はAAVトランスファーゲノムプラスミド(pAAV-EGFP)、プラスミドpRepCap2、およびプラスミドpHelperでトランスフェクトした。コントロールサンプルは、pRepCap2の代わりにスタッファードDNA(pUC19)でトランスフェクトし、DNase処理の効率についての対照とした。

40

図15Aからの結果は、二つのTERAベクター：TERA-RepとTERA-AAV-EGFP-Cap2との共感染は、Rep発現プラスミドをトランスフェクションにより供給する場合、すなわちRepが天然型p5 AAVプロモーターから発現するか、または、ヘルパーフリープラスミドを介して発現する場合と比較して、は、無傷のAAV2ベクターの産生量を著しく増やしたことを示す。

50

図15Bの結果は、図15Aの実験と同じ実験を示すが、Rep発現を駆動するp5プロモーターが強力なCMVプロモーターと置き換えられており、これは、TERA-Repの使用の場合と比較して、AAVの生産性を改善してはいない。

【0214】

参考文献

Fisher, K.J. et al (1996) A novel adenovirus-adenovirus-associated virus hybrid vector that displays efficient rescue and delivery of the AAV genome. Hum gene ther.7:2079-2087.

Liu, X.L et al (1999) Production of recombinant adeno-associated virus vectors using a packaging cell line and a hybrid recombinant adenovirus. Gene ther. 6:293-299.

Sitaraman, V. et al (2011) Computationally designed adeno-associated virus (AAV) rep 78 is efficiently maintained within an adenovirus vector. Proc. Natl. Acad. Sci. 108:14294-14299.

Timpe, J.M. et al (2006) Effect of adeno-associated virus on adenovirus replication and gene expression during coinfection. J. Virol. 16:7807-7815.

Weger, S. et al (2016) A regulatory element near the 3' end of adeno-associated virus rep gene inhibits adenovirus replication in cis by means of p40 promoter-associated short transcripts. J. Virol. 90:3981-3993.

Zhang, H-G. et al (2001) Recombinant adenovirus expressing adeno-associated virus cap and rep proteins supports production of high-titre recombinant adeno-associated virus. Gene ther. 8:704-712.

Zhang, X. and Li, C-Y. (2001) Generation of recombinant adeno-associated virus vectors by a complete adenovirus-mediated approach. Mol. Ther. 3:787-693.

【0215】

SEQUENCES

10

20

30

40

50

【表 1】

SEQ ID NO: 1

Rep nucleotide sequence (AAV serotype 2)

atgccggggttttacgagattgtgattaagggtccccagcgaccttgacgagcatctgcccgcatcttctgacagctt
tgtgaactgggtggccgagaaggaatgggagttgccgccagattctgacatggatctgaatctgattgagcagggcac
ccctgaccgtggccgagaagctgcagcgcgactttctgacggaatggcgccgtgtgagtaaggccccggaggccctt
ttctttgtgcaatttgagaaggagagagctacttccacatgcacgtgctcgtggaaaccacgggggtgaaatccat
ggttttgggacgtttcctgagtcagattcgcgaaaaactgattcagagaatttaccgcgggatcgagccgactttgc
caaactgggttcgcgggtcacaagaccagaaaatggcgccggaggcggaacaagggtggatgagtgctacatcccc
aattactgtctccccaaaaccagcctgagctccagtgggcggtggactaatatggaacagtatTTAAGCGCCTGTTT
gaatctcacggagcgtaaaacgggtgggtggcgagcatctgacgcacgtgtcgagacgcaggagcagaacaaagaga
atcagaatcccaattctgatgcgcgggtgatcagatcaaaaaacttcagccagggtacatggagctggtcgggtggctc
gtggacaaggggattacctcggaagaagcagtggtatccaggaggaccaggcctcatacatctccttcaatgcggcctc
caactcgcggtcccaaatcaaggctgccttggacaatgcgggaaagattatgagcctgactaaaaccgcccccgact
acctgggtggccagcagccgtggaggacatttccagcaatcggtattataaaattttggaactaaacgggtacgat
cccaatatgcggcttccgtcttctgggatgggccaagaaagttcggaagagggaacaccatctggctgtttgg
gcctgcaactaccgggaagaccaacatcgcgaggccatagccacactgtgcccttctacgggtgcgtaaactgga
ccaatgagaactttcccttcaacgactgtgtcgacaagatgggtgatctggtgggaggaggggaagatgaccgccaag
gtcgtggagtcggccaaagccattctcgagggaagcaagggtgcgcgtggaccagaaatgcaagtcctcgcccgat
agaccgactcccgatgatcgtcacctccaacaccaacatgtgcgcgtgattgacgggaactcaacgaccttcgaac
accagcagccgttgcaagaccgatgttcaaatTTGAATCACCCGCGTCTGGATCATGACTTTGGGAAGGTCACC
AAGCAGGAAGTCAAAGACTTTTTCCGGTGGGCAAAGGATCACGTGGTTGAGGTGGAGCATGAATTTCTACGTCAAAAA
GGGTGGAGCCAAGAAAAGACCCGCCCCAGTGACGCAGATATAAGTGAGCCAAACGGGTGCGGAGTCAGTTGCGC
AGCCATCGACGTCAGACGCGGAAGCTTCGATCAACTACGCAGACAGGTACCAAAACAAATGTTCTCGTCACGTGGGC
ATGAATCTGATGCTGTTTCCCTGCAGACAAATGCGAGAGAATGAATCAGAATTCAAATATCTGCTTCACTCACGGACA
GAAAGACTGTTTAGAGTGCTTCCCGTGTGAGAATCTCAACCCGTTTCTGTGCTCAAAAAGGCGTATCAGAACTGT
GCTACATTCTCATATCATGCGGAAAGGTGCCAGACGCTTGCACTGCCTGCGATCTGGTCAATGTGGATTTGGATGAC
TGCACTCTTTGAACAAATAG

10

20

30

SEQ ID NO: 2

Cap nucleotide sequence (AAV serotype 2)

Cagttgcgagccatcgacgtcagacgcggaagcttcgatcaactacgcagacaggtacaaaacaaatgttctcgt
cacgtgggcatgaatctgatgctgtttccctgcagacaatgcgagagaatgaatcagaattcaaatatctgcttcac
tcacggacagaaagactgtttagagtgtttcccggtgtcagaatctcaaccggtttctgtcgtcaaaaaggcgatc
agaaactgtgtacattcatcatatcatgggaaaggtgccagacgcttgcaactgcctgcgatctgggtcaatgtggat
ttggatgactgcacatcttgaacaataaatgatttaaatacagggt
atggctgccgatgggttatcttccagattggctcgaggacactctctctgaaggaataagacagtggtggaagctcaa
acctggccccaccaccaccaaaagcccgagagcggcataaggacgacagcaggggtcttgtgttctctgggtacaagt

40

50

【表 2】

acctcggacccttcaacggactcgacaagggagagccggtcaacgaggcagacgcccggccctcgagcagacacaaa
gcctacgaccggcagctcgacagcggagacaacccgtacctcaagtacaaccacgcccagcggagtttcaggagcg
ccttaaagaagatacgtcttttgggggaacctcggacgagcagtcctccaggcgaaaagaggggttcttgaacctc
tgggctggttgaggaacctgttaagacggctccgggaaaaaagaggccggttagagcactctcctgtggagccagac
tcctcctcgggaaccggaaaggcggggccagcagcctgcaagaaaaagattgaattttggtcagactgggagcgcaga
ctcagtacctgacccccagcctctcggacagccaccagcagccccctctggtctgggaactaatacagatggctacag
gcagtgggcgaccaatggcagacaataacgaggcgccgacggagtggttaattcctcgggaaattggcattgcgat
tcacatggatgggagcagagtcaccaccagcagccgaacctgggacctgcccacctacaacaaccacctcta
caaacaatttccagccaatcaggagcctcgacgacaatcactacttggctacagaccccttgggggtattttg
acttcaacagattccactgccacttttcaccacgtgactggcaaagactcatcaacaacactggggattccgaccc
aagagactcaacttcaagctctttaacattcaagtcaaagaggtcacgcagaatgacggtagcagcagattgccaa
taaccttaccagcaggttcaggtgttactgactcggagtagcagctcccgtagctcctcggctcggcgcatcaag
gatgcctccgcgcttccagcagagctctcatggtgccacagtaggatacctcaccctgaacaacgggagtcag
gcagtaggacgctcttcatcttactgcctggagtagcttctcctctcagatgctgctaccggaaacaactttacctt
cagctacacttttgaggagcttcttccacagcagctacgctcacagccagagctctggacgctctcatgaatcctc
tcatcgaccagtagctgtattacttgagcagaacaaacactccaagtgaaccaccacgcagtcagggttcagttt
tctcaggccggagcagtgacattcgggaccagctctaggaactggcttctggacctgttaccgccagcagcagtg
atcaaagacatctgcggataacaacaacagtgataactcgtggactggagctaccaagtagcacctcaatggcagag
actctctggtgaatccgggcccggccatggcaagccacaaggacgatgaagaaaagtttttctcagagcgggggtt
ctcatctttgggaagcaaggctcagagaaaaaataatgtggacattgaaaaggctcatgattacagacgaagaggaaat
caggacaaccaatcccgtaggctacggagcagtaggttctgtatctaccaacctccagagaggcaacagacaagcag
ctaccgcagatgtcaacacacaaggcgttcttcaggcatggtctggcaggacagagatgtgtaccttcaggggccc
atctgggcaaagattccacacacggacggacattttcacctctctccctcatgggtggattcggacttaaacaccc
tcctccacagattctcatcaagaacaccccggtacctgcgaatccttcgaccacctcagtcggcgaaggttgcctt
ccttcatcacacagtagctccacgggacaggtcagcgtggagatcgagtgaggagctgcagaaggaaaacgcaaacgc
tggaatcccgaaattcagtagacttccaactacaacaagtctgttaatgtggactttactgtggacactaatggcgt
gtattcagagcctcgccccattggcaccagatacctgactcgtaattctgtaA

10

20

30

SEQ ID NO: 3

Cap amino acid sequence (AAV serotype 2)

MAADGYLPDWLEDTLSEGI RQWWKLKPGPPPKPAERHKDDSRGLVLPKYKLGPFNGLDKGEPVNEADAALEBHDK
AYDRQLDSGDNPYLKYNHADADEFQERLKEDTSFGGNLGRAVFQAKKRVLEPLGLVEEPVKTA PGKKRPVEHSPVEPD
SSSGTGKAGQQPARKRLNFGQTDADSV PDPQLGQPPAAPSGLGTNTMATGSGAPMADNNEGADGVGNSSGNWHCD
STWMGDRVITSTRTWALPTYNNHLYKQISSQSGASNDNHYFGYSTPWGYFDNFRFHCHFS PRDWQRLINNNWGFRP
KRLNFKLFNIQVKEVTQNDGTTTIANNLTSTVQVFTDSEYQLPYVLGSAHQGCLPPFPADVFMVPQYGYLTLNNGSQ
AVGRSSFYCLEYFPSQMLRTGNNFTFSYTFEDVPFHSSYAHSQSLDRLMNPLIDQYLYLSRTNTPSGTTTQSR LQF
SQAGASDIRDQSRNWLPGPCYRQQRVSKTSADNNNSEYSWTGATKYHLNGRDSLVPNPGPAMASHKDDEEKFFPQSGV
LIFGKQGSEKTNVDIEKVMITDEEIRTTNPVATEQYGSVSTNLQRGNRQAATADVNTQGVLPGMVWQDRDVYLQGP

40

50

【表 3】

IWAKI PHTDGHFHPSPLMGGFGLKHPPQILIKNTPVPANPSTTFSAAKFASFITQYSTGQVSVEIEWELQKENS KR
WNPEIQYTSNYNKSVNVDF'TVDINGVYSEPRPIGTRYLTRNL*

SEQ ID NO: 4

gtcctgtattagaggtcacgtgagtgttttgcgacattttgcgacaccatgtggtcacgctgggt**tatttaagcccga**
gtgagcacgcagggtctccattttgaagcgggaggtttgaacgcgcagccgcc

SEQ ID NO: 5

agatctttgtcgatcctaccatccactcgacacacccgccagcggccgctgccaaagcttccgagctctcgaattc

10

SEQ ID NO: 6

gtcacaaagaccagaaatggcgccggaggcgggaacaaggtggtggatgagtgctacatccccaattacttgtctccc
caaaacccagcctgagctccagtgggctggactaatatggaacag**tatttaag**cgcctgtttgaatctcacggagc
gtaaacggttggtggcgagcatctgacgcacgtgtcgagacgcaggagcagaacaaagagaatcagaatcccaat
tctgatgcgcgggtgatcagatcaaaaaacttcagccaggtac

SEQ ID NO: 7

gtcacaaagaccagaaatggcgccggaggcgggaacaaggtggtggatgagtgctacatccccaattacttgtctccc
caaaacccagcctgagctccagtgggctggactaatatggaacag**tacctcag**cgcctgtttgaatctcacggagc
gtaaacggttggtggcgagcatctgacgcacgtgtcgagacgcaggagcagaacaaagagaatcagaatcccaat
tctgatgcgcgggtgatcagatcaaaaaacttcagccaggtac

20

SEQ ID NO: 8

Ggtcaccaagcaggaagtcaaagactttttccggtgggcaaaggatcacgtggttgaggtggagcatgaattctacg
tcaaaaagggtggagccaagaaaagaccgccccagtgacgcagat**tata**agtgagcccaaacgggtgcgcgagtc
gttgcgagccatcgacgtcagacgcggaagcttcgatcaactacgcagacaggt

30

SEQ ID NO: 9

gtgacaaaaaagaggtgaaggacttctttcgttgggccaagaccatgtggtcgaggtcgaacacgagttctatgt
gaagaaaaggaggcggaagaagcgcccagcgccatcgagcgtgacatctccgaaccgaagcgcgtgagagagagcg
tggcacaaccatcaacctcggtgccgaggtccatcaattatgcggaaggt

SEQ ID NO: 10

Gtcaccaagcaggaagtcaaagactttttccggtgggcaaaggatcacgtggttgaggtggagcatgaattctacgt
caaaaagggtggagccaagaaaagaccgccccagtgacgcagatataagtgagcccaaacgggtgcgcgagtcag
ttgcgcagccatcgacgtcagacgcggaagcttcgatcaactacgcagacaggt

40

【表 4】

SEQ ID NO: 11

gtgacaaaaaagaggtgaaggacttctttcgttgggccaagaccatgtggtcgaggtcgaacacgagttctatgt
gaagaaaggaggcggaagaagcgccagcgccatcgacgctgacatctccgaaccgaagcggtgagagagagcg
tggcacaaccatcaacctcggtgcccaggcatccatcaattatgctggacaggt

SEQ ID NO: 12

atgccggggttttacgagattgtgattaagggtccccagcgaccttgacgagcatctgcccgccatttctgacagctt
tgtgaactgggtggccgagaaggaatgggagttgccccagattctgacatggatctgaatctgattgagcaggcac
ccctgaccgtggccgagaagctgcagcgcgacttctgacggaatggcgccgtgtgagtaaggccccggaggccctt
ttctttgtgcaatttgagaaggagagagctacttccacatgcacgtgctcgtggaaaccacggggtgaaatccat
ggttttgggacgtttcctgagtcagattcgcgaaaaactgattcagagaatttaccgcggtatcgagccgactttgc
caaactgggtcgcggtcacaagaccagaaatggcgccggaggcggaacaagggtgggtggtgagtgctacatcccc
aattacttgctccccaaaaccagcctgagctccagtgggcggtgactaataatggaacagtagctcagcgctgttt
gaatctcacggagcgtaaacgggtgggtggcgagcatctgacgcacgtgtcgagacgcaggagcagaacaaagaga
atcagaatcccaattctgatgcgcccgtgatcagatcaaaaacttcagccaggtacatggagctggctcggtggctc
gtggacaagggtgattacctcggaagaagcagtggtccaggaggaccaggcctcatacatctccttcaatgcggcctc
caactcgcggtcccaaatcaaggctgccttggaacaatgcgggaaagattatgagcctgactaaaaccgcccccgact
acctgggtggccagcagcccggtggaggacatttccagcaatcggtttataaaattttggaactaaacgggtacgat
ccccaatatgcggcttccgtctttctgggatgggccagaaaaagttcggaagaggaacaccatctggctgtttgg
gcctgcaactaccgggaagaccaacatcgcgaggccatagcccacactgtgccttctacgggtgcgtaaactgga
ccaatgagaactttcccttcaacgactgtgtcgacaagatgggtgatctgggtgggaggagggaagatgaccgccaag
gtcgtggagtcggccaaagccattctcgagggaagcaagggtgcgctggaccagaaatgcaagtcctcgccccagat
agaccgactcccgatgatctcacctccaacaccaacatgtgcgccgtcatcgacggaaatagcaccactttcgagc
atcaacagcctctgcaggatcggtatgtttaagttcgagctgacgaggcggtcgacctgatttcgggaaagtgaca
aaacaagaggtgaaggacttctttcgttgggccaagaccatgtggtcgaggtcgaacacgagttctatgtgaagaa
aggaggcggaagaagcgccagcgccatcggaagctgacatctccgaaccgaagcggtgagagagagcggtggcac
aaccatcaacctcggtgcccaggcatccatcaattatgctggacaggtacaaaaacaaatgttctcgtcactcaggaca
atgaatctgatgctgtttccctgcagacaatgcgagagaatgaatcagaattcaaatactgcttactcaggaca
gaaagactgttagagtgctttcccggtgtcagaatctcaaccggtttctgtcgtcaaaaaggcgtatcagaaactgt
gctacattcatcatatcatgggaaagggtgccagatgcttgactgcctgcgatctggtcaatgtggatttggtgac
tgcattcttgaacaataaatgatttaattcaggtatggctgccgatgggtatcttccagattggctcgaggacactc
tctctga

SEQ ID NO: 13

TetR binding site

tccctatcag tgatagaga

10

20

30

40

50

【表 5】

SEQ ID NO: 14

Modified MLP

cgccctcttc ggcacaaagg aaggtgattg gttttaggt gtagggcacg tgaccgggtg
ttctgaagg ggggctataa aaggtcccta tcagtgatag agactca

SEQ ID NO: 15

Modified MLP

cgccctcttc ggcacaaagg aaggtgattg gttttaggt gtagggcacg tgactcccta
tcagtgatag agaactataa aaggtcccta tcagtgatag agactca

10

SEQ ID NO: 16

Rep52 nucleotide sequence

CATGGAGCTGGTCGGGTGGctcgtggacaaggggattacctcggagaagcagtggtccaggaggaccaggcctcat
acatctccttcaatgcggcctccaactcgcggtcccaaatcaaggctgccttggacaatgcgggaaagattatgagc
ctgactaaaaccgccccgactacctggtgggccagcagcccgaggagacatttccagcaatcggatttataaaat
tttggaaactaaacgggtacgatcccaaatatgcggcttccgtctttctgggatggggcacgaaaaagttcggcaaga
ggaacaccatctggctgtttgggcctgcaactaccgggaagaccaacatcgcggaggccatagcccacactgtgccc
ttctacgggtgcgtaaactggaccaatgagaactttcccttcaacgactgtgtcgacaagatggtgatctggtggga
ggaggggaagatgaccccaaggtcgtggagtcggccaaagccattctcggaggaagcaaggtgcgcgtggaccaga
aatgcaagtcctcggcccagatagaccgactcccgatcggtcacctccaacaccaacatgtgcgcgtgattgac
ggaaactcaacgacctcgaacaccagcagccgttgcaagaccggatgttcaaatttgaactcaccgccgtctgga
tcatgactttgggaaggtcaccaagcaggaagtcaaagacttttccgggtgggcaaggatcacgtggtgaggtgg
agcatgaattctacgtcaaaaagggtggagccaagaaaagaccgccccagtgacgcagatataagttagcccaaa
cgggtgcgcgagtcagttgcgcagccatcgacgtcagacgggaagcttcgatcaactacgcagacaggtacaaaa
caaatgttctcgtcacgtgggcatgaatctgatgctgtttccctgcagacaatgcgagagaatgaatcagaattcaa
atatctgcttcaactcagggacagaaagactgttagagtgtttcccggtgcagaatctcaaccggttctgtcgtc
aaaaaggcgtatcagaaactgtgtacattcatcatatcattgggaaaggtgccagacgcttgactgcctgcgatct
gtcaatgtggatttggatgaCTGCATCTTTGAACAATAG

20

SEQ ID NO: 17

Rep40 nucleotide sequence

ATGGAGCTGGTCGGGTGGctcgtggacaaggggattacctcggagaagcagtggtccaggaggaccaggcctcata
catctccttcaatgcggcctccaactcgcggtcccaaatcaaggctgccttggacaatgcgggaaagattatgagcc
tgactaaaaccgccccgactacctggtgggccagcagcccgaggagacatttccagcaatcggatttataaaatt
ttggaactaaacgggtacgatcccaaatatgcggcttccgtctttctgggatggggcacgaaaaagttcggcaagag
gaacaccatctggctgtttgggcctgcaactaccgggaagaccaacatcgcggaggccatagcccacactgtgccc
tctacgggtgcgtaaactggaccaatgagaactttcccttcaacgactgtgtcgacaagatggtgatctggtgggag
gaggggaagatgaccccaaggtcgtggagtcggccaaagccattctcggaggaagcaaggtgcgcgtggaccagaa
atgcaagtcctcggcccagatagaccgactcccgatcggtcacctccaacaccaacatgtgcgcgtgattgacg

30

40

50

【表 6】

ggaactcaacgaccttcgaacaccagcagccgttgcaagaccggatgttcaaatttgaaactcaccgcgcgtctggat
catgacttttgggaaggtcaccaagcaggaagtcaaagactttttccggtgggcaaaggatcacgtggttgaggtgga
gcatgaattctacgtcaaaaagggtggagccaagaaaagaccgccccagtgacgcagatataagtgagccaaac
gggtgcgcgagtcagttgcgcagccatcgacgtcagacgcggaagcttcgatcaactacgcagacagattggctcga
ggacactctctcTAG

SEQ ID NO: 18

Rep52 amino acid sequence (AAV serotype 2)

MELVGWLVDKGITSEKQWIQEDQASYISFNAASNSRSQIKAALDNAGKIMSLTKTAPDYLVGQQPVEDISSNRIYKI
LELNGYDPQYAAASVFLGWATKKFGKRNTIWLFGPATTGKTNIAEIAHTVPFYGCVNWTNENFPFND CVDKMVIWWE
EGKMTAKVVESAKAILGGSKVRVDQKCKSSAQIDPTPIVTSNTNMCVIDGNSTTFEHQQPLQDRMFKFELTRRLD
HDFGKVTQEVKDFFRWAKDHVVEVEHEFYVKKGAKKRPA PSDADISEPKRVRESVAQPSTSDAEASINYADRYQN
KCSRHVGMNMLFPCRQCERMNQNSNICFTHGQKDCLECFVSESQPVSVVKAYQKLCYIHHIMGKVPDACTACDL
VNVDLDDCIFEQ*

10

SEQ ID NO: 19

Rep40 amino acid sequence (AAV serotype 2)

MELVGWLVDKGITSEKQWIQEDQASYISFNAASNSRSQIKAALDNAGKIMSLTKTAPDYLVGQQPVEDISSNRIYKI
LELNGYDPQYAAASVFLGWATKKFGKRNTIWLFGPATTGKTNIAEIAHTVPFYGCVNWTNENFPFND CVDKMVIWWE
EGKMTAKVVESAKAILGGSKVRVDQKCKSSAQIDPTPIVTSNTNMCVIDGNSTTFEHQQPLQDRMFKFELTRRLD
HDFGKVTQEVKDFFRWAKDHVVEVEHEFYVKKGAKKRPA PSDADISEPKRVRESVAQPSTSDAEASINYADRLAR
GHSL*

20

SEQ ID NO: 20

Rep78 nucleotide sequence (AAV serotype 2)

atgccgggggttttacgagattgtgattaaggtccccagcgaccttgacgggcatctgccccgcatctctgacagcctt
tgtgaactgggtggccgagaaggaatgggagttgccgccagattctgacatggatctgaatctgattgagcaggcac
ccctgacccgtggccgagaagctgcagcgcgactttctgacggaatggcgccgtgtgagtaaggccccggaggccctt
ttctttgtgcaatttgagaagggagagagctacttccacatgcacgtgctcgtggaaaccacccgggtgaaatccat
ggttttgggacgtttcctgagtcagattcgcgaaaaactgattcagagaatttaccgcgggatcgagccgactttgc
caaaactggttcgcgggtcacaagaccagaaatggcgccggaggcggaacaagggtggtggatgagtgctacatcccc
aattacttgctccccaaaaaccagcctgagctccagtgggcggtgactaataatggaacagtacctcagcgcctgttt
gaatctcacggagcgtaaaagggttggtggcgagcatctgacgcacgtgtcgagacgcaggagcagaacaaagaga
atcagaatcccaattctgatgcgccggtgatcagatcaaaaacttcagccaggtagatggagctgggtcggtggctc
gtggacaaggggattacctcggagaagcagtggtatccaggaggaccaggcctcatacatctccttcaatgcggcctc
caactcgcggtcccaaatcaaggctgccttggaacaatgcgggaaagattatgagcctgactaaaaccgccccgact
acctggtgggcccagcagccgtggaggacatttccagcaatcggtattataaaattttggaactaaacgggtacgat
ccccaatatgcggcttcctcttctgggatgggccagaaaaagttcggaagaggaacacatctggctgtttgg
gcctgcaactaccgggaagaccaacatcgcgaggccatagcccacactgtgcccttctacgggtgcgtaaaactgga

30

40

【表 7】

ccaatgagaactttcccttcaacgactgtgtcgacaagatggtgatctggtgggaggaggggaagatgaccgccaag
 gtcgtggagtcggccaaagccattctcgaggaagcaaggtgcgcgtggaccagaaatgcaagtcctcgcccagat
 agaccgactcccgatgatcgtcacctccaacaccaacatgtgcgcgtgattgacgggaactcaacgaccttcgaac
 accagcagccgttgcaagaccggatgttcaaatttgaactcaccgcgcgtctggatcatgactttgggaaggtcacc
 aagcaggaagtcaaagactttttccggtgggcaaaggatcacgtggttgaggtggagcatgaattctacgtcaaaaa
 ggggtggagccaagaaaagacccgccccagtgacgcagatataagtgagcccaaacgggtgcgcgagtcagttgcgc
 agccatcgacgtcagacgcggaagcttcgatcaactacgcagacaggtacccaaaacaaatgttctcgtcacgtgggc
 atgaatctgatgctgtttccctgcagacaatgcgagagaatgaatcagaattcaaatatctgcttactcacggaca
 gaaagactgttttagagtgtttcccggtgcagaatctcaaccggtttctgctgcaaaaaaggcgtatcagaaactgt
 gctacattcatcatatcatgggaaagggtgccagacgcttgcaactgcctgcgatctggtcaatgtggatttgatgac
 tgcacatctttgaacaaTAG

10

SEQ ID NO: 21

Rep68 nucleotide sequence (AAV serotype 2)

ATGCCGGGGTTTTACGAGattgtgattaaggtcccagcgaccttgacgagcatctgcccgcatcttctgacagctt
 tgtgaactgggtggccgagaaggaatgggagttgccgccagattctgacatggatctgaatctgattgagcaggcac
 ccctgaccgtggccgagaagctgcagcgcgactttctgacggaatggcgccgtgtgagtaaggcccgaggccctt
 ttctttgtgcaatttgagaaggagagagctacttccacatgcacgtgctcgtggaaaccacggggtgaaatccat
 gggtttgggacgtttcctgagtcagattcgcaaaaaactgattcagagaatttaccgcgggatcgagccgactttgc
 caaactgggttcgcggtcacaaagaccagaaatggcgccggaggcggaacaagggtggtggatgagtgtacatcccc
 aattacttgcctccccaaaaccagcctgagctccagtgggcgtGGACTAATATGGAACAGTACCTCAGCGCTGTTT
 GAATCTCACGGagcgtaaaacggttgggtggcgcagcatctgacgcacgtgtcgcagacgcaggagcagaacaaagaga
 atcagaatcccaattctgatgcgcgggtgatcagatcaaaaacttcagccaggtacatggagctggtcgggtggctc
 gtggacaaggggattacctcggaagcagtggtatccaggaggaccaggcctcatacatctccttcaatgcggcctc
 caactcgcggtcccaaatcaaggctgccttggacaatgcgggaaagattatgagcctgactaaaaccgcccccgact
 acctgggtgggcccagcagccggtggaggacatttccagcaatcggatttataaaattttggaactaaacgggtacgat
 ccccaatatgcggcttccgtctttctgggatggggccacgaaaaagttcggcaagaggaacaccatctgctgtttgg
 gctgcaactaccgggaagaccaacatcgcgaggccatagcccacactgtgcccttctacgggtgcgtaaaactgga
 ccaatgagaactttcccttcaacgactgtgtcgacaagatggtgatctggtgggaggaggggaagatgaccgccaag
 gtcgtggagtcggccaaagccattctcgaggaagcaaggtgcgcgtggaccagaaatgcaagtcctcgcccagat
 agaccgactcccgatgatcgtcacctccaacaccaacatgtgcgcgtgattgacgggaactcaacgaccttcgaac
 accagcagccgttgcaagaccggatgttcaaatttgaactcaccgcgcgtctggatcatgactttgggaaggtcacc
 aagcaggaagtcaaagactttttccggtgggcaaaggatcacgtggttgaggtggagcatgaattctacgtcaaaaa
 ggggtggagccaagaaaagacccgccccagtgacgcagatataagtgagcccaaacgggtgcgcgagtcagttgcgc
 agccatcgacgtcagacgcggaagcttcgatcaactacgcagacagTAG

20

30

40

50

【表 8】

SEQ ID NO: 22

Rep78 amino acid sequence (AAV serotype 2)

MPGFYEIVIKVPSDLGLPGISDSFVNWVAEKEWELPPDSMDLNLIEQAPLTVAEKLQDRDFLTEWRRVSKAPEAL
 FFVQFEKGESYFHHVLETTGVKSMVLGRFLSQIREKLIQRIYRGIEPTLPNWFVAVTKTRNGAGGGNKVVDECYIP
 NYLLPKTQPELQAWTNMEQYLSACLNLTERKRLVAQHLTHVSQTQEQNKENQNPNSDAPVIRSKTSARYMELVGWL
 VDKGITSEKQWQIEDQASYISFNAASNSRSQIKAALDNAGKIMSLTKTAPDYLVGQQPVEDISSNRIYKILELNGYD
 PQYAASVFLGWATKKFGKRNTIWLFGPATTGKTNIAEAIHTVPFYGCVNWTNENFPFNDCCVDMVIWWEEGKMTAK
 VVESAKAILGGSKVRVDQKCKSSAQIDPTPVIVTSNTNMCAVIDGNSTTFEHQQPLQDRMFKFELTRRLDHDGKVT
 KQEVKDFFRWAKDHVVEVEHEFYVKKGGAKKRPPAPSDADISEPKRVRESVAQPSTSDAEASINYADRYQNKCSRHV
 GNMNMLFPCRQCERMNQNSNICFTHGQKDCLECFPVSESQPVSVVKKAYQKLCYIHHIMGKVPDCTACTDLNVNDDLDD
 CIFEQ*

10

SEQ ID NO: 23

Rep68 amino acid sequence (AAV serotype 2)

MPGFYEIVIKVPSDLDEHLPGISDSFVNWVAEKEWELPPDSMDLNLIEQAPLTVAEKLQDRDFLTEWRRVSKAPEAL
 FFVQFEKGESYFHHVLETTGVKSMVLGRFLSQIREKLIQRIYRGIEPTLPNWFVAVTKTRNGAGGGNKVVDECYIP
 NYLLPKTQPELQAWTNMEQYLSACLNLTERKRLVAQHLTHVSQTQEQNKENQNPNSDAPVIRSKTSARYMELVGWL
 VDKGITSEKQWQIEDQASYISFNAASNSRSQIKAALDNAGKIMSLTKTAPDYLVGQQPVEDISSNRIYKILELNGYD
 PQYAASVFLGWATKKFGKRNTIWLFGPATTGKTNIAEAIHTVPFYGCVNWTNENFPFNDCCVDMVIWWEEGKMTAK
 VVESAKAILGGSKVRVDQKCKSSAQIDPTPVIVTSNTNMCAVIDGNSTTFEHQQPLQDRMFKFELTRRLDHDGKVT
 KQEVKDFFRWAKDHVVEVEHEFYVKKGGAKKRPPAPSDADISEPKRVRESVAQPSTSDAEASINYAD*

20

SEQUENCE LISTING FREE TEXT

- <210> 1
 <213> Rep nucleotide sequence (adeno-associated virus 2)
 <210> 2
 <213> Cap nucleotide sequence (adeno-associated virus 2)
 <210> 3
 <213> Cap amino acid sequence (adeno-associated virus 2)
 <210> 4
 <213> Wild-type adeno-associated virus 2 p5 promoter
 <210> 5
 <213> Sequence that forms part of the 5'-untranslated region (UTR) of the
 Homo sapiens beta-globin gene
 <210> 6
 <213> Wild-type adeno-associated virus 2 p19 promoter
 <210> 7
 <223> Non-functional p19 sequence
 <210> 8
 <213> Wild-type adeno-associated virus 2 p40 promoter
 <210> 9
 <223> Non-functional p40 promoter sequence
 <210> 10
 <213> Wild-type adeno-associated virus 2 adenovirus inhibitor
 <210> 11
 <223> Nucleotide sequence without a functional p40 promoter sequence
 <210> 12

30

40

50

<223> rep gene sequence with p19 and p40 promoters ablated, retaining the Rep78 and Rep68 coding sequences

<210> 13

<223> TetR binding site

<210> 14

<223> Modified MLP

<210> 15

<223> Modified MLP

<210> 16

<223> Rep52 nucleotide sequence

<210> 17

<223> Rep40 nucleotide sequence

<210> 18

<213> Rep52 amino acid sequence (adeno-associated virus 2)

<210> 19

<213> Rep40 amino acid sequence (adeno-associated virus 2)

<210> 20

<213> Rep78 nucleotide sequence (adeno-associated virus 2)

<210> 21

<213> Rep68 nucleotide sequence (adeno-associated virus 2)

<210> 22

<213> Rep78 amino acid sequence (adeno-associated virus 2)


<210> 23

<213> Rep68 amino acid sequence (adeno-associated virus 2)

【図面】


【図 1】

Figure 1



【図 2 A】

Figure 2A



10

20


30

40

50


【図 2 B】

Figure 2B



【図 3 A】


Figure 3A



10


【図 3 B】

Figure 3B



【図 4 A】

Figure 4A



20


30

40

50


【図 4 B】

Figure 4B




【図 5】

Figure 5




【図 6】

Figure 6



【図 7】

Figure 7



10

20


30

40

50


【図 8】

Figure 8




【図 9】

Figure 9




【図 10】

Figure 10



【図 11】

Figure 11



10

20


30

40

50


【図 1 2】

Figure 12



【図 1 3】


Figure 13



10


【図 1 4】

Figure 14




【図 1 5】

Figures 15A and 15B



30



40

50

【配列表】
0007522839000001.app

10

20

30

40

50

フロントページの続き

(33)優先権主張国・地域又は機関

英国(GB)

(31)優先権主張番号 2010835.3

(32)優先日 令和2年7月14日(2020.7.14)

(33)優先権主張国・地域又は機関

英国(GB)

(31)優先権主張番号 2011437.7

(32)優先日 令和2年7月23日(2020.7.23)

(33)優先権主張国・地域又は機関

英国(GB)

(74)代理人 110000040

弁理士法人池内アンドパートナーズ

(72)発明者 ケイウッド、ライアン

イギリス、オックスフォード オックスフォードシャー オーエックス4 4エイチジー、ロバート
ロビンソン アヴェニュー、 メダワー センター シー／オー オックスフォード ジェネティクス
リミテッド

(72)発明者 スー、ウェイヘン

イギリス、オックスフォード オックスフォードシャー オーエックス4 4エイチジー、ロバート
ロビンソン アヴェニュー、 メダワー センター シー／オー オックスフォード ジェネティクス
リミテッド

審査官 鈴木 崇之

(56)参考文献 国際公開第2019/020992 (WO, A1)

国際公開第2019/141993 (WO, A1)

欧州特許出願公開第03456822 (EP, A1)

特表2002-505085 (JP, A)

PNAS, 2011年, Vol. 108, No. 34, pp. 14294-14299

J. Virol., 2014年, Vol. 88, No. 24, pp. 14126-14137

(58)調査した分野 (Int.Cl., DB名)

C12N 15/00-15/90

C12N 1/00-7/08

C12P 1/00-41/00

CAplus/MEDLINE/EMBASE/BIOSIS (STN)