



19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11 Número de publicación: **2 274 656**

51 Int. Cl.:

C12N 15/12 (2006.01)

C07K 14/47 (2006.01)

C12N 1/19 (2006.01)

C12N 1/21 (2006.01)

C12N 5/10 (2006.01)

C07K 16/18 (2006.01)

G01N 33/68 (2006.01)

C12Q 1/68 (2006.01)

12

TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA

T3

86 Número de solicitud europea: **99968001 .0**

86 Fecha de presentación : **23.11.1999**

87 Número de publicación de la solicitud: **1131434**

87 Fecha de publicación de la solicitud: **12.09.2001**

54 Título: **Factor inductor de apoptosis.**

30 Prioridad: **23.11.1998 US 109595 P**

45 Fecha de publicación de la mención BOPI:
16.05.2007

45 Fecha de la publicación del folleto de la patente:
16.05.2007

73 Titular/es:
**Centre National de la Recherche Scientifique
3, rue Michel-Ange
75794 Paris Cédex 16, FR**

72 Inventor/es: **Penninger, Josef, M.;
Kroemer, Guido, Peter;
Siderovski, David, Peter;
Zamzami, Naoufal;
Susin, Santos, A. y
Snow, Bryan E. L.**

74 Agente: **Curell Suñol, Marcelino**

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín europeo de patentes, de la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas).

DESCRIPCIÓN

Factor inductor de apoptosis.

5 **Antecedentes de la invención****Campo de la invención**

La presente invención se refiere generalmente a nuevos polipéptidos con factor inductor de apoptosis (AIF) de mamífero, a los ADN que codifican los polipéptidos con AIF y a sus utilidades.

Tecnología relacionada

La apoptosis es esencial para el mantenimiento de las dimensiones del tejido y de la homeostasis del número de células de los organismos pluricelulares, y se cree que las anomalías apoptóticas desempeñan una función importante en el desarrollo de varias enfermedades neoplásicas así como de numerosas enfermedades neurodegenerativas.

Las mitocondrias desempeñan una función clave en la regulación de la apoptosis. Una variedad de fenómenos clave en la apoptosis involucran a las mitocondrias, incluyendo la liberación de activadores de caspasa (como por ejemplo el citocromo c), cambios en el transporte de electrones, pérdida del potencial de membrana de las mitocondrias (permitiendo de este modo que varias proteínas que se encuentran en el espacio de la intermembrana mitocondrial se liberen a través de la membrana de la mitocondria externa, participando por esta razón en la fase de degradación apoptótica), oxidación-reducción celular alterada y que involucra a la familia de proteínas Bcl-2 pro- y anti-apoptótica. Las diferentes señales que convergen en las mitocondrias para activar o inhibir estos fenómenos y sus efectos corriente abajo esbozan varias de las series de reacciones principales en la muerte celular fisiológica.

Debido a que la apoptosis y su regulación desempeñan una función crítica en el mantenimiento de la homeostasis celular y tisular, existe necesidad de desarrollar el material y los métodos para estimular o inhibir la apoptosis así como para proporcionar sistemas para el cribado de sustancias experimentales adicionales que estimulen o inhiban la apoptosis.

Sumario de la invención

La presente invención se refiere a los polinucleótidos aislados que codifican un factor inductor de apoptosis de mamífero. Los polinucleótidos se seleccionan de entre el grupo constituido por ADNc y ADN sintetizado químicamente, en el que el factor inductor de apoptosis de mamífero es el factor inductor de apoptosis murino o isoformas del mismo. La invención se refiere también al factor inductor de apoptosis humano que codifica polinucleótidos aislados o a isoformas del mismo. Todavía como otro aspecto, la presente invención se refiere a polinucleótidos aislados que codifican un polipéptido que presenta por lo menos del 70 al 95 por ciento de identidad con los polipéptidos que comprenden las secuencias de aminoácidos indicadas en las SEC. ID n°: 2, n° 3, n° 5, n° 6, n° 8, n° 9, n° 11, n° 12, n° 14, y n° 15.

La presente invención se refiere también a polinucleótidos aislados que codifican un factor inductor de apoptosis de mamífero, seleccionándose el polinucleótido de entre el grupo constituido por: (a) las moléculas de ADN indicadas en las SEC. ID n°: 1, n° 4, n° 7, n° 10, y n° 13; (b) las moléculas de ADN que se hibridan, en condiciones de alta severidad, con las moléculas de ADN definidas en (a); y (c) las moléculas de ADN que codifican una expresión para los aminoácidos codificados por cualquiera de las moléculas de ADN anteriores.

En otro de sus aspectos, la presente invención se refiere a vectores de expresión o vectores de clonación que comprenden cualquiera de los polinucleótidos que codifican a AIF descrito así como a las células huésped transformadas con cualquiera de los polinucleótidos descritos que codifican a AIF.

La presente invención se refiere también a células de mamífero que contienen un factor inductor de apoptosis de mamífero que codifica un ADN modificado de modo que permite una expresión mayor del factor inductor de apoptosis por medio de un fenómeno recombinatorio homólogo consistente en insertar una secuencia reguladora de la expresión en proximidad operativa al ADN que codifica el factor inductor de apoptosis, en la que la secuencia reguladora de la expresión insertada no es una secuencia reguladora de la expresión del factor inductor de apoptosis natural.

Aún en otro aspecto, la presente invención se refiere a los métodos para la producción de un polipéptido del factor inductor de apoptosis codificado por el polinucleótido según la presente invención, comprendiendo el método las etapas siguientes: (a) cultivar una célula huésped según las reivindicaciones 18 ó 21 en condiciones adecuadas para la expresión del polipéptido del factor inductor de apoptosis; y (b) recuperar el polipéptido del factor inductor de apoptosis expresado.

La presente invención se refiere asimismo a un factor inductor de apoptosis purificado de mamífero codificado por el polinucleótido según la presente invención, más particularmente a un factor inductor de apoptosis murino aislado y purificado y a las isoformas del mismo. La presente invención se refiere además a un factor inductor de apoptosis humano aislado y purificado y a las isoformas del mismo.

Todavía un aspecto más de la presente invención se refiere a las sustancias del anticuerpo que se unen específicamente a los factores estimulantes de apoptosis descritos anteriormente.

La presente invención se refiere también a los derivados de los factores estimulantes de apoptosis, descritos, que presentan una o más fracciones químicas unidas a éstos opcionalmente en un vehículo aceptable.

La presente invención se refiere asimismo a los métodos para la determinación de la presencia del factor inductor de apoptosis de mamífero en una muestra biológica que comprende las etapas siguientes: (a) obtener una muestra biológica; (b) exponer dicha muestra biológica a un anticuerpo específico para el factor inductor de apoptosis de mamífero según la presente invención; y (c) detectar la unión del anticuerpo específico para el factor inductor de apoptosis de mamífero en dicha muestra biológica. La presente invención se refiere también a los procedimientos para determinar la presencia de moléculas de polinucleótido específicas para el factor inductor de apoptosis del mamífero en una muestra biológica que comprende las etapas siguientes: (a) recoger una muestra biológica; (b) aislar las moléculas de polinucleótido de dicha muestra biológica; (c) hibridar a dichas moléculas de polinucleótido un reactivo de diagnóstico según la reivindicación 39 ó 40; y (d) detectar la unión de las moléculas de polinucleótido específicas para el factor inductor de apoptosis de mamífero en dichas muestras biológicas.

La presente invención se refiere asimismo a los métodos para determinar la presencia de una molécula de polinucleótido específica para el factor inductor de apoptosis de mamífero en una muestra de tejido o celular que comprende las etapas siguientes: (a) tomar una muestra de tejido o celular; (b) hibridar dicha muestra de tejido o celular con un reactivo de diagnóstico según la reivindicación 39 ó 40; y (c) detectar la unión de las moléculas de polinucleótido específicas para el factor inductor de apoptosis de mamífero en la muestra de tejido o celular a dicho reactivo de diagnóstico.

La presente invención se refiere asimismo a una composición que comprende un factor inductor de apoptosis de mamífero aislado y purificado según la presente invención y a un vehículo aceptable, diluyente y/o adyuvante, siendo el factor inductor de apoptosis de mamífero aislado un factor inductor de apoptosis murino o las isoformas del mismo o un factor inductor de apoptosis humano o las isoformas del mismo.

Todavía otro aspecto de la invención se refiere a la utilización de la composición descrita, a la preparación de un medicamento para inhibir la proliferación celular.

Otros objetivos y ventajas de la invención resultarán evidentes para los expertos en la materia a partir de la descripción detallada siguiente, que hace referencia a los dibujos, así como las reivindicaciones adjuntas.

Breve descripción de los dibujos

Las Figs. 1A a 1E presentan la estructura primaria y la distribución en el tejido de la proteína AIF. Específicamente, la Fig. 1A describe la alineación de la secuencia de aminoácidos del AIF de ratón y humana con el sistema ferredoxina NADH reductasa de benceno 1,2 dioxigenasa en *Pseudomonas putida* (BDSF). La secuencia subrayada en el AIF de ratón (mAIF) iguala los datos de la espectroscopía de masas obtenidos con el mAIF purificado digerido con tripsina. Los guiones indican la identidad del aminoácido; las casillas rayadas señalan la similitud de los aminoácidos; las casillas negras destacan las secuencias con localización de mitocondrias (MLS) y las supuestas secuencias con localización nuclear (NLS). Los números de registro en el GenBank para AIF de ratón y humana son It232169 (AF100927) e It232173 (AF100928), respectivamente.

La Fig. 1B presenta la hibridación fluorescente *in situ* (FISH) de la sonda de ADN del AIF (fluorescencia roja) en un cariograma de ratón macho teñido por contraste con DAPI (fluorescencia azul). La posición detallada del gen del AIF fue cartografiada para la zona A6 del cromosoma X (10 determinaciones con resultados idénticos).

La Fig. 1C presenta el modelo de la expresión de ARNm tisular del AIF. Se hibridó una sonda de ADNc del AIF con una transferencia Northern de ARN poliadenilado de páncreas humano (1), riñón (2), músculo esquelético (3), hígado (4), cerebro (6), placenta (5) y corazón (7).

La Fig. 1D presenta el modelo de escisión proteica del AIF. Un antisuero producido contra los aminoácidos nº 151 a 200 de AIF de ratón (mAIF) se utilizó para detectar la proteína AIF contenida en las mitocondrias del hígado (1), riñón (2), corazón (3), cerebro (5) o bazo (6) de ratón. Las transferencias de referencia realizadas en presencia de péptidos inmunógenos que comprenden los aminoácidos nº 151 a 200 proporcionaron resultados negativos para las mitocondrias del hígado.

La Fig. 1E presenta la importación de mitocondrias de AIF. Se realizó la transcripción y la traducción *in vitro* utilizando el kit de transcripción/traducción acoplado al lisado de TNT (Promega) y [³⁵S]metionina en ausencia (1) o presencia (2) de ADNc con mAIF. Se midió la retención de este producto utilizando las mitocondrias que se dejaron sin tratar (3), se digirieron con proteinasa K para eliminar la proteína unida en la superficie (4) se desenergizaron con CCCP 100 µM (5) o se trataron tanto con proteinasa K como CCCP (6). Obsérvese la maduración de AIF en una proteína de 57 kDa que está retenida por las mitocondrias de un modo que puede ser inhibido por CCCP y que está protegido contra la proteólisis.

Las Figs. 2A a 2F presentan la distribución submitocondrial y subcelular en AIF en células normales y apoptóticas. Específicamente, la Fig. 2A presenta la localización submitocondrial de AIF, de la liberación de AIF por apertura de poros de PT y neutralización mediada por anticuerpos de la bioactividad de AIF contenida en el espacio de la intermembrana mitocondrial. Se realizaron transferencias Western en el lisado de mitocondrias de hígado de ratón (1), proteínas de la matriz (2), membrana interna (3), espacio de la intermembrana (4), membrana externa (5), el sobrenadante de las mitocondrias no tratadas (6) o el de las mitocondrias tratadas con atractilisida 5 mM (7), Ca^{2+} 200 μM (8), ciclosporina A 1 μM (9), atractilisida +CsA (10) o Ca^{2+} + ciclosporina A (11). Además, el sobrenadante de las mitocondrias tratadas con atractilisida se pseudoinmunosuprimió utilizando un suero preinmune (12), o AIF inmunosuprimido en ausencia (13) o presencia (14) de péptidos inmunógenos derivados de AIF (véase el Ejemplo 2, a continuación) capaz de bloquear el antisuero de AIF. Se determinó la capacidad de las alícuotas de cada preparación para estimular la hipoploidia nuclear en núcleos aislados de HeLa.

La Fig. 2B presenta la localización subcelular de AIF en comparación con citocromo *c*. El hibridoma 2B4,11 de linfocito T que expresa un vector de referencia (Neo) o Bcl-2 humano se cultivaron durante 12 horas en ausencia o presencia del análogo de dexametasona (DEX, 1 μM) de glucocorticoide sintético, seguido de la detección por inmunotransferencia de AIF o de citocromo *c* en los lisados de células completas o de fracciones subcelulares diferentes (anticuerpo contra citocromo *c* está disponible en el mercado; véase el Ejemplo 2 a continuación para anticuerpos contra AIF).

La Fig. 2C presenta la detección por inmunofluorescencia de AIF en fibroblastos de rata-1 transfectados con un vector de referencia (Neo) o Bcl-2 y tratados con estaurosporina (Stauro, 1 μM , 2 h.) o sin tratar. Se fijaron las células, se permeabilizaron y se tiñeron con un anticuerpo anti-AIF (véase el Ejemplo 2) revelado mediante un conjugado marcado con FITC secundario. En las células Neo, el tratamiento con estaurosporina conduce a la generación de dos fenotipos, uno con condensación parcial de cromatina (~80% de células, etapa I) y otro con condensación más avanzada de cromatina y fragmentación nuclear (~20% de células, etapa II), identificada por microscopía en contraste de fase o contador-tinción con Hoechst 33342 (no mostrado). Las puntas de flecha están colocadas en el centro del núcleo.

La Fig. 2D presenta la detección por inmunofluorescencia del citocromo *c*. El citocromo *c* se detectó mediante un anticuerpo monoclonal específico puesto de manifiesto con un anticuerpo marcado con PE secundario. Se trataron las células y se clasificaron como en la Fig. 2C.

La Fig. 2E presenta la morfología nuclear y DY_m . Se tiñeron células de hígado con el colorante Hoechst 33342 (fluorescencia azul) intercalador de ADN o el colorante CMXRos (fluorescencia roja) sensible a DY_m . Los resultados son representativos de cinco experimentos independientes.

La Fig. 2F presenta la microscopía inmunoelectrónica de localización de AIF en células de linfoma de linfocitos T de Jurkat normales (referencia) y en células tratadas con ceramida (25 μM , 16 horas) que ponen de manifiesto el esponjamiento de mitocondrias y la condensación de cromatina. Se detectó el AIF utilizando antisuero específico revelado mediante un anticuerpo marcado con partículas de Immunogold (5 nm) secundario (flechas blancas). Se presentan las secciones representativas de mitocondrias (mito, M) o de los núcleos (N) cerca de la envoltura (e).

Las Figs. 3A a 3G presentan los efectos del AIF en núcleos aislados y mitocondrias. Específicamente, la Fig. 3A presenta los efectos de la pérdida de ADN estimulada por AIF y la condensación de cromatina en núcleos aislados. Se cultivaron núcleos de HeLa a 37°C en ausencia (referencia) o presencia de 100 ng/ml de AIF recombinante durante 90 min., seguido de tinción con un colorante de yoduro de propidio (PI) intercalador de ADN y análisis citométrico de flujo del contenido de ADN nuclear. Las inserciones demuestran las fotografías típicas obtenidas mediante tinción con DAPI.

La Fig. 3B presenta la determinación por microscopía electrónica de la condensación de cromatina de las células tratadas como en A y fijadas con tetróxido de osmio.

La Fig. 3C presenta la concentración y la dependencia del tiempo de los efectos de AIF en núcleos aislados. Se cultivaron núcleos de HeLa durante 90 min. con la concentración indicada de AIF rec. o de varios mutantes por delección de AIF (panel izquierdo). Alternativamente, se trataron los núcleos en diferentes periodos con la dosis indicada de AIF (panel derecho). Se determinó la hipoploidia nuclear mediante tinción con PI y citometría de flujo como en A.

La Fig. 3D presenta la electroforesis en gel de campo pulsado de los núcleos de HeLa que se dejaron sin tratar (banda 1) o se cultivaron durante 5 min. (2), 15 min. (3), 30 min. (4), 60 min. (5) o 90 min. (6) con 100 ng/ml de AIF sola, 90 min. con 100 ng/ml de AIFD1-377 (7) o 90 min. con 100 ng de AIF (8-11) en presencia de 200 μM de ácido *p*-cloromercurifenil-sulfónico (8), 200 μM del inhibidor caspasa de amplio espectro, Z-VAD.fmk (9), EDTA 5 mM (10) o EGTA 5 mM (11). Además, en cada preparación nuclear se evaluó la frecuencia de núcleos hipoploides como en A.

La Fig. 3E presenta el esponjamiento mitocondrial estimulado por AIF. Se controlaron en continuo mitocondrias de hígado de rata purificados para esponjamiento de gran amplitud. Las flechas indican la adición de Ca^{2+} (200 μM ; referencia positiva), AIF (100 ng/ml), citosol (100 μg de proteína por ml) y/o Z-VAD.fmk (100 μM , añadido previamente a la mezcla citosol/AIF). Obsérvese que únicamente la adición combinada de AIF más citosol (panel derecho)

produce esponjamiento mitocondrial. Las mutaciones (D180-638, D1-377, D563-638) por delección de AIF fueron inactivas en este ensayo.

La Fig. 3F presenta la liberación inducida por AIF del citocromo *c* y caspasa-9 de mitocondrias. Se sometieron mitocondrias aisladas a lisis osmótica (1) o se trataron como en A (15 min.) solamente con tampón (2), AIF rec. (3), citosol (4), AIF rec. + citosol (5), o AIF rec. + citosol + Z-VAD.fmk (6) y sus sobrenadantes se sometieron a análisis por inmunotransferencia de citocromo *c* y caspasa-9. Obsérvese que Z-VAD.fmk no inhibe la liberación de caspasa-9 pero interfiere algo con su activación proteolítica.

La Fig. 3G presenta la activación estimulada por AIF de una caspasa. Se determinó la capacidad de los mismos sobrenadantes mitocondriales que en la Fig. 3F para escindir el sustrato Z-VAD.afc de caspasa, que conduce a la generación del fluorocromo afc. El valor 100% se refiere a la activación enzimática obtenida por lisis osmótica de las mitocondrias.

Las Figs. 4A a 4D presentan los efectos del AIF en células sanas. Específicamente, la Fig. 4A presenta el efecto de la microinyección de AIF en las células. Se inyectó tampón solamente o AIF recombinante (10 μ M) en el citoplasma de células Rat-1, que se cultivaron durante 90 min. en ausencia o presencia de Z-VAD.fmk 100 μ M (añadida 15 min. antes de la inyección). Las células microinyectadas pudieron identificarse porque el inyectado contenía dextrano con FITC (fluorescencia verde no mostrada). Microfotografías representativas (tres experimentos independientes, 100 a 200 células microinyectadas por sesión) de células viables teñidas con el colorante CMXRos sensible a DY_m y Hoechst 33342 (como en la Fig. 2E, paneles superiores) o Anexina-V, que marca los restos de fosfatidilserina expuestos en superficie (fluorescencia roja en los paneles inferiores).

La Fig. 4B presenta la apoptosis estimulada por la sobreexpresión de AIF reforzada por transfección. Se transfectaron transitoriamente células de Jurkat con vector pcADN3.1 solamente (referencia) o ADNc con AIF de ratón (bajo la referencia de un activador de citomegalovirus (véase el vector pcADN3.1 de Invitrogen). Tras de 24 horas de cultivo, las células se tiñeron con los fluorocromos indicados para determinar la frecuencia y alteraciones asociadas a la apoptosis: pérdida de DY_m (fluorocromo: DiOC₆(3), exposición a fosfatidilserina (fluorocromo: Anexina V-FITC) o pérdida del ADN nuclear (fluorocromo: yoduro de propidio, PI, tras permeabilización con etanol). Los números se refieren al porcentaje de células con características apoptóticas. Los resultados son representativos de 3 experimentos diferentes.

La Fig. 4C presenta la cuantificación de la apoptosis nuclear estimulada por microinyección (100 células mínimo, 2 a 3 determinaciones, X $\pm$ SEM) de AIF recombinante, un mutante de AIF inactivo por delección, citocromo *c* o atractilisida en células Neo o Rat-1 transfectadas con Bcl-2.

La Fig. 4D presenta la inhibición de la apoptosis nuclear estimulada por atractilisida y estaurosporina mediante microinyección de un antisuero anti-AIF. Se microinyectaron células Rat-1 con atractilisida (ATR, 50 μ M) sola o atractilisida diluida en suero de referencia, antisuero anti-AIF y/o péptidos inmunógenos derivados de AIF 100 μ M. 180 min. después de la microinyección, se tiñeron las células con Hoechst 33342 y CMXRos (como en la Fig. 4A, panel superior). Alternativamente, se cultivaron las células durante 120 min. con estaurosporina (1 μ M, como en las Figs. 2C-2E), se añadieron al medio de cultivo tras la microinyección de antisuero de referencia o anti-AIF. Obsérvese que las células inyectadas con atractilisida y tratadas con estaurosporina no conservan el colorante CMXRos sensible a DY_m.

Descripción detallada de la invención

Tanto la muerte celular fisiológica (apoptosis) como, en algunos casos, la muerte celular accidental (necrosis) entrañan un procedimiento en dos etapas. En el primer nivel, numerosos estímulos fisiológicos y algunos patológicos desencadenan un aumento de permeabilidad de la membrana mitocondrial. Las mitocondrias liberan factores apoptógenos a través de la membrana externa y disipan el gradiente electroquímico de la membrana interna. La transición de la permeabilidad mitocondrial (PT) implica un complejo dinámico de multiproteína formado en el punto de contacto entre las membranas mitocondriales interna y externa. El complejo PT puede funcionar como un detector de tensión y lesión, así como para determinadas señales conectadas con los receptores. La inhibición de PT por intervención farmacológica en las estructuras mitocondriales o en la expresión mitocondrial de la oncoproteína Bcl-2 inhibidora de apoptosis impide la muerte celular, lo que sugiere que PT es un fenómeno limitativo de velocidad del proceso de muerte. En un segundo nivel, las consecuencias de la disfunción mitocondrial (colapso del potencial de la membrana interna mitocondrial, desacoplamiento de la cadena respiratoria, hiperproducción de aniones superóxido, destrucción de la biogénesis mitocondrial, pérdida del calcio y del glutatión de la matriz y liberación de proteínas de la intermembrana solubles) entraña una catástrofe bioenergética que culmina en la destrucción de la integridad de la membrana plasmática (necrosis) y/o la activación de la proteasa apoptógena específica (caspasa) por las proteínas mitocondriales que se filtran en el citosol (citocromo *c*, factor inductor de apoptosis) con la activación de endonucleasa secundaria (apoptosis). La velocidad relativa de estos dos procesos (catástrofe bioenergética frente a activación de la proteasa y de la endonucleasa) determina si una célula experimentará necrosis primaria o apoptosis. La adquisición de las propiedades bioquímicas ultraestructurales de la apoptosis se basa críticamente en la liberación de proteasas apoptógenas o de activadores de proteasa en las mitocondrias. El hecho de que los fenómenos mitocondriales controlan la muerte celular presenta mayores implicaciones para el desarrollo de fármacos citoprotectores y citotóxicos.

La apertura del poro de transición de permeabilidad (PT) mitocondrial, que está bajo el control de los miembros de la familia Bcl-2, es uno de los fenómenos decisivos del proceso apoptótico [Kroemer, *Nature Medicine*, **3**:614-620 (1997); Green *et al.*, *Science* **281** (28 de agosto, 1998)]. La apertura del poro de PT puede producir la destrucción física de la membrana mitocondrial externa (vander Heiden *et al.*, *Cell* **91**:627-637 (1997)], que conduce a la liberación de proteínas solubles del espacio de la intermembrana. La fracción de intermembrana mitocondrial contiene numerosos factores diferentes, potencialmente apoptógenos que incluyen el citocromo *c* [Liu *et al.*, *Cell* **86**:147-157 (1996); Kluck *et al.*, *Science* **275**:1132-1136 (1997)], procaspasas 2, 3 y 9 [Mancini *et al.*, *J. Cell Biol.* **140**:1485-1495 (1998); Susin *et al.*, *J. Exp. Med.*, en imprenta], y un factor inductor de apoptosis (AIF) que basta para forzar a los núcleos aislados para que adopten una morfología apoptótica [Zamzami *et al.*, *J. Exp. Med.* **183**:1533-1544 (1996); Susin *et al.*, *J. Exp. Med.* **184**:1331-1342 (1996)]. Una actividad de AIF que mantiene su bioactividad en presencia del inhibidor Z-VAD.fmk de caspasa [Susin *et al.*, *J. Exp. Med.*, en imprenta] se purificó a partir del sobrenadante de mitocondrias de hígado de ratón sometidas a apertura de poros de PT. Los datos espectrométricos de masas en serie obtenidos en la digestión triptica de una sola banda de SDS-PAGE teñida con plata [Ducret *et al.*, *Protein Sci.* **7**:706-719 (1998)] se utilizó para identificar una etiqueta de la secuencia expresada (EST GenBank nº: 1595214; secuencia de aminoácidos (aa) subrayada en la Fig. 1A), que permite la clonación del clon de los ADNc completos correspondientes de ratón y de hombre (Fig. 1A). El AIF se conserva muy bien entre las dos especies de mamífero (92% de identidad de aminoácidos) y lleva una homología muy significativa con varias ferredoxinas eurobacterianas y arqueobacterianas u oxidorreductasas de NADH en su parte del terminal C (aminoácidos nº 128 a nº 613 para mAIF), lo que sugiere firmemente que AIF se conserva a través de todas las especies de mamífero. Su porción del terminal N no presenta dicha homología con las oxidorreductasas y en su lugar lleva una secuencia de direccionamiento mitocondrial (encapsillada en la Fig. 1A) [Claros *et al.*, *Eur. J. Biochem.* **241**:779-786 (1996)]. Solamente un cromosoma de ratón se hibrida con el ADNc con AIF *in situ* (Fig. 1B). Este gen está situado en la zona A6 del cromosoma X de ratón, que es sinténica con la zona Xq25-26 del cromosoma X humano, donde está localizado el gen AIF humano (número de registro en EMBL nº Z81364). Basada en el análisis por transferencia Northern, una especie de ARNm del AIF de 2,4 kb se expresa de modo omnipresente en el tejido humano (Fig. 1C). Este descubrimiento fue confirmado en el contexto proteico para los tejidos de ratón que utilizan un anticuerpo producido contra los aminoácidos nº 151 a 200 de AIF, que reconocen una proteína única de ~57 kDa (Fig. 1D).

El producto principal de la transcripción/traducción de ADNc de AIF obtenido *in vitro* presenta un peso molecular aparente próximo al esperado de 66,8 kDa. Cuando se importa en mitocondrias *in vivo*, da lugar a una proteína más corta correspondiente al AIF maduro (Fig. 1E). La bioactividad e inmunorreactividad del AIF se encuentra exclusivamente en el espacio de la intermembrana mitocondrial, como se puso de manifiesto por fraccionamiento sub-mitocondrial (Fig. 2A). La proteína AIF de 57 kDa se libera en la apertura de poros de PT por agentes tales como actinosida (ATR), calcio o terc-butildihidroperóxido, y esta liberación es evitada por el inhibidor ciclosporina A del poro PT (Fig. 2A). La inmunorreducción del AIF del grupo completo de proteínas de la intermembrana mitocondrial también elimina la actividad biológica que estimula la apoptosis nuclear *in vitro*, lo que indica que el AIF es el principal factor mitocondrial que produce apoptosis nuclear (Fig. 2A). El fraccionamiento subcelular (Fig. 2B), el análisis de inmunofluorescencia (Fig. 2C) y la microscopía inmunoelectrónica (Fig. 2F) confirman que el AIF se encuentra exclusivamente en las mitocondrias de las células normales no tratadas. Tras la estimulación de la apoptosis por estauroporina, el AIF se traslada por lo menos parcialmente al citosol y al núcleo (Fig. 2C) al mismo tiempo que la DY_m se reduce y los núcleos se vuelven traslúcidos con DAPI o tinción con Hoechst 33342 y manifiestan la condensación de cromatina periférica (etapa I en la Fig. 2C-2E). En las células Rat I, la liberación total de citocromo *c* de la mitocondria al citosol es únicamente visible en una etapa posterior, a saber cuando se produce la condensación avanzada de cromatina y la fermentación nuclear (cariorexis) (etapa II en la Fig. 2C a 2E) y el AIF aparece concentrado en el núcleo (Fig. 2C). La localización nuclear del AIF es compatible con la composición global de aminoácidos [Cedano *et al.*, *J. Mol. Biol.* **266** (1997)] y la presencia de varias señales supuestas de localización nuclear (Fig. 1A) [Boulikas, *Crit. Rev. Eukaryotic Gene Expression* **3**:193-227 (1993)]. La sobreexpresión de Bcl-2 impide la liberación mitocondrial activada por estauroporina de AIF y el citocromo *c* y estabiliza la DY_m (Fig. 2C a 2E) de acuerdo con las observaciones anteriores [Zamzami *et al.*, *J. Exp. Med.* **183**:1533-1544 (1996); Liu *et al.*, *Cell* **86**:147-157 (1996); Susin *et al.*, *J. Exp. Med.* **184**:1331-1342 (1996); Kluck *et al.*, *Science* **275**:1132-1136 (1997); vander Heiden *et al.*, *Cell* **91**:627-637 (1997); Susin *et al.*, *J. Exp. Med.*, en imprenta; y Shimizu *et al.*, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **95**:1455-1459 (1998)]. La relocalización diferencial de las dos proteínas de la intermembrana citocromo *c* y AIF, que se trasladan al citosol y al núcleo, respectivamente, se ha confirmado para otros tipos de células y en respuesta a otros estimulantes de apoptosis, por ejemplo para las células del hibridoma de linfocitos T tratadas con un agonista receptor de grupo corticoide (Fig. 2B). La sobreexpresión de Bcl-2 impide asimismo la liberación mitocondrial del AIF en esta línea celular (Fig. 2B). La inmunoelectromicroscopía confirma la redistribución del AIF aún en otro modelo de apoptosis, a saber las células de linfoma de Jurkat tratadas con ceramida y pone de manifiesto un enriquecimiento particular de AIF en áreas de densidad electrónica de la condensación de cromatina periférica (Fig. 2F). En conjunto, estos datos indican una transposición mitocondrio-nuclear del AIF durante la apoptosis.

Cuando se añade a los núcleos purificados de las células HeLa, la proteína AIF recombinante estimula la pérdida de ADN (es decir, escisión en bruto de 50 kbp, que conduce a la pérdida de ADN), medida por citometría de flujo (Fig. 3A). Además, el AIF provoca la condensación de cromatina periférica, determinada mediante tinción con Hoechst 33342 (Fig. 3A) o por microscopía electrónica (Fig. 3B). Estos efectos de AIF se observan para la proteína completa pero no para varias mutaciones por delección (D180 a 638, D1-377, D563-638) (Fig. 3C). Es probable que sean independientes de su supuesta función de oxidorreductasa, por lo que la AIF recombinante carece de los grupos prostéticos FAD y NAD y no pone de manifiesto ninguna actividad de oxidorreductasa en los análisis enzimáticos normales (no mostrados). El efecto de AIF en los núcleos aislados no requiere factores citoplásmicos adicionales, es

dependiente de la dosis y es rápido, con efectos en tan poco como 1 min. (Fig. 3C). Está acompañado por la digestión de cromatina en fragmentos de ~50 kbp (Fig. 3D). Esta fragmentación del ADN a gran escala está inhibida por el EDTA quelante del Ca^{2+} y por el ácido p-cloromercurifenilsulfónico pero no por el inhibidor Z-VAD.fmk de caspasa de amplio espectro (Fig. 3D). La AIF recombinante añadida a los núcleos purificados no produce la fragmentación del ADN oligonucleosómico (es decir, “escalonomiento” del ADN de los fragmentos de 120 kbp, independientemente de la pérdida de ADN observada anteriormente con los fragmentos en bruto de 50 kbp) ni escinde el ADN del plásmido purificado (no mostrado). Además de sus efectos nucleares, el AIF recombinante actúa en las mitocondrias. En presencia de citosol, el AIF produce mitocondrias purificadas que experimentan esponjamiento de gran amplitud indicativo de la permeabilización de la membrana mitocondrial (Fig. 3D). Este efecto mitocondrial del AIF está acompañado de la liberación de citocromo *c* y de caspasa-9 (Fig. 3F). Ninguno de estos efectos del AIF, en los núcleos aislados o en los mitocondrias, es impedido por el inhibidor Z-VAD.fmk de caspasa de amplio espectro (Fig. 3D a 3F), lo que sugiere que son independientes de la caspasa. Sin embargo, el sobrenadante de mitocondrias tratado con AIF más citosol contiene una actividad enzimática inhibible por Z-VAD.fmk que escinde el sustrato Z-VAD.fmk de caspasa (Fig. 3E). Esta actividad es por lo menos debida en parte a la presencia de caspasa-9 activada (Fig. 3G y Susin *et al.*, *J. Exp. Med.*, en imprenta). Por lo tanto, AIF puede activar la caspasa-9 (y supuestamente otras caspasas) mediante un mecanismo indirecto, dependiente de la mitocondria.

En una serie más de experimentos, se determinó si la localización ectópica (extramitocondrial) del AIF estimularía la apoptosis *in vivo*. En la microinyección de AIF recombinante en el citoplasma de las células vivas, el AIF estimula rápidamente (60 a 90 min.) varias marcas de apoptosis: condensación de cromatina nuclear y pérdida de ADN, disipación del DY_m y exposición de fosfatidilserina en la hojilla externa de la membrana plasmática (Fig. 4A). La sobreexpresión reforzada por transfección de AIF natural también estimula el colapso de DY_m , la exposición de fosfatidilserina y la hipoploidia (Fig. 4B). Ninguno de los efectos mediados por el AIF microinyectado es inhibido por Z-VAD.fmk (Fig. 4A y 4C), aunque Z-VAD.fmk logró prevenir la apoptosis dependiente de caspasa, estimulada por citocromo *c* (Fig. 4C) [Kluck *et al.*, *Science* **275**:1132-1136 (1997); Li *et al.*, *Cell* **91**:479-489 (1997)]. Además, la valoración cuidadosa del AIF puso de manifiesto una diferencia no significativa en su eficacia para estimular la apoptosis en las células de referencia y en las células transfectadas con Bcl-2 (Fig. 4C). Como referencia interna para su efecto citoprotector, Bcl-2 impide la pérdida de DY_m [Zamzami *et al.*, *J. Exp. Med.* **183**:1533-1544 (1996); Susin *et al.*, *J. Exp. Med.* **184**:1331-1342 (1996); y datos no mostrados] y la apoptosis nuclear estimulada por microinyección del agente atractilosida de apertura del poro de PT (Fig. 4C). La microinyección del antisuero específico para el AIF elimina los signos morfológicos de la apoptosis nuclear estimulada por atractilosida, aunque no impide la disipación de DY_m estimulada por atractilosida (Fig. 4D). Ninguno de dichos efectos inhibidores se observa cuando el anticuerpo específico para AIF es neutralizado mediante la inyección conjunta de un exceso de péptidos inmunógenos (véase el Ejemplo 2 a continuación). El antisuero anti-AIF no presenta tampoco ningún efecto sobre el colapso de DY_m estimulado por estaurosporina, aunque impide los cambios nucleares estimulados por estaurosporina (Fig. 4D), puntuando por defecto de nuevo la contribución del AIF a la apoptosis nuclear.

Los datos publicados en la presente memoria demuestran que AIF es una proteína de la intermembrana mitocondrial apoptógena. Como el citocromo *c*, es probable que el AIF sea una proteína bifuncional, filogenéticamente vieja, con una función de aceptor/donante de electrones (oxidoreductasa) y una segunda función apoptógena independiente [Kluck *et al.*, *EMBO J.* **16**:4639-4649 (1997)]. El citocromo *c* se redistribuye desde la mitocondria al citosol y estimula la apoptosis nuclear con ayuda de varios factores adicionales (Apaf-1, ATP y procaspasa-9), que activan conjuntamente la caspasa-3, permitiendo la activación de todavía otro factor, DFF/CAD, que activa la fragmentación del ADN oligonucleosómico [Li *et al.*, *Cell* **91**:479-489 (1997); Liu *et al.*, *Cell* **89**:175-184 (1997); y Enari *et al.*, *Nature* **391**:43-50 (1998)]. Aunque se ha considerado a DFF/CAD como el principal efector citoplasmático responsable de la apoptosis nuclear [Liu *et al.*, *Cell* **89**:175-184 (1997); y Enari *et al.*, *Nature* **391**:43-50 (1998)], no es el único factor que estimula la condensación de la cromatina apoptótica [Samejima *et al.*, *J. Cell. Biol.* **143**:225-239 (1998)]. En estricto contraste con el citocromo *c*, el AIF presenta un efecto directo sobre los núcleos aislados en los que se desencadena la condensación de cromatina así como la fragmentación de cromatina a gran escala. Este tipo de fragmentación de ADN precede a la degradación del ADN oligonucleosómico en varios modelos celulares de apoptosis [Oberhammer *et al.*, *EMBO J.* **12**:3679-3684 (1993); Lagarkova *et al.*, *J. Biol. Chem.* **270**:20239-20241 (1995)] y puede ser independiente de la caspasa (Fig. 3D y ref. 22). Además, el AIF afecta la función barrera de las membranas mitocondriales (Fig. 3E, 3F), lo que sugiere que puede involucrarse en un bucle de autoampliación en el que el AIF liberado de algunos mitocondrias actúa en otros mitocondrias para comprometer su función de membrana [Susin *et al.*, *J. Exp. Med.* **186**:25-37 (1997)]. Bcl-2 inhibe la liberación mitocondrial de AIF (Fig. 2C y 2F) pero no presenta ningún efecto citoprotector, una vez que el AIF está presente en el citosol (Fig. 4C). Por lo tanto, es probable que el AIF actúe más allá o independientemente del Bcl-2 y de los puntos de comprobación de la caspasa del procedimiento de muerte celular. Por lo tanto, el AIF proporciona una nueva conexión molecular entre la permeabilización de la membrana mitocondrial y la muerte celular apoptótica.

La presente invención se refiere al descubrimiento y la caracterización de un polipéptido, denominado factores estimulantes de la apoptosis mitocondrial (AIF). Se dan a conocer asimismo los AIF de mamíferos que codifican los ADN, que desempeñan una función crítica en la estimulación de la apoptosis.

En un aspecto, la presente invención se refiere a la identificación de materiales que funcionan como estimulantes de apoptosis. En particular, la invención se refiere al aislamiento, purificación y secuenciado de determinados ácidos nucleicos que corresponden al gen del AIF de mamífero, así como a los polipéptidos correspondientes codificados por estos ácidos nucleicos. La invención por lo tanto comprende los polinucleótidos con las secuencias indicadas en

la SEC. ID. nº: 1 (ADN que codifica el AIF de ratón) y SEC. ID. nº: 7 (ADN que codifica el AIF humano) y a los polinucleótidos que codifican el AIF, mediante codones degenerados, variantes degeneradas, variantes conservadas, variantes alélicas y fragmentos de los mismos, que poseen todos una actividad asignada a AIF, incluyendo pero sin limitarse a, la apoptosis por estimulación (por ejemplo, pero no limitada a la isoforma de ratón: SEC. ID. nº: 4; isoformas humanas: SEC. ID. nº: 10 y nº 13). Los polinucleótidos y polipéptidos de AIF de la invención son útiles en condiciones relacionadas con la pérdida de estimulación de apoptosis (por ejemplo varias enfermedades neoplásicas) en condiciones relacionadas con el aumento de estimulación de la apoptosis (por ejemplo varias enfermedades neurodegenerativas), así como otras enfermedades y disfunciones que están relacionadas con las anomalías en el control de la apoptosis. La invención se refiere asimismo a los polipéptidos expresados por los polinucleótidos descritos, y particularmente a los polipéptidos descritos en la SEC. ID. nº: 2 (completa de ratón), nº 3 (madura de ratón), nº 8 (completa humana) y 9 (madura humana), así como a las variantes conservadas, a los fragmentos apoptóticamente activos (con una actividad asignada a AIF), a moléculas pequeñas homólogas, a las isoformas de los polipéptidos descritos [por ejemplo la isoforma de ratón: SEC. ID. nº: 5 y nº 6 (maduras); a una primera isoforma humana SEC. ID. nº: 11 y nº 12 (maduras) y a una segunda isoforma humana SEC. ID. nº: 14 y nº 15 (maduras) y a los fragmentos inmunológicamente activos de cualquiera de los polipéptidos dados a conocer en la presente memoria (por ejemplo véase el Ejemplo 2 a continuación).

Polipéptidos inductores de apoptosis (AIF)

Los términos “proteína” que se refiere al polipéptido natural y “polipéptido” se utilizan en la presente memoria indistintamente con respecto al producto génico AIF y a las variantes del mismo. La expresión “proteína madura” o “polipéptido maduro” se refiere particularmente al producto génico AIF con la secuencia señal (o una proteína de fusión asociada) eliminada.

Como se indicó anteriormente, en las formas de realización específicas de los polipéptidos del AIF de la invención se incluyen las que presentan las secuencias de aminoácidos publicadas en la presente memoria por ejemplo las SEC. ID. nº: 2 (ratón), nº: 3 (madura de ratón), nº: 8 (humana) y nº: 9 (madura humana), incluyendo el polipéptido de AIF modificado con las secuencias conservadoras de aminoácidos, así como los fragmentos, análogos y derivados de los mismos biológicamente activos (incluyendo las isoformas expuestas anteriormente). La expresión “biológicamente activo”, se utiliza en la presente memoria para referirse a un efecto específico del polipéptido, que incluye pero no se limita a la unión específica, por ejemplo, a un compañero del enlace, anticuerpo u otra molécula de reconocimiento; a la activación de la serie de reacciones de transducción de señal en un contexto molecular; y/o a la producción (o inhibición por antagonistas) de los efectos fisiológicos mediados por el polipéptido de AIF natural *in vivo*. Los polipéptidos del AIF, incluyendo los fragmentos, análogos y derivados, pueden prepararse por síntesis, por ejemplo, utilizando técnicas bien conocidas de síntesis de péptidos en fase sólida o en fase solución. Alternativamente, los polipéptidos de AIF de la invención pueden prepararse utilizando técnicas de ingeniería genética bien conocidas, como las descritas anteriormente. En otra forma de realización todavía, el polipéptido de AIF puede purificarse, por ejemplo, mediante purificación por inmutafinidad, a partir de un fluido biológico, tal como pero no limitado al plasma, suero u orina, preferentemente plasma, suero u orina humanos, y más preferentemente de un paciente que sobreexpresa el polipéptido, tal como un individuo que padezca por ejemplo de una variedad de enfermedades neurodegenerativas.

Fragmentos del polipéptido del AIF

En una forma de realización determinada, la presente invención contempla que los fragmentos naturales del polipéptido del AIF pueden ser importantes. La secuencia peptídica incluye numerosos puntos que frecuentemente son el objetivo de la escisión proteolítica, por ejemplo, restos de arginina. Es posible que el polipéptido completo pueda escindirse en uno o más de dichos puntos para formar fragmentos biológicamente activos (que incluirían necesariamente las partes del polipéptido que permitirían al fragmento permanecer activo). Dichos fragmentos biológicamente activos pueden agonizar o antagonizar la actividad operativa del polipéptido del AIF para estimular o impedir la estimulación de la apoptosis, respectivamente.

Como se describe en la presente memoria, determinadas zonas de la molécula del AIF, que son importantes para una o más de las actividades del AIF han sido identificadas y por lo tanto esta información proporciona a una persona experta en la materia instrucciones para el diseño de fragmentos, análogos y derivados, que son útiles para la puesta en práctica de la invención [véase a continuación para los mutantes BamHI (D180-638), NcoI (D1-377) o HindIII (D563-638) por delección del AIF así como las Figs. 3 y 4 para los datos que entrañan los mutantes siguientes].

Análogos del polipéptido del AIF

La presente invención contempla específicamente la preparación de análogos del polipéptido del AIF, que se caracterizan porque son capaces de una actividad biológica del polipéptido del AIF, por ejemplo de enlace al compañero del enlace específico del polipéptido del AIF (por ejemplo, una enzima o efectores similares). En una forma de realización, el análogo agoniza la actividad del AIF, es decir, opera de manera similar al polipéptido del AIF. Preferentemente, un agonista del AIF es más eficaz que la proteína natural. Por ejemplo, un análogo del agonista del AIF puede fijarse al compañero de enlace del AIF específico con mayor afinidad o demostrar una vida media más prolongada *in vivo*, o ambas. No obstante, también se contemplan los análogos agonistas del polipéptido del AIF que son menos eficaces que la proteína natural.

En otra forma de realización, el análogo antagoniza la actividad del AIF. Por ejemplo, un análogo del AIF que se fija al compañero del enlace del AIF específico pero no produce transducción de señal puede inhibir competitivamente el enlace el AIF natural a su compañero de enlace, disminuyendo de este modo la actividad del AIF *in vivo*. Dicho análogo antagonista del AIF puede también demostrar diferentes propiedades del polipéptido AIF, por ejemplo, vida media más prolongada (o más corta) *in vivo*, mayor (o menor) afinidad de enlace para el compañero de enlace del AIF específico, o ambas.

En una forma de realización, un análogo del polipéptido del AIF es un polipéptido del AIF modificado por la sustitución de aminoácidos en las posiciones en el polipéptido que no son esenciales para la estructura o el funcionamiento. Por ejemplo, la sustitución de restos divergentes de aminoácidos en la secuencia humana en comparación con la secuencia de aminoácidos murina (y viceversa) proporcionará probablemente análogos útiles del polipéptido del AIF (es decir intercambios de aminoácidos entre el ratón y el hombre). Por ejemplo, alineando la secuencia madura de aminoácidos del AIF de ratón (SEC. ID n°: 3) con la secuencia madura de aminoácidos del AIF humana (SEC. ID n°: 9), comenzando en la posición 1 (uno), que pone de manifiesto diferencias de aminoácidos en las siguientes posiciones: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 140, 141, 143, 144, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 306, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 435, 436, 437, 438, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 451, 452, 453, 455, 456, 457, 458, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 5569, 570, 571, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611 y 612.

Asimismo se contemplan las sustituciones de aminoácidos conservadoras entre los polipéptidos del AIF de ratón y humano como se determina por determinadas propiedades químicas o físicas compartidas en común entre las especies, hidrofobia de carga y/o aminoácidos ácidos frente a aminoácidos básicos.

Los análogos, tales como los fragmentos, pueden producirse, por ejemplo, por digestión en pepsina del polipéptido del AIF. Otros análogos, tales como las muteínas, pueden ser producidos por mutagénesis normal dirigida al punto de las secuencias de codificación del polipéptido de AIF. Los análogos que presentan actividad estimulante de apoptosis tales como pequeñas moléculas, si funcionan como activadores o inhibidores, pueden ser identificados por una variedad conocida de análisis *in vitro* descritos en la presente memoria y otros que son bien conocidos en la materia.

Análogos de pequeñas moléculas y peptidomiméticos del polipéptido del AIF

La estructura del polipéptido del AIF, se analiza por varios procedimientos conocidos en la materia. La secuencia de la proteína puede ser caracterizada por un análisis de hidrofilia [por ejemplo, Hopp *et al.*, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, **78**:3824 (1981)]. Un perfil de hidrofilia se utiliza para identificar las zonas hidrófoba e hidrófila del polipéptido del AIF, que pueden indicar las zonas ocultas en el interior del polipéptido plegado, y las zonas accesibles en el exterior del polipéptido. Además, puede emprenderse también el análisis estructural secundario [por ejemplo, Chou *et al.*, *Biochem.*, **13**:222 (1974)], para identificar las zonas del polipéptido del AIF que adoptan estructuras secundarias específicas. La manipulación de la estructura prevista o determinada, que incluye la predicción de la estructura secundaria, puede ser realizada utilizando programas informáticos fácilmente disponibles en la técnica.

Al proporcionar una fuente abundante de polipéptido del AIF recombinante, la presente invención permite la determinación estructural cuantitativa del polipéptido. En particular, se proporciona suficiente material para la resonancia magnética nuclear (RMN), infrarrojo (IR), Raman y ultravioleta (UV) y dicroísmo circular (CD), análisis espectroscópico. En particular la RMN proporciona análisis estructurales muy potentes de moléculas en solución, que se aproxima más estrechamente a su media natural [Marion *et al.*, *Biochem. Biophys. Res. Comm.*, **113**:967-974 (1983); Bar *et al.*, *J. Magn. Reson.*, **65**:355-360 (1985); Kimura *et al.*, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, **77**:1681-1685 (1980)]. Pueden emplearse también otros métodos de análisis estructural. Éstos incluyen pero no se limitan a la cristalografía de rayos X [Engstrom, *Biochem. Exp. Biol.*, **11**:7-13 (1974)].

Todavía en una forma de realización adicional, puede probarse un polipéptido análogo del AIF para determinar si interacciona con un anticuerpo específico para el polipéptido del AIF natural o los fragmentos específicos del mismo. El grado de interreactividad proporciona información acerca de la homología estructural o similitud de proteínas, o acerca de la accesibilidad de las zonas correspondientes a los fragmentos del polipéptido que se utilizaron para generar anticuerpos específicos para el fragmento.

Cribado para los análogos del AIF

Se conocen varias técnicas de cribado en la materia para el cribado de análogos de polipéptidos. Están disponibles varios bancos de productos químicos. Por consiguiente, la presente invención contempla el cribado de dichos bancos, por ejemplo, bancos de compuestos sintéticos generados durante años de investigación, bancos de compuestos naturales y bancos combinatorios, como los descritos con mayor detalle, anteriormente, para los análogos del polipéptido del AIF. En una forma de realización, la invención contempla el cribado de dichos bancos para los compuestos que se unen a anticuerpos del polipéptido anti-AIF. En otro aspecto, una vez se identifica el compañero de enlace del AIF (véase anteriormente), puede utilizarse cualquier técnica de cribado conocida en la materia para cribar agonistas o antagonistas del compañero de enlace del AIF. La presente invención contempla cribados para pequeñas moléculas de ligandos o análogos de ligando y mímicos, así como cribados para ligandos naturales que se unen para activar y agonizar o antagonizar el compañero de enlace del AIF *in vivo*.

El conocimiento de la estructura primaria del compañero de enlace del AIF y la similitud de esta secuencia con las proteínas de función conocida, pueden proporcionar una indicación inicial como agonistas o antagonistas de la proteína. La identificación y cribado de los antagonistas se facilita además determinando las propiedades estructurales de la proteína, por ejemplo, utilizando cristalografía de rayos X, difracción de neutrones, espectrometría de resonancia magnética nuclear y otras técnicas para la determinación de estructuras. Estas técnicas proporcionan el diseño racional o la identificación de agonistas y antagonistas.

Otro método utiliza un bacteriófago recombinante para producir grandes bancos. Utilizando el "método del fago" [Scott *et al.*, *Science*, **249**:386-390 (1990); Cwirla *et al.*, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, **87**:6378-6382 (1990); Devlin *et al.*, *Science*, **249**:404-406 (1990)], pueden construirse bancos muy grandes (entidades químicas de 10^6 a 10^8). Un segundo método utiliza métodos químicos primarios, del cual son ejemplos el método Geysen [Geysen *et al.*, *Molecular Immunology*, **23**:709-715 (1986); Geysen *et al.*, *J. Immunologic Method*, **102**:259-274 (1987)] y el reciente método de Fodor *et al.*, *Science*, **251**:767-773 (1991). Furka *et al.*, 14th International Congress of Biochemistry, volumen 5, resumen FR:013 (1988); Furka, *Int. J. Peptide Protein Res.*, **37**:487-493 (1991); Houghton (patente US n° 4.631.211, publicada en diciembre de 1986); y Rutter *et al.* (patente US n° 5.010.175, publicada el 23 de abril de 1991) describen métodos para producir una mezcla de péptidos que pueden ser probados como agonistas o antagonistas. En otro aspecto, los bancos sintéticos [Needels *et al.*, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, **90**:10700-10704 (1993); Lam *et al.*, publicación de la patente internacional n° WO 92/00252, cada una de las cuales está incorporada a la presente memoria en su totalidad como referencia] y similares pueden utilizarse para cribar los ligandos del compañero de enlace del AIF según la presente invención. Con dichos bancos, pueden detectarse los antagonistas del compañero de enlace utilizando células que expresan el o los compañero(s) de enlace sin clonar realmente el compañero de enlace del AIF.

En otro aspecto todavía, los análogos del polipéptido del AIF pueden cribarse mediante la utilización de un sistema químico combinatorio como el dado a conocer en la patente US n° 5.723.232 de Kauffman y Ballivet.

Derivados de polipéptidos del AIF

Los polipéptidos dados a conocer en la presente memoria pueden modificarse mediante el acoplamiento de una o más fracciones químicas a la fracción de la proteína. Los derivados verificados químicamente pueden formularse además para las vías de administración intraarterial, intraperitoneal, intramuscular, subcutánea, intravenosa, oral, nasal, rectal, bucal, sublingual, pulmonar, tópica, transdérmica u otras. Se ha observado que la modificación química de las proteínas biológicamente activas aporta ventajas adicionales en determinadas circunstancias, tales como el aumento de estabilidad y de tiempo de circulación de la proteína terapéutica y la disminución de inmunogenicidad [patente US n° 4.179.337; Abuchowski *et al.*, "Soluble Polymer-Enzyme Adducts", en *Enzymes as Drugs*, págs. 367-383, Holcenberg y Roberts, eds., Wiley-Interscience, Nueva York, NY, (1981); Francis, *Focus on Growth Factors*, 3:4-10 (1992)].

Fracciones químicas para modificación

Las fracciones químicas adecuadas para la modificación pueden seleccionarse de entre los polímeros solubles en agua. El polímero seleccionado debería ser soluble en agua de modo que la proteína a la que se acopla no precipite en un medio acuoso, tal como un medio fisiológico. Preferentemente, el polímero será farmacéuticamente aceptable para la utilización terapéutica de la preparación del producto final. Un experto en la materia será capaz de seleccionar el polímero deseado basándose en consideraciones tales como si el conjugado polímero/polipéptido se utilizará terapéuticamente y si es así, la dosificación deseada, el tiempo de circulación, la resistencia a la proteólisis y otras consideraciones. Para las presentes proteínas y polipéptidos, éstas pueden determinarse utilizando los análisis proporcionados en la presente memoria.

Moléculas de polímero

El polímero soluble en agua puede seleccionarse de entre el grupo constituido, por ejemplo, por polietilenglicol, copolímeros de etilenglicol/propilenglicol, carboximetilcelulosa, dextrano, alcohol polivinílico, polivinilpirrolidona, poli-1,3-dioxolano, poli-1,3,6-trioxano, copolímero de etileno/anhídrido maleico, poliaminoácidos (homopolímeros o copolímeros aleatorios) y dextrano o poli(n-vinilpirrolidona)polietilenglicol, homopolímeros de propilenglicol, copolímeros de óxido de polipropileno/óxido de etileno, polioles polioxiethylados y alcohol polivinílico. El propionaldehído de polietilenglicol puede aportar ventajas en la preparación debido a su estabilidad en agua.

El polímero puede ser de cualquier peso molecular y puede ser ramificado o no ramificado. Para el polietilenglicol, el peso molecular preferido está comprendido entre aproximadamente 2 kDa y aproximadamente 100 kDa (el término “aproximadamente” indica que en las preparaciones de polietilenglicol, algunas moléculas pesarán más, algunas menos, que el peso molecular estipulado) para su facilidad de manejo y preparación. Pueden utilizarse otros tamaños, dependiendo del perfil terapéutico deseado (por ejemplo, la duración de la liberación lenta deseada, los efectos, si existen sobre la actividad biológica, la facilidad de manipulación, el grado de falta de antigenicidad y otros efectos conocidos del polietilenglicol para una proteína o análogo terapéutico).

Relación polímero/proteína

El número de moléculas de polímero unidas de este modo puede variar, y un experto en la materia será capaz de determinar el efecto sobre la función. Una puede monoderivarse, o se puede proporcionar una o alguna combinación di-, tri-, tetra- de modificación, con la misma o diferentes fracciones químicas (por ejemplo, polímeros, tales como diferentes pesos de polietilenglicoles). La proporción de moléculas de polímero a moléculas de proteína (o péptido) variará, como sus concentraciones en la mezcla de reacción. En general, la relación óptima (desde el punto de vista de eficacia de la reacción en la que no existe ningún exceso de proteína o polímero sin reaccionar) se determinará mediante factores tales como el grado de modificación deseado (por ejemplo, mono, di-, tri-, etc.), el peso molecular del polímero seleccionado, si el polímero está ramificado o no ramificado y las condiciones de la reacción.

Acoplamiento de la fracción química a la proteína

Las moléculas de polietilenglicol (u otras fracciones químicas) deberían acoplarse a la proteína en consideración de los efectos sobre los dominios operativos o antigénicos de la proteína. Existen numerosos procedimientos de acoplamiento disponibles para los expertos en la materia, por ejemplo el documento EP 0 401 384 (que acopla PEG a G-CSF); Malik *et al.*, *Exp. Hematol.*, **20**:1028-1035 (1992) (que describe la pegilación de GM-CSF utilizando cloruro de tresilo). Por ejemplo, el polietilenglicol puede estar unido por enlaces covalentes mediante restos de aminoácidos por un grupo reactivo, tal como un grupo amino o carboxilo libre. Los grupos reactivos son a los que puede unirse una molécula activada de polietilenglicol. Los restos de aminoácido con un grupo amino libre pueden incluir restos de lisina y restos de aminoácidos N-terminal, que tienen un grupo carboxilo libre, pueden incluir restos de ácido aspártico y restos de ácido glutámico y el resto aminoácido C-terminal. Pueden utilizarse también grupos sulfhidrido como grupo reactivo para el acoplamiento de molécula(s) de polietilenglicol. Con fines terapéuticos se prefiere el acoplamiento a un grupo amino, tal como el acoplamiento al terminal N o al grupo lisina. Debería evitarse el acoplamiento a restos importantes para la fijación al receptor si se desea la fijación al receptor.

Proteínas modificadas químicamente en el terminal N

Se puede desear específicamente la proteína modificada químicamente en el terminal N. Utilizando polietilenglicol como ilustración de las presentes composiciones, se puede seleccionar de entre una variedad de moléculas de polietilenglicol (por peso molecular, ramificación, etc.), la proporción de moléculas de polietilenglicol a moléculas de proteína (o péptido) en la mezcla de reacción, el tipo de reacción de pegilación que debe realizarse y el procedimiento de obtención de la proteína pegilada seleccionada en el terminal N. El procedimiento de obtención de la preparación pegilada en el terminal N (es decir, la separación de esta fracción de otras fracciones monopegiladas si es necesario) puede realizarse mediante la purificación del material pegilado en el terminal N de una población de moléculas de proteína pegiladas. La modificación química del terminal N selectiva puede realizarse mediante la alquilación reductora que aprovecha la reactividad diferencial de diferentes tipos de grupos amino primarios (lisina frente al terminal N) disponibles para la modificación en una determinada proteína. En las condiciones de reacción apropiadas, se consigue la modificación sustancialmente selectiva de la proteína en el terminal N con un grupo carbonilo que contiene polímero. Por ejemplo, se puede pegilar selectivamente en el terminal N la proteína realizando la reacción a un pH que permita aprovecharse de las diferencias de pK_a entre los grupos ϵ -amino de los restos de lisina y las del grupo α -amina del resto N-terminal de la proteína. Mediante dicha modificación selectiva se controla el acoplamiento de un polímero soluble en agua a una proteína: la conjugación con el polímero tiene lugar principalmente en el terminal N de la proteína y no se produce ninguna modificación significativa de otros grupos reactivos, tales como los grupos amino con cadena lateral de lisina. Utilizando la alquilación reductora, el polímero soluble en agua puede ser del tipo descrito anteriormente, y debería tener un único aldehído reactivo para el acoplamiento a la proteína. Puede utilizarse el propionaldehído de polietilenglicol, que contiene un único aldehído reactivo.

Ácidos nucleicos asociados a polipéptidos del AIF

Como se indicó anteriormente, la presente invención se refiere a los ADN que codifican los polipéptidos del AIF así como a los ADN que se hibridan a los ADN que codifican a los polipéptidos del AIF (véanse a continuación las condiciones de solubilidad). Por lo tanto, según la presente invención pueden emplearse técnicas convencionales de biología molecular, microbiología y de ADN recombinante dentro de la experiencia en la materia. Dichas técnicas se explican completamente en la bibliografía científica [por ejemplo, Sambrook *et al.*, *Molecular Cloning: A Laboratory Manual*, segunda edición, Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, Nueva York (1989); Glover ed., *DNA Cloning: A Practical Approach*, volúmenes I y II, MRL Press, Ltd., Oxford, U.K. (1985); Gait ed., *Oligonucleotide Synthesis*, Oxford University Press (1984); Hames *et al.*, eds., *Nucleic Acid Hybridization*, Springer-Verlag (1985); Hames *et al.*, eds., *Transcription And Translation*, Oxford University Press (1984)]; Freshney ed., *Animal Cell Culture*, Oxford University Press (1986); Immobilized Cell And Enzymes, IRL Press (1986)]; Perbal, *A Practical Guide to Molecular Cloning*, Wiley, Nueva York (1984)]. De particular importancia en la presente invención son las estrategias para el aislamiento, clonación, secuenciado, análisis y caracterización de un gen o ácido nucleico basadas en las técnicas bien conocidas de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR).

Para los fines de esta exposición, son importantes las siguientes definiciones. Un “replicón” es cualquier elemento genético (por ejemplo, plásmido, cromosoma, virus) que opere como una unidad autónoma de replicación del ADN *in vivo*, es decir, capaz de replicación bajo su propio control.

Un “vector” es un replicón, como por ejemplo un plásmido, fago o cósmido, al que puede acoplarse otro segmento de ADN con el fin de que lleve aproximadamente la replicación del segmento acoplado.

Un “casete” se refiere a un segmento de ADN que puede insertarse en un vector en las secuencias de restricción específicas. El segmento de ADN codifica un polipéptido de interés, y el casete y las secuencias de restricción se diseñan para asegurar la inserción del casete en el propio marco de lectura para la transcripción y traducción.

ADN “heterólogo” se refiere al ADN no situado de forma natural en la célula, o en un punto cromosómico de la célula. Preferentemente el ADN heterólogo comprende un gen extraño a la célula.

Una célula ha sido “transfectada” por ADN exógeno o heterólogo cuando dicho ADN ha sido introducido en el interior de la célula. Una célula ha sido “transformada” por ADN exógeno o heterólogo cuando el ADN transfectado efectúa un cambio fenotípico. Preferentemente, el ADN transformante estará integrado (ligado por enlace covalente) en el ADN cromosómico construyendo el genoma de la célula.

Un “clon” es una población de células procedente de una sola célula o de un antecesor común por mitosis.

Un “polinucleótido” se refiere a un ADN de una sola cadena, ARN, o ADN modificado o ARN. Este término también incluye el ADN de doble cadena encontrado, entre otras, en las moléculas de ADN lineales o circulares (por ejemplo, fragmentos de restricción), plásmidos y cromosomas. Al exponer la estructura de determinadas moléculas de ADN de doble cadena, pueden describirse las secuencias en la presente memoria según el acuerdo normal de proporcionar solamente la secuencia en la dirección 5' a 3' a lo largo de la cadena de ADN no transcrita (es decir, la cadena con una secuencia homóloga al ARNm). Una “molécula de ADN recombinante” es una molécula de ADN que ha experimentado una manipulación biológica molecular.

Una molécula de ácido nucleico es “hibridable” con otra molécula de ácido nucleico, tal como un ADNc, un ADN genómico o un ARN, cuando la forma de cadena única de la molécula de ácido nucleico puede hibridarse con otra molécula de ácido nucleico en condiciones apropiadas de temperatura y de fuerza iónica de la solución (Sambrook *et al.*, 1989, *supra*). Las condiciones de temperatura y de fuerza iónica determinan la “severidad” de la hibridación. La hibridación requiere que los dos ácidos nucleicos contengan secuencias complementarias, aunque dependiendo de la severidad de la hibridación, son posibles incompatibilidades entre las bases. La severidad apropiada para los ácidos nucleicos hibridantes depende de la longitud de los ácidos nucleicos y del grado de complementariedad, variables bien conocidas en la materia. Cuanto mayor es el grado de similitud o de homología entre dos secuencias nucleotídicas, mayor es el valor de T_m para los híbridos de los ácidos nucleicos con estas secuencias. La estabilidad relativa (correspondiente a la T_m mayor) de las hibridaciones del ácido nucleico disminuye en el orden siguiente: ARN:ARN, ADN:ARN, ADN:ADN. Para los híbridos mayores de 100 nucleótidos de longitud, se han derivado las ecuaciones para calcular la T_m (Sambrook *et al.*, 1989, *supra*, 9.50-0.51). Para la hibridación con ácidos nucleicos más cortos, es decir, oligonucleótidos, la posición de las incompatibilidades se hace más importante, y la longitud del oligonucleótido determina su especificidad (Sambrook *et al.*, 1989, *supra*, 11.7-11.8). Preferentemente, una longitud mínima para un ácido nucleico hibridable es de por lo menos aproximadamente 10 nucleótidos; más preferentemente de por lo menos aproximadamente 15 nucleótidos; todavía más preferentemente la longitud es de por lo menos aproximadamente 20 nucleótidos.

“Recombinación homóloga” se refiere a la inserción de una secuencia de ADN extraña de un vector en un cromosoma. Preferentemente, el vector se dirige a un punto cromosómico específico para la recombinación homóloga. Para la recombinación homóloga específica, el vector contendrá zonas suficientemente largas de homología con las secuencias del cromosoma para permitir la unión e incorporación complementarias del vector en el cromosoma. Las zonas más largas de homología y los grados mayores de similitud de secuencia, pueden aumentar la eficacia de la recombinación homóloga.

Una “secuencia de codificación” de ADN es una secuencia de ADN que está transcrita y traducida en un polipéptido en una célula *in vitro* o *in vivo* cuando se coloca bajo el control de secuencias reguladoras apropiadas. Los límites de la secuencia de codificación se determinan mediante un codón de inicio en el terminal 5' (amino) y un codón de terminación de la traducción en el terminal 3' (carboxilo). Una secuencia de codificación puede incluir, pero no se limita a, secuencias procarióticas, ADNc del ARNm eucariótico, secuencias del ADN genómico del ADN eucariótico (por ejemplo, mamífero) e incluso secuencias de ADN sintético. Si la secuencia de codificación se desea para la expresión en una célula eucariótica, una señal de poliadenilación y una secuencia de terminación de la transcripción estará situada normalmente en 3' con respecto a la secuencia de codificación.

10 Aislamiento de secuencias de codificación y flanqueantes del AIF

Tal como se utiliza en la presente memoria, el término “AIF” (factor inductor de apoptosis) de mamífero cuando se utiliza para describir una molécula de ácido nucleico se refiere a una molécula de ácido nucleico o a un fragmento de la misma que (a) presenta la secuencia nucleotídica indicada en la SEC. ID n°: 1 (murina), SEC. ID n°: 4 (isoforma murina), SEC. ID n°: 7 (humana), SEC. ID n°: 10 (isoforma humana) y SEC. ID n°: 13 (isoforma humana); (b) presenta una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que es por lo menos 75 por ciento idéntico, pero puede ser mayor del 75 por ciento, es decir 80 por ciento, 85 por ciento, 90 por ciento, 95 por ciento, o incluso mayor del 95 por ciento idéntico, al polipéptido codificado por cualquiera de entre SEC. ID n°: 1 (murina), SEC. ID n°: 4 (isoforma murina), SEC. ID n°: 7 (humana), SEC. ID n°: 10 (isoforma humana) y SEC. ID n°: 13 (isoforma humana); (c) es una variante alélica natural de (a) o (b); (d) es una variante de ácido nucleico de (a)-(c) producida como se proporciona en la presente memoria; (e) presenta una secuencia que es complementaria de (a)-(d); y/o (f) se hibrida con cualquiera de (a)-(e) en condiciones de alta severidad. La expresión “condiciones de alta severidad” se refiere a la hibridación y el lavado en condiciones que permitan únicamente el enlace de una molécula de ácido nucleico tal como un oligonucleótido o una sonda molecular de ADNc con secuencias muy homólogas. Las condiciones de hibridación severas a título de ejemplo son las siguientes: hibridación a 65°C en 3 × SSC, NaPO₄ 20 mM pH 6,8 seguido de lavado a 55°C-65°C y lavado con NaCl 0,015 M, CitratoNa 0,005 M y SDS al 0,1 por ciento. Resulta evidente para los expertos en la materia que la variación en estas condiciones tiene lugar basándose en la longitud y contenido nucleotídico de GC de las secuencias que deben hibridarse. Están disponibles fórmulas estándar en la materia para la determinación de las condiciones de hibridación exacta. Véase Sambrook *et al.*, *supra*. Por ejemplo, otra solución de lavado severo es 0,2 × SSC y SDS al 0,1 por ciento utilizado a una temperatura comprendida entre 50°C y 65°C. Cuando se utilizan sondas de oligonucleótidos para cribar bancos de ADNc o genómicos, pueden utilizarse las siguientes condiciones severas de lavado. Un protocolo utiliza 6 × SSC con pirofosfato de sodio al 0,05 por ciento a una temperatura comprendida entre 35°C y 62°C, dependiendo de la longitud de la sonda de oligonucleótido. Por ejemplo, sondas de 14 pares de bases se lavan entre 35°C y 40°C, sondas de 17 pares de bases se lavan entre 45°C y 50°C, sondas de 20 pares de bases se lavan entre 52°C y 57°C, y sondas de 23 pares de bases se lavan entre 57°C y 63°C. La temperatura puede aumentarse 2 a 3°C cuando el enlace no específico de fondo parece elevado. Un segundo protocolo utiliza cloruro de tetrametilamonio (TMAC) para lavar sondas de oligonucleótido. Una solución severa de lavado es TMAC 3 M, Tris-HCl 50 mM, pH 8,0 y SDS al 0,2 por ciento. La temperatura de lavado que utiliza esta solución es función de la longitud de la sonda. Se lava aproximadamente entre 45 y 50°C. Los ácidos nucleicos que codifican el AIF de mamífero incluyen también secuencias de ácido nucleico que codifican el polipéptido del AIF de mamífero o un fragmento del mismo, a modo de codones degenerados.

La identidad de secuencia por ciento puede determinarse mediante procedimientos normalizados que se utilizan habitualmente para comparar la similitud en la posición de los aminoácidos de dos polipéptidos. A título de ejemplo, utilizando un programa informático tal como BLAST o FASTA, los dos polipéptidos para los cuales la identidad de secuencia por ciento debe determinarse están alineados para la compatibilidad óptima de sus respectivos aminoácidos (el “intervalo compatible”, que puede incluir la longitud completa de una o ambas secuencias, o una parte predeterminada de una o ambas secuencias). Cada programa informático proporciona una penalización de apertura “por defecto” y una penalización de hueco “por defecto” y una matriz de puntuación tal como PAM 250. Puede utilizarse una matriz de puntuación patrón (véase Dayhoff *et al.*, *Atlas of Protein Sequence and Structure*, vol. 5, supl. 3 (1978)), junto con el programa informático. La identidad por cien puede calcularse a continuación utilizando un algoritmo contenido en un programa tal como FASTA como:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Número total de emparejamientos idénticos}}{[\text{longitud de la secuencia más larga en el tramo emparejado}] + [\text{número de huecos introducidos en la secuencia más larga para alinear las dos secuencias}]} \times 100
 \end{aligned}$$

Los polipéptidos que son por lo menos 70 por ciento idénticos presentarán típicamente una o más sustituciones, deleciones y/o inserciones de aminoácidos en comparación con el AIF natural. Normalmente, las sustituciones serán conservadoras de modo que ejerzan poco o ningún efecto sobre la carga global neta, la polaridad o la hidrofobia de la proteína pero opcionalmente pueden aumentar la actividad de AIF. En la Tabla I se publican las sustituciones conservadoras ejemplares a continuación.

TABLA I

Sustituciones conservadoras de aminoácidos

5	Básicos:	arginina, lisina, histidina
	Ácidos:	ácido glutámico, ácido aspártico
	Polar:	glutamina, asparagina
	Hidrófobos:	leucina, isoleucina, valina
10	Aromáticos:	fenilalanina, triptófano, tirosina
	Pequeños:	glicina, alanina, serina, treonina, metionina

Pueden prepararse otras variantes del polipéptido alineando una secuencia del polipéptido del AIF humano con una secuencia de polipéptido del AIF murino (o del AIF de otras especies) e identificando los aminoácidos divergentes. Uno o más de los aminoácidos divergentes pueden sustituirse a continuación por el aminoácido divergente o por otros aminoácidos. Dichas variantes por consiguiente pueden ser un polipéptido compuesto que comprende secuencias de aminoácidos procedentes de polipéptidos del AIF, que proceden de dos o más especies.

Los ácidos nucleicos contemplados por la presente invención se extienden como se indica, a otros ácidos nucleicos que codifican la expresión de péptidos tales como los indicados en la SEC. ID n°: 2 (completa de ratón), n°: 3 (madura de ratón), n°: 8 (completa humana), n°: 9 (madura humana), así como algunas isoformas [isoforma murina: SEC. ID n°: 5 (completa), SEC. ID n°: 6 (completa); isoformas humanas: SEC. ID n°: 11 (completa), SEC. ID n°: 12 (madura), y SEC. ID n°: 14 (completa), SEC. ID n°: 15 (madura)] de los polipéptidos anteriores. Por consiguiente, aunque los ADN que codifican al AIF se han aislado y secuenciado debido a homologías demostradas, cualquier célula animal puede servir potencialmente como fuente de ácido nucleico para la clonación molecular de un polinucleótido que codifica los péptidos de la invención. El ADN puede obtenerse por procedimientos normalizados conocidos en la tecnología del ADN clonado (por ejemplo, un "banco" de ADN), por síntesis química, por clonación de ADNc o por clonación de ADN genómico, o fragmentos del mismo, purificados a partir de la célula deseada [Sambrook *et al.*, 1989, *supra*; Glover, 1985, *supra*]. Los clones procedentes del ADN genómico pueden contener zonas de ADN reguladoras e intrónicas además de zonas de codificación. Los clones procedentes del ADNc no contendrán secuencias de intrones. Cualquiera que sea la procedencia, el gen debería estar molecularmente clonado en un vector adecuado para la propagación del gen.

En la clonación molecular del gen del ADN genómico, el ADN genómico puede ampliarse utilizando cebadores seleccionados de entre las secuencias de ADNc. Alternativamente, se generan fragmentos de ADN, algunos de los cuales codificarán el gen deseado. El ADN puede escindir-se en puntos específicos utilizando varias enzimas de restricción. Se puede utilizar también desoxirribonucleasa en presencia de manganeso para fragmentar el ADN, o el ADN puede cizallarse físicamente, como por ejemplo, mediante tratamiento con ultrasonidos. Los fragmentos del ADN lineal pueden separarse a continuación por tamaño mediante técnicas normalizadas, que incluyen pero no se limitan a, electroforesis en gel de agarosa y poliacrilamida y cromatografía en columna.

Una vez generados los fragmentos de ADN, la identificación del fragmento de ADN específico que contiene el AIF o el gen similar al AIF deseado puede realizarse de numerosas maneras. Por ejemplo, si una cantidad de un fragmento de un AIF o de un gen similar al AIF o de su ARN específico, o de un fragmento del mismo, está disponible y puede purificarse y marcarse, los fragmentos de ADN generados pueden cribarse mediante hibridación del ácido nucleico con una sonda marcada [Benton *et al.*, *Science*, **196**:180 (1977); Grunstein *et al.*, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, **72**:3961 (1975)]. La presente invención proporciona dichas sondas de ácido nucleico, que pueden prepararse convenientemente a partir de las secuencias específicas dadas a conocer en la presente memoria, por ejemplo, una sonda hibridable con una secuencia de nucleótidos correspondiente por lo menos a 10, y preferentemente a 15, fragmentos nucleotídicos de las secuencias descritas por las SEC. ID n°: 1 y n°: 7, así como el ADN (dado a conocer en la presente memoria) que codifica las isoformas de los presentes polipéptidos del AIF. Preferentemente se selecciona un fragmento que es muy exclusivo para los polipéptidos del AIF de la invención. Los fragmentos de ADN con homología sustancial a la sonda se hibridarán. Como se indicó anteriormente, cuanto mayor sea el grado de homología, más severas serán las condiciones de hibridación que pueden utilizarse. En una forma de realización, se utilizan condiciones de hibridación de baja severidad para identificar un péptido de AIF homólogo. Sin embargo, en un aspecto preferido, y como se demuestra experimentalmente en la presente memoria, un ácido nucleico que codifica un péptido del AIF de la invención se hibridará con un ácido nucleico que presenta una secuencia de nucleótidos tal como la representada en la SEC. ID n°: 1 y n°: 7, así como el ADN (dado a conocer en la presente memoria) que codifica las isoformas de los presentes polipéptidos del AIF o un fragmento hibridable de los mismos, en condiciones moderadamente severas; más preferentemente, se hibridará en condiciones de alta severidad.

Alternativamente, la presencia del gen puede detectarse mediante ensayos basados en las propiedades físicas, químicas o inmunológicas de su producto expresado. Por ejemplo, los clones de ADNc o los clones de ADN que hibridan o seleccionan los ARNm propios, pueden seleccionarse para que produzcan una proteína que, por ejemplo, presente migración electroforética, comportamiento de enfoque isoelectrico, cartografía de digestión proteolítica, actividad de tirosina fosfatasa o propiedades antigénicas similares o idénticas a las conocidas para los presentes polipéptidos del

AIF. Por ejemplo, los anticuerpos de la presente invención pueden utilizarse convenientemente para cribar homólogos de los polipéptidos del AIF de otras procedencias.

Un gen que codifica un polipéptido del AIF de la invención puede también identificarse por selección del ARNm, es decir, mediante hibridación del ácido nucleico seguida de traducción *in vitro*. En este procedimiento, se utilizan fragmentos para aislar los ARNm complementarios por hibridación. Dichos fragmentos de ADN pueden representar ADN modulador purificado, disponible. El análisis por inmunoprecipitación o el análisis funcional (por ejemplo, actividad de tirosina fosfatasa) de los productos de traducción *in vitro* de los productos de los ARNm aislados identifica el ARNm y, por consiguiente, los fragmentos de ADN complementarios, que contienen las secuencias deseadas. Además, pueden seleccionarse ARNm específicos por adsorción de polisomas aislados de las células para los anticuerpos inmovilizados específicamente dirigidos contra un polipéptido del AIF.

Un ADNc del polipéptido del AIF radiomarcado puede sintetizarse utilizando el ARNm seleccionado (procedente de los polisomas adsorbidos) como plantilla. El ARNm o el ADNc radiomarcado puede utilizarse a continuación como sonda para identificar fragmentos de ADN del polipéptido del AIF homólogos entre otros fragmentos de ADN genómicos.

Tal como se mencionó anteriormente, una secuencia de ADN que codifica péptidos del AIF como los dados a conocer en la presente memoria puede prepararse sintéticamente en lugar de clonarse. La secuencia de ADN puede diseñarse con los codones apropiados para las secuencias de aminoácidos del polipéptido del AIF. En general, si la secuencia se utilizase para la expresión se seleccionarían codones preferidos para el huésped deseado. La secuencia completa se monta en oligonucleótidos superpuestos preparados por métodos normalizados y montados en una secuencia de codificación completa [por ejemplo, Edge, *Nature*, **292**:756 (1981); Nambair *et al.*, *Science*, **223**:1299 (1984); Jay *et al.*, *J. Biol. Chem.*, **259**:6311 (1984)].

Las secuencias del ADN sintético permiten la construcción conveniente de genes que expresen análogos de AIF, tal como se describió anteriormente. Alternativamente, el ADN que codifica análogos puede prepararse por mutagénesis dirigida al sitio de genes del AIF o de los ADNc, y los análogos pueden prepararse directamente utilizando síntesis de polipéptidos convencional.

Un método general para la incorporación específica en el sitio de aminoácidos no naturales en proteínas se describe en Noren *et al.*, *Science*, **244**:182-188 (1989). Este método puede utilizarse para crear análogos del polipéptido del AIF con aminoácidos no naturales.

Ácidos nucleicos no codificantes

La presente invención se extiende a la preparación de nucleótidos de cadena complementaria y ribozimas que pueden utilizarse para interferir con la expresión de las proteínas del AIF en el contexto de la traducción. Este método entraña que el ácido nucleico de cadena complementaria y los ribozimas bloqueen la traducción de un ARNm específico, ya sea enmascarando este ARNm con un ácido nucleico de cadena complementaria o escindiéndolo con una ribozima.

Los ácidos nucleicos de cadena complementaria son las moléculas de ADN o de ARN que son complementarias con por lo menos una fracción de una molécula de ARNm específico [Weintraub, *Sci. Am.*, **262**:40-46 (1990); Marcus-Sekura, *Anal. Biochem.*, **172**:289-295 (1988)]. En la célula, se hibridan con este ARNm, formando una molécula de doble cadena no traducible. Por consiguiente, los ácidos nucleicos de cadena complementaria interfieren con la expresión de ARNm en la proteína. Los oligómeros de aproximadamente quince nucleótidos y las moléculas que se hibridan con el codón de iniciación AUG serán particularmente eficaces, ya que son fáciles de sintetizar y son probablemente las que plantean menos problemas cuando las introducen en las células productoras del péptido del AIF. Se han utilizado métodos de cadena complementaria para inhibir la expresión de muchos genes *in vitro* [(Marcus-Sekura, 1988 *supra*; Hambor *et al.*, *J. Exp. Med.*, **168**:1237-1245 (1988)].

Las ribozimas son moléculas de ARN que poseen la capacidad de escindir específicamente otras moléculas de ARN de una sola cadena de manera algo análoga a las endonucleasas de restricción del ADN. Las ribozimas se descubrieron a partir de la observación de que determinados ARNm tienen capacidad para escindir sus propios intrones. Al modificar la secuencia nucleotídica de estos ARN, los investigadores han podido modificar genéticamente las moléculas que reconocen las secuencias específicas nucleotídicas en una molécula de ARN y escindirla [Cech, *J. Am. Med. Assoc.*, **260**:3030-3034 (1988)]. Debido a que son específicas de la secuencia, únicamente los ARNm con determinadas secuencias se inactivan.

Los investigadores han identificado dos tipos de ribozimas, el tipo *Tetrahymena* y el tipo "cabeza de martillo". Las ribozimas del tipo *Tetrahymena* reconocen secuencias de cuatro bases, mientras que las de tipo "cabeza de martillo" reconocen secuencias de once a dieciocho bases. Cuanto más larga sea la secuencia de reconocimiento, más probablemente tendrá lugar exclusivamente en la especie de ARNm diana. Por consiguiente, las ribozimas del tipo cabeza de martillo son preferibles a las ribozimas del tipo *Tetrahymena* para inactivar una especie de ARNm específico, y las secuencias de reconocimiento de dieciocho bases son preferibles a las secuencias de reconocimiento más cortas.

Las secuencias de ADN descritas en la presente memoria pueden utilizarse por lo tanto para preparar moléculas de cadena complementaria en contraste y las ribozimas que escinden los ARNm para los polipéptidos del AIF y sus ligandos, inhibiendo de este modo la expresión del gen del AIF y conduciendo a una menor estimulación de apoptosis.

5 En otra forma de realización, la presente invención aporta los oligonucleótidos cortos complementarios con las cadenas de codificación y complementarias del ácido nucleico del AIF, o con las zonas no codificantes del gen del AIF 5', 3' o interna (intrónica) a la zona de codificación. Dichos ácidos nucleicos son útiles como sondas, ya sea sondas oligonucleotídicas marcadas directamente o como cebadores para la reacción en cadena de la polimerasa, para evaluar la presencia de mutaciones en el gen del AIF o el nivel de expresión de ARNm del AIF. En una forma de realización
10 específica, los ácidos nucleicos no codificantes proporcionan la recombinación homóloga para la integración de un gen ampliable y/o otras secuencias reguladoras en proximidad al gen del AIF, por ejemplo, para proporcionar mayores niveles de expresión del polipéptido del AIF o para superar una mutación en las secuencias reguladoras del gen del AIF que eviten niveles apropiados de expresión del polipéptido del AIF (publicación de patente internacional WO 91/06666, por Skoultschi; publicación de patente internacional n° WO 91/09955, publicada el 11 de julio de 1991 por
15 Chappel; publicación de patente internacional n° WO 90/14092, por Kucherlapati y Campbell).

Producción de polipéptidos de AIF: Expresión y síntesis

Las secuencias de control de transcripción y traducción son secuencias reguladoras del ADN, tales como activadores, potenciadores, terminadores y similares, que proporcionan la expresión de una secuencia de codificación en una célula huésped. En las células eucarióticas, las señales de poliadenilación son secuencias de control.

Para los objetivos de esta exposición, son importantes las siguientes definiciones. Una secuencia de codificación está "bajo control" de las secuencias de transcripción y de traducción en una célula cuando la ARN polimerasa transcribe la secuencia de codificación en el ARNm, que es a continuación el ARN-trans cortado y empalmado transportado a la proteína codificada por la secuencia de codificación.
25

Una "secuencia señal" está incluida al principio de la secuencia de codificación de una proteína que debe ser expresada en la superficie de una célula. Esta secuencia codifica un péptido señal, N-terminal en el polipéptido maduro, que se dirige a la célula huésped para trasladar el polipéptido. La expresión "secuencia señal de transposición" se utiliza también en la presente memoria para referirse a esta especie de secuencia señal. Las secuencias señal de transposición pueden encontrarse asociadas con una variedad de proteínas naturales con eucariotas y procariotas, y con frecuencia son operativas en ambos tipos de organismos.
30

Una secuencia de ADN está "operativamente ligada" a una secuencia de control de expresión cuando la secuencia de control de expresión controla y regula la transcripción y la traducción de esta secuencia de ADN. La expresión "operativamente ligada" comprende las que presentan una señal de iniciación apropiada (por ejemplo, ATG) frente a la secuencia de ADN que debe expresar y mantener el marco de lectura correcto que permita la expresión de la secuencia de ADN bajo el control de la secuencia de control de expresión y la producción del producto deseado codificado por la secuencia de ADN. Si un gen que se desea insertar en una molécula de ADN recombinante no contiene una señal de iniciación apropiada, dicha señal inicial puede insertarse corriente arriba (5') del marco de lectura y en éste con el gen.
35 40

Una "secuencia activadora" es una zona reguladora del ADN capaz de unir la ARN polimerasa en una célula e iniciar la transcripción de una secuencia de codificación corriente abajo (dirección 3'). Para los objetivos de definición de la presente invención, la secuencia activadora está unida en su terminal 3' mediante la secuencia de iniciación de la transcripción y se prolonga corriente arriba (dirección 5') para incluir el número mínimo de bases o elementos necesarios para iniciar la transcripción en los niveles de fondo detectables anteriores. En la secuencia activadora se encontrará una secuencia de iniciación de la transcripción (convenientemente definida por ejemplo, por cartografía con la nucleasa S1), así como los dominios de fijación de la proteína (secuencias de consenso) responsables de la unión de ARN polimerasa.
45 50

Otra característica de la presente invención consiste en la expresión de las secuencias de ADN dadas a conocer en la presente memoria. Como es bien conocido en la materia, las secuencias de ADN pueden ser expresadas ligándolas operativamente a una secuencia de control de la expresión en un vector de expresión apropiado y empleando este vector de expresión para transformar un huésped unicelular apropiado.
55

Dicho enlace operativo de una secuencia de ADN de la presente invención a una secuencia de control de la expresión, desde luego, incluye, si no ya parte de la secuencia del ADN, el aporte de un codón de iniciación, ATG, en el marco de lectura correcto corriente arriba de la secuencia del ADN.
60

Puede emplearse una amplia variedad de combinaciones huésped/vector de expresión para expresar las secuencias del ADN de la presente invención. Los vectores de expresión útiles, por ejemplo, pueden estar constituidos por segmentos de secuencias cromosómicas, no cromosómicas y de ADN sintético. Los vectores adecuados comprenden derivados de SV40 y plásmidos bacterianos conocidos, por ejemplo, derivados plasmídicos co1 E1, pCR1, pBR322, pMB9, pUC o pUC de los plásmidos de *E. coli*, por ejemplo, vectores de pGEX, vectores de pET, pmal-c, pFLAG, etc., y sus derivados, plásmidos tal como RP4; los ADN del fago, por ejemplo, los numerosos derivados del fago λ , por ejemplo NM989, y otro ADN del fago, por ejemplo, M13 y el ADN filamentoso del fago de una sola cadena, plás-
65

midos de levaduras tal como el plásmido 2 μ o derivados del mismo; vectores útiles en las células eucarióticas, tales como los vectores útiles en células de insecto o de mamífero; vectores procedentes de combinaciones de plásmidos y de los ADN del fago, tales como los plásmidos que han sido modificados para emplear ADN del fago u otras secuencias de control de la expresión; y similares. Asimismo puede conseguirse la expresión del AIF en levadura metilótrofa, por ejemplo, levadura de *Pichia pastoris* (por ejemplo, publicación de la patente internacional n° WO 90/03431, de Brierley *et al.*; publicación de la patente internacional n° WO 90/10697, por Siegel *et al.*).

Cualquier variedad amplia de las secuencias de control de la expresión (secuencias que controlan la expresión de una secuencia de ADN operativamente ligada a ella) puede utilizarse en estos vectores para expresar las secuencias de ADN de la presente invención. Dichas secuencias útiles de control de expresión comprenden, por ejemplo, los activadores precoces o tardíos de SV40, CMV, vacunas, poliomias o adenovirus, el sistema *lac*, el sistema *trp*, el sistema *TAC*, el sistema *TRC*, el sistema *LTR*, el operador principal y las zonas activadoras del fago λ , las zonas de control de la proteína de recubrimiento fd, el activador de la 3-fosfoglicerato cinasa u otras enzimas glucolíticas, los activadores de la fosfatasa ácida (por ejemplo, Pho5), el activador AOX 1 de la levadura metilótrofa, los activadores de los factores de α -emparejamiento de levaduras y otras secuencias conocidas para controlar la expresión de los genes de células procarióticas o eucarióticas o sus virus y varias combinaciones de las mismas.

Una amplia variedad de células huésped unicelulares son también útiles para expresar las secuencias de ADN de la presente invención. Estos huéspedes pueden incluir huéspedes eucarióticos y procarióticos bien conocidos, tales como las cepas de *E. coli*, *Pseudomonas*, *Bacillus*, *Streptomyces*; hongos tales como las levaduras (*Saccharomyces*, y levadura metilótrofa tal como *Pichia*, *Candida*, *Hansenula* y *Torulopsis*); células animales, tales como las células CHO, R11, B-W y LM, células de riñón del mono verde africano (por ejemplo, COS 1, COS 7, BSC1, BSC40 y BMT10), células de insecto (por ejemplo, Sf9) y células humanas y células vegetales en cultivo tisular.

Debe entenderse que no todos los vectores, las secuencias de control de la expresión y los huéspedes funcionarán igualmente bien para expresar las secuencias de ADN de la presente invención. Ni todos los huéspedes funcionarán igualmente bien con el mismo sistema de expresión. Sin embargo, un experto en la materia podrá seleccionar los vectores, las secuencias de control de la expresión y los huéspedes apropiados sin experimentación indebida para realizar la expresión deseada sin apartarse del alcance de la presente invención. Por ejemplo, al seleccionar un vector, puede considerarse el huésped porque el vector debe operar en él. El número de copias del vector, la capacidad para controlar este número de copias y la expresión de cualquier otra proteína codificada por el vector, tales como los marcadores de antibióticos, se considerarán también.

Al seleccionar una secuencia de control de la expresión, se considerará normalmente una variedad de factores. Éstos comprenden, por ejemplo, la resistencia relativa del sistema, su capacidad de control y su compatibilidad con la secuencia de ADN determinada o del gen para expresarse, particularmente con respecto a las estructuras secundarias potenciales. Los huéspedes unicelulares adecuados se seleccionarán en consideración, por ejemplo, a su compatibilidad con el vector seleccionado, a sus características de secreción, a su capacidad para plegar las proteínas correctamente y a sus requisitos de fermentación, así como a la toxicidad para el huésped del producto codificado por las secuencias de ADN que deben expresarse, y a la facilidad de purificación de los productos de la expresión.

Considerando estos y otros factores, un experto en la materia podrá construir una variedad de combinaciones vector/secuencia de control de la expresión/puente que expresarán las secuencias del ADN de la presente invención en la fermentación o en cultivo animal a gran escala.

En una forma de realización específica, puede expresarse una proteína de fusión del AIF. Una proteína de fusión del AIF comprende por lo menos una fracción operativamente activa de un polipéptido del AIF. Las secuencias que no son del AIF pueden ser secuencias con terminal carboxi del AIF. Además, para la expresión estable de una proteína de fusión del AIF proteolíticamente inactiva, la fracción de la proteína de fusión que no es del AIF se une mediante un enlace peptídico al terminal amino de la proteína del AIF. Una molécula de ADN recombinante que codifica dicha proteína de fusión comprende una secuencia que codifica por lo menos una fracción operativamente activa de una proteína que no es del AIF unida en la estructura a la secuencia de codificación del AIF y codifica preferentemente una secuencia de escisión para una proteasa específica, por ejemplo, trombina o factor Xa, preferentemente en la unión AIF-no AIF.

Con respecto a las proteínas de fusión del AIF, un aspecto adicional incluye la fusión del polipéptido del AIF o un fragmento biológicamente activo del mismo con anticuerpos o fragmentos de anticuerpo (por ejemplo, F_c, S_cF_v). Dicho montaje sería útil para dirigir el AIF a las células que expresan antígenos que se unen a anticuerpos o a fragmentos de los mismos acoplados al AIF (es decir, la proteína de fusión).

En otro aspecto, puede utilizarse el vector pGEX [Smith *et al.*, *Gene* 67:31-40 (1988)]. Este vector fusiona el ADNc de la glutatión S-transferasa de *Schistosoma japonicum* con la secuencia de interés. Las proteínas bacterianas se recogen y las proteínas recombinantes pueden purificarse rápidamente en una columna de afinidad de glutatión reducido. El transportador de GST puede escindirse posteriormente de las proteínas de fijación por digestión con proteasas específicas para la secuencia. Después de la escisión, el transportador y la proteína de fusión no escindida puede eliminarse por absorción en glutatión agarosa. Ocasionalmente aparecen dificultades con el sistema cuando la proteína codificada es insoluble en soluciones acuosas.

La expresión de proteínas recombinantes de sistemas bacterianos puede producir el plegamiento incorrecto de la proteína expresada, lo que requiere replegamiento. La proteína recombinante puede replegarse antes o después de la escisión para formar un polipéptido del AIF operativamente activo. El polipéptido del AIF puede replegarse mediante las etapas de (i) incubación de la proteína en un tampón desnaturalizado que contiene un agente reductor, y a continuación (ii) incubación de la proteína en un tampón que contiene un agente oxidante, y preferentemente contiene además un agente estabilizante de la proteína o un agente caótrofo o ambos. Las parejas de agentes redox (reductor/oxidante) adecuadas comprenden, pero no se limitan a, glutatión reducido/disulfuro de glutatión, cistina/cisteína, cistamina/cisteamina y 2-mercaptoetanol/disulfuro de 2-hidroxieltilo. En un aspecto particular, la proteína de fusión puede solubilizarse en un desnaturalizante, tal como la urea, antes de intercambiar en el tampón de reducción. En una forma de realización preferida, la proteína se purifica también, por ejemplo, por intercambio iónico o cromatografía de quelación con Ni, antes de intercambiar en el tampón de reducción. Los agentes desnaturalizantes comprenden pero no se limitan a la urea y a la guanidina-HCl. La proteína recombinante se diluye a continuación aproximadamente por lo menos 10 veces, más preferentemente aproximadamente 100 veces, en un tampón de oxidación que contiene un agente oxidante, tal como, pero no limitado a Tris-HCl 0,1 M, pH 8,0, EDTA 1 mM, NaCl 0,15 M, glutatión oxidado 0,3 M. La proteína de fusión se incuba a continuación durante aproximadamente 1 a aproximadamente 24 horas, preferentemente aproximadamente 2 a aproximadamente 16 horas, a temperatura ambiente en el tampón oxidante. El tampón oxidante puede comprender un agente estabilizante de proteínas, por ejemplo, un azúcar, un alcohol o un sulfato amónico. El tampón oxidante puede comprender además un agente caótrofo a baja concentración, para desestabilizar las interacciones intermoleculares incorrectas y favorecer de este modo el plegamiento apropiado. Los agentes caótrofos adecuados incluyen pero no se limitan a un detergente, un poliol, L-arginina, guanidina-HCl y polietilenglicol (PEG). Es importante utilizar una concentración suficientemente baja del agente caótrofo para impedir la desnaturalización de la proteína. La proteína replegada puede concentrarse por lo menos unas 10 veces, más preferentemente en la cantidad en que se diluyó en el tampón oxidante.

Pueden producirse asimismo procesos de fermentación bacteriana en una preparación de proteínas recombinantes que contenga niveles inaceptables de endotoxinas. Por ejemplo, la invención contempla la eliminación de dichas endotoxinas, por ejemplo, utilizando anticuerpos específicos para la endotoxina u otras moléculas de unión a la endotoxina. La presencia de endotoxinas puede ser determinada mediante técnicas normalizadas, tales como las que emplean reactivos E-TOXATE (Sigma, St. Louis, Missouri), o con bioanálisis.

Además del ejemplo específico, los presentes inventores contemplan la utilización de sistemas de expresión de baculovirus, mamíferos y levaduras para expresar los polipéptidos del AIF. Por ejemplo, en los sistemas de expresión de baculovirus, ambos vectores de transferencia sin fusión, tales como pero no limitados a pVL941 (secuencia de clonación de *Bam*H1); pVL1393 (secuencia de clonación de *Bam*H1, *Sma*I, *Xba*I, *Eco*R1, *Not*I, *Xma*III, *Bgl*II y *Pst*I; Invitrogen), pVL1392 (secuencia de clonación de *Bgl*II, *Pst*I, *Not*I, *Xma*III, *Eco*RI, *Xba*I, *Sma*I y *Bam*H1; Summers e Invitrogen) y pBlueBacIII (secuencia de clonación de *Bam*H1, *Bgl*II, *Pst*I, *Nco*I y *Hind*III, con posible cribado recombinante azul/blanco; Invitrogen) y vectores de transferencia de fusión, tales como pero no limitados a pAc700 (secuencia de clonación de *Bam*H1 y *Kpn*I, en la que la secuencia del reconocimiento *Bam*H1 comienza en el codón de iniciación; Summers), pAc701 y pAc702 (igual que pAc700, con diferentes marcos de lectura), pAc360 (36 pares de bases de la secuencia de clonación *Bam*H1 corriente abajo de un codón de iniciación de polihedrina; Invitrogen) y pBlueBacHisA, B, C (tres marcos de lectura diferentes, con secuencia de clonación de *Bam*H1, *Bgl*II, *Pst*I, *Nco*I y *Hind*III, un péptido N-terminal para la purificación de ProBond y el cribado recombinante azul/blanco de placas; Invitrogen).

Los vectores de expresión de mamífero contemplados para su utilización en la invención comprenden vectores con activadores inducibles, tales como el activador de dihidrofolato reductasa (DHFR), por ejemplo, cualquier vector de expresión con un vector de expresión *DHFR*, o *DHFR*/metotrexato, tal como pED (secuencia de clonación de *Pst*I, *Sal*I, *Sba*I, *Sma*I y *Eco*RI, con el vector que expresa tanto al gen clonado como a *DHFR*; Kaufman, *Current Protocols in Molecular Biology*, 16:12 (1991). Alternativamente, un vector de coampliación de glutamina sintetasa/metionina sulfoximina, tal como pEE14 (secuencia de clonación de *Hind*III, *Xba*I, *Sma*I, *Sba*I, *Eco*RI y *Bcl*I, en la que el vector expresa la glutamina sintetasa y el gen clonado; Celltech). En otra forma de realización, puede utilizarse un vector que dirige la expresión episómica bajo el control del virus de Epstein Barr (EBV), tales como pREP4 (secuencia de clonación de *Bam*H1, *Sfi*I, *Xho*I, *Not*I, *Nhe*I, *Hind*III, *Nhe*I, *Pvu*II y *Kpn*I, el activador constitutivo de RSV-LTR, el marcador seleccionable de higromicina, Invitrogen), pCEP4 (secuencia de clonación de *Bam*H1, *Sfi*I, *Xho*I, *Not*I, *Nhe*I, *Hind*III, *Nhe*I, *Pvu*II y *Kpn*I, el gen precoz inmediato de hCMV constitutivo, el marcador seleccionable de higromicina; Invitrogen), pMEP4 (secuencia de clonación de *Kpn*I, *Pvu*I, *Nhe*I, *Hind*III, *Not*I, *Xho*I, *Sfi*I, *Bam*H1, el activador inducible del gen IIa de metalotioneína, el marcador seleccionable de higromicina; Invitrogen), pREP8 (secuencia de clonación de *Bam*H1, *Xho*I, *Not*I, *Hind*III, *Nhe*I y *Kpn*I, activador de RSV-LTR, marcador seleccionable de histidinol; Invitrogen), pREP9 (secuencia de clonación de *Kpn*I, *Nhe*I, *Hind*III, *Not*I, *Xho*I, *Sfi*I y *Bam*H1, activador de RSV-LTR, marcador seleccionable de G418; Invitrogen) y pEBVHis (activador de RSV-LTR, marcador seleccionable de higromicina, péptido N-terminal purificable por la resina ProBond y escindido por enterocinasas; Invitrogen). Los vectores de expresión de mamífero seleccionables para su utilización en la invención comprenden pRc/CMV (secuencia de clonación de *Hind*III, *Bst*XI, *Not*I, *Sba*I y *Apa*I, selección G418; Invitrogen), pRc/RSV (secuencia de clonación de *Hind*III, *Spe*I, *Bst*XI, *Not*I, *Xba*I, selección G418; Invitrogen) y otros. Los vectores de expresión de mamífero del virus de la vacuna (Kaufman, 1991, *supra*) para su utilización según la invención comprenden pero no se limitan a pSC11 (secuencia de clonación *Sma*I, selección TK y β -gal), pMJ601 (secuencia de clonación de *Sal*I, *Sma*I, *Afl*I, *Nar*I, *Bsp*MII, *Bam*HI, *Apa*I, *Nhe*I, *Sca*II, *Kpn*I y *Hind*III; selección TK y β -gal) y pTKgptF1S (secuencia de clonación de *Eco*RI, *Pst*I, *Sal*I, *Acc*I, *Hind*III, *Sba*I, *Bam*HI y *Hpa*, selección TK o XPRT).

Pueden utilizarse asimismo sistemas de expresión de levadura según la invención para expresar polipéptidos del AIF. Por ejemplo, el vector pYES2 no de fusión (secuencia de clonación de *XbaI*, *SphI*, *ShoI*, *NotI*, *GstXI*, *EcoRI*, *BstXI*, *BamHI*, *SacI*, *KpnI* y *HindIII*; Invitrogen) o la fusión pYESHisA, B, C (secuencia de clonación de *XbaI*, *SphI*, *ShoI*, *NotI*, *BstXI*, *EcoRI*, *BamHI*, *SacI*, *KpnI* y *HindIII*, péptido N-terminal purificado con la resina ProBond y escindido con enterocinasa; Invitrogen) por mencionar sólo dos, pueden emplearse según la invención.

Es más deseable que los análogos del AIF puedan prepararse a partir de las secuencias nucleotídicas derivadas del alcance de la presente invención.

Además de la expresión recombinante del polipéptido del AIF, la presente invención contempla y permite totalmente la preparación del polipéptido del AIF, o de fragmentos del mismo, utilizando las técnicas bien conocidas y muy desarrolladas de la síntesis de péptidos en fase sólida. La invención contempla utilizar tanto el Boc ocular como el Fmoc, así como otras estrategias de grupos protectores, para preparar el polipéptido del AIF o fragmentos del mismo. Varias técnicas de replegamiento y oxidación de las cadenas laterales de cisteína para formar un enlace disulfuro son también bien conocidas en la materia.

Anticuerpos contra el polipéptido del AIF

Según la invención, el polipéptido del AIF producido de manera recombinante o por síntesis química y los fragmentos u otros derivados o análogos del mismo, incluyendo las proteínas de fusión, pueden utilizarse como inmunógeno para generar anticuerpos que reconozcan el polipéptido del AIF. Dichos anticuerpos incluyen, pero no se limitan a, fragmentos Fab de una sola cadena, híbridos, policlonales o monoclonales y un banco de expresión de Fab.

Para los objetivos de esta exposición, son importantes las siguientes definiciones. Una molécula es “antigénica” cuando es capaz de interactuar de manera específica con una molécula de reconocimiento del antígeno del sistema inmunitario, tal como una inmunoglobulina (anticuerpo) o un receptor del antígeno de linfocito T. Un polipéptido antigénico contiene por lo menos aproximadamente 5, y preferentemente por lo menos aproximadamente 10 aminoácidos. Un fragmento antigénico de una molécula puede ser esa parte que es inmunodominante para el reconocimiento del receptor del anticuerpo o del linfocito T, o puede ser un fragmento utilizado para generar un anticuerpo contra la molécula conjugando el fragmento antigénico con una molécula portadora para la inmunización. Una molécula que es antigénica no necesita ser la propia inmunógena, es decir, capaz de provocar una respuesta inmunitaria sin un portador.

Un “anticuerpo” es cualquier inmunoglobulina, incluyendo los anticuerpos y los fragmentos de los mismos, que se unen a un epítipo específico. El término comprende los anticuerpos policlonales, monoclonales e híbridos, mencionados últimamente descritos con más detalle en las patentes US n° 4.816.397 y n° 4.816.567, así como los fragmentos de unión al antígeno de anticuerpos, incluyendo Fab, F(ab')₂ y F(v) (incluyendo los anticuerpos con una sola cadena). Por consiguiente, la frase “molécula de anticuerpo” en sus varias formas gramaticales tal como se utiliza en la presente memoria contempla tanto una molécula de inmunoglobulina intacta como un fragmento inmunológicamente activo de una molécula de inmunoglobulina que contiene la secuencia de combinación del anticuerpo. Una “secuencia de combinación del anticuerpo” es la parte de la estructura de una molécula de anticuerpo compuesta por zonas variables e hipervariables con cadena pesada y ligera que se unen específicamente al antígeno.

A título de ejemplo las moléculas de anticuerpo son moléculas de inmunoglobulina intactas, moléculas de inmunoglobulina sustancialmente intactas y las partes de una molécula de inmunoglobulina que contienen el paratopo, incluyendo las fracciones conocidas en la materia como Fab, Fab', F(ab')₂ y F(v) cuyas fracciones son preferidas para su utilización en los métodos terapéuticos descritos en la presente memoria.

Las fracciones Fab y F(ab')₂ de moléculas de anticuerpo se preparan mediante la reacción proteolítica de la papaína y pepsina, respectivamente, en las moléculas de anticuerpo intactas en gran parte por métodos que son bien conocidos. Véase por ejemplo, la patente US n° 4.342.566 de Theofilopoulos *et al.* Son asimismo bien conocidos los fragmentos de molécula de anticuerpo Fab' y se producen a partir de los fragmentos F(ab')₂ seguido de reducción de los enlaces disulfuro que unen las dos partes de la cadena pesada como en el mercaptoetanol, y seguido de alquilación de mercaptano de la proteína resultante con un reactivo tal como yodoacetamida. En la presente memoria se prefiere un anticuerpo que contiene moléculas intactas del anticuerpo.

La frase “anticuerpo monoclonal” en sus varias formas gramaticales se refiere a un anticuerpo que presenta únicamente una especie de secuencia de combinación del anticuerpo capaz de inmunorreactar con un antígeno determinado. Un anticuerpo monoclonal por lo tanto presenta típicamente una sola afinidad de unión para cualquier antígeno con el que inmunorreacta. Un anticuerpo monoclonal puede contener por consiguiente una molécula de anticuerpo con muchas combinaciones de combinación del anticuerpo, cada una inmunoespecífica para un antígeno diferente; por ejemplo, un anticuerpo monoclonal bioespecífico (híbrido).

El término “adyuvante” se refiere a un compuesto o a una mezcla que potencia la respuesta inmunitaria a un antígeno. Un adyuvante puede servir como depósito de tejido que libera lentamente el antígeno y también como activador del sistema linfóide que potencia la respuesta inmunitaria de manera no específica [Hood *et al.*, en *Immunology*, pág. 384, segunda ed., Benjamín/Cummings, Menlo Park, California (1984)]. Con frecuencia, una prueba de provocación primaria con un antígeno solo, en ausencia de un adyuvante, no podrá provocar una respuesta inmunitaria humoral o celular. Los adyuvantes comprenden, pero no se limitan a, adyuvante completo de Freund, adyuvante incompleto de

Freund, saponina, geles minerales tales como hidróxido de aluminio, sustancias tensioactivas tales como lisolecitina, polioles plurónicos, polianiones, péptidos, emulsiones de aceite o hidrocarburos, hemocianinas de la lapa californiana, dinitrofenol y adyuvantes humanos potencialmente útiles tal como BCG (*bacilo Calmette-Guerin*) y *Corynebacterium parvum*. Preferentemente, el adyuvante es farmacéuticamente aceptable.

Pueden utilizarse varios procedimientos conocidos en la materia para la producción de anticuerpos policlonales contra el polipéptido del AIF, o el fragmento, derivado o análogo del mismo. Para la producción de anticuerpos, pueden inmunizarse varios animales huésped mediante la inyección con el polipéptido del AIF, o un derivado (por ejemplo, fragmento o proteína de fusión) del mismo, incluyendo pero sin limitarse a conejos, ratones, ratas, ovejas, cabras, etc. En una forma de realización, el polipéptido del AIF o un fragmento del mismo puede conjugarse con un portador inmunógeno, por ejemplo, albúmina de suero bovino (BSA) o hemocianina de la lapa californiana (KLH). Pueden utilizarse varios adyuvantes para aumentar la respuesta inmunológica, dependiendo de la especie del huésped, incluyendo pero sin limitarse a adyuvante de Freund (completo e incompleto), geles minerales tales como hidróxido de aluminio, sustancias tensioactivas tales como lisolecitina, polioles plurónicos, polianiones, péptidos, emulsiones de aceite, hemocianinas de la lapa californiana, dinitrofenol y adyuvantes humanos potencialmente útiles tal como BCG (*bacilo Calmette-Guerin*) y *Corynebacterium parvum*.

Para la preparación de anticuerpos monoclonales dirigidos contra el polipéptido del AIF o el fragmento, análogo o derivado del mismo, puede utilizarse cualquier técnica que proporcione la producción de moléculas de anticuerpo mediante líneas celulares continuas en cultivo. Estas comprenden pero no se limitan a la técnica del hibridoma originalmente desarrollada por Kohler *et al.* [*Nature*, **256**:495-497 (1975)], así como la técnica del trioma, la técnica de hibridoma de linfocito B humano [Kozbor *et al.*, *Immunology Today*, **4**:72 (1983)] y la técnica de EBV-hibridoma para producir anticuerpos monoclonales humanos [Cole *et al.*, en *Monoclonal Antibodies and Cancer Therapy*, págs. 77-96, Alan R. Liss, Inc., (1985)]. Pueden crearse líneas celulares inmortalizadas que producen anticuerpos mediante técnicas distintas de la fusión, tales como la transformación directa de linfocitos B con ADN oncogénico, o la transfección con virus de Epstein-Barr, por ejemplo, M. Schreier *et al.*, *Hybridoma Techniques* (1980); Hammerling *et al.*, *Monoclonal Antibodies And T-cell Hybridomas* (1981); Kennett *et al.*, *Monoclonal Antibodies* (1980); también en las patentes US n° 4.341.761; n° 4.399.121; n° 4.427.783; n° 4.444.887; n° 4.451.570; n° 4.466.917; n° 4.472.500; n° 4.491.632 y n° 4.493.890.

En una forma de realización adicional de la invención, pueden producirse anticuerpos monoclonales en animales exentos de gérmenes que utilizan tecnología reciente (solicitud internacional n° PCT/US 90/02545). Según la invención, pueden utilizarse anticuerpos humanos y pueden obtenerse utilizando hibridomas humanos [Cote *et al.*, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, **80**:2026-2030 (1983)] o transformando los linfocitos B humanos con virus EBV *in vitro* [Cole *et al.*, 1985, *supra*]. De hecho, según la invención, pueden utilizarse las técnicas desarrolladas para la producción de “anticuerpos híbridos” [Morrison *et al.*, *J. Bacteriol.*, 159-870 (1984); Neuberger *et al.*, *Nature*, **312**:604-608 (1984); Takeda *et al.*, *Nature*, **314**:452-454 (1985)] mediante corte y empalme de los genes de una molécula de anticuerpo de ratón específica para un polipéptido del AIF junto con los genes de una molécula de anticuerpo humano de actividad biológica apropiada; dichos anticuerpos están comprendidos dentro del alcance de la presente invención. Dichos anticuerpos híbridos humanos o humanizados son preferidos para su utilización en la terapia de enfermedades o trastornos humanos (descritos a continuación), ya que los anticuerpos humanos o humanizados es mucho menos probable que los anticuerpos xenógenos produzcan una respuesta inmunitaria, en particular una respuesta alérgica, ellos mismos.

Según la invención, las técnicas descritas para la producción de anticuerpos de una sola cadena (patente US n° 4.946.778) pueden ser adaptadas para producir anticuerpos de cadena única específicos para el polipéptido del AIF. Una forma de realización adicional de la invención utiliza las técnicas descritas para la construcción de bancos de expresión de Fab [Huse *et al.*, *Science*, **246**:1275-1281 (1989)] que permitan la identificación rápida y fácil de fragmentos monoclonales de Fab con la especificidad deseada para un polipéptido del AIF o sus derivados o análogos.

Pueden generarse por técnicas conocidas fragmentos de anticuerpo que contienen el idiotipo de una molécula de anticuerpo. Por ejemplo, dichos fragmentos comprenden, pero no se limitan a: el fragmento F(ab')₂ que puede producirse por digestión con pepsina de la molécula de anticuerpo; los fragmentos Fab' que pueden ser generados por reducción de los puentes disulfuro del fragmento F(ab')₂ y los fragmentos Fab que pueden generarse tratando la molécula de anticuerpo con papaína y agente reductor.

En la producción de anticuerpos, puede realizarse la identificación del anticuerpo deseado por técnicas conocidas en la materia, por ejemplo, radioinmunoanálisis, ELISA (ensayo inmunoabsorbente con enzima ligada), inmunoanálisis “sándwich”, análisis inmunoradiométricos, reacciones de precipitina con difusión en gel, análisis por inmunodifusión, inmunoanálisis *in situ* (utilizando oro coloidal, enzimas o marcadores radioisotópicos, por ejemplo), transferencias Western, reacciones de precipitación, análisis por aglutinación (por ejemplo, análisis por aglutinación en gel, análisis por hemoaglutinación), análisis por fijación del complemento, análisis de inmunofluorescencia, análisis con proteína A y análisis por inmunoelectroforesis, etc. En una forma de realización, el enlace al anticuerpo se detecta mediante la identificación de un marcador en el anticuerpo primario. En otra forma de realización, el anticuerpo primario se detecta identificando el enlace de un anticuerpo secundario o de un reactivo al anticuerpo primario. En otra forma de realización, el anticuerpo secundario está marcado. Se conocen muchos medios en la materia para detectar el enlace en un inmunoanálisis y están comprendidos en el alcance de la presente invención. Por ejemplo, para seleccionar anticuerpos que reconozcan a un epítipo específico de un polipéptido del AIF, se pueden analizar los hibridomas generados para un producto que se une a un fragmento del polipéptido del AIF que contiene dicho epítipo. Para la

selección de un anticuerpo específico contra un polipéptido del AIF de una especie determinada de animal, se puede seleccionar basándose en el enlace positivo con el polipéptido del AIF expresado por las células de la especie de animal o aislado de las mismas.

5 Con respecto a la localización y actividad del polipéptido del AIF pueden utilizarse los siguientes anticuerpos en los métodos conocidos en la materia, por ejemplo, para la transferencia Western, detección por la imagen del polipéptido del AIF *in situ*, midiendo las concentraciones de éste en muestras fisiológicas apropiadas.

10 En una forma de realización específica, pueden generarse los anticuerpos que agonizan o antagonizan la actividad del polipéptido del AIF. Dichos anticuerpos pueden analizarse utilizando los análisis descritos a continuación para la identificación de los ligandos.

15 En una forma de realización específica, los anticuerpos se desarrollan inmunizando conejos con péptidos sintéticos previstos por la secuencia proteica o con proteínas recombinantes construidas utilizando vectores de expresión bacteriana. La selección de péptidos sintéticos se realiza tras un análisis minucioso de la estructura proteínica prevista, tal como se describió anteriormente. En particular, se seleccionan secuencias peptídicas entre las secuencias de escisión supuestas. Los péptidos sintéticos se conjugan con un portador tal como la hemocianina de KLH o BSA utilizando carbodiimida y se utilizan en adyuvantes de Freund para inmunizar conejos. Con el fin de preparar la proteína recombinante, puede utilizarse el vector pGEX para expresar el polipéptido [Smith *et al.*, 1988, *supra*]. Alternativamente, se 20 puede utilizar solamente dominios hidrófilos para generar la proteína de fusión. La proteína expresada se preparará en cantidad y se utilizará para inmunizar conejos en adyuvante de Freund.

25 En otra forma de realización específica, se utiliza polipéptido del AIF recombinante para inmunizar pollos y los anticuerpos del anti-AIF de pollo se recuperan de la yema del huevo, por ejemplo, por purificación por afinidad en una columna con AIF. Preferentemente, los pollos utilizados en la inmunización se mantienen en condiciones exentas de patógenos específicos (SPF).

30 Todavía en otra forma de realización, el polipéptido del AIF recombinante se utiliza para inmunizar conejos, y los anticuerpos policlonales se inmunopurifican antes de otra utilización. Los anticuerpos purificados son particularmente útiles para análisis semicuantitativos, particularmente para detectar la presencia del polipéptido del AIF circulante en suero o plasma.

35 En los anticuerpos monoclonales producidos contra polipéptidos del AIF pueden identificarse varias propiedades; es decir, isótopo, epítopo, afinidad, etc. Son de particular interés los anticuerpos monoclonales que neutralizan la actividad de los polipéptidos del AIF. Dichos anticuerpos monoclonales pueden ser fácilmente identificados en el análisis de actividad del AIF. Los anticuerpos de alta afinidad son también útiles cuando es posible la purificación por inmuoafinidad del modulador natural o recombinante.

40 Preferentemente, el anticuerpo antimodulador utilizado en los métodos de diagnóstico y terapéuticos de la presente invención es un anticuerpo policlonal purificado por afinidad. Más preferentemente, el anticuerpo es un anticuerpo monoclonal (mAb). Además, es preferible que las moléculas del anticuerpo antimodulador utilizadas en la presente memoria estén en forma de fragmentos Fab, Fab', F(ab')₂ o F(v) de moléculas de anticuerpo completas.

45 *Implicaciones del diagnóstico*

La presente invención se refiere además a una variedad de aplicaciones para el diagnóstico, incluyendo los métodos para detectar la presencia de las condiciones y/o estímulos que impactan en las anomalías que implican la hipoestimulación o hiperestimulación de la apoptosis, en relación con su capacidad para producir las actividades que están 50 mediadas por los presentes AIF. Como se mencionó al principio, el polipéptido del AIF puede utilizarse para producir anticuerpos contra ellos mismos mediante una variedad de técnicas conocidas, y dichos anticuerpos pueden aislarse a continuación y utilizarse en análisis para la presencia de determinada actividad de transcripción en células diana sospechosas. Alternativamente, los ácidos nucleicos de la invención pueden emplearse en diagnóstico.

55 *Diagnósticos a base de anticuerpos*

Como se sugirió al principio, un método de diagnóstico útil en la presente invención comprende el examen de una muestra o del medio celular por medio de un análisis incluyendo una cantidad eficaz de un antagonista contra una proteína moduladora, tal como un anticuerpo antimodulador, preferentemente un anticuerpo policlonal purificado por afinidad, y más preferentemente un mAb. Además, es preferible que las moléculas de anticuerpo antimodulador 60 utilizadas en la presente memoria estén en forma de fragmentos Fab, Fab', F(ab')₂ o F(v) o moléculas de anticuerpo completas. Los pacientes capaces de beneficiarse de este método comprenden los que padecen varias enfermedades neoplásicas, enfermedades neurodegenerativas (por ejemplo, pero sin limitarse a la neurodegeneración debida al ictus, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson y esclerosis lateral amiotrófica) u otras enfermedades donde la estimulación anómala de la apoptosis (ya sea hipoestimulación o hiperestimulación) es una característica o factor [Science, 281(5381); 28 agosto 1998]. Los métodos para aislar el modulador y producir anticuerpos antimoduladores 65 y para determinar y optimizar la capacidad de los anticuerpos antimoduladores para ayudar en el examen de las células diana son bien conocidos en la materia.

Asimismo, los anticuerpos que incluyen tanto los anticuerpos policlonales como los monoclonales y los fármacos que modulan la producción o actividad de los AIF y otros factores de reconocimiento y/o sus subunidades pueden poseer determinadas aplicaciones de diagnóstico y pueden, por ejemplo, ser utilizados para detectar y/o medir enfermedades donde las anomalías en la estimulación o falta de estimulación de la apoptosis es o puede ser probable que se desarrolle. Por ejemplo, los polipéptidos del AIF o sus fragmentos activos pueden utilizarse para producir anticuerpos tanto policlonales como monoclonales contra ellos mismos en una variedad de medios celulares, mediante técnicas conocidas, tales como la técnica del hibridoma que utiliza, por ejemplo, linfocitos de bazo de ratón y células de mieloma fusionadas. Estas técnicas se describen con detalle a continuación. Asimismo, las moléculas pequeñas que simulan o antagonizan la o las actividades de los factores de reconocimiento del receptor de la invención pueden ser descubiertas o sintetizadas y pueden ser utilizadas en los protocolos de diagnóstico y/o terapéuticos.

La presencia de los AIF en las células puede determinarse mediante procedimientos inmunológicos habituales aplicables a dichas determinaciones. Se conocen numerosos procedimientos útiles. Tres de dichos procedimientos que son especialmente útiles utilizan ya sea el factor de reconocimiento del receptor marcado con un marcador detectable, anticuerpo Ab₁ marcado con un marcador detectable o anticuerpo Ab₂ marcado con un marcador detectable. Los procedimientos pueden resumirse mediante las siguientes ecuaciones en las que el asterisco indica que la partícula está marcada y "AIF" se refiere al factor estimulador de la apoptosis:

$$A. AIF^* + Ab_1 = AIF^*Ab_1$$

$$B. AIF + Ab^*_1 = AIFAb_1^*$$

$$C. AIF + Ab_1 + Ab^*_2 = Ab_1AIFAb^*_2$$

Todos los procedimientos y su aplicación son conocidos por los expertos en la materia y por consiguiente pueden utilizarse dentro del alcance de la presente invención. El procedimiento "competitivo", Procedimiento A, está descrito en las patentes US n° 3.654.090 y n° 3.850.752. El procedimiento B es representativo de técnicas de análisis competitivos muy conocidas. El procedimiento C, procedimiento "sándwich", está descrito en las patentes US n° RE 31.006 y n° 4.016.043. Todavía otros procedimientos son conocidos tales como el procedimiento de "doble anticuerpo" o "DASP".

En cada caso, los AIF forman complejos con uno o más anticuerpo(s) o compañeros de enlace y un miembro del complejo está marcado con un marcador detectable. El hecho de que se haya formado un complejo y, la cantidad del mismo, puede determinarse por métodos aplicables a la detección de marcadores.

De lo anterior se observará que una propiedad característica de Ab₂ es que reaccionará con Ab₁. Esto es debido a que Ab₁, producido en una especie de mamífero, se ha utilizado en otras especies como antígeno para producir el anticuerpo, Ab₂. Por ejemplo, Ab₂ puede ser producido en cabras utilizando anticuerpos de conejo como antígenos. Ab₂ por lo tanto sería el anticuerpo anticonejo producido en cabras. Para los fines de esta descripción y las reivindicaciones, Ab₁ se denominará anticuerpo primario o anti-AIF y Ab₂ se denominará anticuerpo secundario o anti-Ab₁.

Los marcadores más ampliamente empleados para estos estudios son los elementos radioactivos, enzimas, productos químicos que producen fluorescencia cuando se exponen a la luz ultravioleta y otros.

Se conocen numerosos materiales fluorescentes que pueden utilizarse como marcadores. Éstos comprenden, por ejemplo, fluoresceína, rodamina y auramina. Un determinado material de detección es el anticuerpo anti-conejo preparado en cabras y conjugado con fluoresceína mediante un isotiocianato.

Los AIF o sus compañeros de enlace pueden estar marcados con un elemento radioactivo o con una enzima. El elemento radioactivo puede ser detectado por alguno de los procedimientos de recuento disponibles actualmente. El isótopo preferido puede seleccionarse de entre ³H, ¹⁴C, ³²P, ³⁵S, ³⁶Cl, ⁵¹Cr, ⁵⁷Co, ⁵⁸Co, ⁵⁹Fe, ⁹⁰Y, ¹²⁵I, ¹³¹I y ¹⁸⁶Re.

Los marcadores enzimáticos son asimismo útiles, y pueden detectarse por cualquiera de las técnicas colorimétricas, espectrofotométricas, fluoroespectrofotométricas, amperométricas o gasométricas utilizadas actualmente. La enzima conjugada con la partícula seleccionada mediante la reacción con las moléculas que forman puente tales como carbodiimidas, diisocianatos, glutaraldehído y similares. Muchas enzimas que pueden utilizarse en estos procedimientos son conocidas y pueden utilizarse. Las preferidas son peroxidasa, β-glucuronidasa, β-D-glucosidasa, β-D-galactosidasa, ureasa, glucosa oxidasa más peroxidasa y fosfatasa alcalina. Las patentes US n° 3.654.090; n° 3.850.752 y n° 4.016.043 se citan a título de ejemplo por su descripción del material y de los métodos de marcado alternativos.

En una forma de realización adicional de la presente invención, pueden prepararse kits de ensayo adecuados para su utilización por un médico especialista para determinar la presencia o ausencia de actividad de transcripción predeterminada o de la capacidad para la actividad de transcripción predeterminada en células diana sospechosas. Según las técnicas de experimentación expuestas anteriormente, una clase de dichos kits contendrá por lo menos el AIF marcado o su compañero de enlace, por ejemplo un anticuerpo específico para éste, y direcciones, desde luego, dependiendo

ES 2 274 656 T3

del método seleccionado, por ejemplo, “competitivo”, “sándwich”, “DASP” y similares. Los kits pueden contener también reactivos periféricos tales como tampones, estabilizantes, etc.

Por consiguiente, puede prepararse un kit de ensayo para la demostración de la presencia o capacidad de las células para la actividad predeterminada de la transcripción, que comprende:

- (a) una cantidad predeterminada de por lo menos un componente reactivo marcado inmunoquímicamente obtenido mediante el acoplamiento directo e indirecto del presente AIF o un compañero de enlace específico a éste, para un marcador detectable;
- (b) otros reactivos; y
- (c) direcciones para la utilización de dicho kit.

Más específicamente, el kit de ensayo de diagnóstico puede comprender:

- (a) una cantidad conocida del AIF descrito anteriormente (o de un compañero de enlace) generalmente ligado a una fase sólida para formar un inmunosorbente, o como alternativa, ligado a una etiqueta adecuada, o varios de dichos productos finales, etc. (o sus compañeros de enlace) uno de cada;
- (b) si es necesario, otros reactivos; y
- (c) direcciones para la utilización de dicho kit de ensayo.

En otra variación, el kit de ensayo puede prepararse y utilizarse para los fines estipulados anteriormente, el cual opera según un protocolo predeterminado (por ejemplo “competitivo”, “sándwich”, “anticuerpo doble”, etc.), y comprende:

- (a) un componente marcado que ha sido obtenido por acoplamiento del AIF a un marcador detectable;
- (b) uno o más reactivos inmunoquímicos adicionales de los cuales por lo menos uno reactivo es un ligando o un ligando inmovilizado, el cual se selecciona de entre el grupo constituido por:
 - (i) un ligando capaz de unirse con el componente (a) marcado;
 - (ii) un ligando capaz de unirse con un compañero de enlace del componente (a) marcado;
 - (iii) un ligando capaz de unirse con por lo menos uno de los componentes que han de determinarse; y
 - (iv) un ligando capaz de unirse con al menos uno de los compañeros de enlace de por lo menos uno de los componentes que han de determinarse; y
- (c) direcciones para el funcionamiento de un protocolo destinado a la detección y/o determinación de uno o más componentes de una reacción inmunoquímica entre el AIF y el compañero de enlace específico a éste.

Implicaciones terapéuticas

Los polipéptidos, ácidos nucleicos y anticuerpos de la invención presentan un potencial terapéutico significativo. Opcionalmente, una cantidad terapéuticamente eficaz de dicho agente se administra en un vehículo, diluyente o excipiente farmacéuticamente aceptable.

Para los fines de esta descripción, son importantes las siguientes definiciones. La expresión “farmacéuticamente aceptable” se refiere a las entidades moleculares y a las composiciones que son fisiológicamente tolerables y no producen normalmente una reacción alérgica o igualmente desfavorable, tal como trastorno gástrico, mareos y similares, cuando se administran a un ser humano y que preferentemente no interfieren en la administración de la proteína administrada. Preferentemente, tal como se utiliza en la presente memoria, la expresión “farmacéuticamente aceptable” significa aprobado por una agencia reguladora del gobierno federal o estatal o listada en la *US Pharmacopeia* u otra farmacopea generalmente reconocida para su utilización en animales, y más particularmente en seres humanos. El término “portador” se refiere a un diluyente, adyuvante, excipiente o vehículo con el que se administra el compuesto. Dichos portadores farmacéuticos pueden ser líquidos esterilizados, tal como agua y aceites, incluyendo los de origen petrolífero, animal, vegetal o sintético, tales como aceite de cacahuate, aceite de soja, aceite mineral, aceite de sésamo y similares. El agua o las soluciones salinas y la dextrosa acuosa y las soluciones de glicerol se emplean preferentemente como portadores, particularmente para soluciones inyectables. Los portadores farmacéuticos adecuados están descritos en Martin, *Remington's Pharmaceutical Sciences*, 18ª ed., Mack Publishing Co., Easton, PA, (1990).

La expresión “cantidad terapéuticamente eficaz” se utiliza en la presente memoria para significar una cantidad suficiente para reducir por lo menos aproximadamente el 15%, preferentemente por lo menos el 50%, más preferentemente por lo menos el 90% y lo más preferentemente impedir, una deficiencia clínicamente significativa de la

actividad, función y respuesta del huésped. Alternativamente, una cantidad terapéuticamente eficaz es suficiente para producir una mejora en una enfermedad clínicamente significativa en el huésped.

La administración del polipéptido del AIF recombinante (o fragmentos, análogos u homólogos de AIF descritos anteriormente, que incorporan actividad de tipo AIF) a las células produce la estimulación de la apoptosis. Dicha administración podría ayudar en el tratamiento y control de numerosas enfermedades neoplásicas, por ejemplo, pero sin limitarse al linfoma, enfermedades neoplásicas del sistema nervioso central, sarcoma, melanoma, mesotelioma o cualquier enfermedad neoplásica de los demás órganos del cuerpo (por ejemplo, pero sin limitarse la próstata, pulmones, músculos, hígado, estómago, vejiga, útero). El polipéptido del AIF puede prepararse utilizando vectores de expresión normales de bacterias y/o mamíferos, sintéticamente, o purificado a partir del plasma o del suero, todo como se indica con detalle al principio en la presente memoria. Alternativamente, el aumento de expresión del polipéptido del AIF natural puede ser producido por técnicas de recombinación homóloga, como se describió anteriormente.

La reducción de la actividad del polipéptido del AIF (por desarrollo de antagonistas, inhibidores, utilización de anticuerpos neutralizantes o moléculas de cadena complementaria, producidas todas como se describe en la presente memoria) produciría una disminución de la apoptosis. Dicha actividad puede ser deseable para el tratamiento de varias enfermedades neurodegenerativas que se han asociado a la estimulación de la apoptosis (a la neurodegeneración debida al ictus, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson y esclerosis lateral amiotrófica). Por lo tanto, la modulación de la actividad del AIF puede servir para controlar o tratar enfermedades neoplásicas (aumentando su actividad) o para tratar enfermedades neurodegenerativas (disminuyendo su actividad).

Tratamiento terapéutico a base de polipéptidos

En el análisis más simple, el producto génico del AIF, y, consiguientemente, las moléculas homólogas, parecen formar parte de la serie de reacciones apoptóticas de señalización, en la que la apoptosis está estimulada por el AIF. El polipéptido del AIF, o un fragmento del mismo operativamente activo, o un antagonista del mismo, puede administrarse por vía oral o parenteral, preferentemente por vía parenteral. Por ejemplo, el polipéptido puede administrarse utilizando una infusión intravenosa, una bomba osmótica implantable, un parche transdérmico, liposomas u otros modos de administración. En una forma de realización, puede utilizarse una bomba [Langer *et al.*, eds., *Medical Applications of Controlled Release*, CRC Pres., Boca Ratón, Florida (1974); Sefton, *CRC Crit. Ref. Biomed. Eng.*, **14**:201 (1987); Buchwald *et al.*, *Surgery*, **88**:507 (1980); Saudek *et al.*, *N. Engl. J. Med.*, **321**:574 (1989)]. En otra forma de realización, pueden utilizarse materiales poliméricos [Langer, 1974, *supra*; Sefton, 1987, *supra*; Smolen *et al.*, eds., *Controlled Drug Bioavailability, Drug Product Design and Performance*, Wiley, Nueva York (1984); Ranger *et al.*, *J. Macromol. Sci. Rev. Macromol. Chem.*, **23**:61 (1983); Levy *et al.*, *Science*, **228**:190 (1985); During *et al.*, *Ann. Neurol.*, **25**:351 (1989); Howard *et al.*, *J. Neurosurg.*, **71**:105 (1989)]. En otra forma de realización todavía, puede colocarse un sistema de liberación controlada en la proximidad de la diana terapéutica, es decir, el cerebro, necesitando de este modo únicamente una fracción de la dosis generalizada [por ejemplo, Goodson, en *Medical Applications of Controlled Release*, vol. 2, págs. 115-138 (1984)]. Otros sistemas de liberación controlada son expuestos en el estudio por Langer, *Science*, **249**:1527-1533 (1990). En otra forma de realización, el compuesto terapéutico puede administrarse en una vesícula, en particular un liposoma (Langer, 1990 *supra*); Treat *et al.*, en *Liposomes in the Therapy of Infectious Disease and Cancer*, Lopez-Berestein y Fidler (eds.), Liss, Nueva York, págs. 353-365 (1989); López-Berestein, *ibid.*, págs. 317-327).

En un aspecto adicional, las células recombinantes que han sido transformadas con el gen del AIF y que expresan grandes concentraciones de polipéptido pueden ser trasplantadas en un paciente que necesite del polipéptido del AIF. Preferentemente las células autólogas transformadas con el gen del AIF se trasplantan para impedir el rechazo; alternativamente, está disponible la tecnología para proteger las células no autólogas que producen factores solubles dentro de una matriz polimérica que impide el reconocimiento y el rechazo inmunitario.

El polipéptido del AIF puede administrarse por las vías de administración intravenosa, intraarterial, intraperitoneal, intramuscular o subcutánea. Alternativamente, el polipéptido del AIF, formulado apropiadamente, puede administrarse mediante administración nasal u oral. Un aporte constante de AIF puede acumularse proporcionando una dosis terapéuticamente eficaz (es decir, una dosis eficaz que estimule la apoptosis en el área objetivo) a intervalos necesarios, por ejemplo, a diario, cada 12 horas, etc. Estos parámetros dependerán de la gravedad de la enfermedad que se está tratando, de otras actuaciones, del peso, la edad y sexo del paciente y de otros criterios, que pueden determinarse fácilmente según las buenas prácticas médicas habituales por los expertos en la materia.

Composiciones/composiciones farmacéuticas

Todavía en otro aspecto de la presente invención se proporcionan composiciones y composiciones farmacéuticas de las anteriores. Dichas composiciones farmacéuticas pueden ser destinadas a la administración por inyectables o por vía oral, pulmonar, nasal u otras formas de administración. En general, las composiciones farmacéuticas están comprendidas por la invención las cuales comprenden cantidades eficaces de proteína (AIF) o de productos derivados (por ejemplo, fragmentos, homólogos, variantes de AIF) de la invención junto con diluyentes, conservantes, solubilizantes, emulsionantes, adyuvantes y/o vehículos farmacéuticamente aceptables. Dichas composiciones comprenden diluyentes de varios contenidos en tampón (por ejemplo, Tris-HCl, acetato, fosfato), pH y fuerza iónica; aditivos tales como detergentes y agentes solubilizantes (por ejemplo, Tween 80, polisorbato 80), antioxidantes (por ejemplo, ácido ascórbico, metabisulfito sódico), conservantes (por ejemplo, Thimersol, alcohol bencílico) y sustancias para esponjamiento

(por ejemplo, lactosa, manitol); incorporación del material en preparaciones en partículas de compuestos poliméricos tales como ácido poliláctico, ácido poliglicólico, etc. o en liposomas. Puede utilizarse también el ácido hialurónico. Dichas composiciones pueden influir en el estado físico, estabilidad, ritmo de liberación *in vivo* y ritmo de eliminación *in vivo* de las presentes proteínas y derivados, por ejemplo, Martin, *Remington's Pharmaceutical Sciences*, 18ª ed. [1990, Mack Publishing Co., Easton, PA 18042] páginas 1435-1712 que están incorporadas a la presente memoria como referencia. Las composiciones pueden prepararse en forma líquida o pueden estar en polvo seco, tal como en forma liofilizada.

Administración oral

Para su utilización en la presente memoria se contemplan las formas de dosificación sólidas orales, que están descritas generalmente en Martin, *Remington's Pharmaceutical Sciences*, 18ª ed. [1990, Mack Publishing Co., Easton, PA 18042] en el Capítulo 89, que se incorpora en la presente memoria como referencia. Las formas de dosificación sólidas comprenden comprimidos, cápsulas, píldoras, grageas o pastillas, sellos o gránulos. Asimismo puede utilizarse la encapsulación liposómica o proteínica para formular las presentes formulaciones (como, por ejemplo, microesferas proteínicas publicadas en la patente US nº 4.925.673). Puede utilizarse encapsulación liposómica y los liposomas pueden modificarse con varios polímeros (por ejemplo, patente US nº 5.013.556). Una descripción de las posibles formas de dosificación sólida para la terapia es proporcionada por Marshall, en *Modern Pharmaceutics*, Capítulo 10, Banker y Rhodes, ed., (1979), incorporada a la presente memoria como referencia. En general, la formulación incluirá la proteína (o la proteína modificada químicamente) e ingredientes inertes que permiten la protección contra el medio del estómago y la liberación del material biológicamente activo en el intestino.

Se contemplan también específicamente las formas de dosificación oral de las proteínas modificadas anteriormente. La proteína puede estar químicamente modificada de modo que sea eficaz la administración oral del derivado. Generalmente, la modificación química contemplada es el acoplamiento de por lo menos una fracción a la propia molécula de proteína (o péptido), donde dicha fracción permite (a) la inhibición de la proteólisis; y (b) la absorción en el torrente sanguíneo del estómago o intestino. También se desea el aumento de la estabilidad general de la proteína y el aumento del tiempo de circulación en el tiempo. Ejemplos de dichas fracciones comprenden: polietilenglicol, copolímeros de etilenglicol y propilenglicol, carboximetilcelulosa, dextrano, alcohol polivinílico, polivinilpirrolidona y poliprolina [Abuchowski *et al.*, 1981, *supra*; Newmark *et al.*, *J. Appl. Biochem.*, 4:185-189 (1982)]. Otros polímeros que podrían utilizarse son el poli-1,3-dioxolano y el poli-1,3,6-tioxocano. Para la utilización farmacéutica se prefiere, como se indicó anteriormente las fracciones de polietilenglicol.

Para la proteína (o derivado) la posición de liberación puede ser el estómago, el intestino delgado (el duodeno, el yeyuno o el íleon) o el intestino grueso. Un experto en la materia tiene formulaciones disponibles que no se disolverán en el estómago, pero liberarán el material en el duodeno o en cualquier parte del intestino. Preferentemente, la liberación impedirá los efectos perjudiciales del medio estomacal, ya sea mediante la protección de la proteína (o derivados) o mediante la liberación del material biológicamente activo fuera del medio estomacal, tal como en el intestino.

Para asegurar la resistencia gástrica completa, es esencial un revestimiento impermeable a por lo menos pH 5.0. Ejemplos de los ingredientes inertes más frecuentes que se utilizan como revestimientos entéricos son el trimelitato acetato de celulosa (CAT), ftalato de hidroxipropilmetilcelulosa (HPMCP), HPMCP 50, HPMCP 55, acetato ftalato de polivinilo (PVAP), Eudragit L30D, Aquateric, acetato ftalato de celulosa (CAP), Eudragit L, Eudragit S y goma laca. Estos recubrimientos pueden utilizarse como películas mixtas.

Un revestimiento o mezcla de revestimientos puede también utilizarse en comprimidos, que no están destinados a la protección contra el estómago. Éste puede incluir revestimientos de azúcar o revestimientos que hacen que la tableta sea más fácil de ingerir. Las cápsulas pueden estar constituidas por una carcasa dura (tal como gelatina) para la administración del producto terapéutico seco, es decir, en polvo, para formas líquidas, puede utilizarse una carcasa blanda de gelatina. El material de la carcasa de los sellos podría ser almidón espeso u otro papel comestible. Para las píldoras, pastillas, comprimidos moldeados o triturados de comprimidos, pueden utilizarse técnicas de amasado húmedas.

El producto terapéutico puede estar incluido en la formulación como multipartículas finas en forma de gránulos o bolitas de tamaño de partícula aproximadamente 1 mm. La formulación del material para la administración de cápsula puede ser también en forma de polvo, tampones ligeramente comprimidos o incluso como comprimidos. El producto terapéutico podría ser preparado por compresión.

Todos los colorantes y agentes potenciadores de sabor pueden estar incluidos. Por ejemplo, la proteína (o derivados) puede formularse (tal como por encapsulación del liposoma o microesfera) y a continuación estar contenida después en un producto comestible, puede diluirse o aumentar el volumen del producto terapéutico con un material inerte. Estos diluyentes podrían incluir carbohidratos, especialmente manitol, α -lactosa, lactosa anhidra, celulosa, sacarosa, dextranos modificados y almidón. Determinadas sales inorgánicas pueden utilizarse también como cargas incluyendo el trifosfato cálcico, carbonato de magnesio y cloruro sódico. Algunos diluyentes disponibles en el mercado son Fast-Flo, Emdex, STA-Rx 1500, Emcompress y Avicell.

Pueden estar incluidos en la formulación disgregadores del producto terapéutico en una forma galénica sólida. Los materiales utilizados como disgregadores comprenden pero no se limitan a almidón, incluyendo el disgregador comercial basado en almidón, Explotab. Pueden también utilizarse almidón glicolato sódico, carboximetilcelulosa sódica, ultramilopectina, alginato sódico, gelatina, cáscara de naranja, carboximetilcelulosa ácida, esponja natural y bentonita. Otra forma de disgregadores son las resinas insolubles de intercambio catiónico. Pueden utilizarse gomas en polvo como disgregadores y como aglutinantes y éstas pueden incluir las gomas en polvo tal como agar-agar, Karaya o tragacanto. El ácido alginico y su sal sódica sirven asimismo como disgregadores.

Pueden utilizarse aglomerantes para mantener el agente terapéutico unido para formar un comprimido duro o incluyen materiales procedentes de productos naturales tales como acacia, tragacanto, almidón y gelatina. Otros incluyen metilcelulosa (MC), etilcelulosa (EC) y carboximetilcelulosa (CMC). La polivinilpirrolidona (PVP) y la hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) podrían ser utilizadas ambas en soluciones alcohólicas para granular el producto terapéutico.

Puede incluirse un agente antifricción en la formulación del producto terapéutico para impedir la adherencia durante el proceso de formulación. Pueden utilizarse lubricantes como una capa entre el producto terapéutico y la pared del troquel, y éstos pueden incluir pero no se limitan a: ácido esteárico incluyendo sus sales de magnesio y de calcio, politetrafluoroetileno (PTFE), parafina líquida, aceites vegetales y ceras. Pueden utilizarse también lubricantes solubles tales como el lauril sulfato sódico, lauril sulfato de magnesio, polietilenglicol de varios pesos moleculares y Carbowax 4000 y 6000.

Pueden añadirse fluidificantes que pueden mejorar las propiedades de flujo del fármaco durante la formulación y ayudar a la reordenación durante la compresión. Los fluidificantes pueden incluir almidón, talco, sílice pirógena y silicoaluminato hidratado.

Para ayudar a la disolución del producto terapéutico en el medio acuoso, puede añadirse un tensioactivo como agente humectante. Los tensioactivos pueden comprender detergentes aniónicos tales como laurilsulfato sódico, sulfosuccinato de dioctilo sódico y sulfonato de dioctilo sódico. Pueden utilizarse detergentes catiónicos y podrían incluir cloruro de benzalconio o cloruro de bencetomio. La lista de detergentes potenciales no iónicos que podrían incluirse en la formulaciones como tensioactivos son lauromacrogol 400, estearato de polioxil 40, aceite de ricino hidrogenado con polioxietileno 10, 50 y 60, monoestearato de glicerol, polisorbato 40, 60, 65 y 80, éster de ácido graso con sacarosa, metilcelulosa y carboximetilcelulosa. Estos tensioactivos pueden estar presentes en la formulación de la proteína o derivado ya sean solos o en mezcla en diferentes proporciones.

Los aditivos que aumentan potencialmente la absorción de la proteína (o derivado) son por ejemplo los ácidos grasos: ácido oleico, ácido linoleico y ácido linolénico.

Puede ser deseable una formulación de liberación controlada. La composición podría incorporarse en una matriz inerte que permita la liberación ya sea por mecanismos de difusión o percolación, es decir, gomas. Pueden incorporarse también en la formulación matrices que se degeneran lentamente. Otra forma de liberación controlada de este producto terapéutico es mediante un método basado en el sistema terapéutico Oros (Alza Corp.), es decir, el fármaco está ocluido en una membrana semipermeable que permite que entre el agua o impulse el fármaco a través de una pequeña abertura única debido a efectos osmóticos. Algunos recubrimientos entéricos también presentan un efecto de liberación retardada.

Pueden utilizarse otros recubrimientos para la formulación. Éstos comprenden una variedad de azúcares que podría aplicarse en un pan de recubrimiento. El agente terapéutico podría también administrarse en un comprimido recubierto de película; los materiales utilizados en este caso se dividen en dos grupos. El primero son los materiales no entéricos e incluyen metilcelulosa, etilcelulosa, hidroxietilcelulosa, metilhdroxietilcelulosa, hidroxipropilcelulosa, hidroxipropil-metilcelulosa, carboxi-metilcelulosa sódica, providona y los polietilenglicoles. El segundo grupo consiste en materiales entéricos que normalmente son ésteres del ácido ftálico.

Podría utilizarse una mezcla de materiales para proporcionar el revestimiento óptimo de la película. El revestimiento de la película puede realizarse en una capa de pan o en un lecho fluidizado o por revestimiento por compresión.

55 Administración pulmonar

Se contempla también en la presente memoria la administración pulmonar de la presente proteína (o de derivados de la misma). La proteína (o derivado) se administra a los pulmones de un mamífero mientras inhala y atraviesa el revestimiento epitelial del pulmón hasta el torrente sanguíneo. Otros informes sobre esto comprenden Adjei *et al.*, *Pharmaceutical Research*, **7(6)**:565-569 (1990); Adjei *et al.*, *International Journal of Pharmaceutics*, **63**:135-144 (1990) (acetato de leuprolida); Braquet *et al.*, *Journal of Cardiovascular Pharmacology*, **13** (supl. 5):143-146 (1989) (endotelina-1); Hubbard *et al.*, *Annals of Internal Medicine*, **3(3)**:206-212 (1989) (α -antitripsina); Smith *et al.*, *J. Clin. Invest.*, **84**:1145-1146 (1989) (α 1-proteinasa); Oswein *et al.*, "Aerosolization of Proteins", *Proceedings of Symposium on Respiratory Drug Delivery II*, Keystone, Colorado, (marzo 1990) (hormona de crecimiento humano recombinante); Debs *et al.*, *J. Immunol.*, **140**:3482-3488 (1988) y Platz *et al.*, patente US n° 5.284.656 (factor inductor de colonias de granulocito). Para su utilización en la puesta en práctica de la presente invención se contempla una amplia gama de dispositivos mecánicos diseñados para la administración pulmonar de productos terapéuticos, incluyendo pero sin

limitarse a nebulizadores, inhaladores de dosis medidas o inhaladores de polvo, todos los cuales son conocidos por los expertos en la materia.

Algunos ejemplos específicos de dispositivos disponibles en el mercado adecuados para la puesta en práctica de la presente invención son el nebulizador Ultravent, fabricado por Mallinckrodt, Inc., St. Louis, Missouri; el nebulizador Acorn II, fabricado por Marquest Medical Products, Englewood, Colorado; el inhalador de dosis medidas Ventolin, fabricado por Glaxo Inc., Research Triangle Park, Carolina del norte; y el inhalador de polvo Spinhaler, preparado por Fisons Corp., Bedford, Massachussets.

Todos estos dispositivos requieren la utilización de formulaciones adecuadas para la administración de la proteína (o derivado). Típicamente, cada formulación es específica para el tipo de dispositivo empleado y puede entrañar la utilización de un material propelente apropiado, además de los diluyentes, adyuvantes y/o portadores habituales útiles en terapia. Asimismo, se contempla la utilización de liposomas, microcápsulas o microesferas, complejos de inclusión u otros tipos de portadores. Puede prepararse también proteína modificada químicamente en diferentes formulaciones dependiendo del tipo de modificación química o del tipo de dispositivo empleado.

Las formulaciones adecuadas para su utilización con un nebulizador, ya sea de chorro o ultrasónico, comprenden típicamente proteína (o derivado) disuelto en agua a una concentración de aproximadamente 0,1 a 25 mg de proteína biológicamente activa por ml de solución. La formulación puede también incluir un tampón y un azúcar sencillo (por ejemplo, para la estabilización de proteínas y regulación de la presión osmótica). La formulación del nebulizador puede contener también un tensioactivo, para reducir o impedir la agregación estimulada por la superficie de la proteína producida por atomización de la solución en la formación del aerosol.

Las formulaciones para su utilización con un dispositivo inhalador de dosis medidas comprenderán generalmente un polvo dividido finamente que contiene la proteína (o derivado) suspendido en un propelente con ayuda de un tensioactivo. El propelente puede ser cualquier material convencional empleado para este fin, tal como un cloro-fluorocarburo, un hidroclorofluorocarburo, un hidrofluorocarburo o un hidrocarburo, incluyendo triclorofluorometano, diclorodifluorometano, diclorotetrafluoroetano y 1,1,1,2-tetrafluoroetano o combinaciones de los mismos. Los tensioactivos adecuados incluyen trioleato de sorbitán y lecitina de soja. El ácido oleico puede ser útil también como tensioactivo.

Las formulaciones para la administración con un dispositivo inhalador de polvo comprenderán una proteína (o derivado) que contiene el polvo seco dividido finamente y puede también comprender un agente de esponjamiento, tal como lactosa, sorbitol, sacarosa o manitol en cantidades que faciliten la dispersión del polvo desde el dispositivo, por ejemplo, 50 a 90% en peso de la formulación. La proteína (o derivado) debería prepararse de manera más ventajosa en forma de partículas con un tamaño de partícula medio inferior a 10 μM (o micras), más preferentemente de 0,5 a 5 μM , para la administración más eficaz del pulmón distal.

Administración nasal

Se contempla asimismo la administración nasal de la proteína (o derivado). La administración nasal permite el paso de la proteína al torrente sanguíneo directamente tras la administración del producto terapéutico a la nariz, sin necesidad de deposición del producto en el pulmón. Las formulaciones para la administración nasal incluyen las que contienen dextrano o ciclodextrano.

Métodos de tratamiento, métodos de preparación del medicamento

Todavía en otro aspecto de la presente invención, se proporcionan métodos de tratamiento y de preparación de un medicamento. Las enfermedades aliviadas o moduladas por la administración de los presentes derivados son las indicadas anteriormente.

Dosis

Para todas las moléculas anteriores, a medida que se realizan más estudios, la información aparecerá con respecto a las concentraciones de dosificación apropiadas para el tratamiento de varias enfermedades en varios pacientes, y el especialista ordinario, considerando el contexto terapéutico, la edad y la salud general del receptor, será capaz de determinar la dosis apropiada. Generalmente, para inyectables o infusión, la dosis estará comprendida entre 0,01 μg de proteína biológicamente activa/kg de peso corporal, (calculando la masa de la proteína sola, sin modificación química) y 10 mg/kg (referida a la misma). El programa de dosificación puede variar, dependiendo de la vida media en circulación de la proteína o derivado utilizado, si el polipéptido se administra en dosis en inyección directa o en infusión continua, y de la formulación utilizada.

Administración con otros compuestos/modalidades de tratamiento

Para la terapia asociada a anomalías relacionadas con la falta de estimulación de la apoptosis, se puede administrar la presente proteína (o derivados) junto con una o más composiciones farmacéuticas utilizadas para el tratamiento de la complicación clínica subyacente (es decir, cáncer: radioterapia y/o quimioterapia). La administración puede ser simultánea o *in seriatim*.

Tratamiento terapéutico a base de ácido nucleico

El polinucleótido del AIF puede introducirse en las células para desarrollar la terapia génica para las anomalías relacionadas con la falta de estimulación de la apoptosis (por ejemplo, enfermedades neoplásicas). Dicha terapia es de esperar que controle dichos cánceres. Por el contrario, la introducción de montajes con cadena complementaria en células humanas con cantidades anormalmente elevadas de apoptosis (por ejemplo, enfermedad neurodegenerativa) reducirían las concentraciones de polipéptido del AIF activo y serían predichas para aliviar los síntomas subyacentes.

En una forma de realización, un gen que codifica un polipéptido del AIF se introduce *in vivo* en un vector vírico. Dichos vectores comprenden un ADN virus atenuado o defectuoso, tal como pero no limitado al virus del herpes simple (HSV), papilomavirus, virus de Epstein Barr (EBV), adenovirus, virus adenoasociado (AAV) y similares. Dichos virus no son infecciosos tras la introducción en una célula. La utilización de los vectores víricos anteriores permite la administración a células en un área específica, localizada, sin preocuparse de que el vector pueda infectar otras células. Por lo tanto, por ejemplo el tejido canceroso puede ser dirigido específicamente. Ejemplos de vectores concretos comprenden, pero no se limitan a vector del herpes virus 1 (HSV1) [Kapliitt *et al.*, *Molec. Cell. Neurosci.*, **2**:320-330 (1991)], véase la patente US nº 5.288.641 de Roizman, un vector de adenovirus atenuado, tal como el vector descrito por Stratford-Perricaudet *et al.*, *J. Clin. Invest.*, **90**:626-630 (1992) y un vector adenoasociado defectuoso [Samulski *et al.*, *J. Virol.*, **61**:3096-3101 (1987); Samulski *et al.*, *J. Virol.*, **63**:3822-3828 (1989)].

En otra forma de realización, el gen puede introducirse en un vector retrovírico, por ejemplo, como se describe en Anderson *et al.*, patente US nº 5.399.346; Mann *et al.*, *Cell*, **33**:153 (1983); Temin *et al.*, patente US nº 4.650.764; Temin *et al.*, patente US nº 4.980.289; Markowitz *et al.*, *J. Virol.*, **62**:1120 (1988); Temin *et al.*, patente US nº 5.124.263; publicación de patente internacional nº WO 95/07358, publicada el 16 de marzo de 1995, por Dougherty *et al.*; y Kuo *et al.*, *Blood*, **82**:845 (1993).

Con respecto a la utilización de vectores víricos para administrar una terapia a base de genes, es preferible un polinucleótido del AIF o un fragmento del mismo bajo el control de un activador capaz de expresarse en las células diana (operativamente ligado a un activador que opera en el contexto de un genoma vírico), por ejemplo, montajes con cadena complementaria (véase anteriormente) para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas o cualquier otra enfermedad caracterizada por la hiperestimulación de la apoptosis.

Alternativamente, el vector puede introducirse *in vivo* por lipofección. Durante la década pasada, se ha incrementado la utilización de liposomas para encapsulación y transfección de ácidos nucleicos *in vitro*. Los lípidos catiónicos sintéticos diseñados para limitar las dificultades y riesgos encontrados con la transfección mediada por liposomas pueden utilizarse para preparar liposomas para la transfección *in vivo* de un gen que codifica un marcador [Felgner *et al.*, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, **84**:7413-7417 (1987); Mackey *et al.*, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, **85**:8027-8031 (1988)]. La utilización de lípidos catiónicos puede estimular la encapsulación de ácidos nucleicos cargados negativamente y también estimular la fusión con las membranas celulares cargadas negativamente [Felgner *et al.*, *Science*, **337**:387-388 (1989)]. La utilización de lipofección para introducir genes exógenos en órganos específicos *in vivo* presenta determinadas ventajas prácticas. El direccionamiento molecular de los liposomas a células específicas representa un área de utilidad. Está claro que dirigir la transfección a determinados tipos de células presentaría particularmente ventajas en un tejido con heterogeneidad celular, tales como el páncreas, hígado, riñón y cerebro. Los lípidos pueden acoplarse químicamente a otras moléculas con fines de direccionamiento [Mackey *et al.*, 1988, *supra*]. Los péptidos dirigidos, por ejemplo, hormonas o neurotransmisores, y proteínas tales como los anticuerpos o moléculas no peptídicas podrían acoplarse químicamente a los liposomas.

Es posible también introducir el vector *in vivo* como plásmido de ADN desprotegido. Los vectores de ADN desprotegidos para la terapia génica pueden introducirse en la célula huésped deseada por los métodos conocidos en la materia, por ejemplo, transfección, electroporación, microinyección, transducción, fusión celular, DEAE dextrano, precipitación con fosfato de calcio, utilización de un acelerador de genes o utilización de un transportador del vector del ADN [Wu *et al.*, *J. Biol. Chem.*, **267**:963-967 (1992); Wu *et al.*, *J. Biol. Chem.*, **263**:14621-14624 (1988); Hartmut *et al.*, solicitud de patente canadiense nº 2.012.311, presentada el 15 de marzo de 1990].

Compañero de enlace al AIF

El desarrollo de pequeñas moléculas agonistas y antagonistas del AIF se facilitará en gran medida mediante el aislamiento del o de los compañero(s) de enlace al AIF. Esto puede realizarse preparando el polipéptido activo del AIF y utilizándolo para identificar un banco de expresión que utiliza metodología habitual. La unión del enlace del compañero en el banco de expresión puede determinarse administrando polipéptido recombinante preparado que utiliza vectores de expresión bacterianos o de mamífero y observando los efectos a corto plazo y la administración continua del polipéptido recombinante en las células del banco de expresión.

Los bancos de ADNc procedentes de tejidos que se cree que contienen AIF pueden ser construidos en vectores de clonación de expresión normal. Estos clones de ADNc se introducirán a continuación en las células COS en grupos y los transformantes resultantes se determinarían con ligando activo para identificar las células COS que se expresan el compañero de enlace al AIF. Los clones positivos pueden aislarse a continuación con el fin de recuperar el compañero de enlace clonado. El compañero de enlace clonado se utilizaría junto con el ligando del AIF para desarrollar los componentes necesarios para la identificación de pequeñas moléculas de moduladores de AIF.

Un ensayo útil y complementado según la presente invención se conoce como ensayo "cis/trans". En resumen, este ensayo emplea dos montajes genéticos, uno de los cuales es típicamente un plásmido que expresa continuamente un compañero de enlace determinado de interés cuando se transfecta en una línea celular apropiada, y el segundo de los cuales es un plásmido que expresa un indicador tal como luciferasa, bajo el control de un complejo receptor/ligando.

Por lo tanto, por ejemplo, si se desea evaluar un compuesto como ligando para un determinado compañero de enlace, uno de los plásmidos debería ser un montaje que produzca la expresión del compañero de enlace en la línea celular seleccionada, mientras que el segundo plásmido poseería un activador ligado al gen de luciferasa en el que el elemento de respuesta al compañero de enlace determinado está insertado. Si el compuesto en ensayo es un agonista para el compañero de enlace, el ligando se acomplejará con el receptor y el complejo resultante unirá el elemento de respuesta e iniciará la transcripción del gen de luciferasa. Se mide a continuación fotométricamente la quimioluminiscencia resultante, y se obtienen las curvas de respuesta a la dosis y se comparan con las de los ligandos conocidos. El protocolo anterior está descrito con detalle en la patente US n° 4.981.784 y en la publicación internacional PCT n° WO 88/03168, con cuya intención se cita al especialista. Una vez se identifica un recombinante que expresa la secuencia génica del compañero de enlace al AIF, puede analizarse el compañero de enlace al AIF recombinante. Esto se consigue mediante los ensayos basados en las propiedades físicas u operativas del compañero de enlace al AIF, incluyendo el marcado radioactivo del compañero de enlace seguido de análisis por electroforesis en gel, inmunoanálisis, fijación del ligando, etc. Además, pueden generarse anticuerpos contra el compañero de enlace al AIF como se describió anteriormente.

La estructura del compañero de enlace al AIF puede analizarse por varios métodos conocidos en la materia. Preferentemente, se analiza la estructura de varios dominios, particularmente la secuencia de enlace al AIF. El análisis estructural puede realizarse identificando la secuencia de manera similar con otras proteínas conocidas, determinadas hormonas y compañero de enlace a la proteína. El grado de similitud (u homología) puede aportar una base para predecir la estructura y función del compañero de enlace al AIF o un dominio del mismo. En una forma de realización específica, las comparaciones de la secuencia pueden realizarse con las secuencias halladas en el GenBank, utilizando, por ejemplo, los programas FASTA y FASTP [Pearson *et al.*, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, **85**:2444-2448 (1988)].

La secuencia proteica puede caracterizarse más mediante un análisis de hidrofilia, por ejemplo, Hopp *et al.*, 1981, *supra*. Puede utilizarse un perfil de hidrofilia para identificar las zonas hidrofóbica e hidrofílica del compañero de enlace al AIF, que a su vez puede indicar las zonas extracitoplásmicas, de enlace a la membrana o intracitoplásmicas.

Puede emprenderse asimismo el análisis estructural secundario, por ejemplo, Chou *et al.*, 1974, *supra*, para identificar zonas del compañero de enlace al AIF que suponen estructuras secundarias específicas. La manipulación, traducción y producción de la estructura secundaria, así como la predicción y la representación del marco de lectura abierto, también pueden realizarse utilizando programas informáticos disponibles en la materia.

Al proporcionar una abundante fuente de polipéptido del AIF recombinante y la oportunidad de aislar el compañero de enlace al AIF, la presente invención permite la determinación estructural cuantitativa de la conformación activa del polipéptido del AIF y el compañero de enlace al AIF o los dominios del mismo. En particular, se aporta material suficiente para resonancia magnética nuclear (RMN), infrarrojo (RI), Raman y ultravioleta (UV), especialmente diroísmo celular (CD), análisis espectroscópico. En particular la RMN proporciona análisis estructural muy potente de moléculas en solución, que se aproxima más estrechamente a su medio natural (Marion *et al.*, 1983, *supra*; Bar *et al.*, 1985, *supra*; Kimura *et al.*, 1980, *supra*). Otros métodos de análisis estructural pueden emplearse también. Éstos incluyen pero no se limitan a la cristalografía por rayos X (Engstrom, 1974, *supra*).

Más preferentemente, pueden estudiarse los cristales conjuntos de polipéptido del AIF y del compañero de enlace al AIF. El análisis de los cristales conjuntos proporciona información detallada acerca del enlace, que a su vez permite el diseño racional de agonistas y antagonistas del ligando. También puede utilizarse modelado informático, especialmente en relación con los métodos por RMN o por rayos X [Fletterick *et al.*, eds., *Computer Graphics and Molecular Modeling, in Current Communications in Molecular Biology*, Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor, Nueva York (1986)].

La identificación y aislamiento de un gen que codifica un compañero de enlace al AIF de la invención proporciona la expresión del receptor en cantidades mayores que pueden aislarse de fuentes naturales o en las células indicadoras que están especialmente modificadas genéticamente para indicar la actividad del compañero de enlace expresada tras la transfección o transformación de las células. Por consiguiente, además del diseño racional de agonistas y antagonistas basado en la estructura del polipéptido del AIF, la presente invención contempla un método alternativo para la identificación de ligandos específicos del compañero de enlace al AIF utilizando varios ensayos de identificación conocidos en la materia.

La invención se ilustra mediante los ejemplos siguientes, que no pretenden limitar el alcance de la invención tal como se describe en las reivindicaciones.

El Ejemplo 1 proporciona métodos para la clonación y expresión del AIF de ratón.

El Ejemplo 2 proporciona métodos para la producción de antiseros anti-AIF así como los métodos para los protocolos experimentales de inmunofluorescencia, microscopía inmunoelectrónica e inmunorreducción.

ES 2 274 656 T3

El Ejemplo 3 proporciona métodos para protocolos experimentales que entrañan el fraccionamiento subcelular y sistemas de apoptosis exentos de células.

El Ejemplo 4 proporciona métodos para la microinyección, transfección y cuantificación de la apoptosis.

El Ejemplo 5 describe las isoformas alternativas del AIF de ratón.

El Ejemplo 6 describe la clonación del AIF humano.

El Ejemplo 7 describe las isoformas alternativas del AIF humano.

El Ejemplo 8 proporciona métodos para la construcción del ADNc del AIF humano completo.

El Ejemplo 9 proporciona métodos para el cultivo de células huésped y la estimulación subsiguiente de la proteína recombinante (AIF).

El Ejemplo 10 describe la purificación de la proteína de fusión del AIF recombinante completa.

El Ejemplo 11 describe la utilización de un análisis híbrido de levadura para identificar los compañeros de enlace al AIF.

Ejemplo 1

Clonación del ADNc del AIF de ratón y producción recombinante del mismo

Con el fin de determinar la secuencia del ADN que codifica a mAIF, se sometió el polipéptido a purificación de proteínas, seguido de análisis de la secuencia de aminoácidos y alineamiento por análisis informático con los EST del GenBank. Después de la determinación tanto del inicio 5' como de la terminación 3' de mAIF, se emprendió el análisis RT-PCT para verificar que el cóntigo de mAIF obtenido formaba un marco de lectura abierto continuo (véase a continuación los métodos existentes).

Purificación de mAIF/alineación de EST

Se purificó el mAIF (AIF de ratón) a partir del sobrenadante de mitocondrias de hígado de ratón tratadas con atractilósida como se describió anteriormente [Wada *et al.*, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **95**:144-149 (1998)], se sometió a SDS-PAGE, tinción con plata, escisión de la banda de ~ 57 kDa, digestión *in situ* con tripsina, extracción del péptido, inyección en una columna HPLC microcapilar (50 micras i.d. x 10 cm.) rellena con C-18 (YMC ODS-AQ) e ionización por electroatomización en un espectrómetro de masas de triple cuadrupolo (Finnigan, San José, CA) durante la elución a gradiente lineal de péptidos con acetonitrilo.

Se analizaron los datos espectrométricos de masas con el ordenador SEQUEST de rutina, permitiendo la correlación de espectros de disociación producidos por colisiones de alta energía de péptidos con todas las secuencias en las bases de datos de proteínas públicas [Ducret *et al.*, *Protein Sci.* **7**:706-719 (1998)]. En resumen (véase a continuación para detalles adicionales) una secuencia etiqueta expresada (GenBank EST n° 1.595.214) que es compatible con los datos de la electroatomización se alineó con varios otros EST de ratón en la base de datos NCBI (por ejemplo n° AA106466 y n° AA068609 de registro en el GenBank). Estos EST se obtuvieron del consorcio IMAGE (Research Genetics, Huntsville, AL) y se secuenciaron para generar un cóntigo del ADNc del AIF de ratón que se utilizó posteriormente para clonar el ADNc completo de ratón y AIF humano por RT-PCR. Se realizaron análisis por transferencia Northern utilizando el ADNc del mAIF completo como sonda.

Más específicamente, los EST de ratón siguientes se alinearon para formar el cóntigo del ADNc del AIF de ratón preliminar: GenBank n° AA106466 (el clon más 5' EST), GenBank n° AA572575, GenBank n° W77437, GenBank n° AA155062, GenBank n° AA516860, GenBank n° AA088093, GenBank n° AA073449 y GenBank n° AA134414.

Determinación del inicio 5' (ATG) de mAIF

La mayor parte del clon EST de ratón de 5' (GenBank n° AA106466) y dos EST humanos (GenBank n° AA337888 y dbj n° C03711), que se cree que corresponden a secuencias ortólogas de AIF, comienzan todos en similares posiciones. Este fenómeno con frecuencia es indicativo de los clones EST que representan el inicio de la transcripción.

La alineación de los EST del AIF de ratón (GenBank n° AA106466) y humano (obj n° C03711) pusieron de manifiesto que eran más divergentes en los terminales del extremo 5' y realmente contenían un hueco de 2 nucleótidos en la alineación en el extremo 5'. Debido a que este hueco en la alineación destruiría el marco de lectura, se sacó en conclusión que el área divergente de la secuencia representaba la zona 5' no traducida. La traducción de cada uno de estos EST en los 3 marcos puso de manifiesto que solamente un marco de lectura continuaba en la dirección de 3' a 5' sin codones de terminación y este marco era el mismo para los EST de AIF tanto de ratón (GenBank n° AA106466) como humano (GenBank n° AA337888 y dbj n° C03711). Además, las alineaciones de la especie de cruce permitieron la verificación de este mismo marco de lectura del extremo 5' de AIF porque las secuencias de AIF de ratón y humana

normalmente se diferenciaban en nucleótidos, que estaban localizados en muchos de los 3 nucleótidos alejados entre sí y estaban por lo tanto ocupando la posición “de oscilación” o el tercer nucleótido del codón de tres letras. La traducción de los EST del AIF de ratón y humano en este marco identificó el inicio de metionina. La presencia de la g en la posición -3 del codón de inicio (ATG) tanto en los clones EST de ratón como humano es coherente con el consenso de Kozak de una A o una g en la posición -3 de la metionina del inicio. Esto por consiguiente presta más apoyo a que ésta sea la verdadera metionina de inicio del AIF.

Determinación de la terminación 3' del ADNc del mAIF

La alineación del cóntigo del ADNc del mAIF con otros EST en la base de datos N.C.B.I. identificó un EST de ratón adicional (GenBank n° AA060609) que extendió el cóntigo del AIF de ratón aun más de 3'. Se cree que este clon EST de ratón se perdió supuestamente porque solamente se solapó con el cóntigo original en 37 nucleótidos.

Este clon EST de ratón adicional (GenBank n° AA068609) estaba disponible y por lo tanto se adquirió en el consorcio I.M.A.G.E. (ADNc ID n° 524752; situado en el vector pBlueScript SK; el ADNc de EST se clonó procedente de un melanoma M2 de ratón de Stratagene (n° 937312). Una vez obtenido, la bacteria que contiene el clon EST se sometió al siguiente protocolo.

Se utilizó un bucle esterilizado para inocular 3,5 ml de caldo de cultivo LB (que contiene 50 µg de carbenicilina/ml) y la bacteria se cultivó en un incubador con agitación a 37°C durante 16 horas. Se utilizó a continuación un kit Plasmid Miniprep de Qiagen (Qiagen Inc. Mississauga, ON, catálogo n° 12125) para preparar el ADN del plásmido de este cultivo según las instrucciones del fabricante. El ADN del plásmido se puso en suspensión en 30 µl de 1 × tampón T.E. (pH 8,0) y se sometió a secuenciado de didesoxi-nucleótido fluorescente y detección automática (ABI/Perkin Elmer, Foster City, CA) con los cebadores T7 y T3.

El secuenciado de este clon EST que utiliza los cebadores T3 y T7 puso de manifiesto que este clon contenía la supuesta terminación 3' para AIF de ratón porque contenía terminaciones en los 3 marcos de lectura (Figs. 8A-8G).

Para determinar el marco de lectura correcto del extremo 3' del AIF de ratón, se realizó una búsqueda en BLAST frente a la base de datos N.C.B.I. de EST utilizando los datos de la secuencia recién generados. Estos nuevos datos de la secuencia alineados con los EST de rata (GenBank n° AA891591) y los EST de los tejidos humanos (por ejemplo GenBank n° AA570483). Las alineaciones de la especie de cruce permitieron a los investigadores terminar el marco de lectura del extremo 3' del AIF de ratón porque las secuencias se diferenciaban normalmente en los nucleótidos que estaban situados en múltiplos de 3 nucleótidos alejados entre sí y estaban por consiguiente ocupando la posición “de oscilación” o el tercer nucleótido del codón de tres letras (Figs. 5A-5H). Cuando se tradujo el EST del AIF de ratón en 3' en este marco fue posible la identificación del codón de terminación en 3'.

RT-PCR del marco de lectura abierto del ADNc del mAIF completo

Con el fin de comprobar que el cóntigo del mAIF obtenido anteriormente formaba un marco de lectura abierto continuo, se diseñaron cebadores al lado del marco de lectura abierto del ADNc del AIF de ratón utilizando el programa de diseño de oligonucleótidos que utiliza la versión Oligo 4.0. Específicamente, los cebadores fueron los siguientes:

Cebador transcrito: 5'-ACGGTGCGTGGAAGGAAAAGGAAGG-3' (SEC. ID n°: 16)

Cebador complementario: 5'-CGCCAGGGATGGAAAAGTGCTTGTG-3' (SEC. ID n°: 17).

Basadas en la información del cóntigo anterior, se predijo este conjunto de cebador para ampliar un fragmento de aproximadamente 1,9 kb.

Se realizaron las ampliaciones por RT-PCR en un volumen de 50 µl que contenía y los dNTP 200 µM, cada cebador de 0,5 µM, Tris-HCl 10 mM (pH 8,3), MgCl₂ 1,5 mM, KCl 50 mM, 2 ng de ADNc de cerebro de ratón (ADNc del “clon rápido” de Clontech n° de catálogo 7130-1) y 5 unidades de Expand™ Hi-Fi ADN polimerasa (Boehringer Mannheim GmbH, Alemania). Las reacciones por PCR se ampliaron utilizando un protocolo de temperatura de hibridación “Touch-down/Touch-up” (Snow *et al.*, *Biochem. Biophys. Res. Comm.*, 233:770-777 (1997) y Snow *et al.*, *Gene* 206:247-253 (1998)) en un ciclador térmico programable PTC-100 (MJ Research Inc.) en las siguientes condiciones: desnaturalización inicial de 95°C durante 40 s, 5 ciclos a 94°C durante 20 s, 70°C - 2°/ciclo durante 20 s, 72°C durante 1 minuto y 19 s + 1 s/ciclo, seguido de 5 ciclos a 94°C durante 25 s, 62°C + 1°C/ciclo durante 20 s, 72°C durante 1 minuto y 30 s + 1 s/ciclo, seguido de 20 ciclos a 94°C durante 25 s, 66°C durante 20 s, 72°C durante 1 minuto y 40 s + 1 s/ciclo y una incubación final de 72°C durante 5 minutos. Los productos de PCR de ~1,9 kb resultantes se purificaron en gel a continuación a partir de un gel de agarosa al 1,0% utilizando el sistema de purificación en gel QiaQuick (QIAGEN Inc., Chatsworth, CA), TA clonado en pCR2.1 utilizando el kit TOPO TA Cloning® (Invitrogen, San Diego, CA, n° de catálogo K4550-40) y se transformaron en células TOP10F' de *E. coli*. Se preparó ADN de plásmido utilizando el kit Plasmid Miniprep de Qiagen (Qiagen Inc. Mississauga, ON, n° de catálogo 12125). Se obtuvo la secuencia de la inserción utilizando el secuenciado del didesoxi-nucleótido fluorescente y detección automática (ABI/Perkin Elmer, Foster City, CA).

ES 2 274 656 T3

Se diseñaron también cuatro cebadores de secuenciado, que ayudarían a secuenciar el marco de lectura abierto del ADNc del AIF de ratón. Los cebadores de secuenciado fueron los siguientes:

Transcrito: 5' TCAGTTCCTCAGATCAGGGCACC-3' (SEC. ID nº: 18)

Complementario: 5' AAAAACACCAACTGTGGGCAAAC-3' (SEC. ID nº: 19)

Transcrito: 5' CATCGATAGGGCTGGAGCAGAGG-3' (SEC. ID nº: 20)

Complementario: 5' TTTCCATGGTCCAGTTGCTGAGG-3' (SEC. ID nº: 21)

El pCR2.1-mus-AIF.B1B (ADN nº 9.806.532) se secuenció y se determinó que era la secuencia perfecta al 100% por alineación con el cóntigo EST del AIF de ratón, que se había montado y por alineación con otro clon de AIF de cerebro de ratón por RT-PCR independiente: pCR2.1-musAIF.A1A (ADN nº 9.806.531). Se comprobaron todos los nucleótidos en el clon pCR2.1-musAIF.B1B debido a que estaban presentes en el cóntigo EST del AIF de ratón, que había sido montado o en el pCR2.1-musAIF.A1A que procedía de una reacción por RT-PCR independiente. Se predijo el pCR2.1-mus-AIF.B1B para codificar un polipéptido de 612 aminoácidos con un peso molecular previsto de 66.689 kDa. La secuencia del ADNc se indica en la SEC. ID nº: 1, mientras que la secuencia de aminoácidos prevista para el AIF de ratón en la SEC. ID nº: 2, con la secuencia de aminoácidos de la proteína madura indicada en la SEC. ID nº: 3.

Polipéptido del AIF recombinante

El mAIF activado por tiorredoxina, así como varios mutantes por delección del AIF generados (con el fin de determinar la secuencia activa de la proteína) por escisión de las secuencias del ADN con BamH1 (aminoácidos nº D180-638), NcoI (aminoácidos nº D1-377) o HindIII (aminoácidos nº D563-638) se expresaron en un vector de expresión bacteriano pET32 de Novagen y se purificaron en cuerpos de inclusión de *E. coli* (véanse las Figs. 3 y 4 para los datos que implican la utilización de estos mutantes por delección). Se replegaron las proteínas en la matriz de afinidad de Nickel NTA y se almacenaron en HEPES 50 mM, pH 7,9, NaCl 100 mM, EDTA 2 mM, DTT 1 mM y glicerol al 10%.

Ejemplo 2

Antisuero del AIF, inmunotransferencias, inmunofluorescencia, microscopía inmunoelectrónica e inmunorreducción

Con el fin de determinar la expresión en la proteína del AIF a través de una variedad de tejidos, se generaron antisueros de conejo contra una mezcla de los tres péptidos del AIF y se sometieron a los métodos de delección indicados a continuación.

Específicamente, se generó antisuero de conejo contra una mezcla de 3 péptidos procedente de la secuencia de aminoácidos del mAIF (aminoácidos nº 151-170, 166-185, 181-200, acoplados a KLH). Este antisuero (título de ELISA ~10.000) se utilizó en inmunotransferencias (1/2.000) y en células 1 de rata (1/250) fijadas con paraformaldehído/ácido picrónico [Bossy-Wetzel *et al.*, *EMBO J.* **17**:37-49 (1998)] y se revelaron con un IgG anticonejo de cabra conjugado con peroxidasa o FITC (fluorescencia verde), respectivamente. El citocromo *c* se detectó por inmunofluorescencia (mAb 6H2.B4 de Pharmingen) en células 1 de rata fijadas transfectadas con un vector de referencia (Neo) o con Bcl-2 humano [Zhu *et al.*, *EMBO J.* **15**:4130-4141 (1996)] descrita [Bossy-Wetzel *et al.*, *EMBO J.* **17**:37-49 (1998)], mientras que el colorante CMXRos sensible a DY_m (100 nM, fluorescencia roja) se utilizó en células vivas [Marzo *et al.*, *Science* **281**, 2027-2031 (1998)]. Se tiñeron las células por contraste con el colorante Hoechst 33342 (1 μ M, fluorescencia azul). Se realizó la microscopía inmunoelectrónica utilizando una Ig anti-conejo (5 nm) de Immunogold para revelar la presencia de proteínas que reaccionan con el antisuero anti-AIF. La inmunoeeliminación de AIF se consiguió inmovilizando el antisuero (o un suero preinmune) en perlas de agarosa con proteína A y proteína g (Santa Cruz Biotechnology: 500 μ l de antisuero por ml de perlas) e incubación durante la noche de proteínas de la intermembrana mitocondrial (100 μ g/ml) con estas perlas (20 μ l de fluido con 10 μ l de perlas de relleno) en presencia o ausencia de péptidos inmunógenos (5 μ M).

Ejemplo 3

Fraccionamiento subcelular y sistemas de apoptosis exentos de células

Se utilizaron los siguientes métodos en los estudios para determinar la localización subcelular del AIF, así como para la determinación del efecto de AIF sobre el orgánulo celular en un sistema exento de células.

Células de hibridoma de linfocitos T 2B4.11 transfectadas de manera estable con el vector SFFV.neo que contenía el gen bcl-2 humano o el gen con resistencia a la neomicina (Neo) solamente [Susin *et al.*, *J. Exp. Med.* **184**:1331-1342 (1996)] se sometieron a lisis mecánica y centrifugación diferencial para la recuperación subsiguiente de núcleos, mitocondrias y citosoles exentos de orgánulos [Liu *et al.*, *Cell* **86**:147-157 (1996)]. Se controló el fraccionamiento submitocondrial de las mitocondrias de hígado de ratón mediante la determinación de enzimas marcadoras adecuadas [Susin *et al.*, *J. Exp. Med.* **186**:25-37 (1997); Pedersen *et al.*, *Meth. Cell Biol.* **20**:411-481 (1978)]. Los núcleos de las

células HeLa purificadas se expusieron a diferentes preparaciones de AIF, y se cuantificó la apoptosis nuclear mediante tinción con yoduro de propidio intercalando ADN y determinación citofluorométrica del contenido en ADN [Susin *et al.*, *J. Exp. Med.* **186**:25-37 (1997)]. Alternativamente, los núcleos se tiñeron con colorante 33342 de Hoechst o se sometieron a extracción del ADN y electroforesis en gel con campo pulsado. Se expusieron mitocondrias de hígado de rata aislados (0,5 mg de proteína mitocondrial/ml) a citosol exentos de mitocondrias (100 µg de proteína/ml) [Susin *et al.*, *J. Exp. Med.* **186**:25-37 (1997); Enari *et al.*, *EMBO J.* **14**:5201-5208 (1995)] y/o AIF recombinante (100 ng/ml), mientras se controla la dilatación de gran amplitud a una DO₅₄₀. La liberación del citocromo *c* y de caspasa-9 en el sobrenadante se midió por inmunotransferencia utilizando un anticuerpo anti-citocromo *c* monoclonal (7H8.2C12, Pharmingen), o un anticuerpo de conejo dirigido contra la subunidad grande de caspasa (Hazelton Research Products Inc., Denver, PA).

Ejemplo 4

Microinyección, transfección y cuantificación de la apoptosis

Se microinyectaron células de fibroblasto 1 de rata (presión 150 hPa; 0,2 s; Marzo *et al.*, *Science* **281**:2027-2031 (1998)) con tampón solamente, atractilósida (50 µM), antisuero dializado, péptidos derivados de AIF (100 µM), citocromo *c* de caballo (Sigma), o la dosis indicada de mAIF recombinante. Se añadió el inhibidor Z-VAD.fmk de caspasa (100 µM; Bachem, Basel, Suiza) al medio de cultivo 30 min. antes de la microinyección en el citoplasma (presión 150 hPa; 0,2 s). Tras la microinyección, se cultivaron las células durante 90-180 min. y se tiñeron durante 10 min. con colorante CMXRos, 33342 de Hoechst, o anexina V conjugada con biotina (Boehringer Mannheim) y se revelaron mediante un conjugado de avidina-ficoeritrina (Sigma). Las células viables microinyectadas (100 a 200 por sesión, dos a tres sesiones independientes de inyección) se identificaron mediante la inclusión del FITC-dextrano (fluorescencia verde) al 0,25% (p:v) en el inyectable. Únicamente se registró la fluorescencia azul o roja. La transfección de células de linfoma T de Jurkat se realizó utilizando AIF clonadas en el vector pcADN3.1 (Invitrogen) y Lipofectamina® (Gibco Life Technologies). Los análisis citofluorométricos de los parámetros asociados a la apoptosis se realizaron como se describe [Kroemer *et al.*, "Detection of apoptosis and apoptosis associated alterations" *The Immunology Methods Manual* (Lefkowitz, R. ed.); Academic Press, capítulo 14.2, págs. 1111-1125 (1997)].

Ejemplo 5

Identificación de isoformas alternativas de mAIF

El análisis de la secuencia del otro clon EST del AIF de ratón [CR2.1-musAIF.A1A (ADN nº 9.806.531 de Amgen) y de otro clon parcial de AIF de ratón: pCR2.1-musAIF-ORF.B parcial (ADN nº 9.804.781 de Amgen) puso de manifiesto que el terminal N del AIF de ratón contiene una secuencia de codificación alternativa que se obtiene supuestamente por consumo de exón alternativo. El clon pCR2.1-musAIF-ORF.B parcial del AIF parcial de ratón (ADN nº 9.804.781 de Amgen) del AIF parcial de ratón se amplió en el ADNc de cerebro de ratón utilizando los cebadores:

cebador transcrito nº 1.874-21:

5'GAGCCACGTGGTCTGTTTGACCCGTTTCG-3' (SEC. ID nº: 22)

cebador complementario nº 1.874-22:

5'GGAGTTCTGCATTTACCCGGAAGCCACC-3' (SEC. ID nº: 23)

Se realizaron las ampliaciones por RT-PCR en un volumen de 50 µl que contenía y los dNTP 200 µM, cada cebador de 0,5 µM, Tris-HCl 10 mM (pH 8,3), MgCl₂ 1,5 mM, KCl 50 mM, 2 ng de ADNc de cerebro de ratón (ADNc del "clon rápido" de Clontech nº de catálogo 7130-1) y 5 unidades de Expand™ Hi-Fi ADN polimerasa (Boehringer Mannheim GmbH, Alemania). Las reacciones por PCR se ampliaron utilizando un protocolo de temperatura de hibridación "Touch-down/Touch-up" (Snow *et al.*, *Biochem. Biophys. Res. Comm.*, 233:770-777 (1997) y Snow *et al.*, *Gene* 206:247-253 (1998)) en un cicladore térmico programable PTC-100 (MJ Research Inc.) en las siguientes condiciones: desnaturalización inicial de 95°C durante 40 s, 5 ciclos a 94°C durante 20 s, 67°C - 2°/ciclo durante 20 s, 72°C durante 59 segundos + 1 s/ciclo, seguido de 5 ciclos a 94°C durante 25 s, 63°C + 1°C/ciclo durante 20 s, 72°C durante 1 minuto y 20 s + 1 s/ciclo, seguido de 20 ciclos a 94°C durante 25 s, 59°C + 1°C/ciclo durante 20 s, 72°C durante 1 minuto y 7 s + 1 s/ciclo y una incubación final de 72°C durante minutos. Los productos de PCR de ~1,35 kb resultantes se purificaron en gel a continuación a partir de un gel de agarosa al 1,0% utilizando el sistema de purificación en gel QiaQuick (QIAGEN Inc., Chatsworth, CA), TA clonado en pCR2.1 utilizando el kit TOPO TA Cloning® (Invitrogen, San Diego, CA, nº de catálogo K4550-40) y se transformaron en células TOP10F' de *E. coli*. Se preparó ADN de plásmido utilizando el kit Plasmid Miniprep de Qiagen (Qiagen Inc. Mississauga, ON, nº de catálogo 12125). Se obtuvo la secuencia de la inserción utilizando el secuenciado del didesoxi-nucleótido fluorescente y detección automática (ABI/Perkin Elmer, Foster City, CA).

Aunque la función de este exón alternativo es desconocida en el momento presente, no se cree que sea producto artificial porque se obtuvieron dos clones de RT-PCR idénticos independientes de este exón alternativo. La codificación

ES 2 274 656 T3

del ADNc para esta isoforma se indica en la SEC. ID n°: 4 con el conjunto de aminoácidos previsto indicado en la SEC. ID n°: 5, mientras que la secuencia de aminoácidos de la proteína madura se indica en la SEC. ID n°: 6.

Ejemplo 6

Clonación molecular del AIFh

La búsqueda en BLAST de la base de datos no redundante NCBI con el marco de lectura abierto de AIFm puso de manifiesto que la secuencia de ADN genómica del AIF humano (AIFh) ortólogo estaba presente en la base de datos en PAC 179D3 (EMBL n° Z81364 y EMBL n° 81370). Utilizando la secuencia genómica como plantilla, se diseñaron los cebadores de AIF que flanqueaban el marco de lectura abierto y son los siguientes:

Cebador transcrito n° 1967-28:

5'-GAGAGGAAAGGGAAGGAGGAGGTC-3' (SEC. ID n°: 24)

Cebador complementario n° 1967-29:

5'-TTGCCAATTCCACTGTGGGGCTTC-3' (SEC. ID n°: 25)

Se clonó AIF humano del ADNc de la retina humana. Se disecaron retinas humanas de ojos humanos completos adquiridos en el banco de ojos de Canadá (Toronto, ON). Se preparó ARN completo procedente del tejido de retina humana utilizando el reactivo TRIzol™ de aislamiento del ARN total (Gibco BRL, Life Technologies Incorporated, n° de cat. 15596-018) según las instrucciones del fabricante. ADNc de la primera cadena procedente del ARN completo de la retina humana se preparó utilizando cebadores oligo-dT y el kit de síntesis SuperscriptII del ADNc de la primera cadena (Gibco BRL, Burlington, OH) según las instrucciones del fabricante. Se realizaron las ampliaciones por RT-PCR utilizando el sistema de PCR (Boehringer Mannheim GmbH, Alemania n° de catalizador. 1732650) en un volumen de 50 µl que contenía los dNTP 200 µM, cada cebador de 0,5 µM, Tris-HCl 10 mM (pH 8,3), MgCl₂ 1,5 mM, KCl 50 mM, 2 ng de oligo-dT cebador de ADNc de retina humana y 5 unidades de Expand™ Hi-Fi ADN polimerasa (Boehringer Mannheim GmbH, Alemania). Las reacciones por PCR se ampliaron utilizando un protocolo de temperatura de hibridación "Touch-down/Touch-up" (Snow *et al.*, *Biochem. Biophys. Res. Comm.*, 233:770-777 (1997) y Snow *et al.*, *Gene* 206:247-253 (1998)) en un ciclador térmico programable PTC-100 (MJ Research Inc.) en las siguientes condiciones: desnaturalización inicial de 95°C durante 40 s, 5 ciclos a 94°C durante 20 s, 69°C - 2°/ciclo durante 20 s, 72°C durante 2 minutos + 1 s/ciclo, seguido de 5 ciclos a 94°C durante 25 s, 61°C + 1°/ciclo durante 20 s, 72°C durante 2 minutos y 33 s + 1 s/ciclo, y una incubación final de 72°C durante 5 minutos. Los productos de PCR de ~1,9 kb resultantes se purificaron en gel a continuación a partir de un gel de agarosa al 1,0% utilizando el sistema de purificación en gel QiaQuick (QIAGEN Inc., Chatsworth, CA), TA clonado en pCR2.1 utilizando el kit TOPO TA Cloning® (Invitrogen, San Diego, CA, n° de catálogo K4550-40) y se transformaron en células TOP10F' de *E. coli*. Se obtuvo la secuencia de la inserción utilizando el secuenciado del didesoxi-nucleótido fluorescente y detección automática (ABI/Perkin Elmer, Foster City, CA).

Se secuenciaron dos clones de ADNc del AIF humano: pCR2.1-hAIF-G.inferior.14 (ADN n° 9.812.239) y pCR2.1-hAIF.E11 (ADN n° 9.812.238). La alineación de los clones del ADNc del AIFh (que procedían de reacciones RT-PCR independientes en la retina humana) con cada otro y con las secuencias genómicas del AIFh del cromosoma X (EMBL n° Z81364) permitió una determinación de la secuencia de consenso correcta para ADNc del AIF humano que comprende el marco de lectura abierto.

Se predijo que el ADNc del AIFh para codificar un polipéptido de 613 aminoácidos con un peso molecular previsto de 66.824 kDa. La alineación de los polipéptidos del AIF humano y de ratón puso de manifiesto que eran 92% idénticos. El ADNc que codifica el AIFh se indica en la SEC. ID n°: 7, con la secuencia de aminoácidos del AIFh prevista indicada en la SEC. ID n°: 8, mientras que la secuencia de aminoácidos de la proteína hAIF madura se indica en la SEC. ID n°: 9.

Ejemplo 7

Identificación de isoformas alternativas de AIFh

Una búsqueda en BLAST de la base de datos de EST N.C.B.I. con la zona del AIFm que contiene la secuencia exónica alternativa identificó un EST humano (GenBank n° H15605), que también contenía una zona de codificación alternativa. La codificación del ADNc para esta forma alternativa de AIFh se indica en la SEC. ID n°: 10, con la secuencia de aminoácidos prevista indicada en la SEC. ID n°: 11, mientras que la secuencia de aminoácidos de la forma madura se indica en la SEC. ID n°: 12.

La alineación de los dos clones humanos del ADNc del AIF, que se secuenciaron, pCR2.1-AIFh-Ginferior.14 (ADN n° 9.812.239) y pCR2.1-AIFh.E11 (ADN n° 9.812.238), puso de manifiesto que era posible el salto del exón en pCR2.1-AIFh-Glower.14 (ADN n° 9.812.239). Esta zona del salto del exón corresponde exactamente a la zona donde tiene lugar el corte y empalme alternativo en los ADNc del AIF tanto de ratón como humano. Dicho descubrimiento

significaría que el exón se corta y empalma completamente o se corta y empalma alternativamente para contener una de las dos secuencias exónicas tanto en el ratón como en el hombre. El ADNc que codifica esta segunda forma alternativa de AIFh se indica en la SEC. ID n°: 13, con la secuencia de aminoácidos prevista indicada en la SEC. ID n°: 14, mientras que la secuencia de aminoácidos de la forma madura está indicada en la SEC. ID n°: 15.

Ejemplo 8

Construcción del ADNc del AIFh completo

La secuencia al 100% del ADNc del AIF humano perfecto se montó en los dos clones de RT-PCT independientes que se habían secuenciado como se describió en la presente memoria. pCR2.1-AIFh-G-inferior.14 (ADN n° 9.812.239), que mostraba el salto del exón del exón alternativo en el terminal N, se cortó con 20 unidades de BamH1 en 1 × tampón B (Boehringer Mannheim) durante 2 horas a 37°C, liberando de este modo un fragmento con terminal C de 1447 bp. El pCR2.1-AIFh.E11, que contenía el terminal N de la secuencia verificado del AIF humano, se cortó con 20 unidades de BamH1 en 1 × tampón B (Boehringer Mannheim) durante 2 horas, se inactivó térmicamente durante 3 minutos a 85°C, se enfrió a temperatura ambiente durante 20 minutos, se diluyó con 400 µl de 1 × tampón T.E. en una unidad de filtración UltraFree®.MC 30.000 NMWL (n° de cat. Millipore UFC3LTKNB) y se centrifugó a 1960 × g en una centrifugadora Eppendorf 5417C durante 6 minutos hasta que quedó un volumen de ~25 µl.

Los 25 µl del pCR2.1-AIFh.E11 cortado con BamH1 se desfosforilaron a continuación con 0,1 unidades de fosfatasa alcalina intestinal de ternera (Pharmacia Biotech Inc., n° de catálogo 27-0620) durante 30 minutos a 37°C. Las reacciones se electroforizaron a continuación en un gel de agarosa al 1% y los productos apropiados se cortaron a continuación en el gel y se purificaron utilizando el sistema de purificación en gel de QiaQuick (QIAGEN Inc., Chatsworth, CA). Se realizó la ligadura utilizando un kit de ligadura de ADN rápido (n° de cat. De Boehringer Mannheim 1.635.379) según las instrucciones del fabricante. 7 µl de la reacción de ligadura se transformaron en 80 µl de células XLI-Blue MR supercompetentes de Epicurian Coli® (Stratagene, La Jolla, CA, n° de catálogo 200.229) según las instrucciones del fabricante.

Ejemplo 9

Células huésped de cultivo y producción de proteína recombinante

El vector de expresión pET32a (Novagen) que contenía el clon AIF de ratón se transformó en Ò BL21 (DE3) células huésped competentes de *Epicurian Coli* (*Escherichia coli*, Stratagene) descritas en el manual de instrucción de Stratagene. Se colocaron las células en placas con LB-agar-agar (placas de plástico de 9 mm) que contenían 50 µg de carbenicilina (Sigma, análogo de ampicilina) por ml de LB-agar-agar (10 g de triptona, 5 g de extracto de levadura, 5 g de NaCl, 1 ml de NaOH 1 N, 15 g de agar-agar, QS hasta 1 l) y se cultivaron durante la noche a 37°C para seleccionar las células transformadas. Una única colonia de células transformadas se desechó de la placa y se cultivó en 50 ml de medio de agar-agar con LB (10 g de tristona, 5 g de extracto de levadura, 5 g de NaCl, 1 ml de NaOH 1 N, QS hasta 1 l) que contenía 50 µg/ml de carbenicilina en (LB-carb) en un matraz Erlenmeyer tabicado de 500 ml, en agitación a 225 rpm durante la noche a 37°C. Cuando las células alcanzaron una densidad óptica de 1,0 (a una longitud de onda de 600 nm, D.O.₆₀₀) se añadió glicerol a la suspensión celular hasta una concentración final del 15% y las células se congelaron rápidamente en nitrógeno líquido y se almacenaron a -80°C. Una solución madre de glicerol se utilizó para inocular los medios para todos los cultivos de células huésped posteriores. Se inocularon 50 ml de medio LB-carb en un matraz Erlenmeyer tabicado de 500 ml con una pizca de la solución madre de glicerol y la suspensión celular se agitó a 225 rpm toda la noche a 37°C. Se transfirió el 50 ml de cultivo a un matraz Erlenmeyer de vidrio de 6 l y se diluyó hasta 1,5 l de medio LB-carb y las células se cultivaron a 37°C en agitación a 200 rpm en una incubadora con agitador. Se cultivaron las células hasta una D.O.₆₀₀ = 0,60 (D.O.₆₀₀ = 0,1 es equivalente a aproximadamente 10⁸ células por ml de cultivo). A esta densidad la temperatura de la incubadora disminuyó hasta 22°C y se dejaron enfriar los cultivos celulares a esta temperatura (con agitación) durante ½ hora. Después de 1 hora a la temperatura de cultivo inferior las células alcanzaron una D.O.₆₀₀ = 0,8 y la expresión de T7 polimerasa se produjo añadiendo isopropil-b-D-tiogalactopiranosido (IPTG, Sigma) hasta una concentración final de 0,2 mM (el IPTG conduce al activador lacUV5 corriente arriba del gen de T7 polimerasa en el lisogen DE3, a su vez la polimerasa conduce a la expresión de la proteína de fusión tiorredoxina-AIF a través del activador de T7 potenciador lac en el vector pET32a). Las células estimuladas por IPTG se cultivaron durante 12 horas a 22°C y se recogieron por centrifugación a 5.000 × g durante 15 minutos a 4°C. El sedimento celular recogido (con un peso en número de aproximadamente 5,0 g) se lavó con 50 ml de PBS que contenía un comprimido de la mezcla inhibidora de proteasa disuelto (comprimidos exentos de EDTA completos de Boehringer Mannheim™) y pepstatina A (Boehringer Mannheim) a una concentración final de 2 µg/ml. Se volvieron a sedimentar las células y se congelaron en nieve carbónica.

Como referencia, el vector pET32a solo (menos el gen del AIF) se transformó en células huésped de *Escherichia coli* y la expresión de la etiqueta de tiorredoxina sola se produjo como se describió anteriormente para el AIF activado por tiorredoxina.

Ejemplo 10

Purificación de la proteína de fusión del AIF recombinante (completa)

5 Los sedimentos celulares congelados (que expresan la proteína de fusión tiorredoxina-AIF (trx-AIF) se volvieron a poner en suspensión en 50 ml (10 ml por g de peso en húmedo del sedimento) de tampón de lisis (HEPES-NaOH 25 mM, pH 8,0, NaCl 100 mM, β -mercaptoetanol 10 mM, imidazol 20 mM, 1 comprimido de la mezcla del inhibidor de proteasa disuelto por 50 ml de tampón, pepstatina A a 2 μ g/ml y leupeptina a 2 μ g/ml) y se homogeneizó con un homogeneizador de vidrio seguido de tratamiento con ultrasonidos utilizando una sonda de 1/4 de pulgada unida a un conjunto de procesador ultrasónico de 600 Watt (Vibro-cell) a una amplitud del 60%, pulsaciones de 5 segundos durante un tiempo total de 1 minuto en hielo. A menos que se indique de otro modo todas las etapas se realizaron a 4°C o en hielo. El desecho celular insoluble se recogió por centrifugación a $16.800 \times g$ durante 30 minutos. La proteína de fusión tiorredoxina-AIF quedó en el sedimento de centrifugación (únicamente una cantidad residual de trx-AIF se detectó en el sobrenadante mediante transferencia Western (utilizando un anticuerpo anti-trx monoclonal, véase a continuación para más detalles en SDS-PAGE y detalles de transferencia). Se aspiró el sobrenadante del sedimento y el sedimento se volvió a poner en suspensión en 50 ml de tampón de lisis guanidina-HCl (HEPES-NaOH 25 mM, pH 8,0, guanidina-HCl 6 M, Tris-HCl 10 mM, β -mercaptoetanol 10 mM, imidazol 20 mM, 1 comprimido de la mezcla inhibidora de proteasa disuelta por 50 ml de tampón, pepstatina A a razón de 2 μ g/ml y leupeptina a razón de 2 μ g/ml). El sedimento se volvió a poner en suspensión en un tampón utilizando un homogeneizador Douce de vidrio y se mezcló el homogeneizado durante 15 minutos utilizando un Neutator (Clay Adams®). El material insoluble se sedimentó por centrifugación a $27.000 \times g$ durante 30 minutos. El sobrenadante se pasó sobre una columna de afinidad superflow (QIAGEN) con NiNTA-agarosa de $1,5 \times 3,0$ cm equilibrada en tampón de lisis guanidina-HCl. Se cargó la columna y se resolvió a un caudal constante de 0,3 ml de solución por minuto. La columna cargada se lavó con 50 ml (10 volúmenes de lecho de columna) de tampón de lavado de la columna NiNTA (HEPES-NaOH 25 mM, pH 8,0, guanidina-HCl 6 M, Tris-HCl 10 mM, β -mercaptoetanol 10 mM e imidazol 40 mM). Se utilizó un gradiente lineal de 50 ml para intercambiar el tampón de la columna desde el tampón de lavado guanidina-HCl hasta el tampón de urea (HEPES-NaOH 25 mM, pH 8,0, urea 6 M, Tris-HCl 10 mM, β -mercaptoetanol 10 mM e imidazol 50 mM).

La tiorredoxina-AIF se eluyó a continuación con NiNTA-agarosa pasando 50 ml de tampón de elución NiNTA (HEPES-NaOH 25 mM, pH 8,0, urea 6 M, Tris-HCl 10 mM, β -mercaptoetanol 10 mM, EDTA 50 mM, 1 comprimido de la mezcla inhibidora de proteasa disuelto por 50 ml de tampón, pepstatina A a razón de 2 μ g/ml y leupeptina a razón de 2 μ g/ml). La fracción de elución recogida se diluyó añadiendo 5 volúmenes (v/v) de tampón de dilución (HEPES-NaOH 25 mM, pH 8,0, urea 3 M, Tris-HCl 10 mM, β -mercaptoetanol 10 mM, EDTA 1 mM, 1 comprimido de la mezcla inhibidora de proteasa disuelto por 50 ml de tampón, pepstatina A a razón de 2 μ g/ml y leupeptina a razón de 2 μ g/ml) y se dializó en 1 l de tampón de diálisis (HEPES-NaOH 25 mM, pH 7,0, β -mercaptoetanol 5 mM, EDTA 1 mM y glicerol al 10%) utilizando entubado de membrana mwco Spectra/Por® 12-14. El tampón de diálisis se cambió cada 4 a 6 horas y se utilizó un total de 6 l de tampón de diálisis.

La muestra dializada se concentró por ultrafiltración utilizando una célula a presión de ultrafiltración Amicon y un filtro YM10 de Amicon bajo gas nitrógeno a 40 psi hasta una concentración final entre 1 y 4 mg/ml de proteína determinada utilizando el análisis BioRad de Bradford con IgG como referencia patrón (realizado como describe el fabricante).

Se identificó la proteína de fusión tiorredoxina-AIF como una banda de 98 kDa por SDS-PAGE y colorante azul de Coomassie que utiliza geles Tris/glicina con gradiente de archilamida del 10 al 20% de Novex y el aparato con gel de Novex. Para confirmar la identidad de la banda de 98 kDa, los geles resueltos se transfirieron a la membrana de PVDF (Boehringer Mannheim), la membrana se bloqueó con anticuerpos de tampón de bloqueo (crema de leche en polvo al 4%, Carnation, BSA al 1%, fracción V de Sigma, Tween 20 al 0,1% en solución salina tamponada con Tris) y proteína de fusión trx-AIF anti-trx (3H8-E11) de ratón o anti-AIF (J53) de conejo seguido de conjugados de IgG-HRP (peroxidasa de rábano picante) anti-ratón/conejo de asno/cabra (Amersham). Los conjugados de HRP se detectaron en película X-omatic Blue XB-1 de Kodak utilizando reactivos para detección de transferencia Western ECL como se esbozó por el fabricante (Amersham Life Sciences). Un total de 1,0 mg de proteína soluble replegada se recuperó por cada 1 l de cultivo celular.

Un polipéptido del factor inductor de la apoptosis de mamífero (AIF), que basta para estimular la apoptosis de núcleos aislados, se ha identificado y clonado. Este factor omnipresente con homología con las oxidorreductasas bacterianas está confinado normalmente con mitocondrias y se libera en la inducción de la apoptosis como una proteína de 57 kDa que se traslada al núcleo. El AIF recombinante produce núcleos aislados que experimentan condensación de cromatina y fragmentación del ADN a gran escala (~50 kbp). Además, produce mitocondrias purificadas que liberan citocromo c y caspasa-9. La microinyección de la proteína del AIF recombinante en las células sanas o la sobreexpresión forzada por transfección de AIF produce la condensación de cromatina, la disipación del potencial de membrana mitocondrial (ΔY_m) y la exposición a la fosfatidilserina de la membrana plasmática. Ninguno de estos efectos evita el inhibidor Z-VAD.fmk de caspasa de amplio espectro. La sobreexpresión de Bcl-2 impide la liberación de AIF de las mitocondrias, pero no tiene efecto sobre la capacidad de AIF para estimular la apoptosis nuclear. Estos datos, dados a conocer en la presente memoria, demuestran a AIF como un nuevo efector mitocondrial de la muerte celular apoptótica. En vista de la capacidad de AIF para estimular la apoptosis, la administración de AIF (o análogos, homólogos o variantes de los mismos que poseen actividad similar a AIF) es de esperar que sea útil en el tratamiento y control de numerosas enfermedades neoplásicas. La reducción de la actividad del polipéptido del AIF (desarrollando

antagonistas, inhibidores, utilización de anticuerpos neutralizantes o moléculas complementarias, todas producidas como se describe en la presente memoria) debería dar como resultado la disminución de la apoptosis. Dicha actividad puede ser deseable para el tratamiento de varias enfermedades neurodegenerativas que han sido relacionadas con la estimulación de la apoptosis.

Ejemplo 11

Identificación de compañeros de enlace para AIF

Para identificar compañeros de enlace destinados al AIF de mamífero, puede utilizarse un sistema de ensayo híbrido con dos levaduras. El ensayo híbrido con dos levaduras se basa en el hecho de que muchos activadores eucarióticos de transcripción se componen de dos dominios operativamente independientes, físicamente separables. La proteína activadora de transcripción de la levadura GAL4, por ejemplo, contiene un dominio de enlace al ADN (GAL4-DB) y un dominio activador de la transcripción (GAL4-TA). El GAL4-DB reconoce y se une a una secuencia (UAS), en las zonas corriente arriba de los genes sensibles a GAL4, mientras que GAL4-TA interactúa con otros componentes de la maquinaria de transcripción necesaria para iniciar la transcripción. Se requieren ambos dominios para activar un gen y, normalmente, los dos dominios son parte de la misma proteína. Sin embargo, si los dos dominios están físicamente separados (por ejemplo, por medio de la tecnología del ADN recombinante) y se expresan en la misma célula huésped, los péptidos GAL4-DB y TA no interactúan directamente entre sí y pueden activar genes sensibles (Ma *et al.*, *Cell* **51**:443-446 (1988)):

En un sistema híbrido de dos levaduras, se utilizan dos vectores de clonación diferentes para generar fusiones independientes de estos dominios GAL4 que potencialmente interactúan entre sí. Las proteínas híbridas recombinantes (híbridas del dominio GAL4 y una proteína de unión potencial) se expresan conjuntamente en la levadura y se dirigen al núcleo de la levadura. Si los fragmentos que no son de GAL4 de los dos tipos de híbrido interactúan entre sí, el GAL4-DB estará ligado a GAL4-TA. Como resultado de esta interacción el activador de transcripción GAL4 se reconstituirá operativamente y activará la transcripción de los genes indicadores que presentan puntos de fijación a GAL4 corriente arriba haciendo detectable fenotípicamente la interacción proteína-proteína. El sistema híbrido de dos levaduras se ha utilizado ya sea para cribar bancos para un(os) gen(es) que codifica(n) una(s) proteína(s) nueva(s) que interactúa(n) con una proteína diana conocida o para analizar dos proteínas clonadas previamente, conocida para interacción (Chien *et al.*, *Proc. Natl. Acad. Sci.* **88**:9578-9583 (1991), incorporada a la presente memoria como referencia).

Para utilizar el sistema de dos híbridos de levadura para aislar e identificar nuevas proteínas de unión al AIF, se clona un ADN del AIF de mamífero completo en el vector pAS-1 para generar una fusión entre la proteína diana, AIF, y el dominio de enlace al ADN de GAL4. Esto crea el "señuelo", la proteína de fusión híbrida GAL4-AIF. Esta cepa de levadura (Y153), (Bai y Elledge, *Methods in Enzymol.* **273**:331-347 (1996)) se utiliza para la transformación y contiene ambos genes indicadores HIS3 y lacZ dirigidos por activadores que contienen puntos de fijación a GAL4 y se elimina para GAL4 endógeno (Bai *et al.*, *Methods in Enzymol.* **273**:331-347 (1996)). Los clones de levadura transformados con GAL4-AIF de pAS-1, son cribados para la expresión de la proteína de fusión GAL4-AIF mediante el análisis de transferencia Western de los lisados de levadura utilizando los anticuerpos anti-AIF monoclonales o policlonales (véase anteriormente). En los clones que expresan a GAL4-AIF se analiza la activación de la transcripción del gen HIS3 basándose en su capacidad para desarrollarse en el medio de His y se analiza la activación de la transcripción de lacZ, midiendo la actividad de b-gal utilizando un análisis colorimétrico. En un intento para cribar las moléculas que se unen al "señuelo" AIF-proteína, se obtiene un banco de ADNc del plásmido de los restantes linfocitos T murinos (Staudinger *et al.*, *J. Biol. Chem.* **268**:4608-4611 (1993)). En este banco, el ADNc obtenido de los linfocitos T restantes se fusiona con el dominio de activación de la transcripción de GAL4, GAL4-TA. Asimismo, se utiliza un banco de la fusión GAL4-TA de embrión de ratón (Clontech, Palo Alto, CA) para transformar los montajes de la fusión GAL4-AIF DB que llevan levadura. Los bancos de ADNc se transfectan en levaduras que llevan los montajes de la fusión AIF-GAL4 DB y se seleccionan los clones en medio His enriquecido con aminotriazol 20 mM. Tras 72 horas, se preparan las réplicas de nitrocelulosa de las colonias transfectadas y se analiza la actividad de b-galactosidasa directamente por un método bien conocido en la técnica. Sambrook *et al.*, *supra*. De los 6×10^6 clones cribados del banco de linfocitos T y de los 3×10^6 clones cribados del banco de embrión de ratón, se seleccionaron cuarenta y dos clones positivos y los ADNc aislados. En los ADNc aislados se comprobó el tamaño de la inserción y se introdujeron en una segunda cepa de levadura (Y187) (Bai y Elledge, *Methods in Enzymol.* **273**:331-347 (1996)). La finalidad de esta etapa es doble, en primer lugar en el ADNc aislado puede analizarse la actividad de b-gal sola, o cuando se cruza con una levadura que lleva GAL-AIF o GAL4 puede fusionarse con otras proteínas no relacionadas. Esto elimina cualquier falso positivo. Se analiza la actividad de b-gal en los cruzamientos entre Y153 que lleva el plásmido GAL4-AIF e Y187 que lleva la fusión GAL4-ADNc para confirmar los clones positivos. Después de este procedimiento, se eliminan los clones como falsos positivos. Los clones se clasifican en falsos positivos si eran positivos para la actividad de b-gal o de sí mismos o cuando se cruzan con Y153 que lleva el dominio de enlace del ADN solo.

Los clones restantes aislados en esta primera ronda de cribado se clasifican interactuando específicamente con el AIF basándose en los siguientes criterios: 1) la levadura que expresa tanto al ADNc como a las proteínas híbridas de AIF son capaces de desarrollarse en el medio His y son positivas para la actividad de b-gal; 2) el ADNc aislado transformado en Y187 son negativos para la activación de HIS3 y lacZ cuando se cruzan con la levadura que lleva el dominio de enlace del ADN de GAL4 solo; y 3) cuando se cruzan con Y153, que contiene GAL4-AIF, se reestablece

ES 2 274 656 T3

la capacidad para transactivar ambos montajes indicadores, pero el cruce de los montajes de ADNc con otras fusiones de GAL4 no produjo la activación de la transcripción.

Se realiza también el cribado de un banco cebado al azar procedente de un embrión de ratón (día 11,5) (disponible en el mercado en Clontech). La utilización de un banco cebado aleatorio permite la detección de proteínas de enlace al AIF, que requieren las secuencias con amino terminal para el enlace. Asimismo, utilizando un banco de un tejido diferente, se detectaron los ADNc no representados en el banco de linfocitos T. Por último, el aislamiento con repetición de las moléculas relacionadas de dos bancos diferentes apoya la legitimidad de la interacción que se está detectando.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

REIVINDICACIONES

1. Polinucleótido aislado que codifica un factor inductor de apoptosis de mamífero, seleccionándose dicho polinucleótido de entre el grupo constituido por ADNc y ADN sintetizado químicamente, en el que el factor inductor de apoptosis de mamífero es el factor inductor de apoptosis murino, y en el que el factor inductor de apoptosis murino comprende la secuencia de aminoácidos presentada en la SEC. ID. nº: 2 o en la SEC. ID. nº: 3.

2. Polinucleótido aislado que codifica un factor inductor de apoptosis de mamífero, seleccionándose dicho polinucleótido de entre el grupo constituido por ADNc y ADN sintetizado químicamente, en el que el factor inductor de apoptosis de mamífero es una isoforma del factor inductor de apoptosis murino, y en el que dicha isoforma del factor inductor de apoptosis murino comprende la secuencia de aminoácidos presentada en la SEC. ID. nº: 5 o en la SEC. ID. nº: 6.

3. Polinucleótido aislado que codifica un factor inductor de apoptosis de mamífero, seleccionándose dicho polinucleótido de entre el grupo constituido por ADNc y ADN sintetizado químicamente, en el que el factor inductor de apoptosis de mamífero es el factor inductor de apoptosis humano, y en el que el factor inductor de apoptosis humano comprende una secuencia de aminoácidos presentada en la SEC. ID. nº: 8 o en la SEC. ID. nº: 9.

4. Polinucleótido aislado que codifica un factor inductor de apoptosis de mamífero, seleccionándose dicho polinucleótido de entre el grupo constituido por ADNc y ADN sintetizado químicamente, en el que el factor inductor de apoptosis de mamífero es una isoforma del factor inductor de apoptosis humano, y en el que dicha isoforma del factor inductor de apoptosis humano comprende la secuencia de aminoácidos presentada en la SEC. ID. nº: 11 o en la SEC. ID. nº: 12.

5. Polinucleótido aislado que codifica un factor inductor de apoptosis de mamífero, seleccionándose dicho polinucleótido de entre el grupo constituido por ADNc y ADN sintetizado químicamente, en el que el factor inductor de apoptosis de mamífero es una isoforma del factor inductor de apoptosis humano y en el que dicha isoforma del factor inductor de apoptosis humano comprende la secuencia de aminoácidos presentada en la SEC. ID. nº: 14 o en la SEC. ID. nº: 15.

6. Polinucleótido aislado según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en el que el polinucleótido codifica un polipéptido que presenta por lo menos 70 por ciento de identidad sobre la longitud total para los polipéptidos que comprenden las secuencias de aminoácidos expuestas en una de las SEC. ID nº: 2, nº 3, nº 5, nº 6, nº 8, nº 9, nº 11, nº 12, nº 14, y nº 15.

7. Polinucleótido aislado según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en el que el polinucleótido codifica un polipéptido que presenta por lo menos el 75 por ciento de identidad sobre la longitud total para los polipéptidos que comprenden las secuencias de aminoácidos expuestas en una de las SEC. ID nº: 2, nº 3, nº 5, nº 6, nº 8, nº 9, nº 11, nº 12, nº 14, y nº 15.

8. Polinucleótido aislado según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en el que el polinucleótido codifica un polipéptido que presenta por lo menos el 80 por ciento de identidad sobre la longitud total para los polipéptidos que comprenden las secuencias de aminoácidos expuestas en una de las SEC. ID nº: 2, nº 3, nº 5, nº 6, nº 8, nº 9, nº 11, nº 12, nº 14, y nº 15.

9. Polinucleótido aislado según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en el que el polinucleótido codifica un polipéptido que presenta por lo menos el 85 por ciento de identidad sobre la longitud total para los polipéptidos que comprenden las secuencias de aminoácidos expuestas en una de las SEC. ID nº: 2, nº 3, nº 5, nº 6, nº 8, nº 9, nº 11, nº 12, nº 14, y nº 15.

10. Polinucleótido aislado según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en el que el polinucleótido codifica un polipéptido que presenta por lo menos el 90 por ciento de identidad sobre la longitud total para los polipéptidos que comprenden las secuencias de aminoácidos expuestas en una de las SEC. ID nº: 2, nº 3, nº 5, nº 6, nº 8, nº 9, nº 11, nº 12, nº 14, y nº 15.

11. Polinucleótido aislado según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en el que el polinucleótido codifica un polipéptido que presenta por lo menos el 95 por ciento de identidad para los polipéptidos que comprenden las secuencias de aminoácidos expuestas en una de las SEC. ID nº: 2, nº 3, nº 5, nº 6, nº 8, nº 9, nº 11, nº 12, nº 14, y nº 15.

12. Polinucleótido aislado que codifica un factor inductor de apoptosis de mamífero, seleccionándose el polinucleótido de entre el grupo constituido por:

(a) las moléculas de ADN expuestas en las SEC. ID nº: 1, nº 4, nº 7, nº 10, y nº 13;

(b) las moléculas de ADN que se hibridan, en condiciones de alta severidad, con las moléculas de ADN definidas en (a); y

- (c) las moléculas de ADN que codifican una expresión para los aminoácidos codificados por cualquiera de las moléculas de ADN anteriores.

13. Ácido nucleico hibridable marcado de manera detectable, en condiciones de alta severidad con un polinucleótido según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12.

14. Vector de clonación que comprende un polinucleótido según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12.

15. Vector de expresión que comprende un polinucleótido según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12.

16. Vector de expresión que comprende un polinucleótido según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, asociado operativamente a una secuencia de control de expresión.

17. Vector de expresión según la reivindicación 16, en el que dicha secuencia de control de expresión se selecciona de entre el grupo constituido por activadores precoces inmediatos de citomegalovirus humano (CMVh), activadores precoces de SV-40, activadores precoces de adenovirus, activadores precoces de polioma virus, activadores tardíos de SV-40, activadores tardíos de virus de la vacuna, activadores tardíos de polioma virus, LTR retrovírico, activadores inducibles, activadores del sistema *TAC*, activadores del sistema *trp*, activadores del sistema *TRC*, operadores principales y las zonas activadoras del fago lambda, zonas de control de la proteína de recubrimiento fd, activador de la 3-fosfoglicerato cinasa, activador de la fosfatasa ácida, activadores del factor de α -emparejamiento de levadura.

18. Célula huésped unicelular transformada con un polinucleótido según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12.

19. Huésped unicelular según la reivindicación 18, en el que la célula huésped se selecciona de entre el grupo constituido por *E. coli*, *Pseudomonas*, *Bacillus*, *Streptomyces*; levadura, y células CHO, R11, B-W, LM, CO5 1, CO5 7, BSC1, BSC40, BMT10 y SF9.

20. Huésped unicelular según la reivindicación 19, en el que el huésped unicelular es una levadura seleccionada de entre el grupo constituido por *Saccharomyces*, *Pichia*, *Candida*, *Hansenula* y *Torulopsis*.

21. Célula de mamífero que contiene un factor inductor de apoptosis de mamífero que codifica un ADN según las reivindicaciones 1 a 12, modificada con el fin de permitir la expresión superior de un factor inductor de apoptosis mediante un episodio recombinatorio homólogo que consiste en insertar una secuencia reguladora de la expresión en proximidad funcional al factor inductor de apoptosis de mamífero que codifica un ADN.

22. Célula de mamífero según la reivindicación 21, en la que la secuencia reguladora de la expresión insertada no es una secuencia reguladora de la expresión del factor inductor de apoptosis.

23. Procedimiento para la producción de un polipéptido del factor inductor de apoptosis codificado por el polinucleótido según las reivindicaciones 1 a 12, comprendiendo el procedimiento las etapas siguientes:

- (a) cultivar una célula huésped según las reivindicaciones 18 ó 21 en condiciones adecuadas para la expresión del polipéptido del factor inductor de apoptosis; y

- (b) recuperar el polipéptido del factor inductor de apoptosis expresado.

24. Ácido nucleico aislado que codifica un análogo de por lo menos el 70 por ciento de identidad con un factor inductor de apoptosis de mamífero que comprende la secuencia de aminoácidos expuesta en la SEC. ID. n°: 3 o SEC. ID. n°: 9, en el que uno o más aminoácidos, en las posiciones del polipéptido que no son esenciales para la estructura o función, se seleccionan de entre el grupo constituido por los aminoácidos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 140, 141, 143, 144, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 24, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 306, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 3115, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 451, 452, 453, 455, 456, 457, 458, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490,

ES 2 274 656 T3

491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611 y 612, se sustituye por otro aminoácido.

25. Factor inductor de apoptosis de mamífero purificado y aislado, codificado por el polinucleótido según la reivindicación 1.

26. Factor inductor de apoptosis de mamífero purificado y aislado, codificado por el polinucleótido según la reivindicación 2.

27. Factor inductor de apoptosis de mamífero purificado y aislado, codificado por el polinucleótido según la reivindicación 3.

28. Factor inductor de apoptosis de mamífero purificado y aislado, codificado por el polinucleótido según la reivindicación 4.

29. Factor inductor de apoptosis de mamífero purificado y aislado, codificado por el polinucleótido según la reivindicación 5.

30. Factor inductor de apoptosis de mamífero purificado y aislado, que comprende la secuencia de aminoácidos expuesta en la SEC. ID. nº: 9, en la que uno o más aminoácidos de entre las posiciones 1 a 612 se sustituye por el aminoácido en las posiciones 1 a 612 alineadas de la SEC. ID. nº: 3.

31. Anticuerpo que se une específicamente al factor inductor de apoptosis humano según las reivindicaciones 27, 28, 29 ó 30.

32. Anticuerpo que se une específicamente al factor inductor de apoptosis murino según las reivindicaciones 25 ó 26.

33. Anticuerpo según la reivindicación 31, que es un anticuerpo monoclonal.

34. Anticuerpo según la reivindicación 32, que es un anticuerpo monoclonal.

35. Derivado del factor inductor de apoptosis de mamífero según las reivindicaciones 25 a 30, que presenta una o más fracciones químicas unidas a éste opcionalmente en un vehículo aceptable.

36. Derivado según la reivindicación 35, en el que uno o más de dichas fracciones químicas es un polímero soluble en agua.

37. Derivado según la reivindicación 36, en el que pol soluble en agua se selecciona de entre el grupo constituido por polietilenglicol (PEG), monometoxi-polietilenglicol, homolímeros de propilenglicol, copolímero de óxido de polipropileno/óxido de etileno, polioles polioxietilados, polivinilpirrolidona, poli-1,3-dioxolano, poli-1,3,6-trioxano, copolímero de etileno/anhídrido maleico, homopolímeros de poliaminoácidos, copopolímeros aleatorios de poliaminoácidos, poli(n-vinilpirrolidona)-polietilenglicol y alcohol polivinílico.

38. Procedimientos para la determinación de la presencia del factor inductor de apoptosis de mamífero según las reivindicaciones 25 a 30 en una muestra biológica que comprende las etapas siguientes:

(a) obtener una muestra biológica;

(b) exponer dicha muestra biológica a un anticuerpo específico para el factor inductor de apoptosis de mamífero según las reivindicaciones 31 a 34; y

(c) detectar el enlace del anticuerpo específico para el factor inductor de apoptosis de mamífero en dicha muestra biológica.

39. Reactivo de diagnóstico que comprende un polinucleótido marcado de manera detectable que codifica parte o la totalidad del factor estimulante de apoptosis humano según las reivindicaciones 27 a 29.

40. Reactivo de diagnóstico que comprende un polinucleótido marcado de manera detectable que codifica parte o la totalidad del factor estimulante de apoptosis murino según las reivindicaciones 25 y 26.

41. Reactivo para diagnóstico según la reivindicación 39 ó 40, en el que dicho polinucleótido marcado es un ADN.

ES 2 274 656 T3

42. Reactivo para diagnóstico según la reivindicación 39 ó 20, en el que dicho polinucleótido marcado es un ADN de primera cadena.

43. Procedimiento para la determinación de la presencia de una molécula de polinucleótido específica para el factor inductor de apoptosis de mamífero en una muestra biológica que comprende las etapas siguientes:

(a) recoger una muestra biológica;

(b) aislar las moléculas de polinucleótido de dicha muestra biológica;

(c) hibridar a dichas moléculas de polinucleótido un reactivo de diagnóstico según la reivindicación 39 ó 40; y

(d) detectar el enlace de las moléculas de polinucleótido específicas para el factor inductor de apoptosis de mamífero en dichas muestras biológicas.

44. Procedimiento para la determinación de la presencia de una molécula de polinucleótido específica para el factor inductor de apoptosis de mamífero en una muestra tisular o celular que comprende las etapas siguientes:

(a) recoger una muestra tisular o celular;

(b) hibridar dicha muestra tisular o celular con un reactivo de diagnóstico según la reivindicación 39 ó 40; y

(c) detectar el enlace de las moléculas de polinucleótido específicas para el factor inductor de apoptosis de mamífero en la muestra tisular o celular a dicho reactivo de diagnóstico.

45. Procedimiento según la reivindicación 43 ó 44, en el que dicha molécula de polinucleótido es el ADN.

46. Procedimiento según la reivindicación 43 ó 44, en el que dicha molécula de polinucleótido es el ARN.

47. Composición que comprende un factor inductor de apoptosis de mamífero purificado y aislado según la reivindicación 25 y un vehículo aceptable, diluyente y/o adyuvante.

48. Composición que comprende un factor inductor de apoptosis de mamífero purificado y aislado según la reivindicación 26 y un vehículo aceptable, diluyente y/o adyuvante.

49. Composición que comprende un factor inductor de apoptosis de mamífero purificado y aislado según la reivindicación 27 y un vehículo aceptable, diluyente y/o adyuvante.

50. Composición que comprende un factor inductor de apoptosis de mamífero purificado y aislado según la reivindicación 28 y un vehículo aceptable, diluyente y/o adyuvante.

51. Composición que comprende un factor inductor de apoptosis de mamífero purificado y aislado según la reivindicación 29 y un vehículo aceptable, diluyente y/o adyuvante.

52. Utilización de cualquiera de las composiciones según las reivindicaciones 47 a 51 como medicamento.

53. Utilización de cualquiera de las composiciones según las reivindicaciones 47 a 51 para la preparación de un medicamento destinado a inhibir la proliferación celular.

54. Utilización del factor inductor de apoptosis de mamífero purificado y aislado según las reivindicaciones 25 a 30 para la preparación de un medicamento destinado a inhibir la proliferación celular.

MLS		
MAIF	1	MERCGGL AGAFKQKLVPLVRTVYVQRPKQNRNLPGNLPQQWRVPLELQM
HAIF	1	-----A-----L-----C-RS-R-----R-H-----
BDSF	1	
MLS		
MAIF	50	ARQMSSGSSGQNMDSVLVLIVGLSTIGAGAYAYKTIKEDQKRYMERVM
HAIF	51	T-----A-----I-----V-----M-----E-----IS
MAIF	100	GLGLSPEEKQRRALASATEGGSVPQIRAPSHVPFLLIGGGTAFAAARSI
HAIF	101	----T--Q--KK-AL--S--EE--DK--
BDSF	2	AN--A I--N-V-G TT-QAL
MAIF	150	RARDPGARVLIVSEIDPELPYMRPLSKMLWFSDDPNVTKTLOFRQWEGKE
HAIF	151	-----R-K-----
BDSF	22	EGYEG-LSLIG-EQH--D--S--AV D-S
MAIF	200	RSIYQPSFSFYVSAQILPNIENGQVAVLTGKKVWHLIVRGNNVRLNDGSQ
HAIF	201	-----H-----Q-----D-----
BDSF	55	FE--R IAEA W YSEASHEN--SE-TD--TQKK-IS--T
NLS		
MAIF	250	ITFEKCLLATGQTFSSLSAIDRAGAEVKSRTTLERKIGDERALEKISREV
HAIF	251	Y-----S-----
BDSF	98	-SAIDAIV--SRA-M--L P-SCLPGVV--TY--VQL-RDSWTPN
MAIF	300	ISITVIGGGFLGSEILACALGRNSOASGIEVILQFFPKQGMOKIIPQYLSN
HAIF	301	-----I-----ARAI--T-----E-----
BDSF	144	TRLLTV--LI-C-V--ATA--L-LS-TT-EAGDELLVRV-GRRIGA
MAIF	350	WTMEKVYREGVIVMPNAILVQSVGVSGGRLLIKLKGKRVETDHIVTAVGL
HAIF	351	-----R-----S-K-----A-----
BDSF	190	LRGLLTEQ--C-ELKIG-SGFSGEGQLEKVMVN--SFIA-NALIQ--A
NLS		
MAIF	400	EPNVELAKTGLEHDSDFGGFRVNAELQARSNIWVAGDADCFYDIKLGRR
HAIF	401	-----
BDSF	240	D-ADQ--RQA--Q-R VVVIERGATEAKG-FAV--V IWPLHSG-K
MAIF	450	RVEMHDHAVVEGRLAGEIMTGAAPYWHQSMFWSDLGPOVGYEAIGLVDS
HAIF	451	-----
BDSF	288	SL-TY MENC--CA-AV-AI--KE-S AP
MAIF	500	SLPTVGVFAKATVADNPKSATQSGTGIRSESETESEASEITIPPSAPAV
HAIF	501	-----T-----
BDSF	315	Q--S WTEIAGH RMOM QDIE-P EYVLRG-LGIG-ALLFRLLDGRH
MAIF	550	PQVPEGREDYKGKGVIFYLRDKVWVGILWNVFNRMPFIARFIKDGQHEH
HAIF	551	-----A-Q-----I-----
BDSF	362	AV-AVLA PRD--A-APRI-EAQ--IIE PE-L MIVSNH
MAIF	600	INEVAKLFNTHED
HAIF	601	-----
BDSF	362	MRDIVRANEGNCK

Fig. 1A




Fig. 1B-1

Fig. 1B-2





Fig. 1C




Fig. ID



Fig. 1E




Fig. 2A




Fig. 2B




Fig. 2C




Fig. 2D




Fig. 2E




Fig. 2F




Fig. 3A




Fig. 3B




Fig. 3C




Fig. 3D




Fig. 3E




Fig. 3F




Fig. 3G




Fig. 4A-1




Fig. 4A-2




Fig. 4B-1





Fig. 4B-2



PI (contenido de ADN)

Fig. 4B-3




Fig. 4C




Fig. 4D-I



Fig. 4D-2

ES 2 274 656 T3

LISTA DE SECUENCIAS

<110> AMGEN CANADÁ, INC.

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

<120> FACTOR INDUCTOR DE APOPTOSIS

<140>

<141>

<150> 60/109,595

<151> 1998-11-23

<160> 25

<170> PatentIn Ver. 2.0

<210> 1

<211> 1932

<212> ADN

<231> *Mus musculus*

<220>

<221> CDS

<222> (1)...(1887)

<220>

<223> factor inductor de apoptosis de ratón (AIFm);

<400> 1

tgc gtg gaa gga aaa gga agg agc ggg agc ttc cga gga gtg atc gcc	48
Cys Val Glu Gly Lys Gly Arg Ser Gly Ser Phe Arg Gly Val Ile Ala	
1 5 10 15	

gaa atg ttc cgg tgt gga ggc ctg gcg ggt gct ttc aag cag aaa ctg	96
Glu Met Phe Arg Cys Gly Gly Leu Ala Gly Ala Phe Lys Gln Lys Leu	
20 25 30	

gtg ccc ttg gtg cgg acg gtg tac gtc cag agg ccg aaa cag agg aac	144
Val Pro Leu Val Arg Thr Val Tyr Val Gln Arg Pro Lys Gln Arg Asn	
35 40 45	

cgg ctt cca ggc aac ttg ttc cag caa tgg cgt gtt cct cta gaa ctc	192
Arg Leu Pro Gly Asn Leu Phe Gln Gln Trp Arg Val Pro Leu Glu Leu	
50 55 60	

cag atg gca aga caa atg gct agc tct ggt tca tca ggg ggc aaa atg	240
Gln Met Ala Arg Gln Met Ala Ser Ser Gly Ser Ser Gly Gly Lys Met	
65 70 75 80	

ES 2 274 656 T3

5	gat aat tct gtg tta gtc ctt att gtg ggc tta tca aca ata gga gct Asp Asn Ser Val Leu Val Leu Ile Val Gly Leu Ser Thr Ile Gly Ala 85 90 95	288
10	ggc gca tat gcc tac aaa act ata aaa gaa gac caa aaa aga tac aat Gly Ala Tyr Ala Tyr Lys Thr Ile Lys Glu Asp Gln Lys Arg Tyr Asn 100 105 110	336
15	gaa aga gtg atg gga tta gga ctg tcc cca gaa gag aaa cag aga aga Glu Arg Val Met Gly Leu Gly Leu Ser Pro Glu Glu Lys Gln Arg Arg 115 120 125	384
20	gcc att gcc tcc gct aca gag gga ggc tca gtt cct cag atc agg gca Ala Ile Ala Ser Ala Thr Glu Gly Gly Ser Val Pro Gln Ile Arg Ala 130 135 140	432
25	cca agt cac gtc cct ttc ctg ctg att ggt gga ggg act gct gct ttt Pro Ser His Val Pro Phe Leu Leu Ile Gly Gly Gly Thr Ala Ala Phe 145 150 155 160	480
30	gca gca gcc aga tcc atc cgg gct cgg gat cct ggg gcc agg gtc ctg Ala Ala Ala Arg Ser Ile Arg Ala Arg Asp Pro Gly Ala Arg Val Leu 165 170 175	528
35	att gta tct gaa gac cct gaa ctg cca tac atg cga cct cct ctt tca Ile Val Ser Glu Asp Pro Glu Leu Pro Tyr Met Arg Pro Pro Leu Ser 180 185 190	576
40	aaa gaa ttg tgg ttt tca gat gat cca aat gtc aca aag aca ctg caa Lys Glu Leu Trp Phe Ser Asp Asp Pro Asn Val Thr Lys Thr Leu Gln 195 200 205	624
45	ttc aga cag tgg aat gga aaa gag aga agc ata tat ttc cag cca cct Phe Arg Gln Trp Asn Gly Lys Glu Arg Ser Ile Tyr Phe Gln Pro Pro 210 215 220	672
50	tct ttc tat gtc tct gct cag gac ctg cct aat att gag aac ggt ggt Ser Phe Tyr Val Ser Ala Gln Asp Leu Pro Asn Ile Glu Asn Gly Gly 225 230 235 240	720
55	gtg gct gtc ctc act ggg aaa aag gta gta cat ctg gat gta aga ggc Val Ala Val Leu Thr Gly Lys Lys Val Val His Leu Asp Val Arg Gly 245 250 255	768
60	aac atg gtg aaa ctt aat gat ggc tct cag att acc ttt gaa aag tgc Asn Met Val Lys Leu Asn Asp Gly Ser Gln Ile Thr Phe Glu Lys Cys 260 265 270	816
65	ttg att gca acg gga ggc act cca aga agt ctg tct gcc atc gat agg Leu Ile Ala Thr Gly Gly Thr Pro Arg Ser Leu Ser Ala Ile Asp Arg 275 280 285	864
	gct gga gca gag gtg aag agt aga aca aca ctt ttc agg aag att gga Ala Gly Ala Glu Val Lys Ser Arg Thr Thr Leu Phe Arg Lys Ile Gly 290 295 300	912

ES 2 274 656 T3

5	gat ttt aga gcc ttg gag aag atc tct cgg gag gtc aag tca att aca	960
	Asp Phe Arg Ala Leu Glu Lys Ile Ser Arg Glu Val Lys Ser Ile Thr	
	305 310 315 320	
10	ggt atc ggc ggg ggc ttc ctt ggg agt gag ctg gcc tgt gct ctt ggc	1008
	Val Ile Gly Gly Gly Phe Leu Gly Ser Glu Leu Ala Cys Ala Leu Gly	
	325 330 335	
15	aga aag tct caa gcc tcg ggc ata gaa gtg atc cag ctg ttc cct gag	1056
	Arg Lys Ser Gln Ala Ser Gly Ile Glu Val Ile Gln Leu Phe Pro Glu	
	340 345 350	
20	aaa gga aat atg ggg aag atc ctt cct caa tac ctc agc aac tgg acc	1104
	Lys Gly Asn Met Gly Lys Ile Leu Pro Gln Tyr Leu Ser Asn Trp Thr	
	355 360 365	
25	atg gaa aaa gtc aaa cga gag gga gtg aaa gtg atg ccc aat gca att	1152
	Met Glu Lys Val Lys Arg Glu Gly Val Lys Val Met Pro Asn Ala Ile	
	370 375 380	
30	gta caa tca gtt gga gtc agc ggt ggc agg tta ctc att aag ctg aaa	1200
	Val Gln Ser Val Gly Val Ser Gly Gly Arg Leu Leu Ile Lys Leu Lys	
	385 390 395 400	
35	gat gga agg aag gta gaa act gac cac ata gtg aca gct gtg ggc cta	1248
	Asp Gly Arg Lys Val Glu Thr Asp His Ile Val Thr Ala Val Gly Leu	
	405 410 415	
40	gag ccc aat gtt gag ttg gcc aag act ggc gga ctg gaa ata gat tcc	1296
	Glu Pro Asn Val Glu Leu Ala Lys Thr Gly Gly Leu Glu Ile Asp Ser	
	420 425 430	
45	gat ttt ggt ggc ttc cgg gta aat gca gaa ctc caa gca cgt tct aac	1344
	Asp Phe Gly Gly Phe Arg Val Asn Ala Glu Leu Gln Ala Arg Ser Asn	
	435 440 445	
50	atc tgg gtg gca ggg gat gct gca tgc ttc tat gat ata aag ttg ggt	1392
	Ile Trp Val Ala Gly Asp Ala Ala Cys Phe Tyr Asp Ile Lys Leu Gly	
	450 455 460	
55	cga agg cga gta gag cat cat gat cat gct gtt gtg agt gga aga ctg	1440
	Arg Arg Arg Val Glu His His Asp His Ala Val Val Ser Gly Arg Leu	
	465 470 475 480	
60	gct gga gaa aac atg act gga gcc gct aag cca tac tgg cat cag tca	1488
	Ala Gly Glu Asn Met Thr Gly Ala Ala Lys Pro Tyr Trp His Gln Ser	
	485 490 495	
65	atg ttc tgg agt gat ttg ggt cct gat gtc ggc tat gaa gct att ggt	1536
	Met Phe Trp Ser Asp Leu Gly Pro Asp Val Gly Tyr Glu Ala Ile Gly	
	500 505 510	
70	ctg gtg gat agt agt ttg ccc aca gtt ggt gtt ttt gca aaa gca act	1584
	Leu Val Asp Ser Ser Leu Pro Thr Val Gly Val Phe Ala Lys Ala Thr	
	515 520 525	

ES 2 274 656 T3

gca caa gac aac cca aaa tct gcc aca gag cag tca gga act ggt atc 1632
Ala Gln Asp Asn Pro Lys Ser Ala Thr Glu Gln Ser Gly Thr Gly Ile
530 535 540

5 cgt tcg gag agt gag aca gag tca gaa gct tcg gaa atc aca att cct 1680
Arg Ser Glu Ser Glu Thr Glu Ser Glu Ala Ser Glu Ile Thr Ile Pro
545 550 555 560

10 ccc agc gcc cct gca gtc cca cag gtc cct gtt gaa ggg gag gac tac 1728
Pro Ser Ala Pro Ala Val Pro Gln Val Pro Val Glu Gly Glu Asp Tyr
565 570 575

15 ggc aaa ggt gtc atc ttc tac ctc agg gac aaa gtt gtg gtg ggg att 1776
Gly Lys Gly Val Ile Phe Tyr Leu Arg Asp Lys Val Val Val Gly Ile
580 585 590

20 gtg cta tgg aac gtc ttt aac cga atg cca att gca agg aag atc att 1824
Val Leu Trp Asn Val Phe Asn Arg Met Pro Ile Ala Arg Lys Ile Ile
595 600 605

25 aag gac ggt gag caa cat gaa gat ctc aat gaa gta gct aaa ctc ttc 1872
Lys Asp Gly Glu Gln His Glu Asp Leu Asn Glu Val Ala Lys Leu Phe
610 615 620

aac att cat gaa gat tgaatcccaa tcgtggaata cacaagcact tttccatccc 1927
Asn Ile His Glu Asp
625

30 tggcgc 1932

<210> 2

35 <211> 629
<212> PRT
<213> *Mus musculus*

40 <400> 2

Cys Val Glu Gly Lys Gly Arg Ser Gly Ser Phe Arg Gly Val Ile Ala
1 5 10 15

45 Glu Met Phe Arg Cys Gly Gly Leu Ala Gly Ala Phe Lys Gln Lys Leu
20 25 30

Val Pro Leu Val Arg Thr Val Tyr Val Gln Arg Pro Lys Gln Arg Asn
35 40 45

50 Arg Leu Pro Gly Asn Leu Phe Gln Gln Trp Arg Val Pro Leu Glu Leu
50 55 60

55 Gln Met Ala Arg Gln Met Ala Ser Ser Gly Ser Ser Gly Gly Lys Met
65 70 75 80

Asp Asn Ser Val Leu Val Leu Ile Val Gly Leu Ser Thr Ile Gly Ala
85 90 95

60

65

ES 2 274 656 T3

	Gly	Ala	Tyr	Ala	Tyr	Lys	Thr	Ile	Lys	Glu	Asp	Gln	Lys	Arg	Tyr	Asn	
				100					105					110			
5	Glu	Arg	Val	Met	Gly	Leu	Gly	Leu	Ser	Pro	Glu	Glu	Lys	Gln	Arg	Arg	
			115					120					125				
	Ala	Ile	Ala	Ser	Ala	Thr	Glu	Gly	Gly	Ser	Val	Pro	Gln	Ile	Arg	Ala	
10		130					135					140					
	Pro	Ser	His	Val	Pro	Phe	Leu	Leu	Ile	Gly	Gly	Gly	Thr	Ala	Ala	Phe	
	145					150					155					160	
15	Ala	Ala	Ala	Arg	Ser	Ile	Arg	Ala	Arg	Asp	Pro	Gly	Ala	Arg	Val	Leu	
				165						170					175		
	Ile	Val	Ser	Glu	Asp	Pro	Glu	Leu	Pro	Tyr	Met	Arg	Pro	Pro	Leu	Ser	
20				180					185					190			
	Lys	Glu	Leu	Trp	Phe	Ser	Asp	Asp	Pro	Asn	Val	Thr	Lys	Thr	Leu	Gln	
			195					200					205				
25	Phe	Arg	Gln	Trp	Asn	Gly	Lys	Glu	Arg	Ser	Ile	Tyr	Phe	Gln	Pro	Pro	
		210					215					220					
	Ser	Phe	Tyr	Val	Ser	Ala	Gln	Asp	Leu	Pro	Asn	Ile	Glu	Asn	Gly	Gly	
30		225				230					235					240	
	Val	Ala	Val	Leu	Thr	Gly	Lys	Lys	Val	Val	His	Leu	Asp	Val	Arg	Gly	
					245					250					255		
35	Asn	Met	Val	Lys	Leu	Asn	Asp	Gly	Ser	Gln	Ile	Thr	Phe	Glu	Lys	Cys	
			260						265					270			
	Leu	Ile	Ala	Thr	Gly	Gly	Thr	Pro	Arg	Ser	Leu	Ser	Ala	Ile	Asp	Arg	
40			275					280					285				
	Ala	Gly	Ala	Glu	Val	Lys	Ser	Arg	Thr	Thr	Leu	Phe	Arg	Lys	Ile	Gly	
		290					295					300					
45	Asp	Phe	Arg	Ala	Leu	Glu	Lys	Ile	Ser	Arg	Glu	Val	Lys	Ser	Ile	Thr	
	305					310					315					320	
	Val	Ile	Gly	Gly	Gly	Phe	Leu	Gly	Ser	Glu	Leu	Ala	Cys	Ala	Leu	Gly	
50				325						330					335		
	Arg	Lys	Ser	Gln	Ala	Ser	Gly	Ile	Glu	Val	Ile	Gln	Leu	Phe	Pro	Glu	
				340					345					350			
55	Lys	Gly	Asn	Met	Gly	Lys	Ile	Leu	Pro	Gln	Tyr	Leu	Ser	Asn	Trp	Thr	
			355					360					365				
	Met	Glu	Lys	Val	Lys	Arg	Glu	Gly	Val	Lys	Val	Met	Pro	Asn	Ala	Ile	
60		370					375					380					

ES 2 274 656 T3

Val Gln Ser Val Gly Val Ser Gly Gly Arg Leu Leu Ile Lys Leu Lys
 385 390 395 400
 5 Asp Gly Arg Lys Val Glu Thr Asp His Ile Val Thr Ala Val Gly Leu
 405 410 415
 Glu Pro Asn Val Glu Leu Ala Lys Thr Gly Gly Leu Glu Ile Asp Ser
 420 425 430
 10 Asp Phe Gly Gly Phe Arg Val Asn Ala Glu Leu Gln Ala Arg Ser Asn
 435 440 445
 Ile Trp Val Ala Gly Asp Ala Ala Cys Phe Tyr Asp Ile Lys Leu Gly
 450 455 460
 15 Arg Arg Arg Val Glu His His Asp His Ala Val Val Ser Gly Arg Leu
 465 470 475 480
 20 Ala Gly Glu Asn Met Thr Gly Ala Ala Lys Pro Tyr Trp His Gln Ser
 485 490 495
 Met Phe Trp Ser Asp Leu Gly Pro Asp Val Gly Tyr Glu Ala Ile Gly
 500 505 510
 25 Leu Val Asp Ser Ser Leu Pro Thr Val Gly Val Phe Ala Lys Ala Thr
 515 520 525
 Ala Gln Asp Asn Pro Lys Ser Ala Thr Glu Gln Ser Gly Thr Gly Ile
 530 535 540
 30 Arg Ser Glu Ser Glu Thr Glu Ser Glu Ala Ser Glu Ile Thr Ile Pro
 545 550 555 560
 35 Pro Ser Ala Pro Ala Val Pro Gln Val Pro Val Glu Gly Glu Asp Tyr
 565 570 575
 Gly Lys Gly Val Ile Phe Tyr Leu Arg Asp Lys Val Val Val Gly Ile
 580 585 590
 40 Val Leu Trp Asn Val Phe Asn Arg Met Pro Ile Ala Arg Lys Ile Ile
 595 600 605
 Lys Asp Gly Glu Gln His Glu Asp Leu Asn Glu Val Ala Lys Leu Phe
 610 615 620
 45 Asn Ile His Glu Asp
 625

50 <210> 3
 <211> 612
 <212> PRT
 <213> *Mus musculus*
 55 <220>
 <223> factor inductor de apoptosis en ratones (mAIF); mAIF-Gold.B1B; polipéptido maduro
 60
 65

ES 2 274 656 T3

<400> 3

5	Met Phe Arg Cys Gly Gly Leu Ala Gly Ala Phe Lys Gln Lys Leu Val	1 5 10 15
	Pro Leu Val Arg Thr Val Tyr Val Gln Arg Pro Lys Gln Arg Asn Arg	20 25 30
10	Leu Pro Gly Asn Leu Phe Gln Gln Trp Arg Val Pro Leu Glu Leu Gln	35 40 45
	Met Ala Arg Gln Met Ala Ser Ser Gly Ser Ser Gly Gly Lys Met Asp	50 55 60
15	Asn Ser Val Leu Val Leu Ile Val Gly Leu Ser Thr Ile Gly Ala Gly	65 70 75 80
20	Ala Tyr Ala Tyr Lys Thr Ile Lys Glu Asp Gln Lys Arg Tyr Asn Glu	85 90 95
	Arg Val Met Gly Leu Gly Leu Ser Pro Glu Glu Lys Gln Arg Arg Ala	100 105 110
25	Ile Ala Ser Ala Thr Glu Gly Gly Ser Val Pro Gln Ile Arg Ala Pro	115 120 125
30	Ser His Val Pro Phe Leu Leu Ile Gly Gly Gly Thr Ala Ala Phe Ala	130 135 140
	Ala Ala Arg Ser Ile Arg Ala Arg Asp Pro Gly Ala Arg Val Leu Ile	145 150 155 160
35	Val Ser Glu Asp Pro Glu Leu Pro Tyr Met Arg Pro Pro Leu Ser Lys	165 170 175
40	Glu Leu Trp Phe Ser Asp Asp Pro Asn Val Thr Lys Thr Leu Gln Phe	180 185 190
	Arg Gln Trp Asn Gly Lys Glu Arg Ser Ile Tyr Phe Gln Pro Pro Ser	195 200 205
45	Phe Tyr Val Ser Ala Gln Asp Leu Pro Asn Ile Glu Asn Gly Gly Val	210 215 220
50	Ala Val Leu Thr Gly Lys Lys Val Val His Leu Asp Val Arg Gly Asn	225 230 235 240
	Met Val Lys Leu Asn Asp Gly Ser Gln Ile Thr Phe Glu Lys Cys Leu	245 250 255
55	Ile Ala Thr Gly Gly Thr Pro Arg Ser Leu Ser Ala Ile Asp Arg Ala	260 265 270

ES 2 274 656 T3

	Gly	Ala	Glu	Val	Lys	Ser	Arg	Thr	Thr	Leu	Phe	Arg	Lys	Ile	Gly	Asp	
			275					280					285				
5	Phe	Arg	Ala	Leu	Glu	Lys	Ile	Ser	Arg	Glu	Val	Lys	Ser	Ile	Thr	Val	
		290					295					300					
10	Ile	Gly	Gly	Gly	Phe	Leu	Gly	Ser	Glu	Leu	Ala	Cys	Ala	Leu	Gly	Arg	
	305					310					315					320	
	Lys	Ser	Gln	Ala	Ser	Gly	Ile	Glu	Val	Ile	Gln	Leu	Phe	Pro	Glu	Lys	
				325						330					335		
15	Gly	Asn	Met	Gly	Lys	Ile	Leu	Pro	Gln	Tyr	Leu	Ser	Asn	Trp	Thr	Met	
			340						345					350			
20	Glu	Lys	Val	Lys	Arg	Glu	Gly	Val	Lys	Val	Met	Pro	Asn	Ala	Ile	Val	
			355					360					365				
	Gln	Ser	Val	Gly	Val	Ser	Gly	Gly	Arg	Leu	Leu	Ile	Lys	Leu	Lys	Asp	
		370					375					380					
25	Gly	Arg	Lys	Val	Glu	Thr	Asp	His	Ile	Val	Thr	Ala	Val	Gly	Leu	Glu	
	385					390					395					400	
30	Pro	Asn	Val	Glu	Leu	Ala	Lys	Thr	Gly	Gly	Leu	Glu	Ile	Asp	Ser	Asp	
				405						410					415		
	Phe	Gly	Gly	Phe	Arg	Val	Asn	Ala	Glu	Leu	Gln	Ala	Arg	Ser	Asn	Ile	
				420					425					430			
35	Trp	Val	Ala	Gly	Asp	Ala	Ala	Cys	Phe	Tyr	Asp	Ile	Lys	Leu	Gly	Arg	
		435					440						445				
40	Arg	Arg	Val	Glu	His	His	Asp	His	Ala	Val	Val	Ser	Gly	Arg	Leu	Ala	
		450					455					460					
	Gly	Glu	Asn	Met	Thr	Gly	Ala	Ala	Lys	Pro	Tyr	Trp	His	Gln	Ser	Met	
	465					470					475					480	
45	Phe	Trp	Ser	Asp	Leu	Gly	Pro	Asp	Val	Gly	Tyr	Glu	Ala	Ile	Gly	Leu	
				485						490					495		
50	Val	Asp	Ser	Ser	Leu	Pro	Thr	Val	Gly	Val	Phe	Ala	Lys	Ala	Thr	Ala	
				500					505					510			
	Gln	Asp	Asn	Pro	Lys	Ser	Ala	Thr	Glu	Gln	Ser	Gly	Thr	Gly	Ile	Arg	
		515						520					525				
55	Ser	Glu	Ser	Glu	Thr	Glu	Ser	Glu	Ala	Ser	Glu	Ile	Thr	Ile	Pro	Pro	
		530					535					540					
60	Ser	Ala	Pro	Ala	Val	Pro	Gln	Val	Pro	Val	Glu	Gly	Glu	Asp	Tyr	Gly	
	545					550					555					560	

ES 2 274 656 T3

Lys Gly Val Ile Phe Tyr Leu Arg Asp Lys Val Val Val Gly Ile Val
 565 570 575
 5 Leu Trp Asn Val Phe Asn Arg Met Pro Ile Ala Arg Lys Ile Ile Lys
 580 585 590
 Asp Gly Glu Gln His Glu Asp Leu Asn Glu Val Ala Lys Leu Phe Asn
 595 600 605
 10 Ile His Glu Asp
 610
 <210> 4
 15 <211> 1920
 <212> ADN
 <213> *Mus musculus*
 20 <220>
 <221> CDS
 <222> (1)..(1875)
 25 <220>
 <223> Factor inductor de apoptosis en ratones (isoforma mAIF); mAIF-alt-exon-Gold
 <400> 4
 30 tgc gtg gaa gga aaa gga agg agc ggg agc ttc cga gga gtg atc gcc 48
 Cys Val Glu Gly Lys Gly Arg Ser Gly Ser Phe Arg Gly Val Ile Ala
 1 5 10 15
 35 gaa atg ttc cgg tgt gga ggc ctg gcg ggt gct ttc aag cag aaa ctg 96
 Glu Met Phe Arg Cys Gly Gly Leu Ala Gly Ala Phe Lys Gln Lys Leu
 20 25 30
 40 gtg ccc ttg gtg cgg acg gtg tac gtc cag agg ccg aaa cag agg aac 144
 Val Pro Leu Val Arg Thr Val Tyr Val Gln Arg Pro Lys Gln Arg Asn
 35 40 45
 45 cgg ctt cca gtt gtg cag tgt cat ctc cta gga tcc cct tct aga aca 192
 Arg Leu Pro Val Val Gln Cys His Leu Leu Gly Ser Pro Ser Arg Thr
 50 55 60
 50 cta gcg tct gca ggt gct tct ggg aaa gat ggc agc agc cta gta tac 240
 Leu Ala Ser Ala Gly Ala Ser Gly Lys Asp Gly Ser Ser Leu Val Tyr
 65 70 75 80
 55 ttc tta att gta gga gca aca gtg act ggg gca gga att tat tat gcc 288
 Phe Leu Ile Val Gly Ala Thr Val Thr Gly Ala Gly Ile Tyr Tyr Ala
 85 90 95
 60 tac aaa act ata aaa gaa gac caa aaa aga tac aat gaa aga gtg atg 336
 Tyr Lys Thr Ile Lys Glu Asp Gln Lys Arg Tyr Asn Glu Arg Val Met
 100 105 110
 65

ES 2 274 656 T3

5		gga tta gga ctg tcc cca gaa gag aaa cag aga aga gcc att gcc tcc	384
		Gly Leu Gly Leu Ser Pro Glu Glu Lys Gln Arg Arg Ala Ile Ala Ser	
		115 120 125	
10		gct aca gag gga ggc tca gtt cct cag atc agg gca cca agt cac gtc	432
		Ala Thr Glu Gly Gly Ser Val Pro Gln Ile Arg Ala Pro Ser His Val	
		130 135 140	
15		cct ttc ctg ctg att ggt gga ggg act gct gct ttt gca gca gcc aga	480
		Pro Phe Leu Leu Ile Gly Gly Gly Thr Ala Ala Phe Ala Ala Ala Arg	
		145 150 155 160	
20		tcc atc cgg gct cgg gat cct ggg gcc agg gtc ctg att gta tct gaa	528
		Ser Ile Arg Ala Arg Asp Pro Gly Ala Arg Val Leu Ile Val Ser Glu	
		165 170 175	
25		gac cct gaa ctg cca tac atg cga cct cct ctt tca aaa gaa ttg tgg	576
		Asp Pro Glu Leu Pro Tyr Met Arg Pro Pro Leu Ser Lys Glu Leu Trp	
		180 185 190	
30		ttt tca gat gat cca aat gtc aca aag aca ctg caa ttc aga cag tgg	624
		Phe Ser Asp Asp Pro Asn Val Thr Lys Thr Leu Gln Phe Arg Gln Trp	
		195 200 205	
35		aat gga aaa gag aga agc ata tat ttc cag cca cct tct ttc tat gtc	672
		Asn Gly Lys Glu Arg Ser Ile Tyr Phe Gln Pro Pro Ser Phe Tyr Val	
		210 215 220	
40		tct gct cag gac ctg cct aat att gag aac ggt ggt gtg gct gtc ctc	720
		Ser Ala Gln Asp Leu Pro Asn Ile Glu Asn Gly Gly Val Ala Val Leu	
		225 230 235 240	
45		act ggg aaa aag gta gta cat ctg gat gta aga ggc aac atg gtg aaa	768
		Thr Gly Lys Lys Val Val His Leu Asp Val Arg Gly Asn Met Val Lys	
		245 250 255	
50		ctt aat gat ggc tct cag att acc ttt gaa aag tgc ttg att gca acg	816
		Leu Asn Asp Gly Ser Gln Ile Thr Phe Glu Lys Cys Leu Ile Ala Thr	
		260 265 270	
55		gga ggc act cca aga agt ctg tct gcc atc gat agg gct gga gca gag	864
		Gly Gly Thr Pro Arg Ser Leu Ser Ala Ile Asp Arg Ala Gly Ala Glu	
		275 280 285	
60		gtg aag agt aga aca aca ctt ttc agg aag att gga gat ttt aga gcc	912
		Val Lys Ser Arg Thr Thr Leu Phe Arg Lys Ile Gly Asp Phe Arg Ala	
		290 295 300	
65		ttg gag aag atc tct cgg gag gtc aag tca att aca gtt atc ggc ggg	960
		Leu Glu Lys Ile Ser Arg Glu Val Lys Ser Ile Thr Val Ile Gly Gly	
		305 310 315 320	
70		ggc ttc ctt ggg agt gag ctg gcc tgt gct ctt ggc aga aag tct caa	1008
		Gly Phe Leu Gly Ser Glu Leu Ala Cys Ala Leu Gly Arg Lys Ser Gln	
		325 330 335	

ES 2 274 656 T3

5	gcc tcg ggc ata gaa gtg atc cag ctg ttc cct gag aaa gga aat atg 1056 Ala Ser Gly Ile Glu Val Ile Gln Leu Phe Pro Glu Lys Gly Asn Met 340 345 350
10	ggg aag atc ctt cct caa tac ctc agc aac tgg acc atg gaa aaa gtc 1104 Gly Lys Ile Leu Pro Gln Tyr Leu Ser Asn Trp Thr Met Glu Lys Val 355 360 365
15	aaa cga gag gga gtg aaa gtg atg ccc aat gca att gta caa tca gtt 1152 Lys Arg Glu Gly Val Lys Val Met Pro Asn Ala Ile Val Gln Ser Val 370 375 380
20	gga gtc agc ggt ggc agg tta ctc att aag ctg aaa gat gga agg aag 1200 Gly Val Ser Gly Gly Arg Leu Leu Ile Lys Leu Lys Asp Gly Arg Lys 385 390 395 400
25	gta gaa act gac cac ata gtg aca gct gtg ggc cta gag ccc aat gtt 1248 Val Glu Thr Asp His Ile Val Thr Ala Val Gly Leu Glu Pro Asn Val 405 410 415
30	gag ttg gcc aag act ggc gga ctg gaa ata gat tcc gat ttt ggt ggc 1296 Glu Leu Ala Lys Thr Gly Gly Leu Glu Ile Asp Ser Asp Phe Gly Gly 420 425 430
35	ttc cgg gta aat gca gaa ctc caa gca cgt tct aac atc tgg gtg gca 1344 Phe Arg Val Asn Ala Glu Leu Gln Ala Arg Ser Asn Ile Trp Val Ala 435 440 445
40	ggg gat gct gca tgc ttc tat gat ata aag ttg ggt cga agg cga gta 1392 Gly Asp Ala Ala Cys Phe Tyr Asp Ile Lys Leu Gly Arg Arg Arg Val 450 455 460
45	gag cat cat gat cat gct gtt gtg agt gga aga ctg gct gga gaa aac 1440 Glu His His Asp His Ala Val Val Ser Gly Arg Leu Ala Gly Glu Asn 465 470 475 480
50	atg act gga gcc gct aag cca tac tgg cat cag tca atg ttc tgg agt 1488 Met Thr Gly Ala Ala Lys Pro Tyr Trp His Gln Ser Met Phe Trp Ser 485 490 495
55	gat ttg ggt cct gat gtc ggc tat gaa gct att ggt ctg gtg gat agt 1536 Asp Leu Gly Pro Asp Val Gly Tyr Glu Ala Ile Gly Leu Val Asp Ser 500 505 510
60	agt ttg ccc aca gtt ggt gtt ttt gca aaa gca act gca caa gac aac 1584 Ser Leu Pro Thr Val Gly Val Phe Ala Lys Ala Thr Ala Gln Asp Asn 515 520 525
65	cca aaa tct gcc aca gag cag tca gga act ggt atc cgt tcg gag agt 1632 Pro Lys Ser Ala Thr Glu Gln Ser Gly Thr Gly Ile Arg Ser Glu Ser 530 535 540
	gag aca gag tca gaa gct tcg gaa atc aca att cct ccc agc gcc cct 1680 Glu Thr Glu Ser Glu Ala Ser Glu Ile Thr Ile Pro Pro Ser Ala Pro 545 550 555 560

ES 2 274 656 T3

gca gtc cca cag gtc cct gtt gaa ggg gag gac tac ggc aaa ggt gtc 1728
 Ala Val Pro Gln Val Pro Val Glu Gly Glu Asp Tyr Gly Lys Gly Val
 565 570 575
 5
 atc ttc tac ctc agg gac aaa gtt gtg gtg ggg att gtg cta tgg aac 1776
 Ile Phe Tyr Leu Arg Asp Lys Val Val Val Gly Ile Val Leu Trp Asn
 580 585 590
 10
 gtc ttt aac cga atg cca att gca agg aag atc att aag gac ggt gag 1824
 Val Phe Asn Arg Met Pro Ile Ala Arg Lys Ile Ile Lys Asp Gly Glu
 595 600 605
 15
 caa cat gaa gat ctc aat gaa gta gct aaa ctc ttc aac att cat gaa 1872
 Gln His Glu Asp Leu Asn Glu Val Ala Lys Leu Phe Asn Ile His Glu
 610 615 620
 20
 gat tgaatcccaa tcgtggaata cacaagcact ttcccatccc tggcg 1920
 Asp
 625

<210> 5

25 <211> 625

<212> PRT

<213> *Mus musculus*

30 <400> 5

Cys Val Glu Gly Lys Gly Arg Ser Gly Ser Phe Arg Gly Val Ile Ala
 1 5 10 15
 35
 Glu Met Phe Arg Cys Gly Gly Leu Ala Gly Ala Phe Lys Gln Lys Leu
 20 25 30
 Val Pro Leu Val Arg Thr Val Tyr Val Gln Arg Pro Lys Gln Arg Asn
 35 40 45
 40
 Arg Leu Pro Val Val Gln Cys His Leu Leu Gly Ser Pro Ser Arg Thr
 50 55 60
 Leu Ala Ser Ala Gly Ala Ser Gly Lys Asp Gly Ser Ser Leu Val Tyr
 65 70 75 80
 45
 Phe Leu Ile Val Gly Ala Thr Val Thr Gly Ala Gly Ile Tyr Tyr Ala
 85 90 95
 Tyr Lys Thr Ile Lys Glu Asp Gln Lys Arg Tyr Asn Glu Arg Val Met
 100 105 110
 50
 Gly Leu Gly Leu Ser Pro Glu Glu Lys Gln Arg Arg Ala Ile Ala Ser
 115 120 125
 55
 Ala Thr Glu Gly Gly Ser Val Pro Gln Ile Arg Ala Pro Ser His Val
 130 135 140

60

65

ES 2 274 656 T3

	Pro	Phe	Leu	Leu	Ile	Gly	Gly	Gly	Thr	Ala	Ala	Phe	Ala	Ala	Ala	Arg	
	145					150				155						160	
5	Ser	Ile	Arg	Ala	Arg	Asp	Pro	Gly	Ala	Arg	Val	Leu	Ile	Val	Ser	Glu	
					165					170					175		
10	Asp	Pro	Glu	Leu	Pro	Tyr	Met	Arg	Pro	Pro	Leu	Ser	Lys	Glu	Leu	Trp	
				180					185					190			
	Phe	Ser	Asp	Asp	Pro	Asn	Val	Thr	Lys	Thr	Leu	Gln	Phe	Arg	Gln	Trp	
			195					200					205				
15	Asn	Gly	Lys	Glu	Arg	Ser	Ile	Tyr	Phe	Gln	Pro	Pro	Ser	Phe	Tyr	Val	
	210					215						220					
20	Ser	Ala	Gln	Asp	Leu	Pro	Asn	Ile	Glu	Asn	Gly	Gly	Val	Ala	Val	Leu	
	225					230					235					240	
	Thr	Gly	Lys	Lys	Val	Val	His	Leu	Asp	Val	Arg	Gly	Asn	Met	Val	Lys	
					245					250					255		
25	Leu	Asn	Asp	Gly	Ser	Gln	Ile	Thr	Phe	Glu	Lys	Cys	Leu	Ile	Ala	Thr	
				260					265					270			
30	Gly	Gly	Thr	Pro	Arg	Ser	Leu	Ser	Ala	Ile	Asp	Arg	Ala	Gly	Ala	Glu	
			275					280					285				
	Val	Lys	Ser	Arg	Thr	Thr	Leu	Phe	Arg	Lys	Ile	Gly	Asp	Phe	Arg	Ala	
		290					295					300					
35	Leu	Glu	Lys	Ile	Ser	Arg	Glu	Val	Lys	Ser	Ile	Thr	Val	Ile	Gly	Gly	
	305					310					315					320	
40	Gly	Phe	Leu	Gly	Ser	Glu	Leu	Ala	Cys	Ala	Leu	Gly	Arg	Lys	Ser	Gln	
				325					330					335			
	Ala	Ser	Gly	Ile	Glu	Val	Ile	Gln	Leu	Phe	Pro	Glu	Lys	Gly	Asn	Met	
			340					345					350				
45	Gly	Lys	Ile	Leu	Pro	Gln	Tyr	Leu	Ser	Asn	Trp	Thr	Met	Glu	Lys	Val	
			355					360					365				
50	Lys	Arg	Glu	Gly	Val	Lys	Val	Met	Pro	Asn	Ala	Ile	Val	Gln	Ser	Val	
		370				375						380					
	Gly	Val	Ser	Gly	Gly	Arg	Leu	Leu	Ile	Lys	Leu	Lys	Asp	Gly	Arg	Lys	
	385					390					395					400	
55	Val	Glu	Thr	Asp	His	Ile	Val	Thr	Ala	Val	Gly	Leu	Glu	Pro	Asn	Val	
				405					410					415			
60	Glu	Leu	Ala	Lys	Thr	Gly	Gly	Leu	Glu	Ile	Asp	Ser	Asp	Phe	Gly	Gly	
				420					425					430			

65

ES 2 274 656 T3

Phe Arg Val Asn Ala Glu Leu Gln Ala Arg Ser Asn Ile Trp Val Ala
 435 440 445
 5 Gly Asp Ala Ala Cys Phe Tyr Asp Ile Lys Leu Gly Arg Arg Arg Val
 450 455 460
 Glu His His Asp His Ala Val Val Ser Gly Arg Leu Ala Gly Glu Asn
 465 470 475 480
 10 Met Thr Gly Ala Ala Lys Pro Tyr Trp His Gln Ser Met Phe Trp Ser
 485 490 495
 Asp Leu Gly Pro Asp Val Gly Tyr Glu Ala Ile Gly Leu Val Asp Ser
 500 505 510
 15 Ser Leu Pro Thr Val Gly Val Phe Ala Lys Ala Thr Ala Gln Asp Asn
 515 520 525
 20 Pro Lys Ser Ala Thr Glu Gln Ser Gly Thr Gly Ile Arg Ser Glu Ser
 530 535 540
 Glu Thr Glu Ser Glu Ala Ser Glu Ile Thr Ile Pro Pro Ser Ala Pro
 545 550 555 560
 25 Ala Val Pro Gln Val Pro Val Glu Gly Glu Asp Tyr Gly Lys Gly Val
 565 570 575
 Ile Phe Tyr Leu Arg Asp Lys Val Val Val Gly Ile Val Leu Trp Asn
 580 585 590
 30 Val Phe Asn Arg Met Pro Ile Ala Arg Lys Ile Ile Lys Asp Gly Glu
 595 600 605
 35 Gln His Glu Asp Leu Asn Glu Val Ala Lys Leu Phe Asn Ile His Glu
 610 615 620
 40 Asp
 625
 <210> 6
 <211> 608
 <212> PRT
 45 <213> *Mus musculus*
 <220>
 50 <223> factor inductor de apoptosis en ratones (isoforma mAIF); mAIF-alt-exon-Gold; polipéptido maduro
 <400> 6
 Met Phe Arg Cys Gly Gly Leu Ala Gly Ala Phe Lys Gln Lys Leu Val
 1 5 10 15
 Pro Leu Val Arg Thr Val Tyr Val Gln Arg Pro Lys Gln Arg Asn Arg
 20 25 30

ES 2 274 656 T3

	Leu	Pro	Val	Val	Gln	Cys	His	Leu	Leu	Gly	Ser	Pro	Ser	Arg	Thr	Leu	
				35				40					45				
5	Ala	Ser	Ala	Gly	Ala	Ser	Gly	Lys	Asp	Gly	Ser	Ser	Leu	Val	Tyr	Phe	
			50				55					60					
10	Leu	Ile	Val	Gly	Ala	Thr	Val	Thr	Gly	Ala	Gly	Ile	Tyr	Tyr	Ala	Tyr	
	65					70					75					80	
	Lys	Thr	Ile	Lys	Glu	Asp	Gln	Lys	Arg	Tyr	Asn	Glu	Arg	Val	Met	Gly	
					85					90					95		
15	Leu	Gly	Leu	Ser	Pro	Glu	Glu	Lys	Gln	Arg	Arg	Ala	Ile	Ala	Ser	Ala	
				100					105					110			
20	Thr	Glu	Gly	Gly	Ser	Val	Pro	Gln	Ile	Arg	Ala	Pro	Ser	His	Val	Pro	
			115						120				125				
	Phe	Leu	Leu	Ile	Gly	Gly	Gly	Thr	Ala	Ala	Phe	Ala	Ala	Ala	Arg	Ser	
		130					135					140					
25	Ile	Arg	Ala	Arg	Asp	Pro	Gly	Ala	Arg	Val	Leu	Ile	Val	Ser	Glu	Asp	
	145					150					155					160	
30	Pro	Glu	Leu	Pro	Tyr	Met	Arg	Pro	Pro	Leu	Ser	Lys	Glu	Leu	Trp	Phe	
					165					170					175		
	Ser	Asp	Asp	Pro	Asn	Val	Thr	Lys	Thr	Leu	Gln	Phe	Arg	Gln	Trp	Asn	
				180					185					190			
35	Gly	Lys	Glu	Arg	Ser	Ile	Tyr	Phe	Gln	Pro	Pro	Ser	Phe	Tyr	Val	Ser	
			195					200					205				
40	Ala	Gln	Asp	Leu	Pro	Asn	Ile	Glu	Asn	Gly	Gly	Val	Ala	Val	Leu	Thr	
		210					215					220					
	Gly	Lys	Lys	Val	Val	His	Leu	Asp	Val	Arg	Gly	Asn	Met	Val	Lys	Leu	
	225					230					235					240	
45	Asn	Asp	Gly	Ser	Gln	Ile	Thr	Phe	Glu	Lys	Cys	Leu	Ile	Ala	Thr	Gly	
					245					250					255		
50	Gly	Thr	Pro	Arg	Ser	Leu	Ser	Ala	Ile	Asp	Arg	Ala	Gly	Ala	Glu	Val	
				260					265					270			
	Lys	Ser	Arg	Thr	Thr	Leu	Phe	Arg	Lys	Ile	Gly	Asp	Phe	Arg	Ala	Leu	
			275				280						285				
55	Glu	Lys	Ile	Ser	Arg	Glu	Val	Lys	Ser	Ile	Thr	Val	Ile	Gly	Gly	Gly	
		290					295					300					
60	Phe	Leu	Gly	Ser	Glu	Leu	Ala	Cys	Ala	Leu	Gly	Arg	Lys	Ser	Gln	Ala	
	305					310					315					320	

65

ES 2 274 656 T3

	Ser Gly Ile Glu Val Ile Gln Leu Phe Pro Glu Lys Gly Asn Met Gly	
	325	330 335
5	Lys Ile Leu Pro Gln Tyr Leu Ser Asn Trp Thr Met Glu Lys Val Lys	
	340	345 350
10	Arg Glu Gly Val Lys Val Met Pro Asn Ala Ile Val Gln Ser Val Gly	
	355	360 365
	Val Ser Gly Gly Arg Leu Leu Ile Lys Leu Lys Asp Gly Arg Lys Val	
	370	375 380
15	Glu Thr Asp His Ile Val Thr Ala Val Gly Leu Glu Pro Asn Val Glu	
	385	390 395 400
20	Leu Ala Lys Thr Gly Gly Leu Glu Ile Asp Ser Asp Phe Gly Gly Phe	
	405	410 415
	Arg Val Asn Ala Glu Leu Gln Ala Arg Ser Asn Ile Trp Val Ala Gly	
	420	425 430
25	Asp Ala Ala Cys Phe Tyr Asp Ile Lys Leu Gly Arg Arg Arg Val Glu	
	435	440 445
30	His His Asp His Ala Val Val Ser Gly Arg Leu Ala Gly Glu Asn Met	
	450	455 460
	Thr Gly Ala Ala Lys Pro Tyr Trp His Gln Ser Met Phe Trp Ser Asp	
	465	470 475 480
35	Leu Gly Pro Asp Val Gly Tyr Glu Ala Ile Gly Leu Val Asp Ser Ser	
	485	490 495
40	Leu Pro Thr Val Gly Val Phe Ala Lys Ala Thr Ala Gln Asp Asn Pro	
	500	505 510
	Lys Ser Ala Thr Glu Gln Ser Gly Thr Gly Ile Arg Ser Glu Ser Glu	
	515	520 525
45	Thr Glu Ser Glu Ala Ser Glu Ile Thr Ile Pro Pro Ser Ala Pro Ala	
	530	535 540
50	Val Pro Gln Val Pro Val Glu Gly Glu Asp Tyr Gly Lys Gly Val Ile	
	545	550 555 560
	Phe Tyr Leu Arg Asp Lys Val Val Val Gly Ile Val Leu Trp Asn Val	
	565	570 575
55	Phe Asn Arg Met Pro Ile Ala Arg Lys Ile Ile Lys Asp Gly Glu Gln	
	580	585 590
60	His Glu Asp Leu Asn Glu Val Ala Lys Leu Phe Asn Ile His Glu Asp	
	595	600 605

<210> 7

<211> 1906

65 <212> ADN

<213> *Homo sapiens*

ES 2 274 656 T3

<220>

<221> CDS

<222> (1)..(1881)

5

<220>

<223> factor inductor de apoptosis en humanos (hAIF); hAIF-Gold

10 <400> 7

```
aga gga aag gga agg agg agg tcc cga ata gcg gtc gcc gaa atg ttc 48
Arg Gly Lys Gly Arg Arg Arg Ser Arg Ile Ala Val Ala Glu Met Phe
1 5 10 15
```

15

```
cgg tgt gga ggc ctg gcg gcg ggt gct ttg aag cag aag ctg gtg ccc 96
Arg Cys Gly Gly Leu Ala Ala Gly Ala Leu Lys Gln Lys Leu Val Pro
20 25 30
```

20

```
ttg gtg cgg acc gtg tgc gtc cga agc ccg agg cag agg aac cgg ctc 144
Leu Val Arg Thr Val Cys Val Arg Ser Pro Arg Gln Arg Asn Arg Leu
35 40 45
```

25

```
cca ggc aac ttg ttc cag cga tgg cat gtt cct cta gaa ctc cag atg 192
Pro Gly Asn Leu Phe Gln Arg Trp His Val Pro Leu Glu Leu Gln Met
50 55 60
```

30

```
aca aga caa atg gct agc tct ggt gca tca ggg ggc aaa atc gat aat 240
Thr Arg Gln Met Ala Ser Ser Gly Ala Ser Gly Gly Lys Ile Asp Asn
65 70 75 80
```

35

```
tct gtg tta gtc ctt att gtg ggc tta tca aca gta gga gct ggt gcc 200
Ser Val Leu Val Leu Ile Val Gly Leu Ser Thr Val Gly Ala Gly Ala
85 90 95
```

40

```
tat gcc tac aag act atg aaa gag gac gaa aaa aga tac aat gaa aga 336
Tyr Ala Tyr Lys Thr Met Lys Glu Asp Glu Lys Arg Tyr Asn Glu Arg
100 105 110
```

45

```
att tca ggg tta ggg ctg aca cca gaa cag aaa cag aaa aag gcc gcg 384
Ile Ser Gly Leu Gly Leu Thr Pro Glu Gln Lys Gln Lys Lys Ala Ala
115 120 125
```

50

```
tta tct gct tca gaa gga gag gaa gtt cct caa gac aag gcg cca agt 432
Leu Ser Ala Ser Glu Gly Glu Glu Val Pro Gln Asp Lys Ala Pro Ser
130 135 140
```

55

```
cat gtt cct ttc ctg cta att ggt gga ggc aca gct gct ttt gct gca 480
His Val Pro Phe Leu Leu Ile Gly Gly Gly Thr Ala Ala Phe Ala Ala
145 150 155 160
```

60

65

ES 2 274 656 T3

5	gcc aga tcc atc cgg gct cgg gat cct ggg gcc agg gta ctg att gta	528
	Ala Arg Ser Ile Arg Ala Arg Asp Pro Gly Ala Arg Val Leu Ile Val	
	165 170 175	
10	tct gaa gat cct gag ctg ccg tac atg cga cct cct ctt tca aaa gaa	576
	Ser Glu Asp Pro Glu Leu Pro Tyr Met Arg Pro Pro Leu Ser Lys Glu	
	180 185 190	
15	ctg tgg ttt tca gat gac cca aat gtc aca aag aca ctg cga ttc aaa	624
	Leu Trp Phe Ser Asp Asp Pro Asn Val Thr Lys Thr Leu Arg Phe Lys	
	195 200 205	
20	cag tgg aat gga aaa gag aga agc ata tat ttc cag cca cct tct ttc	672
	Gln Trp Asn Gly Lys Glu Arg Ser Ile Tyr Phe Gln Pro Pro Ser Phe	
	210 215 220	
25	tat gtc tct gct cag gac ctg cct cat att gag aat ggt ggt gtg gct	720
	Tyr Val Ser Ala Gln Asp Leu Pro His Ile Glu Asn Gly Gly Val Ala	
	225 230 235 240	
30	gtc ctc act ggg aag aag gta gta cag ctg gat gtg aga gac aac atg	768
	Val Leu Thr Gly Lys Lys Val Val Gln Leu Asp Val Arg Asp Asn Met	
	245 250 255	
35	gtg aaa ctt aat gat ggc tct caa ata acc tat gaa aag tgc ttg att	816
	Val Lys Leu Asn Asp Gly Ser Gln Ile Thr Tyr Glu Lys Cys Leu Ile	
	260 265 270	
40	gca aca gga ggt act cca aga agt ctg tct gcc att gat agg gct gga	864
	Ala Thr Gly Gly Thr Pro Arg Ser Leu Ser Ala Ile Asp Arg Ala Gly	
	275 280 285	
45	gca gag gtg aag agt aga aca acg ctt ttc aga aag att gga gac ttt	912
	Ala Glu Val Lys Ser Arg Thr Thr Leu Phe Arg Lys Ile Gly Asp Phe	
	290 295 300	
50	aga agc ttg gag aag att tca cgg gaa gtc aaa tca att acg att atc	960
	Arg Ser Leu Glu Lys Ile Ser Arg Glu Val Lys Ser Ile Thr Ile Ile	
	305 310 315 320	
55	ggg ggg ggc ttc ctt ggt agc gaa ctg gcc tgt gct ctt ggc aga aag	1008
	Gly Gly Gly Phe Leu Gly Ser Glu Leu Ala Cys Ala Leu Gly Arg Lys	
	325 330 335	
60	gct cga gcc ttg ggc aca gaa gtg att caa ctc ttc ccc gag aaa gga	1056
	Ala Arg Ala Leu Gly Thr Glu Val Ile Gln Leu Phe Pro Glu Lys Gly	
	340 345 350	
65	aat atg gga aag atc ctc ccc gaa tac ctc agc aac tgg acc atg gaa	1104
	Asn Met Gly Lys Ile Leu Pro Glu Tyr Leu Ser Asn Trp Thr Met Glu	
	355 360 365	
70	aaa gtc aga cga gag ggg gtt aag gtg atg ccc aat gct att gtg caa	1152
	Lys Val Arg Arg Glu Gly Val Lys Val Met Pro Asn Ala Ile Val Gln	
	370 375 380	

ES 2 274 656 T3

5	tcc gtt gga gtc agc agt ggc aag tta ctt atc aag ctg aaa gac ggc Ser Val Gly Val Ser Ser Gly Lys Leu Leu Ile Lys Leu Lys Asp Gly 385 390 395 400	1200
10	agg aag gta gaa act gac cac ata gtg gca gct gtg ggc ctg gag ccc Arg Lys Val Glu Thr Asp His Ile Val Ala Ala Val Gly Leu Glu Pro 405 410 415	1248
15	aat gtt gag ttg gcc aag act ggt ggc ctg gaa ata gac tca gat ttt Asn Val Glu Leu Ala Lys Thr Gly Gly Leu Glu Ile Asp Ser Asp Phe 420 425 430	1296
20	ggg ggc ttc cgg gta aat gca gag cta caa gca cgc tct aac atc tgg Gly Gly Phe Arg Val Asn Ala Glu Leu Gln Ala Arg Ser Asn Ile Trp 435 440 445	1344
25	gtg gca gga gat gct gca tgc ttc tac gat ata aag ttg gga agg agg Val Ala Gly Asp Ala Ala Cys Phe Tyr Asp Ile Lys Leu Gly Arg Arg 450 455 460	1392
30	cgg gta gag cac cat gat cac gct gtt gtg agt gga aga ttg gct gga Arg Val Glu His His Asp His Ala Val Val Ser Gly Arg Leu Ala Gly 465 470 475 480	1440
35	gaa aat atg act gga gct gct aag ccg tac tgg cat cag tca atg ttc Glu Asn Met Thr Gly Ala Ala Lys Pro Tyr Trp His Gln Ser Met Phe 485 490 495	1488
40	tgg agt gat ttg ggc ccc gat gtt ggc tat gaa gct att ggt ctt gtg Trp Ser Asp Leu Gly Pro Asp Val Gly Tyr Glu Ala Ile Gly Leu Val 500 505 510	1536
45	gac agt agt ttg ccc aca gtt ggt gtt ttt gca aaa gca act gca caa Asp Ser Ser Leu Pro Thr Val Gly Val Phe Ala Lys Ala Thr Ala Gln 515 520 525	1584
50	gac aac ccc aaa tct gcc aca gag cag tca gga act ggt atc cga tca Asp Asn Pro Lys Ser Ala Thr Glu Gln Ser Gly Thr Gly Ile Arg Ser 530 535 540	1632
55	gag agt gag aca gag tcc gag gcc tca gaa att act att cct ccc agc Glu Ser Glu Thr Glu Ser Glu Ala Ser Glu Ile Thr Ile Pro Pro Ser 545 550 555 560	1680
60	acc ccg gca gtt cca cag gct ccc gtc cag ggg gag gac tac ggc aaa Thr Pro Ala Val Pro Gln Ala Pro Val Gln Gly Glu Asp Tyr Gly Lys 565 570 575	1728
65	ggg gtc atc ttc tac ctc agg gac aaa gtg gtc gtg ggg att gtg cta Gly Val Ile Phe Tyr Leu Arg Asp Lys Val Val Val Gly Ile Val Leu 580 585 590	1776
	tgg aac atc ttt aac cga atg cca ata gca agg aag atc att aag gac Trp Asn Ile Phe Asn Arg Met Pro Ile Ala Arg Lys Ile Ile Lys Asp 595 600 605	1824

ES 2 274 656 T3

ggt gag cag cat gaa gat ctc aat gaa gta gcc aaa cta ttc aac att 1872
 Gly Glu Gln His Glu Asp Leu Asn Glu Val Ala Lys Leu Phe Asn Ile
 610 615 620

cat gaa gac tgaagcccca cagtgggaatt ggcaa 1906
 His Glu Asp
 625

10 <210> 8

<211> 627

<212> PRT

15 <213> *Homo sapiens*

<400> 8

20 Arg Gly Lys Gly Arg Arg Arg Ser Arg Ile Ala Val Ala Glu Met Phe
 1 5 10 15

Arg Cys Gly Gly Leu Ala Ala Gly Ala Leu Lys Gln Lys Leu Val Pro
 20 25 30

25 Leu Val Arg Thr Val Cys Val Arg Ser Pro Arg Gln Arg Asn Arg Leu
 35 40 45

Pro Gly Asn Leu Phe Gln Arg Trp His Val Pro Leu Glu Leu Gln Met
 50 55 60

30 Thr Arg Gln Met Ala Ser Ser Gly Ala Ser Gly Gly Lys Ile Asp Asn
 65 70 75 80

35 Ser Val Leu Val Leu Ile Val Gly Leu Ser Thr Val Gly Ala Gly Ala
 85 90 95

Tyr Ala Tyr Lys Thr Met Lys Glu Asp Glu Lys Arg Tyr Asn Glu Arg
 100 105 110

40 Ile Ser Gly Leu Gly Leu Thr Pro Glu Gln Lys Gln Lys Lys Ala Ala
 115 120 125

45 Leu Ser Ala Ser Glu Gly Glu Glu Val Pro Gln Asp Lys Ala Pro Ser
 130 135 140

His Val Pro Phe Leu Leu Ile Gly Gly Gly Thr Ala Ala Phe Ala Ala
 145 150 155 160

50 Ala Arg Ser Ile Arg Ala Arg Asp Pro Gly Ala Arg Val Leu Ile Val
 165 170 175

55 Ser Glu Asp Pro Glu Leu Pro Tyr Met Arg Pro Pro Leu Ser Lys Glu
 180 185 190

Leu Trp Phe Ser Asp Asp Pro Asn Val Thr Lys Thr Leu Arg Phe Lys
 195 200 205

60

65

ES 2 274 656 T3

	Gln Trp Asn Gly Lys Glu Arg Ser Ile Tyr Phe Gln Pro Pro Ser Phe	
	210	215 220
5	Tyr Val Ser Ala Gln Asp Leu Pro His Ile Glu Asn Gly Gly Val Ala	
	225	230 235 240
	Val Leu Thr Gly Lys Lys Val Val Gln Leu Asp Val Arg Asp Asn Met	
10		245 250 255
	Val Lys Leu Asn Asp Gly Ser Gln Ile Thr Tyr Glu Lys Cys Leu Ile	
		260 265 270
15	Ala Thr Gly Gly Thr Pro Arg Ser Leu Ser Ala Ile Asp Arg Ala Gly	
		275 280 285
	Ala Glu Val Lys Ser Arg Thr Thr Leu Phe Arg Lys Ile Gly Asp Phe	
20		290 295 300
	Arg Ser Leu Glu Lys Ile Ser Arg Glu Val Lys Ser Ile Thr Ile Ile	
		305 310 315 320
25	Gly Gly Gly Phe Leu Gly Ser Glu Leu Ala Cys Ala Leu Gly Arg Lys	
		325 330 335
	Ala Arg Ala Leu Gly Thr Glu Val Ile Gln Leu Phe Pro Glu Lys Gly	
30		340 345 350
	Asn Met Gly Lys Ile Leu Pro Glu Tyr Leu Ser Asn Trp Thr Met Glu	
		355 360 365
35	Lys Val Arg Arg Glu Gly Val Lys Val Met Pro Asn Ala Ile Val Gln	
		370 375 380
	Ser Val Gly Val Ser Ser Gly Lys Leu Leu Ile Lys Leu Lys Asp Gly	
40		385 390 395 400
	Arg Lys Val Glu Thr Asp His Ile Val Ala Ala Val Gly Leu Glu Pro	
		405 410 415
45	Asn Val Glu Leu Ala Lys Thr Gly Gly Leu Glu Ile Asp Ser Asp Phe	
		420 425 430
	Gly Gly Phe Arg Val Asn Ala Glu Leu Gln Ala Arg Ser Asn Ile Trp	
50		435 440 445
	Val Ala Gly Asp Ala Ala Cys Phe Tyr Asp Ile Lys Leu Gly Arg Arg	
		450 455 460
55	Arg Val Glu His His Asp His Ala Val Val Ser Gly Arg Leu Ala Gly	
		465 470 475 480
	Glu Asn Met Thr Gly Ala Ala Lys Pro Tyr Trp His Gln Ser Met Phe	
60		485 490 495

ES 2 274 656 T3

Trp Ser Asp Leu Gly Pro Asp Val Gly Tyr Glu Ala Ile Gly Leu Val
 500 505 510
 Asp Ser Ser Leu Pro Thr Val Gly Val Phe Ala Lys Ala Thr Ala Gln
 515 520 525
 Asp Asn Pro Lys Ser Ala Thr Glu Gln Ser Gly Thr Gly Ile Arg Ser
 530 535 540
 Glu Ser Glu Thr Glu Ser Glu Ala Ser Glu Ile Thr Ile Pro Pro Ser
 545 550 555 560
 Thr Pro Ala Val Pro Gln Ala Pro Val Gln Gly Glu Asp Tyr Gly Lys
 565 570 575
 Gly Val Ile Phe Tyr Leu Arg Asp Lys Val Val Val Gly Ile Val Leu
 580 585 590
 Trp Asn Ile Phe Asn Arg Met Pro Ile Ala Arg Lys Ile Ile Lys Asp
 595 600 605
 Gly Glu Gln His Glu Asp Leu Asn Glu Val Ala Lys Leu Phe Asn Ile
 610 615 620
 His Glu Asp
 625
 <210> 9
 <211> 613
 <212> PRT
 <213> *Homo sapiens*
 <220>
 <223> factor inductor de apoptosis en humanos (hAIF); hAIF-Gold; polipéptido maduro
 <400> 9
 Met Phe Arg Cys Gly Gly Leu Ala Ala Gly Ala Leu Lys Gln Lys Leu
 1 5 10 15
 Val Pro Leu Val Arg Thr Val Cys Val Arg Ser Pro Arg Gln Arg Asn
 20 25 30
 Arg Leu Pro Gly Asn Leu Phe Gln Arg Trp His Val Pro Leu Glu Leu
 35 40 45
 Gln Met Thr Arg Gln Met Ala Ser Ser Gly Ala Ser Gly Gly Lys Ile
 50 55 60
 Asp Asn Ser Val Leu Val Leu Ile Val Gly Leu Ser Thr Val Gly Ala
 65 70 75 80
 Gly Ala Tyr Ala Tyr Lys Thr Met Lys Glu Asp Glu Lys Arg Tyr Asn
 85 90 95

ES 2 274 656 T3

	Glu Arg Ile Ser Gly Leu Gly Leu Thr Pro Glu Gln Lys Gln Lys Lys	
	100	105 110
5	Ala Ala Leu Ser Ala Ser Glu Gly Glu Glu Val Pro Gln Asp Lys Ala	
	115	120 125
10	Pro Ser His Val Pro Phe Leu Leu Ile Gly Gly Gly Thr Ala Ala Phe	
	130	135 140
	Ala Ala Ala Arg Ser Ile Arg Ala Arg Asp Pro Gly Ala Arg Val Leu	
	145	150 155 160
15	Ile Val Ser Glu Asp Pro Glu Leu Pro Tyr Met Arg Pro Pro Leu Ser	
	165	170 175
20	Lys Glu Leu Trp Phe Ser Asp Asp Pro Asn Val Thr Lys Thr Leu Arg	
	180	185 190
	Phe Lys Gln Trp Asn Gly Lys Glu Arg Ser Ile Tyr Phe Gln Pro Pro	
	195	200 205
25	Ser Phe Tyr Val Ser Ala Gln Asp Leu Pro His Ile Glu Asn Gly Gly	
	210	215 220
30	Val Ala Val Leu Thr Gly Lys Lys Val Val Gln Leu Asp Val Arg Asp	
	225	230 235 240
	Asn Met Val Lys Leu Asn Asp Gly Ser Gln Ile Thr Tyr Glu Lys Cys	
	245	250 255
35	Leu Ile Ala Thr Gly Gly Thr Pro Arg Ser Leu Ser Ala Ile Asp Arg	
	260	265 270
40	Ala Gly Ala Glu Val Lys Ser Arg Thr Thr Leu Phe Arg Lys Ile Gly	
	275	280 285
	Asp Phe Arg Ser Leu Glu Lys Ile Ser Arg Glu Val Lys Ser Ile Thr	
	290	295 300
45	Ile Ile Gly Gly Gly Phe Leu Gly Ser Glu Leu Ala Cys Ala Leu Gly	
	305	310 315 320
50	Arg Lys Ala Arg Ala Leu Gly Thr Glu Val Ile Gln Leu Phe Pro Glu	
	325	330 335
	Lys Gly Asn Met Gly Lys Ile Leu Pro Glu Tyr Leu Ser Asn Trp Thr	
	340	345 350
55	Met Glu Lys Val Arg Arg Glu Gly Val Lys Val Met Pro Asn Ala Ile	
	355	360 365
60	Val Gln Ser Val Gly Val Ser Ser Gly Lys Leu Leu Ile Lys Leu Lys	
	370	375 380

ES 2 274 656 T3

	Asp Gly Arg Lys Val Glu Thr Asp His Ile Val Ala Ala Val Gly Leu	385	390	395	400
5	Glu Pro Asn Val Glu Leu Ala Lys Thr Gly Gly Leu Glu Ile Asp Ser	405	410	415	
	Asp Phe Gly Gly Phe Arg Val Asn Ala Glu Leu Gln Ala Arg Ser Asn	420	425	430	
10	Ile Trp Val Ala Gly Asp Ala Ala Cys Phe Tyr Asp Ile Lys Leu Gly	435	440	445	
15	Arg Arg Arg Val Glu His His Asp His Ala Val Val Ser Gly Arg Leu	450	455	460	
	Ala Gly Glu Asn Met Thr Gly Ala Ala Lys Pro Tyr Trp His Gln Ser	465	470	475	480
20	Met Phe Trp Ser Asp Leu Gly Pro Asp Val Gly Tyr Glu Ala Ile Gly	485	490	495	
25	Leu Val Asp Ser Ser Leu Pro Thr Val Gly Val Phe Ala Lys Ala Thr	500	505	510	
	Ala Gln Asp Asn Pro Lys Ser Ala Thr Glu Gln Ser Gly Thr Gly Ile	515	520	525	
30	Arg Ser Glu Ser Glu Thr Glu Ser Glu Ala Ser Glu Ile Thr Ile Pro	530	535	540	
35	Pro Ser Thr Pro Ala Val Pro Gln Ala Pro Val Gln Gly Glu Asp Tyr	545	550	555	560
	Gly Lys Gly Val Ile Phe Tyr Leu Arg Asp Lys Val Val Val Gly Ile	565	570	575	
40	Val Leu Trp Asn Ile Phe Asn Arg Met Pro Ile Ala Arg Lys Ile Ile	580	585	590	
45	Lys Asp Gly Glu Gln His Glu Asp Leu Asn Glu Val Ala Lys Leu Phe	595	600	605	
	Asn Ile His Glu Asp	610			

50 <210> 10
 <211> 1894
 <212> ADN
 55 <213> *Homo sapiens*

<220>
 <221> CDS
 60 <222> (1)..(1869)

<220>
 <223> factor inductor de apoptosis en humanos (isoforma hAIF # 1); hAIF-alt-exon-Gold
 65

ES 2 274 656 T3

<400> 10

5	aga gga aag gga agg agg agg tcc cga ata gcg gtc gcc gaa atg ttc	48
	Arg Gly Lys Gly Arg Arg Arg Ser Arg Ile Ala Val Ala Glu Met Phe	
	1 5 10 15	
10	cgg tgt gga ggc ctg gcg gcg ggt gct ttg aag cag aag ctg gtg ccc	96
	Arg Cys Gly Gly Leu Ala Ala Gly Ala Leu Lys Gln Lys Leu Val Pro	
	20 25 30	
15	ttg gtg cgg acc gtg tgc gtc cga agc ccg agg cag agg aac cgg ctc	144
	Leu Val Arg Thr Val Cys Val Arg Ser Pro Arg Gln Arg Asn Arg Leu	
	35 40 45	
20	cca gtt gtg cag tct cat cac cta gga tcc cct tct aga tca cta gca	192
	Pro Val Val Gln Ser His His Leu Gly Ser Pro Ser Arg Ser Leu Ala	
	50 55 60	
25	tct aca ggt gct tct ggg aaa gat ggc agc aac cta gtg tac ttc tta	240
	Ser Thr Gly Ala Ser Gly Lys Asp Gly Ser Asn Leu Val Tyr Phe Leu	
	65 70 75 80	
30	att gta gga gca aca gtc act ggg gca gga gtt tat tat gcc tac aag	288
	Ile Val Gly Ala Thr Val Thr Gly Ala Gly Val Tyr Tyr Ala Tyr Lys	
	85 90 95	
35	act atg aaa gag gac gaa aaa aga tac aat gaa aga att tca ggg tta	336
	Thr Met Lys Glu Asp Glu Lys Arg Tyr Asn Glu Arg Ile Ser Gly Leu	
	100 105 110	
40	ggg ctg aca cca gaa cag aaa cag aaa aag gcc gcg tta tct gct tca	384
	Gly Leu Thr Pro Glu Gln Lys Gln Lys Lys Ala Ala Leu Ser Ala Ser	
	115 120 125	
45	gaa gga gag gaa gtt cct caa gac aag gcg cca agt cat gtt cct ttc	432
	Glu Gly Glu Glu Val Pro Gln Asp Lys Ala Pro Ser His Val Pro Phe	
	130 135 140	
50	ctg cta att ggt gga ggc aca gct gct ttt gct gca gcc aga tcc atc	480
	Leu Leu Ile Gly Gly Gly Thr Ala Ala Phe Ala Ala Ala Arg Ser Ile	
	145 150 155 160	
55	cgg gct cgg gat cct ggg gcc agg gta ctg att gta tct gaa gat cct	528
	Arg Ala Arg Asp Pro Gly Ala Arg Val Leu Ile Val Ser Glu Asp Pro	
	165 170 175	
60	gag ctg ccg tac atg cga cct cct ctt tca aaa gaa ctg tgg ttt tca	576
	Glu Leu Pro Tyr Met Arg Pro Pro Leu Ser Lys Glu Leu Trp Phe Ser	
	180 185 190	

ES 2 274 656 T3

5	gat gac cca aat gtc aca aag aca ctg cga ttc aaa cag tgg aat gga Asp Asp Pro Asn Val Thr Lys Thr Leu Arg Phe Lys Gln Trp Asn Gly 195 200 205	624
10	aaa gag aga agc ata tat ttc cag cca cct tct ttc tat gtc tct gct Lys Glu Arg Ser Ile Tyr Phe Gln Pro Pro Ser Phe Tyr Val Ser Ala 210 215 220	672
15	cag gac ctg cct cat att gag aat ggt ggt gtg gct gtc ctc act ggg Gln Asp Leu Pro His Ile Glu Asn Gly Gly Val Ala Val Leu Thr Gly 225 230 235 240	720
20	aag aag gta gta cag ctg gat gtg aga gac aac atg gtg aaa ctt aat Lys Lys Val Val Gln Leu Asp Val Arg Asp Asn Met Val Lys Leu Asn 245 250 255	768
25	gat ggc tct caa ata acc tat gaa aag tgc ttg att gca aca gga ggt Asp Gly Ser Gln Ile Thr Tyr Glu Lys Cys Leu Ile Ala Thr Gly Gly 260 265 270	816
30	act cca aga agt ctg tct gcc att gat agg gct gga gca gag gtg aag Thr Pro Arg Ser Leu Ser Ala Ile Asp Arg Ala Gly Ala Glu Val Lys 275 280 285	864
35	agt aga aca acg ctt ttc aga aag att gga gac ttt aga agc ttg gag Ser Arg Thr Thr Leu Phe Arg Lys Ile Gly Asp Phe Arg Ser Leu Glu 290 295 300	912
40	aag att tca cgg gaa gtc aaa tca att acg att atc ggt ggg ggc ttc Lys Ile Ser Arg Glu Val Lys Ser Ile Thr Ile Ile Gly Gly Gly Phe 305 310 315 320	960
45	ctt ggt agc gaa ctg gcc tgt gct ctt ggc aga aag gct cga gcc ttg Leu Gly Ser Glu Leu Ala Cys Ala Leu Gly Arg Lys Ala Arg Ala Leu 325 330 335	1008
50	ggc aca gaa gtg att caa ctc ttc ccc gag aaa gga aat atg gga aag Gly Thr Glu Val Ile Gln Leu Phe Pro Glu Lys Gly Asn Met Gly Lys 340 345 350	1056
55	atc ctc ccc gaa tac ctc agc aac tgg acc atg gaa aaa gtc aga cga Ile Leu Pro Glu Tyr Leu Ser Asn Trp Thr Met Glu Lys Val Arg Arg 355 360 365	1104
60	gag ggg gtt aag gtg atg ccc aat gct att gtg caa tcc gtt gga gtc Glu Gly Val Lys Val Met Pro Asn Ala Ile Val Gln Ser Val Gly Val 370 375 380	1152
65	agc agt ggc aag tta ctt atc aag ctg aaa gac ggc agg aag gta gaa Ser Ser Gly Lys Leu Leu Ile Lys Leu Lys Asp Gly Arg Lys Val Glu 385 390 395 400	1200
	act gac cac ata gtg gca gct gtg ggc ctg gag ccc aat gtt gag ttg Thr Asp His Ile Val Ala Ala Val Gly Leu Glu Pro Asn Val Glu Leu 405 410 415	1248

ES 2 274 656 T3

	gcc aag act ggt ggc ctg gaa ata gac tca gat ttt ggt ggc ttc cgg	1296
	Ala Lys Thr Gly Gly Leu Glu Ile Asp Ser Asp Phe Gly Gly Phe Arg	
	420 425 430	
5	gta aat gca gag cta caa gca cgc tct aac atc tgg gtg gca gga gat	1344
	Val Asn Ala Glu Leu Gln Ala Arg Ser Asn Ile Trp Val Ala Gly Asp	
	435 440 445	
10	gct gca tgc ttc tac gat ata aag ttg gga agg agg cgg gta gag cac	1392
	Ala Ala Cys Phe Tyr Asp Ile Lys Leu Gly Arg Arg Arg Val Glu His	
	450 455 460	
15	cat gat cac gct gtt gtg agt gga aga ttg gct gga gaa aat atg act	1440
	His Asp His Ala Val Val Ser Gly Arg Leu Ala Gly Glu Asn Met Thr	
	465 470 475 480	
20	gga gct gct aag ccg tac tgg cat cag tca atg ttc tgg agt gat ttg	1488
	Gly Ala Ala Lys Pro Tyr Trp His Gln Ser Met Phe Trp Ser Asp Leu	
	485 490 495	
25	ggc ccc gat gtt ggc tat gaa gct att ggt ctt gtg gac agt agt ttg	1536
	Gly Pro Asp Val Gly Tyr Glu Ala Ile Gly Leu Val Asp Ser Ser Leu	
	500 505 510	
30	ccc aca gtt ggt gtt ttt gca aaa gca act gca caa gac aac ccc aaa	1584
	Pro Thr Val Gly Val Phe Ala Lys Ala Thr Ala Gln Asp Asn Pro Lys	
	515 520 525	
35	tct gcc aca gag cag tca gga act ggt atc cga tca gag agt gag aca	1632
	Ser Ala Thr Glu Gln Ser Gly Thr Gly Ile Arg Ser Glu Ser Glu Thr	
	530 535 540	
40	gag tcc gag gcc tca gaa att act att cct ccc agc acc ccg gca gtt	1680
	Glu Ser Glu Ala Ser Glu Ile Thr Ile Pro Pro Ser Thr Pro Ala Val	
	545 550 555 560	
45	cca cag gct ccc gtc cag ggg gag gac tac ggc aaa ggt gtc atc ttc	1728
	Pro Gln Ala Pro Val Gln Gly Glu Asp Tyr Gly Lys Gly Val Ile Phe	
	565 570 575	
50	tac ctc agg gac aaa gtg gtc gtg ggg att gtg cta tgg aac atc ttt	1776
	Tyr Leu Arg Asp Lys Val Val Val Gly Ile Val Leu Trp Asn Ile Phe	
	580 585 590	
55	aac cga atg cca ata gca agg aag atc att aag gac ggt gag cag cat	1824
	Asn Arg Met Pro Ile Ala Arg Lys Ile Ile Lys Asp Gly Glu Gln His	
	595 600 605	
60	gaa gat ctc aat gaa gta gcc aaa cta ttc aac att cat gaa gac	1869
	Glu Asp Leu Asn Glu Val Ala Lys Leu Phe Asn Ile His Glu Asp	
	610 615 620	
60	tgaagcccca cagtggaatt ggcaa	1894

<210> 11

<211> 623

65 <212> PRT

<213> *Homo sapiens*

ES 2 274 656 T3

<400> 11

5	Arg Gly Lys Gly Arg Arg Arg Ser Arg Ile Ala Val Ala Glu Met Phe	1 5 10 15
10	Arg Cys Gly Gly Leu Ala Ala Gly Ala Leu Lys Gln Lys Leu Val Pro	20 25 30
15	Leu Val Arg Thr Val Cys Val Arg Ser Pro Arg Gln Arg Asn Arg Leu	35 40 45
20	Pro Val Val Gln Ser His His Leu Gly Ser Pro Ser Arg Ser Leu Ala	50 55 60
25	Ser Thr Gly Ala Ser Gly Lys Asp Gly Ser Asn Leu Val Tyr Phe Leu	65 70 75 80
30	Ile Val Gly Ala Thr Val Thr Gly Ala Gly Val Tyr Tyr Ala Tyr Lys	85 90 95
35	Thr Met Lys Glu Asp Glu Lys Arg Tyr Asn Glu Arg Ile Ser Gly Leu	100 105 110
40	Gly Leu Thr Pro Glu Gln Lys Gln Lys Lys Ala Ala Leu Ser Ala Ser	115 120 125
45	Glu Gly Glu Glu Val Pro Gln Asp Lys Ala Pro Ser His Val Pro Phe	130 135 140
50	Leu Leu Ile Gly Gly Gly Thr Ala Ala Phe Ala Ala Ala Arg Ser Ile	145 150 155 160
55	Arg Ala Arg Asp Pro Gly Ala Arg Val Leu Ile Val Ser Glu Asp Pro	165 170 175
60	Glu Leu Pro Tyr Met Arg Pro Pro Leu Ser Lys Glu Leu Trp Phe Ser	180 185 190
65	Asp Asp Pro Asn Val Thr Lys Thr Leu Arg Phe Lys Gln Trp Asn Gly	195 200 205
70	Lys Glu Arg Ser Ile Tyr Phe Gln Pro Pro Ser Phe Tyr Val Ser Ala	210 215 220
75	Gln Asp Leu Pro His Ile Glu Asn Gly Gly Val Ala Val Leu Thr Gly	225 230 235 240
80	Lys Lys Val Val Gln Leu Asp Val Arg Asp Asn Met Val Lys Leu Asn	245 250 255

ES 2 274 656 T3

	Asp Gly Ser Gln Ile Thr Tyr Glu Lys Cys Leu Ile Ala Thr Gly Gly	
	260	265 270
5	Thr Pro Arg Ser Leu Ser Ala Ile Asp Arg Ala Gly Ala Glu Val Lys	
	275	280 285
	Ser Arg Thr Thr Leu Phe Arg Lys Ile Gly Asp Phe Arg Ser Leu Glu	
10	290	295 300
	Lys Ile Ser Arg Glu Val Lys Ser Ile Thr Ile Ile Gly Gly Gly Phe	
	305	310 315 320
15	Leu Gly Ser Glu Leu Ala Cys Ala Leu Gly Arg Lys Ala Arg Ala Leu	
	325	330 335
	Gly Thr Glu Val Ile Gln Leu Phe Pro Glu Lys Gly Asn Met Gly Lys	
20	340	345 350
	Ile Leu Pro Glu Tyr Leu Ser Asn Trp Thr Met Glu Lys Val Arg Arg	
	355	360 365
25	Glu Gly Val Lys Val Met Pro Asn Ala Ile Val Gln Ser Val Gly Val	
	370	375 380
	Ser Ser Gly Lys Leu Leu Ile Lys Leu Lys Asp Gly Arg Lys Val Glu	
30	385	390 395 400
	Thr Asp His Ile Val Ala Ala Val Gly Leu Glu Pro Asn Val Glu Leu	
	405	410 415
35	Ala Lys Thr Gly Gly Leu Glu Ile Asp Ser Asp Phe Gly Gly Phe Arg	
	420	425 430
	Val Asn Ala Glu Leu Gln Ala Arg Ser Asn Ile Trp Val Ala Gly Asp	
40	435	440 445
	Ala Ala Cys Phe Tyr Asp Ile Lys Leu Gly Arg Arg Arg Val Glu His	
	450	455 460
45	His Asp His Ala Val Val Ser Gly Arg Leu Ala Gly Glu Asn Met Thr	
	465	470 475 480
	Gly Ala Ala Lys Pro Tyr Trp His Gln Ser Met Phe Trp Ser Asp Leu	
50	485	490 495
	Gly Pro Asp Val Gly Tyr Glu Ala Ile Gly Leu Val Asp Ser Ser Leu	
	500	505 510
55	Pro Thr Val Gly Val Phe Ala Lys Ala Thr Ala Gln Asp Asn Pro Lys	
	515	520 525
	Ser Ala Thr Glu Gln Ser Gly Thr Gly Ile Arg Ser Glu Ser Glu Thr	
60	530	535 540

65

ES 2 274 656 T3

Glu Ser Glu Ala Ser Glu Ile Thr Ile Pro Pro Ser Thr Pro Ala Val
 545 550 555 560
 5 Pro Gln Ala Pro Val Gln Gly Glu Asp Tyr Gly Lys Gly Val Ile Phe
 565 570 575
 Tyr Leu Arg Asp Lys Val Val Val Gly Ile Val Leu Trp Asn Ile Phe
 580 585 590
 10 Asn Arg Met Pro Ile Ala Arg Lys Ile Ile Lys Asp Gly Glu Gln His
 595 600 605
 15 Glu Asp Leu Asn Glu Val Ala Lys Leu Phe Asn Ile His Glu Asp
 610 615 620
 <210> 12
 <211> 609
 20 <212> PRT
 <213> *Homo sapiens*
 <220>
 25 <223> factor inductor de apoptosis en humanos (isofoma hIFA # 1); hAIF-alt-exon-Gold; pilipéptidos madura
 <400> 12
 30 Met Phe Arg Cys Gly Gly Leu Ala Ala Gly Ala Leu Lys Gln Lys Leu
 1 5 10 15
 Val Pro Leu Val Arg Thr Val Cys Val Arg Ser Pro Arg Gln Arg Asn
 20 25 30
 35 Arg Leu Pro Val Val Gln Ser His His Leu Gly Ser Pro Ser Arg Ser
 35 40 45
 40 Leu Ala Ser Thr Gly Ala Ser Gly Lys Asp Gly Ser Asn Leu Val Tyr
 50 55 60
 Phe Leu Ile Val Gly Ala Thr Val Thr Gly Ala Gly Val Tyr Tyr Ala
 65 70 75 80
 45 Tyr Lys Thr Met Lys Glu Asp Glu Lys Arg Tyr Asn Glu Arg Ile Ser
 85 90 95
 50 Gly Leu Gly Leu Thr Pro Glu Gln Lys Gln Lys Lys Ala Ala Leu Ser
 100 105 110
 Ala Ser Glu Gly Glu Glu Val Pro Gln Asp Lys Ala Pro Ser His Val
 115 120 125
 55 Pro Phe Leu Leu Ile Gly Gly Gly Thr Ala Ala Phe Ala Ala Ala Arg
 130 135 140
 60 Ser Ile Arg Ala Arg Asp Pro Gly Ala Arg Val Leu Ile Val Ser Glu
 145 150 155 160

65

ES 2 274 656 T3

	Asp	Pro	Glu	Leu	Pro	Tyr	Met	Arg	Pro	Pro	Leu	Ser	Lys	Glu	Leu	Trp	
					165					170					175		
5	Phe	Ser	Asp	Asp	Pro	Asn	Val	Thr	Lys	Thr	Leu	Arg	Phe	Lys	Gln	Trp	
				180					185					190			
10	Asn	Gly	Lys	Glu	Arg	Ser	Ile	Tyr	Phe	Gln	Pro	Pro	Ser	Phe	Tyr	Val	
			195					200					205				
	Ser	Ala	Gln	Asp	Leu	Pro	His	Ile	Glu	Asn	Gly	Gly	Val	Ala	Val	Leu	
		210					215					220					
15	Thr	Gly	Lys	Lys	Val	Val	Gln	Leu	Asp	Val	Arg	Asp	Asn	Met	Val	Lys	
	225					230					235					240	
20	Leu	Asn	Asp	Gly	Ser	Gln	Ile	Thr	Tyr	Glu	Lys	Cys	Leu	Ile	Ala	Thr	
					245					250					255		
	Gly	Gly	Thr	Pro	Arg	Ser	Leu	Ser	Ala	Ile	Asp	Arg	Ala	Gly	Ala	Glu	
				260					265					270			
25	Val	Lys	Ser	Arg	Thr	Thr	Leu	Phe	Arg	Lys	Ile	Gly	Asp	Phe	Arg	Ser	
			275					280					285				
30	Leu	Glu	Lys	Ile	Ser	Arg	Glu	Val	Lys	Ser	Ile	Thr	Ile	Ile	Gly	Gly	
		290					295					300					
	Gly	Phe	Leu	Gly	Ser	Glu	Leu	Ala	Cys	Ala	Leu	Gly	Arg	Lys	Ala	Arg	
	305					310					315					320	
35	Ala	Leu	Gly	Thr	Glu	Val	Ile	Gln	Leu	Phe	Pro	Glu	Lys	Gly	Asn	Met	
					325					330					335		
40	Gly	Lys	Ile	Leu	Pro	Glu	Tyr	Leu	Ser	Asn	Trp	Thr	Met	Glu	Lys	Val	
				340					345					350			
	Arg	Arg	Glu	Gly	Val	Lys	Val	Met	Pro	Asn	Ala	Ile	Val	Gln	Ser	Val	
			355					360					365				
45	Gly	Val	Ser	Ser	Gly	Lys	Leu	Leu	Ile	Lys	Leu	Lys	Asp	Gly	Arg	Lys	
		370				375						380					
50	Val	Glu	Thr	Asp	His	Ile	Val	Ala	Ala	Val	Gly	Leu	Glu	Pro	Asn	Val	
	385					390					395					400	
	Glu	Leu	Ala	Lys	Thr	Gly	Gly	Leu	Glu	Ile	Asp	Ser	Asp	Phe	Gly	Gly	
					405					410					415		
55	Phe	Arg	Val	Asn	Ala	Glu	Leu	Gln	Ala	Arg	Ser	Asn	Ile	Trp	Val	Ala	
				420					425					430			
60	Gly	Asp	Ala	Ala	Cys	Phe	Tyr	Asp	Ile	Lys	Leu	Gly	Arg	Arg	Arg	Val	
			435					440					445				

ES 2 274 656 T3

Glu His His Asp His Ala Val Val Ser Gly Arg Leu Ala Gly Glu Asn
 450 455 460
 5 Met Thr Gly Ala Ala Lys Pro Tyr Trp His Gln Ser Met Phe Trp Ser
 465 470 475 480
 10 Asp Leu Gly Pro Asp Val Gly Tyr Glu Ala Ile Gly Leu Val Asp Ser
 485 490 495
 15 Ser Leu Pro Thr Val Gly Val Phe Ala Lys Ala Thr Ala Gln Asp Asn
 500 505 510
 20 Pro Lys Ser Ala Thr Glu Gln Ser Gly Thr Gly Ile Arg Ser Glu Ser
 515 520 525
 25 Glu Thr Glu Ser Glu Ala Ser Glu Ile Thr Ile Pro Pro Ser Thr Pro
 530 535 540
 30 Ala Val Pro Gln Ala Pro Val Gln Gly Glu Asp Tyr Gly Lys Gly Val
 545 550 555 560
 35 Ile Phe Tyr Leu Arg Asp Lys Val Val Val Gly Ile Val Leu Trp Asn
 565 570 575
 40 Ile Phe Asn Arg Met Pro Ile Ala Arg Lys Ile Ile Lys Asp Gly Glu
 580 585 590
 45 Gln His Glu Asp Leu Asn Glu Val Ala Lys Leu Phe Asn Ile His Glu
 595 600 605
 50 Asp
 <210> 13
 <211> 1762
 <212> ADN
 <213> *Homo sapiens*
 <220>
 <221> CDS
 <222> (79)..(1737)
 <220>
 <223> factor inductor de apoptosis en humanos (isoforma hAIF #2); hAIF-exon-skip-Gold
 <400> 13
 gaggaaaggg aaggaggagg tcccgaatag cggtcgccga aatgttccgg tgtggaggcc 60
 55
 tggcggcggg tgctttga agc aga agc tgg tgc cct tgg tgc gga ccg tgt 111
 Ser Arg Ser Trp Cys Pro Trp Cys Gly Pro Cys
 1 5 10
 60
 65

ES 2 274 656 T3

	gcg tcc gaa gcc cga ggc aga gga acc ggc tcc cag gcc tac aag act	159
	Ala Ser Glu Ala Arg Gly Arg Gly Thr Gly Ser Gln Ala Tyr Lys Thr	
	15 20 25	
5	atg aaa gag gac gaa aaa aga tac aat gaa aga att tca ggg tta ggg	207
	Met Lys Glu Asp Glu Lys Arg Tyr Asn Glu Arg Ile Ser Gly Leu Gly	
	30 35 40	
10	ctg aca cca gaa cag aaa cag aaa aag gcc gcg tta tct gct tca gaa	255
	Leu Thr Pro Glu Gln Lys Gln Lys Lys Ala Ala Leu Ser Ala Ser Glu	
	45 50 55	
15	gga gag gaa gtt cct caa gac aag gcg cca agt cat gtt cct ttc ctg	303
	Gly Glu Glu Val Pro Gln Asp Lys Ala Pro Ser His Val Pro Phe Leu	
	60 65 70 75	
20	cta att ggt gga ggc aca gct gct ttt gct gca gcc aga tcc atc cgg	351
	Leu Ile Gly Gly Gly Thr Ala Ala Phe Ala Ala Ala Arg Ser Ile Arg	
	80 85 90	
25	gct cgg gat cct ggg gcc agg gta ctg att gta tct gaa gat cct gag	399
	Ala Arg Asp Pro Gly Ala Arg Val Leu Ile Val Ser Glu Asp Pro Glu	
	95 100 105	
30	ctg ccg tac atg cga cct cct ctt tca aaa gaa ctg tgg ttt tca gat	447
	Leu Pro Tyr Met Arg Pro Pro Leu Ser Lys Glu Leu Trp Phe Ser Asp	
	110 115 120	
35	gac cca aat gtc aca aag aca ctg cga ttc aaa cag tgg aat gga aaa	495
	Asp Pro Asn Val Thr Lys Thr Leu Arg Phe Lys Gln Trp Asn Gly Lys	
	125 130 135	
40	gag aga agc ata tat ttc cag cca cct tct ttc tat gtc tct gct cag	543
	Glu Arg Ser Ile Tyr Phe Gln Pro Pro Ser Phe Tyr Val Ser Ala Glu	
	140 145 150 155	
45	gac ctg cct cat att gag aat ggt ggt gtg gct gtc ctc act ggg aag	591
	Asp Leu Pro His Ile Glu Asn Gly Gly Val Ala Val Leu Thr Gly Lys	
	160 165 170	
50	aag gta gta cag ctg gat gtg aga gac aac atg gtg aaa ctt aat gat	639
	Lys Val Val Gln Leu Asp Val Arg Asp Asn Met Val Lys Leu Asn Asp	
	175 180 185	
55	ggc tct caa ata acc tat gaa aag tgc ttg att gca aca gga ggt act	687
	Gly Ser Gln Ile Thr Tyr Glu Lys Cys Leu Ile Ala Thr Gly Gly Thr	
	190 195 200	
60	cca aga agt ctg tct gcc att gat agg gct gga gca gag gtg aag agt	735
	Pro Arg Ser Leu Ser Ala Ile Asp Arg Ala Gly Ala Glu Val Lys Ser	
	205 210 215	
65	aga aca acg ctt ttc aga aag att gga gac ttt aga agc ttg gag aag	783
	Arg Thr Thr Leu Phe Arg Lys Ile Gly Asp Phe Arg Ser Leu Glu Lys	
	220 225 230 235	

ES 2 274 656 T3

	att tca cgg gaa gtc aaa tca att acg att atc ggt ggg ggc ttc ctt	831
	Ile Ser Arg Glu Val Lys Ser Ile Thr Ile Ile Gly Gly Gly Phe Leu	
	240 245 250	
5	ggt agc gaa ctg gcc tgt gct ctt ggc aga aag gct cga gcc ttg ggc	879
	Gly Ser Glu Leu Ala Cys Ala Leu Gly Arg Lys Ala Arg Ala Leu Gly	
	255 260 265	
10	aca gaa gtg att caa ctc ttc ccc gag aaa gga aat atg gga aag atc	927
	Thr Glu Val Ile Gln Leu Phe Pro Glu Lys Gly Asn Met Gly Lys Ile	
	270 275 280	
15	ctc ccc gaa tac ctc agc aac tgg acc atg gaa aaa gtc aga cga gag	975
	Leu Pro Glu Tyr Leu Ser Asn Trp Thr Met Glu Lys Val Arg Arg Glu	
	285 290 295	
20	ggg gtt aag gtg atg ccc aat gct att gtg caa tcc gtt gga gtc agc	1023
	Gly Val Lys Val Met Pro Asn Ala Ile Val Gln Ser Val Gly Val Ser	
	300 305 310 315	
25	agt ggc aag tta ctt atc aag ctg aaa gac ggc agg aag gta gaa act	1071
	Ser Gly Lys Leu Leu Ile Lys Leu Lys Asp Gly Arg Lys Val Glu Thr	
	320 325 330	
30	gac cac ata gtg gca gct gtg ggc ctg gag ccc aat gtt gag ttg gcc	1119
	Asp His Ile Val Ala Ala Val Gly Leu Glu Pro Asn Val Glu Leu Ala	
	335 340 345	
35	aag act ggt ggc ctg gaa ata gac tca gat ttt ggt ggc ttc cgg gta	1167
	Lys Thr Gly Gly Leu Glu Ile Asp Ser Asp Phe Gly Gly Phe Arg Val	
	350 355 360	
40	aat gca gag cta caa gca cgc tct aac atc tgg gtg gca gga gat gct	1215
	Asn Ala Glu Leu Gln Ala Arg Ser Asn Ile Trp Val Ala Gly Asp Ala	
	365 370 375	
45	gca tgc ttc tac gat ata aag ttg gga agg agg cgg gta gag cac cat	1263
	Ala Cys Phe Tyr Asp Ile Lys Leu Gly Arg Arg Arg Val Glu His His	
	380 385 390 395	
50	gat cac gct gtt gtg agt gga aga ttg gct gga gaa aat atg act gga	1311
	Asp His Ala Val Val Ser Gly Arg Leu Ala Gly Glu Asn Met Thr Gly	
	400 405 410	
55	gct gct aag ccg tac tgg cat cag tca atg ttc tgg agt gat ttg ggc	1359
	Ala Ala Lys Pro Tyr Trp His Gln Ser Met Phe Trp Ser Asp Leu Gly	
	415 420 425	
60	ccc gat gtt ggc tat gaa gct att ggt ctt gtg gac agt agt ttg ccc	1407
	Pro Asp Val Gly Tyr Glu Ala Ile Gly Leu Val Asp Ser Ser Leu Pro	
	430 435 440	
65	aca gtt ggt gtt ttt gca aaa gca act gca caa gac aac ccc aaa tct	1455
	Thr Val Gly Val Phe Ala Lys Ala Thr Ala Gln Asp Asn Pro Lys Ser	
	445 450 455	

ES 2 274 656 T3

```

gcc aca gag cag tca gga act ggt atc cga tca gag agt gag aca gag 1503
Ala Thr Glu Gln Ser Gly Thr Gly Ile Arg Ser Glu Ser Glu Thr Glu
460                      465                      470                      475

5
tcc gag gcc tca gaa att act att cct ccc agc acc ccg gca gtt cca 1551
Ser Glu Ala Ser Glu Ile Thr Ile Pro Pro Ser Thr Pro Ala Val Pro
                      480                      485                      490

10
cag gct ccc gtc cag ggg gag gac tac ggc aaa ggt gtc atc ttc tac 1599
Gln Ala Pro Val Gln Gly Glu Asp Tyr Gly Lys Gly Val Ile Phe Tyr
                      495                      500                      505

15
ctc agg gac aaa gtg gtc gtg ggg att gtg cta tgg aac atc ttt aac 1647
Leu Arg Asp Lys Val Val Val Gly Ile Val Leu Trp Asn Ile Phe Asn
                      510                      515                      520

20
cga atg cca ata gca agg aag atc att aag gac ggt gag cag cat gaa 1695
Arg Met Pro Ile Ala Arg Lys Ile Ile Lys Asp Gly Glu Gln His Glu
                      525                      530                      535

25
gat ctc aat gaa gta gcc aaa cta ttc aac att cat gaa gac 1737
Asp Leu Asn Glu Val Ala Lys Leu Phe Asn Ile His Glu Asp
540                      545                      550

tgaagcccca cagtggaatt ggcaa 1762

30 <210> 14
    <211> 553
    <212> PRT
35 <213> Homo sapiens

    <400> 14

Ser Arg Ser Trp Cys Pro Trp Cys Gly Pro Cys Ala Ser Glu Ala Arg
40 1 5 10 15

Gly Arg Gly Thr Gly Ser Gln Ala Tyr Lys Thr Met Lys Glu Asp Glu
20 25 30

45 Lys Arg Tyr Asn Glu Arg Ile Ser Gly Leu Gly Leu Thr Pro Glu Gln
35 40 45

Lys Gln Lys Lys Ala Ala Leu Ser Ala Ser Glu Gly Glu Glu Val Pro
50 50 55 60

Gln Asp Lys Ala Pro Ser His Val Pro Phe Leu Leu Ile Gly Gly Gly
65 70 75 80

55 Thr Ala Ala Phe Ala Ala Ala Arg Ser Ile Arg Ala Arg Asp Pro Gly
85 90 95

Ala Arg Val Leu Ile Val Ser Glu Asp Pro Glu Leu Pro Tyr Met Arg
60 100 105 110

```

65

ES 2 274 656 T3

	Pro	Pro	Leu	Ser	Lys	Glu	Leu	Trp	Phe	Ser	Asp	Asp	Pro	Asn	Val	Thr	
			115					120					125				
5	Lys	Thr	Leu	Arg	Phe	Lys	Gln	Trp	Asn	Gly	Lys	Glu	Arg	Ser	Ile	Tyr	
		130					135					140					
	Phe	Gln	Pro	Pro	Ser	Phe	Tyr	Val	Ser	Ala	Gln	Asp	Leu	Pro	His	Ile	
10	145					150					155					160	
	Glu	Asn	Gly	Gly	Val	Ala	Val	Leu	Thr	Gly	Lys	Lys	Val	Val	Gln	Leu	
					165					170					175		
15	Asp	Val	Arg	Asp	Asn	Met	Val	Lys	Leu	Asn	Asp	Gly	Ser	Gln	Ile	Thr	
				180					185					190			
	Tyr	Glu	Lys	Cys	Leu	Ile	Ala	Thr	Gly	Gly	Thr	Pro	Arg	Ser	Leu	Ser	
20		195						200					205				
	Ala	Ile	Asp	Arg	Ala	Gly	Ala	Glu	Val	Lys	Ser	Arg	Thr	Thr	Leu	Phe	
		210					215					220					
25	Arg	Lys	Ile	Gly	Asp	Phe	Arg	Ser	Leu	Glu	Lys	Ile	Ser	Arg	Glu	Val	
	225					230					235					240	
	Lys	Ser	Ile	Thr	Ile	Ile	Gly	Gly	Gly	Phe	Leu	Gly	Ser	Glu	Leu	Ala	
30					245					250					255		
	Cys	Ala	Leu	Gly	Arg	Lys	Ala	Arg	Ala	Leu	Gly	Thr	Glu	Val	Ile	Gln	
				260					265					270			
35	Leu	Phe	Pro	Glu	Lys	Gly	Asn	Met	Gly	Lys	Ile	Leu	Pro	Glu	Tyr	Leu	
		275						280						285			
	Ser	Asn	Trp	Thr	Met	Glu	Lys	Val	Arg	Arg	Glu	Gly	Val	Lys	Val	Met	
40		290					295					300					
	Pro	Asn	Ala	Ile	Val	Gln	Ser	Val	Gly	Val	Ser	Ser	Gly	Lys	Leu	Leu	
	305					310					315					320	
45	Ile	Lys	Leu	Lys	Asp	Gly	Arg	Lys	Val	Glu	Thr	Asp	His	Ile	Val	Ala	
					325					330					335		
	Ala	Val	Gly	Leu	Glu	Pro	Asn	Val	Glu	Leu	Ala	Lys	Thr	Gly	Gly	Leu	
50				340					345					350			
	Glu	Ile	Asp	Ser	Asp	Phe	Gly	Gly	Phe	Arg	Val	Asn	Ala	Glu	Leu	Gln	
		355						360					365				
55	Ala	Arg	Ser	Asn	Ile	Trp	Val	Ala	Gly	Asp	Ala	Ala	Cys	Phe	Tyr	Asp	
		370					375					380					
	Ile	Lys	Leu	Gly	Arg	Arg	Arg	Val	Glu	His	His	Asp	His	Ala	Val	Val	
60		385				390					395					400	

ES 2 274 656 T3

Ser Gly Arg Leu Ala Gly Glu Asn Met Thr Gly Ala Ala Lys Pro Tyr
 405 410 415
 5 Trp His Gln Ser Met Phe Trp Ser Asp Leu Gly Pro Asp Val Gly Tyr
 420 425 430
 Glu Ala Ile Gly Leu Val Asp Ser Ser Leu Pro Thr Val Gly Val Phe
 435 440 445
 10 Ala Lys Ala Thr Ala Gln Asp Asn Pro Lys Ser Ala Thr Glu Gln Ser
 450 455 460
 15 Gly Thr Gly Ile Arg Ser Glu Ser Glu Thr Glu Ser Glu Ala Ser Glu
 465 470 475 480
 Ile Thr Ile Pro Pro Ser Thr Pro Ala Val Pro Gln Ala Pro Val Gln
 485 490 495
 20 Gly Glu Asp Tyr Gly Lys Gly Val Ile Phe Tyr Leu Arg Asp Lys Val
 500 505 510
 Val Val Gly Ile Val Leu Trp Asn Ile Phe Asn Arg Met Pro Ile Ala
 515 520 525
 25 Arg Lys Ile Ile Lys Asp Gly Glu Gln His Glu Asp Leu Asn Glu Val
 530 535 540
 30 Ala Lys Leu Phe Asn Ile His Glu Asp
 545 550
 <210> 15
 <211> 526
 35 <212> PRT
 <213> *Homo sapiens*
 40 <220>
 <223> factor inductor de apoptosis (isoforma hAIF #2); hAIF-exon-skip-Gold; polipéptido maduro
 <400> 15
 45 Met Lys Glu Asp Glu Lys Arg Tyr Asn Glu Arg Ile Ser Gly Leu Gly
 1 5 10 15
 Leu Thr Pro Glu Gln Lys Gln Lys Lys Ala Ala Leu Ser Ala Ser Glu
 50 20 25 30
 Gly Glu Glu Val Pro Gln Asp Lys Ala Pro Ser His Val Pro Phe Leu
 35 40 45
 55 Leu Ile Gly Gly Gly Thr Ala Ala Phe Ala Ala Ala Arg Ser Ile Arg
 50 55 60
 60 Ala Arg Asp Pro Gly Ala Arg Val Leu Ile Val Ser Glu Asp Pro Glu
 65 70 75 80

ES 2 274 656 T3

	Leu	Pro	Tyr	Met	Arg	Pro	Pro	Leu	Ser	Lys	Glu	Leu	Trp	Phe	Ser	Asp	
					85					90						95	
5	Asp	Pro	Asn	Val	Thr	Lys	Thr	Leu	Arg	Phe	Lys	Gln	Trp	Asn	Gly	Lys	
				100					105					110			
10	Glu	Arg	Ser	Ile	Tyr	Phe	Gln	Pro	Pro	Ser	Phe	Tyr	Val	Ser	Ala	Gln	
			115					120					125				
	Asp	Leu	Pro	His	Ile	Glu	Asn	Gly	Gly	Val	Ala	Val	Leu	Thr	Gly	Lys	
		130					135					140					
15	Lys	Val	Val	Gln	Leu	Asp	Val	Arg	Asp	Asn	Met	Val	Lys	Leu	Asn	Asp	
	145					150					155					160	
20	Gly	Ser	Gln	Ile	Thr	Tyr	Glu	Lys	Cys	Leu	Ile	Ala	Thr	Gly	Gly	Thr	
				165						170					175		
	Pro	Arg	Ser	Leu	Ser	Ala	Ile	Asp	Arg	Ala	Gly	Ala	Glu	Val	Lys	Ser	
				180					185						190		
25	Arg	Thr	Thr	Leu	Phe	Arg	Lys	Ile	Gly	Asp	Phe	Arg	Ser	Leu	Glu	Lys	
			195					200						205			
30	Ile	Ser	Arg	Glu	Val	Lys	Ser	Ile	Thr	Ile	Ile	Gly	Gly	Gly	Phe	Leu	
		210					215					220					
	Gly	Ser	Glu	Leu	Ala	Cys	Ala	Leu	Gly	Arg	Lys	Ala	Arg	Ala	Leu	Gly	
	225					230					235					240	
35	Thr	Glu	Val	Ile	Gln	Leu	Phe	Pro	Glu	Lys	Gly	Asn	Met	Gly	Lys	Ile	
				245						250					255		
40	Leu	Pro	Glu	Tyr	Leu	Ser	Asn	Trp	Thr	Met	Glu	Lys	Val	Arg	Arg	Glu	
			260						265						270		
	Gly	Val	Lys	Val	Met	Pro	Asn	Ala	Ile	Val	Gln	Ser	Val	Gly	Val	Ser	
			275					280						285			
45	Ser	Gly	Lys	Leu	Leu	Ile	Lys	Leu	Lys	Asp	Gly	Arg	Lys	Val	Glu	Thr	
		290					295					300					
50	Asp	His	Ile	Val	Ala	Ala	Val	Gly	Leu	Glu	Pro	Asn	Val	Glu	Leu	Ala	
	305					310					315					320	
	Lys	Thr	Gly	Gly	Leu	Glu	Ile	Asp	Ser	Asp	Phe	Gly	Gly	Phe	Arg	Val	
				325						330					335		
55	Asn	Ala	Glu	Leu	Gln	Ala	Arg	Ser	Asn	Ile	Trp	Val	Ala	Gly	Asp	Ala	
			340						345					350			
60	Ala	Cys	Phe	Tyr	Asp	Ile	Lys	Leu	Gly	Arg	Arg	Arg	Val	Glu	His	His	
		355						360						365			

ES 2 274 656 T3

	Asp His Ala Val Val Ser Gly Arg Leu Ala Gly Glu Asn Met Thr Gly	
	370 375 380	
5	Ala Ala Lys Pro Tyr Trp His Gln Ser Met Phe Trp Ser Asp Leu Gly	
	385 390 395 400	
	Pro Asp Val Gly Tyr Glu Ala Ile Gly Leu Val Asp Ser Ser Leu Pro	
	405 410 415	
10	Thr Val Gly Val Phe Ala Lys Ala Thr Ala Gln Asp Asn Pro Lys Ser	
	420 425 430	
	Ala Thr Glu Gln Ser Gly Thr Gly Ile Arg Ser Glu Ser Glu Thr Glu	
	435 440 445	
15	Ser Glu Ala Ser Glu Ile Thr Ile Pro Pro Ser Thr Pro Ala Val Pro	
	450 455 460	
	Gln Ala Pro Val Gln Gly Glu Asp Tyr Gly Lys Gly Val Ile Phe Tyr	
20	465 470 475 480	
	Leu Arg Asp Lys Val Val Val Gly Ile Val Leu Trp Asn Ile Phe Asn	
	485 490 495	
25	Arg Met Pro Ile Ala Arg Lys Ile Ile Lys Asp Gly Glu Gln His Glu	
	500 505 510	
	Asp Leu Asn Glu Val Ala Lys Leu Phe Asn Ile His Glu Asp	
	515 520 525	

30 <210> 16
 <211> 25
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial
 35 <220>
 <223> Descripción de la secuencia artificial: cebador

40 <400> 16

acggtgcgtg gaaggaaaag gaagg

25

45 <210> 17
 <211> 25
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial
 50 <220>
 <223> Descripción de la secuencia artificial: cebador

55 <400> 17

cgccagggat ggaaaagtgc ttgtg

25

60 <210> 18
 <211> 23
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial
 65 <220>

ES 2 274 656 T3

	<223> Descripció de la secuencia artificial: cebador	
	<400> 18	
5	tcagttcctc agatcagggc acc	23
	<219> 19	
10	<211> 23	
	<212> ADN	
	<213> Secuencia artificial	
15	<220>	
	<223> Descripción de la secuencia artificial: cebador	
	<400> 19	
20	aaaaacacca actgtgggca aac	23
	<210> 20	
25	<211> 23	
	<212> ADN	
	<213> Secuencia artificial	
30	<220>	
	<223> Descripció de la secuencia artificial: cebador	
	<400> 20	
35	catcgatagg gctggagcag agg	23
	<210> 21	
40	<211> 23	
	<212> ADN	
	<213> Secuencia artificial	
45	<220>	
	<223> Descripció de la secuencia artificial: cebador	
	<400> 21	
50	ttccatggt ccagttgctg agg	23
	<210> 22	
55	<211> 23	
	<212> ADN	
	<213> Secuencia artificial	
60	<220>	
	<223> Descripció de la secuencia artificial: cebador	
	<400> 22	
65	gagccacgtg gtctgtttga cccgttcg	28

ES 2 274 656 T3

	<210> 23	
	<211> 28	
	<212> ADN	
5	<213> Secuencia artificial	
	<220>	
	<223> Descripció de la secuencia artificial: cebador	
10	<400> 23	
	ggagttctgc atttaccggg aagccacc	28
15	<210> 24	
	<211> 24	
	<212> ADN	
20	<213> Secuencia artificial	
	<220>	
	<223> Descripció de la secuencia artificial: cebador	
25	<400> 24	
	gagaggaaag ggaaggagga ggtc	24
30	<210> 25	
	<211> 24	
	<212> ADN	
35	<213> Secuencia artificial	
	<220>	
	<223> Descripció de la secuencia artificial: cebador	
40	<400> 25	
	ttgccaattc cactgtgggg cttc	24
45		
50		
55		
60		
65		