



(19)中華民國智慧財產局

(12)發明說明書公開本

(11)公開編號：TW 202428301 A

(43)公開日：中華民國 113 (2024) 年 07 月 16 日

(21)申請案號：112135033 (22)申請日：中華民國 107 (2018) 年 02 月 27 日

(51)Int. Cl. : *A61K38/20 (2006.01)* *A61K38/19 (2006.01)*
 A61K38/21 (2006.01) *C07K14/54 (2006.01)*
 C07K14/535 (2006.01) *C07K14/56 (2006.01)*
 C12N15/67 (2006.01) *A61P35/00 (2006.01)*

(30)優先權：2017/02/28 美國 62/464,981
 2017/08/23 歐洲專利局 17306089.8
 2017/12/12 美國 62/597,527

(71)申請人：法商賽諾菲公司 (法國) SANOFI (FR)
 法國

(72)發明人：吉塞克 弗里德里克 GIESEKE, FRIEDERIKE (DE)；莎欣 烏格 SAHIN, UGUR (TR)；瓦赫納爾 堤莫西 WAGENAAR, TIMOTHY R. (US)；溫德沙恩 德米特里 WIEDERSCHAIN, DMITRI G. (US)；霍茲 克里斯蒂安 HOTZ, CHRISTIAN (DE)

(74)代理人：何愛文；王仁君

申請實體審查：有 申請專利範圍項數：10 項 圖式數：35 共 312 頁

(54)名稱
治療性 RNA
(57)摘要

本發明係關於治療實體腫瘤癌症用之治療性 RNA 之領域。

This disclosure relates to the field of therapeutic RNAs for treatment of solid tumor cancers.

指定代表圖：




圖 1A

發明摘要

【發明名稱】（中文/英文）

治療性RNA

THERAPEUTIC RNA

【中文】

本發明係關於治療實體腫瘤癌症用之治療性 RNA 之領域。

【英文】

This disclosure relates to the field of therapeutic RNAs for treatment of solid tumor cancers.

【代表圖】

【本案指定代表圖】：第（1A）圖。

【本代表圖之符號簡單說明】：

無

【本案若有化學式時，請揭示最能顯示發明特徵的化學式】：

無

發明專利說明書

(本說明書格式、順序，請勿任意更動)

【發明名稱】(中文/英文)

治療性RNA

THERAPEUTIC RNA

【技術領域】

【0001】 本申請案主張 2017 年 2 月 28 日申請之美國臨時申請案第 62/464,981 號、2017 年 12 月 12 日申請之美國臨時申請案第 62/597,527 號及 2017 年 8 月 23 日申請之歐洲專利申請案第 17306089.8 號之優先權，其所有均以全文引用之方式併入。

【先前技術】

【0002】 本發明係關於治療實體腫瘤之治療性 RNA 之領域。美國國家癌症研究所將實體腫瘤定義為通常不含有囊腫或液體區域之異常組織塊體。實體腫瘤包括良性及惡性(癌性)肉瘤、癌瘤及淋巴瘤，且可物理地位於任何組織或器官中，包括腦、卵巢、乳房、結腸及其他組織。癌症通常分成兩個主要類型：實體腫瘤癌症及血液學(血液)癌症。據估計，每年在美國診斷出多於 150 萬癌症病例，且每年在美國多於 500,000 人死於癌症。

【0003】 實體腫瘤癌症尤其難以治療。目前治療包括手術、放射線療法、免疫療法及化學療法。單獨手術對於小型局部腫瘤可為適當治療，但大型侵襲性腫瘤及大部分轉移性惡性腫瘤通常不能手術切除。諸如放射線療法及化學療法之其他常用治療與非所需副作用及對健康細胞之破壞相關聯。

【0004】 儘管手術及目前療法有時能夠殺死大多數實體腫瘤，但額外細胞(包括潛在地癌症幹細胞)可能在療法下存活。隨著時間推移，此等細胞

可形成導致癌症復發之新的腫瘤。不管進行多重習知療法，但許多實體腫瘤類型之無病存活率小於 25%。對多重療法具有抗性或在療法之後復發之實體腫瘤甚至更難以治療，且長期存活率小於 10%。

【0005】 本文中揭示可克服治療實體腫瘤中之當前缺點之組成物、用途及方法。投與本文中揭示之治療性 RNA 可減小腫瘤大小、延長存活時間及/或防止腫瘤之癌轉移及/或復發。

【發明內容】

具體例 1. 一種組成物，其包含以下：RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 14 之胺基酸具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之 IL-12sc 蛋白質，及 RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 27 胺基酸具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之 GM-CSF 蛋白質。

具體例 2. 如具體例 1 之組成物，其進一步包含編碼與 SEQ ID NO: 24 之胺基酸具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之 IL-15 sushi 蛋白質的 RNA。

具體例 3. 如具體例 1 之組成物，其進一步包含編碼與 SEQ ID NO: 9 之胺基酸具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之 IL-2 蛋白質的 RNA。

具體例 4. 如具體例 1 之組成物，其進一步包含編碼與 SEQ ID NO: 19 之胺基酸具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之 IFN α 2b 蛋白質的 RNA。

具體例 5. 一種組成物，其包含：

- a. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 14 之胺基酸具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之 IL-12sc

蛋白質；

- b. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 27 之胺基酸具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之 GM-CSF 蛋白質；以及
- c. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 19 之胺基酸具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之 IFN α 2b 蛋白質。

具體例 6. 如具體例 5 之組成物，其進一步包含編碼與 SEQ ID NO: 24 之胺基酸具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之 IL-15 sushi 蛋白質的 RNA。

具體例 7. 如具體例 5 之組成物，其進一步包含編碼與 SEQ ID NO: 9 之胺基酸具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之 IL-2 蛋白質的 RNA。

具體例 8. 如具體例 1 至 7 中任一項之組成物，其中，至少一個 RNA 包含替代至少一個尿苷之修飾核鹼基。

具體例 9. 如具體例 1 至 7 中任一項之組成物，其中，各 RNA 包含替代各尿苷之修飾核鹼基。

具體例 10. 如具體例 8 至 9 中任一項之組成物，其中，該修飾核鹼基為假尿苷(ψ)、N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)或 5-甲基-尿苷(m^5U)。

具體例 11. 如具體例 10 之組成物，其中，該修飾核鹼基為 N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)。

具體例 12. 如具體例 1 至 11 中任一項之組成物，其中，至少一個 RNA 進一步包含 5'端帽(cap)。

具體例 13. 如具體例 1 至 11 中任一項之組成物，其中各 RNA 進一步

包含 5'端帽。

具體例 14. 如具體例 12 至 13 中任一項之組成物，其中，該 5'端帽為

$m_2^{7,3'-O}Gppp(m_1^{2'-O})ApG$ 或 $3'-O-Me-m^7G(5')ppp(5')G$ 。

具體例 15. 如具體例 1 至 14 中任一項之組成物，其中至少一個 RNA 進一步包含 5' UTR。

具體例 16. 如具體例 1 至 14 中任一項之組成物，其中各 RNA 進一步包含 5' UTR。

具體例 17. 如具體例 15 至 16 中任一項之組成物，其中，該 5' UTR 包含以下或由以下組成：SEQ ID NO: 2、4 或 6 之核苷酸，或與 SEQ ID NO: 2、4 或 6 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90% 或 85%一致性之核苷酸。

具體例 18. 如具體例 1 至 17 中任一項之組成物，其中，至少一個 RNA 進一步包含 3' UTR。

具體例 19. 如具體例 1 至 17 中任一項之組成物，其中，各 RNA 進一步包含 3' UTR。

具體例 20. 如具體例 18 至 19 中任一項之組成物，其中，該 3' UTR 包含以下或由以下組成：SEQ ID NO: 8 之核苷酸，或與 SEQ ID NO: 8 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%或 85%一致性之核苷酸。

具體例 21. 如具體例 1 至 20 中任一項之組成物，其中，至少一個 RNA 進一步包含多腺苷酸尾(poly-A tail)。

具體例 22. 如具體例 1 至 20 中任一項之組成物，其中，各 RNA 進一步包含多腺苷酸尾。

具體例 23. 如具體例 21 至 22 中任一項之組成物，其中該多腺苷酸尾包

含至少 100 個核苷酸。

具體例 24. 如具體例 1 至 23 中任一項之組成物，其中至少一個 RNA 包含 5'端帽、5' UTR、3' UTR 及多腺苷酸尾。

具體例 25. 如具體例 1 至 23 中任一項之組成物，其中，各 RNA 包含 5'端帽、5' UTR、3' UTR 及多腺苷酸尾。

具體例 26. 如具體例 24 至 25 中任一項之組成物，其中，

- a. 該 5' 端 帽 為 $m_2^{7,3'-O}Gppp(m_1^{2'-O})ApG$ 或 $3'-O-Me-m^7G(5')ppp(5')G$ ；
- b. 該 5' UTR 包含以下或由以下組成：SEQ ID NO: 2、4 或 6 之核苷酸，或與 SEQ ID NO: 2、4 或 6 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%或 85%一致性之核苷酸；
- c. 該 3' UTR 包含以下或由以下組成：SEQ ID NO: 8 之核苷酸，或與 SEQ ID NO: 8 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%或 85%一致性之核苷酸；以及
- d. 該多腺苷酸尾包含至少 100 個核苷酸。

具體例 27. 一種用於治療或預防個體之癌症、減小腫瘤大小、預防處於緩解中之癌症復發或預防癌轉移之方法，其包含向個體投與如具體例 1 至 26 中任一項之組成物。

具體例 28. 一種用於治療或預防個體之癌症、減小腫瘤大小、預防處於緩解中之癌症復發或預防癌轉移之方法，其包含向個體投與：

- a. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 14 之胺基酸具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之 IL-12sc 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 17 或 18 之核苷酸具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致

性之核苷酸；以及

- b. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 27 之胺基酸具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之 GM-CSF 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 29 之核苷酸具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸，

從而治療或預防個體之癌症、減小腫瘤大小、預防處於緩解中之癌症復發或預防癌轉移。

具體例 29. 如具體例 28 之方法，其進一步包含投與以下之 RNA，該 RNA 編碼與 SEQ ID NO: 19 之胺基酸具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之 IFN α 2b 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 22 或 23 之核苷酸具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸。

具體例 30. 如具體例 28 之方法，其進一步包含投與以下之 RNA，該 RNA 編碼與 SEQ ID NO: 24 之胺基酸具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之 IL-15 sushi 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 26 之核苷酸具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸。

具體例 31. 如具體例 28 之方法，其進一步包含投與以下之 RNA，該 RNA 編碼與 SEQ ID NO: 9 之胺基酸具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之 IL-2 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 12 或 13 之核苷酸具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸。

具體例 32. 如具體例 28 之方法，其進一步包含投與以下之 RNA，該

RNA 編碼

- a. 與 SEQ ID NO: 24 之胺基酸具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之 IL-15 sushi 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 26 之核苷酸具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸；以及
- b. 與 SEQ ID NO: 19 之胺基酸具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之 IFN α 2b 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 22 或 23 之核苷酸具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸。

具體例 33. 如具體例 28 之方法，其進一步包含投與以下之 RNA，該

RNA 編碼

- a. 與 SEQ ID NO: 9 之胺基酸具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之 IL-2 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 12 或 13 之核苷酸具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸；以及
- b. 與 SEQ ID NO: 19 之胺基酸具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之 IFN α 2b 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 22 或 23 之核苷酸具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸。

具體例 34. 如具體例 27 至 33 中任一項之方法，其中，該癌症為肉瘤、

癌瘤或淋巴瘤。

具體例 35. 如具體例 27 至 33 中任一項之方法，其中，該癌症為實體腫瘤。

具體例 36. 如具體例 35 之方法，其中，該實體腫瘤在肺、結腸、卵巢、子宮頸、子宮、腹膜、睪丸、陰莖、舌、淋巴結、胰臟、骨、乳房、前列腺、軟組織、結締組織、腎臟、肝、腦、甲狀腺或皮膚中。

具體例 37. 如具體例 35 之方法，其中，該實體腫瘤為上皮腫瘤、何杰金氏淋巴瘤(Hodgkin lymphoma ; HL)、非何杰金氏淋巴瘤、前列腺瘤、卵巢瘤、腎細胞瘤、胃腸道瘤、肝癌、結腸直腸瘤、血管瘤、間皮瘤、胰臟瘤、乳房瘤、肉瘤、肺癌、結腸瘤、腦瘤、黑色素瘤、小細胞肺癌、神經母細胞瘤、睪丸瘤、癌瘤、腺癌、神經膠質瘤、精細胞癌瘤、視網膜母細胞瘤或骨肉瘤。

具體例 38. 如具體例 27 至 37 中任一項之方法，其中，該組成物為腫瘤內或腫瘤周圍投與。

具體例 39. 如具體例 38 之方法，其中，經注射腫瘤及未注射腫瘤在腫瘤內或腫瘤周圍注射至第一腫瘤中或附近之後在大小上均減小。

具體例 40. 如具體例 27 至 39 中任一項之方法，其中，該個體為人類。

具體例 41. 如具體例 27 至 40 中任一項之方法，其中，亦投與另一療法。

具體例 42. 如具體例 41 之方法，其中，該其他療法為對腫瘤進行切除、割除或減積之手術。

具體例 43. 如具體例 41 之方法，其中，該其他療法為免疫療法、放射線療法或化學療法。

具體例 44. 如具體例 27 至 43 中任一項之方法，其中，至少一個 RNA

包含替代至少一個尿苷之修飾核鹼基。

具體例 45. 如具體例 27 至 43 中任一項之方法，其中各 RNA 包含替代各尿苷之修飾核鹼基。

具體例 46. 如具體例 44 至 45 中任一項之方法，其中，該修飾核鹼基為假尿苷(ψ)、N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)或 5-甲基-尿苷(m^5U)。

具體例 47. 如具體例 46 之方法，其中，該修飾核鹼基為 N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)。

具體例 48. 如具體例 27 至 47 中任一項之方法，其中至少一個 RNA 進一步包含 5'端帽。

具體例 49. 如具體例 27 至 47 中任一項之方法，其中各 RNA 進一步包含 5'端帽。

具體例 50. 如具體例 48 至 49 中任一項之方法，其中該 5'端帽為 $m_2^{7,3'-O}Gppp(m_1^{2'-O})ApG$ 或 $3'-O-Me-m^7G(5')ppp(5')G$ 。

具體例 51. 如具體例 27 至 50 中任一項之方法，其中，至少一個 RNA 進一步包含 5' UTR。

具體例 52. 如具體例 27 至 50 中任一項之方法，其中各 RNA 進一步包含 5' UTR。

具體例 53. 如具體例 51 至 52 中任一項之方法，其中，該 5' UTR 包含以下或由以下組成：SEQ ID NO: 2、4 或 6 之核苷酸，或與 SEQ ID NO: 2、4 或 6 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%或 85% 一致性之核苷酸。

具體例 54. 如具體例 27 至 54 中任一項之方法，其中至少一個 RNA 進一步包含 3' UTR。

具體例 55. 如具體例 27 至 54 中任一項之方法，其中，各 RNA 進一步

包含 3' UTR。

具體例 56. 如具體例 54 至 55 中任一項之方法，其中，該 3' UTR 包含以下或由以下組成：SEQ ID NO: 8 之核苷酸，或與 SEQ ID NO: 8 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%或 85%一致性之核苷酸。

具體例 57. 如具體例 27 至 56 中任一項之方法，其中，至少一個 RNA 進一步包含多腺苷酸尾。

具體例 58. 如具體例 27 至 56 中任一項之方法，其中，各 RNA 進一步包含多腺苷酸尾。

具體例 59. 如具體例 57 至 58 中任一項之方法，其中該多腺苷酸尾包含至少 100 個核苷酸。

具體例 60. 如具體例 27 至 59 中任一項之方法，其中至少一個 RNA 包含 5'端帽、5' UTR、3' UTR 及多腺苷酸尾。

具體例 61. 如具體例 27 至 59 中任一項之方法，其中，各 RNA 包含 5'端帽、5' UTR、3' UTR 及多腺苷酸尾。

具體例 62. 如具體例 60 至 61 中任一項之方法，其中，

- a. 該 5' 端帽為 $m_2^{7,3'-O}Gppp(m_1^{2'-O})ApG$ 或 $3'-O-Me-m^7G(5')ppp(5')G$ ；
- b. 該 5' UTR 包含以下或由以下組成：SEQ ID NO: 2、4 或 6 之核苷酸，或與 SEQ ID NO: 2、4 或 6 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%或 85%一致性之核苷酸；
- c. 該 3' UTR 包含以下或由以下組成：SEQ ID NO: 8 之核苷酸，或與 SEQ ID NO: 8 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%或 85%一致性之核苷酸；以及

d. 該多腺苷酸尾包含至少 100 個核苷酸。

具體例 63. 一種密碼子最佳化 DNA，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 11 具有至少 83%一致性之連續核苷酸。

具體例 64. 如具體例 63 之 DNA，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 11 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%或 85%一致性之連續核苷酸。

具體例 65. 一種密碼子最佳化 RNA，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 13 具有至少 83%一致性之連續核苷酸。

具體例 66. 如具體例 65 之 RNA，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 13 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%或 85%一致性之連續核苷酸。

具體例 67. 一種 RNA，其由具體例 63 或 64 中任一項之 DNA 產生。

具體例 68. 一種密碼子最佳化 DNA，其包含以下或由以下組成：

- a. 連續核苷酸，其與 SEQ ID NO: 16 之核苷酸 1-984 具有至少 78%一致性；
- b. 連續核苷酸，其與 SEQ ID NO: 16 之核苷酸 1027-1623 具有至少 81%一致性；以及
- c. 核苷酸，其編碼 a)與 b)之核苷酸之間的連接子。

具體例 69. 如具體例 68 之 DNA，其中，該連接子包含 SEQ ID NO: 16 之核苷酸 985-1026。

具體例 70. 如具體例 68 及 69 中任一項之 DNA，其中，部分 a)包含與 SEQ ID NO: 16 之核苷酸 1-984 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%、80%或 75%一致性之連續核苷酸；及部分 b)包含與 SEQ ID NO: 16 之核苷酸 1027-1623 具有至少 99%、98%、

97%、96%、95%、90%或 85%一致性之連續核苷酸。

具體例 71. 一種密碼子最佳化 RNA，其包含以下或由以下組成：

- a. 連續核苷酸，其與 SEQ ID NO: 18 之核苷酸 1-984 具有至少 78%一致性；
- b. 連續核苷酸，其與 SEQ ID NO: 18 之核苷酸 1027-1623 具有至少 81%一致性；以及
- c. 核苷酸，其編碼 a)與 b)之核苷酸之間的連接子。

具體例 72. 如具體例 71 之 RNA，其中，該連接子包含 SEQ ID NO: 18 之核苷酸 985-1026。

具體例 73. 如具體例 71 及 72 中任一項之 RNA，其中，部分 a)包含與 SEQ ID NO: 18 之核苷酸 1-984 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%、80%或 75%一致性之連續核苷酸；及部分 b)包含與 SEQ ID NO: 18 之核苷酸 1027-1623 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%或 85%一致性之連續核苷酸。

具體例 74. 一種 RNA，其由具體例 68 至 70 中任一項之 DNA 產生。

具體例 75. 一種密碼子最佳化 DNA，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 21 具有至少 80%一致性之連續核苷酸。

具體例 76. 如具體例 75 之 DNA，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 21 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%或 85%一致性之連續核苷酸。

具體例 77. 一種密碼子最佳化 RNA，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 23 具有至少 80%一致性之連續核苷酸。

具體例 78. 如具體例 77 之 RNA，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 23 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%或 85%一致

性之連續核苷酸。

具體例 79. 一種 RNA，其由具體例 75 至 76 中任一項之 DNA 產生。

具體例 80. 一種 DNA，其包含以下或由以下組成：

- a. 連續核苷酸，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 25 之核苷酸 1-321 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%或 85%一致性之連續核苷酸；
- b. 連續核苷酸，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 25 之核苷酸 382-729 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%或 85%一致性之連續核苷酸；以及
- c. 核苷酸，其編碼 a)與 b)之核苷酸之間的連接子。

具體例 81. 一種 RNA，其由具體例 80 之 DNA 產生。

具體例 82. 一種 RNA，其包含以下或由以下組成：

- a. 連續核苷酸，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 26 之核苷酸 1-321 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%或 85%一致性之連續核苷酸；
- b. 連續核苷酸，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 26 之核苷酸 382-729 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%或 85%一致性之連續核苷酸；以及
- c. 核苷酸，其編碼 a)與 b)之核苷酸之間的連接子。

具體例 83. 一種 DNA，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 28 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%或 85%一致性之連續核苷酸。

具體例 84. 一種 RNA，其由具體例 83 之 DNA 產生。

具體例 85. 一種 RNA，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 29

具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%或 85%一致性之連續核苷酸。

具體例 86. 如具體例 67、74、79、81 及 84 中任一項之 RNA，其中，該 RNA 在活體外由 DNA 轉錄。

具體例 87. 如具體例 65 至 67、71 至 74、78 至 79、81 至 82 及 84 至 85 中任一項之 RNA，其中，至少一個尿苷用修飾核鹼基置換。

具體例 88. 如具體例 65 至 67、71 至 74、78 至 79、81 至 82 及 84 至 85 中任一項之 RNA，其中，各尿苷用修飾核鹼基置換。

具體例 89. 如具體例 87 或 88 之 RNA，其中，該修飾核鹼基為假尿苷(ψ)、N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)或 5-甲基-尿苷(m^5U)。

具體例 90. 如具體例 89 之 RNA，其中，該修飾核鹼基為 N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)。

具體例 91. 如具體例 65 至 67、71 至 74、78 至 79、81 至 82 及 84 至 90 中任一項之 RNA，其進一步包含 5'端帽。

具體例 92. 如具體例 91 之 RNA，其中，該 5'端帽為 $m_2^{7,3'-O}Gppp(m_1^{2'-O})ApG$ 或 $3'-O-Me-m^7G(5')ppp(5')G$ 。

具體例 93. 如具體例 65 至 67、71 至 74、78 至 79、81 至 82 及 84 至 92 中任一項之 RNA，其進一步包含 5' UTR。

具體例 94. 如具體例 93 之 RNA，其中，該 5' UTR 包含以下或由以下組成：SEQ ID NO: 2、4 或 6 之核苷酸，或與 SEQ ID NO: 2、4 或 6 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%或 85%一致性之核苷酸。

具體例 95. 如具體例 65 至 67、71 至 74、78 至 79、81 至 82 及 84 至 94 中任一項之 RNA，其進一步包含 3' UTR。

具體例 96. 如具體例 95 之 RNA，其中，該 3' UTR 包含以下或由以下組成：SEQ ID NO: 8 之核苷酸，或與 SEQ ID NO: 8 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%或 85%一致性之核苷酸。

具體例 97. 如具體例 65 至 67、71 至 74、78 至 79、81 至 82 及 84 至 96 中任一項之 RNA，其進一步包含多腺苷酸尾。

具體例 98. 如具體例 97 之 RNA，其中，該多腺苷酸尾包含至少 100 個核苷酸。

具體例 99. 如具體例 65 至 67、71 至 74、78 至 79、81 至 82 及 84 至 97 中任一項之 RNA，其進一步包含 5'端帽、5' UTR、3' UTR 及多腺苷酸尾。

具體例 100. 如具體例 99 之 RNA，其中，

- a. 該 5' 端 帽 為 $m_2^{7,3'-O}Gppp(m_1^{2'-O})ApG$ 或 $3'-O-Me-m^7G(5')ppp(5')G$ ；
- b. 該 5' UTR 包含以下或由以下組成：SEQ ID NO: 2、4 或 6 之核苷酸，或與 SEQ ID NO: 2、4 或 6 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%或 85%一致性之核苷酸；
- c. 該 3' UTR 包含以下或由以下組成：SEQ ID NO: 8 之核苷酸，或與 SEQ ID NO: 8 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%或 85%一致性之核苷酸；以及
- d. 該多腺苷酸尾包含至少 100 個核苷酸。

具體例 101. 一種 DNA，其包含以下或由以下組成：

- a. 連續核苷酸，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 11 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 83%一致性之核苷酸；以及

- b. 連續核苷酸，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 1、3 或 5 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85% 或 80%一致性之核苷酸，其中當轉錄時，部分 a)及 b)之核苷酸形成單一轉錄物。

具體例 102. 一種 DNA，其包含以下或由以下組成：

- a. 連續核苷酸，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 16 之核苷酸 1-984 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%、80%或 78%一致性之核苷酸；
- b. 連續核苷酸，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 16 之核苷酸 1027-1623 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%、80%或 81%一致性之核苷酸；以及
- c. 連續核苷酸，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 1、3 或 5 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85% 或 80%一致性之核苷酸，其中當轉錄時，部分 a)、b)及 c) 之核苷酸形成單一轉錄物。

具體例 103. 一種 DNA，其包含以下或由以下組成：

- a. 連續核苷酸，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 21 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80% 一致性之核苷酸；及
- b. 連續核苷酸，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 1、3 或 5 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85% 或 80%一致性之核苷酸，其中當轉錄時，部分 a)及 b)之核苷酸形成單一轉錄物。

具體例 104. 一種 DNA，其包含以下或由以下組成：

- a. 連續核苷酸，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 28 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80% 一致性之核苷酸；及
- b. 連續核苷酸，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 1、3 或 5 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85% 或 80%一致性之核苷酸，其中當轉錄時，部分 a)及 b)之核苷酸形成單一轉錄物。

具體例 105. 一種 DNA，其包含以下或由以下組成：

- a. 連續核苷酸，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 25 之核苷酸 1-321 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸；
- b. 連續核苷酸，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 25 之核苷酸 382-729 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸；以及
- c. 連續核苷酸，其與 SEQ ID NO: 1、3 或 5 具有至少 80%一致性，其中當轉錄時，部分 a)、b)及 c)之核苷酸形成單一轉錄物。

具體例 106. 一種 DNA，其包含以下或由以下組成：

- a. 連續核苷酸，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 11 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 83% 一致性之核苷酸；以及
- b. 連續核苷酸，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 7 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80% 一致性之核苷酸，其中當轉錄時，部分 a)及 b)之核苷酸形

成單一轉錄物。

具體例 107. 一種 DNA，其包含以下或由以下組成：

- a. 連續核苷酸，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 16 之核苷酸 1-984 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%、80%或 78%一致性之核苷酸；
- b. 連續核苷酸，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 16 之核苷酸 1027-1623 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%、80%或 81%一致性之核苷酸；以及
- c. 連續核苷酸，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 7 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸，其中當轉錄時，部分 a)、b)及 c)之核苷酸形成單一轉錄物。

具體例 108. 一種 DNA，其包含以下或由以下組成：

- a. 連續核苷酸，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 21 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸；及
- b. 連續核苷酸，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 7 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸，其中當轉錄時，部分 a)及 b)之核苷酸形成單一轉錄物。

具體例 109. 一種 DNA，其包含以下或由以下組成：

- a. 連續核苷酸，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 28 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸；及

- b. 連續核苷酸，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 7 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80% 一致性之核苷酸，其中當轉錄時，部分 a)及 b)之核苷酸形成單一轉錄物。

具體例 110. 一種 DNA，其包含以下或由以下組成：

- a. 連續核苷酸，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 25 之核苷酸 1-321 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸；
- b. 連續核苷酸，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 25 之核苷酸 382-729 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸；以及
- c. 連續核苷酸，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 7 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80% 一致性之核苷酸，其中當轉錄時，部分 a)、b)及 c)之核苷酸形成單一轉錄物。

具體例 111. 一種 DNA，其包含以下或由以下組成：

- a. 連續核苷酸，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 11 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 83% 一致性之核苷酸；
- b. 連續核苷酸，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 1、3 或 5 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85% 或 80%一致性之核苷酸；以及
- c. 連續核苷酸，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 7 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%

一致性之核苷酸，其中當轉錄時，部分 a)、b)及 c)之核苷酸形成單一轉錄物。

具體例 112. 一種 DNA，其包含以下或由以下組成：

- a. 連續核苷酸，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 16 之核苷酸 1-984 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%、80%或 78%一致性之核苷酸；
- b. 連續核苷酸，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 16 之核苷酸 1027-1623 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%、80%或 81%一致性之核苷酸；
- c. 連續核苷酸，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 1、3 或 5 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸；以及
- d. 連續核苷酸，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 7 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸，其中當轉錄時，部分 a)、b)、c)及 d)之核苷酸形成單一轉錄物。

具體例 113. 一種 DNA，其包含以下或由以下組成：

- a. 連續核苷酸，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 21 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸；
- b. 連續核苷酸，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 1、3 或 5 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸，其中部分 b)之核苷酸調節部分 a)之核苷酸之表現；以及

- c. 連續核苷酸，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 7 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80% 一致性之核苷酸，其中當轉錄時，部分 a)、b)及 c)之核苷酸形成單一轉錄物。

具體例 114. 一種 DNA，其包含以下或由以下組成：

- a. 連續核苷酸，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 28 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80% 一致性之核苷酸；
- b. 連續核苷酸，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 1、3 或 5 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85% 或 80%一致性之核苷酸；以及
- c. 連續核苷酸，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 7 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80% 一致性之核苷酸，其中當轉錄時，部分 a)、b)及 c)之核苷酸形成單一轉錄物。

具體例 115. 一種 DNA，其包含以下或由以下組成：

- a. 連續核苷酸，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 25 之核苷酸 1-321 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸；
- b. 連續核苷酸，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 25 之核苷酸 382-729 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸；
- c. 連續核苷酸，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 1、3 或 5 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%

或 80%一致性之核苷酸；以及

- d. 連續核苷酸，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 7 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80% 一致性之核苷酸，其中當轉錄時，部分 a)、b)、c)及 d)之核苷酸形成單一轉錄物。

具體例 116. 一種 RNA，其由具體例 101 至 115 之 DNA 中之任一者產生。

具體例 117. 如具體例 116 之 RNA，其中，至少一個尿苷用修飾核鹼基置換。

具體例 118. 如具體例 116 之 RNA，其中，各尿苷用修飾核鹼基置換。

具體例 119. 如具體例 117 至 118 中任一項之 RNA，其中，該修飾核鹼基為假尿苷(ψ)、N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)或 5-甲基-尿苷(m^5U)。

具體例 120. 如具體例 119 之 RNA，其中，該修飾核鹼基為 N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)。

具體例 121. 如具體例 116 至 120 中任一項之 RNA，其中，該 RNA 進一步包含 5'端帽。

具體例 122. 如具體例 121 之 RNA，其中，該 5'端帽為 $m_2^{7,3'-O}Gppp(m_1^{2'-O})ApG$ 或 $3'-O-Me-m^7G(5')ppp(5')G$ 。

具體例 123. 如具體例 116 至 122 中任一項之 RNA，其中，該 RNA 實質上不含雙鏈 RNA。

具體例 124. 如具體例 116 至 122 中任一項之 RNA，其中，已自該 RNA 移除雙鏈 RNA。

具體例 125. 如具體例 123 至 124 中任一項之 RNA，其中，該 RNA

已經由 HPLC 或基於纖維素之層析純化。

具體例 126. 一種醫藥調配物，其包含具體例 63 至 125 之 DNA 或 RNA 中之任一者及醫藥學上可接受之賦形劑。

具體例 127. 一種用於治療或預防個體之癌症、減小腫瘤大小、預防處於緩解中之癌症復發或預防癌轉移之方法，其包含投與具體例 63 至 125 之 RNAs 或 DNA 中之任何一或多者或具體例 126 之醫藥調配物。

具體例 128. 一種活體內生產編碼 IL-2、IL-12sc、IL-15 sushi、GM-CSF 及 IFN α 2b 之多肽之方法，其包含向個體投與具體例 63 至 125 中任一項之 DNA 或 RNA 中的一或多者、具體例 1 至 26 中任一項之組成物，或具體例 126 之醫藥調配物。

具體例 129. 一種組成物，其包含至少兩種 RNA，其中，該等 RNA 編碼不同蛋白質，且其中，該等 RNA 選自如具體例 65 至 67、71 至 74、78 至 79、81 至 82、84 至 100 及 116 至 125 中任一項之 RNA。

具體例 130. 如具體例 129 之組成物，其中，該組成物包含編碼 GM-CSF 及 IL-12sc 之兩種 RNA。

具體例 131. 如具體例 129 之組成物，其中，該組成物包含編碼 GM-CSF、IL-12sc 及 IFN α 2b 之三種 RNA。

具體例 132. 如具體例 129 之組成物，其中，該組成物包含編碼 GM-CSF、IL-2 及 IFN α 2b 之三種 RNA。

具體例 133. 如具體例 129 之組成物，其中，該組成物包含編碼 GM-CSF、IL-12sc、IL-2 及 IFN α 2b 之四種 RNA。

具體例 134. 如具體例 129 之組成物，其中，該組成物包含編碼

GM-CSF、IL-12sc、IL-15 sushi 及 IFN α 2b 之四種 RNA。

具體例 135. 如具體例 130 至 134 中任一項之組成物，其中，該編碼

GM-CSF 之 RNA 選自具體例 84 至 85 中任一項之 RNA。

具體例 136. 如具體例 130 至 134 中任一項之組成物，其中，該編碼

IL-12sc 之 RNA 選自具體例 71 至 74 中任一項之 RNA。

具體例 137. 如具體例 131 至 134 中任一項之組成物，其中，該編碼

IFN α 2b 之 RNA 選自具體例 77 至 79 中任一項之 RNA。

具體例 138. 如具體例 134 之組成物，其中，該編碼 IL-15 sushi 之

RNA 選自具體例 81 至 82 中任一項之 RNA。

具體例 139. 如具體例 132 至 133 中任一項之組成物，其中，該編碼

IL-2 之 RNA 選自具體例 65 至 67 中任一項之 RNA。

具體例 140. 一種治療或預防實體腫瘤癌症之方法，其包含直接投與

治療有效量之以下 RNA 中之每一者至腫瘤中：

a. RNA，其包含編碼 IL-12sc 之 RNA (SEQ ID NO: 17 或 18)；

b. RNA，其包含編碼 GM-CSF 之 RNA (SEQ ID NO: 29)；以
及

c. RNA，其包含編碼 IFN α 2b 之 RNA (SEQ ID NO: 22 或 23)，

其中各 RNA 包含替代各尿苷之修飾核鹼基，且其中各 RNA 包含 5' UTR (SEQ ID NO: 2、4 或 6)、3' UTR (SEQ ID NO: 8)、5'端帽及多腺苷酸尾。

具體例 141. 一種治療或預防實體腫瘤癌症之方法，其包含直接投與

治療有效量之以下 RNA 中之每一者至腫瘤中：

a. RNA，其包含編碼 IL-12sc 之 RNA (SEQ ID NO: 17 或 18)；

b. RNA，其包含編碼 GM-CSF 之 RNA (SEQ ID NO: 29)；

c. RNA，其包含編碼 IFN α 2b 之 RNA (SEQ ID NO: 22 或 23)；

以及

d. RNA，其包含編碼 IL-2 之 RNA (SEQ ID NO: 12 或 13)，其中各 RNA 包含替代各尿苷之修飾核鹼基，且其中各 RNA 包含 5' UTR (SEQ ID NO: 2、4 或 6)、3' UTR (SEQ ID NO: 8)、5'端帽及多腺苷酸尾。

具體例 142. 一種治療或預防實體腫瘤癌症之方法，其包含直接投與治療有效量之以下 RNA 中之每一者至腫瘤中：

- a. RNA，其包含編碼 IL-12sc 之 RNA (SEQ ID NO: 17 或 18)；
- b. RNA，其包含編碼 GM-CSF 之 RNA (SEQ ID NO: 29)；
- c. RNA，其包含編碼 IFN α 2b 之 RNA (SEQ ID NO: 22 或 23)；

以及

d. RNA，其包含編碼 IL-15 sushi 之 RNA (SEQ ID NO: 26)，其中各 RNA 包含替代各尿苷之修飾核鹼基，且其中各 RNA 包含 5' UTR (SEQ ID NO: 2、4 或 6)、3' UTR (SEQ ID NO: 8)、5'端帽及多腺苷酸尾。

具體例 143. 一種組成物，其包含編碼與 SEQ ID NO: 9 之胺基酸具有至少 95%一致性之 IL-2 蛋白質之 RNA，其中各尿苷用修飾核鹼基置換，且進一步包含 5' UTR (SEQ ID NO: 2、4 或 6)、3' UTR (SEQ ID NO: 8)、5'端帽及多腺苷酸尾。

具體例 144. 一種組成物，其包含編碼與 SEQ ID NO: 14 之胺基酸具有至少 95%一致性之 IL-12sc 蛋白質之 RNA，其中各尿苷用修飾核鹼基置換，且進一步包含 5' UTR (SEQ ID NO: 2、4 或 6)、3' UTR (SEQ ID NO: 8)、5'端帽及多腺苷酸尾。

具體例 145. 一種組成物，其包含編碼與 SEQ ID NO: 27 之胺基酸具有至少 95%一致性 GM-CSF 蛋白質之 RNA，其中各尿苷用修飾核鹼基置換，且進一步包含 5' UTR (SEQ ID NO: 2、4 或 6)、3' UTR

(SEQ ID NO: 8)、5'端帽及多腺苷酸尾。

具體例 146. 一種組成物，其包含編碼與 SEQ ID NO: 19 之胺基酸具有至少 95%一致性之 IFN α 2b 蛋白質之 RNA，其中各尿苷用修飾核鹼基置換，且進一步包含 5' UTR (SEQ ID NO: 2、或 6)、3' UTR (SEQ ID NO: 8)、5'端帽及多腺苷酸尾。

具體例 147. 一種組成物，其包含編碼與 SEQ ID NO: 24 之胺基酸具有至少 95%一致性之 IL-15 sushi 蛋白質之 RNA，其中各尿苷用修飾核鹼基置換，且進一步包含 5' UTR (SEQ ID NO: 2、4 或 6)、3' UTR (SEQ ID NO: 8)、5'端帽及多腺苷酸尾。

具體例 148. 一種 IL-12sc RNA 組成物，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 17 或 18 具有至少 95%一致性之核苷酸，其中各尿苷用修飾核鹼基置換；且進一步包含 5' UTR (SEQ ID NO: 2、4 或 6)、3' UTR (SEQ ID NO: 8)、5'端帽及多腺苷酸尾。

具體例 149. 一種 GM-CSF RNA 組成物，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 29 具有至少 95%一致性之核苷酸，其中各尿苷用修飾核鹼基置換；且進一步包含 5' UTR (SEQ ID NO: 2、4 或 6)、3' UTR (SEQ ID NO: 8)、5'端帽及多腺苷酸尾。

具體例 150. 一種 IFN α 2b RNA 組成物，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 22 或 23 具有至少 95%一致性之核苷酸，其中各尿苷用尿苷類似物置換；且進一步包含 5' UTR (SEQ ID NO: 2、4 或 6)、3' UTR (SEQ ID NO: 8)、5'端帽及多腺苷酸尾。

具體例 151. 一種 IL-15 sushi RNA 組成物，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 26 具有至少 95%一致性之核苷酸，其中各尿苷用修飾核鹼基置換；且進一步包含 5' UTR (SEQ ID NO: 2、4 或

6)、3' UTR (SEQ ID NO: 8)、5'端帽及多腺苷酸尾。

具體例 152. 一種 IL-2 RNA 組成物，其包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 12 或 13 具有至少 95%一致性之核苷酸，其中各尿苷用修飾核鹼基置換；且進一步包含 5' UTR (SEQ ID NO: 2、4 或 6)、3' UTR (SEQ ID NO: 8)、5'端帽及多腺苷酸尾。

具體例 153. 一種 IL-12sc RNA 組成物，其包含以下或由以下組成：SEQ ID NO: 17 或 18 之核苷酸，其中各尿苷用修飾核鹼基置換；且進一步包含 5' UTR (SEQ ID NO: 2、4 或 6)、3' UTR (SEQ ID NO: 8)、5'端帽及多腺苷酸尾。

具體例 154. 一種 GM-CSF RNA 組成物，其包含以下或由以下組成：SEQ ID NO: 29 之核苷酸，其中各尿苷用修飾核鹼基置換；且進一步包含 5' UTR (SEQ ID NO: 2、4 或 6)、3' UTR (SEQ ID NO: 8)、5'端帽及多腺苷酸尾。

具體例 155. 一種 IFN α 2b RNA 組成物，其包含以下或由以下組成：SEQ ID NO: 22 或 23 之核苷酸，其中各尿苷用修飾核鹼基置換；進一步包含 5' UTR (SEQ ID NO: 2、4 或 6)、3' UTR (SEQ ID NO: 8)、5'端帽及多腺苷酸尾。

具體例 156. 一種 IL-15 sushi RNA 組成物，其包含以下或由以下組成：SEQ ID NO: 26 之核苷酸，其中各尿苷用修飾核鹼基置換；且進一步包含 5' UTR (SEQ ID NO: 2、4 或 6)、3' UTR (SEQ ID NO: 8)、5'端帽及多腺苷酸尾。

具體例 157. 一種 IL-2 RNA 組成物，其包含以下或由以下組成：SEQ ID NO: 12 或 13 之核苷酸，其中各尿苷用修飾核鹼基置換；且進一步包含 5' UTR (SEQ ID NO: 2、4 或 6)、3' UTR (SEQ ID NO: 8)、

5'端帽及多腺苷酸尾。

具體例 158. 如具體例 143 至 157 中任一項之組成物，其中，該修飾核鹼基為假尿苷(ψ)、N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)或 5-甲基-尿苷(m^5U)。

具體例 159. 一種組成物，其包含編碼 IFN α 2b 之 RNA，其中改變該 RNA 以與未改變 RNA 相比具有減少的免疫原性。

具體例 160. 如具體例 159 之組成物，其中，改變包含用修飾核鹼基取代至少一個尿苷。

具體例 161. 如具體例 159 之組成物，其中，該修飾核鹼基為假尿苷(ψ)、N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)或 5-甲基-尿苷(m^5U)。

具體例 162. 如具體例 161 之組成物，其中，該修飾核鹼基為 N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)。

具體例 163. 如具體例 159 至 162 中任一項之組成物，其中，改變包含減少雙鏈 RNA 之量。

具體例 164. 如具體例 163 之組成物，其中，雙鏈 RNA 之減少為經由 HPLC 或基於纖維素之層析純化之結果。

具體例 165. 如具體例 159 至 164 中任一項之組成物，其中，改變與未改變 RNA 相比減少由先天免疫系統識別之 RNA。

具體例 166. 如具體例 159 至 165 中任一項之組成物，其中，改變包含向該 RNA 添加 5'端帽。

具體例 167. 如具體例 166 之組成物，其中，該 5'端帽為 $m_2^{7,3'-O}Gppp(m_1^{2'-O})ApG$ 或 $3'-O-Me-m^7G(5')ppp(5')G$ 。

具體例 168. 如具體例 159 至 167 中任一項之組成物，其進一步包含編碼所關注之肽或蛋白之第二 RNA。

具體例 169. 如具體例 168 之組成物，其中，該所關注之肽或蛋白為

選自或衍生自以下之肽或蛋白質：細胞介素、趨化激素、自殺基因產物、免疫原性蛋白質或肽、細胞凋亡誘導劑、血管生成抑制劑、熱衝擊蛋白質、腫瘤抗原、β-連環蛋白抑制劑、STING 路徑之活化劑、視黃酸誘導基因(RIG)-I 路徑之活化劑、toll 樣受體(TLR) 路徑之促效劑、檢查點調節劑、先天性免疫活化劑、抗體、顯性陰性受體及誘餌受體、源於骨髓之抑制細胞(MDSC)之抑制劑、IDO 路徑抑制劑及結合細胞凋亡抑制劑之蛋白質或肽。

具體例 170. 如具體例 168 或 169 之組成物，其中，改變該第二 RNA 以與未改變 RNA 相比具有減少的免疫原性。

具體例 171. 如具體例 170 之組成物，其中改變包含用修飾核鹼基取代至少一個尿苷。

具體例 172. 如具體例 171 之組成物，其中，該修飾核鹼基為假尿苷(ψ)、N1-甲基-假尿苷(m¹ψ)或 5-甲基-尿苷(m⁵U)。

具體例 173. 如具體例 172 之組成物，其中，該修飾核鹼基為 N1-甲基-假尿苷(m¹ψ)。

具體例 174. 如具體例 168 至 173 中任一項之組成物，其中，改變包含減少雙鏈 RNA 之量。

具體例 175. 如具體例 174 之組成物，其中，雙鏈 RNA 之減少為經由 HPLC 或基於纖維素之層析之純化之結果。

具體例 176. 如具體例 168 至 173 中任一項之組成物，其中，改變包含向該 RNA 添加 5'端帽。

具體例 177. 如具體例 176 之組成物，其中，該 5'端帽為 m₂^{7,3'-O}Gppp(m₁^{2'-O})ApG 或 3'-O-Me-m⁷G(5')ppp(5')G。

具體例 178. 如具體例 168 至 177 中任一項之組成物，其中，該第二

RNA 包含：

- a. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 14 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-12sc 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 17 或 18 之核苷酸具有至少 95% 一致性之核苷酸；
- b. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 27 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 GM-CSF 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 29 之核苷酸具有至少 95% 一致性之核苷酸；
- c. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 24 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-15 sushi 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 26 之核苷酸具有至少 95% 一致性之核苷酸；或
- d. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 9 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-2 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 12 或 13 之核苷酸具有至少 95% 一致性之核苷酸。

具體例 179. 一種用於治療或預防個體之癌症、減小腫瘤大小、預防處於緩解中之癌症復發或預防癌轉移之方法，其包含投與具體例 159 至 178 之組成物中之任一者。

具體例 180. 如具體例 159 至 178 中任一項之組成物，其用於治療或預防癌症、減小腫瘤大小、預防處於緩解中之癌症復發或預防癌轉移之方法中。

具體例 181. 一種組成物，其包含編碼與 SEQ ID NO: 14 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-12sc 蛋白質之 RNA。

具體例 182. 一種組成物，其包含編碼與 SEQ ID NO: 27 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 GM-CSF 蛋白質之 RNA。

具體例 183. 一種組成物，其包含編碼與 SEQ ID NO: 19 之胺基酸序

列具有至少 95%一致性之 IFN α 2b 蛋白質之 RNA。

具體例 184. 一種組成物，其包含編碼與 SEQ ID NO: 24 之胺基酸序

列具有至少 95%一致性之 IL-15 sushi 蛋白質之 RNA。

具體例 185. 一種組成物，其包含編碼與 SEQ ID NO: 9 之胺基酸序

列具有至少 95%一致性之 IL-2 蛋白質之 RNA。

具體例 186. 一種組成物，其包含編碼 IL-12sc 蛋白質之 RNA，其中

該 RNA 包含與 SEQ ID NO: 17 或 18 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸。

具體例 187. 一種組成物，其包含編碼 GM-CSF 蛋白質之 RNA，其

中該 RNA 包含與 SEQ ID NO: 29 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸。

具體例 188. 一種組成物，其包含編碼 IFN α 2b 蛋白質之 RNA，其中

該 RNA 包含與 SEQ ID NO: 22 或 23 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸。

具體例 189. 一種組成物，其包含編碼 IL-15 sushi 蛋白質之 RNA，

其中該 RNA 包含與 SEQ ID NO: 26 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸。

具體例 190. 一種組成物，其包含編碼 IL-2 蛋白質之 RNA，其中該

RNA 包含與 SEQ ID NO: 12 或 13 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸。

具體例 191. 一種組成物，其包含以下 RNA 中之任何兩種：

- a. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 14 之胺基酸序列具有至少 95%一致性之 IL-12sc 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 17 或 18 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸；

- b. RNA,其編碼與 SEQ ID NO: 27 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 GM-CSF 蛋白質, 及/或包含與 SEQ ID NO: 29 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸;
- c. RNA,其編碼與 SEQ ID NO: 19 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IFN α 2b 蛋白質, 及/或包含與 SEQ ID NO: 22 或 23 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸;
- d. RNA,其編碼與 SEQ ID NO: 24 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-15 sushi 蛋白質, 及/或包含與 SEQ ID NO: 26 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸; 以及
- e. RNA,其編碼與 SEQ ID NO: 9 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-2 蛋白質, 及/或包含與 SEQ ID NO: 12 或 13 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸。

具體例 192. 一種組成物, 其包含:

- a. RNA,其編碼與 SEQ ID NO: 14 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-12sc 蛋白質, 及/或包含與 SEQ ID NO: 17 或 18 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸; 以及
- b. RNA,其編碼與 SEQ ID NO: 27 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 GM-CSF 蛋白質, 及/或包含與 SEQ ID NO: 29 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸。

具體例 193. 一種組成物, 其包含:

- a. RNA,其編碼與 SEQ ID NO: 14 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-12sc 蛋白質, 及/或包含與 SEQ ID NO: 17 或 18 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸; 以及
- b. RNA,其編碼與 SEQ ID NO: 19 之胺基酸序列具有至少 95%

一致性之 IFN α 2b 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 22 或 23 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸。

具體例 194. 一種組成物，其包含：

- a. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 14 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-12sc 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 17 或 18 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸；以及
- b. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 24 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-15 sushi 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 26 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸。

具體例 195. 一種組成物，其包含：

- a. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 14 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-12sc 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 17 或 18 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸；以及
- b. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 9 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-2 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 12 或 13 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸。

具體例 196. 一種組成物，其包含：

- a. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 27 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 GM-CSF 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 29 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸；以及
- b. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 19 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IFN α 2b 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 22 或 23 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸。

具體例 197. 一種組成物，其包含：

- a. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 27 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 GM-CSF 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 29 之核苷酸具有至少 95% 一致性之核苷酸；以及
- b. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 24 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-15 sushi 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 26 之核苷酸具有至少 95% 一致性之核苷酸。

具體例 198. 一種組成物，其包含：

- a. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 27 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 GM-CSF 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 29 之核苷酸具有至少 95% 一致性之核苷酸；以及
- b. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 9 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-2 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 12 或 13 之核苷酸具有至少 95% 一致性之核苷酸。

具體例 199. 一種組成物，其包含：

- a. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 19 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IFN α 2b 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 22 或 23 之核苷酸具有至少 95% 一致性之核苷酸；以及
- b. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 24 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-15 sushi 蛋白質，及/或與 SEQ ID NO: 26 之核苷酸具有至少 95% 一致性之核苷酸。

具體例 200. 一種組成物，其包含：

- a. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 19 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IFN α 2b 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 22 或 23 之核苷酸具有至少 95% 一致性之核苷酸；以及

- b. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 9 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-2 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 12 或 13 之核苷酸具有至少 95% 一致性之核苷酸。

具體例 201. 一種組成物，其包含：

- a. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 24 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-15 sushi 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 26 之核苷酸具有至少 95% 一致性之核苷酸；以及
- b. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 9 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-2 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 12 或 13 之核苷酸具有至少 95% 一致性之核苷酸。

具體例 202. 一種組成物，其包含以下中之任何三種：

- a. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 14 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-12sc 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 17 或 18 之核苷酸具有至少 95% 一致性之核苷酸；
- b. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 27 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 GM-CSF 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 29 之核苷酸具有至少 95% 一致性之核苷酸；
- c. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 19 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IFN α 2b 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 22 或 23 之核苷酸具有至少 95% 一致性之核苷酸；
- d. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 24 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-15 sushi 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 26 之核苷酸具有至少 95% 一致性之核苷酸；以及
- e. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 9 之胺基酸序列具有至少 95%

一致性之 IL-2 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 12 或 13 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸。

具體例 203. 一種組成物，其包含：

- a. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 14 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-12sc 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 17 或 18 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸；
- b. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 27 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 GM-CSF 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 29 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸；以及
- c. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 19 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IFN α 2b 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 22 或 23 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸。

具體例 204. 一種組成物，其包含：

- a. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 14 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-12sc 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 17 或 18 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸；
- b. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 27 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 GM-CSF 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 29 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸；以及
- c. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 24 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-15 sushi 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 26 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸。

具體例 205. 一種組成物，其包含：

- a. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 14 之胺基酸序列具有至少 95%

一致性之 IL-12sc 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 17 或 18 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸；

- b. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 27 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 GM-CSF 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 29 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸；以及
- c. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 9 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-2 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 12 或 13 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸。

具體例 206. 一種組成物，其包含：

- a. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 14 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-12sc 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 17 或 18 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸；
- b. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 19 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IFN α 2b 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 22 或 23 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸；以及
- c. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 24 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-15 sushi 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 26 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸。

具體例 207. 一種組成物，其包含：

- a. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 14 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-12sc 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 17 或 18 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸；
- b. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 19 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IFN α 2b 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 22 或

23 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸；以及

- c. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 9 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-2 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 12 或 13 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸。

具體例 208. 一種組成物，其包含：

- a. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 14 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-12sc 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 17 或 18 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸；
- b. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 24 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-15 sushi 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 26 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸；以及
- c. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 9 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-2 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 12 或 13 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸。

具體例 209. 一種組成物，其包含：

- a. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 27 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 GM-CSF 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 29 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸；
- b. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 19 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IFN α 2b 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 22 或 23 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸；以及
- c. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 24 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-15 sushi 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 26 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸。

具體例 210. 一種組成物，其包含：

- a. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 27 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 GM-CSF 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 29 之核苷酸具有至少 95% 一致性之核苷酸；
- b. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 19 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IFN α 2b 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 22 或 23 之核苷酸具有至少 95% 一致性之核苷酸；以及
- c. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 9 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-2 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 12 或 13 之核苷酸具有至少 95% 一致性之核苷酸。

具體例 211. 一種組成物，其包含：

- a. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 27 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 GM-CSF 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 29 之核苷酸具有至少 95% 一致性之核苷酸；
- b. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 24 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-15 sushi 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 26 之核苷酸具有至少 95% 一致性之核苷酸；以及
- c. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 9 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-2 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 12 或 13 之核苷酸具有至少 95% 一致性之核苷酸。

具體例 212. 一種組成物，其包含：

- a. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 19 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IFN α 2b 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 22 或 23 之核苷酸具有至少 95% 一致性之核苷酸；

- b. RNA, 其編碼與 SEQ ID NO: 24 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-15 sushi 蛋白質, 及/或包含與 SEQ ID NO: 26 之核苷酸具有至少 95% 一致性之核苷酸; 以及
- c. RNA, 其編碼與 SEQ ID NO: 9 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-2 蛋白質, 及/或包含與 SEQ ID NO: 12 或 13 之核苷酸具有至少 95% 一致性之核苷酸。

具體例 213. 一種組成物, 其包含以下中之任何四種:

- a. RNA, 其編碼與 SEQ ID NO: 14 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-12sc 蛋白質, 及/或包含與 SEQ ID NO: 17 或 18 之核苷酸具有至少 95% 一致性之核苷酸;
- b. RNA, 其編碼與 SEQ ID NO: 27 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 GM-CSF 蛋白質, 及/或包含與 SEQ ID NO: 29 之核苷酸具有至少 95% 一致性之核苷酸;
- c. RNA, 其編碼與 SEQ ID NO: 19 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IFN α 2b 蛋白質, 及/或包含與 SEQ ID NO: 22 或 23 之核苷酸具有至少 95% 一致性之核苷酸;
- d. RNA, 其編碼與 SEQ ID NO: 24 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-15 sushi 蛋白質, 及/或包含與 SEQ ID NO: 26 之核苷酸具有至少 95% 一致性之核苷酸; 以及
- e. RNA, 其編碼與 SEQ ID NO: 9 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-2 蛋白質, 及/或包含與 SEQ ID NO: 12 或 13 之核苷酸具有至少 95% 一致性之核苷酸。

具體例 214. 一種組成物, 其包含:

- a. RNA, 其編碼與 SEQ ID NO: 14 之胺基酸序列具有至少 95%

一致性之 IL-12sc 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 17 或 18 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸；

- b. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 27 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 GM-CSF 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 29 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸；
- c. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 19 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IFN α 2b 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 22 或 23 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸；以及
- d. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 24 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-15 sushi 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 26 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸。

具體例 215. 一種組成物，其包含：

- a. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 14 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-12sc 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 17 或 18 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸；
- b. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 27 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 GM-CSF 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 29 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸；
- c. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 19 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IFN α 2b 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 22 或 23 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸；以及
- d. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 9 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-2 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 12 或 13 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸。

具體例 216. 一種組成物，其包含：

- a. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 14 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-12sc 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 17 或 18 之核苷酸具有至少 95% 一致性之核苷酸；
- b. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 27 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 GM-CSF 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 29 之核苷酸具有至少 95% 一致性之核苷酸；
- c. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 24 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-15 sushi 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 26 之核苷酸具有至少 95% 一致性之核苷酸；以及
- d. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 9 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-2 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 12 或 13 之核苷酸具有至少 95% 一致性之核苷酸。

具體例 217. 一種組成物，其包含：

- a. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 14 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-12sc 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 17 或 18 之核苷酸具有至少 95% 一致性之核苷酸；
- b. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 19 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IFN α 2b 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 22 或 23 之核苷酸具有至少 95% 一致性之核苷酸；
- c. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 24 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-15 sushi 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 26 之核苷酸具有至少 95% 一致性之核苷酸；以及
- d. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 9 之胺基酸序列具有至少 95%

一致性之 IL-2 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 12 或 13 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸。

具體例 218. 一種組成物，其包含：

- a. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 27 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 GM-CSF 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 29 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸；
- b. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 19 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IFN α 2b 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 22 或 23 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸；
- c. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 24 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-15 sushi 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 26 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸；以及
- d. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 9 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-2 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 12 或 13 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸。

具體例 219. 一種組成物，其包含：

- a. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 14 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-12sc 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 17 或 18 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸；
- b. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 27 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 GM-CSF 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 29 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸；
- c. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 19 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IFN α 2b 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 22 或

23 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸；

- d. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 24 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-15 sushi 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 26 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸；以及
- e. RNA，其編碼與 SEQ ID NO: 9 之胺基酸序列具有至少 95% 一致性之 IL-2 蛋白質，及/或包含與 SEQ ID NO: 12 或 13 之核苷酸具有至少 95%一致性之核苷酸。

具體例 220. 一種醫藥調配物，其包含具體例 181 至 219 之組成物中之任一者。

具體例 221. 一種醫藥調配物，其包含具體例 181 至 219 之組成物中之任一者及醫藥學上可接受之賦形劑。

具體例 222. 如具體例 181 至 219 中任一項之組成物或如具體例 220 或 221 之醫藥調配物，其用於治療或預防癌症之方法中。

具體例 223. 如具體例 181 至 219 中任一項之組成物或如具體例 220 或 221 之醫藥調配物，其用於減小腫瘤大小之方法中。

具體例 224. 如具體例 181 至 219 中任一項之組成物或如具體例 220 或 221 之醫藥調配物，其用於預防處於緩解中之癌症復發之方法中。

具體例 225. 如具體例 181 至 219 中任一項之組成物或如具體例 220 或 221 之醫藥調配物，其用於預防癌轉移之方法中。

具體例 226. 一種用於治療或預防癌症之方法，其包含投與具體例 181 至 219 中任一項之組成物或具體例 220 或 221 之醫藥調配物。

具體例 227. 一種用於減小腫瘤大小之方法，其包含投與具體例 181 至 219 中任一項之組成物或具體例 220 或 221 之醫藥調配物。

具體例 228. 一種用於預防處於緩解中之癌症復發之方法，其包含投與具體例 181 至 219 中任一項之組成物或具體例 220 或 221 之醫藥調配物。

具體例 229. 一種用於預防癌轉移之方法，其包含投與如具體例 181 至 219 中任一項之組成物或如具體例 220 或 221 之醫藥調配物。

【0006】 本發明之其他具體例如下：

具體例 A 1. 一種醫學製劑，其包含編碼 IL-12sc 蛋白質之 RNA 及編碼 GM-CSF 蛋白質之 RNA。

具體例 A 2. 如具體例 A 1 之醫學製劑，其進一步包含編碼 IL-15 sushi 蛋白質之 RNA。

具體例 A 3. 如具體例 A 1 或 2 之醫學製劑，其進一步包含編碼 IL-2 蛋白質之 RNA。

具體例 A 4. 如具體例 A 1 至 3 中任一項之醫學製劑，其進一步包含編碼 IFN α 蛋白質之 RNA。

具體例 A 5. 如具體例 A 4 之醫學製劑，其中，該 IFN α 蛋白質為 IFN α 2b 蛋白質。

具體例 A 6. 如具體例 A 2 之醫學製劑，其包含編碼 IL-12sc 蛋白質之 RNA、編碼 GM-CSF 蛋白質之 RNA 及編碼 IL-15 sushi 蛋白質之 RNA。

具體例 A 7. 如具體例 A 3 之醫學製劑，其包含編碼 IL-12sc 蛋白質之 RNA、編碼 GM-CSF 蛋白質之 RNA 及編碼 IL-2 蛋白質之 RNA。

具體例 A 8. 如具體例 A 4 或 5 之醫學製劑，其包含編碼 IL-12sc 蛋白質之 RNA、編碼 GM-CSF 蛋白質之 RNA 及編碼 IFN α 蛋白質之 RNA。

具體例 A 9. 如具體例 A 4 或 5 之醫學製劑，其包含編碼 IL-12sc 蛋白質之 RNA、編碼 GM-CSF 蛋白質之 RNA、編碼 IL-15 sushi 蛋白質之 RNA

及編碼 IFN α 蛋白質之 RNA。

具體例 A 10. 如具體例 A 4 或 5 之醫學製劑，其包含編碼 IL-12sc 蛋白質之 RNA、編碼 GM-CSF 蛋白質之 RNA、編碼 IL-2 蛋白質之 RNA 及編碼 IFN α 蛋白質之 RNA。

具體例 A 11. 如具體例 A 1 至 10 中任一項之醫學製劑，其中，(i)該編碼 IL-12sc 蛋白質之 RNA 包含 SEQ ID NO: 17 或 18 之核苷酸序列，或與 SEQ ID NO: 17 或 18 之核苷酸序列具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸序列；及/或(ii)該 IL-12sc 蛋白質包含 SEQ ID NO: 14 之胺基酸序列，或與 SEQ ID NO: 14 之胺基酸序列具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之胺基酸序列。

具體例 A 12. 如具體例 A 1 至 11 中任一項之醫學製劑，其中，(i)該編碼 GM-CSF 蛋白質之 RNA 包含 SEQ ID NO: 29 之核苷酸序列，或與 SEQ ID NO: 29 之核苷酸序列具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸序列；及/或(ii)該 GM-CSF 蛋白質包含 SEQ ID NO: 27 之胺基酸序列，或與 SEQ ID NO: 27 之胺基酸序列具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之胺基酸序列。

具體例 A 13. 如具體例 A 2 至 12 中任一項之醫學製劑，其中，(i)該編碼 IL-15 sushi 蛋白質之 RNA 包含 SEQ ID NO: 26 之核苷酸序列，或與 SEQ ID NO: 26 之核苷酸序列具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸序列；及/或(ii)該 IL-15 sushi 蛋白質包含 SEQ ID NO: 24 之胺基酸序列，或與 SEQ ID NO: 24 之胺基酸序列具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之胺基

酸序列。

具體例 A 14. 如具體例 A 3 至 13 中任一項之醫學製劑，其中，(i)該編碼 IL-2 蛋白質之 RNA 包含 SEQ ID NO: 12 或 13 之核苷酸序列，或與 SEQ ID NO: 12 或 13 之核苷酸序列具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸序列；及/或(ii)該 IL-2 蛋白質包含 SEQ ID NO: 9 之胺基酸序列，或與 SEQ ID NO: 9 之胺基酸序列具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之胺基酸序列。

具體例 A 15. 如具體例 4 至 14 中任一項之醫學製劑，其中，(i)該編碼 IFN α 蛋白質之 RNA 包含 SEQ ID NO: 22 或 23 之核苷酸序列，或與 SEQ ID NO: 22 或 23 之核苷酸序列具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸序列；及/或(ii)該 IFN α 蛋白質包含 SEQ ID NO: 19 之胺基酸序列，或與 SEQ ID NO: 19 之胺基酸序列具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之胺基酸序列。

具體例 A 16. 如具體例 A 1 至 15 中任一項之醫學製劑，其中，至少一個 RNA 包含替代至少一個尿苷之修飾核鹼基。

具體例 A 17. 如具體例 A 1 至 16 中任一項之醫學製劑，其中，各 RNA 包含替代至少一個尿苷之修飾核鹼基。

具體例 A 18. 如具體例 A 1 至 17 中任一項之醫學製劑，其中，各 RNA 包含替代各尿苷之修飾核鹼基。

具體例 A 19. 如具體例 A 16 至 18 中任一項之醫學製劑，其中，該修飾核鹼基為假尿苷(ψ)、N1-甲基-假尿苷(m1 ψ)或 5-甲基-尿苷(m5U)。

具體例 A 20. 如具體例 A 19 之醫學製劑，其中，該修飾核鹼基為 N1-甲

基-假尿苷(m¹ψ)。

具體例 A 21. 如具體例 A 1 至 20 中任一項之醫學製劑，其中，至少一個 RNA 包含 5'端帽。

具體例 A 22. 如具體例 A 1 至 21 中任一項之醫學製劑，其中，各 RNA 包含 5'端帽。

具體例 A 23. 如具體例 A 21 或 22 之醫學製劑，其中，該 5'端帽為 $m_2^{7,3'-O}Gppp(m_1^{2'-O})ApG$ 或 $3'-O-Me-m^7G(5')ppp(5')G$ 。

具體例 A 24. 如具體例 A 1 至 23 中任一項之醫學製劑，其中，至少一個 RNA 包含 5' UTR。

具體例 A 25. 如具體例 A 1 至 24 中任一項之醫學製劑，其中，各 RNA 包含 5' UTR。

具體例 A 26. 如具體例 A 24 或 25 之醫學製劑，其中，該 5' UTR 包含選自由 SEQ ID NO: 2、4 及 6 組成之群之核苷酸序列，或與選自由 SEQ ID NO: 2、4 及 6 組成之群之核苷酸序列具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸序列。

具體例 A 27. 如具體例 A 1 至 26 中任一項之醫學製劑，其中，至少一個 RNA 包含 3' UTR。

具體例 A 28. 如具體例 A 1 至 27 中任一項之醫學製劑，其中，各 RNA 包含 3' UTR。

具體例 A 29. 如具體例 A 27 或 28 之醫學製劑，其中，該 3' UTR 包含 SEQ ID NO: 8 之核苷酸序列，或與 SEQ ID NO: 8 之核苷酸序列具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸序列。

具體例 A 30. 如具體例 A 1 至 29 中任一項之醫學製劑，其中，至少一個

RNA 包含多腺苷酸尾。

具體例 A 31. 如具體例 A 1 至 30 中任一項之醫學製劑，其中，各 RNA 包含多腺苷酸尾。

具體例 A 32. 如具體例 A 30 或 31 之醫學製劑，其中，該多腺苷酸尾包含至少 100 個核苷酸。

具體例 A 33. 如具體例 A 1 至 32 中任一項之醫學製劑，其中，至少一個 RNA 包含 5'端帽、5' UTR、3' UTR 及多腺苷酸尾。

具體例 A 34. 如具體例 A 1 至 33 中任一項之醫學製劑，其中，各 RNA 包含 5'端帽、5' UTR、3' UTR 及多腺苷酸尾。

具體例 A 35. 如具體例 A 33 或 34 之醫學製劑，其中，

- a. 該 5'端帽為 $m_2^{7,3'-O}Gppp(m_1^{2'-O})ApG$ 或 $3'-O-Me-m^7G(5')ppp(5')G$ ；
- b. 該 5' UTR 包含選自由 SEQ ID NO: 2、4 及 6 組成之群之核苷酸序列，或與選自由 SEQ ID NO: 2、4 及 6 組成之群之核苷酸序列具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸序列；
- c. 該 3' UTR 包含 SEQ ID NO: 8 之核苷酸序列，或與 SEQ ID NO: 8 之核苷酸序列具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸序列；以及
- d. 該多腺苷酸尾包含至少 100 個核苷酸。

具體例 A 36. 如具體例 A 1 至 35 中任一項之醫學製劑，其中，該 RNA 為 mRNA。

具體例 A 37. 如具體例 A 1 至 36 中任一項之醫學製劑，其包含其他治療劑。

具體例 A 38. 如具體例 A 37 之醫學製劑，其中，該其他治療劑為抗癌治

療劑。

具體例 A 39. 如具體例 A 37 或 38 之醫學製劑，其中，該其他治療劑為檢查點調節劑。

具體例 A 40. 如具體例 A 39 之醫學製劑，其中，該檢查點調節劑為抗 PD1 抗體、抗 CTLA-4 抗體或抗 PD1 抗體與抗 CTLA-4 抗體之組合。

具體例 A 41. 如具體例 A 1 至 40 中任一項之醫學製劑，其為包含至少兩個容器之套組，各容器包含該等 RNA 中之至少一者。

具體例 A 42. 如具體例 A 41 之醫學製劑，其包含在獨立容器中之各 RNA。

具體例 A 43. 如具體例 A 41 或 42 之醫學製劑，其中，該其他治療劑在不包含該 RNA 之容器中。

具體例 A 44. 如具體例 A 41 至 43 中任一項之醫學製劑，其進一步包含該治療或預防癌症用之醫學製劑之使用說明書。

具體例 A 45. 如具體例 A 1 至 40 中任一項之醫學製劑，其為包含該等 RNA 之醫藥組成物。

具體例 A 46. 如具體例 A 45 之醫學製劑，其中，該醫藥組成物進一步包含一或多種醫藥學上可接受之載劑、稀釋劑及/或賦形劑。

具體例 A 47. 如具體例 A 1 至 46 中任一項之醫學製劑，其中，該 RNA 以選自液體形式、固體形式或其組合之形式存在。

具體例 A 48. 如具體例 A 47 之醫學製劑，其中，該固體形式為冷凍形式或脫水形式。

具體例 A 49. 如具體例 A 48 之醫學製劑，其中，該脫水形式為凍乾或噴霧乾燥形式。

具體例 A 50. 如具體例 A 1 至 49 中任一項之醫學製劑，其用於醫藥用途。

具體例 A 51. 如具體例 A 50 之醫學製劑，其中，該醫藥用途包含治療性

或預防性治療疾病或病症。

具體例 A 52. 如具體例 A 1 至 51 中任一項之醫學製劑，其用於治療或預防癌症用之方法中。

具體例 A 53. 如具體例 A 38 至 52 中任一項之醫學製劑，其中，該癌症為肉瘤、癌瘤或淋巴瘤。

具體例 A 54. 如具體例 A 38 至 53 中任一項之醫學製劑，其中，該癌症為實體腫瘤。

具體例 A 55. 如具體例 A 54 之醫學製劑，其中，該實體腫瘤在肺、結腸、卵巢、子宮頸、子宮、腹膜、睪丸、陰莖、舌、淋巴結、胰臟、骨、乳房、前列腺、軟組織、結締組織、腎臟、肝、腦、甲狀腺或皮膚中。

具體例 A 56. 如具體例 A 54 或 55 之醫學製劑，其中，該實體腫瘤為上皮腫瘤、何杰金氏淋巴瘤(HL)、非何杰金氏淋巴瘤、前列腺瘤、卵巢瘤、腎細胞瘤、胃腸道瘤、肝癌、結腸直腸瘤、血管瘤、間皮瘤、胰臟瘤、乳房瘤、肉瘤、肺癌、結腸瘤、腦瘤、黑色素瘤、小細胞肺癌、神經母細胞瘤、睪丸瘤、癌瘤、腺癌、神經膠質瘤、精細胞癌瘤、視網膜母細胞瘤或骨肉瘤。

具體例 A 57. 如具體例 A 1 至 56 中任一項之醫學製劑，其中，該 RNA 用於腫瘤內或腫瘤周圍投與。

具體例 A 58. 如具體例 A 37 至 57 中任一項之醫學製劑，其中，該其他治療劑用於全身性投與。

具體例 A 59. 如具體例 A 1 至 58 中任一項之醫學製劑，其用於向人類投與。

具體例 A 60. 如具體例 A 44 及 47 至 59 中任一項之醫學製劑，其中，治療或預防癌症包含減小個體之腫瘤大小、預防處於緩解中之癌症復發

或預防癌轉移。

【0007】 本發明之其他具體例如下：

具體例 B 1. 一種 RNA，其用於治療或預防個體之癌症用之方法中，其中該方法包含投與編碼 IL-12sc 蛋白質之 RNA 及編碼 GM-CSF 蛋白質之 RNA。

具體例 B 2. 如具體例 B 1 之 RNA，其中，該方法進一步包含投與編碼 IL-15 sushi 蛋白質之 RNA。

具體例 B 3. 如具體例 B 1 或 2 之 RNA，其中，該方法進一步包含投與編碼 IL-2 蛋白質之 RNA。

具體例 B 4. 如具體例 B 1 至 3 中任一項之 RNA，其中，該方法進一步包含投與編碼 IFN α 蛋白質之 RNA。

具體例 B 5. 如具體例 B 4 之 RNA，其中，該 IFN α 蛋白質為 IFN α 2b 蛋白質。

具體例 B 6. 如具體例 B 2 之 RNA，其中，該方法包含投與編碼 IL-12sc 蛋白質之 RNA、編碼 GM-CSF 蛋白質之 RNA 及編碼 IL-15 sushi 蛋白質之 RNA。

具體例 B 7. 如具體例 B 3 之 RNA，其中，該方法包含投與編碼 IL-12sc 蛋白質之 RNA、編碼 GM-CSF 蛋白質之 RNA 及編碼 IL-2 蛋白質之 RNA。

具體例 B 8. 如具體例 B 4 或 5 之 RNA，其中，該方法包含投與編碼 IL-12sc 蛋白質之 RNA、編碼 GM-CSF 蛋白質之 RNA 及編碼 IFN α 蛋白質之 RNA。

具體例 B 9. 如具體例 B 4 或 5 之 RNA，其中，該方法包含投與編碼 IL-12sc 蛋白質之 RNA、編碼 GM-CSF 蛋白質之 RNA、編碼 IL-15 sushi

蛋白質之 RNA 及編碼 IFN α 蛋白質之 RNA。

具體例 B 10. 如具體例 B 4 或 5 之 RNA，其中，該方法包含投與編碼 IL-12sc 蛋白質之 RNA、編碼 GM-CSF 蛋白質之 RNA、編碼 IL-2 蛋白質之 RNA 及編碼 IFN α 蛋白質之 RNA。

具體例 B 11. 如具體例 B 1 至 10 中任一項之 RNA，其中，(i)該編碼 IL-12sc 蛋白質之 RNA 包含 SEQ ID NO: 17 或 18 之核苷酸序列，或與 SEQ ID NO: 17 或 18 之核苷酸序列具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸序列；及/或(ii)該 IL-12sc 蛋白質包含 SEQ ID NO: 14 之胺基酸序列，或與 SEQ ID NO: 14 之胺基酸序列具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之胺基酸序列。

具體例 B 12. 如具體例 B 1 至 11 中任一項之 RNA，其中，(i)該編碼 GM-CSF 蛋白質之 RNA 包含 SEQ ID NO: 29 之核苷酸序列，或與 SEQ ID NO: 29 之核苷酸序列具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸序列；及/或(ii)該 GM-CSF 蛋白質包含 SEQ ID NO: 27 之胺基酸序列，或與 SEQ ID NO: 27 之胺基酸序列具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之胺基酸序列。

具體例 B 13. 如具體例 B 2 至 12 中任一項之 RNA，其中，(i)該編碼 IL-15 sushi 蛋白質之 RNA 包含 SEQ ID NO: 26 之核苷酸序列，或與 SEQ ID NO: 26 之核苷酸序列具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸序列；及/或(ii)該 IL-15 sushi 蛋白質包含 SEQ ID NO: 24 之胺基酸序列，或與 SEQ ID NO: 24 之胺基酸序列具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之胺基

酸序列。

具體例 B 14. 如具體例 B 3 至 13 中任一項之 RNA，其中，(i)該編碼 IL-2 蛋白質之 RNA 包含 SEQ ID NO: 12 或 13 之核苷酸序列，或與 SEQ ID NO: 12 或 13 之核苷酸序列具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸序列；及/或(ii)該 IL-2 蛋白質包含 SEQ ID NO: 9 之胺基酸序列，或與 SEQ ID NO: 9 之胺基酸序列具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之胺基酸序列。

具體例 B 15. 如具體例 B 4 至 14 中任一項之 RNA，其中，(i)該編碼 IFN α 蛋白質之 RNA 包含 SEQ ID NO: 22 或 23 之核苷酸序列，或與 SEQ ID NO: 22 或 23 之核苷酸序列具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸序列；及/或(ii)該 IFN α 蛋白質包含 SEQ ID NO: 19 之胺基酸序列，或與 SEQ ID NO: 19 之胺基酸序列具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之胺基酸序列。

具體例 B 16. 如具體例 B 1 至 15 中任一項之 RNA，其中，至少一個 RNA 包含替代至少一個尿苷之修飾核鹼基。

具體例 B 17. 如具體例 B 1 至 16 中任一項之 RNA，其中，各 RNA 包含替代至少一個尿苷之修飾核鹼基。

具體例 B 18. 如具體例 B 1 至 17 中任一項之 RNA，其中，各 RNA 包含替代各尿苷之修飾核鹼基。

具體例 B 19. 如具體例 B 16 至 18 中任一項之 RNA，其中，該修飾核鹼基為假尿苷(ψ)、N1-甲基-假尿苷(m1 ψ)或 5-甲基-尿苷(m5U)。

具體例 B 20. 如具體例 B 19 之 RNA，其中，該修飾核鹼基為 N1-甲基-

假尿苷(m¹ψ)。

具體例 B 21. 如具體例 B 1 至 20 中任一項之 RNA，其中，至少一個 RNA 包含 5'端帽。

具體例 B 22. 如具體例 B 1 至 21 中任一項之 RNA，其中，各 RNA 包含 5'端帽。

具體例 B 23. 如具體例 B 21 或 22 之 RNA，其中，該 5'端帽為 m₂^{7,3'-O}Gppp(m₁^{2'-O})ApG 或 3'-O-Me-m⁷G(5')ppp(5')G。

具體例 B 24. 如具體例 B 1 至 23 中任一項之 RNA，其中，至少一個 RNA 包含 5' UTR。

具體例 B 25. 如具體例 B 1 至 24 中任一項之 RNA，其中各 RNA 包含 5' UTR。

具體例 B 26. 如具體例 B 24 或 25 之 RNA，其中，該 5' UTR 包含選自由 SEQ ID NO: 2、4 及 6 組成之群之核苷酸序列，或與選自由 SEQ ID NO: 2、4 及 6 組成之群之核苷酸序列具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸序列。

具體例 B 27. 如具體例 B 1 至 26 中任一項之 RNA，其中，至少一個 RNA 包含 3' UTR。

具體例 B 28. 如具體例 B 1 至 27 中任一項之 RNA，其中，各 RNA 包含 3' UTR。

具體例 B 29. 如具體例 B 27 或 28 之 RNA，其中，該 3' UTR 包含 SEQ ID NO: 8 之核苷酸序列，或與 SEQ ID NO: 8 之核苷酸序列具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸序列。

具體例 B 30. 如具體例 B 1 至 29 中任一項之 RNA，其中，至少一個 RNA 包含多腺苷酸尾。

具體例 B 31. 如具體例 B 1 至 30 中任一項之 RNA，其中，各 RNA 包含多腺苷酸尾。

具體例 B 32. 如具體例 B 30 或 31 之 RNA，其中，該多腺苷酸尾包含至少 100 個核苷酸。

具體例 B 33. 如具體例 B 1 至 32 中任一項之 RNA，其中，至少一個 RNA 包含 5'端帽、5' UTR、3' UTR 及多腺苷酸尾。

具體例 B 34. 如具體例 B 1 至 33 中任一項之 RNA，其中，各 RNA 包含 5'端帽、5' UTR、3' UTR 及多腺苷酸尾。

具體例 B 35. 如具體例 B 33 或 34 之 RNA，其中，

- a. 該 5'端帽為 $m_2^{7,3'-O}Gppp(m_1^{2'-O})ApG$ 或 $3'-O-Me-m^7G(5')ppp(5')G$ ；
- b. 該 5' UTR 包含選自由 SEQ ID NO: 2、4 及 6 組成之群之核苷酸序列，或與選自由 SEQ ID NO: 2、4 及 6 組成之群之核苷酸序列具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸序列；
- c. 該 3' UTR 包含 SEQ ID NO: 8 之核苷酸序列，或與 SEQ ID NO: 8 之核苷酸序列具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸序列；以及
- d. 該多腺苷酸尾包含至少 100 個核苷酸。

具體例 B 36. 如具體例 B 1 至 35 中任一項之 RNA，其中，該 RNA 為 mRNA。

具體例 B 37. 如具體例 B 1 至 36 中任一項之 RNA，其中，該方法進一步包含投與其他療法。

具體例 B 38. 如具體例 B 37 之 RNA，其中，該其他療法包含選自由以下組成之群之一或多個：(i)對腫瘤進行切除、割除或減積之手術，(ii)免

疫療法，(iii)放射線療法及(iv)化學療法。

具體例 B 39. 如具體例 B 37 或 38 之 RNA，其中，該其他療法包含投與其他治療劑。

具體例 B 40. 如具體例 B 39 之 RNA，其中，該其他治療劑為抗癌治療劑。

具體例 B 41. 如具體例 B 39 或 40 之 RNA，其中，該其他治療劑為檢查點調節劑。

具體例 B 42. 如具體例 B 41 之 RNA，其中，該檢查點調節劑為抗 PD1 抗體、抗 CTLA-4 抗體或抗 PD1 抗體與抗 CTLA-4 抗體之組合。

具體例 B 43. 如具體例 B 1 至 42 中任一項之 RNA，其中，該癌症為肉瘤、癌瘤或淋巴瘤。

具體例 B 44. 如具體例 B 1 至 43 中任一項之 RNA，其中，該癌症為實體腫瘤。

具體例 B 45. 如具體例 B 44 之 RNA，其中，該實體腫瘤在肺、結腸、卵巢、子宮頸、子宮、腹膜、睪丸、陰莖、舌、淋巴結、胰臟、骨、乳房、前列腺、軟組織、結締組織、腎臟、肝、腦、甲狀腺或皮膚中。

具體例 B 46. 如具體例 B 44 或 45 之 RNA，其中，該實體腫瘤為上皮腫瘤、何杰金氏淋巴瘤(HL)、非何杰金氏淋巴瘤、前列腺瘤、卵巢瘤、腎細胞瘤、胃腸道瘤、肝癌、結腸直腸瘤、血管瘤、間皮瘤、胰臟瘤、乳房瘤、肉瘤、肺癌、結腸瘤、腦瘤、黑色素瘤、小細胞肺癌、神經母細胞瘤、睪丸瘤、癌瘤、腺癌、神經膠質瘤、精細胞癌瘤、視網膜母細胞瘤或骨肉瘤。

具體例 B 47. 如具體例 B 1 至 46 中任一項之 RNA，其中，該 RNA 為腫瘤內或腫瘤周圍投與。

具體例 B 48. 如具體例 B 39 至 47 中任一項之 RNA，其中，該其他治療

劑全身性投與。

具體例 B 49. 如具體例 B 1 至 48 中任一項之 RNA，其中，該個體為人類。

具體例 B 50. 如具體例 B 1 至 49 中任一項之 RNA，其中，該等 RNA 同時投與。

具體例 B 51. 如具體例 B 1 至 50 中任一項之 RNA，其中，該等 RNA 藉由投與包含該等 RNA 之組合之組成物來投與。

具體例 B 52. 如具體例 B 1 至 49 中任一項之 RNA，其中，該等 RNA 中之至少兩者在不同時間投與。

具體例 B 53. 如具體例 B 1 至 49 及 52 中任一項之 RNA，其中，該等 RNA 藉由投與至少兩種組成物來投與，各組成物包含該等 RNA 中之至少一者。

具體例 B 54. 如具體例 B 1 至 53 中任一項之 RNA，其中，治療或預防癌症包含減小個體之腫瘤大小、預防處於緩解中之癌症復發或預防癌轉移。

具體例 B 55. 如具體例 B 1 至 54 中任一項之 RNA，其為或包含在該方法中投與之該等 RNA 中之一或多者。

具體例 B 56. 如具體例 B 55 之 RNA，其為或包含選自由以下組成之群之一或多者：編碼 IL-12sc 蛋白質 RNA、編碼 GM-CSF 蛋白質之 RNA、編碼 IL-15 sushi 蛋白質之 RNA、編碼 IL-2 蛋白質之 RNA 及編碼 IFN α 蛋白質之 RNA。

具體例 B 57. 如具體例 B 55 或 56 之 RNA，其為或包含編碼 IL-12sc 蛋白質之 RNA。

具體例 B 58. 如具體例 B 55 或 56 之 RNA，其為或包含編碼 GM-CSF 蛋白質之 RNA。

具體例 B 59. 如具體例 B 55 或 56 之 RNA，其為或包含編碼 IL-15 sushi 蛋白質之 RNA。

具體例 B 60. 如具體例 B 55 或 56 之 RNA，其為或包含編碼 IL-2 蛋白質之 RNA。

具體例 B 61. 如具體例 B 55 或 56 之 RNA，其為或包含編碼 IFN α 蛋白質之 RNA。

具體例 B 62. 如具體例 B 55 或 56 之 RNA，其為包含編碼 IL-12sc 蛋白質之 RNA 及編碼 GM-CSF 蛋白質之 RNA。

具體例 B 63. 如具體例 B 55 或 56 之 RNA，其為或包含編碼 IL-12sc 蛋白質之 RNA、編碼 GM-CSF 蛋白質之 RNA 及編碼 IL-15 sushi 蛋白質之 RNA。

具體例 B 64. 如具體例 B 55 或 56 之 RNA，其為或包含編碼 IL-12sc 蛋白質之 RNA、編碼 GM-CSF 蛋白質之 RNA 及編碼 IL-2 蛋白質之 RNA。

具體例 B 65. 如具體例 B 55 或 56 之 RNA，其為或包含編碼 IL-12sc 蛋白質之 RNA、編碼 GM-CSF 蛋白質之 RNA 及編碼 IFN α 蛋白質之 RNA。

具體例 B 66. 如具體例 B 55 或 56 之 RNA，其為或包含編碼 IL-12sc 蛋白質之 RNA、編碼 GM-CSF 蛋白質之 RNA、編碼 IL-15 sushi 蛋白質之 RNA 及編碼 IFN α 蛋白質之 RNA。

具體例 B 67. 如具體例 B 55 或 56 之 RNA，其為包含編碼 IL-12sc 蛋白質之 RNA、編碼 GM-CSF 蛋白質之 RNA、編碼 IL-2 蛋白質之 RNA 及編碼 IFN α 蛋白質之 RNA。

【圖式簡單說明】

【0008】 圖 1A 至圖 1G 展示實驗結果，其中帶有 B16F10 腫瘤小鼠在第 8、10、12、14 天用 mRNA 腫瘤內注射，且監測個別腫瘤生長至第 41

天。圖 1A 及圖 1D 展示當使用 IL-2、IL-12sc 及 GM-CSF (ModA) mRNA 時之結果。圖 1B 及圖 1E 展示 IL-2、IL-12sc 及 GM-CSF (ModB) mRNA。圖 1C 及圖 1F 展示當使用螢光素酶 mRNA (ModA)時之結果。圖 1G 展示當使用螢光素酶 mRNA (ModB)時之結果。(對於 A 至 C，N=10 隻小鼠/組；且對於 D 至 G，N=9 隻小鼠/組)。

【0009】 圖 2A 至圖 2D 展示實驗結果，其中帶有 CT26 腫瘤小鼠在第 19、21、24、26、28 及 31 天用 mRNA 腫瘤內注射，且監測個別腫瘤生長至第 48 天。圖 2A 展示 GM-CSF、IL-2、IL-12sc (ModA)。圖 2B 展示 GM-CSF、IL-2、IL-12sc (ModB)。圖 2C 展示作為對照之螢光素酶 mRNA (ModA)。圖 2D 展示作為對照之林格氏(Ringer's)溶液。

【0010】 圖 3A 至圖 3C 展示實驗結果，其中帶有 CT26 腫瘤小鼠在第 13、15、18、20 及 22 天用 mRNA 腫瘤內注射，且監測腫瘤生長至第 42 天。圖 3A 展示 IL-2、GM-CSF、IL-12sc (ModB)。圖 3B 展示 IL-15 sushi、GM-CSF、IL-12sc (ModB)。圖 3C 展示作為對照之螢光素酶 mRNA (ModB)。

【0011】 圖 4A 至圖 4F 展示實驗結果，其中帶有 B16F10 腫瘤小鼠在第 11、13、15、17 天用細胞介素 mRNA 混合物腫瘤內注射，且監測個別腫瘤生長至第 45 天。圖 4A 展示 IL-2、IL-12sc 及 GM-CSF (ModA)。圖 4B 為與圖 5A 中所描述相同實驗中之重複，展示 IL-2、IL-12sc 及 GM-CSF (ModB)。圖 4C 展示 IL-15 sushi、IL-12sc 及 GM-CSF (ModA)。圖 4D 為與圖 5B 中所描述相同實驗中之重複，展示 IL-15 sushi、IL-12sc 及 GM-CSF (ModB)。圖 4E 展示對照螢光素酶 mRNA (ModA)。圖 4F 為與圖 5D 及圖 6D 中所描述相同實驗中之重複，展示對照螢光素酶 mRNA (ModB)。(N=8 隻小鼠/組)。

【0012】 圖 5A 至圖 5D 展示實驗結果，其中帶有 B16F10 腫瘤小鼠

在第 11、13、15、17 天用細胞介素 mRNA 混合物腫瘤內注射，且監測個別腫瘤生長至第 45 天。圖 5A 為與圖 4B 中所描述相同實驗中之重複，展示 IL-2、IL-12sc 及 GM-CSF (ModB)。圖 5B 為與圖 4D 中所描述相同實驗中之重複，展示 IL-15 sushi、IL-12sc 及 GM-CSF (ModB)。圖 5C 為與圖 6C 中所描述相同實驗中之重複，展示 IL-2、IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α (ModB)。圖 5D 為與圖 4F 及圖 6D 中所描述相同實驗中之重複，展示作為對照之螢光素酶 mRNA (ModB)。(N=8 隻小鼠/組)。

【0013】 圖 6A 及圖 6B 展示實驗結果，其中帶有 CT26 腫瘤小鼠在第 13、15、17、19、21、23 天用細胞介素 mRNA 混合物腫瘤內注射，且繪製個別腫瘤生長。圖 6A 為與圖 7A 中所描述相同實驗中之重複，展示 GM-CSF、IL-2、IL-12sc、IFN α (ModB)。圖 6B 為與圖 7C 中所描述相同實驗中之重複，展示螢光素酶 mRNA (ModB)。N=8 隻小鼠/組。

【0014】 圖 6C 及圖 6D 展示實驗結果，其中帶有 B16F10 腫瘤小鼠在第 11、13、15、17 天用 mRNA 腫瘤內注射，且繪製個別腫瘤生長。圖 6C 為與圖 5C 中所描述相同實驗中之重複，展示 GM-CSF、IL-2、IL-12sc、IFN α (ModB)。圖 6D 為與圖 4F 及圖 5D 中所描述相同實驗中之重複，展示螢光素酶 mRNA (ModB)。N=8 隻小鼠/組。

【0015】 圖 6E 及圖 6F 展示實驗結果，其中帶有 MC38 腫瘤小鼠在第 11、15、19、23 天用細胞介素 mRNA 混合物腫瘤內注射，且繪製個體腫瘤生長。圖 6E 展示 GM-CSF、IL-2、IL-12sc、IFN α (ModB)。圖 6F 展示螢光素酶 mRNA (ModB)。N=5 隻小鼠/組。

【0016】 圖 7A 至圖 7F 展示實驗結果，其中帶有 CT26 腫瘤小鼠在第 13、15、17、19、21、23 天用細胞介素 mRNA 混合物腫瘤內注射，且繪製個別腫瘤生長。圖 7A 為與圖 6A 中所描述相同實驗中之重複，展示 IL-2、

IL-12sc、GM-CSF、IFN α (ModB)。圖 7B 展示 IL-15 sushi、IL-12sc、GM-CSF、IFN α (ModB)。圖 7C 為與圖 6B 中所描述相同實驗中之重複，展示螢光素酶 mRNA (ModB)對照。在類似設計之重複研究中，帶有 CT26 腫瘤小鼠在第 19、21、23、26、28 及 30 天用細胞介素 mRNA 混合物腫瘤內注射，且繪製個別腫瘤生長。圖 7D 為與圖 9A 中所描述相同實驗中之重複，展示 IL-2、IL-12sc、GM-CSF、IFN α (ModB)。圖 7E 展示 IL-15 sushi、IL-12sc、GM-CSF、IFN α (ModB)。圖 7F 為與圖 9F 中所描述相同實驗中之重複，展示螢光素酶 mRNA (ModB)對照。對於圖 A 至圖 C，N=8 隻小鼠/組；對於圖 D 至圖 F，N=10-11 隻小鼠/組。

【0017】 圖 8A 至圖 8H 展示實驗結果，其中帶有 CT26 腫瘤小鼠在第 12、15、19 及 22 天用 mRNA 腫瘤內注射，且監測並繪製個別腫瘤生長至第 35 天。圖 8A 展示 IL-15 sushi、IL-12sc、GM-CSF、IFN α (ModB)。圖 8B 展示 IL-15 sushi、IL-12sc、IFN α (ModB)。圖 8C 展示 IL-15 sushi、GM-CSF、IFN α (ModB)。圖 8D 展示 GM-CSF、IL-12sc、IFN α (ModB)。圖 8E 展示 IL-15 sushi、GM-CSF、IL-12sc (ModB)。圖 8F 展示螢光素酶 mRNA (ModB)對照。(N=10 隻/組)。圖 8G 及圖 8H 展示圖 8A 至圖 8F 中展示之研究之腫瘤生長動力學。圖 8G 展示所有處理組之直至第 33 天之平均腫瘤體積。圖 8H 展示腫瘤生長壓制。計算直至第 19 天之 T/C (基於平均腫瘤體積之腫瘤/對照)。

【0018】 圖 9A 至圖 9F 展示實驗，其中帶有 CT26 腫瘤小鼠在第 19、21、23、26、28 及 30 天用 mRNA 腫瘤內注射，且監測腫瘤生長至第 50 天。圖 9A 為與圖 7D 中所描述相同實驗中之重複，展示 GM-CSF、IL-2、IL-12sc、IFN α (ModB)。圖 9B 展示 IL-2、IL-12sc、IFN α (ModB)。圖 9C 展示 GM-CSF、IL-2、IFN α (ModB)。圖 9D 展示 GM-CSF、IL-12sc、IFN α (ModB)。圖 9E

展示 GM-CSF、IL-2、IL-12sc (ModB)。圖 9F 為與圖 7F 中所描述相同實驗中之重複，展示作為對照之螢光素酶 mRNA (ModA)。(對於圖 9A 至圖 9E，N=11 隻/組；對於圖 9F，螢光素酶 mRNA 組，N=10)。

【0019】 圖 10A 至圖 10B 展示圖 9 中展示之研究之腫瘤生長動力學。圖 10A 展示所有處理組之直至第 36 天之平均腫瘤體積。圖 10B 展示腫瘤生長壓制。計算直至第 30 天之 T/C (基於平均腫瘤體積之腫瘤/對照)。

【0020】 圖 11 展示來自圖 9 中展示之實驗之資料之長條圖，展示 mRNA 混合物及腫瘤體積顯著減少，其中基於腫瘤體積之 Z 分值及腫瘤體積變化與對照組的平均值之間的比率，將顯著腫瘤減少之處理組中的每一者的小鼠數目與螢光素酶對照組相比。

【0021】 圖 12A 至圖 12D 展示實驗結果，其中小鼠：1)為原生腫瘤，或 2)先前已皮下注射 5×10^5 個 B16F10 細胞且在腫瘤內細胞介素 mRNA 治療之後排斥初始腫瘤。兩個組均用 B16F10 腫瘤再刺激 (re-challenged)。圖 12A 展示腫瘤原生宿主小鼠。圖 12B 展示先前已在用 GM-CSF、IL-15 sushi、IL-12sc、IFN α (ModB)之腫瘤內細胞介素 mRNA 治療之後排斥 B16F10 腫瘤的小鼠。在 B16F10 注射之後監測小鼠 55 天，且繪製各小鼠之腫瘤生長。移植有 B16F10 細胞之所有九隻原生小鼠均發展腫瘤(圖 12A)，而所有八隻無腫瘤小鼠均排斥 B16F10 細胞且不呈現 B16F10 腫瘤生長(圖 12B)。圖 12B 中之曲線無可見資料線，因為所有觀測均為零，亦即與橫軸重疊。圖 12C 展示在腫瘤位點處之局部白斑病之實施例。圖 12D 展示實驗結果，其中小鼠為原生腫瘤(三角形符號)，或已先前皮下注射有 CT26 腫瘤細胞且在腫瘤內細胞介素 mRNA 治療(圓形符號)之後排斥初始腫瘤。兩個組均用 CT26 腫瘤細胞(CT26-WT)或 CT26- Δ gp70 腫瘤細胞再刺激，其中 gp70 抗原決定基已基因剔除。在腫瘤細胞注射之後監測小鼠 21 天。移植有 CT26-WT

細胞之所有九隻但一隻原生小鼠及移植有 CT26- Δ gp70 細胞之所有原生小鼠均發展腫瘤，而所有三隻無腫瘤小鼠均排斥 CT26 腫瘤細胞且分別地不呈現 CT26 及 CT26- Δ gp70 腫瘤生長。

【0022】 圖 13A 至圖 13D 展示實驗結果，其中小鼠在第 0 天在右(注射)及左側腹(未注射)植入 B16F10 腫瘤細胞(圖 13A)。小鼠在右側腫瘤中在第 11、15、19 及 23 天接受一系列 4 個腫瘤內注射 ModB 細胞介素 mRNA (IL-15 sushi、IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α)或 ModB 對照 mRNA (螢光素酶)。平均腫瘤體積 $\pm$ SEM (n=12)針對注射(圖 13B)及對側未注射腫瘤(圖 13C)展示。中值存活率展示於圖 13D 中。

【0023】 圖 14A 至圖 14F 展示實驗結果，其中人類 HEK293 (圖 14B) 及黑色素瘤細胞株(A101D (圖 14C)、A2058 (圖 14D)、A375 (圖 14E)及 Hs294T (圖 14F))用人類細胞介素 mRNA 混合物(IL-12sc、GM-CSF、IL-15 sushi 及 IFN α 2b)以一定範圍內之 mRNA 劑量轉染。在轉染之後 24 小時收集上清液，且用細胞介素特異性 ELISA 測定蛋白質濃度。圖 14A 展示實驗之示意圖。

【0024】 圖 15A 至圖 15B 展示示意圖(圖 15A)及研究結果(圖 15B)，其中用編碼 IL-15 sushi、IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α 2b 之人類細胞介素 mRNA 混合物或個別細胞介素 mRNA 轉染 HEK293 細胞，且在 24 小時處收集條件培養基，稀釋並添加至人類 PBMC。IFN γ 在 24 小時處之 PBMC 培養上清液中量測。(N=6 個供體，平均)。

【0025】 圖 16A 至圖 16E 展示實驗結果，其中帶有人類 A375 腫瘤異種移植之免疫受損小鼠接受編碼人類細胞介素(IL-15 sushi、IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α 2b，「IL15 sushi 混合物」或 IL-2、IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α 2b，「IL2 混合物」)之 ModB mRNA 混合物之單一注射。腫瘤細胞分

解物在注射後之 2 小時、4 小時、8 小時、24 小時、48 小時及 72 小時處製備，且各細胞介素之濃度相對於腫瘤分解物中之總蛋白量測($n=3$ 隻小鼠/時間點， $\pm$ SEM)。圖 16A 展示 IFN α 2b，圖 16B 展示 IL-2，圖 16C 展示 IL-12sc，圖 16D 展示 IL-15 sushi，及圖 16E 展示 GM-CSF。

【0026】 圖 17A 至圖 17C 展示實驗結果，其中 mRNA 在注射 ModB 細胞介素 mRNA 混合物(IL-15 sushi、IL-12sc、GM-CSF、IFN α 2b；或 IL-2、IL-12sc、GM-CSF、IFN α 2b)後 2 小時、4 小時、8 小時、24 小時、48 小時及 72 小時處自 A375 腫瘤分離。干擾素 α 反應基因之表現藉由 qPCR 監測。圖 17A 展示人類 ISG15，圖 17B 展示人類 ISG54，及圖 17C 展示人類 MX1。

【0027】 圖 18A 至圖 18E 展示實驗結果，其中小鼠植入 B16F10 腫瘤細胞，且用具有或不具有 IFN α 之 mRNA 混合物(FLT3L、IL-2、41BBL 及 CD27L-CD40L)治療。將呈標準(ModA，圖 18B)及修飾形式(ModB，圖 18C)之不具有 IFN α 之 mRNA 混合物與呈標準(ModA，圖 18D)及修飾形式(ModB，圖 18E)之包括 IFN α 之彼等混合物相比。圖 18A 為陰性對照，其中提供不具有 mRNA 之林格氏介質。

【0028】 圖 19A 至圖 19E 展示實驗結果，其中小鼠在一側腹上植入腫瘤，且接受屬於肺之表現螢光素酶之腫瘤細胞的 IV 注射(圖 19A)。處理組中之小鼠接受 mRNA 混合物(IL-15 sushi、IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α)腫瘤內注射至僅側腹腫瘤中，而肺中之腫瘤未加以治療。圖 19B 展示肺中之例示性生物發光量測及在同一天(第 20 天)因此獲得之肺之圖像；腫瘤節點視為黑色標記；圖 19C 展示如藉由卡尺量測所測定之側腹腫瘤平均腫瘤體積；圖 19D 展示第 20 天之生物發光量測之總通量分析；圖 19E 展示肺重量。

【0029】 圖 20A 至圖 20G 展示實驗結果，該等實驗設計成評定與全身性投與抗體組合之腫瘤內注射 mRNA 混合物在雙側腹腫瘤模型中的效

果。植入左及右側腹上之 B16F10 腫瘤或左及右側腹上之 MC38 腫瘤之小鼠接受 IL-15 sushi、IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α (Mod B)之 mRNA 混合物腫瘤內注射至僅一個側腹腫瘤中，而另一側腹腫瘤未加以治療。小鼠亦接受抗 PD1 抗體之腹膜內(全身性)注射。圖 20 展示 B16F10 (圖 20A)及 MC38 (圖 20B)腫瘤模型中之總存活率。圖 20C 至圖 20G 展示評估抗 PD-1 抗體之實驗結果，其中小鼠在一側腹上植入 B16F10 腫瘤，且接受屬於肺之表現螢光素酶之 B16F10 腫瘤細胞的 IV 注射。小鼠接受 IL-15 sushi、IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α 之 mRNA 混合物之三個腫瘤內注射，以及接受抗 PD-1 抗體之三個腹膜內(全身性)注射。SC 腫瘤之腫瘤生長描繪於圖 20C 至圖 20F 中。圖 20C 展示對照 mRNA 及對照抗體；圖 20D 展示對照 mRNA+抗 PD1 抗體；圖 20E 展示細胞介素 mRNA 混合物+同型對照抗體。圖 20F 展示細胞介素 mRNA+抗 PD-1 抗體。圖 20G 展示直至 IV 腫瘤接種 70 天後之所有四個處理組之百分比存活；接受 mRNA+抗 PD-1 抗體之處理組展示最強抗腫瘤活性，其中 6/15 小鼠在腫瘤接種 40 天後無腫瘤。

【0030】 圖 21A 至圖 21I 展示額外實驗結果，該等額外實驗設計成評定與全身性投與抗體組合之 mRNA 混合物之腫瘤內注射的效果。帶有 CT26 腫瘤之小鼠接受 IL-15 sushi、IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α 之 mRNA 混合物之腫瘤內注射。小鼠亦接受抗 CTLA-4 抗體之腹膜內(全身性)注射。圖 21A 展示，腫瘤內細胞介素 mRNA 及 IP 注射抗 CTLA-4 之組合療法產生最強抗腫瘤活性，其中 12/16 小鼠在腫瘤接種 55 天後無腫瘤。圖 21B 展示細胞介素 mRNA 混合物+同型對照抗體；圖 21C 展示對照 mRNA+抗 CTLA-4 抗體；圖 21D 展示對照 mRNA 及對照抗體。圖 21E 至圖 21I 展示額外實驗結果，該等額外實驗設計成評定與抗 CTLA-4 抗體組合之 mRNA 混合物之腫瘤內注射在 B16F10 腫瘤模型中的效果。帶有 B16F10 腫瘤之小鼠接受

IL-15 sushi、IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α 之 mRNA 混合物之腫瘤內注射。小鼠亦接受抗 CTLA-4 抗體之腹膜內(全身性)注射。圖 21E 展示，腫瘤內細胞介素 mRNA 及 IP 注射抗 CTLA-4 之組合療法產生最強抗腫瘤活性，其中 6/9 小鼠在腫瘤接種 70 天後無腫瘤。圖 21F 展示細胞介素 mRNA 混合物+同型對照抗體；圖 21G 展示對照 mRNA+抗 CTLA-4 抗體；圖 21H 展示對照 mRNA 及對照抗體。圖 21I 展示所有四個處理組直至腫瘤接種 70 天後之百分比存活。

【0031】 圖 22A 至圖 22D 展示實驗結果，該等實驗設計成評價細胞介素 mRNA (Mod B)之腫瘤內注射在不同人類癌症之人類腫瘤異種移植中的效果。編碼細胞介素之 4 種 mRNA 中之每一者之腫瘤內表現加以展示：IL-12sc (圖 22A)、IFN α 2b (圖 22B)、GM-CSF (圖 22C)及 IL-15 sushi (圖 22D)。

【0032】 圖 23A 至圖 23D 展示實驗結果，該等實驗設計成評價不同腫瘤內 mRNA 劑量對於所編碼細胞介素之表現的效果：IL-15 sushi (圖 23A)、IL-12sc (圖 23B)、GM-CSF (圖 23C)及 IFN α 2b (圖 23D)。

【0033】 圖 24A 至圖 24F 展示實驗結果，其中小鼠植入 B16F10 腫瘤，且用 IL-15 sushi、IL-12sc、GM-CSF、IFN α (ModB)之細胞介素 mRNA 混合物或編碼單一細胞介素之 mRNA 的四個腫瘤內注射治療。量測大致 70 天之腫瘤體積。圖 24A 展示螢光素酶對照；圖 24B 展示四細胞介素混合物；圖 24C 展示僅 IL-12sc mRNA；圖 24D 展示僅 GM-CSF mRNA；圖 24E 展示僅 IFN α mRNA；以及圖 24F 展示僅 IL-15 sushi。圖 24G 展示用細胞介素 mRNA 混合物或編碼細胞介素之個別 mRNA 治療之 B16F10 腫瘤的總存活率。存活資料來自圖 24A 至圖 24F 中呈現之實驗。

【0034】 圖 25 展示在對照 mRNA (「安慰劑」)及細胞介素 mRNA 治療後之皮下腫瘤中之 CD8+免疫細胞。

【0035】 圖 26A 至圖 26C 展示在帶有 CT26 腫瘤小鼠血液中，針對 gp70 之 gp70 腫瘤抗原具有特異性之 CD8⁺ T 細胞的量測結果，該等小鼠已分別地接受腫瘤內投與細胞介素 mRNA 治療及對照 mRNA。圖 26C 例示性展示用抗小鼠 CD8 抗體及用源於已接受對照 mRNA 之動物之 gp70 特異性四聚體染色之 CD8⁺ T 細胞的 FACS 直方圖；及圖 26B 展示來自用細胞介素 mRNA 治療之一個動物之實施例。圖 26C 展示 gp70 特異性 CD8⁺ T 細胞治療(由已接受對照 mRNA 之四個注射之 9 隻小鼠及已接受細胞介素 mRNA 之 4 個注射之 10 隻小鼠開始) 13 天後之血液中的百分比分析。

【0036】 圖 27A 至圖 27C 展示實驗，其中帶有 B16F10 腫瘤之小鼠在左及右側腹上接受細胞介素 mRNA 之單一腫瘤內 mRNA 注射或在僅一個腫瘤中接受對照 mRNA 之單一腫瘤內 mRNA 注射。在 mRNA 注射後第 7 天，左側及右側腫瘤經收集，且將其 RNA 定序。圖 27B 展示 ingenuity pathway analysis 結果，從而比較細胞介素 mRNA 治療與對照 mRNA 治療腫瘤之間的基因表現變化。進行所治療腫瘤側(行 1)及未治療腫瘤側(行 2)之因果網狀分析，且分析活化 Z 分值(上半部分)及抑制 Z 分值(下半部分)以分別定義上調及下調的路徑。圖 27 展示，注射及未注射腫瘤之叢集分析係基於 327 干擾素 γ 調節基因進行。用細胞介素 mRNA 治療之注射及未注射腫瘤之小鼠兩者均展示相比於用對照 mRNA 治療之小鼠，上調多種 IFN γ 基因。

【0037】 圖 28A 至圖 28D 展示來自 B16F10 雙重腫瘤模型之細胞之螢光顯微圖。A 圖展示用細胞介素 mRNA 治療之注射腫瘤，及 B 圖展示對應未注射腫瘤。圖 C 展示用對照 mRNA 治療之注射腫瘤，及 D 圖展示對應未注射腫瘤。切片進行 CD4⁺、CD8⁺及 FoxP3⁺細胞染色。

【0038】 圖 28E 至圖 28G 展示免疫螢光法影像中定量之 CD4⁺、CD8⁺及 FOXP3⁺細胞之頻率。CD4⁺及 CD8⁺細胞/ mm²之頻率呈現於圖 28E 及圖

28F 中。CD8⁺頻率除以 FOXP3⁺頻率之比率呈現於圖 28G 中。

【0039】 圖 29A 至圖 29G 展示具有單一 B16F10 腫瘤接受編碼 Thy1.1 細胞表面蛋白質之 mRNA 或單獨媒劑(林格氏溶液)之單一注射的小鼠。在大致腫瘤內注射後 16 至 18 小時處，腫瘤進行切除，消化，用一組抗體染色且藉由流式細胞測量術分析。表徵表現 Thy1.1 之細胞之細胞類型及頻率。

【0040】 圖 30A 至圖 30F 展示在各種劑量之細胞介素 mRNA 或螢光素酶對照 mRNA 之後在腫瘤分解物中偵測之指示蛋白質的表現，如實施例 15 中所描述。圖 30E 中之「IFN γ 」指示 IFN γ 。

【0041】 圖 31A 至圖 31B 展示在對照或細胞介素 mRNA 治療後之 CD8⁺及 FOXP3⁺ (Treg)細胞的流式細胞測量術結果，如實施例 15 中所描述。所觀測到之 CD8⁺比 Treg 細胞之比率展示於各圖中。

【0042】 圖 31C 至圖 31D 展示對照或細胞介素 mRNA 治療後之多功能 CD8⁺ T 細胞的流式細胞測量術結果，如實施例 15 中所描述。多功能 CD8⁺ T 細胞之比例展示於各圖中。

【0043】 圖 31E 展示對照或細胞介素 mRNA 治療後之浸潤骨髓細胞上之 PD-L1 位準，如實施例 15 中所描述。

【0044】 圖 31F 展示對照或細胞介素 mRNA 治療後之浸潤 CD8⁺細胞上之 PD-L1 位準，如實施例 15 中所描述。

【0045】 圖 31G 至圖 31H 展示對照或細胞介素 mRNA 治療後之腫瘤內顆粒酶 B CD8⁺ T 細胞之頻率，如實施例 15 中所描述。

【0046】 圖 32A 至圖 32B 展示述腫瘤內注射 50 μ g 編碼螢火蟲螢光素酶之 mRNA 後之各種組織中之螢光素酶表現，如實施例 16 中所描述。

【0047】 圖 33 展示關於基本上如圖 12 中所展示之實驗的資料。

【0048】 圖 34 展示在用細胞介素 mRNA 治療之前消耗 CD8⁺ T 細

胞、CD4+ T 細胞或 NK 細胞對於帶有 B16F10 腫瘤之小鼠之存活的效果，如實施例 17 中所描述。

【0049】 圖 35 展示如實施例 1 中所描述植入 B16F10 腫瘤細胞及如實施例 18 中所描述用對照或細胞介素 mRNA 治療之 WT 及 IFN γ KO 小鼠的存活。

序列描述

【0050】 表 1 及 2 提供本文中參考之某些序列之清單。

表 1：序列(人類序列)描述		
SEQ ID NO:	描述	序列
5' UTR		
1	ModA 5' UTR (DNA)	GGGCGAACTAGTATTCTTCTGGTCCCCACAGACTCAGAGAGAACCCGCCACC
2	ModA 5' UTR (RNA)	GGGCGAACUAGUAUUCUUCUGGUCCCCACAGACUCAGAGAGAACCCGCCACC
3	ModB 5' UTR (DNA)	GGAATAAACTAGTCTCAACACAACATATACAAAACAAACGAATCTCAAGCAATCAAGCATTCTACTTCTATTGCAGCAATTTAAATCATTTCCTTTAAAGCAAAAGCAATTTCTGAAAAATTTCACCATTTACGAACGATAGCC
4	ModB 5' UTR (RNA)	GGAAUAAACUAGUCUCAACACAACAUUACAAAACAAACGAAUCUCAAGCAAUCAAGCAUUCUACUUCUAUUGCAGCAAUUAAAAUCAUUCUUUAAAGCAAAAGCAAUUUCUGAAAAUUUCACCAUUAACGAACGAUAGCC
5	替代性 Mod 5' UTR (DNA)	AGACGAACTAGTATTCTTCTGGTCCCCACAGACTCAGAGAGAACCCGCCACC
6	替代性 Mod 5' UTR (RNA)	AGACGAACUAGUAUUCUUCUGGUCCCCACAGACUCAGAGAGAACCCGCCACC
3' UTR		
7	ModA/B 3' UTR (DNA)	CTCGAGCTGGTACTGCATGCACGCAATGCTAGCTGCCCTTTTCCCGTCCTGGGTACCCCGAGTCTCCCCCGACCTCGGGTCCAGGTATGCTCCACCTCCACCTGCCCCACTCACCACCTCTGCTAGTTCCAGACACCTCCCAAGCACGCAGCAATGCAGCTCAAAACGCTTAGCCTAGCCACACCCCCACGGGAAACAGCAGTGATTAACCTTTAGCAATAAACGAAAGTTTAACTAAGCTATACTAACCCACAGGGTTGGTCAATTTCTGTGCCAGCCACACCGAGACCTGGTCCAGAGTCGCTAGCCGCGTCGCTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCATATGACTAAAAA AA AAAA

8	ModA/B 3' UTR (RNA)	CUCGAGCU GGU ACU GCAUGCACGCAAUGCU AGCU GCCCCU U UCCCGU CCUGGGUACCCC GAGUCUCCCCCGACCU CGGGU CCCAGGU AUGCUCCACCUC CACCUC GCCCCACUCACCAC CUCUGCU AGU UCCAGACACCU CCCAAGCACGCAGCAAUGCAGCU CAAAACGCUUAGCCUA GCCACACCCCCACGGGAAACAGCAGU GAUUAACCUU UAGCAAUAAACGAAAGUUUAACUA AGCUAUACUAACCCCGAGGUUGGU CAU UUCGU GCCAGCCACACCGAGACCU GGUCCAG AGUCGCU AGCCGCGU CGCUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCAU AUGACUA AA AAAAAAA
IL-2		
9	人類 IL-2 (胺 基酸)	MYRMQLLSICIALSLALVTNSAPTSSSTKKTQLQLEHLLLDLQMILNGINNYKNPKLTRMLTFK FYNPKKATELKHLLQCLEEELKPLEEVLNLAQSKNFHLRPRDLISNINVIVLELKGSETTFMCEY ADETATIVEFLNRWITFCQSIISTLT
10	人類非最佳 化 IL-2 (CDS DNA)	ATGTACAGGATGCAACTCCTGTCTTGCAATTGCACTAAGTCTTGCACTTGTCACAAACAGTG CACCTACTTCAAGTTCTACAAAGAAAACACAGCTACAACCTGGAGCATTCTACTGCTGGATT ACAGATGATTTTGAATGGAATTAATAATTACAAGAATCCAAACTCACCAGGATGCTCACA TTTAAGTTTTACATGCCCAAGAAGGCCACAGAACTGAAACATCTTCAGTGTCTAGAAGAAG AACTCAAACCTCTGGAGGAAGTGCTAAATTTAGCTCAAAGCAAAAACTTTCACTTAAGACC CAGGGACTTAATCAGCAATATCAACGTAATAGTTCTGGAACATAAAGGGATCTGAAACAACA TTCATGTGTGAATATGCTGATGAGACAGCAACCATTGTAGAATTTCTGAACAGATGGATTA CCTTTTGTCAAAGCATCATCTCAACACTGACTTGATGA
11	人類最佳化 IL-2 (CDS DNA)	ATGTACAGAATGCAGCTGTGCTTGCAATTGCTCTTTCTCTTGCTCTTGTGACAAATTCTG CTCCAACATCTTCTTCAACAAAGAAAACACAGCTTCAGCTTGAAACACCTTCTTCTTGATCTT CAGATGATTTCTGAATGGAATCAACAATTACAAAAATCCAAACTGACAAGAATGCTGACAT TTAAATTTTACATGCCAAAGAAAGCAACAGAACTGAAACACCTTCAGTGCCTTGAAGAAGA ACTGAAAACCTCTGGAAGAAGTGCTGAATCTGGCTCAGAGCAAAAATTTTCACTGAGACCA AGAGATCTGATCAGCAACATCAATGTGATTGTGCTGGAACATAAAGGATCTGAAACAACAT TCATGTGTGAATATGCTGATGAAACAGCAACAATTGTGGAATTTCTGAACAGATGGATCAC ATTTTGCCAGTCAATCATTTCAACACTGACATGATGA

12	人類非最佳 化 IL-2 (編碼 CDS 之 RNA)	AUGUACAGGAUGCAACUCCUGUCUUGCAUUGCACUAAGUCUUGCACUUGUCACAAACAGU GCACCUACUUCAAGUUCUACAAAGAAAAACACAGCUACAACUGGAGCAUUUACUGCUGGAU UUACAGAUGAUUUUGAAUGGAAUUAUUAUUAACAAGAAUCCCAAACUACCAGGAUGCUC ACAUUUAAGUUUUACAUGCCCAAGAAGGCCACAGAACUGAAACAUCUUCAGUGUCUAGAA GAAGAACUCAAAACCUCUGGAGGAAGUGCUAAAUUAGCUCAAAGCAAAAACUUUCACUUA AGACCCAGGGACUUAUUCAGCAAUAUCAACGUAAUAGUUCUGGAACUAAAAGGGAUCUGAA ACAACAUCUUGUGUGAAUAUGCUGAUGAGACAGCAACCAUUGUAGAAUUUCUGAACAGA UGGAUUACCUUUUGUCAAAAGCAUCAUCUCAACACUGACUUGAUGA
13	人類最佳化 IL-2 (編碼 CDS 之 RNA)	AUGUACAGAAUGCAGCUGCUGUCUUGCAUUGCUCUUUCUCUUGCUCUUGUGACAAAUUCU GCUCCAACAUCUUCUUAACAAAGAAAAACACAGCUUCAGCUUGAACACCUUCUUCUUGAU CUUCAGAUGAUUCUGAAUGGAAUCAACAAUUACAAAAAUCCAAAACUGACAAGAAUGCUG ACAUUUAAAAUUUACAUGCCAAAGAAAGCAACAGAACUGAAACACCUUCAGUGCCUUGAA GAAGAACUGAAACCUCUGGAAGAAGUGCUGAAUCUGGCUCAGAGCAAAAAUUUUCACCU GAGACCAAGAGAUUCUGAUCAGCAACAUAUGUGAUUGUGCUGGAACUGAAAGGAUCUG AAACAACAUCUUGUGUGAAUAUGCUGAUGAAACAGCAACAAUUGUGGAAUUUCUGAACA GAUGGAUCACAUUUUGCCAGUCAAUCAUUUCAACACUGACAUGAUGA
IL-12sc		
14	人類 IL-12sc (胺基酸)	MCHQQLVISWFSLVFLASPLVAIWELKKDVYVVVELDWYPDAPGEMVVLTCDTPEEDGITWTL DQSSEVLGSGKTLTIQVKEFGDAGQYTCHKGGEVLSHSLLLLHKKEDGIWSTIDILKDQKEPKN KTFLRCEAKNYSGRFTCWWLTTISTDLTFSVKSSRGSSDPQGVTCGAATLSAERVGRDNKEYE YSVECQEDSACPAAEESLPIEVMVDAVHKLKYENYTSFFFIRDIIKPDPPKNLQLKPLKNSRQVE VSWEYPDTWSTPHSYFSLTFCVQVQGKSKREKKDRVFTDKTSATVICRKNASISVRAQDRYSS SWSEWASVPCSGSSGGGSPGGGSSRNLPVATPDPGMFPCLLHHSQNLLRAVSNMLQKARQTL EFYPCTSEEIDHEDITKDKTSTVEACLPLELTKNESCLNSRETSFITNGSCLASRKTSFMMALCL SSIYEDLKMYQVEFKTMNAKLLMDPKRQIFLDQNMLAVIDELMQALNFNSETVPOKSSLEEPD FYKTKIKLCILLHAFRIRAVTIDRVMSYLNAS

15	人類非最佳 化 IL-12sc (CDS DNA) 序列註釋 CAPS : p40 域 : CAPS : 連接 子 : CAPS : p35 •	ATGTGTCACCAGCAGTTGGTCATCTCTTGGTTTTCCCTGGTTTTCTGGCATCTCCCCTCGTGGCC ATATGGGAACTGAAGAAAGATGTTTATGTCGTAGAATTGGATTGGTATCCGGATGCCCCCTGGAG AAATGGTGGTCCTCACCTGTGACACCCCTGAAGAAGATGGTATCACCTGGACCTTGGACCAGAG CAGTGAGGTCTTAGGCTCTGGCAAAACCCTGACCATCCAAGTCAAAGAGTTTGGAGATGCTGGC CAGTACACCTGTACAAAGGAGGCGAGGTTCTAAGCCATTCGCTCCTGCTGCTTCACAAAAAGG AAGATGGAATTTGGTCCACTGATATTTTAAAGGACCAGAAAGAACCACAAAAATAAGACCTTTCT AAGATGCGAGGCCAAGAATTATTCTGGACGTTTCACCTGCTGGTGGCTGACGACAATCAGTACT GATTTGACATTCAGTGTCAAAGCAGCAGAGGGTCTTCTGACCCCCAAGGGGTGACGTGCGGAG CTGCTACACTCTCTGCAGAGAGAGTCAGAGGGGACAACAAGGAGTATGAGTACTCAGTGGAGT GCCAGGAGGACAGTGCCCTGCCAGCTGCTGAGGAGAGTCTGCCCATTGAGGTCATGGTGGATGC CGTTCACAAGCTCAAGTATGAAAACCTACACCAGCAGCTTCTTCATCAGGGACATCATCAAACCT GACCCACCCAAGAACTTGCAGCTGAAGCCATTAAAGAATTCTCGCAGGTGGAGGTACGTGG GAGTACCCTGACACCTGGAGTACTCCACATTCTCTCCCTGACATTCTGCGTTTCAGGTCCA GGGCAAGAGCAAGAGAGAAAAAGAAAGATAGAGTCTTCACGGACAAGACCTCAGCCACGGTCAT CTGCCGCAAAAATGCCAGCATTAGCGTGCGGGCCCAGGACCGCTACTATAGCTCATCTTGGAGC GAATGGGCATCTGTGCCCTGCAGTGGCTCTAGCGGAGGGGGAGGCTCTCCTGGCGGGGGATCTA GCAGAAACCTCCCCGTGGCCACTCCAGACCCAGGAATGTTCCCATGCCTTCACCACTCCCA AAACCTGCTGAGGGCCGTCAGCAACATGCTCCAGAAGGCCAGACAAACTCTAGAAATTTA CCCTTGCACTTCTGAGGAAATTGATCATGAAGATATCAGAAAAAGATAAAACCGACACAGTG GAGGCCTGTTTACCATTGGAATTAACCAAGAATGAGAGTTGCCTAAATTCCAGAGAGACCT CTTTCATAACTAATGGGAGTTGCCTGGCCTCCAGAAAGACCTCTTTTATGATGGCCCTGTG CCTTAGTAGTATTTATGAAGACTTGAAGATGTACCAGGTGGAGTTCAAGACCATGAATGCA AAGCTTCTGATGGATCCTAAGAGGCAGATCTTTCTAGATCAAAACATGCTGGCAGTTATTG ATGAGCTGATGCAGGCCCTGAATTTCAACAGTGAGACTGTGCCACAAAAATCCTCCCTTGA AGAACCGGATTTTATAAAACCTAAAAATCAAGCTCTGCATACTTCTTCATGCTTTCAGAATT GGGCAGTGACTATTGATAGAGTGATGAGCTATCTGAATGCTTCCTGATGA
----	---	--

16	人類最佳化 IL-12sc (CDS DNA) 序列註釋 CAPS : p40 域 : CAPS : 連接 子 : CAPS : p35	ATGTGTCACCAGCAGCTGGTGATCTCATGGTTCTCCCTGGTATTTCTGGCATCTCCTCTTGTCGCA ATCTGGGAACTGAAGAAAAGACGTGTATGTCGTTGAGCTCGACTGGTATCCGGATGCGCCTGGCG AGATGGTGCTGACCTGTGACACCCAGAGGAGGATGGGATCACTTGGACCCTTGATCAATC CTCCGAAGTGCTCGGGTCTGGCAAGACTCTGACCATACAAGTGAAAGAGTTTGGCGATGCCGGG CAGTACACTTGCCATAAGGGCGGAGAAAGTTCTGTCCCACTCACTGCTGCTGCTGCACAAGAAAG AGGACGGAATTTGGAGTACCGATATCTGAAAAGATCAGAAAGAGCCCAAGAACAAAACCTTCT TGCGGTGCGAAGCCAAGAACTACTCAGGGAGATTTACTTGTTGGTGGCTGACGACGATCAGCAC CGATCTGACTTTCTCCGTGAAATCAAGTAGGGGATCATCTGACCCTCAAGGAGTCACATGTGGA GCGGCTACTCTGAGCGCTGAACGCGTAAGAGGGGACAATAAGGAGTACGAGTATAGCGTTGAG TGCCAAGAGGATAGCGCATGCCCGCCGCCGAAGAATCATTGCCCATGGAAGTGATGGTGGATG CTGTACACAAGCTGAAGTATGAGAACTACACAAGCTCCTTCTTCATCCGTGACATCATCAAACC AGATCCTCCTAAGAACCTCCAGCTTAAACCTCTGAAGAACTCTAGACAGGTGGAAGTGTCTTGG GAGTATCCCGACACCTGGTCTACACCACATTCTACTTCAGTCTCACATTCTGCGTTCAGGTACA GGGCAAGTCCAAAAGGGAGAAGAAGGATCGGGTCTTTACAGATAAAAACAAGTGCCACCGTTAT ATGCCGGAAGAATGCCTCTATTTCTGTGCGTGCGCAGGACAGATACTATAGCAGCTCTTGGAGT GAATGGGCCAGTGTCCCATGTTCAAGGGTCATCCGGTGGTGGCGGCAGCCCCGAGGCGGTAGCT CCAGAAATCTCCCTGTGGCTACACCTGATCCAGGCATGTTTCCCTGTTTGACCATAGCCA AAACCTCCTGAGAGCAGTCAGCAACATGCTCCAGAAAGCTAGACAAACACTGGAATTCTA CCCATGCACCTCCGAGGAAATAGATCACGAGGATATCACTAAGGACAAAACAAGCACTGT CGAAGCATGCCCTTCCCTTGGAAGTGAACAAGACGAGAGTTGCCTTAATTCAAGAGAAAC ATCTTTCATTACAAACGGTAGCTGCTTGGCAAGCAGAAAAACATCTTTTATGATGGCCCTT TGCTGAGCAGTATTTATGAGGATCTCAAATGTACCAGGTGGAGTTTAAGACCATGAATG CCAAGCTGCTGATGGACCCAAAAGAGACAGATTTTCTCGATCAGAATATGCTGGCTGTGAT TGATGAACTGATGCAGGCCTTGAATTTCAACAGCGAAAACCGTTCCCCAGAAAAGCAGTCTT GAAGAACCTGACTTTTATAAGACCAAGATCAAACCTGTGTATTCTCCTGCATGCCTTTAGAA TCAGAGCAGTCACTATAGATAGAGTGATGTCCTACCTGAATGCTTCCTGATGA
----	---	--

17	人類非最佳 化 IL-12sc (編碼 CDS 之 RNA)	AUGUGUACCAGCAGUUGGUAUCUCUUGGUUUUCCCUGGUUUUCUGGGCAUCUCCCCUC GUGGCCAU AUGGGAACUGAAGAAAGAUUUUAUGUCGUAGAAUUGGAUUGGUAUCCGGA UGCCCCUGGAGAAAUGGUGGUCCUACCCUGUGACACCCUGAAGAAGAUUGGUAUCACCU GGACCUUGGACCAGAGCAGUGAGGUCUUAAGGCUCUGGCAAAAACCCUGACCAUCCAAGUC AAAGAGUUUGGAGAUGCUGGCCAGUACACCUGUCACAAAGGAGGGCGAGGUUCUAAGCCA UUCGCUCCUGCUGCUUCACAAAAAGGAAGAUGGAAUUUGGUCCACUGAUUUUAAAAGGA CCAGAAAGAACCCAAAAAUAGACCUUUCUAAGAUGCGAGGCCAAGAAUUAUUCUGGACG UUUCACCUGCGUGGUGGCGUACGACAAUCAGUACUGAUUUGACAUUCAGUGUCAAAGCA GCAGAGGGUUCUUGACCCCCAAGGGGUGACGUGCGGAGCUGCUACACUCUCUGCAGAG AGAGUCAGAGGGGACAACAAGGAGUAUGAGUACUCAGUGGAGUGCCAGGAGGACAGUGC CUGCCCAGCUGCUGAGGAGAGUCUGCCCAUUGAGGUCAUGGUGGAUGCCGUUCACAAGC UCAAGUAUGAAAAACUACACCAGCAGCUUCUUCUACAGGGACAUCAUCAAACCCUGACCCAC CCAAGAACUUGCAGCUGAAGCCAUUAAGAAUUCUCGGCAGGUGGAGGUCAGCUGGGAG UACCCUGACACCUGGAGUACUCCACAUUCCUACUUCUCCUGACAUUCUGCGUUCAGGUC CAGGGCAAGAGCAAGAGAGAAAAAGAAAGAUAGAGUCUUCACGGACAAGACCUACGCCAC GGUCAUCUGCCGCAAAAAUGCCAGCAUUAAGCGUGCGGGCCCAGGACCGCUACUAUAGCU CAUCUUGGAGCGAAUGGGCAUCUGUGCCCUGCAGUGGCUCUAGCGGAGGGGGAGGCUCU CCUGGCGGGGGAUCUAGCAGAAACCUCCCGUGGCCACUCCAGACCCAGGAAUGUCCC AUGCCUUCACCACUCCCAAAAACCUUGCUGAGGGCCGUCAGCAACAUGCUCCAGAAGGCCAG ACAAACUCUAGAAUUUUACCCUUGCACUUCUGAGGAAAUUGAUCAUGAAGAUUAUCAAAA AGAUA AAAACAGCACAGUGGAGGCCUGUUUACCAUUGGAAUUAACCAAGAAUGAGAGUU GCCUAAAUUCCAGAGAGACCUUUUCAUAACUAAUGGGAGUUGCCUGGCCUCCAGAAAGA CCUCUUUAUGAUGGGCCCUUGGCCUUAAGUAUAUUUAUGAAGACUUGAAGAUGUACCAG GUGGAGUUAAGACCAUGAAUGCAAAGCUUCUGAUGGAUCCUAAGAGGCAGAUUUUCU AGAUCAAAACAU GCUGGCAGUUAUUGAUGAGCUGAUGCAGGCCUGAAUUUCAACAGUG AGACUGUGCCACAAAAUCCUCCCUUGAAGAACCGGAUUUUUAUAAAACUAAAAUCAAGC UCUGCAUACUUCUUAUGCUUUCAGAAUUCGGGCAGUGACUAUUGAUAGAGUGAUGAGC UAUCUGAAUGCUUCCUGAUGA
----	---	---

18	人類最佳化 IL-12sc (編碼 CDS 之 RNA)	AUGUGUCACCAGCAGCUGGUGAUCUCAUGGUUCUCCUGGUAUUUCUGGCAUCUCCUCUU GUCGCAAUCUGGGAACUGAAGAAAGACGUGUAUGUCGUUGAGCUCGACUGGUAUCCGGA UGCGCCUGGCGAGAUGGUGGUGCUGACCCUGUGACACCCAGAGGAGGAUGGGAUCACUU GGACCCUUGAUCAAUCCUCCGAAGUGCUCGGGUCUGGCAAGACUCUGACCAUACAAGUG AAAGAGUUUGGCGAUGCCGGGCAGUACACUUGCCAUAAGGGCGGAGAAGUUCUGUCCCA CUCACUGCUGCUGCUGCACAAGAAAGAGGACGGAAUUGGAGUACCGAUUCCUGAAAAG AUCAGAAAAGAGCCCAAGAACAAAACCUUCUUGCGGUGCGAAGCCAAGAACUACUCAGGG AGAUUUACUUGUUGGUGGCUGACGACGAUCAGCACCGAUCUGACUUUCUCCGUGAAAUC AAGUAGGGGAUCAUCUGACCCUCAAGGAGUCACAUGUGGAGCGGCUACUCUGAGCGCUG AACGCGUAAGAGGGGACAAUAAGGAGUACGAGUAUAGCGUUGAGUGCCAAGAGGAUAGC GCAUGCCCCGCGCCGCGAAGAAUCAUUGCCCAUUGAAGUGAUGGUGGAUGCUGUACACAA GCUGAAGUAUGAGAACUACACAAGCUCCUUCUUAUCCGUGACAUCAUCAAACCAGAUC UCCUAAGAACCUCAGCUUAAAACCUUGAAGAUCUAGACAGGUGGAAGUGUCUUGGG AGUAUCCCGACACCUGGUCUACACCACAUUCCUACUUCAGUCUCACAUUCUGCGUUCAGG UACAGGGCAAGUCCAAAAGGGAGAAAGGAUCGGGUCUUUACAGAUAAAACAAGUGCC ACCGUUAUAUGCCGGAAGAAUGCCUCUAUUUCUGUGCGUGCGCAGGACAGAUACUUAAG CAGCUCUUGGAGUGAAUGGGCCAGUGUCCCAUGUUCAGGGUCAUCCGGUGGUGGCGGCA GCCCCGGAGGCGGUAGCUCCAGAAAUCUCCUGUGGCUACACCUGAUCCAGGCAUGUUU CCCUGUUUGCACCAUAGCCAAAACCUCCUGAGAGCAGUCAGCAACAUGCUCCAGAAAAGCU AGACAAACACUGGAAUUCUACCAUGCACCUCCGAGGAAAUAAGAUACGAGGAUAUCACU AAGGACAAAACAAGCACUGUCGAAGCAUGCCUUCCTUGGAACUGACAAAAGAACGAGAG UUGCCUUAUUCAAGAGAAAACUUCUUAUACAAACGGUAGCUGCUUGGCAAGCAGAAA AACAUUUUAUGAUGGCCCCUUGUCUGAGCAGUAUUUAUGAGGAUCUAAAUAUGUACCA GGUGGAGUUUAAGACCAUGAAUGCCAAGCUGCUGAUGGACCCAAAGAGACAGAUUUUCC UCGAUCAGAAUAUGCUGGCUGUGAUGAUGAACUGAUGCAGGCCUUGAAUUUACAACAGC GAAACCGUUCUCCAGAAAAGCAGUCUUGAAGAACCUGACUUUUUAAGACCAAGAUCAAA CUGUGUAUUCUCCUGCAUGCCUUUAGAAUCAGAGCAGUCACUAUAGAUAGAGUGAUGUCC UACCUGAAUGCUUCCUGAUGA
IFNα2b (IFNα2b)		
19	人類 IFNα2b (胺基酸)	MALTFALLVALLVLSCSSCSVGCDLPQTHSLGSRRTLMLLAQMRRISLFSCLKDRHDFGFPQ EEFGNQFQKAETIPVLHEMIQIIFNLFSTKDSSAAWDETLDDKFTELYQQLNDLEACVIQGVG VTETPLMKEDSILAVRKYFQRITLYLKEKKYSPCAWEVVRAEIMRSFSLSTNLQESLRSKE

20	人類非最佳 化 IFN α 2b (CDS DNA)	ATGGCCTTGACCTTTGCTTTACTGGTGGCCCTCCTGGTGCTCAGCTGCAAGTCAAGCTGCT CTGTGGGCTGTGATCTGCCTCAAACCCACAGCCTGGGTAGCAGGAGGACCTTGATGCTCC TGGCACAGATGAGGAGAATCTCTCTTTTCTCCTGCTTGAAGGACAGACATGACTTTGGATT TCCCCAGGAGGAGTTTGGCAACCAGTTCCAAAAGGCTGAAACCATCCCTGTCCTCCATGA GATGATCCAGCAGATCTTCAACCTTTTCAGCACAAAAGGACTCATCTGCTGCTTGGGATGAG ACCTCCTAGACAAATTCTACACTGAACTCTACCAGCAGCTGAATGACCTGGAAGCCTGTG TGATACAGGGGGTGGGGGTGACAGAGACTCCCCTGATGAAGGAGGACTCCATTCTGGCTG TGAGGAAATACTTCCAAAGAATCACTCTCTATCTGAAAGAGAAGAAATACAGCCCTTGTGC CTGGGAGGTTGTGAGAGCAGAAATCATGAGATCTTTTCTTTGTCAACAACTTGCAAGAA AGTTTAAGAAGTAAGGAATGATGA
21	人類最佳化 IFN α 2b (CDS DNA)	ATGGCCCTGACTTTTGCCCTTCTCGTGGCTTTGTTGGTGCTGAGTTGCAAATCTTCTGTGTA GTGTCGGATGTGATCTGCCTCAAACCCACAGTCTGGGATCTAGGAGAACACTGATGCTGT TGGCACAGATGAGGAGAAATTAGCCTCTTTTCTGCCTGAAGGATAGACATGACTTCGGCTT TCCCCAAGAGGAGTTTGGCAATCAGTTCCAGAAAGCGGAAACGATTCCCGTTCTGCACGA GATGATCCAGCAGATCTTCAACCTCTTTTCAACCAAAGACAGCTCAGCAGCCTGGGATGAG ACACTGCTGGACAAATTCTACACAGAACTGTATCAGCAGCTTAACGATCTGGAGGCATGC GTGATCCAAGGGGTTGGTGTGACTGAAACTCCGCTTATGAAGGAGGACTCCATTCTGGCT GTACGGAAGTACTTCCAGAGAATAACCTCTATCTGAAGGAGAAGAAGTACTCACCATGT GCTTGGGAAGTCGTGAGAGCCGAAATCATGAGATCCTTCAGCCTTAGCACCAATCTCCAG GAATCTCTGAGAAGCAAAGAGTGATGA
22	人類非最佳 化 IFN α 2b (編碼 CDS 之 RNA)	AUGGCCUUGACCUUUGCUUUACUGGUGGCCCUCCUGGUGCUCAGCUGCAAGUCAAGCUG CUCUGUGGGCUGUGAUCUGCCUCAACCCACAGCCUGGGUAGCAGGAGGACCUUGAUGC UCCUGGCACAGAUAGGAGAAUCUCUCUUUUCUCCUGCUUGAAGGACAGACAUGACUUU GGAUUUCCCCAGGAGGAGUUUGGCAACCAGUUCCAAAGGCUGAAACCAUCCUGUCCU CCAUGAGAUGAUCCAGCAGAUUCUUAACCUUUUCAGCACAAAGGACUCAUCUGCUGCUUG GGAUGAGACCCUCCUAGACAAAUCUACACUGAACUCUACCAGCAGCUGAAUGACCUGGA AGCCUGUGUGAUACAGGGGGUGGGGGUGACAGAGACUCCCGUGAUGAAGGAGGACUCCA UUCUGGCUGUGAGGAAAUAUUCUCAAAGAAUCACUCUCUAUCUGAAAGAGAAGAAUAACA GCCCUUGUGCCUGGGAGGUUGUCAGAGCAGAAAUCAUGAGAUCUUUUUCUUUGUCAACA AACUUGCAAGAAAGUUUAAGAAGUAAGGAAUGAUGA

23	人類最佳化 IFNα2b (編碼 CDS 之 RNA)	AUGGCCCUAGACUUUUGCCCUUCUCGUGGCUUUGUUGGUGCUGAGUUGCAAAUCUCCUG UAGUGUCGGAUGUGAUCUGCCUCAAACCCACAGUCUGGGAUUAGGAGAACACUGAUGC UGUUGGCACAGAUGAGGAGAAUAGCCUUCUUUCCUGCCUGAAGGAUAGACAUGACUUC GGCUUCCCCAAGAGGAGUUUGGCAAUCAGUUCAGAAAAGCGGAAACGAUUCGCGUUCU GCACGAGAUGAUCCAGCAGAUUCUUAACCUCUUUUAACCAAAGACAGCUCAGCAGCCUG GGAUGAGACACUGCUGGACAAAUCUACACAGAACUGUAUCAGCAGCUUAACGAUCUGG AGGCAUGCGUGAUCCAAGGGGUUGGUGUGACUGAAACUCCGCUUAUGAAGGAGGACUCC AUUCUGGCUGUACGGAAGUACUCCAGAGAAUAACCCUCUAUCUGAAGGAGAAGAAGUA CUCACCAUGUGCUUGGGAAGUCGUGAGAGCCGAAAUCAUGAGAUCCUUCAGCCUAGCA CCAAUCUCCAGGAAUCUCUGAGAAGCAAAGAGUGAUGA
IL-15 sushi		
24	人類 IL-15 sushi (胺基酸)	MAPRRARGCRTLGLPALLLLLLLRPPATRGITCPPPMSVEHADIWVKSYSLSRERYICNSGFK RKAGTSSLTECVLNKATNVAHWTTPSLKCIKIRDPALVHQRPAAPPGGSGGGGSGGGSGGGGSL QNWVNVISDLKKIEDLIQSMHIDATLYTESDVHPSCKVTAMKCFLELQVISLESGDASIHDTVE NLILANNSLSSNGNVTESGCKECEELKEKNIKEFLOSFVHIVQMFINTS
25	人類 IL-15 sushi (CDS DNA) 序列註釋 CAPS : IL-15 sushi : CAPS : 連接 子 ; CAPS : 成熟 IL-15	ATGGCCCCGCGGCGGGCGCGGGCTGCCGGACCCTCGGTCTCCCGGCGCTGCTACTGCTGCTGC TGCTCCGCGCCGCGCGGACGCGGGGCATCACGTGCCCTCCCCCATGTCCGTGGAACACGCAGA CATCTGGGTCAAGAGCTACAGCTTGACTCCAGGGAGCGGTACATTGTAACTCTGGTTTCAAG CGTAAAGCCGGCACGTCCAGCCTGACGGAGTGCGTGTGAACAAGGCCACGAATGTCGCCCACT GGACAACCCCCAGTCTCAAATGCATTAGAGACCCTGCCCTGGTTCACCAAAGGCCAGCGCCACC CGGGGGAGGATCTGGCGGCGGTGGGTCTGGCGGGGGATCTGGCGGAGGAGGAAGCTTACAGAA CTGGGTGAATGTAATAAGTGATTTGAAAAAATTGAAGATCTTATTCAATCTATGCATATT GATGCTACTTTATATACGGAAAGTGATGTTACCCAGTTGCAAAGTAACAGCAATGAAGT GCTTTCTCTTGGAGTTACAAGTTATTTCACTTGAGTCCGGAGATGCAAGTATTTCATGATAC AGTAGAAAAATCTGATCATCCTAGCAACAACAGTTTGTCTTCTAATGGGAATGTAACAGAA TCTGGATGCAAGAATGTGAGGAACTGGAGGAAAAAATATTAAAGAATTTTTGCAGAGTT TTGTACATATTGTCAAATGTTTCATCAACACTTCTTGATGA

• •

29	人類 GM-CSF (編 碼 CDS 之 RNA)	AUGUGGCUCCAGAGCCUGCUGCUCUUGGGCACUGUGGCCUGCUCCAUCUCUGCACCCGC CCGCUCGCCCAGCCCCAGCACGCAGCCUGGGAGCAUGUGAAUGCCAUCCAGGAGGCC GGCGUCUGCUGAACCCUGAGUAGAGACACUGCUGCUGAGAUGAAUGAAACAGUAGAAGUC AUCUCAGAAAUGUUUGACCUCAGGAGCCGACCUGCCUACAGACCCGCCUGGAGCUGUA CAAGCAGGGCCUGCGGGGCAGCCUACCAAGCUC AAGGGCCCCUUGACCAUGAUGGCCA GCCACUACAAGCAGCACUGCCCUCCAACCCGGAAACUCCUGUGCAACCCAGAUUAUCA CCUUUGAAAGUUUCAAGAGAAACCUGAAGGACUUUCUGCUUGUCAUCCCCUUGACUGCU GGGAGCCAGUCCAGGAGUGAUGA
----	------------------------------------	---

表 2：序列(本發明之小鼠序列及其他序列)描述		
SEQ ID NO:	描述	序列
IL-2 小鼠		
30	ModA IL-2 (胺基酸，與小鼠最佳化分泌序列組合之人類 IL-2)	MRVTAPRTLILLLSGALALTETWAGSGSAPTSSSTKKTQLQLEHLLLDLQMILNGINNYKNPKL TRMLTFKFYMPKKATELKHILQCLEEELKPLEEVNLNLAQSKNFHLRPRDLISINIVIVLEIKGSE TTFMCEYADETATIVEFLNRWITFCQSIISTLT
31	ModA IL-2 (DNA：5' UTR-CDS-3' UTR)	GGGCGAACTAGTATTCTTCTGGTCCCCACAGACTCAGAGAGAACCCGCCACCATGAGAGT GACCGCCCCCAGAACCCCTGATCCTGCTGCTGTCTGGCGCCCTGGCCCTGACAGAGACATG GGCCGGAAGCGGATCCGCACCTACTTCAAGTTCTACAAAGAAAACACAGCTACAACCTGGA GCATTTACTTCTGGATTTACAGATGATTTTGAATGGAATTAATAATTACAAGAATCCCAA CTCACCAGGATGCTCACATTTAAGTTTTACATGCCCAAGAAGGCCACAGAACTGAAACATC TTCAGTGTCTAGAAGAAGAAGCTCAAACCTCTGGAGGAAGTGCTAAATTTAGCTCAAAAGCAA AACTTTTCACTTAAGACCCAGGGACTTAATCAGCAATATCAACGTAATAGTTCTGGAACTA AAGGGATCTGAAACAACATTCATGTGTGAATATGCTGATGAGACAGCAACCATTTGTAGAAT TTCTGAACAGATGGATTACCTTTTGTCAAAGCATCATCTCAACACTGACTTGACTCGAGAG CTCGCTTTCCTGCTGTCCAATTTCTATTAAAGGTTCCCTTTGTTCCCTAAGTCCAACCTACTAA ACTGGGGGATATTATGAAGGGCCTTGAGCATCTGGATTCTGCCTAATAAAAAACATTATT TTCAATTGCTGCGTCTGAGAGCTCGCTTCTTGCTGTCCAATTTCTATTAAAGGTTCCCTTTGT CCCTAAGTCCAACCTACTAAACTGGGGGATATTATGAAGGGCCTTGAGCATCTGGATTCTGC CTAATAAAAAACATTTATTTTTCATTGCTGCGTCTGAGACCTGGTCCAGAGTCGCTAGCAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCATATGACTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA

32	ModA IL-2 (RNA)	GGGCGAACUAGU <u>AUUCUUCUGGU</u> CCCCACAGACUCAGAGAGAACCCGCCACCAUGAGAG UGACCGCCCCCAGAACCCUGAUCCUGCUGCUGUCUGGGCGCCCUGGCCCUGACAGAGACA UGGGCCGGAAGCGGAUCCGCACCUACUUC <u>AAAGUUCU</u> ACAAAAGAAAAACAGCUACAACUG GAGCAUUUACUUCUGGAUUUACAGAU <u>GAUUUUGAAUGGAAU</u> UAAUAAUACAAGAAUCCC AAACUCACCAGGAUGCUCACAUUU <u>AAGUUU</u> ACAUGCCCCAAGAAGGCCACAGAACUGAAA CAUCUUCAGUGUCUAGAAGAAGAACUCAAACCCUCUGGAGGAAGUGCUAAAUUUAGCUCAA AGCAAAAA <u>CUUUCACU</u> AAAGACCCAGGGACUAAUCAGCAAUAUCAACGUAAUAGUUCUG GAACUAAAAGGGAUCUGAAACAACAUUCAUGUGUGAAUAUGCUGAUGAGACAGCAACCAU GUAGAAUUUCUGAAACAGAU <u>GGAUUACCUUUUGU</u> CAAAGCAUCAUCUCAACACUGACUUGA CUCGAGAGCUCGCUUUCUUGCUGUCCA <u>UUUCUAUUAAAGGU</u> UCCUUUGUCCCUAAGUC CAACUACUAAACUGGGGGAUAAU <u>UUGAAGGGCCU</u> UGAGCAUCUGGAUUCUGCCUAAUAA AAAACAUUAAUUU <u>CAUUGCUGCGUCGAGAGCUC</u> GUUCUUGCUGUCCA <u>UUUCUAUUA</u> AAGGUUCCUUUGUCCCUAAGUCCAACUACUAAACUGGGGGAUAAU <u>UUGAAGGGCCU</u> UG AGCAUCUGGAUUCUGCCUAAUAAAAA <u>CAUUUAAUUU</u> CAUUGCUGCGUCGAGACCUGGUC CAGAGUCGCUAGCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCAU <u>UAGACU</u> AAAAAA AA AA
33	ModB IL-2 (氨基酸)	MGAMAPRTLLLLLAAALAPTQT <u>TRAGPGS</u> APTSSSTKKTQLQLEHLLLDLQMILNGINNYKNPK LTRMLTFKFYMPKKATELKHLQCLEEELKPLEEVLNLAQSKNFHLRPRDLISNINVIVLELKGS ETTFMCEYADETATIVEFLNRWITFCQSHSTLT

34	ModB IL-2 (DNA : 5' UTR-CDS-3' UTR)	GGAATAAACTAGTCTCAACACAACATATACAAAACAAACGAATCTCAAGCAATCAAGCATT CTACTTCTATTGCAGCAATTTAAATCATTTCTTTTAAAGCAAAAGCAATTTTCTGAAAAATT TCACCATTTACGAACGATAGCCATGGGCGCCATGGCCCCTAGAACATTGCTCCTGCTGCTG GCCGCTGCCCTGGCCCCTACACAGACAAGAGCTGGACCTGGATCCGCACCTACTTCAAGT TCTACAAAGAAAACACAGCTACAACCTGGAGCATTACTTCTGGATTTACAGATGATTTTGA ATGGAATTAATAATTACAAGAATCCCAAACCTCACCAGGATGCTCACATTAAAGTTTTACAT GCCCAAGAAGGCCACAGAACTGAAACATCTTCAGTGTCTAGAAGAAGAACTCAAACCTCT GGAGGAAGTGCTAAATTTAGCTCAAAGCAAAAACTTTCACCTTAAGACCCAGGGACTTAATC AGCAATATCAACGTAATAGTTCTGGAACATAAAGGGATCTGAAACAACATTCATGTGTGAAT ATGCTGATGAGACAGCAACCATTTGTAGAATTTCTGAACAGATGGATTACCTTTTGTCAAAG CATCATCTCAACACTGACTTGACTCGACGTCCTGGTACTGCATGCACGCAATGCTAGCTGC CCCTTTCCCGTCCTGGGTACCCCGAGTCTCCCCCGACCTCGGGTCCCAGGTATGCTCCAC CTCCACCTGCCCCACTCACCACTCTGCTAGTTCCAGACACCTCCCAAGCACGCAGCAATG CAGCTCAAAACGCTTAGCCTAGCCACACCCCCACGGGAAACAGCAGTGATTAACCTTTAG CAATAAACGAAAGTTTAACTAAGCTATACTAACCCCAGGGTTGGTCAATTTTCGTGCCAGCC ACACCCCTCGAGCTAGCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCATATGACTAAAAA AAA AAAA
----	--	---

35	ModB IL-2 (RNA)	GGAUAAACUAGUCUACAACAUAUACAAAAAAACGAAUCUCAAGCAAUCAAGCAUUCUACUUCUAUUGCAGCAAUUUAAUCAAUUUCUUUAAAAGCAAAAGCAAUUUUCUGAAAAUUUUCACCAUUUACGAACGAUAGCCAUGGGCGCCAUGGCCCCUAGAACAUUGCUCUCCUGCU GCUGGCCGCGUGCCUGGCCCCUACACAGACAAGAGCUGGACCUGGAUCCGCACCUACUU CAAGUUCUACAAAGAAAAACAGCUAACUGGAGCAUUUACUUCUGGAUUUACAGAUGA UUUUGAAUGGAAUUAAUAAUACAAGAAUCCCAAACUACCAGGAUGCUCACAUUUAAAGU UUUACAUGCCCAAGAAGGCCACAGAACUGAAACAUCUUCAGUGUCUAGAAGAAGAACUCA AACUCUGGAGGAAGUGCUAAAUUUAGCUCAAAGCAAAAAUUUCACUUAAGACCCAGGG ACUUAUUCAGCAAUAUCAACGUAUAGUUCUGGAACUAAAAGGGAUCUGAAACAACAUAUUA UGUGUGAAUAUGCUGAUGAGACAGCAACCAUUGUAGAAUUUCUGAACAGAUGGAUUACC UUUUGUCAAAAGCAUCAUCUACAACACUGACUUGACUCGACGUCCUGGUACUGCAUGCACGC AAUGCUAGCUGCCCCUUUCCCGUCCUGGGUACCCCGAGUCUCCCCCGACCUCGGGUCCCA GGUUAGCUCCCACCUCCACCUGCCCCACUACCACCUCUGCUAGUCCAGACACCUCCCA AGCACGCAGCAAUGCAGCUCAAAAAGCUUAGCCUAGCCACACCCCCACGGGAAACAGCAG UGAUUAAACCUUAGCAAUAAACGAAAGUUUAAACUAAAGCUAUACUAAACCCAGGGUUGGUC AAUUUCGUGCCAGCCACACCCUCGAGCUAGCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AGCAUAUGACUAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
IL-12 小鼠		
36	ModA 鼠類 IL-12 (胺基酸)	MRVTAPRTLILLLSGALALTETWAGSGSMWELEKDVYVVEVDWTPDAPGETVNLTCDTPEED DITWTSQDRHGVIGSGKTLTITVKEFLDAGQYTCHKGETLSHSHLLLHKKENGIWSTEILKN FKNKTFKCEAPNYSGRFTCSWLVRNMDLKFNKSSSSSPDSRAVTCGMASLSAEKVTLDR DYKYSVSCQEDVTCPTAEETLPIELALEARQONKYENYSTSFIRDIIKPDPPKNLQMKPLKNS QVEVSWEYPDSWSTPHSYFSLKFFVRIQRKKEKMKETEEGCNQKGAFLVEKTSTEVQCKGGN VCVQAQDRYNNSSCSKWACVPCRVRSPVGPVGPVGRVIPVSGPARCLSQSRNLLKTTDDMV KTAREKLKHYSCTAEDIDHEDITRDQTSTLKTCLPLELHKNESCLATRETSSTTRGSCLPQKT SLMMTLCLSIYEDLKMYQTEFQAINAALQNNHQQIILDKGMLVAIDELMQSLNHNGETLR QKPPVGEADPYRVKMKLCILLHAFSTRVVTINRVMGYLSSA

37	ModA 鼠類 IL-12 (DNA : 5' UTR-CDS-3' UTR)	GGGCGAACTAGTATTCTTCTGGTCCCCACAGACTCAGAGAGAACCCGCCACCATGAGAGTGACCGC CCCCAGAACCCCTGATCCTGCTGCTGTCTGGCGCCCTGGCCCTGACAGAGACATGGGCCGGAAGCG GATCCATGTGGGAGCTGGAGAAAGACGTTTATGTTGTAGAGGTGGACTGGACTCCCGATGCCCTG GAGAAACAGTGAACCTCACCTGTGACACGCCTGAAGAAGATGACATCACCTGGACCTCAGACCAGA GACATGGAGTCATAGGCTCTGGAAAGACCCTGACCATCACTGTCAAAGAGTTTCTAGATGCTGGCC AGTACACCTGCCACAAAGGAGGCGAGACTCTGAGCCACTCACATCTGCTGCTCCACAAGAAGGAAA ATGGAATTTGGTCCACTGAAATTTTAAAAAATTTCAAAAAACAAGACTTTCTGAAAGTGTGAAGCACC AAATTACTCCGGACGGTTCACGTGCTCATGGCTGGTGCAAAGAAACATGGACTTGAAGTTCAACAT CAAGAGCAGTAGCAGTTCCTCTGACTCTCGGGCAGTGACATGTGGAATGGCGTCTCTGTCTGCAGA GAAGGTCACACTGGACCAAAGGGACTATGAGAAGTATTCAGTGTCTGCCCAGGAGGATGTCACCTG CCCAACTGCCGAGGAGACCCCTGCCCATTTGAACTGGCGTTGGAAGCACGGCAGCAGAAATAAATATG AGAACTACAGCACCAGCTTCTTCATCAGGGACATCATAAACCAGACCCGCCCAAGAACTTGCAGA TGAAGCCTTTGAAGAACTCACAGGTGGAGGTGAGCTGGGAGTACCCTGACTCCTGGAGCACTCCCC ATTCTACTTCTCCCTCAAGTTCTTTGTTGCAATCCAGCGCAAGAAAGAAAAGATGAAGGAGACAG AGGAGGGGTGTAACCAGAAAGGTGCGTTCCCTCGTAGAGAAGACATCTACCGAAGTCCAATGCAAA GGCGGGAATGTCTGCGTGCAAGCTCAGGATCGCTATTACAATTCCTCATGCAGCAAGTGGGCATGT GTTCCCTGCAGAGTCCGATCGGTTCCCTGGAGTAGGGGTACCTGGAGTGGGCAGGGTCATACCGGT CTCTGGACCTGCCAGGTGTCTTAGCCAGTCCCGAAACCTGCTGAAGACCACAGATGACATGGTGAA GACGGCCAGAGAAAAAGCTGAAACATTATTCCTGCACTGCTGAAGACATCGATCATGAAGACATCAC ACGGGACCAAACCAGCACATTGAAGACCTGTTTACCCTGGAACCTACACAAGAACGAGAGTTGCCT GGCTACTAGAGAGACTTCTTCCACAACAAGAGGGAGCTGCCTGCCCCACAGAAGACGTCTTTGAT GATGACCCCTGTGCCTTGGTAGCATCTATGAGGACTTGAAGATGTACCAGACAGAGTTCCAGGCCAT CAACGCAGCACTTCAGAATCACAACCATCAGCAGATCATTCTAGACAAGGGCATGCTGGTGGCCAT CGATGAGCTGATGCAGTCTCTGAATCATAATGGCGAGACTCTGCGCCAGAAACCTCCTGTGGGAGA AGCAGACCCCTTACAGAGTGAAAAATGAAGCTCTGCATCCTGCTTCACGCCTTCAGCACCCGCGTCTGT GACCATCAACAGGGTGATGGGCTATCTGTCCAGCGCCTAATAGCTCGAGAGCTCGCTTTCTTGCTG TCCAAATTTCTATTAAAGGTTCCCTTTGTTCCCTAAGTCCAACCTACTAACTGGGGGATATTATGAAGG GCCTTGAGCATCTGGATTCTGCCTAATAAAAAACATTTATTTTCATTGCTGCGTCGAGAGCTCGCTT TCTTGCTGTCCAATTTCTATTAAAGGTTCCCTTTGTTCCCTAAGTCCAACCTACTAACTGGGGGATAT TATGAAGGGCCTTGAGCATCTGGATTCTGCCTAATAAAAAACATTTATTTTCATTGCTGCGTCGAGA CCTGGTCCAGAGTCGCTAGCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCATATGACTAAAAAA AA
----	---	--

38	ModA 鼠類 IL-12 (RNA)	GGGCGAACUAGUAUUCUUCUGGUCCCCACAGACUCAGAGAGAACCCGCCACCAUGAGAGUGACCGCCCCCA GAACCCUGAUCCUGCUGCUGCUGGCGCCCGUGGCCCUGACAGAGACAUGGGCCGGAAGCGGAUCCAUGUGG GAGCUGGGAGAAAGACGUUUAUGUUGUAGAGGUGGACUGGACUCCCGAUUGCCCGUGGAGAAACAGUGAACCU CACCUGUGACACGCCUGAAGAAGAUAGACAUCACCUGGACCUCAGACCAGAGACAUGGAGUCAUAGGCUCUG GAAAAGACCCUGACCAUCACUGUCAAAAGAUUUUAGAUGCUGGCCAGUACACCUGCCACAAAGGAGGCGGAG ACUCUGAGCCACUCACAUCUGCUGCUCCACAAGAAGGAAAAUGGAAUUUGGUCCACUGAAAAUUUUAAAAAU UUCAAAAACAAGACUUUCCUGAAGUGUGAAGCACCAAAUUAUCCGGACGGUUCACGUGCUCAUGGCUGGU GCAAAGAAACAUGGACUUGAAGUUCACAAGAGCAGUAGCAGUUCCCUGACUCUCGGGCAGUGACAU GUGGAAUGGCGUCUCUGUCUGCAGAGAAGGUCACACUGGACCAAGGGGACUAGAGAAGUAUUCAGUGUCC UGCCAGGAGGAUGUCACCUGCCCAACUGCCGAGGAGACCCUGCCCAUUGAACUGGCGUUGGAAGCACGGCA GCAGAAUAAUAUGAGAAUCACAGCACCAGCUUCUUCACAGGGACAUCAUCAAACAGACCCGCCCAAGAA CUUGCAGAUGAAGCCUUUGAAGAACUCACAGGUGGAGGUCAGCUGGGAGUACCCUGACUCCUGGAGCACUC CCCAUUCUACUUCUCCCUCAAGUUCUUUGUUGGAAUCCAGCGCAAGAAAGAAAAAGUAAGGAGACAGAGG AGGGGUGUAACCAGAAAGGUGCGUUCUCUGUAGAGAAGACAUCUACCGAAGUCCAAUGCAAAGGCGGGAAU GUCUGCGUGCAAGCUCAGGAUCGCUAUUACAAUUCUUCUAGCAGCAAGUGGGCAUGUGUUCUCCUGCAGAGU CCGAUCGGUUCUGGAGUAGGGGUACCUGGAGUGGGCAGGGUCAUACCGGUCUCUGGACCUGCCAGGUGUC UUAGCCAGUCCCGAAACUUGCUGAAGACCACAGAUAGCAUGGUGAAGACGGCCAGAGAAAGCUGAAACAU UAUUCUGCAGUCUGAAGACAUCGAUCAUGAAGACAUCACACGGGACCAAAACCAGCACAUUGAAGACCUGU UUACCACUGGAACUACACAAGAACGAGAGUUGCCUGGCUACUAGAGAGACUUCUUCACAAACAAGAGGGAG CUGCCUGCCCCACAGAAGACGUCUUUGAUGAUGACCUGGCCUUGGUAGCAUCUAUGAGGACUUGAAGA UGUACCAGACAGAGUUCAGGCCAUCAACGACGACUUCAGAAUACAACCAUCAGCAGAUCAUUCUAGACA AGGGCAUGCUGGUGGCCAUCGAUGAGCUGAUGCAGUCUCUGAAUCAUAAUGGCGAGACUCUGCGCCAGAAA CCUCCUGUGGGAGAAAGCAGACCCUACAGAGUGAAAAUAGAAGCUCUGCAUCCUGCUUCACGCCUUCAGCAC CGCGUCUGAGCAUCAACAGGGUGAUGGGCUAUCUGUCCAGCGCCUAAUAGCUCGAGAGCUCGCUUUCUUG CUGUCCAAUUCUAUUAAGGUUCCUUGUUCUUAAGUCCAAUACUAAACUGGGGGAUUAUUAUGAAGGGC CUUGAGCAUCUGGAUUCUGCCUAAUAAAAACAUAUUAUUUCAUUGCUGCGUCGAGAGCUCGCUUUCUUGCU GUCCAUAUUCUAUUAAGGUUCCUUGUUCUUAAGUCCAACUACUAAACUGGGGGAUUAUUAUGAAGGGCCU UGAGCAUCUGGAUUCGCCUAAUAAAAACAUAUUAUUUCAUUGCUGCGUCGAGACCUGGUCCAGAGUCGCU AGCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCAUAGACUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA
39	ModB 鼠類 IL-12 (胺基酸)	MGAMAPRTL L L L L L A A L A P T Q T R A G P G S M W E L E K D V Y V V E V D W T P D A P G E T V N L T C D T P E E D D I T W T S D Q R H G V I G S G K T L T I T V K E F L D A G Q Y T C H K G G E T L S H S H L L L H K K E N G I W S T E I L K N F K N K T F L K C E A P N Y S G R F T C S W L V Q R N M D L K F N I K S S S S P D S R A V T C G M A S L S A E K V T L D Q R D Y E K Y S V S C Q E D V T C P T A E E T L P I E L A L E A R Q Q N K Y E N Y S T S F F I R D I I K P D P P K N L Q M K P L K N S Q V E V S W E Y P D S W S T P H S Y F S L K F F V R I Q R K K E K M K E T E E G C N Q K G A F L V E K T S T E V Q C K G G N V C V Q A Q D R Y N S S C S K W A C V P C R V R S V P G V G V P G V G R V P V S G P A R C L S Q S R N L L K T T D D M V K T A R E K L K H Y S C T A E D I D H E D I T R D Q T S T L K T C L P L E L H K N E S C L A T R E T S S T T R G S C L P P Q K T S L M M T L C L G S I Y E D L K M Y Q T E F Q A I N A A L Q N H N H Q Q I L D K G M L V A I D E L M Q S L N H N G E T L R Q K P P V G E A D P Y R V K M K L C I L L H A F S T R V V T I N R V M G Y L S S A

40	ModB 鼠類 IL-12 (DNA : 5' UTR-CDS-3' UTR)	GGAAATAAAGTAGTCTCAACACAACATATACAAAACAAACGAATCTCAAGCAATCAAGCATTCTACTTCTATTGC AGCAATTTAAATCATTCTTTTAAAGCAAAAGCAATTTTCTGAAAATTTTACCATTACGAACGATAGCCATG GGCGCCATGGCCCCTAGAACATTGCTCCTGCTGCTGGCCGCTGCCCTGGCCCCCTACACAGACAAGAGCTGGA CCTGGATCCATGTGGGAGCTGGAGAAAGACGTTTATGTTGTAGAGGTGGACTGGACTCCCGATGCCCTGGA GAAACAGTGAACCTCACCTGTGACACGCCTGAAAGAAGATGACATCACCTGGACCTCAGACCAGAGACATGGA GTCATAGGCTCTGGAAGACCCCTGACCATCACTGTCAAAGAGTTTCTAGATGCTGGCCAGTACACCTGCCACA AAGGAGGCGAGACTCTGAGCCACTCACATCTGCTGCTCCACAAGAAGGAAAAATGGAATTTGGTCCACTGAAA TTTTAAAAAATTTCAAAAACAAGACTTTCTGAAAGTGTGAAGCACCAAAATTAATCCGGACGGTTTCACTGCTC ATGGCTGGTGCAAGAAACATGGACTTGAAGTTCAACATCAAGAGCAGTAGCAGTTCCCTGACTCTCGGGC AGTGACATGTGGAATGGCGTCTCTGTCTGCAGAGAAGGTCACTGGACCAAAGGGACTATGAGAAGTATTC AGTGTCTGCCAGGAGGATGTCACTGCCCACTGCCGAGGAGACCCTGCCATTGAACTGGCGTTGGAAGC ACGGCAGCAGATAAATATGAGAACTACAGCACCAGCTTCTTCATCAGGGACATCATCAAAACAGACCCGCC AAGAACTTGACAGATGAAGCCTTTGAAGAACTCACAGGTGGAGGTCAGCTGGGAGTACCCTGACTCCTGGAGC ACTCCCCATTCTACTTCTCCCTCAAGTTCTTTGTTGCAATCCAGCGCAAGAAAGAAAAAGATGAAGGAGACAG AGGAGGGGTGTAACCAGAAAGGTGCGTTCCCTCGTAGAGAAGACATCTACCGAAGTCCAATGCAAGGCGGGA ATGTCTGCGTGCAAGCTCAGGATCGCTATTACAATTCTCATGCAGCAAGTGGGCATGTGTTCCCTGCAGAGT CCGATCGGTTCTGGAGTAGGGGTACCTGGAGTGGGCAGGGTCATACCGGTCTCTGGACCTGCCAGGTGTCT TAGCCAGTCCCGAAACCTGCTGAAGACCACAGATGACATGGTGAAGACGGCCAGAGAAAAAGCTGAAACATTA TTCTGCACTGCTGAAGACATCGATCATGAAGACATCACACGGGACCAAACAGCACATTGAAGACCTGTTTA CCACTGGAATACACAAGAACGAGAGTTGCCTGGCTACTAGAGAGACTTCTTCCACAACAAGAGGGAGCTGC CTGCCCCCACAGAAGACGTCTTTGATGATGACCTGTGCCTTGGTAGCATCTATGAGGACTTGAAGATGTACC AGACAGAGTTCCAGGCCATCAACGCAGCACTTCAGAATCACAACCATCAGCAGATCATTCTAGACAAGGGCAT GCTGTGGCCATCGATGAGCTGATGCAGTCTCTGAATCATAATGGCGAGACTCTGCGCCAGAAACCTCCTGT GGGAGAAGCAGACCCTTACAGAGTGAAAAATGAAGCTCTGCATCCTGCTTACGCCTTCAGCACCCGCGTCTGT GACCATCAACAGGGTGATGGGCTATCTGTCCAGCGCCTAATAGCTCGACGTCTGGTACTGATGCACGCAAT GCTAGCTGCCCTTTCCCGTCTGGGTACCCCGAGTCTCCCCGACCTCGGGTCCCAGGTATGCTCCCACCTC CACCTGCCCCACTCACACCTCTGCTAGTTCCAGACACCTCCCAAGCACGCAGCAATGCAGCTCAAAACGCTT AGCCTAGCCACACCCACGGGAAACAGCAGTGATTAACTTTAGCAATAAACGAAAGTTTAACTAAGCTATA CTAACCCAGGGTTGGTCAATTTCTGTGCCAGCCACACCTCGAGCTAGCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAGCATATGACTAAA AAAAAAAAAAAAA
----	---	--

41	ModB 鼠類 IL-12 (RNA)	GGAAUAAACUAGUCUCAACACACAUAUACAAAAACAACGAAUCUCAAGCAAUCAAGCAUUCUACUUCUATU GCAGCAAUUAAAACAUUUCUUAUAAAGCAAAAGCAAUUUCUGAAAAUUCACCAUUAACGAACGAUAGC CAUGGGCGCCAUGGGCCCCUAGAACAUGGUCUCUGGUGGCGCCUGCCUGGGCCCUACACAGACAAGAG CUGGACCUUGGAUCCAUGUGGGAGCUGGAGAAAGACGUUAUGUUGUAGAGGUGGACUGGACUCCCGAUGCC CCUGGAGAAACAGUGAACUUCACCUUGACACGCCUGAAGAAGAUACAUACCUUGGACUUCAGACCAGAG ACAUUGGAGUCAUAGGCUUCUGGAAAGACCCUGACCAUCACUGUCAAGAGUUUCIAGAUGCUUGGCCAGUACA CCUGCCACAAGGAGGCGAGACUCUGAGCCACUCACAUCUGCUGCUCCACAAGAAGGAAAAUGGAAUUGG UCCACTGAAAUUUAAAAAUUCAAACAAGACTUUCUGAAGUGUGAAGCACCAAUUACUCCGGACGG UUCACGUGCUCAUGGCUGGUGCAAAGAAACAUUGGACUUGAAGUUAACAUCAAGAGCAGUAGCAGUUCUCC UGACUCUCGGGCAGUGACAUGUGGAAUGGCGUCUCUGUCUGCAGAGAAGGUACACUGGACCAAAGGGACU AUGAGAAGUAUUCAGUGUCUCCGCCAGGAGGAUGUACCCUGCCCAACUGCCGAGGAGACCCUGCCCAUUGAA CUGGCGUUGGAAGCACGGCAGCAGAAUAAUUGAGAACUACAGCACCGCUUCUUAUCAGGGACAUCAU CAAAACAGACCCGCCCAAGAACTUGCAGAUGAAGCTUUGAAGAACUCACAGGUGGAGGUACGUGGGAGU ACCCUGACUCCUGGAGCACTCCCCAUUCUACUUCUCCUCAAGUUCUUGUUCGAAUCCAGCGCAAGAAAG AAAAGAUGAAGGAGACAGAGGAGGGGUGUAACCAGAAAGGUGCGUUCUUGUAGAGAAGACAUCUACCGAA GUCCAAGCAAAGGCGGGAAUGUCUGCGUGCAAGCUACGGAUCCGUAFUACAATUCCUACUGCAGCAAGUG GGCAUGUGUUCUUGCAGAGUCCGAUCGGUUCUUGGAGUAGGGGUACUUGGAGUGGGCAGGGUACUACCGG UCUCUGGACCUUGCAGGUGUCUUAAGCCAGUCCCGAAACUUGCUGAAGACCACAGAUACAUGGUGAAGACG GCCAGAGAAAAGCUGAACAUAUUCUUGCAGUGCUGAAGACUCCGAUACUGAAGACAUACACGGGACCAA ACCAGCACAUUGAAGACCUGUUAACCACUGGAACUACACAAGAAGCAGAGUUGCCUGGCUACUAGAGAGACU UCUUCACACAACAAGAGGGAGCUGCCUGCCCCACAGAAGACGUCUUGAUGAUGACCCUGUGCCUUGGUAG CAUCUAGAGGACUUGAAGAUGUACAGACAGAGUUCAGGCGCAUCAACGCAGCACUICAGAAUCACAACCA UCAGCAGAUCAUUCUAGACAAGGGCAUGCUGGUGGCCAUCCGAUGAGCUGAUGCAGUCUCUGAAUCAUAUG GGGAGACUCUGGCCAGAAAACUCCUGUGGGAGAAAGCAGACCCUACAGAGUGAAAAUGAAGCUUCUGCAUC CUGCUUCACGCCUUCAGCACCCGCGUCUGGACCAUACACAGGGUGAUGGGCUAUCUGUCCAGCGCCUAAUA GCUCGACGUCUUGGUACUGAUGCAGCAUUGCUAGCUGCCCCUUCUCCGUGCCUGGGUACCCCGAGUCUCC CCCGACCUUGGGUCCAGGUAUGCUCCCAUCCACCUGCCCCACUCACCACCUUCGUAUGUCCAGACACC UCCCAAGCACGCAGCAUUGCAGCUCAAAACGCUUAGCCUAGCCACACCCCCACGGGAAACAGCAGUGAUUAA CCUUAAGCAUUAACGAAAGUUAACUAGCUAUACUAAACCCAGGGUUGGUCAAUUCUGUGCCAGCCACAC CCUCGAGUAGCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCAUUGACUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AA
IFNα (IFNα4)小鼠		
42	ModA 鼠類 IFNα4 (胺基 酸)	MRVTAPRTLILLSGALALTETWAGSGCDLPHTYNLGNKRALTVLEEMRRLPPLSCLKDRKD FGFPLEKVDNQIQKAQAILVLRDLTQQILNLFSTKDLSATWNA TL L D S F C N D L H Q Q L N D L K A CVMQEPPLTQEDSLLAVRTYFHRITVYLRKKKHSLCAWEVIRA EVWRALSSSTNLLARLSEEK E

43	ModA 鼠類 IFNα4 (DNA : 5' UTR-CDS-3' UTR)	GGGCGAACTAGTATTCTTCTGGTCCCCACAGACTCAGAGAGAACCCGCCACCATGAGAGT GACCGCCCCCAGAACCCCTGATCCTGCTGCTGTCTGGCGCCCTGGCCCTGACAGAGACATG GGCCGGAAGCGGATCCTGTGACCTGCCTCACACTTATAACCTCGGGAACAAGAGGGCCCTT GACAGTCCTGGAAGAAATGAGAAGACTCCCCCTCTTTCCTGCCTGAAGGACAGGAAGGA TTTTGGATTCCCCTTGGAGAAGGTGGATAACCAACAGATCCAGAAGGCTCAAGCCATCCTT GTGCTAAGAGATCTTACCCAGCAGATTTTGAACCTCTTCACATCAAAAAGACTTGTCTGCTA CTTGGAATGCAACTCTCCTAGACTCATTCTGCAATGACCTCCATCAGCAGCTCAATGATCT CAAAGCCTGTGTGATGCAGGAACCTCCTCTGACCCAGGAAGACTCCCTGCTGGCTGTGAG GACATACTTCCACAGGATCACTGTGTACCTGAGAAAGAAGAAACACAGCCTCTGTGCCTG GGAGGTGATCAGAGCAGAAGTCTGGAGAGCCCTCTCTTCTCAACCAACTTGCTGGCAAG ACTGAGTGAGGAGAAGGAGTGATAACTCGAGAGCTCGCTTTCTTGCTGTCCAATTTCTATT AAAGGTTTCCTTTGTTCCCTAAGTCCAACCTACTAACTGGGGGATATTATGAAGGGCCTTGA GCATCTGGATTCTGCCTAATAAAAAACATTTATTTTCATTGCTGCGTCGAGAGCTCGCTTT CTTGCTGTCCAATTTCTATTAAAGGTTTCCTTTGTTCCCTAAGTCCAACCTACTAACTGGGG GATATTATGAAGGGCCTTGAGCATCTGGATTCTGCCTAATAAAAAACATTTATTTTCATTG CTGCGTCGAGACCTGGTCCAGAGTCGCTAGCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AGCATATGACTAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
----	---	---

44	ModA 鼠類 IFNα4 (RNA)	GGGCGAACUAGUAUUCUUCUGGUCCCCACAGACUCAGAGAGAACCCGCCACCAUGAGAG UGACCGCCCCCAGAAACCUGAUCCUGCUGCUGUCUGGCGCCCUGGCCCCUGACAGAGACA UGGGCCGGAAGCGGAUCCUGUGACCUGCCUCACACUUAUAACCUCGGGAACAAGAGGGC CUUGACAGUCCUGGAAGAAAUGAGAAGACUCCCCCUCUUCCUGCCUGAAGGACAGGA AGGAUUUUGGAUUCCCUUGGAGAAGGUGGAUAACCAACAGAUCCAGAAGGCUCAAGCC AUCCUUGUGCUAAGAGAUUUACCCAGCAGAUUUUGAACCUUCUACAUCAAAAGACUUG UCUGCUACUUGGAAUGCAACUCUCCUAGACUCAUUCUGCAAUGACCUCAUCAGCAGCUC AAUGAUCUCAAAAGCCUGUGUGAUGCAGGAACCUCUCUGACCCAGGAAGACUCCUGCU GGCUGUGAGGACAUACUCCACAGGAUCACUGUGUACCUGAGAAAAGAAGAAACACAGCC UCUGUGCCUGGGAGGUGAUCAGAGCAGAAGUCUGGAGAGCCCUCUCUCCUCAACCAAC UUGCUGGCAAGACUGAGUGAGGAGAAGGAGUGAUAAUCUGAGAGCUCGCUUUCUUGCUG UCCAAUUCUAUUAAGGUUCCUUGUCCCUAAGUCCAACUACUAAACUGGGGGGAUUAU AUGAAGGGCCUUGAGCAUCUGGAUUCUGCCUAAUAAAAACAUAUUAUUUCAUUGCUGCG UCGAGAGCUCGCUUUCUUGCUGUCCAAUUCUAUUAAGGUUCCUUGUCCCUAAGUCC AACUACUAAACUGGGGGGAUUAUGAAGGGCCUUGAGCAUCUGGAUUCUGCCUAAUAAA AAACAUUUAUUUCAUUGCUGCGUCGAGACCUGGUCCAGAGUCGCUAGCAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAGCAUAGACUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA
45	ModB 鼠類 IFNα4 (胺基 酸)	MGAMAPRTL L L L L L A A A L A P T Q T R A G P G S C D L P H T Y N L G N K R A L T V L E E M R R L P P L S C L K D R K D F G F P L E K V D N Q Q I Q K A Q A I L V L R D L T Q Q I L N L F T S K D L S A T W N A T L L D S F C N D L H Q Q L N D L K A C V M Q E P P L T Q E D S L L A V R T Y F H R I T V Y L R K K K H S L C A W E V I R A E V W R A L S S T N L L A R L S E E K E

46	ModB 鼠類 IFNα4 (DNA : 5' UTR-CDS-3' UTR)	GGAATAAACTAGTCTCAACACAACATATACAAAAAAAAGAATCTCAAGCAATCAAGCATT CTACTTCTATTGCAGCAATTTAAATCATTTCTTTTAAAGCAAAAGCAATTTCTGAAAAATTT TCACCATTTACGAACGATAGCCATGGGCGCCATGGCCCCTAGAACATTGCTCCTGCTGCTG GCCGCTGCCCTGGCCCCTACACAGACAAGAGCTGGACCTGGATCCTGTGACCTGCCTCAC ACTTATAACCTCGGGAACAAGAGGGCCTTGACAGTCCTGGAAGAAATGAGAAGACTCCCC CCTCTTTCCTGCCTGAAGGACAGGAAGGATTTTGGATTCCCCTTGGAGAAGGTGGATAAC CAACAGATCCAGAAGGCTCAAGCCATCCTTGTGCTAAGAGATCTTACCCAGCAGATTTTGA ACCTCTTCACATCAAAAAGACTTGTCTGCTACTTGGAATGCAACTCTCCTAGACTCATTCTG CAATGACCTCCATCAGCAGCTCAATGATCTCAAAAGCCTGTGTGATGCAGGAACCTCCTCTG ACCCAGGAAGACTCCCTGCTGGCTGTGAGGACATACTTCCACAGGATCACTGTGTACCTG AGAAAGAAGAAACACAGCCTCTGTGCCTGGGAGGTGATCAGAGCAGAAGTCTGGAGAGCC CTCTCTTCCCAACCAACTTGCTGGCAAGACTGAGTGAGGAGAAGGAGTGATAAATCGAC GTCCTGGTACTGCATGCACGCAATGCTAGCTGCCCCCTTCCCCTCCTGGGTACCCCGAGTC TCCCCCGACCTCGGGTCCCAGGTATGCTCCCACCTCCACCTGCCCCACTCACCACCTCTGC TAGTTCCAGACACCTCCCAAGCAGCAGCAATGCAGCTCAAAACGCTTAGCCTAGCCACA CCCCACGGGAAACAGCAGTGATTAACCTTTAGCAATAAACGAAAAGTTAACTAAGCTATA CTAACCCCAGGGTTGGTCAATTTTCGTGCCAGCCACACCCTCGAGCTAGCAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAGCATATGACTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AA
----	---	---

47	ModB 鼠類 IFNα4 (RNA)	GGAAUAAACUAGUCUCAACACAACAUAUACAAAACAAACGAAUCUCAAGCAAUCAAGCAU UCUACUUCUUAUUGCAGCAAUUUAAAUCAUUCUUUAAAAGCAAAAGCAAUUCUUGAAAA UUUUCACCAUUTACGAACGAUAGCCAUGGGCGCCAUGGCCCCUAGAACAUUGCUCCUGCU GCUGGCCGCUGCCCU'GGCCCTACACAGACAAGAGCUGGACCU'GGAUCCU'GU'GACCU'GC CUCACACU'AU'AAACUCGGGAACAAGAGGGCCU'GACAGUCCU'GGAAGAAAU'GAGAAGA CU'CCCCCU'CU'UCCUGCCU'GAAGGACAGGAAGGAU'U'GGAU'CCCU'GGAGAAGGU' GGAU'AAACCAACAGAU'CCAGAAGGCU'CAAGCCAU'CCU'GU'GCU'AAGAGAU'CU'ACCCAGCA GAU'UU'GAACCU'CU'U'CA'CAU'CAAAAGACU'UGU'CU'GCU'ACU'UGGAAUGCAACU'CU'CCU'AGA CUCAU'CU'GCAAUGACCU'CCAUCAGCAGCU'CAU'GAU'CU'CAAAGCCU'GU'GU'GAU'GCAGGA ACCU'CCU'CU'GACCCAGGAAGACU'CCU'GCU'GGCU'GU'GAGGACAU'ACU'CCACAGGAUCAC UGUGU'ACCU'GAGAAAGAAGAAACACAGCCU'CU'GU'GCCU'GGGAGGU'GAU'GAGAGCAGAAG UCU'GGAGAGCCCU'CU'CU'CCU'CAACCAACU'GCU'GGCAAGACUGAGU'GAGGAGAAGGAG UGAU'AAU'CGACGU'CCUGGUACU'GCAUGCACGCAU'GCU'AGCU'GCCCCU'U'CCCGU'CCUG GGU'ACCCCGAGU'CU'CCCCGACCU'CGGGU'CCAGGU'AU'GCU'CCACCU'CCACCU'GCCCCA CUCACCACCU'CU'GCU'AGU'UCCAGACACCU'CCAAGCACGCAGCAAUGCAGCUCAAAACGC UU'AGCCU'AGCCACACCCCCACGGGAAACAGCAGU'GAU'U'AAACUU'U'AGCAAU'AAACGAAAG UU'AAU'U'AAAGCU'AU'ACU'U'AAACCCAGGGU'UGGU'CAU'U'CGUGCCAGCCACACCCU'CGAGC' UAGCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCAU'AU'GACUAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA
IL-15 sushi 小鼠		
48	ModA 鼠類 IL-15 sushi (胺基酸)	MGAMAPRTL L L L L L A A A L A P T Q T R A G P G S T T C P P P V S I E H A D I R V K N Y S V N S R F R Y V C N S G F K R K A G T S T L I E C V I N K N T N V A H W T T P S L K C I R D P S L A G G S G G S G G S G G S G G S G G N W I D V R Y D L E K I E S L I Q S H I I D T T L Y T D S D F H P S C K V T A M N C F L L E I Q V I L H E Y S N M T I N E T V R N V L Y L A N S T L S S N K N V A E S G C K E C E E L E E K T F T E F L Q S F I R I V Q M F I N T S

49	ModA 鼠類 IL-15 sushi (DNA:5' UTR-CDS-3' UTR)	GGGCGAACTAGTATTCTTCTGGTCCCCACAGACTCAGAGAGAAACCCGCCACCATGGGCGC CATGGCCCCTAGAACATTGCTCCTGCTGCTGGCCGCTGCCCTGGCCCCTACACAGACAAG AGCTGGACCTGGATCCACCACGTGTCCACCTCCCGTATCTATTGAGCATGCTGACATCCGG GTCAAGAATTACAGTGTGAACTCCAGGGAGAGGTATGTCTGTAACCTCTGGCTTTAAGCGG AAAGCTGGAACATCCACCCTGATTGAGTGTGTGATCAACAAGAACACAAATGTTGCCCACT GGACAACTCCCAGCCTCAAGTGCATCAGAGACCCCTCCCTAGCTGGAGGGGAGCGGAGGCT CTGGCGGAAGCGGCGGGTCTGGAGGGCTCCGGGGGAAGCGGCGGAAATGGATCGACGTG CGCTACGACCTGGAAAAGATCGAGAGCCTGATCCAGAGCATCCACATCGACACCACCCTG TACACCGACAGCGACTTCCACCCCAGCTGCAAAAGTGACCGCTATGAACTGCTTCCTGCTG GAACTGCAAGTGATCCTGCACGAGTACAGCAACATGACCCCTGAACGAGACAGTGCGGAAC GTGCTGTACCTGGCCAACAGCACCTGAGCAGCAACAAGAACGTGGCCGAGAGCGGCTGC AAAGAGTGCGAGGAACTGGAAAGAAAAGACCTTCACCGAGTTTCTGCAGAGCTTCATCAGG ATCGTGCAAGTGTTCATCAACACCTCTTGATGAGTCGACGTCTGGTACTGCATGCAACGCA ATGCTAGCTGCCCCCTTCCCGTCCTGGGTACCCCGAGTCTCCCCGACCTCGGGTCCCAG GTATGCTCCACCTCCACCTGCCCCACTCACCACCTCTGCTAGTTCCAGACACCTCCCAAG CACGCAAGTGCAGCTCAAAAACGCTTAGCCTAGCCACACCCCCACGGGAAACAGCAGTG ATTAACCTTTAGCAATAAACGAAAAGTTAACTAAGCTATACTAACCCAGGGTTGGTCAAT TTCGTGCCAGCCACACCCTCGAGCTAGCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGC ATATGACTAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
----	---	---

50	ModA 鼠類 IL-15 sushi (RNA)	GGGCGAACUAGUAUUCUUCUGGUCCCCACAGACUCAGAGAGAAACCCGCCACCAUGGGCG CCAUGGCCCCUAGAACAUUGCUCUCCUGCUGCGUGGCCGCGUGCCUUGGCCCCUACACAGACAA GAGCUGGACCUGGAUCCACCACGUGUCCACCUCCCGUAUCUAUUGAGCAUGCUGACAUCC GGGUCAAGAAUACAGUGUGAACUCCAGGGAGAGGU AUGUCUGUAACUCUGGCUUUAAG CGGAAAGCUGGAAACAUCCACCCUGAUUGAGUGUGUGAUCAACAAGAACACAAAUGUUGC CCACUGGACAACUCCAGCCUCAAGUGCAUCAGAGACCCUCCCUAGCUGGAGGGAGCG GAGGCUCUGGGCGGAAGCGGCGGGUCUGGAGGCUCGCGGGGAAGCGGCGGAAAAUUGAU CGACGUGCGCUACGACCUGGAAAAAGAU CGAGAGCCUGAUCCAGAGCAUCCACAUCGACA CCACCCUGUACACCGACAGCGACUCCACCCACGUGCAAAGUGACCGCUAUGAACUGCU UCCUGCUGGAACUGCAAGUGAUCCUGCACGAGUACAGCAACAUGACCCUGAACGAGACA GUGCGGAACGUGCUGUACCUGGCCAACAGCACCCUGAGCAGCAACAAGAACGUGGCCGA GAGCGGCUGCAAAGAGUGCGAGGAACUGGAAGAAAAAGACCUUCACCGAGUUUCUGCAGA GCUUCAUCAGGAUCGUGCAGAUUGUUAUCAACACCUCUUGAUGAGUCGACGUCUGGUA CUGCAUGCACGCAAUGCUAGCUGCCCCUUCUCCGUGCCUGGGUACCCCGAGUCUCCCCGA CCUCGGGUCCCAGGU AUGCUCCACCUCACCCUGCCCCACUCACCACCUCUGCUAGUUC AGACACCUCCCAAGCACGCAGCAAUGCAGCUCAAAACGCUUAGCCUAGCCACACCCCCAC GGGAAACAGCAGUGAUUAACCUUAGCAAUAAACGAAAGUUUAACUAAGCUAUACUAACC CCAGGGUUGGUCAAUUUCGUGCCAGCCACACCUCGAGCUAGCAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAGCAUAUGACUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
51	ModB 鼠類 IL-15 sushi (胺基酸)	MGAMAPRTLLLLAAALAPTQTRAGPGSTTCPPVSIHADIRVKNYSVNSRERYVCNSGFKR KAGTSTLIECVINKNTNVAHWTTPSLKCIRDPSLAGSGSGSGSGSGSGSGGNWIDVRYD LEKIESLIQSIHIDTTLYTDSDFHPCKVTAMNCFLELQVILHEYSNMTLNETVRNVLYLANST LSSNKNVAESGCKECELEEKTFTEFLQSFIRIVQMFINTS

52	ModB 鼠類 IL-15 sushi (DNA : 5' UTR-CDS-3' UTR)	GGAATAAACTAGTCTCAACACAACATATACAAAACAAACGAATCTCAAGCAATCAAGCATT CTACTTCTATTGCAGCAATTTAAATCATTTCTTTTAAAGCAAAAGCAATTTTCTGAAAATTT TCACCATTTACGAACGATAGCCATGGGCGCCATGGCCCCTAGAACATTGCTCCTGCTGCTG GCCGCTGCCCTGGCCCCTACACAGACAAGAGCTGGACCTGGATCCACCACGTGTCCACCT CCCGTATCTATTGAGCATGCTGACATCCGGGTCAAGAATTACAGTGTGAACTCCAGGGAG AGGTATGTCTGTAACTCTGGCTTTAAGCGGAAAAGCTGGAACATCCACCCTGATTGAGTGTG TGATCAACAAGAACACAAATGTTGCCCACTGGACAACCTCCCAGCCTCAAGTGCATCAGAG ACCCCTCCCTAGCTGGAGGGGAGCGGAGGGCTCTGGCGGAAGCGGCGGGTCTGGAGGGCTCC GGGGGAAGCGGCGGAAATTGGATCGACGTGCGCTACGACCTGGAAAAGATCGAGAGCCT GATCCAGAGCATCCACATCGACACCACCTGTACACCGACAGCGACTTCCACCCCAGCTG CAAAGTGACCGCTATGAACTGCTTCCTGCTGGAAGTCAAGTGATCCTGCACGAGTACAG CAACATGACCCTGAACGAGACAGTGCGGAACGTGCTGTACCTGGCCAAACAGCACCCCTGAG CAGCAACAAGAACGTGGCCGAGAGCGGCTGCAAAGAGTGCGAGGAACTGGAAGAAAAGA CCTTCACCGAGTTTCTGCAGAGCTTCATCAGGATCGTGCAGATGTTTCATCAACACCTCTTG ATGAGTCGACGTCTTGGTACTGCATGCACGCAATGCTAGCTGCCCCCTTCCCGTCCTGGGT ACCCCGAGTCTCCCCCGACCTCGGGTCCCAGGTATGCTCCCACTCCACCTGCCCACTCA CCACCTCTGCTAGTTCCAGACACCTCCCAAGCACGCAGCAATGCAGCTCAAAACGCTTAGC CTAGCCACACCCCCACGGGAAACAGCAGTGATTAACCTTTAGCAATAAACGAAAGTTTAAC TAAGCTATACTAACCCCAAGGGTTGGTCAATTTTCGTGCCAGCCACACCCTCGAGCTAGCAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCATATGACTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA
----	---	---

53	ModB 鼠類 IL-15 sushi (RNA)	GGAAUAAACUAGUCUCAACACAACAUAUACAAAACAAACGAAUCUCAAGCAAUCAAGCAU UCUACUUCUUAUUGCAGCAAUUUAAAUCAUUUCUUUAAAAGCAAAAGCAAUUUCUGAAAA UUUUCACCAUUUACGAACGAUAGCCAUGGGCGCCAUGGCCCCUAGAACAUUGCUCCUGCU GCUGGCCGCUGCCCCUGGCCCCUACACAGACAAGAGCUGGACCUGGAUCCACCACGGUGC CACCUCCCGUAUCUUAUGAGCAUGCUGACAUCCGGGUCAAGAAUACAGUGUGAACTCCA GGGAGAGGUAUGUCUGUAACUCUGGCUUUAAGCGGAAAGCUGGAACAUCCACCCUGAUU GAGUGUGUAUCAACAAGAACACAAAUGUUGCCCACTGGACAACUCCAGCCUCAAGUGC AUCAGAGACCCUCCCUAGCUGGAGGGAGCUGGAGGCUCUGGCGGAAGCGGCGGGUCUGG AGGCUCCGGGGGAAGCGGCGGAAAUUGGAUCGACGUGCGCUACGACCUGGAAAAGAU CG AGAGCCUGAUCCAGAGCAUCCACAUCGACACCACCCUGUACACCGACAGCGACUCCACC CCAGCUGCAAAGUGACCGCUAUGAACUGCUUCUUGCUUGGAACUGCAAGUGAUCCUGCAC GAGUACAGCAACAUGACCCUGAACGAGACAGUGCGGAACGUGCUGUACCUGGCCAACAG CACCCUGAGCAGCAACAAGAACGUGGGCCGAGAGCGGCUGCAAAGAGUGCGAGGAAACUGG AAGAAAAGACCUUCACCGAGUUCUGCAGAGCUUCAICAGGAUCGUGCAGAUUUCAUCA ACACCUUUGAUAGAGUCGACGUCUGGUACUGCAUGCACGCAAUGCUAGCUGCCCCUUC CCGUCUUGGGUACCCCGAGUCUCCCCGACCUUGGGUCCCAGGUUAUGCUCCCACCUCCAC CUGCCCCACUCACCACCUUGCUAGUUCAGACACCUCCCAAGCACGCAGCAAUGCAGCU CAAAACGCUUAGCCUAGCCACACCCCCACGGGAAACAGCAGUGAUUAACCUUAGCAAUA AACGAAAAGUUAACUAAAGCUAUACUAACCCCAGGGUUGGUCAAUUCGUGCCAGCCACAC CCUCGAGCUAGCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCAUAUGACUAAAAAAAA A A
GM-CSF 小鼠		
54	ModA 鼠類 GM-CSF (胺 基酸)	MWLQNLLFLGIVVYSL SAPTRSPITVTRPWKHVEAIKEALNLLDDMPVTLNEEVEVVSNEFSFK KLTCVQTRLKIFEQGLRGNFTKLKGALNMTASYVQTYCPPTPETDCETQVTTYADFDISLKTF LTDIPFECKKPGQK

55	ModA 鼠類 GM-CSF (DNA : 5' UTR-CDS-3' UTR)	GGGCGAACTAGTATTCTTCTGGTCCCCACAGACTCAGAGAGAACCCGCCACCATGTGGCT GCAGAACCTGCTGTTTCCTGGGCATCGTGGTGTACAGCCTGAGCGCCCCACCAGGAGCCC CATCACCGTGACCAGGCCCTGGAAGCACGTGGAGGCCATCAAGGAGGCCCTGAACCTGCT GGACGACATGCCCGTGACCCTGAACGAGGAGGTGGAGGTGGTGAAGCAACGAGTTCAAGCTT CAAGAAGCTGACCTGCGTGCAGACCAGGCTGAAGATCTTCGAGCAGGGCCTGAGGGGCAA CTTCACCAAGCTGAAGGGCGCCCTGAACATGACCGCCAGCTACTACCAGACCTACTGCC CCCCACCCCGAGACCGACTGCGAGACCCAGGTGACCACCTACGCCGACTTCATCGACAG CCTGAAGACCTTCCTGACCGACATCCCCTTCGAGTGCAAGAAGCCCGGCCAGAAGTGATG ACTCGAGCTGGTACTGCATGCACGCAATGCTAGCTGCCCTTTCCCGTCTTGGGTACCCC GAGTCTCCCCCGACCTCGGGTCCCAGGTATGCTCCACCTCCACCTGCCCACTCAACACC TCTGCTAGTTCCAGACACCTCCCAAGCACGCAGCAATGCAGCTCAAAACGCTTAGCCTAGC CACACCCCCACGGGAAACAGCAGTGATTAACTTTAGCAATAAACGAAAGTTTAACTAAGC TATACTAACCCAGGGTTGGTCAATTTCTGTGCCAGCCACACCGAGACCTGGTCCAGAGTC GCTAGCCGCGTCGCTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCATATGACTAAAAA AAA AAAA
56	ModA 鼠類 GM-CSF (RNA)	GGGCGAACUAGUAUUCUUCUGGUCCCCACAGACUCAGAGAGAACCCGCCACCAUGUGGC UGCAGAACCUGCUGUUCUGGGCAUCGUGGUGUACAGCCUGAGCGCCCCACCAGGAGC CCCAUCACCGUGACCAGGCCUGGAAGCACGUGGAGGCCAUCAAGGAGGCCCUGAACCU GCUGGACGACAUGCCCGUGACCCUGAACGAGGAGGUGGAGGUGGUGAGCAACGAGUUA GCUUCAAGAAGCUGACCUGCGUGCAGACCAGGCUGAAGAUCUUCGAGCAGGGCCUGAGG GGCAACUUCACCAAGCUGAAGGGCGCCUGAACAUAGCCGCCAGCUACUACCAGACCUAC UGCCCCCCCACCCCGAGACCGACUGCGGAGACCCAGGUGACCACCUACGCCGACUUAUC GACAGCCUGAAGACCUUCCUGACCGACAUCCCCUUCGAGUGCAAGAAGCCCGGCCAGAA GUGAUGACUCGAGCUGGUACUGCAUGCACGCAAUGCUAGCUGCCCUUUCGCCUGCCUGG GUACCCCGAGUCUCCCCGACCUCGGGUCCCAGGUAGCUCUCCACCUCCACCUGCCCCAC UCACCACCUUCUGCUAGUUCAGACACCUCCCAAGCACGCAGCAAUGCAGCUCAAAACGCU UAGCCUAGCCACACCCACGGGAAACAGCAGUGAUUAACCUUAGCAAUAAACGAAAGU UUAACUAAGCUAUACUAACCCAGGGUUGGUCAAUUCGUGCCAGCCACACCGAGACCUG GUCCAGAGUCGCUAGCCGCGUCGCUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCAUA UGACUAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1 .

57	ModB 鼠類 GM-CSF (胺 基酸)	MWLQNLLFLGIVVYSLAPTRSPITVTRPWKHVEAIKEALNLLDDMPVTLNEEVEVVSNEFSFK KLTCVQTRLKIFEQGLRGNFTKLKGALNMTASYYQTYCPPTPETDCETQVTTYADFIDSLKTF LTDIPFECKKPGQK
58	ModB 鼠類 GM-CSF (DNA : 5' UTR-CDS-3' UTR)	GGAATAAACTAGTCTCAACACAACATATACAAAACAAACGAATCTCAAGCAATCAAGCATT CTACTTCTATTGCAGCAATTTAAATCATTTCTTTTAAAGCAAAAGCAATTTTCTGAAAAATT TCACCATTTACGAACGATAGCCATGTGGCTGCAGAACCTGCTGTTCTGGGGCATCGTGGT GTACAGCCTGAGCGCCCCACCAGGAGCCCCATCACCGTGACCAGGCCCTGGAAGCACGT GGAGGCCATCAAGGAGGCCCTGAACCTGCTGGACGACATGCCCGTGACCCTGAACGAGGA GGTGGAGGTGGTGAGCAACGAGTTCAGCTTCAAGAAGCTGACCTGCGTGCAGACCAGGCT GAAGATCTTCGAGCAGGGCCTGAGGGGCAACTTCACCAAGCTGAAGGGCGCCCTGAACAT GACCGCCAGCTACTACCAGACCTACTGCCCCCCCCACCCCGAGACCGACTGCGAGACCCA GGTGACCACCTACGCCGACTTCATCGACAGCCTGAAGACCTTCCTGACCGACATCCCCTTC GAGTGCAAGAAGCCCCGCCAGAAAGTGATGACTCGAGCTGGTACTGCATGCACGCAATGCT AGCTGCCCCCTTTCCCGTCCTGGGTACCCCGAGTCTCCCCGACCTCGGGTCCCAGGTATG CTCCCACCTCCAACCTGCCCCACTCACCACTCTGCTAGTTCCAGACACCTCCCAAGCACGC AGCAATGCAGCTCAAAAACGCTTAGCCTAGCCACACCCCCACGGGAAACAGCAGTGATTAA CCTTTAGCAATAAACGAAAGTTTAACTAAGCTATACTAACCCAGGGTTGGTCAATTTCTG GCCAGCCACACCGAGACCTGGTCCAGAGTCGCTAGCCGCGTCGCTAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAGCATATGACTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

59	ModB 鼠類 GM-CSF (RNA)	GGAAUAAACUAGUCUCAACACAACAUAUACAAAACAAACGAAUCUCAAGCAAUCAAGCAU UCUACUUCUAUUGCAGCAAUUUAAAAUCAUUUCUUUAAAAGCAAAAGCAAUUUUCUGAAAA UUUUCACCAUUUACGAACGAUAGCCAUGUGGCUGCAGAACCUGCUGUUCUGGGCAUCG UGGUGUACAGCCUGAGCGCCCCCACCAGGAGCCCCAUACCGUGACCAGGCCCCUGGAAG CACGUGGAGGGCCAUCAAGGAGGCCCUGAACCUGCUGGACGACAUGCCCGUGACCCUGAA CGAGGAGGUGGAGGUGGAGCAACGAGUUCAGCUUCAAGAACGUGACCUGCGUGCAGA CCAGGCUGAAGAUUUUCGAGCAGGGCCUGAGGGGCAACUUCACCAAGCUGAAGGGCGCC CUGAAACAUACCGCCAGCUACUACCAGACCUACUGCCCCCCCCACCCCGAGACCGACUGC GAGACCCAGGUGACCACCUACGCCGACUUCUAGCAGCCUGAAGACCUUCCUGACCGAC AUCCCCUUCGAGUGCAAGAAGCCCGGCCAGAAUGAUGACUCGAGCUGGUACUGCAUGC ACGCAAUGCUAGCUGCCCCUUUCCCGUCCUGGGUACCCCGAGUCUCCCCGACCUCGGG UCCCAGGUAUGCUCCCACCUCCACCUGCCCCACUCACCACCUCUGCUAGUUCAGACACC UCCCAAGCACGCAGCAAUGCAGCUAAAAACGCUUAGCCUAGCCACACCCCCACGGGAAAC AGCAGUGAUUAAACUUUAGCAAUAAACGAAAGUUUACUAAGCUAUACUAAACCCAGGGU UGGUCAAUUUCGUGCCAGCCACACCGAGACCUUGGUCCAGAGUCGCUAGCCGCGUCGCUA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCAUAUGACUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA
FLT3L 小鼠		
60	ModA FLT3L (胺基 酸，與小鼠最 佳化分泌序 列組合之人 類 FLT3L)	MGAMAPRTL L L L L L L L L L L A A L A P T Q T R A G P G S T Q D C S F Q H S P I S S D F A V K I R E L S D Y L L Q D Y P V T V A S N L Q D E E L C G G L W R L V L A Q R W M E R L K T V A G S K M Q G L L E R V N T E I H F V T K C A F Q P P P S C L R F V Q T N I S R L L Q E T S E Q L V A L K P W I T R Q N F S R C L E L Q C Q P D S S T L P P P W S P R P L E A T A P T A P Q P P

61	ModA FLT3L (DNA : 5' UTR-CDS-3' UTR)	GGGCGAACTAGTATTCTTCTGGTCCCCACAGACTCAGAGAGAACCCGCCACCATGGGCGC CATGGCCCCTAGAACATTGCTCCTGCTGCTGGCCGCTGCCCTGGCCCCTACACAGACAAG AGCTGGACCTGGATCCACCCAGGACTGCAGCTTCCAGCACTCCCCTATCTCTCCGACTTC GCCGTGAAGATCCGGGAGCTGTCCGATTACCTGCTGCAGGACTACCCTGTGACCGTGGCC AGCAACCTGCAGGACGAAGAACTGTGTGGCGGCCTGTGGCGGCTGGTGTGCCCCAGCG GTGGATGGAACGGCTGAAAACCGTGGCCGGCTCCAAGATGCAGGGCCTGCTCGAGCGGG TGAACACCGAGATCCACTTCGTGACCAAAGTGCGCCTTCCAGCCTCCTCCTTCTGCCTGCG GTTCTGTCAGACCAACATCTCCCGGCTGCTGCAGGAAACCTCCGAGCAGCTGGTCGCCCT GAAGCCTTGGATCACC CGCAGAACTTCTCCCGGTGTCTGGAACCTCAGTGTGAGCCCGA CTCCTCCACCCTGCCTCCTCCCTGGTCCCCCAGGCCTCTGGAAGCCACCGCCCCTACCGCC CCACAGCCTCCTTGATAGGTCGACGTCTGGTACTGCATGCACGCAATGCTAGCTGCCCT TTCCCGTCCTGGGTACCCCGAGTCTCCCCGACCTCGGGTCCCAGGTATGCTCCCACTCC ACCTGCCCCACTCACCACCTCTGCTAGTTCCAGACACCTCCCAAGCACGCAGCAATGCAGC TCAAAACGCTTAGCCTAGCCACACCCCAAGGAAACAGCAGTGATTAACCTTTAGCAATA AACGAAAGTTTAACTAAGCTATACTAACCCCAAGGTTGGTCAATTTCTGTGCCAGCCACACC CTCGAGCTAGCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCATATGACTAAAAAAAAAA AA
----	--	--

62	ModA FLT3L (RNA)	GGGCGAACUAGUAUUCUUCUGGUCCCCACAGACUCAGAGAGAACCCGCCACCAUGGGCG CCAUGGCCCCUAGAACAUUGCUCUGCUGCGGGCCGUGCCCUGGCCCCUACACAGACAA GAGCUGGACCUGGAUCCACCCAGGACUGCAGCUUCCAGCACUCCCCUAUCUCCUCCGACU UCGCCGUGAAGAUCGGGGAGCUGUCCGAUUAACUGCUGCAGGACUACCCUGUGACCGUG GCCAGCAACCUGCAGGACGAAGAACUGUGUGGGCGGCCUGUGGGCGGCUGGUGCUGGGCCA GCGGUGGAUGGAACGGCUGAAAAACCGUGGCCGGCUCCAAGAUGCAGGGCCUGCUCGAGC GGGUGAACACCGAGAUCCACUUCGUGACCAAGUGCGCCUUCAGCCUCCUCCUUCUGCC UGCGGUUCGUGCAGACCAACAUCUCCCGGCUGCUGCAGGAAACCUCCGAGCAGCUGGUC GCCCUGAAGCCUUGGAUCACCCGGCAGAACUUCUCCCGGUGUCUGGAACUCCAGUGUCA GCCCCACUCCUCCACCCUGCCUCCUCCUGGUCCCCCAGGCCUCUGGAAGCCACCGCCCC UACCGCCCCACAGCCUCCUUGAUAGGUCGACGUCCUGGUACUGCAUGCACGCAAUGCUA GCUGCCCCUUCUCCGUCUCCUGGUACCCCGAGUCUCCCCGACCUCGGGUCCCAGGUAUG CUCCCACCUCACCUGCCCCACUACCACCUCUGCUAGUUCAGACACCUCCCAAGCAG CAGCAAUGCAGCUAAAAACGUUAGCCUAGCCACACCCCCACGGGAAACAGCAGUGAUUA ACCUUAGCAAUAAACGAAAGUUAAACUAAGCUAUACUACCCACAGGUUGGUCAAUUUC GUGCCAGCCACACCCUCGAGCUAGCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCAUA UGACUAAA AAAAAAAAAAAAAAAAA
63	ModB FLT3L (胺基 酸・與小鼠最 佳化分泌序 列組合之人 類 FLT3L)	MGAMAPRTL L L L L L A A A L A P T Q T R A G P G S T Q D C S F Q H S P I S S D F A V K I R E L S D Y L L Q D Y P V T V A S N L Q D E L C G G L W R L Y L A Q R W M E R L K T V A G S K M Q G L L E R V N T E I H F V T K C A F Q P P P S C L R F V Q T N I S R L L Q E T S E Q L V A L K P W I T R Q N F S R C L E L Q C Q P D S S T L P P P W S P R P L E A T A P T A P Q P P

64	ModB FLT3L (DNA : 5' UTR-CDS-3' UTR)	GGAATAAACTAGTCTCAACACAACATATACAAAACAAACGAATCTCAAGCAATCAAGCATT CTACTTCTATTGCAGCAATTTAAATCATTTCCTTTAAAGCAAAAGCAATTTCTGAAAATTT TCACCATTTACGAACGATAGCCATGGGCGCCATGGCCCCTAGAACATTGCTCCTGCTGCTG GCCGCTGCCCTGGCCCCTACACAGACAAGAGCTGGACCTGGATCCACCCAGGACTGCAGC TTCCAGCACTCCCTATCTCCTCCGACTTCGCCGTGAAGATCCGGGAGCTGTCCGATTACC TGCTGCAGGACTACCCTGTGACCGTGGCCAGCAACCTGCAGGACGAAGAACTGTGTGGCG GCCTGTGGCGGCTGGTGCTGGCCCAGCGGTGGATGGAACGGCTGAAAACCGTGGCCGGC TCCAAGATGCAGGGCCTGCTCGAGCGGGTGAACACCGAGATCCACTTCGTGACCAAGTGC GCCTTCCAGCCTCCTCCTTCCCTGCCTGCGGTTCGTGCAGACCAACATCTCCCGGCTGCTGC AGGAAAACCTCCGAGCAGCTGGTCGCCCTGAAGCCTTGGATCACCCGGCAGAACTTCTCCC GGTGTCTGGAACCTCCAGTGTCAAGCCCGACTCCTCCACCCTGCCTCCTCCCTGGTCCCCCAG GCCTCTGGAAGCCACCGCCCCCTACCGCCCCACAGCCTCCTTGATAGGTGACGTCCTGGT ACTGCATGCACGCAATGCTAGCTGCCCCTTTCCCGTCCTGGGTACCCCGAGTCTCCCCCGA CCTCGGGTCCCAGGTATGCTCCCACCTCCACCTGCCCCACTCACCACCTCTGCTAGTTCCA GACACCTCCCAAGCACGCAGCAATGCAGCTCAAAACGCTTAGCCTAGCCACACCCCCACG GGAAAACAGCAGTGATTAACTTTAGCAATAAACGAAAGTTTAACTAAGCTATACTAACCCC AGGGTTGGTCAATTCGTGCCAGCCACACCCTCGAGCTAGCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAGCATATGACTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
----	--	--

65	ModB 鼠類 FLT3L (RNA)	GGAAUAAACUAGUCUCAACACAACAUAUACAAAACAAACGAAUCUCAAGCAAUCAAGCAU UCUACUUCUAUUGCAGCAAUUUAAAUCAUUCUUUUAAAAGCAAAAGCAAUUUCUGAAAA UUUUCACCAUUAACGAACGAUAGCCAUGGGCGCCAUGGCCCCUAGAACAUUGCUCUUGCU GCUGGCCGCU'GCCCUGGCCCCU'ACACAGACAAGAGCU'GGACCU'GGAU'CCACCCAGGACT' GCAGCU'CCAGCACU'CCCU'AU'CU'CCU'CCGACU'CGCCGU'GAAGAU'CCGGGAGCU'GU'CC GAU'U'ACCU'GCU'GCAGGACT'ACCCUGUGACCGU'GGCCAGCAACCU'GCAGGACGAAGAACU' GUGUGGGCGGCCUGUGGGCGGCU'GGUGCU'GGCCCAGCGGU'GGAU'GGAACGGCU'GAAAAAC GUGGGCCGGCU'CCAAGAU'GCAGGGCCU'GCU'CGAGCGGGU'GAACACCGAGA'UCCACU'CGU' GACCAAGUGCGCCU'UCCAGCCU'CCUCCU'UCCUGCCUGCGGU'UCCUGCAGAC'AAAU'CU'CC CCGGCU'GCU'GCAGGAAACCU'CCGAGCAGCU'GGU'CGCCU'GAAGCCU'UGGAU'CACCC'GGC' AGAACU'CU'CCCGGUGUCU'GGAACU'CCAGUGUCAGCCCGACUCCU'CCACCCU'GCCU'CCUC CCU'GGU'CCCCCAGGCCU'CU'GGAAGCCACCGCCCCU'ACCGCCCCACAGCCU'CCU'GAU'AGG U'CGACGU'CCUGGU'ACU'GCAU'GCACGCAAU'GCU'AGCU'GCCCCU'U'U'CCCGU'CCU'GGGU'ACC' CCGAGU'CU'CCCCCGACCU'CGGGU'CCCAGGU'AU'GCU'CCCACCU'CCACCU'GCCCCACU'CAAC ACCU'GUGU'AGU'CCAGACACCU'CCCAAGCACGCAGCAAU'GCAGCU'CAAAACGCU'U'AGCC U'AGCCACACCCCCACGGGAAACAGCAGUGAU'U'AAACU'U'AGCAAU'AAACGAAAGU'U'AAU' U'AGCU'AU'ACU'AA'CCCAGGGU'GGU'CAAU'U'CGU'GCCAGCCACACCCU'CGAGCU'AGCAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCAU'AU'GACU'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA
41BBL 小鼠		
66	ModA 鼠類 41BBL (胺基 酸)	MDQHTLDVEDTADARHPAGTSCPSDAALLRDTGLLADAALLSDTVRPTNAALPTDAAYPAVNV RDREAAWPPALNFCSRHPKLYGLVALVLLLLIAACVPIETRTEPRPALTITTSPLNGTRENNAD QVTPVSHIGCPNTTQQGSPVFAKLLAKNQASLCNTTINWHSQDGAGSSYLSQGLRYEEDKKEL VVDSPGLYYVFLELKLSPFTTNTGHHKYQGWSLVYLQAKPQVDDFDNLALTVELFPCSMENKL VDRWSQLLLLKAGHRLSVGLRAYLHGAQDAYRDWELSYPNNTTSFGLFLVKPDNPWE

67	ModA 鼠類 41BBL (DNA : 5' UTR-CDS-3' UTR)	GGGCGAACTAGTATTCTTCTGGTCCCCACAGACTCAGAGAGAACCCGCCACCATGGACCA GCACACACTTGATGTGGAGGATACCGGGATGCCAGACATCCAGCAGGTACTTCGTGCCC CTCGGATGCGGCGCTCCTCAGAGATACCGGGCTCCTCGCGGACGCTGCGCTCCTCTCAGA TACTGTGCGCCCCACAAATGCCGCGCTCCCCACGGATGCTGCCTACCCTGCGGTTAATGTT CGGGATCGCGAGGCCCGGTGGCCGCTGCACTGAACCTCTGTTCCCGCCACCCAAAGCTC TATGGCCTAGTCGCTTTGGTTTTGCTGCTTCTGATCGCCGCTGTGTTCCCTATCTTCACCC GCACCGAGCCTCGGCCAGCGCTACAATCACCACCTCGCCCAACCTGGGTACCCGAGAGA ATAATGCAGACCAGGTCACCCCTGTTTCCACATTGGCTGCCCCAACACTACACAACAGGG CTCTCCTGTGTTTCGCCAAGCTACTGGCTAAAAACCAAGCATCGTTGTGCAATACAACCTG AACTGGCACAGCCAAGATGGAGCTGGGAGCTCATACCTATCTCAAGGTCTGAGGTACGAA GAAGACAAAAAGGAGTTGGTGGTAGACAGTCCCGGGCTCTACTACGTATTTTGGAAC TG AAGCTCAGTCCAACATTACAAAACACAGGCCACAAGGTGCAGGGCTGGGTCTCTCTTGTTT TGCAAGCAAAAGCCTCAGGTAGATGACTTTGACAACTTGGCCCTGACAGTGGAAC TGTTCC CTTGCTCCATGGAGAACAAGTTAGTGGACCGTTCCTGGAGTCAACTGTTGCTCCTGAAGG CTGGCCACCGCCTCAGTGTGGGTCTGAGGGCTTATCTGCATGGAGCCCAGGATGCATACA GAGACTGGGAGCTGTCTTATCCCAACACCACAGCTTTGGACTCTTTCTTGTAACCCGA CAACCCATGGGAATGATAGGGATCCGATCTGGTACTGCATGCACGCAATGCTAGCTGCCC CTTTCCCGTCTGGGTACCCCGAGTCTCCCCGACCTCGGGTCCCAGGTATGCTCCCACCT CCACCTGCCCACTCACCACCTCTGCTAGTTCCAGACACCTCCCAAGCACGCAGCAATGCA GCTCAAAACGCTTAGCCTAGCCACACCCCCACGGGAAACAGCAGTGATTAACCTTTAGCA ATAAACGAAAAGTTTAACTAAGCTATACTAACCCAGGGTTGGTCAATTTTCGTGCCAGCCAC ACCCTCGAGCTAGCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCATATGACTAAAAAAA AA AA
----	---	--

68	ModA 鼠類 41BBL (RNA)	GGGCGGAACUAGUAUUCUUCUGGUCGCCACAGACUCAGAGAGAACCCGCCACCAUGGACC AGCACACACUUAUGUGGAGGAUACCGCGGAUGCCAGACAUCAGCAGGUAUUCUGGCG CCUCGGAUGCGGGCGCUCCUCAGAGAUACCGGGCUCCUCGCGGACGCGUGCGUCCUCUC AGAUCUGUGCGCCCCACAAUAGCGCGCUCCCCAGGAUGCGUCCUACCCUGCGGUUA AGUUCGGGAUCGCGAGGCCGCGUGGCCGCGUCAGACUGAACUUCUGUUCGCCGCAACCA AAGCUCUAUGGCCUAGUCGCUUUGGUUUUGCUGCUUCUGAUCGCCGCCUGUGUCCUAU CUUACCCCGCACCGAGCCUCGGCCAGCGCUCACAAUACCCACCUCCGCCAACCCGGGUAC CCGAGAGAAUAAUGCAGACAGGUCACCCCUUUUCCCCAACUUGGCUGCCCCAACACUAC ACAAACGGGCUCCUGUGUUCGCAAGCUCUAGGCUAAGGCUAAGGCUAAGGCUAAGGCUA UACAACUCUGAAACUGGCACAGCCAAGAUGGAGCUGGGAGCUCUACCUAUCUCAAGGUC UGAGUACGAAAGACAAGCAAAAGGAGUUGGUGGUAGACAGUCUCCGGGCUUACUGAUGA UUUUUGGAACUGAAGCUCAGUCCAACAUUACAAAAACAGGCCACAAGGUGCAGGGGUG GGUCUCUUGUUUUGCAAGCAAGGCCUGAGUAGUAGUAGUAGUAGUAGUAGUAGUAGUAGU CAGUGGAACUGUUCUUGCUCCAUGGAGAACAAGUUAGUGGACCGUUCUGGAGUCA CUGUUGCUCCUGAAGGCGUGGCCACCGCCUCAGUGUGGGUCUGAGGGGCUUACUGCAGG AGCCCAGGAUGCAUACAGAGACUGGGAGCUGUCUUAUCCCAACACCCAGCUCUUGGAC UCUUUCUUGGAAACCCGACAACCCUAGGGAAUGAUAGGGAUCCGAUCUGGUACUGCAU GCACGCAAUGCUAGCUGCCCCUUCUCCCGUCCUGGUACCCCGAGUCUCCCCCGACCUCCG GGUCCAGGUAUGCUCCCAACCUCCACCUCCGCCCAUCACCCUCCAGCUGAUGUCCAGACA CCUCCCAAGCAGCGACAAGCGAGCUCAAAAAGCUCUAGCCUAGCCACGCCCCACGGGAA ACAGCAGUGAUUAAACCUUAGCAUAAACGAAAGUUUAAACUAAAGCUAUAUAAACCCCGA GUUGGUCAAUUCGUGCCAGCCACACCCUCGAGCUAGCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAACAUAUGACUAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
69	ModB 鼠類 41BBL (胺基 酸)	MDQHTLDVEDTADARHPAGTSCPSDAALLRDTGLLADAALLSDTVRPTNAALPTDAAYPVNV RDREAAWPPALNFCRHPKLYGLVALVLLLLIAACVPIFTTRTEPRPALTITTSPLNGTRENNAD QVTPVSHIGCPNTTQQGSPVFAKLAKNQASLCNTTLNWHQSDGASSYLTLQFLRYEEDKKEL VVDSPGLYYVFLLEKLSPFTNTGKHVKQGWVSLVLQAKPQVDDFDNLALTVGLFPCSMENKL VDRWSOLLRLKAGHRLSVGLRAYLHGAODAYRDWELSPYNTTSFGLFLVKPDNPWE

70	ModB 鼠類 41BBL (DNA : 5' UTR-CDS-3' UTR)	GGAATAAACTAGTCTCAACACAACATATACAAAACAAACGAATCTCAAGCAATCAAGCATT CTACTTCTATTGCAGCAATTTAAATCATTTCCTTTAAAGCAAAAGCAATTTCTGAAAATTT TCACCAITTAACGAACGATAGCCATGGACCAGCACACACTTGATGTGGAGGATACCGCGGA TGCCAGACATCCAGCAGGTACTTCGTGCCCCCTCGGATGCGGCGCTCCTCAGAGATACCGG GCTCCTCGCGGACGCTGCGCTCCTCTCAGATACTGTGCGCCCCACAAATGCCGCGCTCCC CACGGATGCTGCCTACCCTGCGGTTAATGTTGCGGATCGCGAGGCCGCGTGGCCGCTGC ACTGAACCTTCTGTTCCCGCCACCCAAAGCTCTATGGCCTAGTCGCTTTGGTTTTGCTGCTT CTGATCGCCGCTGTGTTCTATCTTCACCCGCACCGAGCCTCGGCCAGCGCTACAATCA CCACCTCGCCCCAACCTGGGTACCCGAGAGAATAATGCAGACCAGGTACCCCTGTTTCCC ACATTGGCTGCCCCAACACTACACAACAGGGCTCTCCTGTGTTGCCCAAGCTACTGGCTAA AAACCAAGCATCGTTGTGCAATACAACCTCTGAACTGGCACAGCCAAGATGGAGCTGGGAG CTCATACCTATCTCAAGGTCTGAGGTACGAAGAAGACAAAAAGGAGTTGGTGGTAGACAG TCCCGGGCTCTACTACGTATTTTTGGAACTGAAGCTCAGTCCAACATTACAAACACAGGC CACAAGGTGCAGGGCTGGGTCTCTCTTGTGTTTGCAAGCAAAGCCTCAGGTAGATGACTTT GACAACTTGGCCCTGACAGTGGAAGTGTCCCTTGCTCCATGGAGAACAAGTTAGTGGAC CGTTCCTGGAGTCAACTGTTGCTCCTGAAGGCTGGCCACCGCCTCAGTGTGGGTCTGAGG GCTTATCTGCATGGAGCCCAGGATGCATACAGAGACTGGGAGCTGTCTTATCCCAACACC ACCAGCTTTGGACTCTTTCTTGTAACCCGACAACCCATGGGAATGATAGGGATCCGATC TGGTACTGCATGCACGCAATGCTAGCTGCCCCCTTCCCGTCCTGGGTACCCCGAGTCTCCC CCGACCTCGGGTCCCAGGTATGCTCCACCTCCACCTGCCCCACTCACCACCTCTGCTAGT TCCAGACACCTCCCAAGCACGCAGCAATGCAGCTCAAAACGCTTAGCCTAGCCACACCCC CACGGGAAACAGCAGTGATTAACCTTTAGCAATAAACGAAAGTTTAACTAAGCTATACTAA CCCCAGGGTTGGTCAATTTTCGTGCCAGCCACACCCTCGAGCTAGCAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAGCATATGACTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
----	---	--

71	ModB 鼠類 41BBL (RNA)	GGAAUAAACUAGUCUCAACACAACAUAUACAAAACAAACGAAUCUCAAGCAAUCAAGCAU UCUACUUCUAUUGCAGCAAUUUAAAUCAUUUCUUUAAAAGCAAAGCAAUUUCUGAAAA UUUUCACCAUUUACGAACGAUAGCCAUGGACCAGCACACACUUGAUGUGGAGGAUACC GGAUGCCAGACAUCCAGCAGGUACUUCGUGCCCCUCGGAUGCGGCGCUCUCAGAGAU CCGGGCUCCUCGCGGACGCGUGCGCUCCUCUCAGAUACUGUGCGCCCCACAAUUGCCGCG CUCCCCACGGAUGCUGCCUACCCUGCGGUAAUGUUCGGGAUCGCGAGGCCGCGUGGCC GCCUGCACUGAACUUCUGUUCGCGCCACCCAAAGCUCUAUGGCCUAGUCGCUUUGGUUU GCUGCUUCUGAUCGCGCGCCUGUGUCCUAUCUUCACCCGCACCGAGCCUCGCGCCAGCGC UCACAAUACCAACCUUGCCCAACCVGGGUACCCGAGAGAAUAAUGCAGACCAGGUACCC CUGUUUCCCAUUGGCUGCCCCAACACUACACAACAGGGCUCUCUGUGUUCGCCAAGC UACUGGCUAAAAACCAAGCAUCGUUGUGCAAUACAACUCUGAACUGGCACAGCCAAGAU GAGCUGGGAGCUCAUACCUAUCUCAAGGUCUGAGGUACGAAGAAGACAAAAAGGAGUUG GUGGUAGACAGUCCCGGGCUCUACUACGUUUUUUGGAACUGAAGCUCAGUCCAACAU CACAAACACAGGCCACAAGGUGCAGGGCUGGGUCUCUCUUGUUUGCAAGCAAAGCCUC AGGUAGAUGACUUUGACAACUUGGCCUGACAGUGGAACUGUCCCUUGCUCCAUGGAG AACAAAGUUAGUGGACCGUUCUGGAGUCAACUGUUGCUCCUGAAGGCUGGCCACCGCCU CAGUGUGGGUCUGAGGGCUUAUCUGCAUGGAGCCCAGGAUGCAUACAGAGACUGGGAGC UGUCUUUACCCAAACACCACAGCUUUGGACUCUUUCUUGUGAAACCCGACAACCAUGGG AAUGAUAGGGAUCCGAUCUGGUACUGCAUGCACGCAAUGCUAGCUGCCCCUUCGCGUC CUGGGUACCCCGAGUCUCCCCGACCUCGGGUCCCAGGUUAGCUCCCAACCUCCACCGCC CCACUCACCACCUUGCUAGUCCAGACACCUCCCAAGCACGCAGCAAUGCAGCUAAAA CGCUUAGCCUAGCCACACCCACAGGAAACAGCAGUGAUUAAACCUUUAAGCAAUAAACGA AAGUUUAAACUAAAGCUAUACUAAACCCAGGGUUGGUCAAUUUCGUGCCAGCCACACCCUCG AGCUAGCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCAUAGACUAAAAAAAAAAAA AAA
CD27L-CD40L 小鼠		

72	ModA 鼠類 CD27L-CD4 0L (胺基酸)	<u>MRVTAPRTLILLLSGALALTETWAGSGSHPEPHTAELQLNLTVPRKDPTLRWGAGPALGRSFTHGPE</u>
		<u>LEEGHLRIHODGLYRLHIQVTLANCSSPGSTLOHRATLAVGICSPAAGHISLLRGRFGODCTVALQRL</u>
	序列註釋	<u>TYLVHGDVLCNTLTLPLLPSRNADETFFGVQWICPGGGSGGGHPEPHTAELQLNLTVPRKDPTLRW</u>
	CAPS :	<u>GAGPALGRSFTHGPELEEGHLRIHODGLYRLHIQVTLANCSSPGSTLOHRATLAVGICSPAAGHISLL</u>
	CD27L ;	<u>RGRFGODCTVALQRLTYLVHGDVLCNTLTLPLLPSRNADETFFGVQWICPGGGSGGGHPEPHTAEL</u>
	CAPS : 連接	<u>QLNLTVPRKDPTLRWGAGPALGRSFTHGPELEEGHLRIHODGLYRLHIQVTLANCSSPGSTLOHRAT</u>
	子 ;	<u>LAVGICSPAAGHISLLRGRFGODCTVALQRLTYLVHGDVLCNTLTLPLLPSRNADETFFGVQWICPG</u>
	CAPS :	<u>GGGSGGGSGGGSGGDEDPQIAAHVSEANSNAASVLQWAKKGYTMTKSNLVMLENGKQLTV</u>
	CD40L	<u>KREGLYYVYTQVTFCSNREPSSQRPFIVGLWLKPSSGSERILLKAANTHSSSQLCEQQSVHLGG</u>
		<u>VFELQAGASVFVNVTASQVIHRVGFSSFGLLKLGGGSGGGGDEDPQIAAHVSEANSNAASVL</u>
		<u>QWAKKGYTMTKSNLVMLENGKQLTVKREGLYYVYTQVTFCSNREPSSQRPFIVGLWLKPSSG</u>
		<u>SERILLKAANTHSSSQLCEQQSVHLGGVFELQAGASVFVNVTASQVIHRVGFSSFGLLKLGGG</u>
		<u>SGGGGDEDPQIAAHVSEANSNAASVLQWAKKGYTMTKSNLVMLENGKQLTVKREGLYYVY</u>
		<u>TQVTFCSNREPSSQRPFIVGLWLKPSSGSERILLKAANTHSSSQLCEQQSVHLGGVFELQAGAS</u>
		<u>VFVNVTASQVIHRVGFSSFGLLKL</u>

73	ModA 鼠類 CD27L-CD4 0L (DNA : 5' UTR-CDS-3' UTR)	GGGCGAACTAGTATTCTTGGTCCCACTGAGAGAGAACCCGCCACCATGAGAGTGACCGCCCCAGAACCCCTGA TCCTGCTGCTCTTGGCGCCCTGGCCCTGACAGAGACATGGGCGGGAAGCGGATCCCACCCGAGCCCAACCCCGGAA CTGACAGCTGAACCTGACCGTGCCAGAAAAGGACCCACCTGAGATGGGGAGCTGGCCCTGCTCTGGGGCAGATCCTTTAC ACACGGCCCCGAGCTGGAAGAAGGCCACCTGAGAATCCACCAGGACGGCTGTACAGACTGCACATCCAAGTGACCCCTGG CCAACTGCAGCAGCCCCCTGGCTCTACCCTGCAGCACAGAGCCACACTGGCCGTGGGCATCTGTAGCCCTGCTGTCACGGA ATCAGCCTGCTGAGAGGCGAGATTGCGGCCAGGACTGTACCCGTGGCCCTGCAGAGGCTGAACCTATCTGGTGCATGGCGACGT GCTGTGCACCAACCTGACACTGCCTCTGCTGCCCAGCAGAAACGCCGACGAAACATTCTTTGGAGTGCAGTGGATTGTTC TGGCGGAGGGTCCGGGGGAGGACACCCAGAACCTCATACAGCTGAACCTGCAGCTGAACCTGACCGTCCCAAGGAGAC CCACCTGAGATGGGGAGCTGGCCCTGCTCTGGGCAGATCCTTTACACAGGCCCGGAGCTGGAAGAAGGCCACCTGAGA ATCCACAGGACGCCCTGTACAGACTGCACATCCAAGTGACCCCTGGCCAACTGCAGCAGCCCTGGCTCTACCTGTCAGCA CAGAGCCCACTGGCCGTGGGCATCTGTAGCCCTGCTGCTCACGGAATCAGCCTGCTGAGAGGCGAGATTGGGCCAGGACT GTACCGTGGCCCTGCAGAGGCTGACCTATCTGTGTCATGGCGACGTGCTGTGCACCAACCTGACACTGCCTCTGCTGCCC AGCAGAAACGCCGACGAAACATTCTTTGGAGTGCAGTGGATTGTCTTGGGGGAGGCTCCGGAGGCGGACACCTGAACC TCATACAGCTGAACCTGCAGCTGAACCTGACCCGTGCCCAGAAAGGACCCACCTGAGATGGGGAGCTGGCCCTGCTCTGG GCAGATCCTTTACACAGGCCCGGAGCTGGAAGAAGGCCACCTGAGAAATCCACCAGGACGGCCCTGTACAGACTGCACATC CAAGTGACCCCTGGCCAACTGCAGCAGGCCCTGGCTCTACCCCTGCAGCACAGAGCCACACTGGCCGTGGGCATCTGTAGCCC TGCTGCTACGGAATCAGCTGCTGAGAGGCGAGATTGGGCCAGGACTGTACCGTGGCCCTGCAGAGGCTGACCTATCTGG TGCATGGCGACGTGCTGTGCACCAACCTGACACTGCCTCTGCTGCCCAGCAGAAACGCCGACGAGACCTTCTTCGGCGTC CAGTGGATCTGCCCGGAGGCGGTGGTAGTGGAGGTGGCGGGTCCGGTGGAGGTGGAAGCGGCGACGAGGACCCCCAGA TCGCGGCCCAACGTGGTGTCTGAGGCCAACAGCAACGCCCGCTCTGTGCTGCAGTGGGCCAAGAAAGGCTACTACACCATG AAGTCCAACCTCGTGATGTGGAAGAACGGCAAGCAGCTGACCCGTGAAGCGCGAGGGCCCTGTACTATGTGTACACCCAACT GACATCTGCAGCAACCGCGAGGCCAGCAGCCAGAGGCCCTTTATCTGTTGGCCCTGTGGCTGAAGCCTAGCAGCGGCGAGCG AGAGAACTCTGCTGAAGGCCGCCAACACCCACAGCAGCTCTCAGCTGTGCGAGCAGCAGTCTGTGCACCTGGGAGGCGTG TTCGAGCTCAAAGCTGGCGCTTCCGTGTTGCTGAACGTGACCGAGGCCAGCCAAGTGATCCACAGAGTGGGCTTCAGCAG CTTTGGAGTGTCTAAACTGGGCGGAGGGTCCGGCGGAGGCGGAGATGAAGATCCTCAGATTGCTGCCACGCTGGTGTCTG AGGCCAACAGCAACGCCCGCTCTGTGCTGCAGTGGGCCAAGAAAGGCTACTACACCATGAAGTCCAACCTCGTGTATGCTG GAAAAAGGCAAGCAGCTGACCGTGAAAGCGCGAGGGCCTGTACTATGTGTACACCCAAAGTGACATTCTGCAGCAACCGCGA GCCAGCAGCCAGAGGCCCTTTATCTGTTGGCCCTGTGGCTGAAGCCTAGCAGCGGCGAGCGAGAGAAATCCTGCTGAAGGCCG CCAACACCCACAGCAGCTCTCAGCTGTGCGAGCAGCAGTCTGTGCACCTGGGAGGCGGTGTTGAGCTGCAAGCTGGCGCT TCCGTGTTGCTGAACGTGACCGAGGCCAGCCAACTGATCCACAGAGTGGGCTTCAGCAGCTTTGGAAGCTGCTCAAACTGGG AGGCGGCTCCGGAGGCGGAGGAGATGAAGATCCTCAGATTGCTGCCACCGTGGTGTCTGAGGCCAACAGCAACGCCCGCT CTGTGCTGCAGTGGGCCAAGAAAGGCTACTACACCATGAAGTCCAACCTCGTGATGCTGGAAGAACGGCAAGCAGCTGACC GTGAAGCGCGAGGGCCTGTACTATGTGTACACCCAAAGTGACATCTGCAGCAACCGCGAGGCCAGCAGCCAGAGGCCCTTT TATCGTGGCCCTGTGGCTGAAGCCTAGCAGCGGCGAGGAGAAATCCTGCTGAAGGCCGCCAACACCCACAGCAGCTCTC AGCTGTGCGAGCAGCAGTCTGTGCACCTGGGAGGCGTGTTCGAGCTGCAAGCTGGCGCTTCCGTGTTCTGTAACCTGAGC GAGGCCAGCCAAGTGATCCACAGAGTGGGCTTCTCCTCCTTCGGCCTCCTGAAGCTGTGACTCGAGAGCTCGCTTCTTGTG TGTCCAATTTCTATTAAGGGTCTCTTTGTTCCCTAAGTCCAACCTAATAACTGGGGGATATTATGAAGGGCCTTGAGCATCT GGATTCTGCTAATAAAAAACATTTATTTCAITTGCTGCGTCGAGAGCTCGCTTTCTTGCTGTCCAATTTCTATTAAGGGT CCTTTGTTCCCTAAGTCCAACCTAATAACTGGGGGATATTATGAAGGGCCTTGAGCATCTGGATTCTGCTAATAAAAAAC ATTTATTTTCTGCTGCTGAGACCTGGTCCAGAGTCGCTAGCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCATAT GACTAAA
----	--	--

74	ModA 鼠類 CD27L-CD4 0L (RNA)	GGGCGAACUAGUAUUCUUCUGGUCCCCACAGACUCAGAGAGAACCCGCCACCAUGAGAGUGACCGCCCCAGAACCCUG AUCCUGCUGCUGUCUGGCGCCUGGCCUGACAGAGACAUGGGCCGGAAGCGGAUCCACCCCGAGCCCCACACCGCCG AACUGCAGCUGAACCUUGACCGUGCCAGAAAGGACCCACCCUGAGAUUGGGAGCUGGCCUCUCUGGGCAGAUCCUU UACACACGGCCCCGAGCUGGAAGAAAGGCCACCUAGAAUCCACAGGACGGCCUGUACAGACUGCAUAUCCAAAGUGACC CUGGCCAACUGCAGCAGCCUGGCCUCUACCTUGCAGCAGAGCCACACUGGCCUGGGCAUCUGUAGCCCTUGCUGCUC ACGGAUUCAGCCUGCUGAGAGGCAGAUUCGGCCAGGACUGUACCGUGGCCUCUGCAGAGGCUGACCUAUCUGGUGCAUUG CGACGUGCUGUGCAACCAACUGACACUGCCUCUGCUGCCAGCAGAAACGCCGACGAAACAUCUUUGGAGUGCAGUGG AUUUGUCCUGGCGGAGGGUCCGGGGGAGGACACCCAGAACCUCAUACAGCUGAACUGCAGCUGAACUGACCGUGCCCA GAAAGGACCCACCCUGAGAUGGGGAGCUGGCCUCUGCUGGGCAGAUCCUUUACACAGGCCCCGAGCUGGAAGAAAG CCACCUAGAGAAUCCACAGGACGGCCUGUACAGACUGCAUCCAAAGUGACCCUGGCCAACUGCAGCAGCCUGGCCUCUA CCUGCAGCACAGAGCCACACUGGCCUGGGCAUCUGUAGCCUCUGCUGCAGCGAAUUCAGCCUGCUGAGAGGCAGAUU CGGCCAGGACUGUACCGUGGCCUCUGAGAGGCUGACCUAUCUGGUGCAUGGCGACGUGCUGCAGCAACCUUGACACUG CCUCUGCUGCCAGCAGAAACGCCGACGAAACAUCUUUGGAGUGCAGUGGAUUCUCCUGGGGGAGGCUCCGGAGGCG GACACCCUGAACCUCAUACAGCUGAACUGCAGCUGAACCUGACCGUGCCAGAAAGGACCCACCCUGAGAUGGGGAGC UGGCCUCUGCUGGGCAGAUCCUUUACACAGGCCCCGAGCUGGAAGAAGGCCACCUAGAAUCCACAGGACGGCCUG UACAGACUGCACAUCCAAGUGACCCUGGCCAACUGCAGCAGCCUGGCCUCUACCCUGCAGCAGAGGCCACACUGGCCGU GGGCAUCUGUAGCCUCUGCUGCAGCGAAUACGCCUGCUGAGAGGCAGAUUCGGCCAGGACUGUACCGUGGCCUCUGCAG AGGCUGACCUAUCUGGUGCAUGGCGACGUGCUGUGCAACCAACUGACACUGCCUCUGCUGCCAGCAGAAACGCCGACG AGACCUUCUUGCGCGUCCAGUGGAUCUGCCCGGAGGGCGGUGGAGUGGAGGUGGCGGGUCCGGUGGAGGUGGAAGCG GCGACGAGGACCCCAAGUCCGCCGCCACGUGGUGUCUGAGGCCAACAGCAACGCCGCCUCUGUGCUGCAGUGGGCCAA GAAAGGCUACUACCAUGAAGUCCAAACCUUGUGAUGCUGGAAACGGCAAGCAGCUGACCGUGAAGCGCAGGGCCUG UACUAGUGUACACCCAAGUGACAUCUCUGCAGCAACGCCGAGCCAGCAGCCAGAGGCCUUUUAUCUGGCCUCUGGCG UGAAGCCUAGCAGCGGCAGCGAGAGAAUCCUGCUGAAGGCCGCCAACACCCACAGCAGCUCUACGCUUGCGAGCAGCA GUCUGUGCACCUGGGAGGCGUGUUCGAGCUGCAAGCUGGCGCUUCCGUGUUCUGGAACGUGACCGAGGCCAGCCAAUG AUCCACAGAGUGGGCUUCAGCAGCUUUGGACUCUAAACUGGGCGGAGGGUCCGGCGGAGGCGGAGAUGAAGAUCCUC AGAUGCUGCCACGUGGUGUCUGAGGCCAACAGCAACGCCGCCUCUGUGCUGCAGUGGGCCAAAGAAAGGCUACUAC CAUGAAGUCCAAACUCUGUGAUGCUGGAAACGGCAAGCAGCUGACCGUGAAGCGCGAGGGCCUGUACUAGUGUACACC CAAGUGACAUUCUGCAGCAACCGCGAGCCAGCAGCCAGAGGCCUUUUUUCUGGGCCUGUGGCUAGAGCCUAGCAGCG GCAGCGAGAGAAUCCUGUGAAGGCCGCCAACACCCACAGCAGCUCUCAGCUGUGCGAGCAGCAGUCUGUGCACCUGGG AGGCCUGUUCGAGCUGCAAGCUGGCGCUUCCGUGUCCUGAACGUGACCGAGGCCAGCCAGUGAUCCACAGAGUGGGC UUCAGCAGCUUUGGACUGCUAAACUGGGAGGCGGCCUGCGGAGGCGGAGGAGAUGAAGAUCCUGAGAUUGCUGCCACG UGGUGUCUGAGGCCAACAGCAACGCCGCCUCUGUGCUGCAGUGGGCCAAAGAAAGGCUACUACCAUGAAGUCCAAACCU CGUGAUGCUGGAAACCGCAAGCAGCUGACCGUGAAGCGCGAGGGCCUGUACUAGUGUACACCAAGUGACAUUCUGC AGCAACCGCGAGCCAGCAGCCAGAGGCCUUUUAUCUGGGGCCUGUGGCUGAAGCCUAGCAGCGGCAGCGAGAGAUCC UGCUGAAGGCCGCCAACACCCACAGCAGCUCUCAGCUGUGCGAGCAGCAGUCUGUGCAGCUGGGAGGCCUGUUCGAGCU GCAAGCUGGCGCUUCCGUGUGUGAAGCUGACCGAGGCCAGCCAAAGUGAUCCACAGAGUGGGCUUCCUCCUCCUCCGCG CUCCUGAAGCUGAGCUGCAGAGCUCGCUUUCUGCUGUCCAAUUCUAUUAAAGGUUCCUUUGUCCCUAAGUCCAAU ACUAAACUGGGGGAUUAUUGAAGGGCCUUGAGCAUCUGGAUUCUGCCUAAUAAAAACAUAUUUUUUAUUGCUGCGUC GAGAGCUCGCUUUCUGCUGUCCAAUUCUAUUAAAGGUUCCUUUGUCCUAAAGUCCAAUUAUUAUUGGGGGAUUAU AUGAAGGGCCUUGAGCAUCUGGAUUCUGCUAAUAAAAACAUAUUUAUUCUUGCUGCGUCGAGACCUUGGUCCAGAGUC GCUAGCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCAUUGACUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
----	----------------------------------	---

75	ModB 鼠類 CD27L-CD4 0L (胺基酸)	<u>MGAMAPRTL</u> <u>LLLLAAALAPTQ</u> <u>TRAGPGSHPEPHTAELQ</u> <u>LNLTVP</u> <u>RKDPTLRWGAGPALGRSFTHGP</u> <u>ELEEGHLRIHODGLYRLHIOVTLANCSSPGSTLOHRATLAVGICSPA</u> <u>AHGISLLRGRFGODCTVALOR</u> <u>LTYL</u> <u>VHGDVLC</u> <u>TNLTPL</u> <u>PSRNADE</u> <u>TF</u> <u>FGVQ</u> <u>WICPGGGSGGGHPEPHTAELQ</u> <u>LNLTVP</u> <u>RKDPTLRW</u> <u>GAGPALGRSFTHGPELEEGHLRIHODGLYRLHIOVTLANCSSPGSTLOHRATLAVGICSPA</u> <u>AHGISLL</u> <u>RGRFGODCTVALOR</u> <u>LTYL</u> <u>VHGDVLC</u> <u>TNLTPL</u> <u>PSRNADE</u> <u>TF</u> <u>FGVQ</u> <u>WICPGGGSGGGHPEPHTAEL</u> <u>Q</u> <u>LNLTVP</u> <u>RKDPTLRWGAGPALGRSFTHGPELEEGHLRIHODGLYRLHIOVTLANCSSPGSTLOHRAT</u> <u>LAVGICSPA</u> <u>AHGISLLRGRFGODCTVALOR</u> <u>LTYL</u> <u>VHGDVLC</u> <u>TNLTPL</u> <u>PSRNADE</u> <u>TF</u> <u>FGVQ</u> <u>WICPG</u> <u>GGGSGGGSGGGSGDEDPQIAAHVVSEANSNAASVLQWAKKGYT</u> <u>MKSNLV</u> <u>MLENGKQ</u> <u>LT</u> <u>V</u> <u>KREGLY</u> <u>YVYTQ</u> <u>VTFC</u> <u>SNREPSSQ</u> <u>RP</u> <u>FIVGLW</u> <u>LKPSSG</u> <u>SERILLKAANTHSSSQLCEQ</u> <u>QSVHLGG</u> <u>VFELQAGASV</u> <u>FNVT</u> <u>EASQ</u> <u>VIHRVGFSSFGLLKLGGGSGGGGDEDPQIAAHVVSEANSNAASVL</u> <u>QWAKKGYT</u> <u>MKSNLV</u> <u>MLENGKQ</u> <u>LT</u> <u>VKREGLY</u> <u>YVYTQ</u> <u>VTFC</u> <u>SNREPSSQ</u> <u>RP</u> <u>FIVGLW</u> <u>LKPSSG</u> <u>SERILLKAANTHSSSQLCEQ</u> <u>QSVHLGGV</u> <u>FELQAGASV</u> <u>FNVT</u> <u>EASQ</u> <u>VIHRVGFSSFGLLKLGGG</u> <u>SGGGGDEDPQIAAHVVSEANSNAASVLQWAKKGYT</u> <u>MKSNLV</u> <u>MLENGKQ</u> <u>LT</u> <u>VKREGLY</u> <u>YVY</u> <u>TQVTFC</u> <u>SNREPSSQ</u> <u>RP</u> <u>FIVGLW</u> <u>LKPSSG</u> <u>SERILLKAANTHSSSQLCEQ</u> <u>QSVHLGGV</u> <u>FELQAGAS</u> <u>VFVNVTEASQ</u> <u>VIHRVGFSSFGLLKL</u>
----	----------------------------------	---

76	ModB 鼠類 CD27L-CD4 0L (DNA : 5' UTR-CDS-3' UTR)	GGAAATAAACTAGTCTCAACACAACATATACAAAAAAACGAATCTCAAGCAATCAAGCATTCTACTTCTATTGCAGCAATTT AAATCATTTTCTTTTAAAGCAAAAGCAATTTTCTGAAAAATTTTCACCATTTACGAACGATAGCCATGGGCGCCATGGCCCCCTA GAAACATTGCTCCTGCTGCTGGCCGCTGCCCTGGCCCCCTACACAGACAAGAGCTGGACCTGGATCCCACCCCGAGCCCCAC ACCGCCGAATCGAGCTGAACCTGACCGTGCCCAAGGAACCCACCTGAGATGGGGAGCTGGCCCTGCTCTGGGCAG ATCCTTTACACACGGCCCCGAGCTGGAAGAAGGCCACCTGAGAATCCACAGGACGGCCTGTACAGACTGCACATCCAAG TGACCTTGGCCAACTGCAGCAGCCCTGGCTCTACCTTGACGACACAGAGCCCACTGGCCGTGGGCACTCTGTAGCCCTGCT GCTCAGGAAATCAGCCTGCTGAGAGGCAAGATTCCGGCCAGGACTGTACCGTGCCCTGCAGAGGCTGACCTATCTGGTGCA TGGCGACGTGCTGTGCACCAACCTGACACTGCCTCTGCTGCCAGCAGAAAACGCCGACGAAACATTCTTTGAGTGCACT GGATTGTCTCTGGCGGAGGGTCCGGGGGAGGACACCCAGAACTCATAACAGCTGAACCTGCAGCTGAACCTGACCGTGCCC AGAAAGGACCCCACTGAGATGGGGAGCTGGCCCTGCTCTGGGCAGATCCTTTACACACGGCCCCGAGCTGGAAAGAGG CCACCTGAGAATCCACCAGGACGGCCTGTACAGACTGCACATCCAAGTGACCTGGCCCACTGCAGCAGCCCTGGCTCTA CCCTGCAGCACAGAGCCCACTGGCCGTGGGCATCTGTAGCCCTGCTGCTCAGCGAATCAGCCTGCTGAGAGGCGAGATT GGCCAGGACTGTACCGTGGCCCTGCAGAGGCTGACCTATCTGGTGCAATGGCGACGTGCTGTGCACCAACCTGACACTGCC TCTGCTGCCCAGCAGAAACGCCGACGAAACATTCTTTGAGTGCACTGGATTGTCTGGGGGAGGCTCCGGAGGCGGAC ACCCTGAACTCATAACAGCTGAACCTGCAGCTGAACCTGACCGTGCCCAAGGAACCCACCTGAGATGGGGAGCTGGC CCTGCTCTGGGCAGATCCTTTACACACGGCCCCGAGCTGGAAAGAGGCCACCTGAGAATCCACCAGGACGGCCTGTACAG ACTGCACATCCAAGTGACCTTGGCCAACTGCAGCAGCCCTGGCTCTACCTGTCAGCACAGAGCCCACTGGCCGTGGGCA TCTGTAGCCCTGCTGCTCACGGAATCAGCCTGCTGAGAGGCAAGATTCCGGCCAGGACTGTACCGTGGCCCTGCAGAGGCTG ACCTATCTGGTGCAATGGCGACGTGCTGTGCACCAACCTGACACTGCCTCTGCTGCCAGCAGAAACGCCGACGAGACCTTC TTCGGCGTCCAGTGGAATCTGCCCCGGAGGCGGTGTTAGTGAGGTGGCGGGTCCGGTGAGGTGGAAGCGGCGACGAGG ACCCCCAGATCGCCGCCACGCTGGTGTCTGAGGCCAACAGCAACGCCGCTCTGTGCTGCAGTGGGCCAAGAAAGGCTAC TACACCATGAAGTCCAACTCGTGATGCTGGAACAGGCAAGCAGCTGACCGTGAAAGCGGAGGGCCTGTACTATGTGTA CACCCAACTGACATTCTGCAGCAACCCGAGCCAGCAGCCAGAGCCCTTTATCTGTGGCCTGTGGCTGAAGCCCTAGCA GGGCGAGCGAGAGAATCCTGCTGAAGGCCGCCAACACCCACAGCAGCTCTCAGCTGTGGGAGCAGCAGTCTGTGCACCTG GGAGGCGTGTTCGAGCTGCAAGCTGGCGCTTCCGTGTTCTGTAACGTGACCGAGGCCAGCCAACTGATCCACAGAGTGGG CTTCAGCAGCTTTGGACTGCTCAAACCTGGCGGAGGGTCCGGCGGAGGCGGAGATGAAGATCCTCAGATTGCTGCCCAAG TGGTGTCTGAGGCCAACAGCAACGCCGCTCTGTGCTGCAGTGGGCCAAGAAAGGCTACTACACCATGAAGTCCAACTTC GTGATGCTGGAACCGCAAGCAGCTGACCGTGAAGCGCGAGGGCCTGTACTATGTGTACACCCAACTGACATTCTGCAG CAACCGCGAGCCAGCAGCCAGAGGCCCTTTATCTGTGGGCTGTGGCTGAAGCCTAGCAGCGGCGAGGAGAAATCCTGC TGAAGGCCGCCAACACCCACAGCAGCTCTCAGCTGTGCGAGCAGCAGTCTGTGCACCTGGGAGGCGGTGTTGAGCTGCAA GCTGGCGCTTCCGTGTTCTGTAACCTGACCGAGGCCAGCCAACTGATCCACAGAGTGGGCTTCAGCAGCTTTGACTGCT CAAACTGGGAGGCGGCTCCGGAGGCGGAGGAGATGAAGATCCTCAGATTGCTGCCCACTGGTGTCTGAGGCCAACAGCA ACGCCGCTCTGTGCTGCAGTGGGCCAAGAAAGGCTACTACACCATGAAGTCCAACTCCTGTATGCTGGAACCGGCAAG CAGCTGACCGTGAAAGCGGAGGGCTGTACTATGTGTACACCAAGTGACATTCTGCAGCAACCGCGAGCCAGCAGCCA GAGGCCCTTTATCTGTGGGCTGTGGCTGAAGCCTAGCAGCGGCGAGGAGAAATCCTGCTGAAGGCCGCCAACACCCACA GCAGCTCTCAGCTGTGCGAGCAGCAGTCTGTGACCTGGGAGGCGTGTTCGAGCTGCAAGCTGGCGCTTCCGTGTTCTGTG AACGTGACCGAGGCCAGCCAACTGATCCACAGAGTGGGCTTCTCTCTCTCGGCTCTCTGAAGCTGTGACTCGAGCTCTCTG GTACTGCTGACCGCAATGCTAGCTGCCCTTTCCCGTCTCTGGGTACCCCGAGTCTCCCGGACCTCGGCTCCAGGTATG CTCCCACTTCCACTGCCCCACTCACCACTCTGTAGTTCCAGACACCTCCCAAGCACGCAATGTCAGCTCAAAAACGC TTAGCCTAGCCACACCCCAAGGGAACAGCAGTGATTAACCTTTAGCAATAAACGAAAGTTTAACTAAGCTATACTAACCC CCAGGGTTGGTCAATTTCTGTGCCAGCCACACCTCGAGCTAGCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCATATGA CTAA
----	--	---

114


本發明之其他序列		
78	多腺苷酸	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCAUAUGACUAAAAAAAAAAAAAAAAA AA
79	抗 PD1 Mab 重鏈	EVQLLESGGV LVQPGGSLRL SCAASGFTFS NFGMTWVRQA PGKGLEWVSG ISGGGRDITYF ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLKGED TAVYYCVKWG NIYFDYWGQG TLVTVSSAST KGPSVFPLAP CSRSTSESTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVVTVPS SSLGTKTYTC NVDHKPSNTK VDKRVESKYG PPCPPCPAPE FLGGPSVFLF PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVSQEDPEV QFNWYVDGVE VHNAKTKPRE EQFNSTYRVV SVLTVLHQDW LNGKEYCKV SNKGLPSSIE KTISKAKGQP REPQVYTLPP SQEEMTKNQV SLTCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT TPPVLDSGGS FFLYSRLTVD KSRWQEGNVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL SLGK
80	抗 PD1 Mab 輕鏈	DIQMTQSPSS LSASVGDSTIT ITCRASLSIN TFLNWFQQKP GKAPNLLIYA ASSLHGGVPS RFGSGSGTD FTLTIRTLQP EDFATYYCQQ SSNTPFTFGP GTVVDFRRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK
81	HCDR1	GFTFSNFG
82	HCDR2	ISGGGRDT
83	HCDR3	VKWGNIYFDY
84	LCDR1	LSINTF
85	LCDR2	AAS
86	LCDR3	QQSSNTPFT
87	抗 PD1 Mab VH	EVQLLESGGV LVQPGGSLRL SCAASGFTFS NFGMTWVRQA PGKGLEWVSG ISGGGRDITYF ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLKGED TAVYYCVKWG NIYFDYWGQG TLVTVSS
88	抗 PD1 Mab VL	DIQMTQSPSS LSASVGDSTIT ITCRASLSIN TFLNWFQQKP GKAPNLLIYA ASSLHGGVPS RFGSGSGTD FTLTIRTLQP EDFATYYCQQ SSNTPFTFGP GTVVDFR

【實施方式】


I. 定義

【0051】 術語「ModB」描述包含替代至少一個(例如各)尿苷之修飾核鹼基且進一步包含 RNA 之 5'端處之 Cap1 結構的 RNA。在一些具體例中，ModB RNA 之 5' UTR 包含 SEQ ID NO: 4 或 6。ModB RNA 已經處理以減少雙鏈 RNA (dsRNA)。「Cap1」結構可在活體外轉譯後藉由酶加帽或在活體外轉譯期間(共轉錄加帽)產生。


【0052】 在一些具體例中，ModB 修飾 RNA 之構建封端端帽如下，其在共轉錄加帽時使用：
 $m_2^{7,3'-O}Gppp(m_1^{2'-O})ApG$ (有時亦稱為 $m_2^{7,3'-O}G(5')ppp(5')m^{2'-O}ApG$)，其具有以下結構：




【0053】 以下為共轉錄加帽後之例示性 Cap1 RNA，其包含 RNA 及 $m_2^{7,3'-O}G(5')ppp(5')m^{2'-O}ApG$ ：




【0054】 以下為酶加帽(無端帽類似物)後之另一例示性 Cap1 RNA：




【0055】 術語「ModA」描述未減少 dsRNA 不包含替代至少一個尿苷之修飾核鹼基的 RNA。ModA RNA 包含 RNA 之 5'端處之 Cap0 結構。ModA RNA 之 5' UTR 可包含 SEQ ID NO: 2。「Cap0」結構在活體外轉譯(共轉錄加帽)期間使用具有以下結構之(在一個具體實施例中)端帽類似物抗逆轉端帽($m_2^{7,3'}G(5')ppp(5')G$)產生：




【0056】 以下為包含 RNA 及 $m_2^{7,3'}G(5')ppp(5')G$ 之例示性 Cap0 RNA :



【0057】 在一些具體例中，「Cap0」結構在活體外轉譯(共轉錄加帽)期間使用具有以下結構之端帽類似物 β -S-ARCA ($m_2^{7,2'}G(5')ppSp(5')G$)產生 :




【0058】 以下為包含 β -S-ARCA ($m_2^{7,2'}G(5')ppSp(5')G$)及 RNA 之例示性 Cap0 RNA 。




【0059】 如本文中所使用，術語「尿嘧啶」描述可存在於 RNA 之核


酸中之核鹼基中之一者。尿嘧啶之結構為：




【0060】 如本文中所使用，術語「尿苷」描述可存在於 RNA 中之核苷中之一者。尿苷之結構為：



【0061】 UTP (尿苷 5'-三磷酸酯)具有以下結構：




【0062】 假 UTP (假尿苷 5'-三磷酸酯)具有以下結構：




【0063】 「假尿苷」為呈尿苷之異構體之修飾核苷之一個實例，其中尿嘧啶經由碳-碳鍵而非氮-碳糖苷鍵連接至戊糖環。假尿苷例如描述於 Charette and Gray, *Life*; 49:341-351 (2000)中。

【0064】 另一例示性修飾核苷為 N1-甲基假尿苷(m1Ψ)，其具有以下結構：



【0065】 N1-甲基假 UTP 具有以下結構：



【0066】 如本文中所使用，術語「多腺苷酸尾」或「多腺苷酸序列」係指腺苷酸殘基之不間斷或間斷序列，其通常位於 RNA 分子之 3'端處。多腺苷酸尾或多腺苷酸序列為熟悉本技藝者已知，且可在本文中所描述之 RNA 中之 3' UTR 之後。不間斷多腺苷酸尾特徵在於連續腺苷酸殘基。在自然界中，不間斷多腺苷酸尾為典型的。本文中揭示之 RNA 可具有藉由模板獨立的 RNA 聚合酶在轉錄後連接至 RNA 之游離 3'端之多腺苷酸尾，或由 DNA 編碼且藉由模板依賴性 RNA 聚合酶轉錄的多腺苷酸尾。

【0067】 已證實，約 120 個 A 核苷酸之多腺苷酸尾對於經轉染真核細胞中之 RNA 位準以及對於由存在於多腺苷酸尾之上游(5')之開讀框轉譯的蛋白質位準具有有益影響(Holtkamp 等人., 2006, Blood, 第 108 卷, 第 4009-4017 頁)。

【0068】 多腺苷酸尾可為任何長度。在一個具體例中，多腺苷酸尾包含、基本上由以下組成或由以下組成：至少 20、至少 30、至少 40、至少 80、或至少 100 且至多 500、至多 400、至多 300、至多 200 或至多 150 個 A 核苷酸，且特定言之約 120 個 A 核苷酸。在此情況下，「基本上由...組

成」意謂，多腺苷酸尾中之大部分核苷酸，通常多腺苷酸尾中之核苷酸數目之至少 75%、至少 80%、至少 85%、至少 90%、至少 95%、至少 96%、至少 97%、至少 98%或至少 99%為 A 核苷酸，但准許，其餘核苷酸為除 A 核苷酸以外之核苷酸，諸如 U 核苷酸(尿苷酸)、G 核苷酸(鳥苷酸)或 C 核苷酸(胞嘧啶核苷酸)。在此情況下，「由...組成」意謂多腺苷酸尾中之所有核苷酸，亦即 100% 多腺苷酸尾中之核苷酸數目為 A 核苷酸。術語「A 核苷酸」或「A」係指腺苷酸。

【0069】 在一些具體例中，多腺苷酸尾在 RNA 轉錄期間連接，例如在製備活體外轉錄 RNA 期間，基於在與編碼鏈互補之鏈中包含重複 dT 核苷酸(脫氧胸苷酸)的 DNA 模板。編碼多腺苷酸尾之 DNA 序列(編碼鏈)被稱作 poly(A)盒。

【0070】 在本發明之一個具體例中，存在於 DNA 之編碼鏈中之 poly(A)盒基本上由 dA 核苷酸組成，但間雜有四種核苷酸(dA、dC、dG 及 dT)之隨機序列。此類隨機序列可為 5 至 50、10 至 30 或 10 至 20 個核苷酸長度。此類盒揭示於 WO 2016/005324 A1 中，以引用之方式併入本文中。揭示於 WO 2016/005324 A1 中之任何 poly(A)盒可在本發明中進行使用。基本上由 dA 核苷酸組成但間雜有具有四種核苷酸(dA、dC、dG、dT)之相等分佈且具有例如 5 至 50 個核苷酸長度之隨機序列的 poly(A)盒，在 DNA 層級上展示在大腸桿菌(E.coli)中之質體 DNA 之恆定增殖，且在 RNA 層級上仍與關於支撐 RNA 穩定性及轉譯效率之有益特性相關聯。因此，在本發明之一個具體例中，包含於本文中所描述之 RNA 分子中之多腺苷酸尾基本上由 A 核苷酸組成，但間雜有四種核苷酸(A、C、G、U)之隨機序列。此類隨機序列可為 5 至 50、10 至 30 或 10 至 20 個核苷酸長度。

【0071】 在本發明之一個具體例中，除 A 核苷酸以外無核苷酸在其

3'端側接多腺苷酸尾，亦即多腺苷酸尾在其 3'端不由除 A 以外之核苷酸遮蔽或接續。

【0072】 在一些具體例中，多腺苷酸尾包含以下序列：
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCAUAUGACUAAAAA
AAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA (SEQ ID NO: 78)，其亦展示於表 2 中之
3' UTR 序列後。

【0073】 「RNA」及「mRNA」在本文中可互換地使用。

【0074】 「IFN α 」在本文中一般用於描述任何干擾素 α I 型細胞介素，包括 IFN α 2b 及 IFN α 4。在實施例章節中描述之實驗中，使用人類 IFN α 2b 及小鼠 IFN α 4。任何 IFN α 可併入至組成物中且在本文所描述之方法中使用。

【0075】 如本文中所使用，術語「治療」涵蓋任何投與或施用用於個體之疾病的治療劑，且包括抑制疾病、遏制其發展、緩解疾病之一或多種症狀、治癒疾病或預防疾病復發。舉例而言，治療實體腫瘤可包含緩解實體腫瘤之症狀、減小實體腫瘤大小、消除實體腫瘤、減少腫瘤進一步生長或減少或消除治療後實體腫瘤之復發。治療亦可量測為效用生物標記之變化、或成像或放射量測之變化。


【0076】 如本文中所使用，術語「預防」意謂抑制或遏制認為無癌之個體發展癌症，包括實體腫瘤。

【0077】 「癌轉移」意謂藉由其癌症自其首先作為原發腫瘤出現之位置處擴散至體內其他位置的過程。

【0078】 如本文中所使用，術語「腫瘤內」意謂在腫瘤內部。舉例而言，腫瘤內注射意謂在接觸腫瘤之任何位置處注入治療劑。

【0079】 如本文中所使用，術語「腫瘤周圍

(peri-tumorally/peri-tumoral)」為約 2-mm 寬且與腫瘤外周之侵襲性前端相鄰的區域。腫瘤周圍區域包含宿主組織。參見例如：



【0080】 「投與」意謂向個體提供醫藥劑或組成物，且包括但不限於由醫學專業人士投與及自投與。

【0081】 本發明描述分別地與既定核酸序列或胺基酸序列(參考序列)具有某種程度之一致性的核酸序列及胺基酸序列。

【0082】 兩個核酸序列之間的「序列一致性」指示序列之間相同核苷酸之百分比。兩個胺基酸序列之間的「序列一致性」指示序列之間相同胺基酸之百分比。

【0083】 術語「一致性% (% identical/% identity)」或類似術語意欲指代(特定言之)，在最佳比對下，待比較序列之間相同核苷酸或胺基酸之百分比。該百分比為純粹統計學的，且兩個序列之間的差異可能為(但不一定)隨機分佈於待比較序列之整個長度上。兩個序列之比較通常藉由在最佳比對之後，相對於片段或「比較窗口」比較改等序列而進行，以鑑別對應序列之局部區。比較之最佳比對可人工地進行或藉助於 Smith 及 Waterman, 1981, *Adv. App. Math.* 2, 482 之局部同源性演算法，藉助於 Needleman 及 Wunsch, 1970, *J. Mol. Biol.* 48, 443 之局部同源性演算法，藉助於 Pearson 及 Lipman, 1988, *Proc. Natl Acad. Sci. USA* 88, 2444 之類似搜索演算法，或藉助於使用該等演算法的電腦程式(Wisconsin 遺傳學軟體包中之 GAP、BESTFIT、FASTA、BLAST P、BLAST N 及 TFASTA，遺傳學電腦組、575

Science Drive, Madison, Wis.)。

【0084】 百分比一致性藉由測定待比較序列對應相同位置處之數目，將此數目除以所比較位置數(例如參考序列之位置數)，且將此結果乘以 100 而獲得。

【0085】 在一些具體例中，給出某個區之一致性程度為參考序列之整個長度的至少約 50%、至少約 60%、至少約 70%、至少約 80%、至少約 90% 或約 100%。舉例而言，若參考核酸序列由 200 個核苷酸組成，則在一些具體例中，給出一致性程度為呈連續核苷酸之至少約 100、至少約 120、至少約 140、至少約 160、至少約 180 或約 200 個核苷酸。在一些具體例中，給出一致性程度為參考序列之整個長度。

【0086】 分別地與既定核酸序列或胺基酸序列具有特定一致性程度之核酸序列或胺基酸序列可具有該既定序列之至少一種功能特性，例如，且在一些情況下功能上等效於該既定序列。一個重要特性包括充當細胞介素的能力，特定言之當向個體投與時。在一些具體例中，與既定核酸序列或胺基酸序列具有特定一致性程度之核酸序列或胺基酸序列功能上等效於該既定序列。

II. 組成物及醫學製劑

A. 介白素-2 (IL-2)

【0087】 在一些具體例中，組成物包含編碼介白素-2 (IL-2) (SEQ ID NO: 9)之 DNA 序列。在一些具體例中，編碼 IL-2 之 DNA 序列提供於 SEQ ID NO: 10 中。

【0088】 在一些具體例中，組成物包含編碼 IL-2 之密碼子最佳化 DNA 序列。在一些具體例中，密碼子最佳化 DNA 序列包含以下或由以下組成：SEQ ID NO: 11 之核苷酸。在一些具體例中，DNA 序列包含與 SEQ

ID NO: 11 具有 83%、84%、85%、90%、95%、96%、97%、98%或 99%一致性之密碼子最佳化 DNA 序列。

【0089】 密碼子最佳化 IL-2 與天然 IL-2 之比對展示於下，其中「Q」為天然 IL-2 (NM_000586.3；SEQ ID NO: 10)及「S」為密碼子最佳化 IL-2 (SEQ ID NO: 11)。百分比一致性為 82.79%。

Q:	1	ATGTACAGGATGCAACTCCTGTCTTGCAATTGCACTAAGTCTTGCACTTGTCAAAACAGT	60
S:	1	ATGTACAGAATGCAGTGCTGTCTTGCAATTGCTCTTTCTCTTGCTCTTGACAAATCT	60
Q:	61	GCACCTACTTCAAGTTCTACAAAGAAAACACAGCTACAACCTGGAGCATTACTGCTGGAT	120
S:	61	GCTCCAACATCTTCTTCAACAAAGAAAACACAGCTTCAGCTTGAACACCTTCTCTTGAT	120
Q:	121	TTACAGATGATTTTGAATGGAATTAATAATTACAAGAATCCAAACTCACCAGGATGCTC	180
S:	121	CTTCAGATGATTTCTGAATGGAATCAACAATTACAAAATCCAAACTGACAAGAATGCTG	180
Q:	181	ACATTTAAGTTTACATGCCCAAGAAGGCCACAGAACTGAAACATCTTCAGTGTCTAGAA	240
S:	181	ACATTTAAATTTTACATGCCAAAGAAAGCAACAGAACTGAAACACCTTCAGTGCCTTGAA	240
Q:	241	GAAGAACTCAAACCTCTGGAGGAAGTGCTAAATTTAGCTCAAAGCAAAAACCTTCACTTA	300
S:	241	GAAGAACTGAAACCTCTGGAAGAAGTGCTGAATCTGGCTCAGAGCAAAAATTTCACTCG	300
Q:	301	AGACCCAGGGACTTAATCAGCAATATCAACGTAATAGTTCTGGAACTAAAGGGATCTGAA	360
S:	301	AGACCAAGAGATCTGATCAGCAACATCAATGTGATTGTGCTGGAACTGAAAGGATCTGAA	360
Q:	361	ACAACATTCATGTGTGAATATGCTGATGAGACAGCAACCATTTGTAGAATTTCTGAACAGA	420
S:	361	ACAACATTCATGTGTGAATATGCTGATGAAACAGCAACAATTTGTGAATTTCTGAACAGA	420
Q:	421	TGGATTACCTTTTGTCAAAGCATCATCTCAACACTGACT	459
S:	421	TGGATCACATTTTGCCAGTCAATCATTTCAACACTGACA	459

【0090】 在一些具體例中，組成物包含自編碼 IL-2 之 DNA 序列轉錄的 RNA 序列。在一些具體例中，RNA 序列自包含 SEQ ID NO: 10 或 11 之核苷酸序列轉錄。在一些具體例中，RNA 序列包含以下或由以下組成：SEQ ID NO: 12 或 13。在一些具體例中，RNA 序列包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 12 或 13 具有 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%或 99%一致性之 RNA 序列。

【0091】 在一些具體例中，IL-2 RNA 中之一或多個尿苷由如本文所描述之修飾核苷置換。在一些具體例中，置換尿苷之修飾核苷為假尿苷(ψ)、

N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)或 5-甲基-尿苷(m^5U)。

【0092】 在一些具體例中，IL-2 RNA 在 5'端處包含改變的核苷酸。在一些具體例中，IL-2 RNA 包含 5'端帽。可使用本技藝中已知之任何 5'端帽。在一些具體例中，5'端帽包含 5'至 5'三磷酸酯連接。在一些具體例中，5'端帽包含包括硫代磷酸酯修飾之 5'至 5'三磷酸酯連接。在一些具體例中，5'端帽包含 2'-*O* 或 3'-*O*-核糖-甲基化核苷酸。在一些具體例中，5'端帽包含修飾鳥苷核苷酸或修飾腺苷核苷酸。在一些具體例中，5'端帽包含 7-甲基鳥苷酸。在一些具體例中，5'端帽為 Cap0 或 Cap1。例示性端帽結構包括 $m7G(5')ppp(5')G$ 、 $m7,2'O-mG(5')pps(5')G$ 、 $m7G(5')ppp(5')2'O-mG$ 及 $m7,3'O-mG(5')ppp(5')2'O-mA$ 。

【0093】 在一些具體例中，IL-2 RNA 包含 5'非轉譯區(UTR)。在一些具體例中，5' UTR 在起始密碼子之上游。在一些具體例中，5' UTR 調節 RNA 之轉譯。在一些具體例中，5' UTR 為穩定化序列。在一些具體例中，5' UTR 增加 RNA 之半衰期。可使用本技藝中已知之任何 5' UTR。在一些具體例中，5' UTR RNA 序列由包含 SEQ ID NO: 1、3 或 5 之核苷酸序列轉錄。在一些具體例中，5' UTR RNA 序列包含以下或由以下組成：SEQ ID NO: 2、4 或 6。在一些具體例中，5' UTR RNA 序列與 SEQ ID NO: 2、4 或 6 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%或 99%一致性。

【0094】 在一些具體例中，IL-2 RNA 包含 3' UTR。在一些具體例中，3' UTR 跟隨在轉譯終止密碼子之後。在一些具體例中，3' UTR 調節聚腺苷酸化、轉譯效率、定位或 RNA 之穩定性。在一些具體例中，3' UTR RNA 序列由包含 SEQ ID NO: 7 之核苷酸序列轉錄。在一些具體例中，3' UTR RNA 序列包含以下或由以下組成：SEQ ID NO: 8。在一些具體例中，3'

UTR RNA 序列與 SEQ ID NO: 8 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%或 99%一致性。

【0095】 在一些具體例中，IL-2 組成物包含 5' UTR 及 3' UTR 兩者。在一些具體例中，組成物僅包含 5' UTR。在一些具體例中，組成物僅包含 3' UTR。

【0096】 在一些具體例中，IL-2 RNA 包含多腺苷酸尾。在一些具體例中，RNA 包含至少約 25、至少約 30、至少約 50、至少約 70 或至少約 100 個核苷酸之多腺苷酸尾。在一些具體例中，多腺苷酸尾包含 200 或更多個核苷酸。在一些具體例中，多腺苷酸尾包含以下或由以下組成：SEQ ID NO: 78。

【0097】 在一些具體例中，RNA 按彼次序包含 5'端帽、5' UTR、編碼 IL-2 之核酸、3' UTR 及多腺苷酸尾。

【0098】 在一些具體例中，組成物含有包含以下或由以下組成之 DNA 序列：與 SEQ ID NO: 10 或 11 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性及與 SEQ ID NO: 1、3 或 5 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性的核酸序列。

【0099】 在一些具體例中，組成物包含例如由包含以下或由以下組成之 DNA 序列轉錄之 RNA 序列：與 SEQ ID NO: 10 或 11 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性及與 SEQ ID NO: 1、3 或 5 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性的核酸序列。RNA 亦可以重組方式產生。在一些具體例中，IL-2 RNA 中之一或多個尿苷由如本文所描述之修飾核苷置換。在一些具體例中，置換尿苷之修飾核苷為假尿苷(ψ)、N1-甲基

-假尿苷($m^1\psi$)或 5-甲基-尿苷(m^5U)。在一些具體例中，RNA 包含替代各尿苷之修飾核苷。在一些具體例中，修飾核苷為 N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)。

【0100】 在一些具體例中，組成物含有包含以下或由以下組成之 DNA 序列：與 SEQ ID NO: 10 或 11 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性及與 SEQ ID NO: 7 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性的核酸序列。

【0101】 在一些具體例中，組成物包含例如由包含以下或由以下組成之 DNA 序列轉錄之 RNA 序列：與 SEQ ID NO: 10 或 11 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性及與 SEQ ID NO: 7 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性的核酸序列。在一些具體例中，IL-2 RNA 中之一或多個尿苷由如本文所描述之修飾核苷置換。在一些具體例中，置換尿苷之修飾核苷為假尿苷(ψ)、N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)或 5-甲基-尿苷(m^5U)。在一些具體例中，RNA 包含替代各尿苷之修飾核苷。在一些具體例中，修飾核苷為 N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)。

【0102】 在一些具體例中，組成物包含含以下或由以下組成之 DNA 序列：與 SEQ ID NO: 10 或 11 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性；與 SEQ ID NO: 1、3 或 5 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性；及與 SEQ ID NO: 7 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性的核酸序列。

【0103】 在一些具體例中，組成物包含例如由包含以下或由以下組成之 DNA 序列轉錄之 RNA 序列：與 SEQ ID NO: 10 或 11 具有至少 70%、

75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性；與 SEQ ID NO: 1、3 或 5 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性；及與 SEQ ID NO: 7 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性的核酸序列。RNA 亦可以重組方式產生。

【0104】 在一些具體例中，IL-2 RNA 中之一或多個尿苷由如本文所描述之修飾核苷置換。在一些具體例中，置換尿苷之修飾核苷為假尿苷(ψ)、N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)或 5-甲基-尿苷(m^5U)。在一些具體例中，RNA 包含替代各尿苷之修飾核苷。在一些具體例中，修飾核苷為 N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)。

【0105】 在一些具體例中，組成物包含含以下或由以下組成之 RNA 序列：與 SEQ ID NO: 12 或 13 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性；與 SEQ ID NO: 2、4 或 6 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性；及與 SEQ ID NO: 8 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性的核酸序列。在一些具體例中，IL-2 RNA 中之一或多個尿苷由如本文所描述之修飾核苷置換。在一些具體例中，置換尿苷之修飾核苷為假尿苷(ψ)、N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)或 5-甲基-尿苷(m^5U)。在一些具體例中，RNA 包含替代各尿苷之修飾核苷。在一些具體例中，修飾核苷為 N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)。

B. 介白素-12 單鏈(IL-12sc)

【0106】 在一些具體例中，組成物包含編碼介白素-12 單鏈 IL-12sc (SEQ ID NO:14)之 DNA 序列，其包含 IL-12 p40(有時稱為 IL-12B)、連接子(諸如 GS 連接子)及 IL-12 p35 (有時稱為 IL-12A)。在一些具體例中，IL-12p40、連接子及 IL-12p36 為連續的，不存在插入核苷酸。編碼 IL-12sc

之例示性 DNA 序列提供於 SEQ ID NO: 15 中。

【0107】 密碼子最佳化 IL-12 p40 與天然 IL-12 p40 之比對展示於下，其中「S」為天然 IL-12 p40 (NM_002187.2；SEQ ID NO: 15 之核苷酸 1-984)及「Q」為密碼子最佳化 IL-12 p40 (SEQ ID NO: 16 之核苷酸 1-984)。百分比一致性為 77%。

Q:	1	ATGTGTCACCAGCAGCTGGTGATCTCATGGTTCTCCCTGGTATTTCTGGCATCTCCTCTT	60
S:	1	ATGTGTCACCAGCAGTTGGTCATCTCTTGGTTTTCCCTGGTTTTTCTGGCATCTCCCTC	60
Q:	61	GTGCAATCTGGGAACGAAGAAAGACGTGTATGTCGTTGAGCTCGACTGGTATCCGGAT	120
S:	61	GTGGCCATATGGGAACGAAGAAAGATGTTTATGTCGTAGAATTGGATTGGTATCCGGAT	120
Q:	121	GCGCCTGGCGAGATGGTGGTGCTGACCTGTGACACCCAGAGGAGGATGGGATCACTTGG	180
S:	121	GCCCCGGAGAAATGGTGGTCCTCACCTGTGACACCCCTGAAGAAGATGGTATCACCTGG	180
Q:	181	ACCTTGATCAATCCTCGAAGTGCTCGGGTCTGGCAAGACTCTGACCATACAAGTGAAA	240
S:	181	ACCTTGGACCAGAGCAGTGAGGTCTTAGGCTCTGGCAAAACCTGACCATCCAAGTCAA	240
Q:	241	GAGTTTGGCGATGCCGGGCAGTACACTTGCCATAAGGGCGGAGAGTTCTGTCCCACTCA	300
S:	241	GAGTTGGAGATGCTGGCCAGTACACCTGTCAAAAGGAGGCGAGGTTCTAAGCCATTCG	300
Q:	301	CTGCTGCTGCTGCACAAGAAAGAGGACGGAATTTGGAGTACCGATATCCTGAAAGATCAG	360
S:	301	CTCCTGCTGCTTCACAAAAGGAAGATGGAATTTGGTCCACTGATATTTAAAGGACCAG	360
Q:	361	AAAGAGCCCAAGAACAAAACCTTCTTGCGGTGCGAAGCCAAGAACTACTCAGGGAGATT	420
S:	361	AAAGAACCCAAAAATAAGACCTTTCTAAGATGCGAGGCCAAGAATTATTCTGGACGTTTC	420
Q:	421	ACTTGTGGTGGCTGACGACGATCAGCACCGATCTGACTTTCTCCGTGAAATCAAGTAGG	480
S:	421	ACCTGCTGGTGGCTGACGACAATCAGTACTGATTGACATTCAAGTGTCAAAAGCAGCAGA	480
Q:	481	GGATCATCTGACCCTCAAGGAGTCACATGTGGAGCGGCTACTCTGAGCGCTGAACGCGTA	540
S:	481	GGCTCTTCTGACCCCAAGGGGTGACGTGCGGAGCTGCTACACTCTCTGCAGAGAGAGTC	540
Q:	541	AGAGGGGACAATAAGGAGTACGAGTATAGCGTTGAGTGCCAAGAGGATAGCGCATGCCCC	600
S:	541	AGAGGGGACAACAAGGAGTATGAGTACTCAGTGGAGTGCCAGGAGGACAGTGCCCTGCCCA	600
Q:	601	GCCGCCGA--AGAATCATTGCCATTGAAGTGATGGTGGATGCTGTACACAAGCTGAAGT	658
S:	601	GCTGCTGAGGAGAGTC-T-GCCCATTGAGGTATGGTGGATGCCGTTCAAAAGCTCAAGT	658
Q:	659	ATGAGAACTACACAAGGTCCTTCTTCATCCGTGACATCATCAAACAGATCCTCCTAAGA	718
S:	659	ATGAAAACACACCAGCAGCTTCTTCATCAGGGACATCATCAAACCTGACCCACCCAAGA	718
Q:	719	ACCTCCAGCTTAAACCTCTGAAGAACTCTAGACAGGTGGAAGTGTCTTGGGAGTATCCCG	778
S:	719	ACTTGCAGCTGAAGCCATTAAAGAATTCTCGGCAGGTGGAGGTGAGCTGGGAGTACCCTG	778
Q:	779	ACACCTGGTCTACACCACATTCTACTTCACTCTCACATTCTGCGTTGAGGTACAGGGCA	838
S:	779	ACACCTGGAGTACTCCACATTCCTACTTCTCCCTGACATTCTGCGTTGAGGTACAGGGCA	838
Q:	839	AGTCCAAAAGGGAGAGAAAGGATCGGGTCTTTACAGATAAAACAAGTGCCACCGTTATAT	898
S:	839	AGAGCAAGAGAGAGAAAAGAGATAGAGTCTTCACGGACAAGACCTCAGCCACGGTCATCT	898

Q: 899 GCCGGAAGAATGCCTCTATTTCTGTGCGTGCAGGACAGATACTATAGCAGCTCTTGA 958
S: 899 GCCGCAAAAATGCCAGCATTAGCGTGCGGGCCAGGACCGCTACTATAGCTCATCTTGA 958

Q: 959 GTGAATGGGC--CAGTGTCCCATGTTCA 984
S: 959 GCGAATGGGCATCTGTG-CCC-TG--CA 982

【0108】 密碼子最佳化 IL-12 p35 與天然 IL-12 p35 之比對展示於下，其中「S」為天然 IL-12 p35 (NM_00882.3；SEQ ID NO: 15 之核苷酸 1027-1623)及「Q」為密碼子最佳化 IL-12 p35 (SEQ ID NO: 16 之核苷酸 1027-1623)。百分比一致性為 80%。

Q: 1 AGAAATCTCCCTGTGGCTACACCTGATCCAGGCATGTTTCCCTGTTTGACCATAGCCAA 60
S: 1 AGAAACCTCCCGTGGCCACTCCAGACCCAGGAATGTTCCCATGCCTTCACCACTCCCAA 60

Q: 61 AACCTCCTGAGAGCAGTCAGCAACATGCTCCAGAAAGCTAGACAAACACTGGAATTCTAC 120
S: 61 AACCTGCTGAGGGCCGTGAGCAACATGCTCCAGAGGCCAGACAAACTCTAGAATTTTAC 120

Q: 121 CCATGCACCTCCGAGGAAATAGATCAGGAGGATATCACTAAGGACAAAACAAGCACTGTC 180
S: 121 CCTTGCACCTTCTGAAGAGATTGATCATGAAGATATCACAAAAGATAAAACCAGCACAGTG 180

Q: 181 GAAGCATGCCTTCCCTTGGAACTGACAAAGAACGAGAGTTGCCTTAATTCAAGAGAAACA 240
S: 181 GAGGCCGTGTTACCATTGGAATTAACCAAGAATGAGAGTTGCCTAAATCCAGAGAGACC 240

Q: 241 TCTTTCATTACAAACGGTAGCTGCTTGGCAAGCAGAAAAACATCTTTTATGATGGCCCTT 300
S: 241 TCTTTCATAACTAATGGGAGTTGCCTGGCCTCCAGAAAGACCTCTTTTATGATGGCCCTG 300

Q: 301 TGTCTGAGCAGTATTTATGAGGATCTCAAATGTACCAGGTGGAGTTTAAGACCATGAAT 360
S: 301 TGCCTTAGTAGTATTTATGAAGACTGAAGATGTACCAGGTGGAGTTCAAGACCATGAAT 360

Q: 361 GCCAAGCTGCTGATGGACCCAAAGAGACAGATTTTCTCGATCAGAATATGCTGGCTGTG 420
S: 361 GCAAAGCTTCTGATGGATCCTAAGAGGCAGATCTTCTAGATCAAACATGCTGGCAGTT 420

Q: 421 ATTGATGAAGTGTGAGGCCTTGAATTTCAACAGCGAAACCGTTCCCCAGAAAAGCAGT 480
S: 421 ATTGATGAGCTGATGAGGCCCTGAATTTCAACAGTGAGACTGTGCCACAAAATCCTCC 480

Q: 481 CTTGAAGAACCCTGACTTTTATAAGACCAAGATCAAACGTGTATTCTCCTGCATGCCFTT 540
S: 481 CTTGAAGAACCGATTTTATAAAACTAAATCAAGCTCTGCATACTTCTCATGCTTTC 540

Q: 541 AGAATCAGAGCAGTCACTATAGATAGAGTGATGTCCTACCTGAATGCTTCC 591
S: 541 AGAATTGCGGCAGTGACTATTGATAGAGTGATGAGCTATCTGAATGCTTCC 591

【0109】 在一些具體例中，組成物包含編碼 IL-12sc 之密碼子最佳化 DNA 序列。在一些具體例中，組成物包含編碼 IL-12 p40 之密碼子最佳化

DNA 序列。在一些具體例中，組成物包含編碼 IL-12 p35 之密碼子最佳化 DNA 序列。在一些具體例中，密碼子最佳化 DNA 序列包含以下或由以下組成：SEQ ID NO: 16。在一些具體例中，DNA 序列包含與 SEQ ID NO: 16 具有 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%或 99%一致性之密碼子最佳化 DNA 序列。在一些具體例中，編碼 IL-12 p40 之密碼子最佳化 DNA 序列包含編碼 IL-12sc-p40 之核苷酸(SEQ ID NO: 16 之核苷酸 1-984)。在一些具體例中，編碼 IL-12 p35 之密碼子最佳化 DNA 序列包含編碼 IL-12sc-p35 之核苷酸(SEQ ID NO: 16 之核苷酸 1027-1623)。在一些具體例中，編碼 IL-12sc 之密碼子最佳化 DNA 序列包含編碼 SEQ ID NO: 16 之 IL-12sc-p40 (SEQ ID NO: 16 之核苷酸 1-984)及 IL-12sc-p35 (SEQ ID NO: 16 之核苷酸 1027-1623)部分的核苷酸，且進一步包含編碼連接 p40 及 p35 部分之連接子多肽之 p40 與 p35 部分之間的核苷酸(例如 SEQ ID NO: 16 之核苷酸 985-1026)。可使用熟悉本技藝者已知之任何連接子。p40 部分可在 p35 部分之 5'或 3'端。

【0110】 在一些具體例中，組成物包含例如由編碼 IL-12sc 之 DNA 序列轉錄之 RNA 序列。RNA 亦可以重組方式產生。在一些具體例中，RNA 序列由包含 SEQ ID NO: 15 或 16 之核苷酸序列轉錄。在一些具體例中，RNA 序列包含以下或由以下組成：SEQ ID NO: 17 或 18。在一些具體例中，RNA 序列包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 17 或 18 具有 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%或 99%一致性的 RNA 序列。在一些具體例中，RNA 序列包含編碼 SEQ ID NO: 17 或 18 之 IL-12sc-p40 (SEQ ID NO:17 或 18 之核苷酸 1-984)及 IL-12sc-p35 (SEQ ID NO: 17 或 18 之核苷酸 1027-1623)部分的核苷酸。在一些具體例中，編碼 IL-12sc 之密碼子最佳化 RNA 序列包含編碼 SEQ ID NO: 18 之 IL-12sc-p40 (SEQ ID NO: 18

之核苷酸 1-984)及 IL-12sc-p35 (SEQ ID NO: 18 之核苷酸 1027-1623)部分之核苷酸，且進一步包含編碼連接 p40 及 p35 部分之連接子多肽之 p40 與 p35 部分之間的核苷酸。可使用熟悉本技藝者已知之任何連接子。

【0111】 在一些具體例中，IL-12sc RNA 中之一或多個尿苷由如本文所描述之修飾核苷置換。在一些具體例中，置換尿苷之修飾核苷為假尿苷(ψ)、N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)或 5-甲基-尿苷(m^5U)。在一些具體例中，RNA 包含替代各尿苷之修飾核苷。在一些具體例中，修飾核苷為 N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)。

【0112】 在一些具體例中，IL-12sc RNA 在 5'端處包含改變的核苷酸。在一些具體例中，RNA 包含 5'端帽。可使用本技藝中已知之任何 5'端帽。在一些具體例中，5'端帽包含 5'至 5'三磷酸酯連接。在一些具體例中，5'端帽包含包括硫代磷酸酯修飾之 5'至 5'三磷酸酯連接。在一些具體例中，5'端帽包含 2'-*O* 或 3'-*O*-核糖-甲基化核苷酸。在一些具體例中，5'端帽包含修飾鳥苷核苷酸或修飾腺苷核苷酸。在一些具體例中，5'端帽包含 7-甲基鳥苷酸。在一些具體例中，5'端帽為 Cap0 或 Cap1。例示性端帽結構包括 $m^7G(5')ppp(5')G$ 、 $m^7,2'O-mG(5')ppsp(5')G$ 、 $m^7G(5')ppp(5')2'O-mG$ 及 $m^7,3'O-mG(5')ppp(5')2'O-mA$ 。

【0113】 在一些具體例中，IL-12sc RNA 包含 5'非轉譯區(UTR)。在一些具體例中，5' UTR 在起始密碼子之上游。在一些具體例中，5' UTR 調節 RNA 之轉譯。在一些具體例中，5' UTR 為穩定化序列。在一些具體例中，5' UTR 增加 RNA 之半衰期。可使用本技藝中已知之任何 5' UTR。在一些具體例中，5' UTR RNA 序列由 SEQ ID NO: 1、3 或 5 轉錄。在一些具體例中，5' UTR RNA 序列包含以下或由以下組成：SEQ ID NO: 2、4 或 6。在一些具體例中，5' UTR RNA 序列與 SEQ ID NO: 2、4 或 6 具有至

少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%或 99%一致性。

【0114】 在一些具體例中，IL-12sc RNA 包含 3' UTR。在一些具體例中，3' UTR 跟隨在轉譯終止密碼子之後。在一些具體例中，3' UTR 調節聚腺苷酸化、轉譯效率、定位或 RNA 之穩定性。在一些具體例中，3' UTR RNA 序列由 SEQ ID NO: 7 轉錄。在一些具體例中，3' UTR RNA 序列包含以下或由以下組成：SEQ ID NO: 8。在一些具體例中，3' UTR RNA 序列與 SEQ ID NO: 8 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%或 99%一致性。

【0115】 在一些具體例中，IL-12sc 組成物包含 5' UTR 及 3' UTR 兩者。在一些具體例中，IL-12sc 組成物僅包含 5' UTR。在一些具體例中，IL-12sc 組成物僅包含 3' UTR。

【0116】 在一些具體例中，IL-12sc RNA 包含多腺苷酸尾。在一些具體例中，RNA 包含至少約 25、至少約 30、至少約 50 個核苷酸、至少約 70 個核苷酸或至少約 100 個核苷酸之多腺苷酸尾。在一些具體例中，多腺苷酸尾包含 200 或更多個核苷酸。在一些具體例中，多腺苷酸尾包含以下或由以下組成：SEQ ID NO: 78。

【0117】 在一些具體例中，RNA 按彼次序包含 5'端帽、5' UTR、編碼 IL-12sc 之核酸、3' UTR 及多腺苷酸尾。

【0118】 在一些具體例中，組成物含有包含以下或由以下組成之 DNA 序列：與 SEQ ID NO: 15 或 16 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性及與 SEQ ID NO: 1、3 或 5 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性的核酸序列。

【0119】 在一些具體例中，組成物包含例如由包含以下或由以下組成

之 DNA 序列轉錄之 RNA 序列：與 SEQ ID NO: 15 或 16 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性及與 SEQ ID NO: 1、3 或 5 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性的核酸序列。RNA 亦可以重組方式產生。在一些具體例中，IL-12sc RNA 中之一或多個尿苷由如本文所描述之修飾核苷置換。在一些具體例中，置換尿苷之修飾核苷為假尿苷(ψ)、N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)或 5-甲基-尿苷(m^5U)。在一些具體例中，RNA 包含替代各尿苷之修飾核苷。在一些具體例中，修飾核苷為 N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)。

【0120】 在一些具體例中，組成物含有包含以下或由以下組成之 DNA 序列：與 SEQ ID NO: 15 或 16 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性及與 SEQ ID NO: 7 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性的核酸序列。

【0121】 在一些具體例中，組成物包含例如由包含以下或由以下組成之 DNA 序列轉錄之 RNA 序列：與 SEQ ID NO: 15 或 16 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性及與 SEQ ID NO: 7 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性的核酸序列。RNA 亦可以重組方式產生。在一些具體例中，IL-12sc RNA 中之一或多個尿苷由如本文所描述之修飾核苷置換。在一些具體例中，置換尿苷之修飾核苷為假尿苷(ψ)、N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)或 5-甲基-尿苷(m^5U)。在一些具體例中，RNA 包含替代各尿苷之修飾核苷。在一些具體例中，修飾核苷為 N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)。

【0122】 在一些具體例中，組成物包含含以下或由以下組成之 DNA 序列：與 SEQ ID NO: 15 或 16 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、

96%、97%、98%、99%或 100%一致性；與 SEQ ID NO: 1、3 或 5 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性；及與 SEQ ID NO: 7 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性的核酸序列。

【0123】 在一些具體例中，組成物包含例如由包含以下或由以下組成之 DNA 序列轉錄之 RNA 序列：與 SEQ ID NO: 15 或 16 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性；與 SEQ ID NO: 1、3 或 5 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性；及與 SEQ ID NO: 7 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性的核酸序列。RNA 亦可以重組方式產生。在一些具體例中，IL-12sc RNA 中之一或多個尿苷由如本文所描述之修飾核苷置換。在一些具體例中，置換尿苷之修飾核苷為假尿苷(ψ)、N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)或 5-甲基-尿苷(m^5U)。在一些具體例中，RNA 包含替代各尿苷之修飾核苷。在一些具體例中，修飾核苷為 N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)。

【0124】 在一些具體例中，組成物含有包含以下或由以下組成之 RNA 序列：與 SEQ ID NO: 17 或 18 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性；與 SEQ ID NO: 2、4 或 6 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性；及與 SEQ ID NO: 8 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性的核酸序列。在一些具體例中，IL-12sc RNA 中之一或多個尿苷由如本文所描述之修飾核苷置換。在一些具體例中，置換尿苷之修飾核苷為假尿苷(ψ)、N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)或 5-甲基-尿苷(m^5U)。

C. 干擾素 α (IFN α)

【0125】 在一些具體例中，組成物包含編碼干擾素 α (IFN α) (例如 SEQ ID NO: 19)之 DNA 序列。編碼此 IFN α 之例示性 DNA 序列提供於 SEQ ID NO: 20 中。

【0126】 密碼子最佳化 IFN α 與天然 IFN α 之比對展示於下，其中「S」為天然 IFN α (NM_000605.3；SEQ ID NO: 20)及「Q」為密碼子最佳化 IFN α (SEQ ID NO: 21)。百分比一致性為 79%。

Q:	1	ATGGCCCTGACCTTTTGCCCTTCTCGTGGCTTTGTTGGTGCTGAGTTGCAAACTTTCCTGT	60
S:	1	ATGGCCTTGACCTTTGCTTTACTGGTGGCCCTCCTGGTGCTCAGCTGCAAGTCAAGCTGC	60
Q:	61	AGTGTGGGATGTGATCTGCCTCAAACCCACAGTCTGGG-ATCTAGGAGAACACTGATGCT	119
S:	61	TCTGTGGGCTGTGATCTGCCTCAAACCCACAGCTGGGTAGC-AGGAGGACCTTGATGCT	119
Q:	120	GTTGGCACAGATGAGGAGAAT-TAGC-CTCTTTTCCTGCCTGAAGGATAGACATGACTTC	177
S:	120	CCTGGCACAGATGAGGAGAATCT--CTCTTTTCCTGCTTGAAGGACAGACATGACTTT	177
Q:	178	GGCTTTCCCAAGAGGAGTTTGGCAATCAGTTCAGAAAGCGGAAACGATTCCCGTTCTG	237
S:	178	GGATTTCCCAAGGAGGAGTTTGGCAACCAGTTCCAAAGGCTGAAACCATCCCTGTCTC	237
Q:	238	CACGAGATGATCCAGCAGATCTTCAACCTCTTTTCAAC-CAAAG-ACAGCTCAGCAGCCT	295
S:	238	CATGAGATGATCCAGCAGATCTTCAATCTCTT--CAGCACAAAGGACTCATCTGCTGCTT	295
Q:	296	GGGATGAGACACTGCTGGACAAATTCTACACAGAACTGTATCAGCAGCTTAACGATCTGG	355
S:	296	GGGATGAGACCTCCTAGACAAATTCTACACTGAACTCTACCAGCAGCTGAATGACCTGG	355
Q:	356	AGGCATGCGTGATCCAAGGGGTTGGTGTGACTGAAACTCCGCTTATGAAGGAGGACTCCA	415
S:	356	AAGCCTGTGTGATACAGGGGGTGGGGGTGACAGAGACTCCCTGATGAAGGAGGACTCCA	415
Q:	416	TTCTGGCTGTACGGAAGTACTTCCAGAGAATAACCCTCTATCTGAAGGAGAAGAAGTACT	475
S:	416	TTCTGGCTGTGAGGAAATACTTCCAAGAATCACTCTATCTGAAGGAGAAGAATAACA	475
Q:	476	CACCATGTGCTTGGGAAGTCGTGAGAGCCGAAATCATGAGATCCTTCAGCCTTAG-CACC	534
S:	476	GCCCTTGTGCCTGGGAGGTTGTGAGAGCAGAAATCATGAGATC-TTTTTC-TTGTCAAC	533
Q:	535	AATC-TCCAGGAATCTCTGAGAAGCAAAGAG	564
S:	534	AACTTGCAAGAAAGTTTAAGAAGTAAGGAA	564

【0127】 在一些具體例中，組成物包含編碼 IFN α 之密碼子最佳化 DNA 序列。在一些具體例中，密碼子最佳化 DNA 序列包含以下或由以下

組成：SEQ ID NO: 21 之核苷酸。在一些具體例中，DNA 序列包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 21 具有 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%或 99%一致性之密碼子最佳化 DNA 序列。

【0128】 在一些具體例中，組成物包含例如由編碼 IFN α 之 DNA 序列轉錄之 RNA 序列。RNA 亦可以重組方式產生。在一些具體例中，RNA 序列由包含 SEQ ID NO: 20 或 21 之核苷酸序列轉錄。在一些具體例中，RNA 序列包含以下或由以下組成：SEQ ID NO: 22 或 23。在一些具體例中，RNA 序列包含以下或由以下組成：與 SEQ ID NO: 22 或 23 具有 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%或 99%一致性之 RNA 序列。

【0129】 在一些具體例中，IFN α RNA 中之一或多個尿苷由如本文所描述之修飾核苷置換。在一些具體例中，置換尿苷之修飾核苷為假尿苷(ψ)、N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)或 5-甲基-尿苷(m^5U)。在一些具體例中，RNA 中之各尿苷為經修飾的。在一些具體例中，RNA 中之各尿苷用 N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)修飾。

【0130】 在一些具體例中，IFN α RNA 在 5'端處包含改變的核苷酸。在一些具體例中，IFN α RNA 包含 5'端帽。可使用本技藝中已知之任何 5'端帽。在一些具體例中，5'端帽包含 5'至 5'三磷酸酯連接。在一些具體例中，5'端帽包含包括硫代磷酸酯修飾之 5'至 5'三磷酸酯連接。在一些具體例中，5'端帽包含 2'-O 或 3'-O-核糖-甲基化核苷酸。在一些具體例中，5'端帽包含修飾鳥苷核苷酸或修飾腺苷核苷酸。在一些具體例中，5'端帽包含 7-甲基鳥苷酸。在一些具體例中，5'端帽為 Cap0 或 Cap1。例示性端帽結構包括 $m7G(5')ppp(5')G$ 、 $m7,2'O-mG(5')ppsp(5')G$ 、 $m7G(5')ppp(5')2'O-mG$ 及 $m7,3'O-mG(5')ppp(5')2'O-mA$ 。

【0131】 在一些具體例中，IFN α RNA 包含 5'非轉譯區(UTR)。在一些具體例中，5' UTR 在起始密碼子之上游。在一些具體例中，5' UTR 調節 RNA 之轉譯。在一些具體例中，5' UTR 為穩定化序列。在一些具體例中，5' UTR 增加 RNA 之半衰期。可使用本技藝中已知之任何 5' UTR。在一些具體例中，5' UTR RNA 序列由包含 SEQ ID NO: 1、3 或 5 之核苷酸序列轉錄。在一些具體例中，5' UTR RNA 序列包含以下或由以下組成：SEQ ID NO: 2、4 或 6。在一些具體例中，5' UTR RNA 序列與 SEQ ID NO: 2、4 或 6 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%或 99%一致性。

【0132】 在一些具體例中，IFN α RNA 包含 3' UTR。在一些具體例中，3' UTR 跟隨在轉譯終止密碼子之後。在一些具體例中，3' UTR 調節聚腺苷酸化、轉譯效率、定位或 RNA 之穩定性。在一些具體例中，3' UTR RNA 序列由包含 SEQ ID NO: 7 之核苷酸序列轉錄。在一些具體例中，3' UTR RNA 序列包含以下或由以下組成：SEQ ID NO: 8。在一些具體例中，3' UTR RNA 序列與 SEQ ID NO: 8 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%或 99%一致性。

【0133】 在一些具體例中，IFN α 組成物包含 5' UTR 及 3' UTR 兩者。在一些具體例中，組成物僅包含 5' UTR。在一些具體例中，組成物僅包含 3' UTR。

【0134】 在一些具體例中，IFN α RNA 包含多腺苷酸尾。在一些具體例中，IFN α RNA 包含至少約 25、至少約 30、至少約 50 個核苷酸、至少約 70 個核苷酸或至少約 100 個核苷酸之多腺苷酸尾。在一些具體例中，多腺苷酸尾包含 200 或更多個核苷酸。在一些具體例中，多腺苷酸尾包含以下或由以下組成：SEQ ID NO: 78。

【0135】 在一些具體例中，RNA 按彼次序包含 5'端帽、5' UTR、編碼 IFN α 之核酸、3' UTR 及多腺苷酸尾。

【0136】 在一些具體例中，組成物含有包含以下或由以下組成之 DNA 序列：與 SEQ ID NO: 20 或 21 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性及與 SEQ ID NO: 1、3 或 5 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性的核酸序列。

【0137】 在一些具體例中，組成物包含例如由包含以下或由以下組成之 DNA 序列轉錄之 RNA 序列：與 SEQ ID NO: 20 或 21 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性及與 SEQ ID NO: 1、3 或 5 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性的核酸序列。RNA 亦可以重組方式產生。在一些具體例中，IFN α RNA 中之一或多個尿苷由如本文所描述之修飾核苷置換。在一些具體例中，置換尿苷之修飾核苷為假尿苷(ψ)、N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)或 5-甲基-尿苷(m^5U)。在一些具體例中，RNA 包含替代各尿苷之修飾核苷。在一些具體例中，修飾核苷為 N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)。

【0138】 在一些具體例中，組成物包含含以下或由以下組成之 DNA 序列：與 SEQ ID NO: 20 或 21 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性及與 SEQ ID NO: 7 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性的核酸序列。

【0139】 在一些具體例中，組成物包含例如由包含以下或由以下組成之 DNA 序列轉錄之 RNA 序列：與 SEQ ID NO: 20 或 21 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性及

與 SEQ ID NO: 7 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性的核酸序列。在一些具體例中，IFN α RNA 中之一或多個尿苷由如本文所描述之修飾核苷置換。在一些具體例中，置換尿苷之修飾核苷為假尿苷(ψ)、N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)或 5-甲基-尿苷(m^5U)。在一些具體例中，RNA 包含替代各尿苷之修飾核苷。在一些具體例中，修飾核苷為 N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)。

【0140】 在一些具體例中，組成物包含含以下或由以下組成之 DNA 序列：與 SEQ ID NO: 20 或 21 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性；與 SEQ ID NO: 1、3 或 5 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性；及與 SEQ ID NO: 7 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性的核酸序列。

【0141】 在一些具體例中，組成物包含例如由包含以下或由以下組成之 DNA 序列轉錄之 RNA 序列：與 SEQ ID NO: 20 或 21 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性；與 SEQ ID NO: 1、3 或 5 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性；及與 SEQ ID NO: 7 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性的核酸序列。RNA 亦可以重組方式產生。在一些具體例中，IFN α RNA 中之一或多個尿苷由如本文所描述之修飾核苷置換。在一些具體例中，置換尿苷之修飾核苷為假尿苷(ψ)、N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)或 5-甲基-尿苷(m^5U)。在一些具體例中，RNA 包含替代各尿苷之修飾核苷。在一些具體例中，修飾核苷為 N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)。在一些具體例中，組成物包含含以下或由以下組成之 RNA 序列：與 SEQ ID NO: 22 或 23 具有至少 70%、75%、80%、

85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性；與 SEQ ID NO: 2、4 或 6 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性；及與 SEQ ID NO: 8 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性的核酸序列。在一些具體例中，IFN α RNA 中之一或多個尿苷由如本文所描述之修飾核苷置換。在一些具體例中，置換尿苷之修飾核苷為假尿苷(ψ)、N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)或 5-甲基-尿苷(m^5U)。

D. IL-15 sushi

【0142】 如本文所使用，術語「IL-15 sushi」描述包含可溶介白素 15 (IL-15)受體 α sushi 域及成熟介白素 α (IL-15)呈融合蛋白質的構築體。在一些具體例中，組成物包含編碼 IL-15 sushi(SEQ ID NO: 24)之 DNA 序列，該 IL-15 sushi 包含可溶 IL-15 受體 α 鏈(sushi)隨後甘胺酸-絲胺酸(GS)連接子隨後 IL-15 之成熟序列。編碼此 IL-15 sushi 之 DNA 序列提供於 SEQ ID NO: 25 中。

【0143】 在一些具體例中，組成物包含例如由編碼 IL-15 sushi 之 DNA 序列轉錄之 RNA 序列。RNA 亦可以重組方式產生。在一些具體例中，RNA 序列自包含 SEQ ID NO: 25 之核苷酸序列轉錄。在一些具體例中，編碼連接子之核苷酸可完全不存在，或部分或完全由編碼適合連接子之任何核苷酸置換。在一些具體例中，RNA 序列包含以下或由以下組成：SEQ ID NO: 26。在一些具體例中，RNA 序列包含與 SEQ ID NO: 26 具有 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%或 99%一致性之 RNA 序列。在一些具體例中，編碼 IL-15 sushi 之 DNA 或 RNA 序列包含編碼 IL-15 受體 α 之 sushi 域(例如 SEQ ID NO: 25 或 26 之核苷酸 1-321)及成熟 IL-15 (例如 SEQ ID NO: 25 或 26 之核苷酸 382-729)的核苷酸。在一些具體例中，編

碼 IL-15 sushi 之 DNA 或 RNA 序列包含編碼 IL-15 受體 α 之 sushi 域(例如 SEQ ID NO: 25 或 26 之核苷酸 1-321)及成熟 IL-15 (例如 SEQ ID NO: 25 或 26 之核苷酸 382-729)之核苷酸，且進一步包含編碼連接該等部分之連接子多肽之此等部分之間的核苷酸。在一些具體例中，連接子包含 SEQ ID NO: 25 或 26 之核苷酸 322-381。可使用熟悉本技藝者已知之任何連接子。

【0144】 在一些具體例中，IL-15 sushi RNA 中之一或多個尿苷由如本文所描述之修飾核苷置換。在一些具體例中，置換尿苷之修飾核苷為假尿苷(ψ)、N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)或 5-甲基-尿苷(m^5U)。在一些具體例中，RNA 包含替代各尿苷之修飾核苷。在一些具體例中，修飾核苷為 N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)。

【0145】 在一些具體例中，IL-15 sushi RNA 在 5'端處包含改變的核苷酸。在一些具體例中，IL-15 sushi RNA 包含 5'端帽。可使用本技藝中已知之任何 5'端帽。在一些具體例中，5'端帽包含 5'至 5'三磷酸酯連接。在一些具體例中，5'端帽包含包括硫代磷酸酯修飾之 5'至 5'三磷酸酯連接。在一些具體例中，5'端帽包含 2'-O 或 3'-O-核糖-甲基化核苷酸。在一些具體例中，5'端帽包含修飾鳥苷核苷酸或修飾腺苷核苷酸。在一些具體例中，5'端帽包含 7-甲基鳥苷酸。在一些具體例中，5'端帽為 Cap0 或 Cap1。例示性端帽結構包括 $m^7G(5')ppp(5')G$ 、 $m^7,2'O-mG(5')ppsp(5')G$ 、 $m^7G(5')ppp(5')2'O-mG$ 及 $m^7,3'O-mG(5')ppp(5')2'O-mA$ 。

【0146】 在一些具體例中，IL-15 sushi RNA 包含 5'非轉譯區(UTR)。在一些具體例中，5' UTR 在起始密碼子之上游。在一些具體例中，5' UTR 調節 RNA 之轉譯。在一些具體例中，5' UTR 為穩定化序列。在一些具體例中，5' UTR 增加 RNA 之半衰期。可使用本技藝中已知之任何 5' UTR。在一些具體例中，5' UTR RNA 序列由 SEQ ID NO: 1、3 或 5 轉錄。在一些

具體例中，5' UTR RNA 序列包含以下或由以下組成：SEQ ID NO: 2、4 或 6。在一些具體例中，5' UTR RNA 序列與 SEQ ID NO: 2、4 或 6 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%或 99%一致性。

【0147】 在一些具體例中，IL-15 sushi RNA 包含 3' UTR。在一些具體例中，3' UTR 跟隨在轉譯終止密碼子之後。在一些具體例中，3' UTR 調節聚腺苷酸化、轉譯效率、定位或 RNA 之穩定性。在一些具體例中，3' UTR RNA 序列由 SEQ ID NO: 7 轉錄。在一些具體例中，3' UTR RNA 序列包含以下或由以下組成：SEQ ID NO: 8。在一些具體例中，3' UTR RNA 序列與 SEQ ID NO: 8 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%或 99%一致性。

【0148】 在一些具體例中，IL-15 sushi 組成物包含 5' UTR 及 3' UTR 兩者。在一些具體例中，IL-15 sushi 組成物僅包含 5' UTR。在一些具體例中，IL-15 sushi 組成物僅包含 3' UTR。

【0149】 在一些具體例中，IL-15 sushi RNA 包含多腺苷酸尾。在一些具體例中，RNA 包含至少約 25、至少約 30、至少約 50 個核苷酸、至少約 70 個核苷酸或至少約 100 個核苷酸之多腺苷酸尾。在一些具體例中，多腺苷酸尾包含 200 或更多個核苷酸。在一些具體例中，多腺苷酸尾包含以下或由以下組成：SEQ ID NO: 78。

【0150】 在一些具體例中，RNA 按彼次序包含 5'端帽、5' UTR、編碼 IL-15 sushi 之核酸、3' UTR 及多腺苷酸尾。

【0151】 在一些具體例中，IL-15 sushi 組成物包含含以下或由以下組成之 DNA 序列：與 SEQ ID NO: 25 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性及與 SEQ ID NO: 1、3 或 5 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%

一致性的核酸序列。

【0152】 在一些具體例中，IL-15 sushi 組成物包含例如由包含以下或由以下組成之 DNA 序列轉錄之 RNA 序列：與 SEQ ID NO: 25 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性及與 SEQ ID NO: 1、3 或 5 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性的核酸序列。RNA 亦可以重組方式產生。在一些具體例中，IFN α RNA 中之一或多個尿苷由如本文所描述之修飾核苷置換。在一些具體例中，置換尿苷之修飾核苷為假尿苷(ψ)、N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)或 5-甲基-尿苷(m^5U)。在一些具體例中，RNA 包含替代各尿苷之修飾核苷。在一些具體例中，修飾核苷為 N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)。

【0153】 在一些具體例中，IL-15 sushi 組成物含有包含以下或由以下組成之 DNA 序列：與 SEQ ID NO: 25 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性及與 SEQ ID NO: 7 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性的核酸序列。

【0154】 在一些具體例中，IL-15 sushi 組成物包含例如由包含以下或由以下組成之 DNA 序列轉錄之 RNA 序列：與 SEQ ID NO: 25 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性及與 SEQ ID NO: 7 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性的核酸序列。RNA 亦可以重組方式產生。在一些具體例中，IFN α RNA 中之一或多個尿苷由如本文所描述之修飾核苷置換。在一些具體例中，置換尿苷之修飾核苷為假尿苷(ψ)、N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)或 5-甲基-尿苷(m^5U)。在一些具體例中，RNA 包含替代各尿苷之修飾核苷。在一些具體例中，修飾核苷為 N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)。

【0155】 在一些具體例中，IL-15 sushi 組成物包含含以下或由以下組成之 DNA 序列：與 SEQ ID NO: 25 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性；與 SEQ ID NO: 1、3 或 5 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性；及與 SEQ ID NO: 7 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性的核酸序列。

【0156】 在一些具體例中，IL-15 sushi 組成物包含例如由包含以下或由以下組成之 DNA 序列轉錄之 RNA 序列：與 SEQ ID NO: 25 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性；與 SEQ ID NO: 1、3 或 5 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性；及與 SEQ ID NO: 7 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性的核酸序列。在一些具體例中，IFN α RNA 中之一或多個尿苷由如本文所描述之修飾核苷置換。在一些具體例中，置換尿苷之修飾核苷為假尿苷(ψ)、N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)或 5-甲基-尿苷(m^5U)。在一些具體例中，RNA 包含替代各尿苷之修飾核苷。在一些具體例中，修飾核苷為 N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)。

【0157】 在一些具體例中，IL-15 sushi 組成物包含含以下或由以下組成之 RNA 序列：與 SEQ ID NO: 26 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性；與 SEQ ID NO: 2、4 或 6 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性；及與 SEQ ID NO: 8 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性的核酸序列。在一些具體例中，IFN α RNA 中之一或多個尿苷由如本文所描述之修飾核苷置換。在一些具體例中，

置換尿苷之修飾核苷為假尿苷(ψ)、N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)或 5-甲基-尿苷(m^5U)。

E. 顆粒球巨噬細胞集落刺激因子(GM-CSF)

【0158】 在一些具體例中，組成物包含編碼顆粒球巨噬細胞集落刺激因子 GM-CSF (例如 SEQ ID NO: 27)之 DNA 序列。在一些具體例中，編碼 GM-CSF 之 DNA 序列提供於 SEQ ID NO: 28 中。

【0159】 在一些具體例中，GM-CSF 組成物包含例如由編碼 GM-CSF 之 DNA 序列轉錄之 RNA 序列。在一些具體例中，RNA 序列由 SEQ ID NO: 28 轉錄。RNA 亦可以重組方式產生。在一些具體例中，RNA 序列包含以下或由以下組成：SEQ ID NO: 29。在一些具體例中，RNA 序列包含與 SEQ ID NO: 29 具有 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%或 99%一致性之 RNA 序列。

【0160】 在一些具體例中，GM-CSF RNA 中之一或多個尿苷由如本文所描述之修飾核苷置換。在一些具體例中，置換尿苷之修飾核苷為假尿苷(ψ)、N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)或 5-甲基-尿苷(m^5U)。在一些具體例中，RNA 包含替代各尿苷之修飾核苷。在一些具體例中，修飾核苷為 N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)。在一些具體例中，GM-CSF RNA 在 5'端處包含改變的核苷酸。在一些具體例中，RNA 包含 5'端帽。可使用本技藝中已知之任何 5'端帽。在一些具體例中，5'端帽包含 5'至 5'三磷酸酯連接。在一些具體例中，5'端帽包含包括硫代磷酸酯修飾之 5'至 5'三磷酸酯連接。在一些具體例中，5'端帽包含 2'-O 或 3'-O-核糖-甲基化核苷酸。在一些具體例中，5'端帽包含修飾鳥苷核苷酸或修飾腺苷核苷酸。在一些具體例中，5'端帽包含 7-甲基鳥苷酸。在一些具體例中，5'端帽為 Cap0 或 Cap1。例示性端帽結構包括 $m^7G(5')ppp(5')G$ 、 $m^7,2'O-mG(5')ppsp(5')G$ 、 $m^7G(5')ppp(5')2'O-mG$ 及

m7,3'-O-mG(5')ppp(5')2'-O-mA。

【0161】 在一些具體例中，GM-CSF RNA 包含 5'非轉譯區(UTR)。在一些具體例中，5' UTR 在起始密碼子之上游。在一些具體例中，5' UTR 調節 RNA 之轉譯。在一些具體例中，5' UTR 為穩定化序列。在一些具體例中，5' UTR 增加 RNA 之半衰期。可使用本技藝中已知之任何 5' UTR。在一些具體例中，5' UTR RNA 序列由 SEQ ID NO: 1、3 或 5 轉錄。在一些具體例中，5' UTR RNA 序列包含以下或由以下組成：SEQ ID NO: 2、4 或 6。在一些具體例中，5' UTR RNA 序列與 SEQ ID NO: 2、4 或 6 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%或 99%一致性。

【0162】 在一些具體例中，GM-CSF RNA 包含 3' UTR。在一些具體例中，3' UTR 跟隨在轉譯終止密碼子之後。在一些具體例中，3' UTR 調節聚腺苷酸化、轉譯效率、定位或 RNA 之穩定性。在一些具體例中，3' UTR RNA 序列由 SEQ ID NO: 7 轉錄。在一些具體例中，3' UTR RNA 序列包含以下或由以下組成：SEQ ID NO: 8。在一些具體例中，3' UTR RNA 序列與 SEQ ID NO: 8 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%或 99%一致性。

【0163】 在一些具體例中，GM-CSF 組成物包含 5' UTR 及 3' UTR 兩者。在一些具體例中，組成物僅包含 5' UTR。在一些具體例中，組成物僅包含 3' UTR。

【0164】 在一些具體例中，GM-CSF RNA 包含多腺苷酸尾。在一些具體例中，RNA 包含至少約 25、至少約 30、至少約 50 個核苷酸、至少約 70 個核苷酸或至少約 100 個核苷酸之多腺苷酸尾。在一些具體例中，多腺苷酸尾包含 200 或更多個核苷酸。在一些具體例中，多腺苷酸尾包含以下或由以下組成：SEQ ID NO: 78。

【0165】 在一些具體例中，GM-CSF RNA 按彼次序包含 5'端帽、5' UTR、編碼 GM-CSF 之核苷酸、3' UTR 及多腺苷酸尾。

【0166】 在一些具體例中，GM-CSF 組成物包含含以下或由以下組成之 DNA 序列：與 SEQ ID NO: 28 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性及與 SEQ ID NO: 1、3 或 5 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性的核酸序列。

【0167】 在一些具體例中，GM-CSF 組成物包含例如由包含以下或由以下組成之 DNA 序列轉錄之 RNA 序列：與 SEQ ID NO: 28 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性及與 SEQ ID NO: 1、3 或 5 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性的核酸序列。RNA 亦可以重組方式產生。在一些具體例中，GM-CSF RNA 中之一或多個尿苷由如本文所描述之修飾核苷置換。在一些具體例中，置換尿苷之修飾核苷為假尿苷(ψ)、N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)或 5-甲基-尿苷(m^5U)。在一些具體例中，RNA 包含替代各尿苷之修飾核苷。在一些具體例中，修飾核苷為 N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)。

【0168】 在一些具體例中，GM-CSF 組成物包含含以下或由以下組成之 DNA 序列：與 SEQ ID NO: 28 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性及與 SEQ ID NO: 7 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性的核酸序列。

【0169】 在一些具體例中，GM-CSF 組成物包含例如由包含以下或由以下組成之 DNA 序列轉錄之 RNA 序列：與 SEQ ID NO: 28 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性及

與 SEQ ID NO: 7 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性的核酸序列。RNA 亦可以重組方式產生。在一些具體例中，GM-CSF RNA 中之一或多個尿苷由如本文所描述之修飾核苷置換。在一些具體例中，置換尿苷之修飾核苷為假尿苷(ψ)、N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)或 5-甲基-尿苷(m^5U)。在一些具體例中，RNA 包含替代各尿苷之修飾核苷。在一些具體例中，修飾核苷為 N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)。

【0170】 在一些具體例中，GM-CSF 組成物包含含以下或由以下組成之 DNA 序列：與 SEQ ID NO: 28 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性；與 SEQ ID NO: 1、3 或 5 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性；及與 SEQ ID NO: 7 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性的核酸序列。

【0171】 在一些具體例中，組成物包含例如由包含以下或由以下組成之 DNA 序列轉錄之 RNA 序列：與 SEQ ID NO: 28 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性；與 SEQ ID NO: 1、3 或 5 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性；及與 SEQ ID NO: 7 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性的核酸序列。RNA 亦可以重組方式產生。在一些具體例中，GM-CSF RNA 中之一或多個尿苷由如本文所描述之修飾核苷置換。在一些具體例中，置換尿苷之修飾核苷為假尿苷(ψ)、N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)或 5-甲基-尿苷(m^5U)。在一些具體例中，RNA 包含替代各尿苷之修飾核苷。在一些具體例中，修飾核苷為 N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)。

【0172】 在一些具體例中，GM-CSF 組成物包含含以下或由以下組成

之 RNA 序列：與 SEQ ID NO: 29 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性；與 SEQ ID NO: 2、4 或 6 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性；及與 SEQ ID NO: 8 具有至少 70%、75%、80%、85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%或 100%一致性的核酸序列。在一些具體例中，GM-CSF RNA 中之一或多個尿苷由如本文所描述之修飾核苷置換。在一些具體例中，置換尿苷之修飾核苷為假尿苷(ψ)、N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)或 5-甲基-尿苷(m^5U)。

F. 修飾

【0173】 本文中所描述之 RNA 及組成物中之每一者可以熟悉本技藝者已知之任何方式修飾。在一些具體例中，修飾為如本文所描述進行「ModA」或「ModB」修飾。

【0174】 RNA 中之一或多個尿苷由修飾核苷置換。在一些具體例中，修飾核苷為修飾尿苷。

【0175】 在一些具體例中，置換尿苷之修飾尿苷為假尿苷(ψ)、N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)或 5-甲基-尿苷(m^5U)。

【0176】 在一些具體例中，RNA 中之一或多個胞嘧啶、腺嘌呤或鳥嘌呤由修飾核鹼基置換。在一個具體例中，置換胞嘧啶之修飾核鹼基為 5-甲基胞嘧啶(m^5C)。在另一具體例中，置換腺嘌呤之修飾核鹼基為 N⁶-甲基腺嘌呤(m^6A)。在另一具體例中，可使用本技藝中已知用於減小分子之免疫原性之任何其他修飾核鹼基。

【0177】 RNA 中之置換一或多個尿苷之修飾核苷可為以下中之任何一或多者：3-甲基-尿苷(m^3U)、5-甲氧基-尿苷(mo^5U)、5-氮雜-尿苷、6-氮雜-尿苷、2-硫-5-氮雜-尿苷、2-硫-尿苷(s^2U)、4-硫-尿苷(s^4U)、4-硫-假尿苷、

2-硫-假尿苷、5-羥基-尿苷(ho^5U)、5-胺基烯丙基-尿苷、5-鹵基-尿苷(例如5-碘-尿苷或5-溴-尿苷)、尿苷5-氧基乙酸(cmo^5U)、尿苷5-氧基乙酸甲酯($mcmo^5U$)、5-羧基甲基-尿苷(cm^5U)、1-羧甲基-假尿苷、5-羧基羥甲基-尿苷(chm^5U)、5-羧基羥甲基-尿苷甲酯($mchm^5U$)、5-甲氧基羧基甲基-尿苷(mcm^5U)、5-甲氧基羧基甲基-2-硫-尿苷(mcm^5s^2U)、5-胺基甲基-2-硫-尿苷(nm^5s^2U)、5-甲胺基甲基-尿苷(mnm^5U)、1-乙基-假尿苷、5-甲胺基甲基-2-硫-尿苷(mnm^5s^2U)、5-甲胺基甲基-2-硒-尿苷(mnm^5se^2U)、5-胺甲醯基甲基-尿苷(ncm^5U)、5-羧甲基胺基甲基-尿苷($cmnm^5U$)、5-羧甲基胺基甲基-2-硫-尿苷($cmnm^5s^2U$)、5-丙炔基-尿苷、1-丙炔基-假尿苷、5-牛磺酸甲基-尿苷(τm^5U)、1-牛磺酸甲基-假尿苷、5-牛磺酸甲基-2-硫-尿苷(τm^5s^2U)、1-牛磺酸甲基-4-硫-假尿苷)、5-甲基-2-硫-尿苷(m^5s^2U)、1-甲基-4-硫-假尿苷($m^1s^4\psi$)、4-硫-1-甲基-假尿苷、3-甲基-假尿苷($m^3\psi$)、2-硫-1-甲基-假尿苷、1-甲基-1-去氮-假尿苷、2-硫-1-甲基-1-去氮-假尿苷、二氫尿苷(D)、二氫假尿苷、5,6-二氫尿苷、5-甲基-二氫尿苷(m^5D)、2-硫-二氫尿苷、2-硫-二氫假尿苷、2-甲氧基-尿苷、2-甲氧基-4-硫-尿苷、4-甲氧基-假尿苷、4-甲氧基-2-硫-假尿苷、N1-甲基-假尿苷、3-(3-胺基-3-羧丙基)尿苷(acp^3U)、1-甲基-3-(3-胺基-3-羧丙基)假尿苷($acp^3\psi$)、5-(異戊烯基胺基甲基)尿苷(inm^5U)、5-(異戊烯基胺基甲基)-2-硫-尿苷(inm^5s^2U)、 α -硫-尿苷、2'-O-甲基-尿苷(Um)、5,2'-O-二甲基-尿苷(m^5Um)、2'-O-甲基-假尿苷(ψm)、2-硫-2'-O-甲基-尿苷(s^2Um)、5-甲氧基羧基甲基-2'-O-甲基-尿苷(mcm^5Um)、5-胺甲醯基甲基-2'-O-甲基-尿苷(ncm^5Um)、5-羧甲基胺基甲基-2'-O-甲基-尿苷($cmnm^5Um$)、3,2'-O-二甲基-尿苷(m^3Um)、5-(異戊烯基胺基甲基)-2'-O-甲基-尿苷(inm^5Um)、1-硫-尿苷、脫氧胸苷、2'-F-氮雜-尿苷、2'-F-尿苷、2'-OH-氮雜-尿苷、5-(2-甲氧羧基乙烯基)尿苷、5-[3-(1-E-丙烯基胺基)尿苷，或本技藝中已知之任何其他修

飾尿苷。

G. 組合組成物

【0178】 在一些具體例中，本發明含有包含多於一個本文所描述之 RNA 之組成物。在一些具體例中，組成物包含兩種 RNA。在一些具體例中，組成物包含三種 RNA。在一些具體例中，組成物包含四種 RNA。在一些具體例中，組成物包含五種 RNA。在一些具體例中，例如在包含此等本文中所述之 RNA 之組成物及調配物中之任一者中，編碼 IL-2、IL12sc、IL-15 sushi、GM-CSF 或 IFN α 之任何或所有 RNA 均可由 IL-2、IL12sc、IL-15 sushi、GM-CSF 及/或 IFN α 多肽置換。

【0179】 在一些具體例中，例如在包含此等本文中所述之 RNA 之組成物及調配物中之任一者中，編碼 IL-2、IL12sc、IL-15 sushi、GM-CSF 及/或 IFN α 之修飾或未修飾之 RNA 可由編碼兩種或更多種多肽的修飾或未修飾的多順反子 RNA 置換，該兩種或更多種多肽選自 IL-2、IL12sc、IL15 sushi、GM-CSF 及 IFN α 多肽。

【0180】 組合組成物中之任一者可進一步包含賦形劑或稀釋劑。賦形劑或稀釋劑可為對於向個體投與而言醫藥學上可接受的。

【0181】 在一些具體例中，組合組成物包含具有相同修飾之 RNA。在一些具體例中，組合組成物包含具有不同修飾之 RNA。在一些具體例中，組合組成物包含具有 ModA 修飾之 RNA。在一些具體例中，組合組成物包含具有 ModB 修飾之 RNA。在一些具體例中，組合組成物包含具有 ModA 及 ModB 修飾之 RNA。

【0182】 在一些具體例中，組成物包含編碼 IL-2 之 DNA 或 RNA，且涵蓋編碼 IL-12sc、IFN α 、IL-15 sushi 及 GM-CSF 之 DNA 或 RNA 中之一或多者。在一些具體例中，組成物包含編碼 IL-2 或密碼子最佳化 IL-2 (SEQ

ID NO: 10-13)之 DNA 或 RNA, 及編碼以下之 DNA 或 RNA 中之一或多者: 如本文所描述之 IL-12sc 或最佳化 IL-12sc (SEQ ID NO: 15-18)、IFN α 或最佳化 IFN α (SEQ ID NO: 20-23)、IL-15 sushi (SEQ ID NO: 25-26)及 GM-CSF (SEQ ID NO: 28-29)。在一些具體例中, RNA 中之一或多個尿苷由如本文所描述之修飾核苷置換。在一些具體例中, 置換尿苷之修飾核苷為假尿苷(ψ)、N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)或 5-甲基-尿苷(m^5U)。在一些具體例中, 組成物中之 RNA 中之一或多者進一步包含本文在組成物章節中所描述之 5'端帽、5' UTR、3' UTR 及多腺苷酸尾。

【0183】 在一些具體例中, 涵蓋包含以下之組成物: 編碼 IL-12sc 之 DNA 或 RNA, 編碼 IL-2、IFN α 、IL-15 sushi 及 GM-CSF 之 DNA 或 RNA 中之一或多者。在一些具體例中, 組成物包含編碼 IL-12sc 或密碼子最佳化 IL-12sc (SEQ ID NO: 15-18)之 DNA 或 RNA, 及編碼以下之 DNA 或 RNA 中之一或多者: 如本文所描述之 IL-2 或最佳化 IL-2 (SEQ ID NO: 10-13)、IFN α 或最佳化 IFN α (SEQ ID NO: 20-23)、IL-15 sushi (SEQ ID NO: 25-26) 及 GM-CSF (SEQ ID NO: 28-29)。在一些具體例中, RNA 中之一或多個尿苷由本文所描述之修飾核苷置換。在一些具體例中, 置換尿苷之修飾核苷為假尿苷(ψ)、N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)或 5-甲基-尿苷(m^5U)。

【0184】 在一些具體例中, 組成物中之 RNA 中之一或多者進一步包含如本文在組成物章節中所描述之 5'端帽、5' UTR、3' UTR 及多腺苷酸尾。

【0185】 在一些具體例中, 涵蓋包含以下之組成物: 編碼 IFN α 之 DNA 或 RNA, 及編碼 IL-2、IL-12sc、IL-15 sushi 及 GM-CSF 之 DNA 或 RNA 中之一或多者。在一些具體例中, 組成物包含編碼 IFN α 或密碼子最佳化 IFN α (SEQ ID NO: 20-23)之 DNA 或 RNA, 及編碼以下之 DNA 或 RNA 中之一或多者: 如本文所描述之 IL-12sc 或最佳化 IL-12sc (SEQ ID NO:

15-18)、IL-2 或最佳化 IL-2 (SEQ ID NO: 10-13)、IL-15 sushi (SEQ ID NO: 25-26)及 GM-CSF (SEQ ID NO: 28-29)。在一些具體例中，RNA 中之一或多個尿苷由本文所描述之修飾核苷置換。在一些具體例中，置換尿苷之修飾核苷為假尿苷(ψ)、N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)或 5-甲基-尿苷(m^5U)。在一些具體例中，組成物中之 RNA 中之一或多者進一步包含本文在組成物章節中所描述之 5'端帽、5' UTR、3' UTR 及多腺苷酸尾。

【0186】 在一些具體例中，涵蓋包含以下之組成物：編碼 IL-15 sushi 之 DNA 或 RNA，及編碼 IL-2、IL-12sc、IFN α 及 GM-CSF 之 DNA 或 RNA 中之一或多者。在一些具體例中，組成物包含編碼 IL-15 sushi (SEQ ID NO: 25-26)之 DNA 或 RNA，及編碼以下之 DNA 或 RNA 中之一或多者：如本文所描述之 IL-12sc 或最佳化 IL-12sc (SEQ ID NO: 15-18)、IFN α 或最佳化 IFN α (SEQ ID NO: 20-23)、IL-2 或最佳化 IL-2 (SEQ ID NO: 10-13)及 GM-CSF (SEQ ID NO: 28-29)。在一些具體例中，RNA 中之一或多個尿苷由本文所描述之修飾核苷置換。在一些具體例中，置換尿苷之修飾核苷為假尿苷(ψ)、N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)或 5-甲基-尿苷(m^5U)。在一些具體例中，組成物中之 RNA 中之一或多者進一步包含本文在組成物章節中所描述之 5'端帽、5' UTR、3' UTR 及多腺苷酸尾。

【0187】 在一些具體例中，涵蓋包含以下之組成物：編碼 GM-CSF 之 DNA 或 RNA，及編碼 IL-2、IL-12sc、IFN α 及 IL-15 sushi 之 DNA 或 RNA 中之一或多者。在一些具體例中，組成物包含編碼 GM-CSF (SEQ ID NO: 28-29)之 DNA 或 RNA，及編碼以下之 DNA 或 RNA 中之一或多者：本文所描述之 IL-12sc 或最佳化 IL-12sc (SEQ ID NO: 15-18)、IFN α 或最佳化 IFN α (SEQ ID NO: 20-23)、IL-2 或最佳化 IL-2 (SEQ ID NO: 10-13)及 IL-15 sushi (SEQ ID NO: 25-26)。在一些具體例中，RNA 中之一或多個尿苷由本文所描

述之修飾核苷置換。在一些具體例中，置換尿苷之修飾核苷為假尿苷(ψ)、N1-甲基-假尿苷($m^1\psi$)或 5-甲基-尿苷(m^5U)。在一些具體例中，組成物中之 RNA 中之一或多者進一步包含本文在組成物章節中所描述之 5'端帽、5' UTR、3' UTR 及多腺苷酸尾。

【0188】 在一些具體例中，組成物包含 GM-CSF、IL-2 及 IL-12sc RNA。在一些具體例中，組成物例如修飾為 ModA 或 ModB。在一些具體例中，IL-12sc RNA 如 SEQ ID NO: 18 中所展示以最佳化。

【0189】 在一些具體例中，組成物包含 GM-CSF、IL-15 sushi 及 IL-12sc RNA。在一些具體例中，組成物例如修飾為 ModA 或 ModB。在一些具體例中，IL-12sc RNA 如 SEQ ID NO: 18 中所展示以最佳化。

【0190】 在一些具體例中，組成物包含 GM-CSF、IL-2、IL-12sc 及 IFN α RNA。在一些具體例中，組成物例如修飾為 ModA 或 ModB。在一些具體例中，IL-12sc RNA 及 IFN α RNA 分別地如 SEQ ID NO: 18 及 23 中所展示以最佳化。

【0191】 在一些具體例中，組成物包含 GM-CSF、IL-15 sushi、IL-12sc 及 IFN α RNA。在一些具體例中，組成物例如修飾為 ModA 或 ModB。在一些具體例中，IL-12sc RNA 及 IFN α RNA 分別地如 SEQ ID NO: 18 及 23 中所展示以最佳化。

【0192】 在一些具體例中，組成物包含 GM-CSF、IL-15 sushi、IL-12sc 及 IFN α RNA，其中 RNA 包含以下或由以下組成：展示於 SEQ ID NO: 18 (IL-12sc)、23 (IFN α)、26 (IL-15 sushi)或 29 (GM-CSF)中之核苷酸。在一些具體例中，組成物例如修飾為 ModA 或 ModB。

【0193】 在一些具體例中，RNA 之組合基於相等 RNA 質量，以 1:1、1:1:1 或 1:1:1:1 比率投與。舉例而言，20 μ g IL15-sushi、20 μ g IL-12sc、20 μ g

IFN α 2b 及 20 μ g GM-CSF。在一些具體例中，調整比率，使得投與不同質量比率，例如 1:10:1:10 比率(20 μ g、200 μ g、20 μ g、200 μ g)。同樣，在一些具體例中，使用例如 1:2:3:4 (20 μ g、40 μ g、60 μ g、80 μ g)之比率。可替代地，並非基於 RNA 之質量比率，比率可基於 RNA 之莫耳濃度。

【0194】 在一些具體例中，RNA 之混合物以等比率之混合物之各 RNA 投與。

【0195】 在一些具體例中，RNA 之混合物以不等比率之混合物之各 RNA 投與。在一些具體例中，一或多個 RNA 以大於混合物中之另一 RNA 1、2、3、4、5、6、7、8、9 或 10 倍的比率投與。在一些具體例中，一或多個 RNA 以小於混合物中之另一 RNA 1、2、3、4、5、6、7、8、9 或 10 倍的比率投與。

【0196】 在一些具體例中，本文中所描述之組成物可為醫學製劑。在一些具體例中，醫學製劑包含套組，其中所包括 RNA 可在同一小瓶或獨立小瓶中。在一些具體例中，醫學製劑進一步包含用於治療或預防實體腫瘤之組成物之使用說明書。

【0197】 在一些具體例中，提供包含本文中所描述之組成物之套組，其中所包括 RNAs 可在同一小瓶或獨立小瓶中。在一些具體例中，套組進一步包含用於治療或預防實體腫瘤之組成物之使用說明書。

H. IFN α 添加對於修飾 mRNA 治療之效果

【0198】 RNA 可經由刺激各種模式識別受體(PRR)來活化免疫系統，從而產生 I 型干擾素(如 IFN α)。併入各種修飾核苷酸或類似減少所投與 dsRNA 之量的其他更改，可降低 RNA 之免疫刺激性效果。出乎意料地，如實施例中所描述，包括核苷酸修飾的及 dsRNA 減少的編碼干擾素 α 之 mRNA，相對於未經核苷酸修飾的及 dsRNA 減少的 mRNA，改良抗腫瘤活

性。添加編碼干擾素 α 之 mRNA 恢復一部分由包括修飾核苷酸及 dsRNA 純化移除的免疫刺激性效果。

【0199】 在一些具體例中，提供編碼 IFN (呈任何形式或次型)之 RNA，其中改變 IFN RNA 以與未改變的 RNA 相比具有減少的免疫原性。在某些具體例中，投與此 IFN 改良非 IFN 編碼之 RNA 之抗腫瘤反應。在一些具體例中，編碼 IFN α 之 RNA 改良其他 RNA 之抗腫瘤反應，只要其他 RNA 已改變成降低免疫原性即可。在一個具體例中，降低免疫原性之改變為減少 dsRNA 之量。在一些態樣中，降低免疫原性之改變為用修飾核苷置換一或多個尿苷。在一些態樣中，降低免疫原性之改變為減少 dsRNA 之量及用修飾核苷置換一或多個尿苷兩者。在一些具體例中，IFN 為 IFN α 。

【0200】 在一些具體例中，IFN RNA 改良修飾 RNA 之抗腫瘤反應。在一些具體例中，IFN RNA 改良包含修飾核苷酸之 RNA 之抗腫瘤反應。在一些具體例中，IFN RNA 改良包含假尿苷之 mRNA 之抗腫瘤反應。在一些具體例中，IFN RNA 改良具有 ModB 修飾之 RNA 之抗腫瘤反應。

【0201】 在一些具體例中，IFN RNA 改良以下之 RNA 之抗腫瘤反應：IL-2 (SEQ ID NO: 12 或 13)、IL-12sc (SEQ ID NO: 17 或 18)、IL-15 sushi (SEQ ID NO: 26)或 GM-CSF (SEQ ID NO: 29)。在一些具體例中，RNA 包含 ModB 修飾。

【0202】 在一些具體例中，IFN 為 IFN α 。

【0203】 在一些具體例中，IFN RNA 構築體為 SEQ ID NO: 22 或 23。

III. 方法及用途

【0204】 本文中所描述之 RNA、組成物、醫學製劑及組合組成物中之任一者可向個體投與以治療癌症或實體腫瘤。在一些具體例中，癌症為

實體腫瘤。在一些具體例中，實體腫瘤為不含有囊腫或液體區域之異常組織塊體。在一些具體例中，實體腫瘤可為良性或惡性的。在一些具體例中，實體腫瘤為癌前病變。在一些具體例中，實體腫瘤存在於以下中：肺、結腸、卵巢、子宮頸、子宮、腹膜、睪丸、陰莖、舌、淋巴結、胰臟、骨、乳房、前列腺、軟組織、結締組織、腎臟、肝、大腦、甲狀腺或皮膚。

【0205】 在一些具體例中，實體腫瘤為肉瘤、癌瘤或淋巴瘤。在一些具體例中，實體腫瘤為上皮腫瘤、何杰金氏淋巴瘤(HL)、非何杰金氏淋巴瘤、前列腺瘤、卵巢瘤、腎細胞瘤、胃腸道瘤、肝癌、結腸直腸瘤、血管瘤、間皮瘤、胰臟瘤、乳房瘤、肉瘤、肺癌、結腸瘤、腦瘤、黑色素瘤、基底細胞癌、鱗狀細胞癌、小細胞肺癌、神經母細胞瘤、睪丸瘤、癌瘤、腺癌瘤、神經膠質瘤、精細胞癌瘤、視網膜母細胞瘤或骨肉瘤。在一些具體例中，實體腫瘤為癌變前病變，諸如光化性角化症。

【0206】 在一些具體例中，RNA 組成物可經由注射至腫瘤中(例如腫瘤內)或腫瘤附近(腫瘤周圍)來遞送。在一些具體例中，RNA 組成物可遞送至腫瘤移除之位點處或附近。

【0207】 在一些具體例中，RNA 組成物可經由局部溶液、軟膏或乳膏來遞送。

【0208】 在一些具體例中，RNA 組成物可經由病毒來遞送。在一些具體例中，RNA 組成物可藉由用編碼 RNA 組成物之病毒(諸如溶瘤病毒)感染來遞送。在一些具體例中，RNA 組成物可藉由溶瘤病毒來遞送。

【0209】 在一些具體例中，以多於一種投與來遞送。在一些具體例中，將導管置放於腫瘤之位點內或附近，以用於多次投與。在一些具體例中，將導管置放於腫瘤移除之位點處，以用於多次投與。

【0210】 在一些具體例中，個體為人類。在一些具體例中，個體為非

人類哺乳動物，諸如狗、貓、小鼠、大鼠、兔、綿羊、牛、馬及豬。

【0211】 在一些具體例中，RNA 組成物與另一療法組合。在一些具體例中，RNA 組成物與多於一種其他療法組合。在一些具體例中，將 RNA 組成物併入多重療法中。

【0212】 在一些具體例中，其他療法為對腫瘤進行切除、割除或減積之手術。在一些具體例中，治療性 RNA 組成物在對腫瘤進行切除、割除或減積之手術期間投與。

【0213】 在一些具體例中，其他療法為放射線療法。在一些具體例中，放射線療法為外部波束放射線療法或粒子束放射線。在一些具體例中，放射線療法為涉及經由導管或較大孔針暫時性或永久性直接移植放射性同位素至腫瘤中的近接療法。在一些具體例中，放射性同位素為 137 銻、192 銻或放射性碘。在一些具體例中，放射線療法為經靜脈內投與之放射性同位素製劑。在一些具體例中，放射性同位素製劑為放射性碘(131I)、銥(89Sr)或釷(153Sm)。

【0214】 在一些具體例中，其他療法為化學療法。在一些具體例中，化學療法為烷化劑、抗代謝產物、抗微管藥劑、拓撲異構酶抑制劑或細胞毒性抗體。

【0215】 在一些具體例中，化學療法包含抗侵襲藥劑(例如金屬蛋白酶抑制劑，如馬立馬司他(marimastat)，及尿激酶纖維蛋白溶酶原活化物受體功能之抑制劑)。在一些具體例中，化學療法包含生長因子功能(例如血小板衍生生長因子及肝細胞生長因子)之抑制劑、生長因子抗體或生長因子受體抗體(例如抗 erbb2 抗體曲妥珠單抗(trastuzumab)[Herceptin™]及抗 erbb1 抗體 cetuximab™)。在一些具體例中，化學療法為法呢基(farnesyl)轉移酶抑制劑。在一些具體例中，化學療法為酪胺酸激酶抑制劑，諸如表皮生長因

子家族之抑制劑(例如 EGFR 家族酪胺酸激酶抑制劑，諸如吉非替尼(gefitinib) (Iressa™)、埃羅替尼(erlotinib) (Tarceva™)及卡奈替尼(Canertinib) (CI 1033)，或絲胺酸/蘇胺酸激酶抑制劑)。

【0216】 在一些具體例中，化學療法包含抗增殖/抗腫瘤藥物，諸如抗代謝物(例如抗葉酸劑，如甲胺喋呤；氟嘧啶，如 5-氟尿嘧啶、喃氟啶；嘌呤及腺苷類似物、胞嘧啶阿拉伯糖苷)；抗腫瘤抗生素(例如蒽環黴素(anthracyclines)，如阿德力黴素(adriamycin)、博萊黴素(bleomycin)、小紅莓、柔紅黴素、表柔比星(epirubicin)及艾達黴素(idarubicin)、絲裂黴素-C、放線菌素、光神黴素)；鉑衍生物(例如順鉑、卡鉑)；烷基化劑(例如氮芥、美法侖(melphalan)、苯丁酸氮芥、白消安(busulphan)、環磷醯胺、異環磷醯胺、亞硝基脲、噻替派(thiotepa))；抗有絲分裂劑(例如長春花生物鹼，如長春新鹼、長春鹼、長春地辛(vindesine)、長春瑞賓(vinorelbine)；及類紫杉醇，如紫杉醇、紫杉德)；拓撲異構酶抑制劑(例如表鬼臼毒素(epipodophyllotoxins)，如依託泊苷(etoposide)及替尼泊甙(teniposide)，安吖啶(amsacrine)，拓朴替康(topotecan)，喜樹鹼以及伊立替康(irinotecan))；或胸苷酸合成酶抑制劑(例如雷替曲塞(raltitrexed))。

【0217】 在一些具體例中，化學療法為抗體-藥物結合物(ADC)。在一些具體例中，ADC 為連接至細胞毒性(抗癌)藥物之抗體。在一些具體例中，ADC 允許將細胞毒性藥物靶向遞送至腫瘤細胞。在一些具體例中，ADC 允許相對於正常組織將細胞毒性藥物優先遞送至腫瘤細胞。

【0218】 在一些具體例中，化學療法為與不同藥劑組合之組合化學療法。在一些具體例中，組合包含具有不同作用機制及/或不同不重疊毒性之不同藥劑。

【0219】 在一些具體例中，其他療法為免疫刺激劑或免疫療法，諸如

檢查點調節劑/抑制劑。檢查點調節劑/抑制劑在本技藝中熟知防止宿主免疫系統攻擊自身，且包括例如 CTLA-4、PD1、PDL1、GITR、OX40、LAG-3 及 TIM-3。在一些具體例中，免疫刺激劑、免疫療法或檢查點調節劑/抑制劑為單株抗體。在一些具體例中，單株抗體為針對以下之抗體：PD1、PDL1、CTLA-4、LAG3、OX40、CD40、CD40L、41BB、41BBL、GITR、CD3、CD28、CD38 或 TGF β 。在一些具體例中，單株抗體為雙特異性抗體。在一些具體例中，免疫刺激劑為基於細胞之免疫療法。在一些具體例中，免疫刺激劑為細胞介素或趨化細胞素。在一些具體例中，免疫刺激劑為癌症疫苗。由於廣泛範圍的免疫刺激劑將為熟悉本技藝之科學家及臨床醫師已知，所以本發明不限於與特定免疫刺激劑的特異性組合。

【0220】 在一些情況下，本文中所描述之 RNA、RNA 組成物、醫學製劑及 RNA 組合組成物中之任一者可與免疫刺激劑、免疫療法或檢查點調節劑組合投與。在一些情況下，本文中所描述之 RNA、RNA 組成物及 RNA 組合組成物與抗體組合向個體投與，以治療癌症，包括實體腫瘤。在一些具體例中，抗體為抗 PD1 抗體、抗 CTLA4 抗體或抗 PD1 抗體與抗 CTLA4 抗體之組合。在一些具體例中，抗體為多特異性抗體，諸如三特異性或雙特異性抗體。

【0221】 在一些具體例中，抗 PD1 抗體為嵌合、人類化或人類抗體。在一些具體例中，抗 PD-1 抗體為分離及/或重組的。抗 PD-1 抗體之實施例為納武單抗 (nivolumab)、派立珠單抗 (pembrolizumab)、測米匹單抗 (cemiplimab)、MEDI0608 (以前 AMP-514；參見例如 WO 2012/145493 及美國專利第 9,205,148 號)、PDR001 (參見例如 WO 2015/112900)、PF-06801591 (參見例如 WO 2016/092419)、BGB-A317 (參見例如 WO 2015/035606)。

【0222】 在一些具體例中，抗 PD-1 抗體為 WO 2015/112800 中揭示

之彼等中之一者(諸如，PCT 公開案之表 1 中被稱作以下之彼等：
H1M7789N、H1M7799N、H1M7800N、H2M7780N、H2M7788N、
H2M7790N、H2M7791N、H2M7794N、H2M7795N、H2M7796N、
H2M7798N、H4H9019P、H4xH9034P2、H4xH9035P2、H4xH9037P2、
H4xH9045P2、H4xH9048P2、H4H9057P2、H4H9068P2、H4xH9119P2、
H4xH9120P2、H4xH9128P2、H4xH9135P2、H4xH9145P2、H4xH8992P、
H4xH8999P 及 H4xH9008P；及 PCT 公開案之表 3 中被稱作以下之彼等：
H4H7798N、H4H7795N2、H4H9008P 及 H4H9048P2)。WO 2015/112800
之揭示內容以全文引用的方式併入本文中。舉例而言，揭示於 WO
2015/112800 中之抗體及相關抗體，包括該 PCT 公開案中揭示之具有 CDR、
VH 及 VL 序列或重鏈及輕鏈序列之抗體及抗原結合片段以及結合至與該
PCT 公開案中揭示之抗體之相同 PD-1 抗原決定基的抗體及抗原結合片段，
可用於與本發明之 RNA 組成物結合，以治療及/或預防癌症。

【0223】 在相關具體例中，抗 PD-1 抗體可分別包含下文展示之 SEQ
ID NO: 79 及 80 之重鏈及輕鏈胺基酸序列；SEQ ID NO: 87 及 88 之 VH 及
VL 序列(斜體表示)；或 SEQ ID NO: 79 及 80 中之一或多個(例如所有六個)
CDR (粗體框中表示) 7。在一些具體例中，涵蓋包含以下 CDR 之抗體：

HCDR1 = GFTFSNFG (SEQ ID NO: 81)

HCDR2 = ISGGGRDT (SEQ ID NO: 82)

HCDR3 = VKWGNIYFDY (SEQ ID NO: 83)

LCDR1 = LSINTF (SEQ ID NO: 84)

LCDR2 = AAS (SEQ ID NO: 85)

LCDR3 = QQSSNTPFT (SEQ ID NO: 86).

【0224】 含有包含 SEQ ID NO: 87 及 88 中之 VH 及 VL 序列(斜體表

示)之重鏈之例示性抗體為全人類抗 PD-1 抗體，稱為 REGN2810 (測米匹單抗)。

【0225】 抗 PD-1 Mab 重鏈

EVQLLESGGV LVQPGGSLRL SCAAS**GFTFS** NFGMTWVRQA
PGKGLEWVSG **ISGGGRDT**YF ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY
LQMNSLKGED TAVYYC**VKWG** **NIYFDY**WGQG TLVTVSSAST
KGPSVFPLAP CSRSTSESTA ALGCLVKDYF PEPVTVSWNS
GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVVTVPS SSLGTKTYTC
NVDHKPSNTK VDKRVESKYG PPCPPCPAPE FLGGPSVFLF
PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVSQEDPEV QFNWYVDGVE
VHNAKTKPRE EQFNSTYRVV SVLTVLHQDW LNGKEYKCKV
SNKGLPSSIE KTISKAKGQP REPQVYTLPP SQEEMTKNQV
SLTCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT TPPVLDSDGS
FFLYSRLTVD KSRWQEGNVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL
SLGK(SEQ ID NO:79)

HCDR1 = GFTFSNFG (SEQ ID NO: 81)

HCDR2 = ISGGGRDT (SEQ ID NO: 82)

HCDR3 = VKWGNIYFDY (SEQ ID NO: 83)

【0226】 抗 PD-1 Mab 輕鏈

DIQMTQSPSS LSASVGDSIT ITCRAS**LSIN TF**LNWYQQKP GKAPNLLIYA
ASSLHGGVPS RFSGSGSGTD FTLTIRTLQP EDFATYYC**QQ SSNTPFT**FGP
GTVVDFRRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY
PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT
LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC(SEQ ID NO:80)

LCDR1 = LSINTF (SEQ ID NO: 84)

LCDR2 = AAS (SEQ ID NO: 85)

LCDR3 = QQ SSNTPFT (SEQ ID NO: 86)

【0227】 在一些具體例中，RNA、RNA 組成物及 RNA 組合組成物可經由注射至腫瘤中(例如腫瘤內)、腫瘤附近(腫瘤周圍)或腫瘤移除位點附近來遞送，且抗體可以相同方式或諸如腸內或非經腸之全身性遞送，包括經由注射、輸注及移植。「以組合投與」包括同時或依序投與。若依序投與，則投與可按任何次序且以熟悉本技藝者已知之任何適當時間間隔來進行。

【0228】 在一些具體例中，其他療法為激素療法。在一些具體例中，激素療法為用於治療乳癌之抗雌激素藥物或用於治療前列腺癌之抗雄激素藥物。實施例藥劑包括抗雌激素(例如他莫昔芬(tamoxifen)、托瑞米芬(toremifene)、雷諾昔酚(raloxifene)、曲洛昔芬(droloxifene)、艾多昔芬(iodoxyfene))、雌激素受體向下調節劑(例如氟維司群(fulvestrant))、孕激素(例如乙酸甲地孕酮(megestrol acetate))、芳香酶抑制劑(例如阿那曲唑(anastrozole)、來曲唑(letrozole)、維拉唑(vorazole)、依西美坦(exemestane))、抗孕激素、抗雄激素(例如氟他胺(flutamide)、尼魯胺(nilutamide)、比卡魯胺(bicalutamide)、乙酸環丙孕酮)、LHRH 促效劑及拮抗劑(例如醋酸戈舍瑞林(goserelin acetate)、魯普利德(luprolide)、布舍瑞林(buserelin))及 5- α -還原酶之抑制劑(例如非那雄安(finasteride))。

【0229】 在一些具體例中，其他療法為靶向療法。在一些具體例中，靶向療法為激酶抑制劑。在一些具體例中，靶向療法為抑制原癌基因之基因產物之活性的藥劑。在一些具體例中，靶向療法為抗血管生成劑。在一些具體例中，靶向療法為針對於調節 VEGF、BCR-ABL、BRAF、EGFR、

c-Met、MEK、ERK、mTOR 或 ALK 之活性的藥劑。

【0230】 在一些具體例中，其他療法為幹細胞移植。

【0231】 在一些具體例中，治療性 RNA 組成物在與另一療法同時遞送。

【0232】 在一些具體例中，治療性 RNA 組成物在另一療法之前遞送。

【0233】 在一些具體例中，治療性 RNA 組成物在另一療法之後遞送。

【0234】 在一些具體例中，治療性 RNA 組成物與另一療法一起直接遞送至腫瘤中、或腫瘤或腫瘤移除位點附近。在一些具體例中，治療性 RNA 組成物直接遞送至腫瘤中、或腫瘤或腫瘤移除位點附近，而另一藥劑經全身性遞送。

IV. 醫藥調配物

【0235】 在一些具體例中，本文中所描述之 DNA、RNA 及組成物中之任一者為醫藥調配物。在一些具體例中，醫藥調配物包含稀釋劑、賦形劑或其他醫藥學上可接受之載劑。因此，本文提供醫藥組成物，其包含本文提供之 DNA、RNA、組成物或其組合，以及醫藥學上可接受之賦形劑。在某些具體例中，醫藥學上可接受之賦形劑為水溶液。在某些具體例中，水溶液為鹽水溶液。如本文中所使用，醫藥學上可接受之賦形劑應理解為無菌的。在一些具體例中，醫藥組成物呈劑量單位形式投與。舉例而言，在某些具體例中，劑量單位呈錠劑、膠囊、可植入器件或快速注射形式。

【0236】 在一些具體例中，本文提供之醫藥組成物可另外含有習知存在於醫藥組成物中之其他佐劑組分。舉例而言，組成物可含有額外相容的醫藥學上活性材料，諸如止癢劑、收斂劑、局部麻醉劑或消炎劑。組成物亦可含有額外相容的醫藥學上非活性材料，諸如賦形劑、稀釋劑及載劑。

【0237】 某些用於注射之醫藥組成物為油性或水性媒劑中之懸浮

液、溶液或乳液，且可含有調配劑，諸如懸浮劑、穩定劑及/或分散劑。適用於注射用醫藥組成物之某些溶劑包括(但不限於)親脂性溶劑及脂肪油(諸如芝麻油)、合成脂肪酸酯(諸如油酸乙酯或甘油三酯)及脂質體。水性注射懸浮液可含有增加懸浮液黏度之物質，諸如羧甲基纖維素鈉、山梨糖醇或聚葡萄糖。視情況，此類懸浮液亦可含有適合穩定劑或提高醫藥劑溶解度之藥劑以允許製備高濃度溶液。

【0238】 脂質部分可用於遞送本文提供之 RNA。在一個方法中，將 RNA 引入至由陽離子脂及中性脂之混合物製成之預成型脂質體或脂複合體中。在另一方法中，具有單-或聚-陽離子脂之 RNA 複合物在不存在中性脂的情況下形成。在某些具體例中，脂質部分經選擇以增加至特定細胞或組織之醫藥劑之分佈。

【0239】 在一些具體例中，本文提供之醫藥組成物包含聚胺化合物或與本文提供之 DNA 或 RNA 複合之脂質部分。

【0240】 在一些具體例中，本文提供之醫藥組成物包含遞送系統。遞送系統之實例包括(但不限於)脂質體及乳液。某些遞送系統適用於製備包括包含疏水性化合物之彼等的某些醫藥組成物。在某些具體例中，使用某些有機溶劑，諸如二甲亞碸。

【0241】 某些用於注射之醫藥組成物呈現成單位劑型，例如在安瓿或多劑量容器中。在某些具體例中，本文提供之醫藥組成物包含治療有效量之 RNA 或 RNA 組合。在某些具體例中，治療有效量為足以治療或預防所治療個體之癌症。

【0242】 以下條款提供眾多具體例且為非限制性的：

條款 1.一種組成物，其包含編碼 IL-12sc 蛋白質之 RNA、編碼 IL-15 sushi 蛋白質之 RNA、編碼 IFN α 蛋白質之 RNA 及編碼 GM-CSF

蛋白質之 RNA。

條款 2.如條款 1 之組成物，其中，該 IFN α 蛋白質為 IFN α 2b 蛋白質。

條款 3.如條款 1 之組成物，其中，(i)該編碼 IL-12sc 蛋白質之 RNA 包含 SEQ ID NO: 17 或 18 之核苷酸序列，或與 SEQ ID NO: 17 或 18 之核苷酸序列具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸序列；及/或(ii)該 IL-12sc 蛋白質包含 SEQ ID NO: 14 之胺基酸序列，或與 SEQ ID NO: 14 之胺基酸序列具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之胺基酸序列。

條款 4.如條款 1 之組成物，其中，(i)該編碼 IL-15 sushi 蛋白質之 RNA 包含 SEQ ID NO: 26 之核苷酸序列，或與 SEQ ID NO: 26 之核苷酸序列具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸序列；及/或(ii)該 IL-15 sushi 蛋白質包含 SEQ ID NO: 24 之胺基酸序列，或與 SEQ ID NO: 24 之胺基酸序列具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之胺基酸序列。

條款 5.如條款 1 之組成物，其中，(i)該編碼 IFN α 蛋白質之 RNA 包含 SEQ ID NO: 22 或 23 之核苷酸序列，或與 SEQ ID NO: 22 或 23 之核苷酸序列具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸序列；及/或(ii)該 IFN α 蛋白質包含 SEQ ID NO: 19 之胺基酸序列，或與 SEQ ID NO: 19 之胺基酸序列具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之胺基酸序列。

條款 6.如條款 1 之組成物，其中，(i)該編碼 GM-CSF 蛋白質之 RNA

包含 SEQ ID NO: 29 之核苷酸序列，或與 SEQ ID NO: 29 之核苷酸序列具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸序列；及/或(ii)該 GM-CSF 蛋白質包含 SEQ ID NO: 27 之胺基酸序列，或與 SEQ ID NO: 27 之胺基酸序列具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之胺基酸序列。

條款 7.如條款 1 之組成物，其中，至少一個 RNA 包含替代至少一種尿苷之修飾核苷，其中該修飾核苷為假尿苷(ψ)、N1-甲基-假尿苷(m1 ψ)、5-甲基-尿苷(m5U)或其組合。

條款 8.如條款 1 之組成物，其中，各 RNA 包含替代至少一個尿苷之修飾核苷，其中該修飾核苷為假尿苷(ψ)、N1-甲基-假尿苷(m1 ψ)、5-甲基-尿苷(m5U)或其組合。

條款 9.如條款 1 之組成物，其中，至少一個 RNA 包含 5'端帽 $m_2^{7,3'-O}Gppp(m_1^{2'-O})ApG$ 、或 $3'-O-Me-m^7G(5')ppp(5')G$ 、或 $m_2^{7,3'-O}Gppp(m_1^{2'-O})ApG$ 或 $3'-O-Me-m^7G(5')ppp(5')G$ 。

條款 10. 如條款 1 之組成物，其中，至少一個 RNA 包含：5' UTR：其包含(i)選自由 SEQ ID NO: 2、4 及 6 組成之群之核苷酸序列，或(ii)與選自由 SEQ ID NO: 2、4 及 6 組成之群之核苷酸序列具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸序列；及/或 3' UTR，其包含(i) SEQ ID NO: 8 之核苷酸序列，或(ii)與 SEQ ID NO: 8 之核苷酸序列具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸序列。

條款 11. 如條款 1 之組成物，其中，至少一個 RNA 包含至少 100 個核苷酸之多腺苷酸尾。

條款 12. 如條款 11 之組成物，其中，該多腺苷酸尾包含展示於 SEQ ID NO: 78 中之多腺苷酸尾。

條款 13. 如條款 1 之組成物，其中，一或多個 RNA 包含：

- 5' 端帽，其包含 $m_2^{7,3'-O}Gppp(m_1^{2'-O})ApG$ 或 $3'-O-Me-m^7G(5')ppp(5')G$ ；
- 5' UTR，其包含(i)選自由 SEQ ID NO: 2、4 及 6 組成之群之核苷酸序列，或(ii)與選自由 SEQ ID NO: 2、4 及 6 組成之群之核苷酸序列具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸序列；
- 3' UTR，其包含(i) SEQ ID NO: 8 之核苷酸序列，或(ii)與 SEQ ID NO: 8 之核苷酸序列具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性之核苷酸序列；以及
- 多腺苷酸尾，其包含至少 100 個核苷酸。

條款 14. 如條款 13 之組成物，其中，該多腺苷酸尾包含 SEQ ID NO: 78。

條款 15. 一種藥物組成物，其包含條款 1 之組成物及醫藥學上可接受之載劑、稀釋劑及/或賦形劑。

條款 16. 一種治療或減小實體腫瘤之可能性之方法，其包含向有需要之個體投與條款 1 之組成物。

條款 17. 一種用於治療或減小實體腫瘤之可能性之方法，其包含向有需要之個體投與第一 RNA 及其他 RNA，其中該第一 RNA 編碼 IL-12sc 蛋白質、IL-15 sushi 蛋白質、IFN α 蛋白質或 GM-CSF 蛋白質，其中：

- 若該第一 RNA 編碼 IL-12sc 蛋白質，則該其他 RNA 編碼 IL-15

sushi 蛋白質、IFN α 蛋白質及 GM-CSF 蛋白質；

- 若該第一 RNA 編碼 IL-15 sushi 蛋白質，則該其他 RNA 編碼 IL-12sc 蛋白質、IFN α 蛋白質及 GM-CSF 蛋白質；
- 若該第一 RNA 編碼 IFN α 蛋白質，則該其他 RNA 編碼 IL-15 sushi 蛋白質、IL-12sc 蛋白質及 GM-CSF 蛋白質；以及
- 若該第一 RNA 編碼 GM-CSF 蛋白質，則該其他 RNA 編碼 IL-15 sushi 蛋白質、IFN α 蛋白質及 IL-12sc 蛋白質。

條款 18. 如條款 17 之方法，其中，該第一 RNA 在該其他 RNA 同時向該個體投與。

條款 19. 如條款 17 之方法，其中，該 RNA 為經腫瘤內或腫瘤周圍投與。

條款 20. 如條款 17 之方法，其中，該個體進一步用包含以下之其他療法治療：(i)對腫瘤進行切除、割除或減積之手術、(ii)免疫療法、(iii)放射線療法或(iv)化學療法。

條款 21. 如條款 17 之方法，其中，該個體進一步用檢查點調節劑治療。

條款 22. 如條款 21 之方法，其中，該檢查點調節劑為抗 PD1 抗體、抗 CTLA-4 抗體或抗 PD1 抗體與抗 CTLA-4 抗體之組合。

條款 23. 如條款 21 之方法，其中，該 RNA 經由注射腫瘤內或腫瘤周圍投與，且檢查點調節劑經全身性投與。

條款 24. 如條款 17 之方法，其中，該實體腫瘤為肉瘤、癌瘤或淋巴瘤。

條款 25. 如條款 17 之方法，其中，該實體腫瘤在肺、結腸、卵巢、子宮頸、子宮、腹膜、睪丸、陰莖、舌、淋巴結、胰臟、骨、乳

房、前列腺、軟組織、結締組織、腎臟、肝、大腦、甲狀腺或皮膚中。

條款 26. 如條款 17 之方法，其中，該實體腫瘤為上皮瘤、何杰金氏淋巴瘤(HL)、非何杰金氏淋巴瘤、前列腺瘤、卵巢瘤、腎細胞瘤、胃腸道瘤、肝癌、結腸直腸瘤、血管瘤、間皮瘤、胰臟瘤、乳房瘤、肉瘤、肺癌、結腸瘤、腦瘤、黑色素瘤、基底細胞癌、鱗狀細胞癌、小細胞肺癌、神經母細胞瘤、睪丸瘤、癌瘤、腺癌瘤、神經膠質瘤、精細胞癌瘤、視網膜母細胞瘤或骨肉瘤。

條款 27. 如條款 17 之方法，其中，治療該實體腫瘤或減小該實體腫瘤之可能性包含減小個體之腫瘤大小、減小處於緩解中之癌症復發之可能性或減小癌轉移之可能性。

條款 28. 一種用於治療實體腫瘤或減小實體腫瘤之可能性之組合療法方法，其包含向有需要之個體投與 RNA 及其他療法，其中該等 RNA 編碼 IL-12sc 蛋白質、IL-15 sushi 蛋白質、IFN α 蛋白質及 GM-CSF 蛋白質，且該其他療法包含免疫療法、化學療法或檢查點調節劑。

條款 29. 如條款 28 之組合療法方法，其中，該其他療法包含抗 PD1 抗體、抗 CTLA-4 抗體或抗 PD1 抗體與抗 CTLA-4 抗體之組合。

條款 30. 一種分離核酸，其包含編碼 IL-12sc 蛋白質之序列，其中：該編碼 IL-12sc 蛋白質之序列包含 a)與 SEQ ID NO: 16 或 18 之核苷酸 1-984 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%、80%或 78%一致性之連續核苷酸，b)與 SEQ ID NO: 16 或 18 之核苷酸 1027-1623 具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 81%一致性之連續核苷酸，及 c)編碼 a)與 b)之間的核苷酸

之連接子的核苷酸。

條款 31. 如條款 30 之核酸，其為 DNA。

條款 32. 如條款 30 之核酸，其為 RNA。

條款 33. 一種分離核酸，其包含編碼 IFN α 蛋白質之序列，其中：

該編碼 IFN α 蛋白質之序列與 SEQ ID NO: 21 或 23 之核苷酸序列具有至少 99%、98%、97%、96%、95%、90%、85%或 80%一致性。

條款 34. 如條款 33 之核酸，其為 DNA。

條款 35. 如條款 33 之核酸，其為 RNA。

條款 36. 一種用於治療或減小實體腫瘤之可能性之方法，其包含向有需要之個體投與條款 34 之 RNA，其中：

該個體進一步用編碼 IL-15 sushi 蛋白質、IFN α 蛋白質及 GM-CSF 蛋白質之其他 RNA 治療。

條款 37. 一種用於治療或減小實體腫瘤之可能性之方法，其包含向有需要之個體投與條款 35 之 RNA，其中：

該個體進一步用編碼 IL-15 sushi 蛋白質、IL-12sc 蛋白質及 GM-CSF 蛋白質之其他 RNA 治療。

條款 38. 一種生產編碼 IL-12sc 之 RNA 之方法，其包含將包含與啟動子可操作地連接之條款 32 之核酸之表現構築體與 RNA 聚合酶在容許轉錄條件下接觸。

條款 39. 一種生產編碼 IFN α 之 RNA 之方法，其包含將包含與啟動子可操作地連接之條款 35 之核酸之表現構築體與 RNA 聚合酶在容許轉錄條件下接觸。

條款 40. 一種套組，其包含條款 1 之組成物。

條款 41. 一種套組，其包含編碼 IL-12sc 蛋白質之 RNA、編碼 IL-15 sushi 蛋白質之 RNA、編碼 IFN α 蛋白質之 RNA 及編碼 GM-CSF 蛋白質之 RNA，其中該等 RNA 不在同一容器中。

條款 42. 如條款 41 之套組，其中，各 RNA 在獨立容器中。

條款 43. 如條款 40 至 42 中任一項之套組，其進一步包含用於治療或減小實體腫瘤之可能性之組成物或 RNA 之使用說明書。

【0243】 本說明書及例示性具體例不應視為限制性的。出於本說明書及所附申請專利範圍之目的，除非另外指示，否則表示量、百分比或比例，及說明書及申請專利範圍中所用之其他數值的所有數目均應理解為在所有情況下藉由術語「約」修飾，程度為其尚未如此修飾。因此，除非有相反指示，否則本說明書及所附申請專利範圍中所說明之數值參數為可視設法獲得之所需特性而變化的近似值。至少，且不試圖將均等論之應用限於申請專利範圍之範疇，各數值參數至少應根據所報導之有效數位之數目且藉由應用一般捨入技術來解釋。

【0244】 應注意，如在本說明書及所附申請專利範圍中所使用，除非明確地且肯定地限於一個指示物，否則單數形式「一(a/an)」與「該(the)」及任何字語之任何單數使用包括複數個指示物。如本文所使用，術語「包括」及其文法變體意欲為非限制性的，使得清單中之項之引述不排除可取代或添加至所列項之其他類似項。

實施例

【0245】 提供以下實施例以說明某些所揭示之具體例，且不應解釋為以任何方式限制本發明之範疇。

實施例 1 - 材料及方法

【0246】 **B16F10 腫瘤模型**：在參與研究之前，使 6 至 8 週齡及重量

在 17.0 與 20.9 g 之間的雌性 C57BL/6J 小鼠(Jackson Laboratory; Bar Harbor, ME)適應至少三天。小鼠自由獲取食物(Harlan 2916 嚙齒動物飼料, Massachusetts, USA)及無菌水, 且在 $22^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 及 $55\% \pm 15\%$ 之相對濕度下以 12 小時光/暗循環圈養。B16F10 細胞獲自美國菌種保存中心(American Type Culture Collection; ATCC) (Manassas, Virginia USA) (目錄號 CRL-6475), 且在補充有 10%熱滅活胎牛血清(HI FBS) (Life technologies, 目錄號 10082-147)之杜爾貝科改良伊格爾介質(Dulbecco's Modified Eagle's Medium; DMEM) (Life technologies, 目錄號 11995)中在 5% CO_2 、 37°C 下培養。細胞使用 0.25%胰蛋白酶-EDTA (Life technologies, 目錄號 25200-056) 來收集, 再懸浮於杜爾貝科氏磷酸鹽緩衝鹽水(DPBS) (Life technologies, 目錄號 14190-144)中, 且以 0.5×10^6 個細胞/200 μl /小鼠皮下(SC)移植至雌性 C57BL/6J 小鼠之右側腹中。對於雙側腹腫瘤模型, 在第 0 天, 以 0.5×10^6 個 B16F10 細胞/200 μl /小鼠皮下(SC)移植至右側腹中, 且以 0.25×10^6 個 B16F10 細胞/200 μl /小鼠 SC 移植至左側腹中。為了測試局部投與細胞介素 mRNA 是否能具有遠距離效果(參見圖 19), 在參與研究之前, 使 6 至 8 週齡、重量在 17 與 24 g 之間的雌性 C57BL/6JolaHsd 小鼠(Envigo, Rossdorf, Germany)適應至少六天。小鼠自由獲取食物(ssniff M-Z autoclavable Soest, Germany)及無菌水, 且在 $22^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 及 $55\% \pm 10\%$ 之相對濕度下以 12 小時光/暗循環圈養。B16F10 細胞獲自美國菌種保存中心(ATCC® CRL-6475™), 且在 7.5% CO_2 、 37°C 下, 培養在補充有 10%胎牛血清(FBS) (Biochrom, 目錄號 S 0115)之 DMEM/高葡萄糖/GlutaMAX™ (Life technologies, 目錄號 31966047)中。細胞使用 StemPro® Accutase®細胞分離試劑(Life technologies, 目錄號 A1110501)來收集, 再懸浮於杜爾貝科氏磷酸鹽緩衝鹽水(DPBS) (Life technologies, 目錄號 14190-169)中, 且以 $0.3 \times$

10⁶ 個細胞/100 μ l/小鼠皮下(SC)移植至雌性 C57BL/6J 小鼠之右側刮毛側腹中。為了接種遠距離肺腫瘤，使用 B16F10_luc-gfp 細胞。此等細胞源於藉由用編碼螢光素酶及 GFP 之質體穩定轉染之 B16F10。B16F10_luc-gfp 細胞在與 B16F10 相同的條件下培養，僅向培養介質中添加 0.5 μ g/mL 嘌呤黴素。在 SC 移植後一天，以 0.3×10^6 個細胞/200 μ l B16F10_luc-gfp 細胞/小鼠經靜脈內(IV)注射至尾靜脈中。腫瘤內 mRNA 注射在 SC 接種腫瘤 10 至 14 天後開始。腫瘤生長藉由每 2 至 3 天測徑規量測來評定，且表述為使用以下式之垂直直徑的乘積： $a \times b/2$ ，其中 $a < b$ 。肺中之螢光素酶陽性腫瘤細胞之移植藉由在活體內生物發光成像使用 Xenogen IVIS 光譜成像系統(Caliper Life Sciences)來分析。L-螢光素(250 μ l, 1.6 mg; BD Biosciences)之水溶液經腹膜內注射。自活體動物發射之光子在 1 min 暴露時間後之 10 min 來定量。所關注區(ROI)定量為平均光亮度(光子 $s^{-1} cm^{-2} sr^{-1}$ ，由使用來自 Caliper Life Sciences 之 Living Image 軟體疊加在小鼠灰度相片上的按色彩縮放的影像表示)。對於絕對定量，生物發光信號視為總通量(photons s^{-1})。對於圖 20C 至圖 20G 及圖 21E 至圖 21I 中進行之研究，亦使用上文所描述之未接種肺癌轉移之 C57BL/6J OlaHsd 小鼠(Envigo, Rossdorf, Germany)模型。

【0247】 CT26 腫瘤模型：對於圖 2、圖 3、圖 7D 至圖 7F、圖 8、圖 9、圖 12D 及圖 21 中進行之研究，在參與研究之前，使 6 至 8 週齡、重量在 17 與 24 g 之間的雌性 Balb/c Rj 小鼠(Janvier, Genest-St.-Isle, France)適應至少六天。小鼠自由獲取食物(ssniff M-Z autoclavable Soest, Germany)及無菌水，且在 $22^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$ 及 $55\% \pm 10\%$ 之相對濕度下以 12 小時光/暗循環圈養。CT26 細胞獲自美國菌種保存中心(ATCC® CRL-2638™)，且在 5% CO₂、37°C 下在補充有 10%胎牛血清(FBS) (Biochrom, 目錄號 S 0115)之洛

斯維·帕克紀念研究所介質(Roswell Park Memorial Institute medium ; RPMI)/1640 介質/GlutaMAX™ (Life technologies , 目錄號 61870-044)中培養。細胞使用 StemPro® Accutase®細胞分離試劑(Life technologies , 目錄號 A1110501)來收集，再懸浮於 DPBS (Life technologies , 目錄號 14190-169)中，且以 0.5×10^6 個細胞/100 μ l/小鼠 SC 移植至雌性 Balb/c Rj 小鼠之右側刮毛側腹中。腫瘤內 RNA 注射在接種腫瘤 13 至 19 天後開始。腫瘤生長藉由每 2 至 3 天卡尺量測來評定，且表述為使用以下式之垂直直徑的乘積： $a \times b/2$ ，其中 b 為兩個直徑之較長者($a < b$)。

【0248】 對於圖 6 及圖 7A 至圖 7C 中進行之研究，在參與研究之前，使 6 至 8 週齡及重量在 17.0 與 20.9 g 之間的雌性 BALB/c 小鼠 Jackson Laboratory ; Bar Harbor , ME)適應至少三天。小鼠自由獲取食物(Harlan 2916 嚙齒動物飼料，Massachusetts , USA)及無菌水，且在溫度($22^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$)、相對濕度($55\% \pm 15\%$)下以 12 小時光/暗循環圈養。CT26 細胞獲自 ATCC (Manassas , Virginia USA) (目錄號 CRL-2638)，且在 5% CO₂、37°C 下，在補充有 10% HI FBS (Life technologies , 目錄號 10082-147)之 RPMI-1640 (Life technologies , 目錄號 11875-093)中培養。細胞使用 0.25%胰蛋白酶-EDTA (Life technologies , 目錄號 25200-056)來收集，再懸浮於 DPBS (Life technologies , 目錄號 14190-144)中，且以 0.5×10^6 個細胞/200 μ l/小鼠 SC 移植至 BALB/c 雌性小鼠之右側腹中。

【0249】 在除腫瘤生長以外之 CT26 腫瘤模型中，在所指示之血液量測 gp70 反應性 CD8+ T 細胞。使用 EDTA 塗佈管獲取血液樣本。將 100 μ L 血液轉移至 FACS 管，且添加含有以下之抗體混合物：T-選擇 H-2Ld MuLV gp70 四聚體-SPSYVYHQF-APC (MBL (TS-M-521-2)，4 μ L/100 μ L 血液)、抗 CD8a FITC (life technologies (MCD801)，1 μ L/100 μ L 血液))及抗 CD45

V500 (BD (561487), 1 μ L/100 μ L 血液))。在室溫下培育 20 min 後，添加血液溶解緩衝液(BD (349202), 300 μ L/管)，且另外培育 6 min。接著，樣本用 PBS-EDTA 緩衝液洗滌兩次。FACS 樣本在 FACS Canto II 流式細胞儀上進行分析。

【0250】 MC38 腫瘤模型：在參與研究之前，使 6 至 8 週齡及重量在 17.0 與 20.9 g 之間的雌性 C57BL/6J 小鼠(Jackson Laboratory ; Bar Harbor , ME)適應至少三天。小鼠自由獲取食物(Harlan 2916 嚙齒動物飼料 , Massachusetts , USA)及無菌水，且在 $22^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 及 $55\% \pm 15\%$ 之相對濕度下以 12 小時光/暗循環圈養。MC38 細胞由 S.A.Rosenberg 博士(National Institute of Health , Bethesda , MD , USA)贈與。細胞株在 5% CO₂、37°C 下，在具有 L-麩醯胺酸(Gibco , 目錄號 11875)之補充有 10% HI FBS (Gibco , 目錄號 100082)之 RPMI-1640 中培養。細胞經收集，再懸浮於 DPBS (Gibco , 目錄號 14190)中，且以 1×10^6 個細胞/200 μ l/小鼠 SC 移植至雌性 C57BL/6J 小鼠之右側腹中。

【0251】 A375 腫瘤模型：在參與研究之前，使 6 至 8 週齡及重量在 17.0 與 20.9 g 之間的雌性嚴重組合免疫缺陷(SCID)小鼠 (Jackson Laboratory ; Bar Harbor , ME)適應至少三天。小鼠自由獲取食物(Harlan 2916 嚙齒動物飼料 , Massachusetts , USA)、無菌水，且在 $22^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 及 $55\% \pm 15\%$ 之相對濕度下以 12 小時光/暗循環圈養。A375 細胞獲自 ATCC (Manassas , Virginia USA) (目錄號 CRL-1619)。細胞株在 5% CO₂、37°C 下，在補充有 10% HI FBS (Life technologies , 目錄號 10082-147)之 DMEM (Life technologies , 目錄號 11995)中培養。細胞使用 0.25%胰蛋白酶-EDTA (Life technologies , 目錄號 25200-056)來收集，再懸浮於 DPBS (Life technologies , 目錄號 14190-144)中，且將 3.0×10^6 /100 μ l PBS 與 100 μ l BD 基質膠基質

(BD，目錄號 354234)混合，且 SC 移植至雌性 SCID 小鼠之右側腹中。

【0252】 KM12 (CRC)異種移植模型：在參與研究之前，使 10 週齡及重量在 17.3 與 21.9 g 之間的雌性 NOD.CB17-Prkdcscid/SCID 小鼠(Jackson Laboratory，Bar Harbor，ME)適應至少三天。小鼠自由獲取食物(Harlan 2916 啮齒動物飼料，Massachusetts，USA)、無菌水，且在 $(22 \pm 2^{\circ}\text{C})$ 及相對濕度 $(55 \pm 15\%)$ 下以 12 小時光/暗循環圈養。KM-12 細胞獲自美國國家癌症研究所(National Cancer Institute；NCI) (目錄號 507345)。細胞在補充有 10% HI FBS (Gibco，目錄號 10082)之具有 L-麩醯胺酸之 RPMI 介質 1640 (Gibco，目錄號 11875)中生長，且在 37°C 及 5% CO_2 下培育。細胞使用 0.25%胰蛋白酶-EDTA (Gibco，目錄號 25200)來收集，至懸浮於 DPBS (Gibco，目錄號 14190)中，且以各小鼠 5.0×10^6 個細胞/200 μl DPBS (具有 50%基質膠，BD，目錄號 356234)SC 移植至雌性 SCID 小鼠之右側腹中。

【0253】 RPMI8226 (骨髓瘤)異種移植模型：在參與研究之前，使 12 週齡及重量在 19.8 g 與 26.6 g 之間的雌性 NSG 小鼠(Jackson Laboratory，Bar Harbor，ME)適應至少三天。小鼠自由獲取食物(Harlan 2916 啮齒動物飼料，Massachusetts，USA)、無菌水，且在 $(22 \pm 2^{\circ}\text{C})$ 及相對濕度 $(55 \pm 15\%)$ 下以 12 小時光/暗循環圈養。RPMI8226 細胞獲自 ATCC (目錄號 CCL-155)。細胞在補充有 10% HI FBS (Gibco，目錄號 10082)之具有 L-麩醯胺酸之 RPMI 介質 1640 (Gibco，目錄號 11875)中生長，且在 37°C 及 5% CO_2 下培育。細胞使用 0.25%胰蛋白酶-EDTA (Gibco，目錄號 25200)來收集，再懸浮於 DPBS (Gibco，目錄號 14190)中，且以各小鼠 5.0×10^6 個細胞/200 μl DPBS (具有 50%基質膠，BD，目錄號 356234)SC 移植至雌性 NSG 小鼠之右側腹中。

【0254】 NCI-N87 (胃癌)異種移植模型：在參與研究之前，使 11 週齡及重量在 18.3 與 22.7 g 之間的雌性 NOD.CB17-Prkdcscid/SCID (Jackson

Laboratory, Bar Harbor, ME)適應至少三天。小鼠自由獲取食物(Harlan 2916 嚙齒動物飼料, Massachusetts, USA)、無菌水, 且在 $(22 \pm 2^{\circ}\text{C})$ 及相對濕度 $(55 \pm 15\%)$ 下以 12 小時光/暗循環圈養。NCI-N87 細胞獲自 ATCC (目錄號 CRL-5822)。細胞在補充有 10% HI FBS (Gibco, 目錄號 10082)之具有 L-麩醯胺酸之 RPMI 介質 1640 (Gibco, 目錄號 11875)中生長, 且在 37°C 及 5% CO_2 下培育。細胞使用 0.25%胰蛋白酶-EDTA (Gibco, 目錄號 25200)來收集, 再懸浮於 DPBS (Gibco, 目錄號 14190)中, 且以各小鼠 3.0×10^6 個細胞/200 μl DPBS (具有 50%基質膠, BD, 目錄號 356234)SC 移植至雌性 SCID 小鼠之右側腹中。

【0255】 NCI-H1975 (NSCLC)異種移植模型：在參與研究之前, 使 10 週齡及重量在 18.8 g 與 26.0 g 之間的雌性 NSG 小鼠(Jackson Laboratory, Bar Harbor, ME)適應至少三天。小鼠自由獲取食物(Harlan 2916 嚙齒動物飼料, Massachusetts, USA)、無菌水, 且在 $(22 \pm 2^{\circ}\text{C})$ 及相對濕度 $(55 \pm 15\%)$ 下以 12 小時光/暗循環圈養。NCI-H1975 細胞獲自 ATCC (目錄號 CRL-5908), 且在 37°C 及 5% CO_2 下, 在補充有 10% HI FBS (Gibco, 目錄號 10082)之具有 L-麩醯胺酸之 RPMI 介質 1640(Gibco, 目錄號 11875)中培養。細胞使用 0.25%胰蛋白酶-EDTA (Gibco, 目錄號 25200)來收集, 再懸浮於 DPBS (Gibco, 目錄號 14190)中, 且以各小鼠 5.0×10^6 個細胞/200 μl DPBS (具有 50%基質膠, BD, 目錄號 356234)SC 移植至雌性 NSG 小鼠之右側腹中。

【0256】 腫瘤再刺激：雌性 C57BL/6J 小鼠植入如上文所描述之 B16F10 細胞。小鼠在第 11、13、15 及 17 天用具有 ModB 細胞介素 mRNA 混合物(IL-15sushi、IL-12sc、GM-CSF、 $\text{IFN}\alpha$)之 4 個腫瘤內注射(80 μg mRNA/20 μg /靶標)處理。在細胞介素 mRNA 處理後, 8 隻小鼠為無腫瘤的。

在最後細胞介素 mRNA 處理四週後，用 0.5×10^6 個 B16F10 細胞/200 μ l/ 小鼠藉由 SC 注射再刺激無腫瘤的小鼠，且監測腫瘤生長。

【0257】 腫瘤監測：用卡尺每週兩次量測腫瘤，直至最終犧牲。當腫瘤大小達至大致 2000 mm³ 或存在動物健康問題(20%區域具有腫瘤潰瘍)時，將動物安樂死。腫瘤消退定義為 i) 在研究結束時腫瘤體積 < 20 mm³，或 ii) $T^F/T^0 < 1$ ，其中 T^F 等於最終腫瘤體積， T^0 等於第一次腫瘤內 mRNA 注射之日的腫瘤體積。

【0258】 mRNA 修飾 A (ModA)：將編碼相關基因之合成 DNA 片段選殖至常用起始載體中，該載體包含：5'-UTR (在一些情況下，對應於 SEQ ID NO: 1)；3' UTR，其由稱為 F 及 I (在一些情況下，對應於 SEQ ID NO: 7) 之兩個元件組成；及總計 110 個核苷酸之 poly(A) 尾(A30-連接子-A70 結構；在一些情況下對應於 SEQ ID NO: 78)。質體 DNA 之線性化在 poly(dA:dT) 之下游用 IIS 類限制酶進行，產生除 poly(dA:dT) 以外不具有其他核苷酸之模板(參見 Holtkamp 等人，*Blood* 108(13):4009-172006 (2006))。將經線性化之質體 DNA 如先前所描述在活體外用 T7 RNA 聚合酶(Thermo Fisher) (參見 Grudzien-Nogalska E 等人，*Methods Mol Biol.* 969:55-72 (2013)) 在 7.5 mM ATP、CTP、UTP、GTP 及 6 mM D1、 β -S-抗逆轉端帽類似物(β -S-ARCA，Cap0) (參見 Kuhn AN 等人，*Gene Ther.* 17(8):961-71 (2010)) 存在下轉錄 RNA 使用磁性粒子(參見 Berensmeier S. *Appl Microbiol Biotechnol.* 73(3):495-504 (2006)) 來純化，且 RNA 濃度及品質分別地以分光光度法評定及藉由毛細管凝膠電泳系統分析。

【0259】 mRNA 修飾 B (ModB)：將編碼相關基因之合成 DNA 片段選殖至常用起始載體中，該載體包含：5'-UTR (在一些情況下對應於菸草蝕刻病毒前導序列 TEV，SEQ ID NO: 3)；3' UTR，其由稱為 F 及 I (在一些情

況下對應於 SEQ ID NO: 7)之兩個元件組成;及總計 110 個核苷酸之 poly(A) 尾(A30-連接子-A70 結構)。在如上文所描述質體 DNA 之線性化後,進行用 T7 RNA 聚合酶(Thermo Fisher)之活體外轉錄。此如對於 ModA 所描述一樣進行,除不向反應添加端帽結構及用 UTP 取代 N1-甲基-假尿苷三磷酸酯以外。接著, RNA 使用磁性粒子(*Berensmeier 2006*)來純化,且隨後 Cap1 結構使用可商購的系統基於 V 痘苗病毒加帽酶(NEB)及添加 mRNA 端帽 2'-O-甲基轉移酶(NEB)來進行酶引入。之後,將 RNA 藉由基於纖維素之層析進行進一步純化過程,以移除雙鏈 RNA 雜質(參見 Day PR 等人, *Phytopathology* 67:1393 (1977); Morris TJ 等人, *Phytopathology* 69:854-858 (1979); 以及 Castillo A 等人, *Virol J.* 8:38 (2011))。RNA 濃度及品質分別地以分光光度法評定及藉由毛細管凝膠電泳系統分析。dsRNA 之存在以西北墨點分析(Northwestern dot-blot assay)使用 dsRNA 特異性 J2 mAb (English & Scientific Consulting)如 Karikó 等人, *Nucleic Acids Res.* 39(21):e142 (2011) 中所描述來評定。

【0260】 mRNA 密碼子最佳化:蛋白質之編碼序列可影響蛋白質轉譯之效率以及準確度(參見 Bossi L 等人, *Nature.* 286(5769):123-7 (1980)及 Irwin 等人, *J Biol Chem.* 270(39):22801-6 (1995))。

【0261】 因此,各靶標之不同密碼子變體經設計及測試。各靶標之不同密碼子變體之設計使用來自 Life Technologies GmbH GeneArt® (Regensburg, Germany)之公開可獲得的軟體(參見 Raab D 等人, *Syst Synth Biol.* 4(3):215-25 (2010))及 Eurofins MWG Operon (Ebersberg, Germany)。另外,以人工地分開地編輯各密碼子進行密碼子最佳化。在最佳化過程期間維持類似於野生型序列之 GC 含量。

【0262】 構築體之評估及選擇藉由使用以下進行之活體外表現來測

定：(i) mRNA 脂質體轉染 HEK293T/17 細胞及(ii) mRNA 電穿孔 K562 細胞。

【0263】 將四萬(40,000)個 HEK293T/17 細胞(ATCC® CRL-11268™)接種在 96 孔盤(VWR International, 目錄號 734-1794)平坦底部之含有 0.5% FBS (Biochrom, 目錄號 S 0115)之 DMEM/高葡萄糖/GlutaMAX™ (Life technologies, 目錄號 31966047)中。將 96 孔盤中接種細胞之在 37°C、7.5%CO₂ 下培育 16 至 18 小時。貼壁 HEK293T/17 細胞用 RNA 使用 Lipofectamine Messenger MAX 試劑(Invitrogen, 目錄號 LMRNA)根據製造商方案藉由以下來轉染：在不含 RNA 酶之 1.5 ml 安全鎖定管 biopur (Eppendorf, Germany, 目錄號 0030121589)中添加 1.2 µl 轉染劑至 20 µl OptiMEM (Thermo Fisher, 目錄號 31985070)；在第二管中，將所指示 RNA 添加至 20 µl OptiMEM。在培育 10 分鐘後，將含有 RNA 之管稀釋至含有 Lipofectamine Messenger MAX 之管中，且在向含有含 HEK293T/17 細胞層之 100 µl 介質之 96 孔盤之一個孔逐滴添加 10 µl RNA-脂質複合物之前，另外培育 5 分鐘。10 µl RNA-脂質複合物分別含有 5 ng、25 ng 及 100 ng 靶標 RNA。在添加另外 140 µl 新鮮介質(DMEM + 0.5% FBS)之前，將盤置放於培養箱中 3 h。將經轉染細胞培育 15 至 18 小時,且如本文所描述，收集上清液並藉由 ELISA 分析蛋白質含量。

【0264】 K562，一種源於慢性骨髓性白血病之人類細胞株(ATCC® CCL-243™)，在補充有 5% FBS 之 RPMI 1640 介質/GlutaMAX™ (Life technologies, 目錄號 61870-044)中培養。如下在 96 孔盤系統中對 K562 進行電穿孔。細胞在 X-VIVO15 介質(龍沙, 目錄號 BE02-060Q)中洗滌一次，且懸浮至 25 萬(250,000)個細胞/150 µl X-VIVO15 之最終濃度。在含有 5 ng、25 ng 或 100 ng RNA 之 96 孔盤之每孔中添加 150 µl 細胞懸浮液。將細胞及 RNA 混合，且在來自 Biorad 之 96 孔 Gene Pulser MX 細胞電穿孔系統(250

V, 1×30 ms 脈衝)中進行電穿孔。緊隨電穿孔，將細胞轉移至具有新鮮介質不含抗生素之新培養盤中，且在 37°C 下在培養箱中靜置 1 小時。將該介質更換為補充有 0.5% FCS 之新鮮 RPMI 1640 GlutaMAX，且培育 15 至 18 小時。如本文所描述，收集上清液且藉由 ELISA 分析蛋白質含量。

【0265】 蛋白質濃度藉由針對編碼細胞介素之 RNA 具有特異性之 ELISA 根據製造商方案來測定。(i)人類 IL-15 sushi/IL-15 sushi $\text{R}\alpha$ 複合物 DuoSet ELISA，(ii)小鼠 IL-12sc DuoSet 發展系統(DY419-05)，(iii)小鼠 GM-CSF DuoSet ELISA 發展系統(DY415)，全部均獲自 RnD systems；及小鼠 $\text{IFN}\alpha$ ELISA 套組(TCM) (PBL assay science, 42120-2)。

【0266】 對於各 mRNA 靶標，評價 wt-序列及不同密碼子最佳化變體之蛋白質表現。考慮自各自用三個不同修飾 RNA 之量測試之脂質體轉染 HEK293T/17 及電穿孔 K562 之兩個資料集，以用於選擇蛋白質編碼序列。若量測到與 WT 序列相比蛋白質表現提高至少 1.5 倍，則選擇為密碼子最佳化序列。若不為此情況，則選擇 WT 序列。對於所有構築體，EarI-限制性序列藉由使 DNA 識別序列(5'-CTCTTC-3')突變同時保留 WT 胺基酸來消除。

【0267】 細胞株：HEK293 (ATCC CRL-1573)細胞株，及人類黑色素瘤細胞株 A101D (ATCC CRL-7798)、A375(ATCC CRL-1619)、A2058 (ATCC CRL-11147)及 Hs294T (ATCC HTB-140)，均獲自 ATCC，且在補充有 10% FBS HI FBS (Life Technologies, 目錄號 10082)之 DMEM (ThermoFisher Scientific, 目錄號 11885-084) 中在 5% CO_2 之加濕環境、 37°C 下培養。

【0268】 mRNA 轉染：細胞使用 Lipofectamine MessengerMAX 試劑 (Invitrogen, 目錄號 LMRNA001)根據製造商方案來轉染。簡言之，對於各孔，0.3 μl 轉染劑用 5 μl Opti-MEM 介質(Life Technologies, 目錄號 31985062)來稀釋，且在室溫下培育 10 min；mRNA 混合物用 Opti-MEM 介質(5 μl /孔)

來稀釋且與稀釋的 MessengerMax 試劑混合，在室溫下培育 5 min，並等分至 96 孔盤中。細胞在完全生長培養基中稀釋，且向轉染混合物添加 40,000 個細胞/孔。細胞在 37°C 下在 CO₂ 培養箱中培育 24 小時，接著收集介質且藉由 Meso Scale Discovery(MSD)分析來測定細胞介素濃度。

【0269】 Meso Scale Discovery 分析：細胞介素濃度使用 MSD 分析來測定：IL12p70 為 Proinflammatory Panel 1 (人類) MSD 套組(目錄號 N05049A-1)，GM-CSF 及 IL-15 sushi 為 Cytokine Panel 1 (人類) MSD 套組(目錄號 N05050A-1)，及 IFN α 為 Human IFN- α 2a 超敏感套組(目錄號 N05050A-1)。資料使用 MSD Discovery Workbench V.4.0.12 軟體及 GraphPad Prism V.6.00 軟體來分析。

【0270】 PBMC 分離及處理：周邊血液單核細胞(PBMC)藉由來自 leukopak (Research Blood Components)之密度梯度介質(Ficoll-Paque)來分離。在 96 孔盤之每孔中添加 600,000 個 PBMC。細胞用細胞介素混合物處理 24 小時，細胞培養基中之 IFN γ 產量使用人類 384-組織培養物 MSD 分析來量測。

【0271】 量測 CD8 反應：帶有 B16F10 腫瘤小鼠接受免疫 mRNA (IFN α 、IL-15 sushi、GM-CSF 及 IL-12sc，ModB)或對照螢光素酶 mRNA (安慰劑)之單一腫瘤內注射。在腫瘤內 mRNA 注射七天後，對腫瘤進行切除，免疫螢光處理，且用 CD8 之抗體(灰色)進行染色。如圖 25 中所展示，CD8 細胞在細胞介素 mRNA 腫瘤內注射之後出現。

【0272】 活體內研究之 mRNA 之製備：藉由在水中混合相等量(微克)mRNA 以 2 $\times$ 期望劑量製備活體內研究之各別 mRNA 混合物。mRNA 混合物冷凍在-80°C 下直至腫瘤內注射之日為止。在注射之日，對 mRNA 進行解凍，且與相等體積之 2 $\times$ 無菌林格氏溶液混合。所得 1 $\times$ mRNA/林格氏溶

液用於腫瘤內注射。

【0273】 基因表現分析：A375 腫瘤在 RLT 緩衝液(Qiagen)中使用 Precellys 24 均質器(Bertin Instruments)來均質化。總 RNA 用 RNeasy-96 套組(Qiagen)之後用 DNA 酶處理之旋轉方案來分離。RNA 用不含核酸酶之水來溶離，且藉由紫外吸光度使用 NanoDrop 8000 (Thermo Scientific)來定量。cDNA 合成用高能力 RNA-cDNA 套組(Applied Biosystems)根據製造商建議來進行。即時 PCR 在 ViiA™7 (Applied Biosystems)上根據標準方案來進行。擴增使用 TaqMan 基因表現基本混合物(Applied Biosystems)及預定 Taqman 分析(Applied Biosystems)來進行。將基因表現標準化為內源性對照 GAPDH。比較 ddCT 方法用於評價基因表現。

表 3

基因	分析 ID	批號	螢光染料
ISG15	Hs01921425_s1	1548867	FAM
ISG54	Hs01922738_s1	1532771	FAM
Mx1	Hs00895608_m1	1539223	FAM
hGAPDH	4326317E	1311049	VIC

實施例 2 - 三種 mRNA 之組合在活體內減小腫瘤體積

【0274】 將編碼 GM-CSF、IL-2 及 IL-12sc 之修飾 mRNA 之混合物注射至帶有 B16F10 腫瘤小鼠中，且監測腫瘤生長至第 41 天。如圖 1 中所展示，腫瘤內注射編碼 GM-CSF、IL-2 及 IL-12sc 之具有 ModA 之三種 mRNA (SEQ ID NO: 32、38 及 56；圖 1A)之組合、或編碼 GM-CSF、IL-2 及 IL-12sc 之具有 ModB 之三種 mRNA (SEQ ID NO: 35、41 及 59；圖 1B)之組合，誘導 6/10 小鼠中之消退，而用編碼螢光素酶之對照 mRNA (ModA)處理的小鼠在 1/10 動物中展示腫瘤消退(圖 1C)。此等資料在類似設計之重複研究中確認(圖 1D 至圖 1G)。在重複實驗中，具有 ModA 或 ModB 之細胞介素 mRNA (GM-CSF、IL-2、IL-12sc)之混合物在 5/9 小鼠中產生腫瘤消退，而用呈 ModA

及 ModB 之對照 mRNA 處理分別地展示 2/9 及 0/9 的腫瘤消退。

【0275】 細胞介素 mRNA 處理之效果在 CT26 腫瘤中來評價。具有所建立 CT26 腫瘤之小鼠注射入編碼 GM-CSF、IL-2 及 IL-12sc 之分別呈 ModA 及 ModB 形式之細胞介素 mRNA 混合物。兩個對照組包括：i) mRNA 林格氏稀釋劑及 ii)編碼螢火蟲螢光素酶之 ModA mRNA。在第 19、21、24、26、28 及 31 天投與總共 6 次腫瘤內注射。如圖 2 中所展示，GM-CSF、IL-2 及 IL-12sc mRNA ModA (SEQ ID NO: 56、32 及 38；圖 2A)及 ModB (SEQ ID NO: 59、35 及 41；圖 2B)兩者分別地在 5/8 及 6/8 小鼠中產生腫瘤消退，而用呈 ModA 之對照 mRNA (圖 2C)或林格氏溶液(圖 2D)處理之腫瘤展示無腫瘤消退。

【0276】 在 CT26 腫瘤模型中，評價編碼 IL-15 sushi、GM-CSF 及 IL-12sc (ModB；SEQ ID NO: 53、59 及 41)與 IL-2、GM-CSF 及 IL-12sc (ModB；SEQ ID NO: 35、59 及 41)之細胞介素 mRNA 混合物的抗腫瘤活性。在腫瘤接種後第 13、15、18、20 及 22 天，腫瘤接受腫瘤內 mRNA 注射。如圖 3 中所展示，腫瘤內注射 IL-2 混合物(圖 3A)或 IL-15 sushi 混合物(圖 3B)分別在 5/10 或 11 帶有腫瘤動物中產生腫瘤消退(圖 3A 及圖 3B)，而在用螢光素酶 mRNA (ModB)注射之對照組中，未觀測到腫瘤消退(圖 3C)。

【0277】 在 B16F10 腫瘤模型中進一步評價 IL-2、IL-12sc 及 GM-CSF (圖 4A-ModA [SEQ ID NO: 32、38 及 56]，圖 4B-ModB [SEQ ID NO: 35、41 及 59])或 IL-15 sushi、IL-12sc 及 GM-CSF 或(圖 4C-ModA [SEQ ID NO: 50、38 及 56]，4D-ModB [SEQ ID NO: 53、41 及 59)之 mRNA 混合物的抗腫瘤活性。具有 B16F10 腫瘤之小鼠在第 11、13、15 及 17 天腫瘤內注射 mRNA。用編碼 IL-15 sushi、IL-12sc、GM-CSF 之細胞介素 mRNA 混合物處理 B16F10 腫瘤分別在呈 ModA 及 ModB 之 3/8 及 4/8 小鼠中產生腫瘤消退。用 IL-2、

IL-12sc 及 GM-CSF 之 mRNA 混合物(ModA 或 ModB)處理腫瘤在 4/8 小鼠中具有腫瘤消退，而用編碼螢光素酶之 ModA 或 ModB mRNA 處理之小鼠中未指示腫瘤消退(圖 4E-ModA，圖 4F-ModB)。

實施例 3 - 四種 mRNA 之組合在活體內減小腫瘤體積

【0278】 接下來，吾人測試向細胞介素 mRNA 混合物添加第四種 mRNA 之效果。帶有 B16F10 腫瘤小鼠接受編碼以下之 ModB 細胞介素 mRNA 混合物之四個腫瘤內注射：i) GM-CSF、IL-2、IL-12sc (SEQ ID NO: 59、35 及 41；圖 5A)，ii) GM-CSF、IL-15 sushi、IL-12sc (SEQ ID NO: 59、53 及 41；圖 5B)及 iii) GM-CSF、IL-15 sushi、IL-12sc、IFN α (SEQ ID NO: 59、53、41 及 47；圖 5C)；且監測腫瘤生長至第 45 天。細胞介素 mRNA 混合物中之每一者在腫瘤內注射 GM-CSF、IL-2 及 IL-12sc 或 GM-CSF、IL-15 sushi 及 IL-12sc 之細胞介素 mRNA 混合物後具有抗腫瘤效果，其中 4/8 腫瘤消退；且 7/8 腫瘤在用 GM-CSF、IL-15 sushi、IL-12sc 及 IFN α 處理後消退。用對照 mRNA (ModB)處理之小鼠不呈現腫瘤消退(圖 5D)。

【0279】 在三個不同鼠類活體內腫瘤模型 CT26、B16F10 及 MC38 中檢查 GM-CSF、IL-2、IL-12sc 及 IFN α 之抗腫瘤活性。帶有腫瘤小鼠接受編碼 IL-2、IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α (SEQ ID NO: 35、41、59 及 47)之 ModB 細胞介素 mRNA 或編碼螢火蟲螢光素酶之對照 ModB mRNA 的 4 至 6 個腫瘤內注射。在各腫瘤模型中評定抗腫瘤活性。用此細胞介素 mRNA 組合處理之小鼠分別在 CT26 (圖 6A)、B16F10 (圖 6C)及 MC38 (圖 6E)模型中具有 4/8、7/8 及 5/5 腫瘤消退。在用螢光素酶 mRNA 處理之比較帶有腫瘤小鼠中未觀測到腫瘤消退(圖 6B [CT26]、圖 6D [B16F10]及圖 6F [MC38])。

【0280】 在 CT26 腫瘤模型中評價編碼 IL-2、IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α (ModB，SEQ ID NO: 35、41、59 及 47)或 IL-15 sushi、IL-12sc、GM-CSF

及 IFN α (ModB, SEQ ID NO: 53、41、59 及 47)中之每一者之四組分細胞介素 mRNA 混合物的抗腫瘤活性。帶有腫瘤小鼠用 6 個腫瘤內注射處理，且監測腫瘤生長。用 IL-2、IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α (圖 7A)與 IL-15 sushi、IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α 兩者(圖 7B)處理分別有效地在 4/8 及 8/8 小鼠中誘導腫瘤消退，而用對照 mRNA (圖 7C)處理之小鼠中未觀測到腫瘤消退。此等資料在類似設計之重複研究(圖 7D 至圖 7F)中確認。

【0281】 進行 CT26 腫瘤模型中之研究，其中個別組分自 IL-15 sushi、IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α (ModB, SEQ ID NO: 53、41、59 及 47)之 mRNA 混合物系統地移除。CT26 腫瘤在接種後第 12、15、19 及 22 天注射細胞介素 mRNA。用編碼 IL-15 sushi、IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α 之 mRNA 之四個注射處理之腫瘤在所有 10 個治療腫瘤中誘導消退(圖 8A)。用以下之 ModB mRNA 混合物處理之腫瘤分別地產生 8/10、6/10、8/10、7/10 之腫瘤消退(圖 8B 至圖 8E): i) IL-15 sushi、IL-12sc 及 IFN α , ii) IL-15 sushi、GM-CSF 及 IFN α , iii) IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α , iv) IL-15 sushi、IL-12sc 及 GM-CSF。用對照 mRNA (ModB)處理之腫瘤未展示腫瘤消退(圖 8F)。為了分析腫瘤生長動力學，計算各處理組直至 33 之平均腫瘤體積(圖 8G)。用 IL-15 sushi、IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α 之混合物處理之小鼠觀測到最小平均腫瘤體積，而在螢光素酶處理動物中觀測到最大平均腫瘤體積。繪製處理組中之每一者之至第 19 天的腫瘤生長壓制 T/C (基於平均腫瘤體積之腫瘤/對照) (圖 8H)。IL-15 sushi、IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α 之四組分混合物呈現最大 T/C。

【0282】 類似於展示於圖 8 中之研究，進行將個別組分自 IL-2、IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α (ModB; SEQ ID NO: 35、41、59 及 47)之 mRNA 混合物系統地移除的研究。CT26 腫瘤在第 19、21、23、26、28 及 30 天接

受 6 個腫瘤內 mRNA 注射。用 IL-2、IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α 之細胞介素 mRNA 混合物之處理在 4/10 動物中產生腫瘤消退，在 4 隻動物中產生完成腫瘤消退，且在 40 天後在兩個個體中使疾病穩定(圖 9A)。用以下之 ModB 3-組分 mRNA 混合物處理之腫瘤分別地產生 2、3、3 及 4 個腫瘤之消退(圖 9B 至圖 9E): i) IL-2、IL-12sc 及 IFN α , ii) IL-2、GM-CSF 及 IFN α , iii) IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α 及 iv) IL-12sc、GM-CSF 及 IL-2；用對照螢光素酶 mRNA 處理之 CT26 腫瘤展示無腫瘤消退(圖 9F)。

【0283】 為了分析腫瘤生長動力學，計算各處理組直至 36 天之平均腫瘤體積。在用 IL-2、IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α 之混合物處理之小鼠中觀測到最小平均腫瘤體積，而在螢光素酶處理之動物中觀測到最大平均腫瘤體積(圖 10A)。繪製處理組中之每一者至 30 天之腫瘤生長壓制 T/C (基於平均腫瘤體積之腫瘤/對照) (圖 10B)。IL-2、IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α 之四組分混合物呈現最大 T/C。

【0284】 圖 9 中之由不同細胞介素 mRNA 混合物之抗腫瘤反應進一步如下進行分析：計算六個處理組中之每一者中之所有小鼠的腫瘤體積改變(ΔV)，該腫瘤體積改變如藉由實驗結束或終止時(V_t)之量測與實驗開始時(V_b)之量測之間的腫瘤體積差異 ($\Delta V = V_t - V_b$)所定義，該等小鼠包括用 4 組分細胞介素 mRNA 混合物(IL-2、IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α)處理的小鼠、用缺少四種細胞介素中之一者之 3 組分混合物處理的小鼠及用對照螢光素酶 mRNA 處理的小鼠。計算對照螢光素酶組之修整資料(移除初始資料之上下 10%)對於腫瘤體積改變的平均(μ)及標準差(σ)，且此修整資料之 Shapiro-Wilk 常態測試展示其大致遵循常態分佈。接著，計算來自所有處理組之各個別小鼠之腫瘤體積改變資料的 Z 分值($Z = (\Delta V - \mu)/\sigma$)。計算各腫瘤體積改變值與對照組之修整平均之間的比率(R) ($R = \Delta V/\mu$)。鑒於定義，吾

人將 Z 分値視為「腫瘤體積減少之顯著性」，及 R 視為「腫瘤體積減少之程度」。為了鑑別展示顯著小於對照螢光素酶組之腫瘤體積增加(換言之，與對照組相比「顯著腫瘤減少」)之小鼠，應用 $Z \leq -1.645$ ($p(Z \leq -1.645) = 0.05$)及 $R \leq 0.15$ 的截止值。結果展示，各處理組具有顯著地小於對照組之腫瘤體積增加之小鼠數目如下：i) IL-2、IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α (ModB) 之細胞介素 mRNA 混合物為 6/8 小鼠，ii) IL-2、GM-CSF 及 IFN α (ModB) 為 2/8 小鼠，iii) IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α 與 IL-2、IL-12sc 及 IFN α 為 3/8，及 iv)用 IL-2、IL-12sc 及 GM-CSF (ModB)之細胞介素 mRNA 混合物處理的為 4/8 小鼠(圖 11)。

【0285】 雌性 C57BL/6J 小鼠如上文所描述植入 B16F10 細胞。小鼠在第 11、15、19 及 23 天用 ModB 細胞介素 mRNA 混合物(IL-15 sushi、IL-12sc、GM-CSF、IFN α)或對照螢光素酶 mRNA 的 4 個腫瘤內注射(8 μ g mRNA/2 μ g(靶標)處理。用細胞介素 mRNA 之 4 組分混合物處理在 6/10 處理小鼠中產生腫瘤排斥。參見圖 24B。相比而言，在用單一 mRNA 處理之任一組中未觀測到無腫瘤的小鼠(圖 24C 至圖 24F)。IL-15 sushi、IL-12sc、GM-CSF、IFN α 之組合引起總存活率增加，其中在第 70 天 60%之小鼠無腫瘤；而用單一細胞介素 mRNA 處理之小鼠之所有腫瘤進行至動物需要安樂死的階段(圖 24G)。螢光素酶對照展示於圖 24A 中。

實施例 4 - 細胞介素 mRNA 保護免於腫瘤再刺激

【0286】 為了評價細胞介素 mRNA 混合物對於發展免疫記憶之效果，進行再刺激實驗。簡言之，帶有 B16F10 腫瘤小鼠用 IL-15sushi、IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α (Mod B；SEQ ID NO: 53、41、59.及 47)之細胞介素 mRNA 混合物處理。一部分細胞介素 mRNA 處理 B16F10 腫瘤完全消退，從而產生無腫瘤的動物。接著，此等無腫瘤的動物用 B16F10 細胞再刺激作為評定

自適應免疫記憶之方法，且 9 隻原生小鼠植入 B16F10 腫瘤細胞作為腫瘤移植之陽性對照(圖 12A)。所有 9 隻移植有 B16F10 細胞之原生小鼠均發展腫瘤，而所有八隻無腫瘤小鼠均排斥 B16F10 細胞且不呈現 B16F10 腫瘤生長(圖 12B)。一部分先前用細胞介素 mRNA 處理之小鼠在腫瘤之初始位點處發展局部白斑病(圖 12C)。此實驗基本上經重複，且結果展示於圖 33 中。

【0287】 為了評價細胞介素 mRNA 混合物對於發展免疫記憶之效果，使用 CT26 腫瘤模型進行再刺激實驗。因此，帶有 CT26 腫瘤小鼠用 IL-15sushi、IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α (Mod B；SEQ ID NO: 53、41、59 及 47)之細胞介素 mRNA 混合物處理。一部分細胞介素 mRNA 處理 CT26 腫瘤完全消退，從而產生無腫瘤的動物。接著，三個無腫瘤的動物用 CT26 腫瘤細胞再刺激，且接著三個無腫瘤的動物用其中基因剔除 gp70 抗原決定基(CT26- Δ gp70)的 CT26 腫瘤細胞再刺激。分別地 9 及 10 隻原生小鼠植入有 CT26 腫瘤細胞及作為腫瘤移植之陽性對照的 CT26- Δ gp70。在腫瘤接種後第 21 天，移植有 CT26 腫瘤細胞之 8/9 原生小鼠發展腫瘤，且移植有 CT26- Δ gp70 腫瘤細胞之所有 10 隻原生小鼠均發展腫瘤，而各組中之所有三隻無腫瘤小鼠均排斥 CT26 及 CT26- Δ gp70 細胞，且分別地不呈現 CT26 腫瘤及 CT26- Δ gp70 之生長(圖 12D)。此實驗展示，CT26 腫瘤模型中之細胞介素 mRNA 注射後免疫記憶不限於針對免疫顯性抗原決定基 gp70 具有特異性之 T 細胞。

實施例 5 - 細胞介素 mRNA 之全身性抗腫瘤活性

【0288】 為了評價局部腫瘤內細胞介素 mRNA 發揮全身性抗腫瘤反應之能力，小鼠在左及右側腹上移植 B16F10 腫瘤細胞(圖 13A)。帶有雙側 B16F10 腫瘤之小鼠接受編碼螢光素酶之對照 mRNA 或編碼 IL-15 sushi、IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α (ModB；SEQ ID NO: 53、41、59 及 47)之細胞介

素 mRNA 混合物的四個腫瘤內注射。右側腫瘤注射三個不同劑量(80 μg 、8 μg 及 0.8 μg mRNA，其對應於 20 μg 、2 μg 及 0.2 μg mRNA/靶標)下之 mRNA，而左側腹上之腫瘤未經處理。在注射(圖 13B)及未注射(圖 13C)腫瘤兩者中均觀測到劑量依賴性抗腫瘤活性，其中腫瘤生長抑制範圍介於未注射腫瘤中之 88%至注射腫瘤中之 96%。用細胞介素 mRNA 處理之組與用螢光素酶對照 mRNA (圖 13D)處理之組相比增加中值存活率。

【0289】 為了進一步評價局部腫瘤內細胞介素 mRNA 發揮全身性抗腫瘤反應之能力，小鼠在右側腹上移植 B16F10 腫瘤細胞，且接受表現螢光素酶之 B16F10 細胞之 IV 注射以在肺中誘導腫瘤(圖 19A)。在 SC 腫瘤植入後第 11、14 及 18 天，帶有 B16F10 腫瘤之小鼠接受將 IL-15 sushi、IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α (ModB；SEQ ID NO: 53、41、59 及 47)之細胞介素 mRNA 混合物總計三個腫瘤內注射至僅側腹腫瘤中，而肺中之腫瘤未經處理。對照組接受等量之不含任何編碼序列之對照 mRNA 的腫瘤內注射。在第 20 天犧牲小鼠以用於端點分析，此時取出肺且稱重。圖 19B 展示四個動物之例示性生物發光量測及因此取出以觀察暗腫瘤節點之肺的圖像。SC 腫瘤之腫瘤生長強烈地受注射細胞介素 mRNA 混合物抑制，而注射有對照 mRNA 之腫瘤如圖 19C 中所描繪漸進地生長，該圖展示各組中 15 隻小鼠之平均腫瘤體積。當與用對照 mRNA 處理之動物相比時，肺腫瘤生長在於 SC 腫瘤中接受腫瘤內細胞介素 mRNA 注射之動物中受到抑制；圖 19D 展示每組所有 15 隻動物在第 20 天之生物發光量測總通量分析，其與腫瘤負荷相關，此係歸因於表現螢光素酶之腫瘤細胞；線指示中值，且星號指示藉由 T-測試分析之 $p < 0.05$ 。另外，用細胞介素 mRNA 處理之動物之肺已顯著地較小重量(圖 19E，線指示中值)。用對照 RNA 處理之動物肺重量較高係由於較高腫瘤負荷所致。

實施例 6 - 人類細胞介素 mRNA

【0290】 為了評價人類細胞介素 mRNA 之活體外表現，將編碼人類細胞介素 IL-15 sushi、IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α 2b (SEQ ID NO: 26、18、29 及 23) (ModB) 之 mRNA 混合物轉染至 HEK293 細胞株以及四個黑色素瘤腫瘤細胞株(A375、A101D、A2058 及 Hs294T)中(圖 14A)。在五個人類細胞株組中，細胞介素 mRNA 混合物呈現劑量依賴性表現及分泌(圖 14B 至圖 14F)。

【0291】 IL-15 sushi、IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α 2b 之人類 mRNA 混合物之藥效動力學效果用人類周邊血液單核細胞(PBMC)在活體外來評價。簡而言之，將 IL-15 sushi、IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α 2b (ModB)之人類細胞介素 mRNA 混合物，或編碼 IL-12sc、IFN α 2b、IL-15 sushi 或 GM-CSF (ModB)之個別細胞介素 mRNA 轉染在 HEK293 細胞中，且在 24 小時時收集條件培養基，稀釋且添加至人類 PBMC (圖 15A)。用 IL-15 sushi、IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α 2b 之細胞介素 mRNA 混合物處理之 6 個供體的中值 IFN γ 位準為 5623 pg/mL，而用 IL-12sc、IFN α 2b、IL-15 sushi 或 GM-CSF 之個別細胞介素 mRNA 的處理分別地誘導 534、67、17 及 4 pg/mL 的中值 IFN γ 位準(圖 15B)。

【0292】 在 A375 人類黑色素瘤異種移植中監測 IL-15 sushi、IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α 2b (ModB)與 IL-2、IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α 2b (ModB)之人類細胞介素 mRNA 混合物的活體內表現。帶有腫瘤小鼠接受細胞介素 mRNA 之單一注射，且在 mRNA 注射後 2 小時、4 小時、8 小時、24 小時、48 小時及 72 小時時收集腫瘤樣本。製備腫瘤分解物，且評價個別人類細胞介素 IFN α 2b (圖 16A)、IL-2 (圖 16B)、IL-12sc (圖 16C)、IL-15 sushi (圖 16D)、GM-CSF (圖 16E)之表現。

【0293】 個別細胞介素中之每一者觀測到時間依賴性表現，其中 IL-15 sushi、IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α 2b (表 4)與 IL-2、IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α 2b (表 5)之混合物之 2 小時與 8 小時之間出現最大濃度(Cmax)。

表 4：IL-15 sushi 混合物之藥物代謝動力學結果

腫瘤	GM-CSF	IFN α 2b	IL-12sc	IL-15sushi
t _{1/2} (小時)	12.4	9.59	15.2	10.2
Tmax (小時)	4	4	8	4
Cmax (pg/mg)	1591	4862	3767	2639

表 5：IL-2 混合物之藥物代謝動力學結果

腫瘤	GM-CSF	IFN α 2b	IL-12sc	IL-2
t _{1/2} (小時)	14.8	10.2	15.5	12.8
Tmax (小時)	2	2	8	2
Cmax (pg/mg)	2487	10685	4961	4274

【0294】 在 A375 腫瘤中在 mRNA 注射 IL-15 sushi、IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α 2b (ModB)與 IL-2、IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α 2b (ModB)之細胞介素 mRNA 混合物後 2 h、4 h、8 h、24 h、48 h 及 72 h，監測人類干擾素 α 基因 ISG15、ISG54 及 MX1 之誘導作為藥物效應動力學標記。與對照處理之腫瘤相比，用細胞介素 mRNA 處理之 A375 腫瘤展示大於 100 倍的 ISG15 (圖 17A)、ISG54 (圖 17B)及 MX1 (圖 17C)的誘導，其中峰值誘導發生在腫瘤內 mRNA 注射 8 小時後。

實施例 7 - 干擾素效果

【0295】 帶有 B16F10 腫瘤小鼠接受編碼以下之 ModA (「標準」)細胞介素 mRNA 之腫瘤內注射：IL-2、Flt3 配位體(FLT3L)、41BBL (亦稱為 CD137L 或腫瘤壞死因子超家族成員 9)及 CD27L-CD40L (此包含 CD27L (亦稱為 CD70)之可溶域與 CD40L 之融合蛋白質，CD27L 及 CD40L 兩者由

CD27L 或 CD40L 之全部均由 GS-連接子序列 (圖 18A, SEQ ID NO: 32、62、68 及 74) 分隔之三個可溶域組成；或接受編碼 IL-2、FLT3L、41BBL 及 CD27L-CD40L (圖 18B、SEQ ID NO: 35、65、71 及 77) 之 ModB (「修飾」) 細胞介素 mRNA 的腫瘤內注射。另外，分別地將編碼 IFN α (SEQ ID NO: 44) 之 ModA mRNA 或編碼 IFN α (SEQ ID NO: 47) 之 ModB mRNA 添加至 ModA 或 ModB mRNA 混合物。(圖 18D 及圖 18E) 評定抗腫瘤活性。

【0296】 用此 ModA mRNA 組合處理之小鼠在不含 IFN α 之情況下具有 4/9 小鼠無腫瘤(圖 18B)，及含 IFN α 之情況下具有 3/9 小鼠無腫瘤(圖 18D)。因此，當 mRNA 以 ModA 形式給藥時，用 IFN α mRNA 之處理似乎不增加對細胞介素之反應。

【0297】 相比之下，用 ModB mRNA 組合處理之小鼠在不含 IFN α 之情況下具有 1/9 小鼠無腫瘤(圖 18C)，且在含 IFN α 之情況下具有 7/9 小鼠無腫瘤(圖 18E)。因此，當 mRNA 以 ModB 形式給藥時，用 IFN α mRNA 之處理增加對於細胞介素之混合物的反應。

實施例 8 - 與抗體組合之細胞介素 mRNA

【0298】 為了評價與全身性投與抗體組合之腫瘤內注射細胞介素 mRNA 之效果，小鼠在左及右側腹兩者上移植 B16F10 或 MC38 腫瘤細胞。小鼠在第 11、15、19、23 天接受用 IL-15 sushi、IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α (ModB；SEQ ID NO: 53、41、59 及 47) 之細胞介素 mRNA 混合物至僅側腹腫瘤中之一者中的四個腫瘤內注射，而使其他側腹腫瘤未經處理。小鼠在第 10、13、16、19、22、25 天亦接受腹膜內注射抗 PD1 抗體(大鼠 IgG2a 抗小鼠 PD-1 純系 RMP1-14 之 Sanofi 鼠化型式，5 mg/kg)。分組如下：1) 對照 mRNA (80 μ g 總 mRNA；在 1.6 mg/mL 下 50 μ L 腫瘤內注射)+對照同型抗體(純系 MOPC-21 (BioLegend)；5 mg/kg)；2)對照 mRNA+抗 PD1 抗體；

3)細胞介素 mRNA+對照同型抗體；以及 4)細胞介素 mRNA+抗 PD1。在 B16F10 (圖 20A)及 MC38 (圖 20B)腫瘤模型兩者中監測總存活率。在兩個腫瘤模型中，用細胞介素 mRNA 與抗 PD-1 處理之組合觀測到最高總存活率，其中 60%之帶有 B16F10 小鼠及 80%之帶有 MC38 小鼠在研究結束時無腫瘤。在 B16F10 腫瘤模型中，10%之單獨用抗 PD-1 或細胞介素 mRNA 處理之小鼠無腫瘤；而在 MC38 模型中，40%之用抗 PD-1 處理之小鼠及 30%之單獨用細胞介素處理之小鼠無腫瘤。結果指示與細胞介素 mRNA 與 PD-1 組合相關聯的強力抗腫瘤活性。

【0299】 為了進一步評價與 PD-1 抗體組合之局部腫瘤內細胞介素 mRNA 發揮全身性抗腫瘤反應之能力，小鼠在右側腹上移植 B16F10 腫瘤細胞，且在一天後接受 IV 注射表現螢光素酶之 B16F10 細胞以誘導肺癌轉移。在 IV 腫瘤植入後第 11、14 及 17 天，帶有 B16F10 腫瘤小鼠接受用 IL-15 sushi、IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α (ModB；SEQ ID NO: 53、41、59 及 47) 之細胞介素 mRNA 混合物僅至側腹腫瘤中的總計三個腫瘤內注射，而肺中之腫瘤未經處理。在同一天，小鼠亦接受腹膜內(IP)注射 PD-1 抗體(大鼠 IgG2a 抗小鼠 PD-1 純系 RMP1-14 之 Sanofi 鼠化型式，10 mg/kg)。分組如下：1)對照 mRNA (40 μ g 總 mRNA；50 μ L 腫瘤內注射之對照同型抗體(純系 MOPC-21 (BioLegend)；10 mg/kg) (圖 20C)；2)對照 mRNA+抗 PD1 抗體 (圖 20D)；3)細胞介素 mRNA+對照同型抗體(圖 20E)；以及 4)細胞介素 mRNA+抗 PD1 (圖 20F)。監測 SC 腫瘤之腫瘤生長(圖 20C 至圖 20F)以及存活率(圖 20G)。此模型中之總存活率藉由腫瘤負荷來測定，此係歸因於 SC 腫瘤以及肺假癌轉移腫瘤(此圖中未展示)；在一些小鼠中，排斥 SC 腫瘤，而肺癌轉移漸進地生長。細胞介素 mRNA 與抗 PD-1 處理之組合中觀測到最高總存活率。6-7%之單獨用細胞介素 mRNA 處理之小鼠無腫瘤，而接受

單獨抗 PD-1 或對照 mRNA+同型抗體之小鼠在第 22 天歸因於高腫瘤負荷而全部犧牲。結果指示，在此具有肺假癌轉移之 B16F10 腫瘤模型中與細胞介素 mRNA 與 PD-1 組合相關聯的強力抗腫瘤活性，而單獨抗 PD-1 抗體不展示任何抗腫瘤活性。

【0300】 為了進一步評價與全身性投與抗體組合之腫瘤內注射細胞介素 mRNA 之效果，小鼠在右側腹上移植 CT26 腫瘤細胞。小鼠在腫瘤接種後第 11、14、18 及 21 天接受 IL-15 sushi、IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α (ModB；SEQ ID NO: 53、41、59 及 47)之細胞介素 mRNA 混合物的四個腫瘤內注射。在同一天，小鼠亦接受腹膜內(IP)注射抗 CTLA-4 抗體(100 μ g/200 μ L/小鼠；來自 InVivoMAb 之純系 9H10)或同型對照抗體(100 μ g/200 μ L/小鼠；來自 BioXCell 之亞美尼亞倉鼠 IgG)。分組如下：1)細胞介素 mRNA+抗 CTLA-4 抗體(圖 21A)；2)細胞介素 mRNA+同型對照抗體(圖 21B)；3)對照 mRNA+抗 CTLA-4 抗體(圖 21C)及 4)對照 mRNA+同型對照抗體(圖 21D)。腫瘤內細胞介素 mRNA 與 IP 注射抗 CTLA-4 之組合療法產生最強抗腫瘤活性，其中在腫瘤接種後第 55 天 12/16 小鼠為無腫瘤小鼠(圖 21A)。用細胞介素 mRNA+同型對照抗體(圖 21B)或對照 mRNA+抗 CTLA-4 抗體(圖 21C)之處理誘導較低抗腫瘤活性，其中分別地在研究結束時為 5 及 7 隻無腫瘤小鼠。相比而言，在接受對照 mRNA+同型對照抗體(圖 21D)之組中，在研究結束時僅保持一隻無腫瘤小鼠。

【0301】 為了進一步評價與抗 CTLA-4 抗體組合之腫瘤內注射細胞介素 mRNA 之效果，小鼠在右側腹上移植 B16F10 腫瘤細胞。小鼠在腫瘤接種後第 13、17 及 20 天接受 IL-15 sushi、IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α (ModB；SEQ ID NO: 53、41、59 及 47)之細胞介素 mRNA 混合物的三個腫瘤內注射。在腫瘤接種後第 13、17、20 及 24 天，小鼠亦接受腹膜內(IP)注射抗 CTLA-4

抗體(100 µg/200 µL/小鼠；來自 InVivoMAb 之純系 9H10)或同型對照抗體(100 µg/200 µL/小鼠；來自 BioXCell 之亞美尼亞倉鼠 IgG)。監測 SC 腫瘤之腫瘤生長以及存活率。分組如下：1)細胞介素 mRNA+抗 CTLA-4 抗體(圖 21E)；2)細胞介素 mRNA+同型對照抗體(圖 21F)；3)對照 mRNA+抗 CTLA-4 抗體(圖 21G)及 4)對照 mRNA+同型對照抗體(圖 21H)。腫瘤內細胞介素 mRNA 與 IP 注射抗 CTLA-4 之組合療法產生最強抗腫瘤活性，其中在腫瘤接種後第 60 天 6/9 小鼠為無腫瘤小鼠(圖 21E)。用細胞介素 mRNA+同型對照抗體(圖 21F)之處理誘導較低抗腫瘤活性，其中 2/9 小鼠為無腫瘤小鼠。相比而言，在接受對照 mRNA+抗 CTLA-4 抗體(圖 21G)或對照 mRNA+同型對照抗體(圖 21H)之兩個組中，在研究結束時未保持有無腫瘤小鼠。百分比存活率描繪於圖 21I 中，展示細胞介素 mRNA 與抗 CTLA-4 處理之組合之最高總存活率，其中在研究結束(第 70 天)時 67%之小鼠帶有腫瘤，而 33%之單獨用細胞介素 mRNA 處理之小鼠無腫瘤。結果指示在此 B16F10 腫瘤模型中與單獨細胞介素 mRNA 及細胞介素 mRNA 與抗 CTLA-4 抗體相關聯的強力抗腫瘤活性，其中單獨抗 CTLA-4 抗體不展示任何抗腫瘤活性。

實施例 9 - 在多種癌症類型中之 mRNA 細胞介素注射

【0302】 為了評價在各種癌症類型中腫瘤內注射細胞介素 mRNA 之效果，如實施例 1 中所描述測試五種異種移植小鼠模型：KM12 (CRC)、RPMI8226 (骨髓瘤)、NCI-N87 (胃癌)、A375 (黑色素瘤)及 NCI-H1975 (NSCLC)。帶有 KM12 (CRC)、RPMI8226 (骨髓瘤)、NCI-N87 (胃癌)、A375 (黑色素瘤)及 NCI-H1975 (NSCLC)腫瘤之小鼠接受 IL-15 sushi、IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α (ModB；SEQ ID NO: 26、18、29 及 23)之 8 µg (2 µg/靶標)人類細胞介素 mRNA 混合物的單一腫瘤內注射，且在 24 小時評定腫瘤中之所編碼細胞介素。偵測所有五種異種移植模型中之 IL-15 sushi (圖 22D)、

IL-12sc (圖 22A)、GM-CSF (圖 22C)及 IFN α (圖 22B)之 4 種細胞介素中之每一者之表現，其中最高細胞介素位準在 NCI-H1975 中觀測到，其後為 A375、NCI-N87、RPMI8226 及 KM12。

實施例 10 - 細胞介素在腫瘤內 mRNA 細胞介素注射後之劑量依賴性血清表現

【0303】 不同腫瘤內 mRNA 劑量對於所編碼細胞介素之表現之效果在右側腹上移植單一 A375 腫瘤之小鼠血清中檢查。小鼠接受單一腫瘤內注射人類 IL-15 sushi、IL-12sc、GM-CSF 及 IFN α (ModB ; SEQ ID NO: 26、18、29 及 23)之細胞介素 mRNA 混合物。在腫瘤內 mRNA 注射後 6 小時，收集血清，且藉由 Meso Scale Discovery 分析來分析細胞介素表現。在 80 μ g (20 μ g)之最高劑量至 0.0256 μ g (0.0064 μ g)之最低劑量之血清中觀測編碼細胞介素之 mRNA 中之每一者之劑量依賴性表現。結果展示於圖 23A 至圖 23D 中。

實施例 11 - 細胞介素 mRNA 引起 gp70+ CD8 T 細胞之擴增

【0304】 在一個側腹上帶有單一 CT26 腫瘤之小鼠接受 IL-15 sushi、GM-CSF、IFN α 及 IL-12sc (ModB ; SEQ ID NO: 53、41、59 及 47)之細胞介素 mRNA 混合物之四個腫瘤內注射。在第一次腫瘤內 mRNA 投與後 13 天收集血液，且針對 gp70 腫瘤抗原具有特異性之 T 細胞藉由流式細胞測量術定量。與接受對照 RNA 之小鼠相比，血液中之針對 gp70 腫瘤抗原具有特異性之 T 細胞之頻率在腫瘤內注射 mRNA 細胞介素後的小鼠中急劇增加。

實施例 12 - 細胞介素 mRNA 誘導多種促炎性路徑且增加處理及未處理腫瘤兩者中之免疫浸潤。

【0305】 在左及右側腹上帶有 B16F10 腫瘤之小鼠接受至右側腫瘤中之單一腫瘤內注射 80 μ g mRNA (20 μ g/靶標)，其以 0.5×10^6 個細胞開始

(經處理的)，而以 0.25×10^6 個細胞開始之腫瘤保持未處理。在腫瘤內注射 mRNA 後七天，收集兩個腫瘤，且分離 RNA 並將其進行 RNA 定序分析。如圖 27A 至圖 27C 中所展示，用 IL-15 sushi、GM-CSF、IFN α 及 IL-12sc (SEQ ID NO: 59、53、41 及 47) 之細胞介素 mRNA 混合物之處理上調多種促炎性路徑，包括一系列 IFN γ 反應基因。促炎性/IFN γ 相關路徑之上調存在於經處理及未處理腫瘤兩者中，從而支撐局部腫瘤內處理具有全身性免疫調節效果的概念。

【0306】 對 3298 基因(其在細胞介素 mRNA 處理與對照之間差異表現(1699 上調及 1599 下調))於注射側腹中及 4973 基因(2546 上調及 2427 下調)於未注射側腹中進行因果網狀分析(Ingenuity pathway analysis 工具之一部分)，以鑑別可闡明所觀測之基因表現改變的信號傳導路徑的改變。計算 Z 分值以指示路徑之改變，其中記分之正負號指示改變之方向(正號表明活化，而負號表明抑制)。

【0307】 對於由 IFNG 調節(295 上調及 33 下調)之 328 基因之表現在對照及細胞介素 mRNA 處理樣本中在注射及未注射腫瘤兩者中進行層級聚類。樣本中之各基因之表現進行 z 分值標準化。類似性度量係基於皮爾森相關係數(Pearson's correlation coefficient)，且完全連接用於產生樹枝狀圖。參見表 6。

【0308】 浸潤免疫細胞之相對豐度藉由計算免疫細胞類型特異性基因標籤之平均表現來測定

【0309】 表6

基因	IFNG 調節	經處理 細胞介素 mRNA 混合物/IgG1 相對 於 Luc mRNA/IgG1.倍數 改變	經處理 細胞介素 mRNA 混合物/IgG1 相比 於 Luc mRNA/IgG1.原始 P 值	經處理 細胞介素 mRNA 混合物/IgG1 相比 於 Luc mRNA/IgG1.FDR BH	未經處理細胞介素 mRNA 混合物 /IgG1 相比於 Luc mRNA/IgG1.倍數 改變	未經處理細胞介素 mRNA 混合物 /IgG1 相比於 Luc mRNA/IgG1.原始 P 值	未經處理細胞介素 mRNA 混合物 /IgG1 相比於 Luc mRNA/IgG1.FDR BH
ABII	活化	1.6776	0.0073	0.0995	1.5218	0.0354	0.1551
ACOD1	活化	31.6293	3.9652E-06	0.0024	6.1017	0.0096	0.0911
ADGRG2	活化	1.8174	0.0248	0.2076	1.3902	0.2293	0.4662
ADORA2B	活化	2.9657	0.0044	0.0752	1.4261	0.352	0.6138
AIF1	活化	6.0406	0.0005	0.0201	4.7598	0.0032	0.057
AIM2	活化	9.9707	0.000085324	0.0086	3.4835	0.0276	0.1361
ANGPTL4	活化	2.0707	0.0293	0.2265	2.0904	0.0368	0.1586
APOL6	活化	10.3994	0.0017	0.0418	10.1341	0.0031	0.0564
APP	活化	2.0312	0.0006	0.0238	2.2382	0.0003	0.0276
ARFGAP3	活化	1.6535	0.0146	0.1517	1.0201	0.9237	1
ASS1	活化	3.5414	0.0084	0.1093	-1.0202	0.9668	1
ATF3	活化	5.5284	0.0006	0.0231	-1.1007	0.8409	1
B2M	活化	4.7005	0.000092097	0.0089	2.7946	0.0085	0.0859
BACH1	活化	2.2944	0.0098	0.1179	1.3281	0.3821	0.6482
BATF2	活化	4.0479	0.0211	0.1885	1.6468	0.4201	0.6889
BCL2L11	活化	4.2973	0.0057	0.0868	1.1465	0.7946	1
BCL3	活化	4.4411	0.0167	0.1639	2.5676	0.1413	0.3455
BLNK	活化	4.2753	0.0003	0.0158	3.2008	0.0044	0.0643
BST1	活化	16.9081	1.3371E-06	0.0016	6.6164	0.0007	0.0334
BTG1	活化	3.5307	0.0001	0.0102	-1.1775	0.5968	0.8607

基因	IFNG 調節	經處理 細胞介素 mRNA 混合物/IgG1 相對於 Luc mRNA/IgG1.倍數 改變	經處理 細胞介素 mRNA 混合物/IgG1 相比 於 Luc mRNA/IgG1.原始 P 值	經處理 細胞介素 mRNA 混合物/IgG1 相比 於 Luc mRNA/IgG1.FDR BH	未經處理細胞介素 mRNA 混合物 /IgG1 相比於 Luc mRNA/IgG1.倍數 改變	未經處理細胞介素 mRNA 混合物 /IgG1 相比於 Luc mRNA/IgG1.原始 P 值	未經處理細胞介素 mRNA 混合物 /IgG1 相比於 Luc mRNA/IgG1.FDR BH
C1QA	活化	5.3999	0.0029	0.0588	1.3506	0.5911	0.8558
C1QB	活化	5.955	0.0104	0.1219	3.531	0.0786	0.2408
C1QC	活化	6.2282	0.0009	0.0307	2.7013	0.0707	0.2284
C2	活化	2.2866	0.0367	0.2598	2.5908	0.0242	0.1281
C3	活化	10.2057	0.0043	0.0734	11.6428	0.0044	0.0648
C4B	活化	3.3143	0.0154	0.1562	1.3973	0.5045	0.7768
C5AR1	活化	6.4343	0.000061281	0.0074	1.8122	0.1729	0.3925
CAMK4	活化	2.5261	0.0011	0.0335	2.0726	0.012	0.1009
CASP1	活化	8.2891	0.0079	0.1049	6.7759	0.0214	0.1263
CASP4	活化	3.9281	0.0015	0.0389	1.2492	0.5969	0.8608
CCL11	活化	6.225	0.0028	0.0579	9.5207	0.0007	0.0334
CCL17	活化	3.9738	0.0268	0.2146	3.0432	0.0868	0.2549
CCL2	活化	5.0444	0.0331	0.2446	1.9159	0.4045	0.6716
CCL22	活化	5.4223	0.000050981	0.0069	3.6151	0.002	0.0467
CCL3	活化	8.2215	0.0007	0.0259	4.7966	0.0129	0.1045
CCL4	活化	8.7234	0.0008	0.0287	2.8285	0.1042	0.2846
CCL5	活化	19.1375	0.000004935	0.0027	9.4224	0.0004	0.0299
CCL7	活化	4.7053	0.0068	0.0952	-1.2497	0.6964	0.9457
CCL8	活化	9.3589	0.0113	0.1283	3.9524	0.1286	0.3243
CCR1	活化	5.333	0.0012	0.0349	1.7221	0.2823	0.5325
CCR2	活化	5.8007	0.0025	0.0546	2.1931	0.1766	0.3975
CCR5	活化	10.8409	0.000010504	0.004	4.8697	0.0025	0.0512

基因	IFNG 調節	經處理 細胞介素 mRNA 混合物/IgG1 相對 於 Luc mRNA/IgG1.倍數 改變	經處理 細胞介素 mRNA 混合物/IgG1 相比 於 Luc mRNA/IgG1.原始 P 值	經處理 細胞介素 mRNA 混合物/IgG1 相比 於 Luc mRNA/IgG1.FDR BH	未經處理細胞介素 mRNA 混合物 /IgG1 相比於 Luc mRNA/IgG1.倍數 改變	未經處理細胞介素 mRNA 混合物 /IgG1 相比於 Luc mRNA/IgG1.原始 P 值	未經處理細胞介素 mRNA 混合物 /IgG1 相比於 Luc mRNA/IgG1.FDR BH
CCRL2	活化	3.9822	0.002	0.0465	3.6428	0.0056	0.071
CD14	活化	5.6413	0.0025	0.0546	1.413	0.5406	0.8104
CD2	活化	13.539	0.0001	0.0095	5.0981	0.0138	0.1086
CD274	活化	11.0684	0.000096803	0.0091	3.4411	0.038	0.1616
CD38	活化	5.5697	0.0005	0.0212	1.4645	0.4221	0.6908
CD40	活化	11.0285	0.0003	0.0158	1.2537	0.7201	0.9637
CD40LG	活化	3.1168	0.0068	0.0952	1.1976	0.6673	0.9224
CD68	活化	6.1325	0.000040468	0.0063	3.6801	0.0029	0.0544
CD74	活化	30.4664	0.000057089	0.0072	5.9291	0.0291	0.1392
CD80	活化	4.1003	0.0005	0.0217	3.5579	0.0026	0.0517
CD86	活化	6.3927	0.0008	0.027	8.2257	0.0004	0.0289
CDKN2A	活化	1.9017	0.0117	0.1312	-1.2679	0.3579	0.6202
CEBPB	活化	4.4389	0.0007	0.0253	2.1429	0.0784	0.2404
CELSR1	活化	1.6953	0.0001	0.0107	1.1455	0.3001	0.5534
CERS6	活化	2.2538	0.0064	0.0927	1.717	0.0763	0.2363
CFB	活化	9.003	0.0001	0.0109	6.2886	0.0018	0.0444
CH25H	活化	4.3757	0.007	0.097	1.9042	0.2435	0.4858
CHRNE	活化	1.6587	0.0293	0.2263	1.0536	0.8254	1
CIITA	活化	6.2751	0.0008	0.0287	2.736	0.0651	0.2172
CLEC2D	活化	4.9639	0.0002	0.0135	2.6567	0.0223	0.1263
CLEC4E	活化	25.396	2.9823E-07	0.001	7.0201	0.0009	0.0355
CLIC4	活化	2.2909	0.000025847	0.0053	1.4654	0.0399	0.1658

基因	IFNG 調節	經處理 細胞介素 mRNA 混合物/IgG1 相對 於 Luc mRNA/IgG1.倍數 改變	經處理 細胞介素 mRNA 混合物/IgG1 相比 於 Luc mRNA/IgG1.原始 P 值	經處理 細胞介素 mRNA 混合物/IgG1 相比 於 Luc mRNA/IgG1.FDR BH	未經處理細胞介素 mRNA 混合物 /IgG1 相比於 Luc mRNA/IgG1.倍數 改變	未經處理細胞介素 mRNA 混合物 /IgG1 相比於 Luc mRNA/IgG1.原始 P 值	未經處理細胞介素 mRNA 混合物 /IgG1 相比於 Luc mRNA/IgG1.FDR BH
CMPK2	活化	2.6988	0.0048	0.0785	1.9213	0.0687	0.2249
CORO1A	活化	5.8653	0.0076	0.1019	2.1612	0.2494	0.4929
CP	活化	2.7012	0.0222	0.1945	1.2703	0.5885	0.8544
CSF1	活化	5.3648	0.0071	0.0977	2.9314	0.0916	0.2624
CSF2	活化	2.4249	0.0053	0.0828	1.8261	0.0635	0.2145
CSF2RB	活化	7.8798	0.000014063	0.0041	3.3417	0.008	0.0833
CTSB	活化	2.9396	0.0192	0.1786	-1.5854	0.3271	0.5867
CTSD	活化	1.7662	0.0058	0.0873	1.5654	0.0351	0.1546
CTSH	活化	6.6723	0.0004	0.0189	3.0998	0.0341	0.1523
CTSS	活化	14.2913	0.000052305	0.0069	2.0554	0.2402	0.4813
CXCL1	活化	2.4631	0.0443	0.2909	2.3701	0.0679	0.223
CXCL10	活化	4.0615	0.0183	0.174	3.84	0.0314	0.1453
CXCL11	活化	6.3825	0.0032	0.0623	2.1745	0.2167	0.4494
CXCL12	活化	4.1992	0.0099	0.1191	3.9497	0.0188	0.1263
CXCL16	活化	11.7476	0.000012898	0.0041	2.7724	0.052	0.1919
CXCL2	活化	17.8737	0.000065478	0.0076	2.0435	0.2897	0.5414
CXCL3	活化	2.5623	0.0157	0.1584	-1.1159	0.7808	1
CXCL9	活化	10.5652	0.002	0.0475	6.7433	0.0152	0.1139
CYBB	活化	10.2429	0.0001	0.0102	2.4115	0.1288	0.3246
CYLD	活化	2.1952	0.0005	0.0217	1.0366	0.8685	1
CYSLTR2	活化	4.6876	0.0015	0.0389	-1.3886	0.4896	0.7624
DAPK1	活化	2.9566	0.0202	0.1837	2.3734	0.0752	0.2341

基因	IFNG 調節	經處理 細胞介素 mRNA 混合物/IgG1 相對 於 Luc mRNA/IgG1.倍數 改變	經處理 細胞介素 mRNA 混合物/IgG1 相比 於 Luc mRNA/IgG1.原始 P 值	經處理 細胞介素 mRNA 混合物/IgG1 相比 於 Luc mRNA/IgG1.FDR BH	未經處理細胞介素 mRNA 混合物 /IgG1 相比於 Luc mRNA/IgG1.倍數 改變	未經處理細胞介素 mRNA 混合物 /IgG1 相比於 Luc mRNA/IgG1.原始 P 值	未經處理細胞介素 mRNA 混合物 /IgG1 相比於 Luc mRNA/IgG1.FDR BH
DAXX	活化	2.5923	0.0255	0.2101	2.7152	0.0271	0.1349
DDIT3	活化	2.2027	0.0286	0.2233	2.4229	0.0212	0.1263
DDX58	活化	2.2084	0.0054	0.084	1.2566	0.422	0.6908
DPP4	活化	4.4101	0.047	0.3002	2.2805	0.2869	0.5383
DTX3L	活化	3.4716	0.000027857	0.0053	1.6387	0.0759	0.2356
EBI3	活化	5.2118	0.0003	0.0153	2.8451	0.0203	0.1263
ECE1	活化	3.9089	0.0033	0.0624	1.8673	0.1782	0.3996
EGLN3	活化	2.9572	0.0465	0.2989	1.0391	0.9453	1
EGR2	活化	2.4479	0.0155	0.157	2.5764	0.0158	0.1159
ERAP1	活化	2.5669	0.0033	0.0634	2.2811	0.0134	0.1068
FAM26F	活化	14.7052	0.0008	0.0279	26.6887	0.0002	0.0227
FAS	活化	7.0896	0.0003	0.0169	4.7216	0.0052	0.0695
FCER1G	活化	6.7045	0.0007	0.0254	4.8631	0.0059	0.0728
FGF2	活化	2.9272	0.0257	0.2106	1.8257	0.2249	0.4606
FGL2	活化	12.456	9.3027E-06	0.0038	4.9116	0.0036	0.0599
FPR2	活化	26.1833	0.000096227	0.0091	4.1758	0.0744	0.2328
FTH1	活化	1.6855	0.0413	0.2791	2.2166	0.0045	0.0657
GBP2	活化	7.2783	0.0007	0.0248	6.7229	0.0017	0.0437
GBP3	活化	6.2795	0.0006	0.0222	3.0356	0.0358	0.156
GBP4	活化	18.7632	0.0002	0.0139	6.7981	0.0154	0.1146
GBP5	活化	18.254	0.0003	0.0157	7.5534	0.0118	0.1
GBP6	活化	6.4537	0.0004	0.0187	8.0969	0.0002	0.0266

基因	IFNG 調節	經處理 細胞介素 mRNA 混合物/IgG1 相對 於 Luc mRNA/IgG1.倍數 改變	經處理 細胞介素 mRNA 混合物/IgG1 相比 於 Luc mRNA/IgG1.原始 P 值	經處理 細胞介素 mRNA 混合物/IgG1 相比 於 Luc mRNA/IgG1.FDR BH	未經處理細胞介素 mRNA 混合物 /IgG1 相比於 Luc mRNA/IgG1.倍數 改變	未經處理細胞介素 mRNA 混合物 /IgG1 相比於 Luc mRNA/IgG1.原始 P 值	未經處理細胞介素 mRNA 混合物 /IgG1 相比於 Luc mRNA/IgG1.FDR BH
GBP7	活化	4.3285	0.0017	0.0427	2.3295	0.0713	0.2296
GCH1	活化	3.9933	0.0057	0.0867	-2.2318	0.1144	0.3009
GNA13	活化	1.843	0.0129	0.1403	1.2404	0.3874	0.6539
GSDMD	活化	5.5069	0.000067203	0.0076	4.0075	0.0013	0.0403
GZMB	活化	10.9342	0.001	0.0323	11.0118	0.0018	0.0442
H2-M3	活化	6.3613	0.0003	0.0169	-1.2831	0.6129	0.8754
H2-Q7	活化	13.035	0.00007123	0.0078	13.2107	0.0001	0.0209
H2-T23	活化	9.9835	0.0035	0.0651	1.093	0.9091	1
HCAR2	活化	5.1405	0.0007	0.0254	3.0731	0.0206	0.1263
HCK	活化	7.0952	0.000025322	0.0053	4.1767	0.0019	0.0455
HIF1A	活化	1.661	0.0261	0.2122	1.117	0.6345	0.8942
HMOX1	活化	2.9191	0.0049	0.0797	2.2892	0.0345	0.1532
ICAM1	活化	5.8185	0.0005	0.0217	4.9939	0.0023	0.0487
ICOSL	活化	1.9545	0.0086	0.1107	1.8592	0.0203	0.1263
IDO1	活化	2.1676	0.007	0.097	1.5151	0.1535	0.3644
IFI27	活化	2.1198	0.0058	0.088	1.1685	0.5669	0.8345
IFI44	活化	10.2739	0.0001	0.0093	5.8893	0.0032	0.057
IFIH1	活化	3.3922	0.0001	0.0093	1.8886	0.0369	0.1588
IFIT1	活化	4.7651	0.000038724	0.0062	2.3488	0.0191	0.1263
IFIT2	活化	2.6547	0.0381	0.266	1.6098	0.3269	0.5865
IFIT3	活化	6.6433	0.0003	0.0153	2.3076	0.0981	0.2746
IFITM1	活化	13.8818	0.0017	0.0427	4.0409	0.096	0.2703

基因	IFNG 調節	經處理 細胞介素 mRNA 混合物/IgG1 相對 於 Luc mRNA/IgG1.倍數 改變	經處理 細胞介素 mRNA 混合物/IgG1 相比 於 Luc mRNA/IgG1.原始 P 值	經處理 細胞介素 mRNA 混合物/IgG1 相比 於 Luc mRNA/IgG1.FDR BH	未經處理細胞介素 mRNA 混合物 /IgG1 相比於 Luc mRNA/IgG1.倍數 改變	未經處理細胞介素 mRNA 混合物 /IgG1 相比於 Luc mRNA/IgG1.原始 P 值	未經處理細胞介素 mRNA 混合物 /IgG1 相比於 Luc mRNA/IgG1.FDR BH
IFITM3	活化	5.3416	0.000049885	0.0069	4.6318	0.0003	0.0278
IFNG	活化	15.8295	0.000030559	0.0055	5.3984	0.0086	0.0862
IFNGR1	活化	4.6529	0.0003	0.0169	1.1624	0.713	0.9579
IKBKE	活化	3.6191	0.000070796	0.0078	2.1509	0.0151	0.1135
IL10RA	活化	6.6362	0.0006	0.0225	2.2744	0.1259	0.3198
IL12B	活化	1.5869	0.0237	0.2019	1.3356	0.1698	0.3882
IL12RB1	活化	3.6563	0.0032	0.0623	2.7374	0.0261	0.1323
IL12RB2	活化	10.8737	0.0001	0.0105	2.7693	0.0898	0.2596
IL15RA	活化	5.6222	0.0002	0.0124	3.263	0.01	0.0929
IL18BP	活化	13.3799	0.000016505	0.0045	2.6518	0.0808	0.2445
IL18R1	活化	10.5794	0.0004	0.0172	4.1773	0.0288	0.1387
IL18RAP	活化	12.8979	1.6368E-06	0.0016	3.9032	0.0058	0.0721
IL1A	活化	5.0611	0.0002	0.014	2.016	0.1006	0.2792
IL1B	活化	7.1785	0.0017	0.0427	2.9628	0.0846	0.2505
IL1RL1	活化	3.2501	0.0421	0.2825	2.7191	0.0999	0.2778
IL1RN	活化	11.4696	0.000016637	0.0045	3.5493	0.0183	0.1256
IL27	活化	5.0377	0.0003	0.0145	2.9655	0.0136	0.1077
IL2RA	活化	12.629	0.000036735	0.0059	9.0232	0.0004	0.03
IL3RA	活化	2.0071	0.0463	0.2977	-2.3554	0.0222	0.1263
INHBA	活化	7.0079	0.0006	0.0238	8.1176	0.0005	0.0316
IRF1	活化	4.8896	0.0002	0.0136	4.2429	0.0011	0.0383
IRF2	活化	3.0856	0.0001	0.0102	2.3475	0.0038	0.0609

基因	IFNG 調節	經處理 細胞介素 mRNA 混合物/IgG1 相對 於 Luc mRNA/IgG1.倍數 改變	經處理 細胞介素 mRNA 混合物/IgG1 相比 於 Luc mRNA/IgG1.原始 P 值	經處理 細胞介素 mRNA 混合物/IgG1 相比 於 Luc mRNA/IgG1.FDR BH	未經處理細胞介素 mRNA 混合物 /IgG1 相比於 Luc mRNA/IgG1.倍數 改變	未經處理細胞介素 mRNA 混合物 /IgG1 相比於 Luc mRNA/IgG1.原始 P 值	未經處理細胞介素 mRNA 混合物 /IgG1 相比於 Luc mRNA/IgG1.FDR BH
IRF4	活化	3.6001	0.0009	0.0303	2.7396	0.0107	0.0955
IRF5	活化	6.3959	0.0039	0.0697	6.2724	0.0066	0.0767
IRF7	活化	4.6951	0.0016	0.0408	2.6708	0.0468	0.1806
IRGM1	活化	3.5604	0.0205	0.1855	3.8887	0.0196	0.1263
ISG15	活化	6.1635	0.0003	0.0158	2.64	0.0488	0.1845
ISG20	活化	3.3567	0.0012	0.0349	3.9719	0.0006	0.0322
ITGA4	活化	2.0304	0.0397	0.272	2.0083	0.055	0.1984
ITGAL	活化	16.3545	0.000032377	0.0056	6.1759	0.0055	0.0707
ITGAM	活化	8.5704	0.0093	0.1151	3.5033	0.1371	0.3385
ITGAX	活化	3.9189	0.0101	0.1202	2.0482	0.185	0.4084
ITGB2	活化	7.7479	0.0002	0.0124	6.9547	0.0006	0.0332
JAK2	活化	1.6647	0.0461	0.2976	1.3678	0.2378	0.4779
JUN	活化	1.7589	0.0035	0.0649	-1.1739	0.4037	0.6708
KLF4	活化	1.907	0.0409	0.2778	1.156	0.6546	0.9116
KLF6	活化	2.4625	0.0037	0.0672	2.1351	0.0182	0.125
KYNU	活化	3.8871	0.008	0.1057	4.8859	0.0039	0.061
LAG3	活化	7.4221	0.0002	0.0114	2.156	0.1298	0.3262
LAT2	活化	2.6441	0.028	0.2208	1.5322	0.3475	0.6094
LCN2	活化	4.3524	0.0296	0.2275	16.3586	0.0003	0.0276
LCP2	活化	8.4235	0.0004	0.0193	4.07	0.0205	0.1263
LGALS9	活化	1.6825	0.0051	0.0817	1.6728	0.0085	0.086
LST1	活化	7.6841	0.02	0.1832	1.6707	0.5648	0.8328

基因	IFNG 調節	經處理 細胞介素 mRNA 混合物/IgG1 相對 於 Luc mRNA/IgG1.倍數 改變	經處理 細胞介素 mRNA 混合物/IgG1 相比 於 Luc mRNA/IgG1.原始 P 值	經處理 細胞介素 mRNA 混合物/IgG1 相比 於 Luc mRNA/IgG1.FDR BH	未經處理細胞介素 mRNA 混合物 /IgG1 相比於 Luc mRNA/IgG1.倍數 改變	未經處理細胞介素 mRNA 混合物 /IgG1 相比於 Luc mRNA/IgG1.原始 P 值	未經處理細胞介素 mRNA 混合物 /IgG1 相比於 Luc mRNA/IgG1.FDR BH
LTA	活化	2.7386	0.0055	0.0851	2.4968	0.0157	0.1157
LTB	活化	8.1723	0.0014	0.0379	2.3655	0.1846	0.4079
LY6E	活化	5.1119	0.0028	0.0572	2.8148	0.061	0.2104
LY96	活化	2.4218	0.0302	0.2305	1.5311	0.3103	0.5661
LYN	活化	5.1219	0.001	0.0325	1.6841	0.2851	0.536
MAP3K8	活化	7.131	0.0009	0.0302	1.0205	0.9717	1
MEFV	活化	10.8378	0.000019758	0.0047	2.3756	0.0951	0.2688
MMP12	活化	6.4662	0.0035	0.0647	5.0068	0.015	0.1131
MX1	活化	6.1489	0.0128	0.1395	2.6469	0.1916	0.4171
MX2	活化	3.9804	0.0005	0.0205	1.8666	0.1068	0.2889
NAMPT	活化	2.341	0.0066	0.0943	-1.4194	0.2673	0.514
NAPSA	活化	4.3452	0.0003	0.0149	4.7434	0.0003	0.0272
NEURL3	活化	5.943	0.0009	0.0291	1.9354	0.2066	0.4363
NFKB1	活化	1.8089	0.0051	0.0815	1.0738	0.7351	0.9751
NFKB1A	活化	4.9409	0.000013016	0.0041	2.4668	0.0097	0.0912
NFKBIZ	活化	2.328	0.0073	0.0995	2.0257	0.0308	0.1436
NGF	活化	3.1687	0.0065	0.0933	3.4968	0.0055	0.0706
NLRC5	活化	3.4173	0.0109	0.1261	2.2706	0.0985	0.2752
NLRP3	活化	5.11	0.0007	0.0254	3.4525	0.0111	0.0975
NMI	活化	2.0435	0.0228	0.1979	1.6117	0.1416	0.3459
NOD2	活化	3.5157	0.000018135	0.0045	2.5449	0.0013	0.0396
NOS2	活化	26.5216	2.2445E-06	0.0017	24.8128	7.9556E-06	0.0117

基因	IFNG 調節	經處理 細胞介素 mRNA 混合物/IgG1 相對於 Luc mRNA/IgG1.倍數 改變	經處理 細胞介素 mRNA 混合物/IgG1 相比 於 Luc mRNA/IgG1.原始 P 值	經處理 細胞介素 mRNA 混合物/IgG1 相比 於 Luc mRNA/IgG1.FDR BH	未經處理細胞介素 mRNA 混合物 /IgG1 相比於 Luc mRNA/IgG1.倍數 改變	未經處理細胞介素 mRNA 混合物 /IgG1 相比於 Luc mRNA/IgG1.原始 P 值	未經處理細胞介素 mRNA 混合物 /IgG1 相比於 Luc mRNA/IgG1.FDR BH
NOTCH1	活化	2.2952	0.0301	0.2303	1.4949	0.3078	0.5625
NR1D1	活化	1.7995	0.0049	0.0799	1.8784	0.0045	0.065
NUPR1	活化	2.8421	0.001	0.0318	1.7353	0.0807	0.2444
OAS2	活化	3.8997	0.0003	0.0154	2.3682	0.0204	0.1263
OAS3	活化	14.5317	7.7153E-06	0.0034	4.0924	0.0123	0.1019
P2RY14	活化	16.6314	0.0005	0.0204	4.8513	0.0471	0.1812
P2RY6	活化	5.352	0.0001	0.0103	2.2094	0.0606	0.2093
PARP9	活化	3.1267	0.0179	0.1716	-1.1573	0.7644	0.9977
PARVG	活化	6.3047	0.0025	0.0539	1.2154	0.7444	0.9822
PDCD1LG2	活化	11.6201	2.1928E-06	0.0017	3.9612	0.0045	0.065
PF4	活化	6.7372	0.0284	0.2226	-2.2437	0.3655	0.6285
PIM1	活化	4.0708	0.0003	0.0169	2.0732	0.0575	0.2034
PLA2G16	活化	4.8619	0.001	0.0309	1.3802	0.4886	0.7613
PLAU	活化	3.8214	0.00003401	0.0058	2.1662	0.0131	0.1056
PLEK	活化	5.9274	0.0049	0.0805	2.9561	0.0921	0.2632
PMAIP1	活化	3.4224	0.0002	0.0134	2.6199	0.0041	0.0627
PRDM1	活化	3.5702	0.0297	0.2283	4.0335	0.0251	0.13
PRKCD	活化	4.5574	2.2524E-07	0.001	2.0325	0.0066	0.0768
PRKCQ	活化	2.1379	0.0065	0.0932	2.1615	0.0089	0.087
PSMB10	活化	3.6197	0.005	0.0807	1.4724	0.3976	0.6643
PSMB8	活化	3.9093	0.0032	0.0615	2.652	0.0388	0.1637
PSMB9	活化	7.4132	0.0005	0.0197	4.5308	0.009	0.0877

基因	IFNG 調節	經處理 細胞介素 mRNA 混合物/IgG1 相對 於 Luc mRNA/IgG1.倍數 改變	經處理 細胞介素 mRNA 混合物/IgG1 相比 於 Luc mRNA/IgG1.原始 P 值	經處理 細胞介素 mRNA 混合物/IgG1 相比 於 Luc mRNA/IgG1.FDR BH	未經處理細胞介素 mRNA 混合物 /IgG1 相比於 Luc mRNA/IgG1.倍數 改變	未經處理細胞介素 mRNA 混合物 /IgG1 相比於 Luc mRNA/IgG1.原始 P 值	未經處理細胞介素 mRNA 混合物 /IgG1 相比於 Luc mRNA/IgG1.FDR BH
PSME1	活化	6.1609	0.0001	0.0096	3.9584	0.0037	0.06
PTAFR	活化	8.5218	0.000052564	0.0069	2.2614	0.1024	0.2821
PTGES	活化	3.3225	0.0241	0.2039	1.61	0.3819	0.6479
PTGS2	活化	10.9036	0.0075	0.1017	3.9538	0.1309	0.3282
PTX3	活化	5.271	0.0253	0.2091	1.8833	0.4052	0.672
RAB20	活化	2.29	0.0257	0.2106	1.1261	0.7537	0.9893
RAC2	活化	7.9519	0.000098427	0.0091	3.7008	0.0123	0.1021
RIPK1	活化	1.6822	0.0456	0.2959	-1.1344	0.6373	0.8964
RSAD2	活化	3.916	0.0003	0.0152	1.6141	0.184	0.407
RTP4	活化	4.8033	0.0025	0.0537	2.5839	0.0696	0.2269
RUNX2	活化	5.3191	0.0001	0.0095	2.2697	0.0491	0.185
RUNX3	活化	5.5652	0.0012	0.0354	5.5875	0.002	0.0467
S100A10	活化	2.1419	0.001	0.0318	-1.0647	0.7799	1
S100A8	活化	10.9785	0.0065	0.0931	11.8118	0.0079	0.0832
S100A9	活化	5.1245	0.0058	0.0879	4.0622	0.0228	0.1263
S1PR3	活化	2.8084	0.0426	0.2844	4.3054	0.0083	0.0851
SAMHD1	活化	6.8165	0.000028539	0.0053	5.2676	0.0004	0.0289
SELL	活化	9.0266	0.000036704	0.0059	2.6848	0.0503	0.1879
SEMA4A	活化	4.5461	0.0002	0.0134	7.1376	0.000014188	0.0118
SEPT3	活化	1.9813	0.0021	0.0484	1.2827	0.2581	0.5036
SERPINB9	活化	3.6968	0.0068	0.0955	1.3544	0.5306	0.8014
SERPINE1	活化	2.7348	0.0131	0.142	1.0382	0.9268	1

基因	IFNG 調節	經處理 細胞介素 mRNA 混合物/IgG1 相對 於 Luc mRNA/IgG1.倍數 改變	經處理 細胞介素 mRNA 混合物/IgG1 相比 於 Luc mRNA/IgG1.原始 P 值	經處理 細胞介素 mRNA 混合物/IgG1 相比 於 Luc mRNA/IgG1.FDR BH	未經處理細胞介素 mRNA 混合物 /IgG1 相比於 Luc mRNA/IgG1.倍數 改變	未經處理細胞介素 mRNA 混合物 /IgG1 相比於 Luc mRNA/IgG1.原始 P 值	未經處理細胞介素 mRNA 混合物 /IgG1 相比於 Luc mRNA/IgG1.FDR BH
SERPING1	活化	8.5956	0.0003	0.0154	5.6206	0.0042	0.063
SHARPIN	活化	1.8222	0.0003	0.0169	-1.1856	0.2897	0.5414
SLAMF1	活化	4.2282	0.000066073	0.0076	1.8422	0.0753	0.2344
SLC11A1	活化	8.1631	0.0002	0.0114	6.6594	0.0009	0.0364
SLC15A3	活化	13.0122	0.0001	0.0093	4.2688	0.0238	0.1278
SLC16A9	活化	2.2466	0.0273	0.2172	1.6072	0.21	0.4406
SLC28A2	活化	6.903	0.0001	0.0096	1.4304	0.4466	0.7176
SLFN5	活化	3.7058	0.0022	0.0493	2.1361	0.0772	0.2383
SMAD7	活化	3.1247	0.0209	0.187	-1.1526	0.7767	1
SOCS1	活化	3.9437	0.011	0.1267	3.3365	0.0325	0.1481
SOD2	活化	2.6759	0.0047	0.0774	3.1489	0.0021	0.0475
SOD3	活化	2.1257	0.0158	0.1591	1.4255	0.2663	0.5128
SP100	活化	4.8282	7.0055E-06	0.0032	2.8699	0.0019	0.0452
SP110	活化	3.7976	0.0057	0.0867	1.1957	0.71	0.9556
SP11	活化	10.5793	0.000055966	0.0071	6.5856	0.0014	0.0409
SPP1	活化	2.5268	0.0212	0.1893	2.4021	0.0384	0.1624
STAT1	活化	4.2736	0.0089	0.1122	3.9844	0.0176	0.1229
STAT2	活化	5.4847	0.000013182	0.0041	3.019	0.0035	0.0589
STAT4	活化	6.3819	0.0038	0.069	1.1576	0.8175	1
STAT6	活化	1.7399	0.0097	0.1171	1.7712	0.0116	0.0993
STX11	活化	3.6303	0.0058	0.088	1.7593	0.2306	0.4679
TAP1	活化	4.588	0.001	0.0323	2.7092	0.0329	0.1493

基因	IFNG 調節	經處理 細胞介素 mRNA 混合物/IgG1 相對 於 Luc mRNA/IgG1.倍數 改變	經處理 細胞介素 mRNA 混合物/IgG1 相比 於 Luc mRNA/IgG1.原始 P 值	經處理 細胞介素 mRNA 混合物/IgG1 相比 於 Luc mRNA/IgG1.FDR BH	未經處理細胞介素 mRNA 混合物 /IgG1 相比於 Luc mRNA/IgG1.倍數 改變	未經處理細胞介素 mRNA 混合物 /IgG1 相比於 Luc mRNA/IgG1.原始 P 值	未經處理細胞介素 mRNA 混合物 /IgG1 相比於 Luc mRNA/IgG1.FDR BH
TAP2	活化	2.8268	0.0148	0.1526	1.5315	0.3257	0.585
TAPBP	活化	2.5416	0.0274	0.2176	1.7971	0.1801	0.4019
TAPBPL	活化	3.0796	0.0031	0.0609	2.4014	0.0251	0.13
TBX21	活化	3.8788	0.0008	0.0273	4.1566	0.0008	0.0354
TCIRG1	活化	2.7899	0.0005	0.0217	1.2508	0.4321	0.7008
TGFBR2	活化	1.9044	0.031	0.2346	1.2596	0.451	0.7222
THBS1	活化	2.8135	0.005	0.0807	2.9522	0.0055	0.0707
THEMIS2	活化	9.3368	0.0011	0.0339	6.5099	0.0079	0.0832
THY1	活化	5.5745	0.0036	0.0666	3.0999	0.0597	0.2073
TLR1	活化	3.9534	0.0044	0.0751	4.9709	0.002	0.0463
TLR2	活化	4.2854	0.0004	0.0173	1.0613	0.8785	1
TLR7	活化	3.6076	0.0317	0.2384	1.1789	0.7874	1
TLR8	活化	7.9426	0.0012	0.0349	1.5453	0.4846	0.7574
TLR9	活化	7.0125	0.0004	0.0182	5.5003	0.0026	0.052
TMEM50B	活化	2.2646	0.0029	0.0584	1.6005	0.089	0.2584
TNF	活化	15.5761	0.000001549	0.0016	3.6025	0.014	0.1094
TNFAIP2	活化	4.2629	0.0043	0.0737	1.3184	0.5837	0.8504
TNFRSF11A	活化	3.7342	0.0089	0.1124	3.2927	0.0236	0.1273
TNFRSF14	活化	3.3507	0.0151	0.1547	2.0443	0.1615	0.3761
TNFRSF1B	活化	6.9767	0.0004	0.0187	3.0014	0.0433	0.1723
TNFSF10	活化	5.9466	0.0008	0.0286	2.8254	0.0505	0.1883
TNFSF12	活化	4.0396	0.0003	0.0145	3.0636	0.0039	0.061

基因	IFNG 調節	經處理 細胞介素 mRNA 混合物/IgG1 相對 於 Luc mRNA/IgG1.倍數 改變	經處理 細胞介素 mRNA 混合物/IgG1 相比 於 Luc mRNA/IgG1.原始 P 值	經處理 細胞介素 mRNA 混合物/IgG1 相比 於 Luc mRNA/IgG1.FDR BH	未經處理細胞介素 mRNA 混合物 /IgG1 相比於 Luc mRNA/IgG1.倍數 改變	未經處理細胞介素 mRNA 混合物 /IgG1 相比於 Luc mRNA/IgG1.原始 P 值	未經處理細胞介素 mRNA 混合物 /IgG1 相比於 Luc mRNA/IgG1.FDR BH
TNFSF13	活化	3.7405	0.0229	0.1979	-1.7547	0.3434	0.6048
TNFSF13B	活化	4.2939	0.00009167	0.0089	1.0175	0.96	1
TRAFD1	活化	7.5123	0.000066493	0.0076	1.4364	0.4415	0.7113
TRIM21	活化	3.1067	0.0069	0.096	-1.1129	0.7984	1
TXK	活化	3.1599	0.0017	0.0418	1.8261	0.0992	0.2766
UBD	活化	39.4489	3.1101E-06	0.0021	20.5238	0.0001	0.0203
UBE2L6	活化	3.418	0.002	0.0464	4.4962	0.0005	0.031
USP18	活化	5.4886	0.0004	0.0192	1.697	0.258	0.5036
VCAM1	活化	7.3103	0.0003	0.0163	1.2409	0.6812	0.9337
WARS	活化	1.5033	0.0098	0.1179	1.8802	0.0003	0.0284
ZFP36	活化	3.0067	0.0051	0.0815	-1.1887	0.6585	0.9153
AHCY	抑制	-2.0639	0.0374	0.2628	-1.8643	0.0878	0.2566
AQP1	抑制	-2.6893	0.0012	0.0354	-2.9843	0.0008	0.0346
AZGP1	抑制	-3.6306	0.0039	0.0701	-3.72	0.0054	0.0705
CSE1L	抑制	-1.9528	0.0448	0.2931	-4.9001	0.000053442	0.0177
DHX9	抑制	-1.9049	0.0192	0.1787	-1.3891	0.2439	0.4863
EMID1	抑制	-2.5566	0.047	0.3003	-1.9661	0.1701	0.3887
FKBP6	抑制	-4.1867	0.0043	0.0733	-2.2618	0.1075	0.2898
FLT4	抑制	-1.7478	0.0248	0.2076	-1.6367	0.0588	0.2058
GMPR	抑制	-2.9853	0.027	0.2154	-5.5877	0.0017	0.0432
GNAO1	抑制	-2.2497	0.0179	0.1721	-1.0647	0.8565	1
HSP90AB1	抑制	-1.9951	0.007	0.0974	-1.1404	0.6083	0.8715

基因	IFNG 調節	經處理 細胞介素 mRNA 混合物/IgG1 相對於 Luc mRNA/IgG1.倍數 改變	經處理 細胞介素 mRNA 混合物/IgG1 相比 於 Luc mRNA/IgG1.原始 P 值	經處理 細胞介素 mRNA 混合物/IgG1 相比 於 Luc mRNA/IgG1.FDR BH	未經處理細胞介素 mRNA 混合物 /IgG1 相比於 Luc mRNA/IgG1.倍數 改變	未經處理細胞介素 mRNA 混合物 /IgG1 相比於 Luc mRNA/IgG1.原始 P 值	未經處理細胞介素 mRNA 混合物 /IgG1 相比於 Luc mRNA/IgG1.FDR BH
IDI1	抑制	-2.9218	0.004	0.0713	-2.402	0.023	0.1263
IGFBP4	抑制	-3.3872	0.0211	0.1885	-3.0044	0.0473	0.1815
MIF	抑制	-3.5707	0.0052	0.0828	-1.3189	0.5425	0.8124
MSH2	抑制	-1.909	0.0328	0.2435	-1.7932	0.0664	0.2198
MYC	抑制	-1.8764	0.0225	0.1962	-1.5059	0.1507	0.36
PBK	抑制	-4.8198	0.0008	0.0287	-10.4275	0.000012076	0.0117
PCDH17	抑制	-2.2868	0.0029	0.0588	-1.1447	0.6223	0.8835
PLCG1	抑制	-1.6389	0.0439	0.2895	1.263	0.3564	0.6189
POLR2F	抑制	-1.7137	0.0139	0.1473	-2.1058	0.0019	0.0456
POMP	抑制	-1.5182	0.047	0.3002	-1.3884	0.1354	0.336
PRPF8	抑制	-2.0788	0.0159	0.1593	-2.1397	0.0179	0.1239
PTGES2	抑制	-1.9137	0.0278	0.2201	-1.0746	0.811	1
RAD18	抑制	-2.1129	0.0032	0.0615	-1.7251	0.0354	0.1551
SF3A1	抑制	-1.598	0.0042	0.0729	-1.2281	0.2111	0.4418
SLC12A2	抑制	-2.8366	0.0039	0.0697	-3.5987	0.0011	0.0373
SMTN	抑制	-1.8432	0.0398	0.2725	-1.2994	0.3927	0.6593
SQLE	抑制	-4.0941	0.0396	0.2717	-4.8892	0.0296	0.1404
SREBF2	抑制	-2.3929	0.0032	0.0615	-3.5164	0.0001	0.0209
SSBP1	抑制	-1.5752	0.0094	0.1156	1.0074	0.9665	1
TMEM158	抑制	-1.6002	0.044	0.2897	1.4394	0.1352	0.3357
TYMP	抑制	-2.6432	0.0448	0.2928	1.469	0.4412	0.7111
UNC5B	抑制	-2.3093	0.0267	0.2143	-1.5396	0.2666	0.5132

實施例 13 - 細胞介素 mRNA 增加經處理及未處理腫瘤兩者中之 CD4+及 CD8+ T 細胞

【0310】 在左及右側腹上帶有 B16F10 腫瘤之小鼠接受至右側腫瘤中之 80 μg mRNA (20 μg /靶標)之單一腫瘤內注射，該右側腫瘤(僅腫瘤中之一者)(經處理)以 0.5×10^6 個細胞開始，而以 0.25×10^6 個細胞開始之另一腫瘤保持未處理。在腫瘤內 mRNA 注射後七天，收集兩個腫瘤，且用 CD4+、CD8+及 FoxP3+細胞之抗體進行 IHC (免疫螢光顯微術)染色處理。來自圖 28A 及圖 28B 中之腫瘤之小鼠用細胞介素 mRNA 處理，而來自圖 28C 及圖 28D 中之腫瘤之小鼠用對照 mRNA 處理。圖 A 及圖 C 來自用 mRNA 注射之腫瘤，而圖 B 及圖 D 來自對應未注射之對側腫瘤。(圖 28A 至圖 28D)。對於細胞介素 mRNA 處理及對照 mRNA 處理組兩者，將用 RNA 注射之 5 個腫瘤及未注射之對應 5 個對側腫瘤進行 CD4+、CD8+、FOXP3+細胞的免疫螢光染色。細胞之相對頻率及比率繪製於圖 28E、圖 28F、圖 28G 中。結果指示，IL-15 sushi、GM-CSF、IFN α 及 IL-12sc (SEQ ID NO: 59、53、41 及 47)之細胞介素 mRNA 混合物增加 CD8+及 CD4+ T 細胞浸潤，引起 CD8+/Treg 比率更改。免疫浸潤之增加在處理及未處理腫瘤中均存在，從而支撐局部腫瘤內處理具有全身性免疫調節效果的概念。

實施例 14 - mRNA 在腫瘤及浸潤免疫細胞兩者中表現

【0311】 帶有單一 B16F10 腫瘤之小鼠接受編碼 Thy1.1 蛋白質之 mRNA 之單一腫瘤內注射(圖 29A 至圖 29G)。腫瘤內注射後大致 18 小時，分離腫瘤，用一組抗體進行染色，且進行流式細胞測量術以限定表現 Thy1.1 蛋白質的細胞。結果指示，腫瘤及免疫細胞兩者吸收及表現 mRNA。

實施例 15 - 腫瘤內細胞介素 mRNA 注射後之劑量依賴性腫瘤表現及 PD 反應

【0312】 帶有 B16F10 腫瘤之小鼠接受 IL-15 sushi、GM-CSF、IFN α 及 IL-12sc (SEQ ID NO: 59、53、41 及 47) 之 80、8 或 0.8 μ g 細胞介素 mRNA 混合物的單一 mRNA 注射。腫瘤內注射後大致 6 小時，移除腫瘤且溶解，定量腫瘤溶解物中之 IL-15 sushi、GM-CSF、IFN α 及 IL-12sc、IFN γ 及 IP-10 之位準。圖 30A 至圖 30F 展示，細胞介素 mRNA 以劑量依賴性方式腫瘤內表現。

【0313】 在獨立實驗中，帶有 B16F10 腫瘤之小鼠接受 IL-15 sushi、GM-CSF、IFN α 及 IL-12sc (SEQ ID NO: 59、53、41 及 47) 之 80、8 或 0.8 μ g 細胞介素 mRNA 混合物的單一 mRNA 注射。在腫瘤內細胞介素 mRNA 注射後七天，分離腫瘤，用一組抗體進行染色，且藉由流式細胞測量術進行分析。所使用抗體係抗鼠類的：CD45、CD4、CD3、CD8、CD279、IFN γ 、TNF α 、FOXP3、顆粒酶 B)。結果指示，用細胞介素 mRNA 混合物之處理改變 CD8⁺/Treg 比率(圖 31A 至圖 31B)，引起腫瘤微環境中之多功能 CD8⁺ T 細胞之頻率增加(圖 31C 至圖 31D)，增加浸潤骨髓細胞上之 PD-L1 (圖 31E) 及增加浸潤 CD8⁺ T 細胞上之 PD-1 之位準(圖 31F)。

【0314】 在其他實驗中，在左及右側腹上帶有 B16F10 腫瘤之小鼠接受至僅腫瘤中之一者(經處理)中之 IL-15 sushi、GM-CSF、IFN α 及 IL-12sc (SEQ ID NO: 59、53、41 及 47) 之細胞介素 mRNA 混合物或對照 mRNA 的單一腫瘤內注射，而另一腫瘤保持未處理。在腫瘤內 mRNA 注射後七天，收集經注射腫瘤，且用 CD45⁺、CD8⁺、CD3⁺ 及顆粒酶 B 之抗體進行流式細胞測量術染色處理。結果指示，細胞介素 mRNA 混合物增加腫瘤中之腫瘤內顆粒酶 B CD8⁺ T 細胞之頻率(圖 31G 至圖 31H)。

實施例 16 - 腫瘤內注射之 mRNA 主要在腫瘤中表現

【0315】 帶有 B16F10 腫瘤之小鼠接受 50 μ g 編碼螢火蟲螢光素酶之

mRNA 的單一腫瘤內注射。在 6 小時及 24 小時時間點時，犧牲 3 隻小鼠，且離體分析腫瘤、肝、脾、腫瘤引流淋巴結(TDLN)及非腫瘤引流淋巴結之螢光素酶表現。圖 32A 至圖 32B 展示，螢光素酶表現在腫瘤中最高，其中表現比任何其他組織之高 100 倍。

實施例 17 - CD4⁺、CD8⁺及 NK 細胞有助於細胞介素 mRNA 在 B16F10 模型中之抗腫瘤活性

【0316】 帶有 B16F10 腫瘤之小鼠組藉由腹膜內注射一週一次總共持續 4 週用 100 µg 消耗抗體(抗 CD4、抗 CD8、抗 NK1.1)進行處理。抗體介導的細胞消耗在用 IL-15 sushi、GM-CSF、IFN α 及 IL-12sc (SEQ ID NO: 59、53、41 及 47)之 80 µg 細胞介素 mRNA 混合物處理之前一天開始。監測抗體消耗對於總存活率之效果。展示於圖 34 中之結果指示，個別消耗 CD8⁺、CD4⁺或 NK 細胞在不同程度上降低細胞介素 mRNA 之抗腫瘤活性及總存活率。

實施例 18 - 細胞介素 mRNA 之抗腫瘤活性在 IFN- γ 缺乏小鼠中未觀測到

【0317】 WT C57BL6J 小鼠及缺乏鼠類 IFN γ (IFN γ KO)之 C57BL6J 小鼠植入實施例 1 中所描述之 B16F10 腫瘤細胞。小鼠藉由 IL-15 sushi、GM-CSF、IFN α 及 IL-12sc (SEQ ID NO: 59、53、41 及 47)之 80 µg (20 µg/靶標)細胞介素 mRNA 混合物或 80 µg 對照 mRNA 的腫瘤內注射進行處理，且監測總存活率。描繪於圖 35 中之結果指示，缺乏 IFN γ 之小鼠在用細胞介素 mRNA 處理時不呈現可偵測的抗腫瘤反應。

【符號說明】

無

【生物材料寄存】

國內寄存資訊【請依寄存機構、日期、號碼順序註記】

無

國外寄存資訊【請依寄存國家、機構、日期、號碼順序註記】

無

【序列表】 (請換頁單獨記載)

申請專利範圍

1. 一種醫藥組成物用於製造減小個體之腫瘤大小的醫藥品之用途，該醫藥組成物包含編碼 IL-12sc 蛋白質之 RNA、編碼 IL-15 sushi 蛋白質之 RNA、編碼 IFN α 蛋白質之 RNA 及編碼 GM-CSF 蛋白質之 RNA，其中

該 IL-12sc 蛋白質包含與 SEQ ID NO: 14 之胺基酸序列具有至少 97%一致性之胺基酸序列；

該 IL-15 sushi 蛋白質包含與 SEQ ID NO: 24 之胺基酸序列具有至少 97%一致性之胺基酸序列；

該 IFN α 蛋白質包含與 SEQ ID NO: 19 之胺基酸序列具有至少 97%一致性之胺基酸序列；以及

該 GM-CSF 蛋白質包含與 SEQ ID NO: 27 之胺基酸序列具有至少 97%一致性之胺基酸序列。

2. 如請求項 1 之用途，其中該 RNA 係由編碼 IL-12sc 蛋白質之 RNA、編碼 IL-15 sushi 蛋白質之 RNA、編碼 IFN α 蛋白質之 RNA 及編碼 GM-CSF 蛋白質之 RNA 所組成。

3. 如請求項 1 之用途，其中，一個、二個、三個、或所有的該等 RNA 包含替代各尿苷之修飾核苷。

4. 如請求項 3 之用途，其中，該修飾核苷獨立地選自假尿苷(ψ)、N1-甲基-假尿苷(m1 ψ)及 5-甲基-尿苷(m5U)。

5. 如請求項 1 之用途，其中，各 RNA 包含 5' 端帽 m₂^{7,3'-O}Gppp(m₁^{2'-O})ApG 或 3'-O-Me-m⁷G(5')ppp(5')G。

6. 如請求項 1 之用途，其中，各 RNA 含有包含以下之 5' UTR：選自由 SEQ ID NO: 2、4 及 6 組成之群之核苷酸序列。

7. 如請求項 1 之用途，其中，各 RNA 含有包含 SEQ ID NO: 8 之核苷

酸序列之 3' UTR。

8. 如請求項 1 之用途，其中，各 RNA 包含多腺苷酸尾(poly-A tail)，該多腺苷酸尾包含 SEQ ID NO: 78。

9. 如請求項 1 之用途，其中，一或多個 RNA 包含：

- a. 5' 端帽，其包含 $m_2^{7,3'-O}Gppp(m_1^{2'-O})ApG$ 或 $3'-O-Me-m^7G(5')ppp(5')G$ ；
- b. 5' UTR，其包含(i)選自由 SEQ ID NO: 2、4 及 6 組成之群之核苷酸序列，或(ii)與選自由 SEQ ID NO: 2、4 及 6 組成之群之核苷酸序列具有至少 80%一致性之核苷酸序列；
- c. 3' UTR，其包含(i) SEQ ID NO: 8 之核苷酸序列，或(ii)與 SEQ ID NO: 8 之核苷酸序列具有至少 80%一致性之核苷酸序列；以及
- d. 多腺苷酸尾，其包含 SEQ ID NO: 78。

10. 如請求項 1 之用途，其中編碼該 IL-12sc 蛋白質之 RNA 由 SEQ ID NO: 18 之核苷酸序列所組成，該 SEQ ID NO: 18 的各尿苷被 N1-甲基-假尿苷(m1ψ)替代，編碼該 IL-15 sushi 蛋白質之 RNA 由 SEQ ID NO: 26 之核苷酸序列所組成，該 SEQ ID NO: 26 的各尿苷被 N1-甲基-假尿苷(m1ψ)替代，編碼該 IFNα 蛋白質之 RNA 由 SEQ ID NO: 23 之核苷酸序列所組成，該 SEQ ID NO: 23 的各尿苷被 N1-甲基-假尿苷(m1ψ)替代，以及編碼該 GM-CSF 蛋白質之 RNA 由 SEQ ID NO: 29 之核苷酸序列所組成，該 SEQ ID NO: 29 的各尿苷被 N1-甲基-假尿苷(m1ψ)替代，

其中各 RNA 包含：

- a. 5' 端帽，其包含 $m_2^{7,3'-O}Gppp(m_1^{2'-O})ApG$ 或 $3'-O-Me-m^7G(5')ppp(5')G$ ；
- b. 5' UTR，其包含 SEQ ID NO: 2、4、或 6 之核苷酸序列；

- c. 3' UTR，其包含 SEQ ID NO: 8 之核苷酸序列；以及
- d. 多腺苷酸尾，其包含 SEQ ID NO: 78；且

其中該醫藥組成物中的 RNA 的莫耳比率或質量比率係 1:1:1:1。

圖式




圖 1A




圖 1B




圖 1C




圖 1D




圖 1E




圖 1F




圖 1G




圖 2A




圖 2B




圖 2C




圖 2D




圖 3A




圖 3B




圖 3C




圖 4A




圖 4B




圖 4C






圖 4D






圖 5A






圖 5B



14.5C



14.5D




圖 6A






圖 6B



146C



146D




圖 6E




圖 6F




圖 7A




圖 7B




圖 7C




圖 7D




圖 7E




圖 7F




圖 8A




圖 8B




圖 8C




圖 8D




圖 8E




圖 8F




圖 8G




圖 8H




圖 9A




圖 9B




圖 9C




圖 9D




圖 9E




圖 9F




圖 10A




圖 10B




圖 11




圖 12A





圖 12B

眼周部位眼周之局部白癜风



WPC




圖 12D




圖 134




圖 135




圖 13C








圖 13D





M4C



M4D




圖 14E





圖 14F

IMK203T 中 c-myc RNA 表現



PMBC 之細胞介素治療



附 154




圖 15B




圖 16A




圖 16B




圖 16C




圖 16D




圖 16E




圖 17A




圖 17B




圖 17C




圖 18A




圖 18B




圖 18C






圖 18D




183



191


1973

1973



1973

1973



1973




圖 19C




圖 19D




圖 19E




圖 20A




圖 20B




圖 20C




圖 20D




圖 20E




圖 20F




圖 20G




圖 21A




圖 21B




圖 21C




圖 21D




圖 21E




圖 21F




圖 21G




圖 21H






圖 211

II-32





II-22A

II-No.21



II-22B






圖 23A




圖 23B




圖 23C




圖 23D




圖 24A

細胞介素混合物






圖 24B



II 21D




圖 24E




圖 24F




図 210





図 25



[illegible]




01000
 01001
 01002
 01003
 01004
 01005
 01006
 01007
 01008
 01009
 01010
 01011
 01012
 01013
 01014
 01015
 01016
 01017
 01018
 01019
 01020
 01021
 01022
 01023
 01024
 01025
 01026
 01027
 01028
 01029
 01030
 01031
 01032
 01033
 01034
 01035
 01036
 01037
 01038
 01039
 01040
 01041
 01042
 01043
 01044
 01045
 01046
 01047
 01048
 01049
 01050
 01051
 01052
 01053
 01054
 01055
 01056
 01057
 01058
 01059
 01060
 01061
 01062
 01063
 01064
 01065
 01066
 01067
 01068
 01069
 01070
 01071
 01072
 01073
 01074
 01075
 01076
 01077
 01078
 01079
 01080
 01081
 01082
 01083
 01084
 01085
 01086
 01087
 01088
 01089
 01090
 01091
 01092
 01093
 01094
 01095
 01096
 01097
 01098
 01099
 01100
 01101
 01102
 01103
 01104
 01105
 01106
 01107
 01108
 01109
 01110
 01111
 01112
 01113
 01114
 01115
 01116
 01117
 01118
 01119
 01120
 01121
 01122
 01123
 01124
 01125
 01126
 01127
 01128
 01129
 01130
 01131
 01132
 01133
 01134
 01135
 01136
 01137
 01138
 01139
 01140
 01141
 01142
 01143
 01144
 01145
 01146
 01147
 01148
 01149
 01150
 01151
 01152
 01153
 01154
 01155
 01156
 01157
 01158
 01159
 01160
 01161
 01162
 01163
 01164
 01165
 01166
 01167
 01168
 01169
 01170
 01171
 01172
 01173
 01174
 01175
 01176
 01177
 01178
 01179
 01180
 01181
 01182
 01183
 01184
 01185
 01186
 01187
 01188
 01189
 01190
 01191
 01192
 01193
 01194
 01195
 01196
 01197
 01198
 01199
 01200
 01201
 01202
 01203
 01204
 01205
 01206
 01207
 01208
 01209
 01210
 01211
 01212
 01213
 01214
 01215
 01216
 01217
 01218
 01219
 01220
 01221
 01222
 01223
 01224
 01225
 01226
 01227
 01228
 01229
 01230
 01231
 01232
 01233
 01234
 01235
 01236
 01237
 01238
 01239
 01240
 01241
 01242
 01243
 01244
 01245
 01246
 01247
 01248
 01249
 01250
 01251
 01252
 01253
 01254
 01255
 01256
 01257
 01258
 01259
 01260
 01261
 01262
 01263
 01264
 01265
 01266
 01267
 01268
 01269
 01270
 01271
 01272
 01273
 01274
 01275
 01276
 01277
 01278
 01279
 01280
 01281
 01282
 01283
 01284
 01285
 01286
 01287
 01288
 01289
 01290
 01291
 01292
 01293
 01294
 01295
 01296
 01297
 01298
 01299
 01300
 01301
 01302
 01303
 01304
 01305
 01306
 01307
 01308
 01309
 01310
 01311
 01312
 01313
 01314
 01315
 01316
 01317
 01318
 01319
 01320
 01321
 01322
 01323
 01324
 01325
 01326
 01327
 01328
 01329
 01330
 01331
 01332
 01333
 01334
 01335
 01336
 01337
 01338
 01339
 01340
 01341
 01342
 01343
 01344
 01345
 01346
 01347
 01348
 01349
 01350
 01351
 01352
 01353
 01354
 01355
 01356
 01357
 01358
 01359
 01360
 01361
 01362
 01363
 01364
 01365
 01366
 01367
 01368
 01369
 01370
 01371
 01372
 01373
 01374
 01375
 01376
 01377
 01378
 01379
 01380
 01381
 01382
 01383
 01384
 01385
 01386
 01387
 01388
 01389
 01390
 01391
 01392
 01393
 01394
 01395
 01396
 01397
 01398
 01399
 01400
 01401
 01402
 01403
 01404
 01405
 01406
 01407
 01408
 0



米 鹽 菜 類

附 21C






Figure 1. The effect of the concentration of the inhibitor on the corrosion rate of the steel in the solution.










Figure 2. The effect of the concentration of the inhibitor on the corrosion rate of the steel in the solution.



Ref 28C












202428301




↑ 肝癌及慢性炎症性肠病(CD11b+) T之 PD-1

CD11b+ T mRNA
CD11b- T mRNA





↑


肝癌及慢性炎症性肠病(CD8+) T之 PD-1



miRNA








AT 372

10/10/2024

对肺纤维化之抗性



7-138




図 34




Figure 1