

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl<sup>7</sup>

A61K 35/78

A61P 31/22

## [12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 00134371.8

[43] 公开日 2002 年 7 月 10 日

[11] 公开号 CN 1357348A

[22] 申请日 2000.12.8 [21] 申请号 00134371.8

[71] 申请人 汤道荃

地址 226531 江苏如皋市石庄镇北大街 32 号

[72] 发明人 汤道荃

权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图页数 0 页


[54] 发明名称 一种治疗带状疱疹的搽剂

[57] 摘要

本发明涉及一种治疗带状疱疹的外用搽剂,其特征  
在于:它采用龙胆、紫草、雄黄、枯凡、青黛、冰片与酒精  
浸泡而成;由于采用了龙胆、紫草、青黛,从而能起到清  
热、解毒、燥湿、泻肝胆火的作用;由于雄黄具有解 毒、燥  
湿的作用,冰片具有通诸窍,散郁火的药效,加至枯凡具  
有解毒、收敛的作用,从而诸药共奏清热散郁、泻火解毒  
止痛的功效。

I S S N 1 0 0 8 - 4 2 7 4


知识产权出版社出版



## 权利要求书

---

1、一种治疗带状疱疹的搽剂，其特征在于：它采用龙胆、紫草、雄黄、枯凡、青黛、冰片与酒精浸泡而成；所述的每 1000ml 搽剂，采用龙胆 80—120g、紫草 40—60g 经 50%酒精浸泡 15—25 日后，经过滤，在其过滤液中加入雄黄 80—120g、枯凡 50—70g、冰片 20—40g 的粉末，并加入青黛 10—50g，经混合搅匀配制而成。



# 说明书

## 一种治疗带状疱疹的搽剂

本发明涉及一种治疗带状疱疹的外用搽剂。

经检索有关专利文献，目前尚未检索到与本发明相同的治疗带状疱疹的搽剂。带状疱疹作为一种病毒性皮肤病，多见于春秋季节，祖国医学称为“缠腰火丹”，俗称“蜘蛛疮”，认为由于肝气郁滞，湿热内蕴，或感受毒邪，湿热火毒蕴蓄积聚肌肤而成。现代医学认为此病由水痘一带状病毒所引起。一般先有轻度发热，疲倦无力，全身不适，食欲不振以及患部皮肤灼热感或神经痛等前驱症状。经 1—3 日后，在一定神经分布区域发生不规则的红斑，后出现多数成群豆疱疹并迅速变为水疱，一般在发病后 2—5 日左右不断有新的皮疹陆续出现，数日后水疱内变浑浊化脓，或部分破裂，形成糜烂面。现有治疗带状疱疹一般以止痛、缩短病程和防止继发感染为原则，注射抗生素、干扰素等抗病毒药来达到治疗的目的。我国专利申请号：93108439，名称为：斩龙（带状疱疹）散，公开了一种采用参三七、龙脑等药物混合而成的散剂或膏体，由于膏体在使用时，需用纱布外敷，再用绷带加压固定，从而给实际应用带来很多不便之处。

本发明的目的是要提供一种能有效地治疗带状疱疹，且使用方便的一种治疗带状疱疹的中药搽剂。

本发明的技术方案是这样来实现的：在考虑疗效显著使用方便的基础上，采用龙胆、紫草、雄黄、枯凡、青黛、冰片与酒精浸泡而成；所述的每 1000ml 搽剂，采用龙胆 80—120g、紫草 40—60g 经 50%酒精浸泡 15—25 日后，经过滤，在其过滤液中加入雄黄 80—120g、枯凡 50—70g、冰片 20—40g 的粉末，并加入青黛 10—50g，经混合搅匀配制而成。



治疗时，先将患处用双氧水洗净拭干，再用消毒棉签蘸湿本发明的搽剂涂于患处，每日数次，一般二至七天即可痊愈。

本发明的优点是：由于所述的搽剂中采用了龙胆，从而能起到清热燥湿，泻肝胆火的作用；由于加入了紫草、青黛，从而能清热解毒、凉血、化斑解毒；由于雄黄具有解毒、燥湿的作用，冰片具有通诸窍、散郁火的药效，枯凡有解毒收敛的作用，本方诸药共奏清热散郁、泻火解毒止痛之功；由于所述的搽剂使用方便，疗效显著，所以有着很大的实用和推广价值。

以下将结合实施例对本发明作进一步的描述：

取龙胆 100g，紫草 50g 用 50%医用酒精 1000ml 浸泡 20 日，经滤布过滤后，得药一；

取雄黄 100g，枯凡 60g，冰片 30g 经碾磨用 120 目网筛过筛得药二；

将上述药一、药二、进行混合，加入青黛 30g 并加入 50%酒精至 1000ml，经搅拌混合均匀后即得到本发明的搽剂。使用时，先用双氧水洗净患处并拭干，再用消毒棉签蘸湿本发明的搽剂涂于患处，每日三次，用药后即能止痛，一般二至七天即可痊愈。

以下是本发明的治疗效果和典型病例：

1、经近 10 年来的临床应用观察 118 例，其中男 67 例，女 51 例，年龄最大 89 岁，最小的 12 岁，平均 45 岁，病程最长的 15 天，最短的 2 天，平均 6 天，2000 年 1 月以来临床应用 56 例，其中男 23 例，女 43 例，经使用本发明的搽剂后一般 3 天左右能治愈。

2、典型病例：

(1) 张中玉，女，75 岁，江苏如皋石庄中心卫生院退休医师，2000 年 2 月 2 日下午来诊时，患者述 5 天前头痛，两天后疑为带状疱疹，去某皮防所疹治，确诊为带状疱疹，给予抗病毒、止痛治疗，两日后头痛不见好转，

夜不能寐。经查，患者疼痛面容、头部左侧有约 8—10cm 成簇不规则红色丘疱疹，诊断：带状疱疹。治疗：用本发明的搽剂 50 ml 外搽，一日三次，2000 年 2 月 4 日复诊时，患者述，当时搽用后疼痛减轻，晚上已能安睡，隔日后疼痛已基本消失，复诊时患者精神佳，红斑消退，头部疱疹已干燥枯瘪，显黑色结痂。嘱继续外搽 3 日以巩固疗效。

(2) 刘承基，男，45 岁，江苏如皋石庄镇西元村人，2000 年 6 月 18 日下午就诊时，患者腹痛 2 天，左下腹出现红斑，有少数成群簇集的粟粒状小丘疱疹，诊断：带状疱疹。治疗：用本发明的搽剂 50ml 外搽一日数次。2000 年 6 月 21 日，患者复诊时称 18 日治疗后疼痛减轻，经查局部疱疹已干瘪，红斑消退，呈黑褐色，剩少量丘疱疹，未发现有新疱疹出现，嘱继续外搽以巩固疗效。

(3) 吴其兰，女，71 岁，如皋石庄镇竹岑村人，2000 年 10 月 4 日来就诊时述：8 天前，因腹痛去医院诊治，经 B 超；X 光等检查未查出原因，10 月 4 日发现左腹部有红色斑疹，前来诊治。经检查患者面色灰暗，疼痛呻吟，不思饮食，夜不能寐，口苦，苔黄脉弦，小便短赤，左腰至下腹部约 4×15cm 不规则红色小丘疱疹，诊断：带状疱疹。治疗：用本发明的搽剂外搽，一日数次，并嘱忌食辛辣。10 月 10 日复诊时病者述 10 月 4 日经涂搽剂后 1 小时左右，疼痛减轻，夜晚已能安睡，两天后基本不痛，剩余少量丘疱疹红斑，嘱再涂搽两日巩固疗效。