



MD 2004 G2 2002.09.30

REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat
pentru Protecția Proprietății Industriale

(11) 2004 (13) G2
(51) Int. Cl.⁷: C 07 J 71/00

(12) BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. depozit: a 2001 0098 (22) Data depozit: 2001.04.11	(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: 2002.09.30, BOPI nr. 09/2002
(71) Solicitant: INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A REPUBLICII MOLDOVA, MD	
(72) Inventatori: CHINTEA Pavel, MD; MASCENCO Natalia, MD; BALAȘOVA Natalia, RU; SCUTELNIC Ruslan, MD; GUBCIN Vitalie, RU	
(73) Titular: INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A REPUBLICII MOLDOVA, MD	

(54) Procedeu de obținere a glicozidelor furostanolice

(57) Rezumat:

1
Invenția se referă la chimia bioorganică, și
anume la un procedeu de obținere a glicozidelor
furostanolice, care pot fi utilizate în agricultură
5 pentru stimularea încolțirii semințelor.
Esența invenției constă în aceea că include
prelucrarea semințelor de *Physalis leguminosae* L.
cu soluție de 4% HCl timp de 30 min, înlăturarea
lichidului și spălarea cu apă. Extragerea glicozidelor
10

2
se efectuează cu metanol de 50%. După evaporare
reziduul uscat obținut se dizolvă în etanol, iar
precipitarea produsului finit se efectuează cu
acetonă.
Rezultatul invenției constă în sporirea randa-
mentului produsului finit.
Revendicări: 1

MD 2004 G2 2002.09.30

Descriere:

Invenția se referă la chimia bioorganică, și anume la un procedeu de obținere a glicozidelor furostanolice care pot fi utilizate în agricultură pentru stimularea încolțirii semințelor.

5 Este cunoscut procedeu de obținere a glicozidelor furostanolice care constă în prelucrarea materiei prime vegetale, și anume a semințelor de tomate cu substanță chimică lichidă, înlăturarea lichidului, extragerea glicozidelor cu metanol. Apoi se efectuează evaporarea extractului până la uscare, dizolvarea reziduului și precipitarea produsului finit [1].

10 Procedeu cunoscut nu este suficient de eficace, deoarece produce pierderi de produs carbonic în procesul transformării furostanolilor în analogii lor spirostanolici în virtutea activării fermenților endogeni prin extragerea cu apă.

În plus, procedeu cunoscut este complicat, deoarece separarea cromatografică a extractului pe coloană de silicagel este un proces îndelungat și laborios.

Problema pe care o rezolvă invenția constă în sporirea eficacității procedurii și simplificarea lui.

15 Esența invenției constă în aceea că procedeu propus include prelucrarea materiei prime vegetale cu soluție de 4% HCl timp de 30 min, în calitate de materie primă utilizându-se semințe de *Physalis leguminosae* L. Apoi lichidul se înlătură și reziduul se spală cu apă.

Extragerea glicozidelor se efectuează cu metanol de 50%, după care extractul se evaporează până la uscare și reziduul uscat se dizolvă în etanol, iar precipitarea produsului finit se efectuează cu acetona.

Rezultatul invenției constă în sporirea randamentului produsului finit.

20 *Exemplu de realizare a invenției.*

500 g de semințe mărunțite de *Physalis leguminosae* L. sunt prelucrate cu 1,5 L de soluție de 4% de HCl timp de 30 min, după înlăturarea lichidului se spală cu apă până la reacție neutră și se extrage prin fierbere în balonul cu răcitor cu recipient (2 L de soluție de metanol de 50% timp de 3 ore). Operația se repetă de 3 ori până la extragerea completă a glicozidelor steroidice (cromatografie în strat subțire de silicagel în sistemul de solvenți butanol-etanol-apă în raportul de volume 65:35:10 a stratului inferior). Extrasele amestecate se evaporă până la uscare, remanenta se dizolvă în 50 mL de etanol și produsul final se precipită cu acetona (100 mL), se filtrează pe filtrul Shott și se usucă.

În spectrul IR al sumei de glicozide este prezentată o bandă lată de absorbție în regiunea 900 cm⁻¹.

Randamentul este de 2,1 g.

30 Analiza produselor hidrolizei a glicozidelor furostanolice cu soluție de 5% de H₂SO₄ a demonstrat prezența gitogeninei și diosgeninei, ceea ce dovedește că în calitate de aglicon nativ servesc (25R)-furost-5 α -2 α , 3 β , 22 α , 26-tetraolul și (25R)-furost-5-en, 3 β , 22 α , 26-triolul, iar în calitate de monozaharide – glucoza și galactoză.

Pe cromatogramă în strat subțire în sistemul 1 s-a depistat prezența 22-hidroxi- și 22-O-metoxifizalozidului.

35 Determinarea activității biologice a glicozidelor furostanolice a fost efectuată cu ajutorul semințelor de morcov. În calitate de parametri test au fost utilizate energia de creștere și capacitatea de germinație a semințelor de morcov, cât și roada culturii date.

40 Semințele de morcov ale soiului "Nantschi" se înmoaie în soluții de glicozidă de concentrații 0,001; 0,008; 0,05; 0,1% timp de 24 de ore. Pentru comparație a fost ales preparatul "Ecostim" [2], iar ca martor a servit apa. Capacitatea de germinație în condiții de câmp a fost determinată în eșantionul de 100 de semințe, în 4 repetări randomizate. Evidența capacității de germinație se efectuează până la apariția plantulelor. Suprafața parcelei de control a fost de 7 m². Semințele au fost semănate manual în rânduri cu lungimea de 1,4 m. În decursul vegetației aprecierile vizuale s-au efectuat în corespundere cu "Семена сельскохозяйственных культур" (Москва, Изд-во стандартов, 1978, 168 c.).

Roadă a fost calculată reieșind din cantitatea de rizocarpi obținută de pe parcelă.

Rezultatele obținute sunt prezentate în tabel.

45 Influența glicozidelor furostanolice obținute din semințe de *Physalis leguminosae* L. asupra capacității de creștere a semințelor și roadei morcovului de soi "Nantschi".

Substanța	Concentrația, %	Energia de creștere, %	Capacitatea de germinație, %	Capacitatea de germinație în condiții de câmp, %	Roadă, t/ha	Roadă față de martor, %
Martor (apă)		46	55	43,7	51,2	100,0
Soluția apoasă a preparatului "Ecostim"	0,08	46	56	44,0	55,5	108,4
Soluția apoasă de glicozide furostanolice obținute din semințe de <i>Physalis leguminosae</i> L.	0,1	48	57	44,0	55,5	115,2
	0,08	49	59	53,2	61,9	120,9
	0,005	48	58	45,5	54,4	106,3
	0,001	48	56	47,5	58,0	113,3

MD 2004 G2 2002.09.30

4

Rezultatele obținute denotă faptul că soluția apoasă de 0,08% de glicozide furostanolice din semințe de *Physalis* *leguminosae* L. a sporit energia de creștere a semințelor de morcov cu 3%, iar capacitatea de germinație cu 4-9% și roada cu 20,9%.

5 Deci, procedeul propus sporește randamentul produsului finit, întrucât se evită pierderile lui în procesul transformării furostanolilor în spirostanoli la tratarea materiei prime vegetale cu soluție de 4% HCl.

Totodată, se reduce volumul de lucru, datorită simplificării procedurii care exclude cromatografierea multiplă a extrasului.

10

(57) Revendicare:

15 Procedeu de obținere a glicozidelor furostanolice, care include prelucrarea materiei prime vegetale cu substanță chimică lichidă, îndălăturarea lichidului, extragerea glicozidelor cu metanol, evaporarea extractului până la uscare, dizolvarea reziduului și precipitarea produsului finit, **caracterizat prin aceea, că** în calitate de materie primă vegetală se utilizează semințe de *Physalis* *leguminosae* L., care se prelucrează cu soluție de 4% HCl timp de 30 min, după îndălăturarea lichidului reziduul se spală cu apă, extragerea glicozidelor se efectuează cu metanol de 50%, reziduul uscat se dizolvă în etanol, iar precipitarea produsului finit se efectuează cu acetonă.

20

(56) Referințe bibliografice:

1. Sato H., Sacamura S. A bitter principle of tomato seeds. Isolation and structure of a new furostanol saponin. "Agr. Biol. Chem.", 1973, 37 (2), p. 225-231

Șef Secție:

GUȘAN Ala

Examinator:

BAZARENCO Tatiana

Redactor:

LOZOVANU Maria

RAPORT DE DOCUMENTARE

(21) Nr. depozit: a 2001 0098		
(22) Data depozit: 2001.04.11		
(51) ⁷ : C 01 J 71/00 Alți indici de clasificare: Titlul : Procedeu de obținere a glicozidelor furostanolice (71) Solicitantul : Institutul de Genetică al Academiei de Științe a Republicii Moldova, MD Termeni caracteristici : glicozide furostanolice, obținerea		
I. Minimul de documente consultate (sistema clasificării și indici de clasificare Int. Cl. (7))		
Int. Cl. ⁷ C 07 J 71/00 (MD) 1993-2001 (EA) 1997-2001		
II. Documente considerate ca relevante		
Categoria*	Date de identificare ale documentelor citate si indicarea pasajelor pertinente	Numărul revendicării vizate
A	95-0351	1
A	96-0050	1
☐ Documentele următoare sunt indicate în continuare a rubricii II		☐ Informația referitoare la brevete paralele se anexează
* categoriile speciale ale documentelor consultate:		P - document publicat înainte de data depozitului național reglementat dar după data priorității invocate
A - document care definește statutul general al tehnicii		T - document publicat după data depozitului sau a priorității invocate, care nu aparține stadiului pertinent al tehnicii, dar care este citat pentru a pune în evidență principiul sau teoria care conține baza invenției
E - document anterior dar publicat la data de depozit național reglementar sau după aceasta data		X - document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată nouă sau implicând activitate inventivă
L - document care poate pune în discuție data priorității invocate, poate contribui la data publicării altor divulgări sau pentru un motiv expres (se va indica motivul)		Y - document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată ca implicând activitate inventivă când documentul este asociat cu unul sau mai multe alte documente de aceeași natură, aceasta combinație fiind evidentă pentru o persoană de specialitate
O - document referitor la o divulgare orală, un act de folosire, la o expunere sau orice altă		& - document care face parte din aceeași familie de documente
Data efectuării de documentare		2002.06.10
Examinatorul		Bazarenco Tatiana

ANEXĂ

RAPORT DE DOCUMENTARE

Informația referitoare la brevete paralele		(21) Nr depozit:	
Date de identificare ale documentelor citate în raport	Data publicării	Brevete paralele	Data publicării
1	2	3	4