

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公表特許公報 (A)

(11) 特許出願公表番号

特表2010-505848

(P2010-505848A)

(43) 公表日 平成22年2月25日 (2010.2.25)

(51) Int. Cl.	F I	テーマコード (参考)
A 6 1 K 45/00 (2006.01)	A 6 1 K 45/00	4 C 0 5 7
A 6 1 P 27/02 (2006.01)	A 6 1 P 27/02	4 C 0 8 4
A 6 1 K 31/7076 (2006.01)	A 6 1 K 31/7076	4 C 0 8 6
A 6 1 P 27/06 (2006.01)	A 6 1 P 27/06	
A 6 1 P 43/00 (2006.01)	A 6 1 P 43/00 1 1 1	
審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 28 頁) 最終頁に続く		

(21) 出願番号	特願2009-531464 (P2009-531464)	(71) 出願人	503457367
(86) (22) 出願日	平成19年10月5日 (2007.10.5)		ザ トラストィーズ オヴ ザ ユニヴァーシティー オヴ ペンシルバニア
(85) 翻訳文提出日	平成21年5月26日 (2009.5.26)		アメリカ合衆国, ペンシルバニア州 1 9
(86) 国際出願番号	PCT/US2007/021409		1 0 4, フィラデルフィア, スイート 2
(87) 国際公開番号	W02008/045330		0 0, チェスナット ストリート 3 1 6
(87) 国際公開日	平成20年4月17日 (2008.4.17)		0
(31) 優先権主張番号	60/850, 175	(74) 代理人	100079108
(32) 優先日	平成18年10月6日 (2006.10.6)		弁理士 稲葉 良幸
(33) 優先権主張国	米国 (US)	(74) 代理人	100109346
			弁理士 大貫 敏史

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 眼内圧を低下させるための種交差性 A₃ アデノシン受容体アンタゴニストの効果的送達

(57) 【要約】

【課題】 緑内障などの眼内圧の上昇をもたらす眼疾患を有する個体において眼内圧を低下させる方法を提供する。

【解決手段】 ジヒドロピリジン、ピリジンもしくはピリジニウム塩又はトリアゾロキナゾリン類及び、例えば、ヌクレオシド系 A₃ AR アンタゴニスト MRS-3820 を初めとする A₃ AR アンタゴニスト活性を明確に有するこれらの誘導体を含むアデノシン受容体サブタイプ A₃ (A₃ AR) アンタゴニストを含む医薬組成物を眼内圧低下有効量で上記個体に投与することを含む。さらに、眼内圧を低下させる局所投与される治療用組成物の送達を確実にする方法であって、前眼房への上記組成物の輸送を可能にするために微細針又はマイクロピペットにより患者の眼の角膜バリアを通してチャンネルを物理的に開孔させることを特に必要とする方法が提供される。

【選択図】 図 1

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

眼内圧の上昇を特徴とする眼疾患を有する個体において眼内圧を低下させる方法であって、

アデノシン受容体サブタイプ A₃ アンタゴニストを含む種交差性医薬組成物を眼内圧低下有効量で前記個体に投与する工程を含む方法。

【請求項 2】

前記受容体サブタイプ A₃ アンタゴニストが、ジヒドロピリジン、ピリジンもしくはピリジニウム塩又はトリアゾロキナゾリン類、あるいはアデノシン受容体サブタイプ A₃ アンタゴニスト活性を明確に有するこれらの誘導体を含む、請求項 1 の方法。

10

【請求項 3】

前記方法における前記受容体サブタイプ A₃ アンタゴニストが、MRS-1097、MRS-1191、MRS-1220、MRS-1523、MRS-1292、MRS-1523、MRS-3642、MRS-3771、MRS-3826、MRS-3827、MRS-1220、MRS-1649、LJ-1830、LJ-1831、LJ-1833、LJ-1834、LJ-1835、LJ-1836、LJ-1837 及び MRS-3820 からなる組成物を含む、請求項 1 の方法。

【請求項 4】

前記受容体サブタイプ A₃ アンタゴニストが、2-(2-クロロ-6-(3-ヨードベンジルアミノ)-9H-プリン-9-イル)テトラヒドロチオフェン-3,4-ジオール、即ち、MRS-3820 を含む、請求項 3 の方法。

20

【請求項 5】

さらに前記医薬組成物を局所的、全身的又は経口的に投与することを含む、請求項 3 の方法。

【請求項 6】

さらに医薬組成物を軟膏剤、ゲル剤又は点眼剤として、患者の眼の涙液膜に局所投与することを含む、請求項 5 の方法。

【請求項 7】

さらに前記眼の涙液膜に前記組成物を投与して 0.1 乃至 30 分以内に、前記患者の眼の角膜を微細針又はマイクロピペットで突き刺すことを含む、請求項 6 の方法。

30

【請求項 8】

前記突き刺し工程が、前記眼の眼内圧を低下させる前記組成物の有効性の侵襲的測定の一部である、請求項 7 の方法。

【請求項 9】

侵襲的サーボ・ヌル技術を含む、請求項 8 の方法。

【請求項 10】

眼内圧の上昇が前記患者における緑内障を表す、請求項 1 の方法。

【請求項 11】

眼内圧の上昇を特徴とする眼疾患を有する個体において眼内圧を低下させる治療用組成物の送達を確実にする方法であって、

40

アデノシン受容体サブタイプ A₃ アンタゴニストを含む医薬組成物を眼内圧低下有効量で前記個体の眼の涙液膜に投与すること、及び

前記眼の涙液膜に前記組成物を投与して 0.1 乃至 30 分以内に、前記患者の眼の角膜を微細針又はマイクロピペットで突き刺すことを含む方法。

【請求項 12】

前記受容体サブタイプ A₃ アンタゴニストが、ジヒドロピリジン、ピリジンもしくはピリジニウム塩又はトリアゾロキナゾリン類あるいはアデノシン受容体サブタイプ A₃ アンタゴニスト活性を明確に有するこれらの誘導体を含む、請求項 11 の方法。

【請求項 13】

50

前記方法における前記受容体サブタイプA₃アンタゴニストが、MRS-1097、MRS-1191、MRS-1220、MRS-1523、MRS-1292、MRS-1523、MRS-3642、MRS-3771、MRS-3826、MRS-3827、MRS1220、MRS-1649、LJ-1830、LJ-1831、LJ-1833、LJ-1834、LJ-1835、LJ-1836、LJ-1837及びMRS-3820からなる組成物を含む、請求項11の方法。

【請求項14】

前記受容体サブタイプA₃アンタゴニストが、2-(2-クロロ-6-(3-ヨードベンジルアミノ)-9H-プリン-9-イル)テトラヒドロチオフエン-3,4-ジオール、即ち、MRS-3820を含む、請求項13の方法。

10

【請求項15】

眼疾患を有する個体において眼内圧を低下させる方法であって、

眼内圧を低下させる眼内圧低下有効量のアデノシンサブタイプA₃のインビボでの生成を活性化又は増強する、眼内圧低下有効量の種交差性アデノシン受容体サブタイプA₃アンタゴニストプロドラッグを前記個体に投与する工程を含む方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、眼内圧を低下させるための種交差性薬剤としてのA₃サブタイプアデノシン受容体アンタゴニストの使用、及び標的部位への効果的な送達を確実にする方法を提供する。

20

【背景技術】

【0002】

眼内圧の上昇（IOP）を特徴とする疾患である緑内障は、不可逆的失明の主な原因である（キグリー（Quigley）ほか、ブリティッシュ・ジャーナル・オブ・オプサルモロジー（Br. J. Ophthalmol.）80：p. 389-393（1996年））。眼内圧は、毛様体上皮を通過する房水の流入速度と、前眼房からの流出に対する抵抗とによって決まる。一定の流出抵抗では、圧依存性及び圧非依存性流出量の合計が流入量と一致するまで、流入の増加はIOPを上昇させることになる。通常、IOPが上昇すると、網膜神経節細胞の死及び視神経の萎縮に至る。上昇したIOPを低下させることが、緑内障性失明の発症を遅らせ、その進行を遅延させる方法として現在に至るまで不等価的に文献に記載されている唯一の方策である。流入の背後にある多くの輸送成分が知られている（図1）が、これらの調節については不明のところが多い。

30

【0003】

眼房水は毛様体上皮によって形成され、この上皮は2層の細胞層、即ち、基質（stroma）に面する外側色素上皮（PE）細胞層及び房水と接触する内側非色素上皮（NPE）細胞層を含む。Cl⁻チャネルの活性のベースライン値が低く、移送される液中には塩素陰イオンが支配的な量で存在すること（コウカーブラドス（Coca-Prados）ほか、アメリカン・ジャーナル・オブ・フィジオロジー（Am. J. Physiol.）、268：p. C572-C579（1995年））を考えれば、Cl⁻チャネル活性が房水分泌の律速因子である可能性が強い。したがって、眼中への房水の分泌は、2つの正反対の生理的過程、即ち、NPE細胞による眼中への液分泌及びPE細胞による液再吸収（眼からの分泌）の結果であると考えられる。さらに、非色素毛様体上皮（NPE）細胞により塩素イオン（Cl⁻）がCl⁻チャネルを介して近傍の房水中に放出されると、分泌が増強されるように思われるのに対し、色素毛様体上皮（PE）細胞により近傍の基質へCl⁻が放出されると、正味の分泌が低下するよう思われる（シヴァン（Civan）、カレント・トピックス・イン・メンブランズ（Current Topics in Membranes）45：p. 1-24（1998年）；シヴァン（Civan）、ニュース・イン・フィジオロジカル・サイエンス（News Physiol. Sci.）12：p. 158-162（1997年））。

40

50

【0004】

アデノシンはNPEのCl⁻チャネルを活性化し、これによりCl⁻の放出が可能となることが分かっている（カレ（Carre）ほか、アメリカン・ジャーナル・オブ・フィジオロジー（Am. J. Physiol.）（セル・フィジオロジー（Cell Physiol.）42）273：p. C1354-C1361（1997年））。アデノシン、ATP及びこれらの関連化合物を包含する化合物類であるプリンは、一部Cl⁻チャネル活性の修飾によって房水分泌を調節することができる。NPE細胞及びPE細胞はいずれもATPを細胞外表面に放出し、そこでATPが細胞外酵素によりアデノシンへ代謝され得ると報告されており（ミッチェル（Mitchell）ほか、プロシーディングズ・オブ・ザ・ナショナル・アカデミー・オブ・サイエンス（Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 95：p. 7174-7178（1998年））、両細胞型ともアデノシン受容体（ワックス（Wax）ほか、エクスメントラル・アイ・リサーチ（Exp. Eye Res.）57：p. 89-95（1993年）；ワックス（Wax）ほか、インベスティゲイティブ・オフサルモロジー・アンド・ビジュアル・サイエンス（Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.）35：p. 3057-3063（1994年）；クヴァンタ（Kvanta）ほか、エクスメントラル・アイ・リサーチ（Exp. Eye Res.）65：p. 595-602（1997年））及びATP受容体（ワックス（Wax）ほか、上記文献1993年；シャヒデュラ（Shahidullah）ほか、カレント・アイ・リサーチ（Curr. Eye Res.）16：p. 1006-1016（1997年））を有している。さらに、ウサギのインビトロ研究によってA₂アデノシン受容体と分泌増加及び眼内圧上昇とが関連付けられ（クロッソン（Crosson）ほか、インベスティゲイティブ・オフサルモロジー・アンド・ビジュアル・サイエンス（Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.）37：p. 1833-1839（1996年））、A₁アデノシン受容体とその逆とが関連付けられている（クロッソン（Crosson）、ジャーナル・オブ・ファーマコロジー・アンド・エクスperimental・セラピューティクス（J. Pharmacol. Exp. Ther.）273：p. 320-326（1995年））。分泌ではなく、眼内圧との定性的に同様な関連がカンクイザルにおいて認められている（ティン（Tain）ほか、エクスメントラル・アイ・リサーチ（Exp. Eye Res.）64：p. 979-989（1997年））。

【0005】

また、眼内圧は房水の再吸収を刺激することによっても低下された。原理的には、これは色素細胞層の側底面の塩素チャネルを活性化することにより達成されるとも考えられ、これによって塩素が基質中に放出されて戻ることになる。PE細胞では、これは抗エストロゲン剤タモキシフェンを用いることにより達成されている。

【0006】

あるいは、アデノシン受容体（AR）がIOPを低下させるための有望な標的であった。これは、マウスにおいてA₃アデノシン受容体をノックアウトすると、インビボでIOPが低下することが分かっているからである。インビトロでの観察では、ノックアウトにより誘発されるIOPの低下は、流入の減少によって媒介されることが明らかにされている。公表されている報告を集約すると、以下のことが分かった。即ち、1）アデノシンは、NPE細胞のCl⁻チャネルを活性化する（カレ（Carre）ほか、上記文献、1997年）。2）Cl⁻チャネルの活性化は、A₃ARによって媒介される（ミッチェル（Mitchell）ほか、アメリカン・ジャーナル・オブ・フィジオロジー（Am. J. Physiol.）276：p. C659-C666（1999年））。3）A₃AR活性化Cl⁻チャネルは、全NPE細胞Cl⁻チャネルの主要な部分を構成する（カレ（Carre）ほか、アメリカン・ジャーナル・オブ・フィジオロジー（Am. J. Physiol.）：セル・フィジオロジー（Cell Physiol.）：279：p. C440-C451（2000年））。4）A₃ARアンタゴニストは、マウスの眼のIOPを低下させる（アビラ（Avila）ほか、ブリティッシュ・ジャーナル・

オブ・ファーマコロジー (Br. J. Pharmacol.) 134: p. 241-245 (2001年); アビラ (Avila) ほか、インベスティゲイティブ・オブサルモロジー・アンド・ビジュアル・サイエンス (Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.) 43: p. 3021-3026 (2002年); ヤング (Yang) ほか、カレント・アイ・リサーチ (Curr. Eye Res.) 30: p. 747-754 (2005年)。5) アデノシン受容体サブタイプA₃ (A₃AR) 欠損マウスのIOPは、A₃ARアンタゴニストMRS-1191に反応しない。詳細に述べると、A₃ARアゴニストは、不死化ヒト及び新鮮調製ウシNPE細胞のCl⁻チャネル並びに完全な状態のウサギ虹彩-毛様体の房水指向Cl⁻チャネルを増加させ、又は刺激すると報告されているのに対し、A₃ARアンタゴニストは、毛様体上皮の房水を含む表面に面するNPE細胞のCl⁻チャネル活性を低下させる (カレ (Carre) ほか、上記文献、1997年; ミッチェル (Mitchell) ほか、上記文献、1999年)。これに対し、A₃ARアゴニストは、通常の流出経路の細胞には相対的にほとんど作用を示さない (フライッシュハウザー (Fleischhauser) ほか、ジャーナル・オブ・メンブラン・バイオロジー (J. Membr. Biol.) 193: p. 121-136 (2003年); カール (Karl) ほか、アメリカン・ジャーナル・オブ・フィジオロジー、セル・フィジオロジー (Am. J. Physiol. Cell Physiol.) 288: p. C784-C794 (2005年))。

【0007】

現在、点眼剤として緑内障に処方されている薬剤としては、ピロカルピン、チモロール、ベタキソロール、レボブノロール、メチプラノロール、エピネフリン、ジピペフリン、ラタノプロスト、カルバコール、エコチオフェートなどの強力なコリンエステラーゼ阻害剤及びドルゾラミデット (dorzolamide) などの炭酸脱水酵素阻害剤が挙げられる。緑内障の薬物療法へのこうしたアプローチの多くは眼への流入速度を低下させるものである。しかしながら、今日まで、これらの薬剤のいずれも、部分的に副作用及び投薬スケジュールの不都合のため、満足のいくものではなく、また、種交差性の有効性についてはこれまでに報告されていない。このような次第ではあるが、A₃ARアンタゴニスト化合物が緑内障の治療のためにIOPを低下させるのに有用で種交差性であり、有効性の向上、作用の持続化及び副作用の低減を示すことを立証すること、並びに治療用医薬化合物を眼に投与する特定の方法が他の方法よりも効果的であるかどうかについて調べることも、なお求められ続けている。

【発明の概要】

【課題を解決するための手段】

【0008】

本発明は有効性が向上し、作用が持続化し、副作用が低減した、緑内障治療のために眼内圧を低下させることができる化合物への要望に応えるものであり、さらに、種非依存性の強力なA₃阻害剤を角膜を通過させて送達することによって、アデノシン受容体サブタイプA₃のアンタゴニストに対する反応の種間変動が実質的に避けられることを明らかにするものである。齧歯類の実験動物における良好な反応が、ヒトにおける同様に良好な効果を表すものでもあることが重要である。このことは、マウスが自然発生及び遺伝子操作による突然変異の機能的意味を研究するための好ましい実験動物であるので、特に重要である。したがって、本発明の一実施態様において、眼における眼内圧を低下させる好ましい方法は、アデノシン受容体サブタイプA₃アンタゴニストを含む種交差性医薬組成物を眼内圧低下有効量で対象動物又はヒトに投与する工程を含む。この実施態様の一態様においては、上記A₃受容体アンタゴニストはジヒドロピリジン、ピリジンもしくはピリジニウム塩又はトリアゾロキナゾリン類である。さらに、本発明の範囲内には、これらの部類から選ばれる、明確にA₃受容体アンタゴニスト活性を示す化合物の誘導体も想定されている。

【0009】

特定の実施態様において、上記受容体サブタイプA₃アンタゴニストは、MRS-10

97、MRS-1191、MRS-1220、MRS-1523、MRS-1292、MRS-1523、MRS-3642、MRS-3771、MRS-3826、MRS-3827、MRS-3820、MRS-1220、LJ-1830、LJ-1831、LJ-1833、LJ-1834、LJ-1835、LJ-1836及びLJ-1837の中から選ぶことができる。ヌクレオシド系の種交差性アデノシン受容体（AR）サブタイプA₃アンタゴニストである例示的な薬剤（MRS-3820）の適用について、インビボで眼内圧（IOP）を低下させることにより緑内障患者に対する治療効果を得る本発明の一般的な目的のために以下に説明する。

【0010】

有利なことに、上記医薬組成物は局所的、全身的又は経口的に投与される。好ましくは、この医薬組成物は軟膏剤、ゲル剤、点眼剤又は注射剤である。したがって、それは、角膜が、涙液膜への滴剤の局所適用によって眼の内部にそのような医薬組成物を治療的に送達することに対する実質的なバリアとなるのかどうかを調べることを目的とする。

【0011】

本発明の別の目的、利点及び新規な特徴については、単に例示を目的としたものであり、本発明を決して限定するものではない以下の記載、実施例及び図においてある程度説明するが、ある程度は、以下の検討時に当業者に明瞭に理解されるであろうし、又は発明の実施によって知ることができる。

【0012】

上述の概要及び以下の本発明の詳細な説明は、添付図面と照合して読めばよく理解されよう。しかしながら、本発明は図示の仕組み及び手段に厳密に限定されるものではないことは、理解されたい。

【図面の簡単な説明】

【0013】

【図1】眼の非色素上皮（NPE）及び色素上皮（PE）細胞並びにATP、アデノシン（Ado）及びタモキシフェン（TMX）の房水の移動に対する効果を示す模式図である。Ecto：細胞外酵素、A₃：アデノシン受容体サブタイプA₃

【図2A】NPE細胞のIB-MECA刺激等張性収縮（isotonic shrinkage）に対するA₃アンタゴニストの効果を示すグラフである。図は、A₃選択的アンタゴニストMRS-1097（300nM）が、A₃選択的アゴニストN⁶-（3-ヨードベンジル）-アデノシン-5'-N-メチルウロナミド（IB-MECA）により誘発される収縮を防止した（P<0.01、F分布検定）ことを示す。実線の曲線は単一指数関数を有する最小二乗適合であり、一方、有意な収縮を示さなかったデータセットは点線で結ばれている。

【図2B】NPE細胞のIB-MECA刺激等張性収縮（isotonic shrinkage）に対するA₃アンタゴニストの効果を示すグラフである。図は、A₃選択的アンタゴニストMRS-1191（100nM）が、IB-MECAにより誘発される特徴的な収縮を防止した（n=4、F分布検定でP<0.01）ことを示す。MRS-1191がIB-MECAの非存在下では細胞容積に影響を与えなかったことから、この相互作用の特異性が裏付けられた（n=4）。実線の曲線は単一指数関数を有する最小二乗適合であり、一方、有意な収縮を示さなかったデータセットは点線で結ばれている。

【図3A】NPE細胞のアデノシン刺激等張性収縮（isotonic shrinkage）に対する選択的A₃アンタゴニストの効果を示すグラフである。10μMアデノシンによるアデノシン受容体の非選択的活性化により誘発される特徴的な収縮は、300nMのMRS-1097（n=4）の適用によって防止された（P<0.01、F分布検定）。実線の曲線は単一指数関数を有する最小二乗適合であり、一方、有意な収縮を示さなかったデータセットは点線で結ばれている。

【図3B】NPE細胞のアデノシン刺激等張性収縮（isotonic shrinkage）に対する選択的A₃アンタゴニストの効果を示すグラフである。10μMアデノシンによるアデノシン受容体の非選択的活性化により誘発される特徴的な収縮は、100n

10

20

30

40

50

MのMRS-1191 ($n=3$)の適用によって防止された ($P<0.01$ 、F分布検定)。実線の曲線は単一指数関数を有する最小二乗適合であり、一方、有意な収縮を示さなかったデータセットは点線で結ばれている。

【図3C】NPE細胞のアデノシン刺激等張性収縮 (isotonic shrinkage) に対する選択的 A_3 アントゴニストの効果を示すグラフである。10 μ M アデノシンによるアデノシン受容体の非選択的活性化により誘発される特徴的な収縮は、100 nMのMRS-1523 ($n=3$)の適用によって防止された ($P<0.01$ 、F分布検定)。実線の曲線は単一指数関数を有する最小二乗適合であり、一方、有意な収縮を示さなかったデータセットは点線で結ばれている。

【図4A】NPE細胞の等張容積に及ぼすアデノシン受容体アゴニストの影響を示すグラフである。 A_3 選択的アゴニストIB-MECAは100 nMで速やかな収縮をもたらした ($n=4$ 、 $v_{\infty}=95.6\pm0.2\%$ 、 $\tau=4.5\pm0.6$ 分、F分布検定で $P<0.01$)。これに対し、 A_1 選択的アゴニストN⁶-シクロペンチルアデノシン (CPA) は100 nMでほとんど影響を与えず、3 μ Mでは全く影響しなかった ($n=4$)。実線の曲線は単一指数関数を有する最小二乗適合であり、一方、有意な収縮を示さなかったデータセットは点線で結ばれている。

【図4B】NPE細胞の等張容積に及ぼすアデノシン受容体アゴニストの影響を示すグラフである。100 nMにおいて、 A_2 選択的アゴニストCGS-21680は影響を示さなかったが、 A_3 選択的アゴニストIB-MECAは、この場合も収縮をもたらした ($n=4$ 、F分布検定で $P<0.01$)。実線の曲線は単一指数関数を有する最小二乗適合であり、一方、有意な収縮を示さなかったデータセットは点線で結ばれている。

【図4C】高濃度 (3 μ M) で、 A_2 選択的アゴニストCGS-21680も等張性収縮を誘発した。しかしながら、細胞を選択的 A_3 受容体アントゴニストMRS-1191 (100 nM) とプレインキュベートすると、この作用は無くなった ($n=4$ 、F分布検定で $P<0.01$)。実線の曲線は単一指数関数を有する最小二乗適合であり、一方、有意な収縮を示さなかったデータセットは点線で結ばれている。

【図5】完全な状態のウサギ毛様体上皮を通過する短絡電流 (I_{sc}) に対するIB-MECAの影響を示すグラフである。データ解析の最初の段階として、薬剤の添加直前の20分間のベースライン電流を線形最小二乗解析によってフィッティングさせた。この解析によって得られた線をその薬剤の導入後45分の時点まで外挿した。各電流レスポンスをそれぞれの外挿ベースラインから差し引いて定ゼロ電流近似の共通の初期ベースラインを得た。全ての記録は薬剤導入時 (0時間) に対して正しく位置合わせした。対照 (溶媒)、溶媒を含むIB-MECA及び溶媒について補正したIB-MECAの記録は別々に平均した。反応に対するCl⁻の寄与を特定するためにIB-MECAは常に5 nMのBa²⁺の存在下に添加した。

【図6A】化学構造を示す図である。図は生理的アゴニストのアデノシン、完全アゴニストCL-IB-MECA並びにヌクレオシド誘導体MRS-3771及びMRS-3642の構造を示す。

【図6B】化学構造を示す図である。図はMRS-3820、(2-(2-クロロ-6-(3-ヨードベンジルアミノ)-9H-プリン-9-イル)テトラヒドロチオフェン-3,4-ジオールの構造を示す。

【発明を実施するための形態】

【0014】

房水分泌に影響を与える際のアデノシン (Ado) などの A_3 受容体アゴニストの提案されている作用機構を図1に示した。ATPがPE及び／又はNPE細胞から放出される。次いで、細胞外酵素 (ecto) によってATPがアデノシンに変換される。次に、このアデノシンがNPE細胞の A_3 受容体に結合し、その結果、Cl⁻チャネルが開く。これによって房水の産生が増加し、眼内圧が上昇する。さらに、ATP及びタモキシフェンによって同時刺激すると、PE細胞からのCl⁻流出が活発になり、房水形成の正味の減少がもたらされる。ATPはPE細胞の P_2 受容体に作用し、Cl⁻チャネルの開孔を促

10

20

30

40

50

進し、房水産生を減少させることにより眼内圧の低下をもたらす。

【0015】

本発明には、等張液中の細胞容積測定により求められるNE細胞の種交差性収縮を、アデノシン受容体サブタイプA₃アンタゴニスト（本明細書では「A₃アンタゴニスト」と呼ぶ）が抑制するという観察が含まれる。この細胞収縮の抑制は、眼内圧の低下をもたらすことになる、NPE細胞膜を通しての房水分泌の正味の低下を意味する（図1）。こうしたA₃受容体はヒト及びウサギのNPE細胞に存在し、アデノシンによるNPE塩素（Cl⁻）チャネルの活性化の基礎を構成している。PE細胞の収縮は、PE細胞膜から基質への房水の正味の再吸収の刺激を意味しており、これによって房水形成の正味の低下及び眼内圧の低下をもたらされる（図1）。よって、こうしたA₃選択的アデノシン受容体はNPE細胞の塩素チャネル活性を増大させ、この受容体をA₃アンタゴニスト又はその関連化合物によりブロックすると、塩素チャネル活性及び房水中へのNPE細胞による分泌が低下する。そのため、A₃アンタゴニストは、緑内障及び眼内圧を低下させることが望まれる眼の他の異常状態の種交差性治療剤として、眼内圧を低下させるために用いることができる。

【0016】

完全な状態のウサギ毛様体上皮を通過する短絡電流、懸濁培養ヒトNPE細胞の細胞容積並びにパッチクランプした培養ヒト及び新鮮ウシNPE細胞からの全細胞電流の測定から、アデノシン受容体を占拠すると哺乳動物のNPE細胞におけるCl⁻分泌が刺激されることが明らかにされている（カレ（Carre）ほか、上記文献、1997年；米国特許第6,528,516号）。下記の実施例に示したデータから明らかなように、こうした効果はA₃受容体によって媒介される。A₃受容体はヒトHCE細胞（ヒトNPE細胞の細胞株）及びウサギ毛様体のいずれにも存在する。

【0017】

A₃選択的アゴニストIB-MECA（N⁶-（3-ヨードベンジル）-アデノシン-5'-N-メチルウロナミド）はBa²⁺の存在下でウサギ虹彩毛様体を通過する短絡電流を増大させたが、これはNPE細胞からのCl⁻の流出が増大することと一致した変化である。Cl⁻コンダクタンスを特定するためのグラミシジンの存在下で、IB-MECAはヒトHCE細胞を用量依存性に収縮させ、そのK_d値約55nMは、100nMのIB-MECAで心筋細胞のA₃受容体が刺激されることと一致している（シャヒデュラ（Shahidullah）ほか、カレント・アイ・リサーチ（Curr. Eye Res.）16：p. 1006-1016（1997年））。高度に特異的なA₃アゴニストCl⁻IB-MECAもグラミシジンの存在下でHCE細胞の収縮をもたらした。グラミシジンは容易に細胞膜を仕切って陽イオン選択的孔を形成し、容積調節の研究に広く用いられている（ホフマン（Hoffmann）ほか、「インタラクション・オブ・セル・ボリューム・アンド・セル・ファンクション（Interaction of Cell Volume and Cell Function）」ラング（Lang）ほか編、スプリングル（Springer）、ハイデルベルグ（Heidelberg）ドイツ、p. 188-248、ACEPシリーズ（ACEP Series）14（1993年））。こうした条件下では、細胞内Cl⁻の放出が低浸透圧性（シヴァン（Civan）ほか、インベスティゲイティブ・オフサルモロジー・アンド・ビジュアル・サイエンス（Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.）35：p. 2876-2886（1994年））及び等張性細胞収縮（カレ（Carre）ほか、上記文献、1997年）のいずれにおいても律速因子になる。

【0018】

さらに、A₃アンタゴニストMRS-1097及びMRS-1191は、A₁及びA_{2A}受容体に対するそのK_iよりもはるかに低い濃度でIB-MECAにより誘発される収縮を防止した。A₁アゴニストCPAは細胞容積に対して一定した効果を示さなかった。A_{2A}アゴニストCGS-21680は低濃度では効果を示さなかった。CGS-21680の収縮に対する効果はA₃受容体に対するK_i値よりも500倍高い濃度で検出され

たに過ぎず、その効果はA₃アンタゴニストMRS-1191によってブロックされた。A₃アンタゴニストMRS-1097、MRS-1191及びMRS-1523は10 μMのアデノシンにより生じる収縮をブロックした。本発明者らはMRS-1523、MRS-3642、MRS-3771、MRS-3826、MRS-1649及びMRS-3827をそれぞれ試験して、これらがマウスでIOPを低下させることを見出した。MRS-1220並びにヌクレオシドLj-1830、Lj-1831、Lj-1833、Lj-1834、Lj-1835、Lj-1836及びLj-1837（これら全てはNIHのL. S. ジョンウン（Jeong）、韓国により合成された）も有効である。したがって、さらに、A₃受容体アンタゴニスト活性を明確に有する、ジヒドロピリジン、ピリジンもしくはピリジニウム塩又はトリアゾロキナゾリン類の誘導体も本発明の範囲内に想定されている。以上の観察結果を総合すると、ヒトNPE細胞のHCE株によるCl⁻放出のアデノシン刺激活性化は、主にアデノシン受容体サブタイプA₃の占拠によって媒介されることが分かる。

【0019】

一実施態様において、NIHのL. S. ジョンウン（Jeong）、韓国により合成されたA₃アンタゴニストMRS-3820（2-（2-クロロ-6-（3-ヨードベンジルアミノ）-9H-プリン-9-イル）テトラヒドロチオフェン-3, 4-ジオール）は、250 μM（マイクロモル）の局所適用液滴濃度を用いて正常マウスで非侵襲的に試験したところ、最初の適用後20分以内に眼内圧（IOP）を有意に低下させた。投与後30分ではさらに大きな低下が認められた（16.7 ± 1.1 mmHgのベースラインから4.2 ± 0.7 mmHg、対応のある t-検定でp < 0.001）。本発明の方法のポイントは、（時間又は大きさに関して）定量的ではなく、定性的であることにある。この場合の「有意に」とは、少なくとも< 0.05 フォローの測定可能なIOPの低下を意味し、これはこの用語の通常受け入れられている定義である。有意な変化とは、IOPが前処置状態から少なくとも5%又は少なくとも10%又は少なくとも20%又は少なくとも30%又は少なくとも50%又は少なくとも60%又は少なくとも75%又は少なくとも90%、並びに最大99%の差だけ低下する変化である。以下のデータから明らかになるが、通常5乃至10分又は15分又は20分又は25分又は30分又は、最も多くの場合35分以上、最大45分又は最大1時間の全測定期間にわたって、MRS 3830は眼内圧を種交差性に有意に低下させた。IOPの変化は統計的に有意であったが、このような効果が単に偶然に観察され得る確率は1/20未満（P < 0.05）であった。さらに、下記でより詳細に説明され、種非依存性の強力なA₃阻害剤を送達してCl⁻チャネルを活性化することにより非色素毛様体上皮（NPE）細胞を積極的に収縮させることを支持することになるが、このIOP低下を明確な「種非依存性」作用として利用した。

【0020】

「種交差性」及び「種非依存性」は、通常の意味、即ち、得られるデータが、選択した試験動物の種と無関係であり、その結果が全く文字通り種間の差を超えているという意味で用いられる用語である。このA₃受容体アンタゴニストのプロドラッグ体も眼への投与が想定されており、これは次いで活性アンタゴニストへ転換され、さらにこれが眼内圧を低下させた。

【0021】

別の実施態様において、A₃アンタゴニストのヨウ化2, 4-ジエチル-1-メチル-3-（エチルスルファニルカルボニル）-5-エチロキシカルボニル-6-フェニルピリジウム（NRS-1649）を用いて眼内圧を低下させた。MRS化合物類の合成については概ね米国特許第6, 528, 516号に開示されており、これは引用により本明細書に組み込まれている。代表的なMRS化合物である3, 5-ジアシル-1, 2, 4-トリアルキル-6-フェニルピリジニウム誘導体は極めて高い水溶性（43 mM）を示し、かつ、容易にエーテルへ抽出することができる。さらに、この化合物のプロドラッグ体である対応する1-メチル-1, 4-ジヒドロピリジンは、組織ホモジネートの存在下にインビトロで酸化されて化合物MRS-1649を形成することができる。したがって、A₃

受容体アンタゴニストのプロドラッグ体を眼に投与し、次いで、これを活性アンタゴニストに変換させ、これにより眼内圧を低下させることができることが想定されている。

【0022】

以下の実施例で説明する具体的なA₃受容体アンタゴニストであるMRS-1097 (3-エチル5-ベンジル-2-メチル-6-フェニル-4-スチリル-1, 4-(±)-ジヒドロピリジン-3, 5-ジカルボキシレート)、MRS-1191 (3-エチル5-ベンジル-2-メチル-6-フェニル-4-フェニルエチニル-1, 4-(±)-ジヒドロピリジン-3, 5-ジカルボキシレート) (ジャンほか、ジャーナル・オブ・メディシナル・ケミストリー (J. Med. Chem.) 40: p. 2596-2608 (1997年))、MRS-1523 (リーほか、ジャーナル・オブ・メディシナル・ケミストリー (J. Med. Chem.) 42: p. 706-721 (1999年)) 及びMRS-3820 (2-(2-クロロ-6-(3-ヨードベンジルアミノ)-9H-プリン-9-イル) テトラヒドロチオフェン-3, 4-ジオール) の他に、眼内圧を低下させる任意のA₃受容体アンタゴニスト又はそのアナログも本発明の範囲内にある。本発明に用いるための他のA₃受容体アンタゴニストとしては、ヤコブソン (Jacobson) (トレンズ・イン・ファーマコロジカル・サイエンシズ (Trends Pharmacol. Sci.) 19: p. 184-191 (1998年)) に記載されているものがあり、MRS-1334 (3-エチル5-(4-ニトロベンジル)-2-メチル-6-フェニル-4-フェニルエチニル-1, 4-(±)-ジヒドロピリジン-3, 5-ジカルボキシレート)、MRS1067 (3, 6-ジクロロ-2'- (イソプロポキシ) -4'-メチルフラボン)、MRS-1220 (9-クロロ-2-(2-フリル)-5-フェニルアセチルアミノ-[1, 2, 4]-トリアゾロ[1, 5-c]キナゾリン)、L249313 (6-カルボキシメチル-5, 9-ジヒドロ-9-メチル-2-フェニル-[1, 2, 4]-トリアゾロ[5, 1-a][2, 7]ナフチリジン) 及びL268605 (3-(4-メトキシフェニル)-5-アミノ-7-オキソトリアゾロ[3, 2]ピリミジン、VUF8504 (4-メトキシ-N-[2-(2-ピリジニル) キナズジン-4-イル] ベンズアミド) などが挙げられる。

【0023】

以下に示したデータは、NPE細胞の収縮をブロックし、PE細胞の収縮を促進する種々の種交差性薬剤の能力を示している。これらの薬剤の正味の効果は、インビボで眼内圧を低下させることである。眼内圧を低下させるためのA₃受容体アンタゴニストの4つの化学物質クラス、即ち、ジヒドロピリジン類 (例えば、MRS 1097、MRS 1191)、ピリジン類、ピリジニウム塩類 (例えば、化合物23 (シエ (Xie) ほか、ジャーナル・オブ・メディシナル・ケミストリー (J. Med. Chem.) 42: p. 4232-4238 (1999年)) 及びトリアゾロキナゾリン類 (例えば、MRS1220 (プグリエセ (Pugliese) ほか、ブリティッシュ・ジャーナル・オブ・ファーマコロジー (Br. J. Pharmacol.) 147: p. 524-532 (2006年))、並びにA₃ARアンタゴニスト活性を有するこれらの誘導体 (例えば、トリアゾロキナゾリン誘導体MRS1220及びヌクレオシドLJ-1830、LJ-1831、LJ-1833、LJ-1834、LJ-1835、LJ-1836及びLJ-1837) の使用も本発明の要旨の範囲内に想定されている。これらのクラスの化合物についてはPCT/W097/27177及び米国特許第6, 528, 516号にも開示されている。

【0024】

化合物がA₃受容体アンタゴニストとして作用することができるかどうかの判定は、標準的な薬理学的結合アッセイを用いておこなうことができる。しかしながら、A₃ARアンタゴニストのIOP低下効果が治療対象の種とは無関係であることを立証する試験を着手するには、小さなマウスの眼におけるIOPの変化の信頼できる測定を可能にする方法が必要であった。そこで、小さなマウスの眼に対して本発明者らが開発した侵襲的サーボ・ヌル技術によってマウスIOPに対するA₃ARアンタゴニストの効果を測定した。

この技術では先端径が約5マイクロメートルの細い中空ガラス針で角膜を突き刺す必要がある。この侵襲的サーボ・ヌル技術（アビラ（Avila）ほか、上記文献、2001年）を用いて正常マウスで認められたIOPの比較的大きな（約5mmHgの）低下から、上記で示したように、A₃アンタゴニストは緑内障患者を治療するためのインビボ治療用化合物として適応となることが示唆されている。しかしながら、別の2つの観察結果が注目された。第一に、サルにおいてA₃ARアンタゴニストを局所適用すると、IOPは極めてわずかに低下するに過ぎなかった（オカムラ（Okamura）ほか、バイオオーガニック・アンド・メディシナル・ケミストリー・レター（Bioorg. Med. Chem. Lett.）14（14）：p. 3775-3779（2004年））が、この場合の測定は角膜を穿刺することなく非侵襲的に行われたことである。第二に、A₃ARアンタゴニストの局所適用に対するマウスIOPの反応は、侵襲的サーボ・ヌル技術で測定したマウスでは他の哺乳動物に比し、はるかにより速やかであった（アビラ（Avila）ほか、上記文献、2001年、2002年；パング（Pang）ほか、エクスメタル・アイ・リサーチ（Exp. Eye Res.）80（2）：p. 207-214（2005年））ことである。この第二の知見については下記の実施例1でさらに詳細に説明する。

10

【0025】

抗エストロゲン剤と、ATPもしくはNPE細胞からのATP放出を促進することができる任意の化合物との併用により、眼内圧を低下させることについても、これ自体又はA₃アンタゴニストなどとの更なる併用も想定されている。眼内圧を低下させるためのカルモデュリンアンタゴニストの使用も本発明の範囲内にあり、このようなアンタゴニストとしては塩酸カルミダゾリウム、カルモデュリン結合ドメイン、クロールプロマジンHCl、メリチン、フェノキシベンザミンHCl、ジマレイン酸トリフロペラジン、W-5、W-7、W-12及びW-13が挙げられるが、これらに限定されるものではない。これらの化合物はカルビオケム社（Calbiochem）（サンディエゴ（San Diego））、カリフォルニア州から入手できる。眼内圧の低下が確認された上記化合物のアナログの使用も本発明の範囲内にある。

20

【0026】

これらの薬剤は、緑内障などの、眼内圧の上昇に伴って生じる、又はこれが原因となる眼疾患を治療するのに用いることができる。こうした薬剤は、IOPが上昇している哺乳動物又は他の動物、好ましくはヒトへの投与用の薬剤を製造するための従来の方法に従って加工することができる。本発明の対象としている患者又は対象（本明細書ではこれらを総称して「個体」と呼ぶ）には、緑内障として認識される病状をもたらすタイプの眼のIOP上昇を患っているか、その素因を有する任意の動物又はヒトを含める。

30

【0027】

これらの薬剤は、通常賦形剤、即ち、これら薬剤と有害に反応しない、非経口的、経腸的（例えば、経口的）又は局所適用に適した医薬用として許容可能な有機又は無機担体物質と混合して用いることができる。好適な医薬用として許容可能な担体としては、水、塩溶液、アルコール、アラビアゴム、植物油、ベンジルアルコール類、ポリエチレングリコール類、ゼラチン、乳糖、アミロース、澱粉などの炭水化物、ステアリン酸マグネシウム、タルク、ケイ酸、粘性パラフィン、香油、脂肪酸モノグリセリド及びジグリセリド類、ペンタエリスリトール脂肪酸エステル類、ヒドロキシメチルセルロース、ポリビニルピロリドンなどが挙げられるが、これらに限定されるものではない。こうした製剤は滅菌し、必要に応じて、助剤、例えば、その活性薬剤と有害に反応しない滑沢剤、防腐剤、安定剤、湿潤剤、乳化剤、浸透圧に影響を与えるための塩、緩衝剤、着色、矯味矯臭及び／又は芳香剤などと混合することができる。また、これらは、所望の場合、他の活性薬剤、例えば、ビタミン類と組み合わせることができる。

40

【0028】

非経口的適用の場合、注射用滅菌溶液、好ましくは油性溶液もしくは水溶液、及び懸濁液、乳濁液又は坐剤を含む埋込剤が特に好適である。アンプル剤は便利な単位投与形態で

50

ある。経腸的適用の場合、錠剤、液剤、ドロップ剤、坐剤又はカプセル剤が特に好適である。加糖ビヒクル使用の場合、シロップ剤、エリキシル剤などを用いることができる。リポソーム、又は活性薬剤が、例えば、マイクロカプセル化、複合コーティングなどによって段階的分解性コーティングで保護されているものなどの持続放出及び制御放出組成物を処方することができる。また、薬剤を凍結乾燥して注射用製剤を調製することも可能である。

【0029】

局所適用の場合、局所適用に適合性の担体を含み、好ましくは水より大きい動的粘度を有する粘性乃至半個体又は個体形態である非噴霧可能形態が用いられる。好適な製剤としては液剤、懸濁剤、乳剤、クリーム剤、軟膏剤、散剤、リニメント剤、膏薬、エアロゾル剤などが挙げられるが、これらに限定されるものではない。これらは、必要に応じて、滅菌され、又は助剤、例えば、防腐剤、安定剤、湿潤剤、緩衝剤もしくは浸透圧、眼透過性などに影響を与える塩と混合する。局所適用の場合、活性成分が、好ましくは固体もしくは液体不活性担体物質との組合せで、スクイーズボトルに又は加圧された揮発性、通常ガス状の噴射剤、例えばフレオンと混合して包装されている噴霧可能なエアロゾル製剤も好適である。

【0030】

好ましい実施態様においては、薬剤を、点眼剤、眼用ゲル剤及び眼軟膏剤を含む、眼に投与するのに適した医薬製剤に製剤化する。最近ワン（Wang）ほか、エクスメントル・アイ・リサーチ（Experim. Eye Research）85：p. 105-112（2007年）に報告されている、標的領域への局所適用薬物の通過をブロック又は阻害する角膜の最近発見されたバリア効果についても留意されたい。この効果は、動物又はヒト患者の眼へIOP低下薬を送達する際に、医療関係者によって考慮される必要があると考えられる。

【0031】

全身性投与の場合、本発明による薬剤の投与量は通常、約 $0.1 \mu\text{g}/\text{kg}$ 乃至 $10 \text{mg}/\text{kg}$ 、好ましくは約 $10 \mu\text{g}/\text{kg}$ 乃至 $1 \text{mg}/\text{kg}$ である。局所投与の場合、約 0.000001% 乃至 10% 、好ましくは約 0.1% 乃至 4% の活性成分の投与量が想定されている。いうまでもなく、薬剤の実際の好ましい量は使用する具体的な薬剤、疾患の重症度、処方される具体的な組成物、適用様式及び治療対象の種によって異なることになる。所与の宿主に対する投与量は、通常の考慮事項を用いて、例えば、対象化合物及び既知の薬剤の異なる活性を、例えば、適切な通常の薬理学的プロトコルによって通例通り比較することにより決定することができる。こうした薬剤は、1日当たり1回未満（例えば、1日おきに）乃至1日当たり4回投与する。

【0032】

本発明を、以下の限定されない具体例を参照することによってさらに明確化する。本発明によって含まれる定義並びに基本的な技術を実施するための方法及び手段が記載されている分子生物学の標準的な教科書を参照されたい。本発明の目的から逸脱したりその範囲を狭めたりすることなく、材料及び方法の両方に対して多くの修正を行うことができることは、当業者に明瞭に理解されよう。

【実施例】

【0033】

以下の実施例では、実施例1乃至3で、それぞれ2つの課題について説明する。第一は、IOP低下薬を涙液膜に点滴剤として局所適用した場合、そのような薬物の眼の内部への治療的送達に対して角膜が実質的なバリアとなるかどうかを明らかにすることである。第二は、投与したアンタゴニストに対するアデノシン受容体サブタイプ A_3 の反応に、種間変動が存在するかどうか、即ち、この反応が非依存性であるかどうかを明らかにすることである。なぜなら、このような確認なしには、齧歯類実験動物で良好な反応が得られても、そのことが必ずしもヒトで同様に良好な効果が得られることを保証しないからである。以下の実施例では、特定の材料及び方法を、多くの場合、米国特許第6,528,51

6号に開示されているような、これまでに報告された実験に使われた材料及び方法に相当する仕方で用いる。

【0034】

総じて、数値データは平均値 ± 1 S Eで示す。実験回数は記号Nで示す。実験及びベースライン測定値が同じ平均値及び分布を共有するとの帰無仮説は、表に示したように、スチューデントt-検定を用い、F分布の有意上限によって検定した。このt-検定は単一平均間又は単一適合パラメータ間で有意性を比較するために適用した。F分布を適用することにより、各種懸濁液における容積測定値の経時変化が、単一のデータ点群を反映することができるかどうかを検定した。

【0035】

材料：

グラミシジン、アデノシン、2-クロロアデノシン、タモキシフェン、ATP、 17α 及び β エストラジオール、DiC₈、カルバコール、アトロピン、ヒスタミン並びにトリフルオベラジンは、シグマ・ケミカルズ社 (Sigma Chemicals) (セントルイス (St. Louis)、ミズーリ州) から入手した。CPA (N⁶-シクロペンチルアデノシン)、CGS-21680、IB-MECA、Cl-IB-MECA及びMRS-1191 (3-エチル5-ベンジル-2-メチル-6-フェニル-4-フェニルエチニル-1, 4-($\pm$)-ジヒドロピリジン-3, 5-ジカルボキシレート) はリサーチ・バイオケミカルズ・インターナショナル社 (Research Biochemicals International) (ナティック (Natick)、マサチューセッツ州) から入手した。フラ-2はモレキュラー・プローブズ社 (Molecular Probes) (ユージーン (Eugene)、オレゴン州) から購入した。MRS-1097、MRS-1523及びMRS-3820は、ケネスA. ヤコブソン (Kenneth A. Jacobson) 博士 (米国国立衛生研究所) 及びブルースL. リャン (Bruce L. Liang) 博士 (ペンシルベニア大学) により提供された。化合物Cl-IB-MECA (MH-C-7-08、ロット番号CMVII I-12) は、米国国立精神保健研究所化学合成プログラム、契約N01MH30003の一部としてリサーチ・バイオケミカルズ・インターナショナル社 (Research Biochemicals International) により提供され、フラ-2 AMはモレキュラー・プローブズ社 (Molecular Probes, Inc.) (ユージーン、オレゴン州) から入手した。NPPB [5-ニトロ-2-(3-フェニルプロピルアミノ) ベンゾエート] 及びスタウロスポリンは、バイオモル・リサーチ・ラボラトリーズ社 (Biomol Research Laboratories, Inc.) (プリマス・ミーティング (Plymouth Meeting)、ペンシルベニア州) から入手した。

【0036】

細胞培養：

HCE (ヒト毛様体上皮 (human ciliary epithelial)) 細胞株 (カレ (Carre) ほか、上記文献、1997年) は、成人上皮の初代培養から得られた不死化NPE細胞株である。細胞は10%ウシ胎仔血清 (FBS、A-1115-L、ハイクローン・ラボラトリーズ社 (HyClone Laboratories, Inc.)、ローガン (Logan)、ユタ州) 及び50 μ g/ml ゲンタマイシン (#15750-011 ギブコBRL社 (Gibco BRL)、グランドアイランド、ニューヨーク州) を含有するダルベッコ改変イーグル培地 (DMEM、#11965-027、ギブコBRL社) において5% CO₂ 中37℃で増殖させた (ワックス (Wax) ほか、エクスメントル・アイ・リサーチ (Exp. Eye Res.) 57: p. 3057-3063 (1993年) ; ヤントルノ (Yantorno) ほか、エクスメントル・アイ・リサーチ (Exp. Eye Res.) 49: p. 423-437 (1989年))。この増殖培地のオスモル濃度は328 mOsmであった。細胞は6乃至7日毎に継代し、継代後8乃至13日に集密となった後に実験に用いた。ウシ色素毛様体上皮の初代培養からの不死化PE細胞株も適合条件下で増殖させた。

10

20

30

40

50

【0037】

等張溶液中における細胞容積の測定：

PE及びNPE細胞の容積を測定した。その理由は、液の移動がPE及びNPE細胞容積のそれぞれの変化の根底にあるからである。また、このことは、房水の分泌の根底にある液の移動と同じであると考えられる（図1）。

【0038】

細胞をトリプシン処理（ヤントルノ、上記文献）して単一のT-75フラスコから採取した後、上記HCE細胞又はウシ細胞のDMEM（又は、適切な場合、Cl⁻不含培地）懸濁液の0.5mlアリコート（各mM単位で）110.0のNaCl、15.0のHEPES [4-（2-ヒドロキシエチル）-1-ピペラジンエタンスルホン酸]、2.5のCaCl₂、1.2のMgCl₂、4.7のKCl、1.2のKH₂PO₄、30.0のNaHCO₃及び10.0のグルコースを含有する、pH7.4及びオスモル濃度298乃至305mOsmの各試験溶液20mlに添加した。細胞の平行アリコートを同じ日に検討した。1つのアリコートは通常、対照として用い、その他は懸濁時に種々の実験条件にさらした。対照及び実験アリコートには常に同量の溶媒ビヒクル（ジメチルホルムアミド、DMSO又はエタノール）を添加した。これらの懸濁液の検討順序を変えることにより、系統的な時間依存性アーチファクトを排除した（シヴァン（Civan）ほか、エクスメントル・アイ・リサーチ（Exp. Eye Res.）54：p. 181-191（1992年）；シヴァンほか、1994年）。

【0039】

等張懸濁液の細胞容積を100µmアパーチャを用い、クーラー計数器（モデルZBI-チャネライザー（Channelyzer）II）で測定した（シヴァンほか、上記文献、1994年）。以前に報告されたように（ワックスほか、上記文献、1993年）、懸濁液の細胞容積（ v_c ）は分布関数のピークとした。細胞収縮は、時間（ t ）の関数として、単一指数関数：

$$v_c = v_{28} + (v_0 - v_\infty) - [e^{-(t-t_0)/\tau}] \quad (1)$$

であって、式中、 v_∞ は定常状態細胞容積、 v_0 はフィッティング対象の経時変化の最初の時点（ t_0 ）の細胞容積、及び τ は収縮の時定数であるものとする関数にフィッティングさせた。データ処理を目的として、データを、等張容積100%とした最初の時点に規準化した。フィット（fits）は非線形最小2乗法回帰解析により得られ、 v_∞ 及び τ を変数とすることが可能となった。

【0040】

アデノシンがNPE細胞のCl⁻チャンネルを活性化することにより、等張細胞収縮を引き起こすことを示した以前の研究（カレ（Carre）ほか、上記文献、1997年）では、使用されたアデノシンの濃度はアデノシン受容体サブタイプA₁、A_{2A}、A_{2B}又はA₃を活性化するのに十分高かった。これらの受容体を識別するために、これらの受容体を選択的な一連のアゴニスト及びアンタゴニストを用いる実験を繰り返した。グラミジンの存在下では、A₃アゴニストIB-MECAは濃度依存性に細胞を収縮させた。IB-MECA誘発収縮の見掛けのK_dは55±10nMであった。IB-MECAはA₃受容体の高度に選択的なアゴニストであり、このA₃受容体に対するK_iは、A₁又はA_{2A}受容体に対するその50分の1以下である（ガローロドリゲス（Galloro-Rodriguez）ほか、ジャーナル・オブ・メディシナル・ケミストリー（J. Med. Chem.）37：p. 636-646（1994年）；ヤコブソン（Jacobson）ほか、上記文献、1995年；ヤコブソン（Jacobson）ほか、FEBSレターズ（FEBS Lett.）336：p. 57-60（1993年））。

【0041】

A₃選択的アンタゴニストがIB-MECAによってもたらされる推定A₃媒介収縮をブロックすることができるかどうかについても調べた。懸濁液の平行アリコートを、ヒトA₁/A_{2A}/A₃受容体への結合のK_i値（nM単位で）が5,930/4,770/108である（ヤコブソン（Jacobson）ほか、ニューロファーマコロジー（Ne

u r o p h a r m a c o l .) 36 : p . 1157-1165 (1997年)) 選択的 A_3 選択的アンタゴニストの MRS-1097 とプレインキュベートした。300 nM の MRS-1097 と2分間プレインキュベートすると、100 nM の IB-MECA がその特性として誘発する等張収縮がブロックされた (図2A) 。ヒト $A_1/A_{2A}/A_3$ 受容体への結合の K_i 値 (nM 単位で) が 40, 100 / >100, 000 / 31.4 である別の高度に選択的な A_3 アンタゴニスト MRS-1191 も使用した。100 nM の MRS-1097 と2分間プレインキュベートすると、100 nM の IB-MECA に対するその後の反応が阻止された (図2B) 。

【0042】

アデノシン受容体に到達する生理的アゴニストは、毛様体上皮細胞による ATP の放出及び細胞外酵素活性から生じるヌクレオシドのアデノシンそのものであると思われる (ミッチェル (M i t c h e l l) ほか、上記文献、1998年) 。アデノシンは、培養ヒト N P E 細胞の等張収縮を3乃至10 μ M の EC₅₀ で誘発する (シヴァン (C i v a n) ほか、上記文献、1997年) 。この濃度範囲では、アデノシンはアデノシン受容体の4種のサブタイプ全ての非選択的アゴニストとしても作用する (フレドホルム (F r e d h o l m) ほか、ファーマコロジカル・レビューズ (P h a r m a c o l . R e v .) 46 : p . 143-156 (1994年) ; フレドホルム (F r e d h o l m) ほか、トレンドズ・イン・ファーマコロジカル・サイエンス (T r e n d s P h a r m a c o l . S c i .) 18 : p . 79-82 (1997年)) 。図3に示したように、100 nM

の A_3 選択的アンタゴニスト MRS-1191 (図3B) 又は300 nM の A_3 選択的アンタゴニスト MRS-1097 (図3A) と2分間プレインキュベートすると、10 μ M アデノシンがその特性としてもたらす収縮がブロックされた。ヒト $A_1/A_{2A}/A_3$ 受容体への結合の K_i 値 (nM 単位で) が 15, 600 / 2, 050 / 19 である (リー (L i) ほか、ジャーナル・オブ・メディシナル・ケミストリー (J . M e d . C h e m .) 41 : p . 3186-3201、1998年) A_3 アンタゴニストの MRS-1523 もアデノシンの作用を排除した。

【0043】

したがって、特異的な A_3 アンタゴニストが非特異的なアデノシンに対する反応を阻害することができることから、その他の受容体が Cl^- チャネルの活性化に寄与することは極めて少ないことが示唆される。このことをさらに調べるために、 A_1 及び A_{2A} アゴニストの作用を調べた。CPA は A_1 受容体に対する K_i が 0.6 nM である A_1 選択的アゴニストである。しかしながら、CPA は30 nM 及び1 μ M (データは示されていない、N=3) 及び3 μ M (図4A) で有意な収縮を生じなかった。100 nM という中間濃度では有意性の不確かなわずかで緩徐な作用が検出された (図4A) 。 A_3 サブタイプに対する CPA の K_i が 43 nM である (クロッツ (K l o t z) ほか、上記文献) ことを考えると、 A_3 受容体との多少の交差反応性は期待できるかも知れない。CGS-21680 は、 A_{2A} 受容体に対して22 nM の IC₅₀ 値を有する (ハッチソン (H u t c h i s o n) ほか、ジャーナル・オブ・ファーマコロジー・アンド・エクスペリメンタル・セラピューティクス (J . P h a r m a c o l . E x p . T h e r .) 251 : p . 47-55、1989年; ジャビス (J a r v i s) ほか、ジャーナル・オブ・ファーマコロジー・アンド・エクスペリメンタル・セラピューティクス (J . P h a r m a c o l . E x p . T h e r .) 253 : p . 888-893、1989年) 、広く用いられている A_{2A} アゴニストである。CGS-21680 は100 nM 濃度では検出可能な作用を示さなかった (図4B) が、30倍高い濃度 (3 μ M) では等張収縮を誘発した (図4C) 。

【0044】

しかしながら、 A_3 受容体における CGS-21680 の K_i は 67 nM であり (K l o t z) ほか、上記文献) 、したがって、CGS-21680 は上記高濃度では A_{2A} 受容体又は A_3 受容体を介して作用していたかも知れない。これらの可能性を区別するために、懸濁液の平行アリコートに100 nM のアンタゴニスト MRS-1191 とプレイン

10

20

30

40

50

キュベートした。その結果、MRS-1191が上記高濃度のCGS-21680により生じる収縮を阻止した（図4C、 $P < 0.01$ 、F検定）ことから、観察された収縮は A_3 受容体との交差反応性によって媒介されたことが明らかとなった。現在、高親和性の A_{2B} アゴニストは存在しない（Klotz）ほか、上記文献）ので、 A_{2B} 受容体刺激の寄与については追跡されなかったが、 A_3 アンタゴニストが $10 \mu M$ のアデノシンに対する反応を阻害することができる（図4）ことは A_{2B} 受容体の役割を否定するものである。例えば、 $10 \mu M$ のMRS-1191は組換えヒト A_{2B} 受容体に結合している放射性リガンドと置換しなかったので、これは真に選択的な A_3 アンタゴニストである。

【0045】

経上皮測定：

動物実験、好ましくはウサギにおいて、麻酔して屠殺（カレ（Carre）ほか、ジャーナル・オブ・メンブラン・バイオロジー（J. Membr. Biol.）146：p. 293-305（1995年））後、カレ（Carre）ほか、1995年に記載の方法で、虹彩-毛様体（I-CB）を摘出、分離した。一実験において、瞳孔及び虹彩中央部（central iris）をルーサイトディスクで閉塞し、虹彩-毛様体をルーサイトチャンバーの両半分の間に取り付けた。露出された組織の体積は 0.93 cm^2 の投影表面積を有した。標本を、（mM単位で）110のNaCl、10.0のHEPES（酸）、5.0のHEPES（ Na^+ ）、30.0の NaHCO_3 、2.5の CaCl_2 、1.2の MgCl_2 、5.9のKCl及び10.0のグルコースを含有する、305mOsmのオスモル濃度のリンゲル液中でpH7.4を維持するために95%乃至5% CO_2 で連続的にバブルした。次いで、この溶液に BaCl_2 （5mM）を添加して K^+ 電流をブロックした。経上皮電圧を0mVに固定し、溶液直列抵抗を補正し、チャート式記録計で短絡電流をモニターした。データは、デジデータ1200A（Digidata 1200A）コンバーター及びアクソスコープ（AxoScope）1.1ソフトウェア（アクソン・インストルメンツ社（Axon Instruments）、フォスターシティ（Foster City）、カリフォルニア州）によって10Hzでデジタル方式により取得した。自動平均化を100の減少因子で行って6/分の最終サンプリング速度を得た。

【0046】

考えられる溶媒効果の補正：

高濃度（ $100 \mu M$ ）のアデノシンはウサギ毛様体を通過する短絡電流を増大させることが分かっている（カレ（Carre）ほか、上記文献、1997年）。したがって、高濃度（ $30 \mu M$ ）の A_3 アゴニストIB-MECAについて、これが短絡電流に影響するか否かを調べた。この濃度では、ビヒクル（ジメチルホルムアミド）自体が有意な効果を示す（図5、最も下の曲線）。この溶媒効果を以下の通りに補正した。即ち、溶媒単独を初期に（0.1%となるように）導入した後、アゴニストを含む同容の溶媒を（0.2%となるように）導入し、さらに3番目の同容の溶媒単独を（0.3%の最終濃度となるように）添加して終了した。溶媒の初回の添加後の短絡電流の減少は3回目よりも常に大きかった。4つの実験のそれぞれにおいて、初回及び3回目の添加の経時変化を平均することによって、実験期間中、アゴニストを含まない溶媒濃度を0.1%から0.2%まで上昇させることの効果を評価した。図5は、平均溶媒効果の平均曲線、IB-MECAを作用させた後の未補正平均経時変化、及び溶媒補正した反応の平均曲線 $\pm 1 \text{ SEM}$ を示す。これらの実験は、 K^+ 電流の寄与をできるだけ少なくするために、5mMの Ba^{2+} の存在下で実施した。IB-MECAは短絡電流の有意な増加を生じたが、 Ba^{2+} の存在下で短絡電流が増加したことは、この効果がNPE細胞の側底膜の Cl^- コンダクタンスを活性化することによって媒介されることを示唆するものである。その刺激の持続性は A_3 刺激に反応した細胞収縮の経時変化と一致している。

【0047】

（実施例1）

眼内標的への局所用薬物の送達に対する角膜バリア

マウス I O P に対する A_3 AR アントゴニストの効果は、従来より、小さなマウスの眼に対して本発明者らが開発した侵襲的サーボ・ヌル技術によって測定されている。この技術では、先端径が約 5 マイクロメートルの細い中空ガラス針で角膜を突き刺す必要がある（アビラ（A v i l l a）ほか、上記文献、2001 年、2002 年）。しかしながら、 A_3 AR アントゴニスト化合物のインビボにおける I O P 低下効果を立証するために、試験技法を改良した。マウス I O P を非侵襲的に測定する気動眼圧計を採用した（アビラ（A v i l l a）ほか、インベスティゲイティブ・オフサルモロジー・アンド・ビジュアル・サイエンス（Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.）46：p. 3274-3280、（2005 年））。この技法を用いると、 A_3 AR アントゴニスト（MRS-1191）が局所適用後にマウス I O P を有意に低下させ始めるには、30 分を要することが分かった。これに対して、I O P を侵襲的サーボ・ヌル技術で測定すると、同じ薬剤が約 1 分以内に I O P を低下させ始めた。同様に、非侵襲的測定では、非選択的 AR アゴニストのアデノシンにより誘発された I O P の増加は 10 分遅れて観察された。以上の結果から、局所適用した A_3 AR アントゴニストに対するマウス I O P の速やかな反応は、実はマイクロピペットの先端部周囲の損傷組織から薬剤が侵入した結果であることが強く示唆されたが、同じ効果が、マウスの極めて薄い角膜（深さ約 170 マイクロメータ）を横切る拡散による薬剤のはるかに緩徐な送達後にも認められた。

【0048】

この効果を立証するために、試験動物において全く別のパラメータをモニターした。（1）カルバコール（縮瞳薬）の局所適用後の瞳孔サイズ並びに（2）侵襲的サーボ・ヌル・マイクロピペット装置（SNMS：servo-null micropipette system）及び非侵襲的気動眼圧測定法（pneumotonometry）の両者により測定したプリン作動性薬剤に対する眼内圧（I O P）反応をモニターすることによりマウスの眼のバリア性。

【0049】

試験動物は、タコニック社（Taconic Inc.）（ジャーマンタウン（German town）、ニューヨーク州）から入手した 7 乃至 9 週令、体重 25 乃至 30 g の black Swiss 非近交系雌雄マウスであり、12：12-h 明／暗の照明サイクル下に維持して餌と水を自由に与えた。マウスは、プロパラカイン HCl 5% の局所適用で補ったケタミン（250 mg/kg）の腹腔内投与で麻酔して I O P 測定を行った。I O P は、侵襲的（SNMS）、及び気動眼圧測定法により非侵襲的に、別々の動物で測定した。

【0050】

瞳孔径を測定するために、瞳孔及びすぐ横に置いた 1 mm 刻みの定規をデジタルカメラで撮像した。機械的応力をかけるのを避け、その結果としてマイクロピペットの先端部を前房内の位置からずらすのを避けるよう注意を払った。長さをイメージ J（IMAGE J）（国立衛生研究所（National Institutes of Health））によって測定し、瞳孔径をその定規に対して校正した。

【0051】

SNMS 法（アビラ（A v i l l a）ほか、上記文献、2001 年）によって、外径 5 乃至 10 mm の近接マイクロピペットを高導電性溶液で満たし、角膜を通過させて前房中に進めた。www.iovs.org/egiletters/46/9/3274#422 で入手可能なワン（Wang）ほか、インベスティゲイティブ・オフサルモロジー・アンド・ビジュアル・サイエンス（Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.）（シリアルオンライン）（2006 年 8 月 31 日）による改良技術では、安定性が改善され、記録の背景ノイズが減少したことにより、抵抗が初期に用いられた 0.25 乃至 0.4 MΩ ではなく 0.1 乃至 0.3 MΩ であるマイクロピペットの作製が可能になった。充填溶液は 3 MKCl ではなく、3 MKCl から 2 MNaCl へ減少させた。充填マイクロピペットの抵抗をブリッジ回路で平衡をとらせ、その先端を角膜を通して進めた。前眼房に侵入させると、I O P が導電性のずっと低い房水をマイクロピペット先

端部に押し入れ、元の充填溶液と置き換える。これによってマイクロピペットの抵抗が増大し、このため、ブリッジ回路の平衡がくずれてペローズが逆圧を生じることにより充填溶液の位置が元に戻り、上記抵抗が初期値に復帰する。したがって、逆圧の値はIOPに等しい。これまで通り（アビラ（Avila）ほか、上記文献、2001年）、記録の安定により薬剤適用の過程で何十分もの間連続して測定することが可能となった。

【0052】

ちなみに、IOPを気動眼圧測定法（OBT）（アビラ（Avila）ほか、上記文献、2005年）によって非侵襲的に測定した。すでに述べたように、眼血液トモグラフィ（OBT: ocular blood tomography）気動眼圧計（pneumotonometer）の市販のチップ（血流分析計[BFA: Blood Flow Analyzer]プローブチップ；パラディグム・メディカル・インダストリーズ社（Paradigm Medical Industries Inc.））を特注のマウントに取り付けた。定圧源からの空気流をこのマウントに通過させてBFAチップの先端を形成するダイヤフラムに到達させた。この空気流がダイヤフラムを外側へ移動させることにより、プローブチップの壁の穴からこの空気を大気中に逃がすことが可能になる。BFAチップのベースにT結線を介して接続したトランスデューサで圧をモニターした。3軸マイクロマニピュレータを用いてプローブアセンブリを角膜へ進めた。ベースライン出力測定値のシフトが示したように、プローブチップを十分に進めて涙液膜と接触させた。改良法では、このチップを、マイクロピペットの先端部が涙液膜から視覚的にずれるまで引っ込めた。次いで、その出力をゼロに調整した後、再び上記チップを進めた。角膜に接触させることによりBFAチップのダイヤフラムが押圧され、このため、空気流の溢出穴への接近が遮断されて、チップのベースの圧が上昇する。プローブを進めると共に生じるこの圧上昇はその特性として、IOPの終点と見なされる相対的プラトー又は湾曲（inflection）領域を示す。

【0053】

この方法を簡素化して上記終点の確認を迅速化し、次いで、上記プローブを約10秒間隔でほぼ50mmの規準化ステップの約10ステップで進めて湾曲領域を確認した（ワン（Wang）ほか、上記文献、2006年）。いずれにせよ、圧記録が同時に測定する心拍と明らかに同期した圧の変動を示すものであれば、上記終点は実用上満足できるものであると考えられた。IOPの気動眼圧測定法による概算値は、カニューレ挿入した標本における圧力計での測定値及びサーボヌル技術により得られる概算値と一致することが以前に見出されていた（アビラ（Avila）ほか、上記文献、2005年）。IOPのベースライン値を確立した後、マイクロマニピュレータを進める軸に沿った位置を記録し、プローブと角膜との接触を中止した。その後、マウスの位置を定位的に維持してプローブチップを同じ位置へ進めることにより遅れた時点でのIOPの測定値を得た。角膜に長時間圧がかかることに伴う潜在的なアーチファクトを避けるために測定は10分間隔で行った。このプロトコルに続く対照の測定値では30分を超える測定時間にわたって高い安定性が示された。

【0054】

心拍数は尾に圧トランスデューサ（MLT1010、アドインストルメンツ社（Adi instruments）、米国）を巻き付けてモニターした。IOP及び心拍信号を帯域ろ波（1乃至100Hz）し、シグナルコンディショナ（サイバーアンプ（CyberAmp）380、アクソン・インストルメンツ社（Axon Instruments Inc.）、米国）を用いて増幅した後、アナログ・デジタル変換器（ミニデジ（MiniDig）1A2ーチャンネル取得システム（two-channel acquisition system）、アクソン・インストルメンツ社、米国）をギャップ・フリーのモードで用いて1kHzでデジタル化した。得られたデジタル・ファイルをクランプフィット（Clampfit）9（アクソン・インストルメンツ社）を用いてオフラインで解析した。

【0055】

ケタミンHClはフェニックス・ファーマシューティカル社（Phoenix Pharmaceutical Inc.）（セントジョーゼフ（St. Joseph）、ミズーリ州）から購入した。他の薬剤はシグマ・ケミカルズ社（Sigma Chemicals Co.）（セントルイス（St. Louis）、ミズーリ州）から入手した。薬剤はエッペンドルフ型ピペットで局所適用した。MRS-1191及びCl-IB-MECAは最初にDMSOに溶かし、次いで塩化ベンザルコニウムを含有する生理食塩溶液に加えることにより角膜透過性を高めた。最終の液滴溶液には記載の濃度の薬剤を<2%のDMSO及び0.0005%の塩化ベンザルコニウムと共に295乃至300mOsmのオスモル濃度で含ませた。DMSOは、親水性化合物アデノシン、カルバコール及びカルボキシフルオレスセインを含有する液滴からは完全に除去した。

10

【0056】

侵襲的に測定するIOPに対する効果は局所適用後10分に測定した。何故なら、この時間を過ぎると、マイクロピペットの存在の継続が、対照条件下でさえ、IOPの下げ傾向と関連付けられ得るからである。これに対して、非侵襲的技術を用いる場合には、気動眼圧計からの空気流に関連付けられる眼の乾燥を未然に防ぐために、より小さな液滴（10mlの代わりに5ml）をより頻回（1回の代わりに3回）眼に適用した。非侵襲的プロトコルの場合、IOPは対照条件下で30分間安定であった。

【0057】

瞳孔径は、マウスの両眼への40mM（0.073mg）縮瞳薬カルバコール含有液滴10mlの局所添加の前、及び10分後に測定した。一方の眼は穿刺せず、他方の眼にはSNMSマイクロピペットを突き刺した。この突き刺しには各マウスの左眼か右眼のいずれかを無作為に選んだ。そのように低い適用濃度でマイクロピペットの非存在下にカルバコールを10分間作用させても瞳孔サイズに有意な作用はなかった。ベースライン径は 1.80 ± 0.11 であり、カルバコールの適用によりわずかに変化し、 0.12 ± 0.17 mm増大した（ $n=6$ 、 $P>0.4$ ）。これに対し、他方の眼の角膜にマイクロピペットを突き刺した場合には、カルバコールの局所適用は瞳孔径を38%減少させ、 2.00 ± 0.15 mmのベースラインから 0.76 ± 0.09 mm収縮させた（ $n=6$ 、 $P<0.0005$ ）。10分の1の液滴濃度及び用量（4mM及び7.3ng）では、カルバコールは、角膜への突き刺しの有無にかかわらず瞳孔サイズに対し作用を示さなかった（データは示されていない、 $n=2$ ）。以上の結果から、SNMS眼圧測定法に用いた細先端のマイクロピペットで生じた角膜穿孔によってさえ、涙液膜から眼内標的部位への薬剤送達が可能になり得ることが分かる。

20

30

【0058】

さらに、眼中への薬剤滲透がマイクロピペットによる角膜の突き刺しによって影響されるか否かについて、0.003%のカルボキシフルオレスセイン（0.3mg）含有の液滴10mlを2匹のマウスの眼に局所適用して調べた。カルボキシフルオレスセインは眼のバリア層を余り通過しない極性の高い分子である。各マウスで、先ず、近接マイクロピペットを一方の眼の房水中へ進め、片方の眼には突き刺ししなかった。5分後に、この色素を等張食塩液で洗浄した。突き刺しを行ったマウスの眼の前房には緑色蛍光が認められたが、対照の眼では認められず、このことから、マイクロピペットによる角膜穿孔によって涙から房水中への薬剤及び化学物質の移送が可能になり得ることが再び示唆された。

40

【0059】

10mMの非選択的ARアゴニスト・アデノシンを10ml（26.7mg）の液滴容量で局所適用すると、マウスIOPは速やかに上昇した。ピーク反応は数分以内に達成され、10分後のベースラインに対する上昇の平均値 $\pm$ S.E.M.は 24.0 ± 4.7 mmHgであった（ $n=14$ 、 $P<0.001$ ）。同様に、選択的なA3アゴニストCl-IB-MECA（200nM、1.09ng）は、IOPを 10.0 ± 2.9 mmHg上昇させた（ $n=9$ 、 $P<0.01$ ）。確立された選択的ジヒドロピリジン系A3アンタゴニストMRS-1191は反対の効果を示した。2.5mM（11.94mg）の液滴濃度で、MRS-1191は、この場合も適用後数分にわたって、IOPを 6.1 ± 1.1

50

mmHg 低下させた ($n = 6$ 、 $P < 0.001$)。

【0060】

角膜の突き刺しを行わずに、アデノシン、C1-IB-MECA及びMRS-1191 (各5 μ lの液滴)に対する反応において、非侵襲的な気動眼圧測定法によるIOPの測定値を調べたところ、検出可能な上昇は、侵襲的サーボ・ヌル技術により測定したそれよりも緩徐で小さかった。SNMS及び気動眼圧測定法による測定値間の差は、IOPの有意な上昇を生じない選択的A₃アゴニストC1-IB-MECAの場合でさらに著しかった。確立されたA₃アンタゴニストであるMRS-1191により誘発されたIOP低下の気動眼圧計による測定値は、SNMSで検出されたものにより近かった。しかしながら、気動眼圧測定法により観察された最大の低下は、MRS-1191の最初の適用の30分後の実験の終了時に認められた。これに対し、SNMSにより検出されたMRS-1191の最大効果はずっと早期の9.6乃至1.1分に認められた。

10

【0061】

上記実験の注眼すべき知見は、(1)40mM(0.073mg)カルバコールの局所適用では、マイクロピペットによる角膜突き刺し後、速やかな縮瞳が生じたが、角膜突き刺しを伴わない局所適用後では生じず、(2)アゴニストのアデノシン及びC1-IB-MECA並びにアンタゴニストMRS-1191の局所投与により誘発されるIOPに対する効果は、気動眼圧測定法による非侵襲的測定の場合、SNMS眼圧測定法による侵襲的測定の場合よりも小さく緩徐であることであった。マウス角膜の薄さを初めとする多くの要因が関係している可能性があるが、最終的には、局所適用された治療用化合物の前房への送達にはIOP測定技術自体が大きな役割を果たしていることが、本明細書に示した実験で確認された。SNMS法では直径が通常検圧技術に用いられる微細針よりも約5乃至10分の1の5乃至10mmである細い近接マイクロピペットを使用するにもかかわらず、これによる角膜の突き刺しは標的への薬剤の送達を有意に変化させる。

20

【0062】

先端が細いと、漏れが最低限に抑えられるが、侵襲的及び非侵襲的技術によりIOPの測定を並行して行うことによってマウスの眼の皮膜が、その薄い構造にもかかわらず、薬剤の浸透に対する十分なバリアとなることが論証される。カルバコール及びプリン作動性薬剤を用いて得られた上記結果は、薬剤の送達が角膜のマイクロピペットによる突き刺しによって増強されることを立証している。今回検討したプリン作動性薬剤は全て角膜突き刺し時に局所適用した場合にはマウスIOPに対して迅速で大きな効果を示したが、未処置の眼に適用した場合には、作用速度に大きなばらつきがみられた。こうしたプリン作動性薬剤の眼浸透性は、相対疎水性の単純関数ではなかった。局所適用した薬剤の浸透が緩徐で有りすぎて完全な状態の眼において確実な生理作用を発現することができなくても、SNMS眼圧測定法によるマウスIOPの測定を補完的に行うことにより、角膜又は眼の皮膜を通した薬剤の送達が容易となり、薬剤効果が高められる。

30

【0063】

(実施例2)

インビボ動物モデルにおけるA₃ARアンタゴニストの種非依存性効果

これまでの研究に用いられたA₃ARアンタゴニストは、培養ヒトNPE細胞のアデノシン誘発収縮をブロックし、マウスのIOPを低下させた。このNPE細胞は、ヒト非色素毛様体上皮の初代培養から得られたクローン4からのものであった(マーチン・バサロ(Martin-Vasallo)ほか、ジャーナル・オブ・セル・フィジオロジー(J. Cell Physiol.)141:p.243-252(1989年)参照)。しかしながら、そうした研究に用いられたジヒドロピリジン系MRS-1191及びピリジン系MRS-1523などの複素環誘導体は、さまざまな種のA₃ARに対して多様な親和性を示した。この多様性は、ヒトA₃受容体に比し、ラットのそれに対する上記アンタゴニストの親和性が10乃至>30,000倍と極めて高かったことによって例示される(ヤング(Yang)ほか、上記文献、2005年)。したがって、アンタゴニストの選択性に一般性がないことにより、化合物のA₃選択性がヒトと著しく異なり得る動物

40

50

モデルにおいて既知の A_3 アンタゴニストが臨床的に妥当なものである可能性を評価することに限界があった。

【0064】

この親和性の問題に対処するために、 A_3 受容体における IB-MECA の高親和性が種を超えて拡大している A_3 アゴニストを修飾することによって A_3 アンタゴニストを構築した。 A_3 アンタゴニスト、例えば、MRS-1292（ガオ（Gao）ほか、バイオケミカル・ファーマコロジー（Biochem. Pharmacol.）65：p. 1675-1684（2003年））が培養ヒトNP E細胞のアデノシン誘発収縮をブロックし、かつ、マウスの IOP を低下させるのに有効であるという以前の立証（ヤング（Yang）ほか、上記文献、2005年）を参照されたい。MRS-1292 は2つの理由でマウスを用いて試験した。遺伝子組換えマウスは、生きている動物において分子生理学及び薬理学を研究する都合のよい機会を与えてくれる（例えば、アビラ（Avila）ほか、上記文献、2003年）。第2に、IOP の測定によりMRS-1292 の標的パラメータに対する効果を評価することが可能になった。しかしながら、広く認められているアデノシン刺激プロトコルはマウスでは用いなかった。何故なら、アデノシンは A_3 受容体を刺激するのみならず、IOP に対して独立した効果を示す他のARをも活性化するためである。したがって、インビボのマウスでMRS-1292 の効果を直接評価するために、薬剤適用の前後でIOPをモニターした。IOPはサーボ・ヌル・マイクロピペット装置（SNMS）でモニターした。この試験プロトコルについてはヤング（Yang）ほか、上記文献、2005年に詳細に記載されており、この文献は引用により本明細書に組み込まれている。

【0065】

MRS-1292 は、 A_3 受容体における IB-MECA の高親和性が種を超えて拡大しているアゴニスト IB-MECA に構造的に関連しているヌクレオシド誘導体である。また、MRS-1292 はヒト及びラットの両者において A_3 受容体選択的でもある。特に、 A_3 受容体に対するラット対ヒトの親和性比はMRS-1292 と選択的 A_3 アゴニストとで同様である。MRS-1292 がヤング（Yang）ほか（上記文献、2005年）によって試験されたところ、これは、培養ヒトNP E細胞及び変化したマウス IOP に対する非プリン系 A_3 アンタゴニストの効果を模倣する際、 A_3 アデノシン受容体アンタゴニストとして作用することが分かった。具体的には、測定開始前の2分間アンタゴニストで前処理し、グラミシジンを含有する対照溶液に懸濁した培養ヒトNP E細胞は、60分の実験時間にわたって軽度の収縮を示した（ $\Delta v_{\infty} = 1.2 \pm 0.1\%$ ）。記号 Δv_{∞} は定常収縮を表す。アデノシン（ $10 \mu M$ ）は収縮の程度を7倍増大させた。MRS-1292 はこの大きさを有意に減少させ（ $\Delta v_{\infty} = 1.9 \pm 0.2\%$ 、スチューデント t 検定で $p < 0.001$ ）、アデノシン誘発収縮を減速させた。MRS-1292 の存在下では、収縮の時定数（ τ ）は 3.8 ± 0.6 から 11.7 ± 2.6 へ延長された（ $p < 0.02$ ）。1, 4-ジヒドロピリジン A_3 アンタゴニストMRS-1191の存在下では、アデノシン処理細胞は指数関数的収縮を示さなかった。これまでに述べたように、従来から、MRS-1191は、ヒト、ラット及びマウスのARに拮抗させるのに成功裡に用いられてきた。

【0066】

$25 \mu M$ の推定アンタゴニストMRS-1292を含有する液滴を局所添加すると、8乃至19分（平均 15 ± 1 分）までにIOPが $4.4 \pm 0.8 mmHg$ （ $n = 10$ 、 $p < 0.005$ 、スチューデント t 検定）の最大の低下を示した。ちなみに、同じ容量の生理食塩水を同じオスモル濃度で添加しても、14分後にIOPは有意な変化を示さなかった（ $-0.3 \pm 1.2 mmHg$ 、 $n = 6$ 、 $p > 0.8$ ）。したがって、これまでの観察結果と一致して、 A_3 ARアゴニスト IB-MECA では $140 nM$ でIOPは $4.6 \pm 1.6 mmHg$ の速やかな上昇を示した（ $n = 6$ 、スチューデント t 検定で $p < 0.05$ ）。10分の1の濃度の IB-MECA では、IOPは $2.2 \pm 0.5 mmHg$ 上昇した（ $p < 0.02$ ）。これに対して、極めて高い液滴濃度（ $1400 nM$ ）の IB-MEC

A は、恐らく A_2 A A R との交差反応のため、有意な作用を示さなかった (-1.2 ± 1.9 mmHg)。

【0067】

おおよその範囲を見積もるために、ヤング (Y a n g) らは、「浸透度」を、多くのアデノシンアゴニスト及びアンタゴニストの最低有効液滴濃度に対するインビトロでの受容体における公表 K_i 値の比と定義した。したがって、マウスで試験されたプリン作動性薬剤の浸透度は $1:100$ から $1:1,000$ の範囲であり、これは、ウサギ及び霊長類に局所適用された薬剤の薬剤浸透度 $1:100$ とあまり異ならない。この経験則は、マウスの眼で局所効果が検討されたアシルグアニジン・ブロッカー及びブメタニドにも当てはまる。したがって、ヤング (Y a n g) らが本実験の MRS 1292 に関して 2003 年の引用文で報告した約 $1:1,000$ の浸透度は過去の研究と一致している。

【0068】

同様な戦略によって、2 種の新規 A_3 アンタゴニスト MRS-3642 及び MRS-3771 を開発した。先の化合物 MRS-1292 は A_3 アゴニスト IB-MECA の修飾体であった。これらの 2 種の新規薬剤 (MRS-3642 及び MRS-3771) は、より選択的な A_3 アゴニスト CL-IB-MECA の修飾体 (図 6 に構造が示されている) であり、したがって、MRS-1292 よりさらに選択的であると期待された。侵襲的サーボ・ヌル技術を用いて、両新規薬剤ト MRS-3642 及び MRS-3771 が侵襲的測定によりマウス IOP を低下させるのに有効であることが分かった (表 1)。

【0069】

表 1 では、侵襲的測定の場合、前述のように対照条件下でさえ IOP の下げ傾向がみられたことを踏まえて 10 分の終点を用いた。また、気動眼圧計を用いる非侵襲的技術に関してはより小さい液滴をより頻回に適用する必要性を上記で説明している。上述のように、非侵襲的プロトコルの場合、IOP は対照条件下で 30 分間安定であった。

【0070】

【表 1】

表 1: A_3 アゴニスト及びアンタゴニストの局所適用後の IOP に対する効果

クラス	薬剤	濃度	気動眼圧計			サーボ・ヌル		
			N	Δ (IOP)	P	N	Δ (IOP)	P
非選択的アゴニスト	アデノシン	10mM	9	$+4.8 \pm 1.7$	<0.05	9	$+22.4 \pm 6.5$	<0.01
A_3 アンタゴニスト	MRS-1191	25mM (2%DMSO)	9	-3.9 ± 1.0	<0.01	6	-6.1 ± 1.1	<0.001
A_3 アンタゴニスト	MRS-3771	25mM (2%DMSO)	4	$+0.3 \pm 2.6$	>0.9			
		250 μ M (2%DMSO)	9	$+0.4 \pm 0.6$	>0.5	9	-3.0 ± 1.1	<0.05
A_3 アンタゴニスト	MRS-3642	250 μ M (2%DMSO)	6	$+0.2 \pm 1.1$	>0.8	10	-4.2 ± 1.2	<0.01
A_3 アゴニスト	CL-IB-MECA	200nM (1%DMSO)	6	$+0.7 \pm 1.4$	>0.6	9	$+10.0 \pm 2.9$	<0.01
CL-IB-MECA モノプロピオニル	MRS-3824	200nM (1%DMSO)				9	$+1.9 \pm 1.3$	>0.1
CL-IB-MECA ジプロピオニル	MRS-3823	200nM (1%DMSO)	4	$+0.2 \pm 0.8$	>0.8			
MRS-3642 のジアセチルエステル	MRS-3826	250 μ M (2%DMSO)	6	-0.5 ± 0.8	>0.5	4	-4.0 ± 0.8	<0.05
MRS-3642 のモノアセチルエステル	MRS-3827	250 μ M (2%DMSO)	9	-0.8 ± 1.1	>0.4	6	-4.4 ± 1.3	<0.05
						6	-3.8 ± 0.8	<0.01
MRS-3771 のジベンジルエステル	MRS-3833	2 μ M (1%DMSO)	6	-0.2 ± 0.9	>0.8			
		200nM (1%DMSO)	9	-1.7 ± 0.6	<0.03		0.02 ± 3.8	>0.9
MRS-3642 修飾体 (ラット/ヒト A_3 アンタゴニスト)	MRS-3820	250 μ M (2%DMSO)	6	-4.2 ± 0.7	<0.002	7	-1.5 ± 0.6	<0.05
		75 μ M (0.6%DMSO)				6	-3.1 ± 1.4	>0.07
		25 μ M (0.2%DMSO)	6	-0.6 ± 1.5	>0.7	6	-4.9 ± 1.7	<0.05
		5 μ M (0.2%DMSO)				6	-2.2 ± 0.7	<0.03
対照	2%DMSO		9	-1.4 ± 1.5	>0.3	6	-0.5 ± 0.6	>0.4

【0071】

侵襲的に測定した場合、MRS-3642及びMRS-3771によるIOP低下の平均値±SEMはそれぞれ 4.2 ± 1.2 mmHg (N=10、 $P < 0.01$)及び 3.0 ± 1.0 mmHg (N=10、 $P < 0.03$)であった(表1)。データは全てBlack Swissマウスを用いて得られた。MRS-3771の局所添加によりC57マウスのIOPも(3.3 ± 0.6 mmHg)低下した(N=6、 $P < 0.01$ 、表2)。これに対し、MRS-3642及びMRS-3771は非侵襲測定期間にわたってはIOPに対して効果を示さなかった。

【0072】

(実施例3)

MRS-3820の種非依存性効果

10

前述の種交差性の結果を踏まえて、 A_3 ARアンタゴニストとしての種交差性の有効性を保持し、マウスIOPの速やかな低下を生じるのに十分角膜を透過可能である2種のヌクレオシド系 A_3 ARアンタゴニストMRS-3642及びMRS-3771の一連の修飾体を開発した。これにより各化合物の効力をIOPの侵襲的測定によって測定することが可能になったが、さらに、その角膜を速やかに通過する能力についてIOPの非侵襲的測定によって観察することができる可能性もあった。MRS-3771及び3642の多くのエステルについて試験した。侵襲的に測定した場合、MRS-3824は無効であった(表1)。MRS-3833は、非侵襲的測定では200 nMでIOPを軽度到低下させたが、他の濃度では侵襲的及び非侵襲的測定のいずれにおいても無効であった(表1)。MRS-3826及び-3827は、侵襲的に測定された場合にはマウスIOPを低下させたが、非侵襲的測定期間においては効果を示さなかった。

20

【0073】

ヌクレオシド系 A_3 ARアンタゴニストMRS-3820は侵襲的及び非侵襲的測定のいずれによっても有効であることが分かった。MRS-3820(LJ-1251)は、MRS-3642の修飾体であるが、NIHのジョンウン(Jeong)により作製された。MRS-3820の構造(2-(2-クロロ-6-(3-ヨードベンジルアミノ)-9H-プリン-9-イル)テトラヒドロチオフェン-3,4-ジオール)は図6Bに示した。特に、MRS-3820は非侵襲的に測定されたIOPを20分以内に低下させることが分かった。表1に示したように、濃度反応相関は侵襲的及び非侵襲的技術のいずれによっても測定したが、反応の大きさを直接比較することは可能ではない。何故なら、上述のように、これら2つの技術で用いるプロトコル及び時間的終点は必然的に異なるからである。250 μ MのMRS-3820局所適用後、非侵襲的に測定された最大反応は30分後の -4.2 ± 0.7 mmHgであった(表1)。その上、この250 μ MのMRS-3820は、さらに短い間隔である適用後20分にIOPを 3.4 ± 0.7 mmHg低下させ、この低下は有意であった(N=6、 $P = 0.004$)。MRS-3820によるIOPの低下が侵襲的及び非侵襲的のいずれにおいても測定されたことは、この化合物が角膜に速やかに浸透し、標的部位である非色素毛様体上皮の A_3 受容体においてアンタゴニストとして作用することができることを示している。前記で引用した、毛様体上皮細胞及び組織を用いたインビトロ研究(カレ(Carre)ほか、上記文献、1997年；ミッチェル(Mitchell)ほか、上記文献、1999年；カレ(Carre)ほか、上記文献、2000年)では、 A_3 受容体における拮抗が非色素毛様体上皮細胞のCl⁻チャンネル活性を低下させることが示されている。その後の房水形成速度の低下がIOPの低下を招いたのである。

30

40

【0074】

【表 2】

表 2：サーボ・ヌル技術により侵襲的に測定した C 5 7 マウス眼内圧に対する
MRS-3771 局所適用の効果

実験番号	マウスの系	ベースライン (mmHg)	MRS 3771 (mmHg)	IOP の変化 (mmHg)
050729B	C57	13.6	12.7	-0.9
050729C	C57	16.4	11.8	-4.6
050801C	C57	11.4	8.9	-2.5
050801D	C57	22.8	19.4	-3.4
050802A	C57	20.8	16.2	-4.6
050802B	C57	14.3	10.5	-3.9
平均値		16.5	13.2	-3.3
±SEM		±1.8	±1.6	±0.6
対応のある t 検定				P=0.002

10

【0075】

未公表の MRS-3820 結合測定結果に表 1 のデータが加われば、この化合物が A₃ 受容体との結合において機能的に種交差性であることがさらに立証される。実験は、(HEK293 細胞で発現させた A_{2A}AR 以外の) アデノシン受容体をコードしている cDNA を安定的に形質移入した接着 CHO 細胞を用いて実施した。結合実験は、A₁、A_{2A} 及び A₃ 受容体のリガンドとして、それぞれ [³H]CCPA、[³H]CGS-21680 及び [¹²⁵I]AB-MECA を用いて行った。本明細書に提示した値は平均値 ±SEM、N=3 乃至 4 として表した。NECA は非特異的結合を測定するために用いた。ヒト及びラットの A₃ 受容体への MRS-3820 の結合の間に有意差は認められなかった。具体的には、ヒト A₃ 受容体への結合では 4.2 ± 0.5 nM、ラット A₃ 受容体への結合では 3.9 ± 1.2 nM であった。この A₃ 受容体への結合は高度に選択的でもあった。

20

【0076】

上記 4 種の既知ヒトアデノシン受容体のそれぞれにおける効力 (K_i、nM ± SEM) は、2,485 ± 940 nM (A₁)、341 ± 74.6 nM (A_{2A})、10 μM でも <10% (A_{2B}) 及び 4.16 ± 0.50 nM (A₃) であった。さらに、MRS-3820 の結合はヒト A₃ 受容体を中和する。CHO 細胞で発現させたヒト A₃ 受容体における環状 AMP 機能アッセイでは、MRS-3820 はアゴニスト (CL-IB-MECA) の用量-反応曲線をアンタゴニストとして 1.92 nM の K_B 値に相当する右方ヘシフトさせた。したがって、MRS-3820 の種交差性アンタゴニストとしての有効性がヒト及びラット (ヤコブソン及びガオ (Jacobson and Gao)、上記文献参照) 並びにマウス (表 1) において機能的 A₃ アンタゴニストとして立証された。正常マウスの IOP の大きな低下は、A₃ AR アンタゴニストが効力を有する可能性を示していた。示されているように、薬剤の親和性が高いことによって副作用を生じる可能性が低下した。さらに、上記の IOP に対する効果によって MRS-3820 が角膜を通過するという証拠が得られた。

30

40

【0077】

したがって、本発明は、種交差性の、強力な A₃ 阻害剤を角膜バリアを通過させて送達し、非色素毛様体上皮 (NPE) 細胞の CL-チャンネル活性を低下させることによって房水形成速度を低減させ眼内圧を低下させる決定的な方法を提供する。


【0078】

この文書に引用又は記載された各特許、特許出願及び刊行物の開示内容については、その全体が引用により本明細書に組み込まれている。

【0079】

50

【図 1】




時間 (分)	○ グラミンジン D	■ グラミンジン D, B-MECA	△ グラミンジン D, MRS1097	▼ グラミンジン D, IB-MECA, MRS1097
0	100.0	100.0	100.0	100.0
2.5	100.0	97.5	100.0	100.0
5	100.0	97.8	100.0	100.0
7.5	100.0	96.5	100.0	100.0
10	99.8	95.8	99.5	99.5
20	99.5	95.5	99.0	99.0
30	99.5	95.5	99.0	99.0

時間 (分)	グラミジシン D (○)	グラミジシン D, 8-MECA (■)	グラミジシン D, 1B-MECA, MRS1191 (▲)
0	100.0	100.0	100.0
5	100.2	96.2	101.2
10	100.3	96.5	101.8
20	100.1	96.0	101.2
30	100.5	95.8	100.8


時間 (分)	○ グラムジシン D	■ グラムジシン D, 10 μ M アデノシン	△ グラムジシン D, 300 nM MRS 1097	▼ グラムジシン D, アデノシン, MRS 1097
0	100.0	100.0	100.0	100.0
5	98.5	97.5	99.0	99.5
10	98.0	96.0	99.0	99.5
15	98.5	95.5	98.5	99.0
20	98.0	95.0	98.0	98.5
30	98.5	94.5	98.0	98.5

時間(分)	○ グラムジシン D	■ 10 μ M アドリアシン	△ グラムジシン D, 10 μ M MRS 1191	● グラムジシン D, 300 nM MRS 1191	▼ グラムジシン D, アドリアシン, MRS 1191
0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
5	99.5	99.0	99.5	98.5	99.0
10	99.5	97.5	100.5	97.5	98.5
15	99.5	97.5	99.5	97.5	98.5
20	99.5	97.5	99.5	97.5	98.5
30	99.5	97.5	99.5	96.5	98.5


【図 3 C】




【図 4 C】




【図 4 A】




【図 5】




【図 4 B】



【図 6 A】



【図 6 B】



【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/US 07/21409
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC(8) - A61K 31/52 (2008.01) USPC - 514/913; 514/263.1 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) USPC- 514/913; 514/263.1 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched USPC-514/912, 913, 263.2, 263.1 (text search-see search terms below) Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) PubWEST (USPT, PGPB, EPAB, JPAB) and Google Patent/Scholar Search terms: adenosine antagonist a3, corneal, eye, thiophene, impale		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 6,528,516 B1 (Civan et al.) 04 March 2003 (04.03.2003) col 2, ln 45-47, col 2, ln 66 to col 3, ln 11, col 8, ln 66 to col 9, ln 15, col 12, ln 21, col 25, ln 29-48; col 12 ln 18-26.	1-3, 5-6, 10, 15
Y		4, 7-9, 11-14
Y	Gao et al. "Conversion of A3 adenosine receptor agonists into selective antagonists by modification of the 5-ribofuran-uronamide moiety" Bioorg Med Chem Lett February 2006 v16 p596; p9, Chart 1, compounds 6 and 7	4, 14
Y	Avila et al. "Reliable measurement of mouse intraocular pressure by a servo-null micropipette system" Invest Ophthalmol Vis Sci 2001 v42 p1841; abstract, p1842, para 8	7-9, 11-14
Y	US 7,064,112 B1 (Fishman) 20 June 2006 (20.06.2006) abstract, col 7, ln 1-44	4, 14
☐ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 01 February 2008 (01.02.2008)		Date of mailing of the international search report 13 MAR 2008
Name and mailing address of the ISA/US Mail Stop PCT, Attn: ISA/US, Commissioner for Patents P.O. Box 1450, Alexandria, Virginia 22313-1450 Facsimile No. 571-273-3201		Authorized officer: Lee W. Young PCT Helpdesk: 571-272-4300 PCT OSP: 571-272-7774

フロントページの続き

(51)Int.Cl. F I テーマコード (参考)
C 0 7 H 19/167 (2006.01) C 0 7 H 19/167

(81)指定国 AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MT,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,SV,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW

(72)発明者 モーティマー, シヴァン, エム.
アメリカ合衆国, ペンシルベニア州 19104-6085, フィラデルフィア, ハミルトン ウ
ォーク 3700, エー303 リチャーズ ビルディング, ユニヴァーシティー オブ ペンシ
ルバニア

(72)発明者 ヤコブソン, ケニース, エー.
アメリカ合衆国, メリーランド州 20892-0810, ベセズダ, ルーム ビー1エー-19
, ビルディング 8エー, ナショナル インスティテュート オブ ヘルス, ナショナル イン
スティテュート オブ ダイアベティス アンド ダイジェスティブ アンド キドニー ディズイ
ーズ, モレキュラー レコグニッション セクション エルビーシー

(72)発明者 アビラ, マーセル, ワイ.
コロンビア国, ボゴタ, アプト 114, エー ナンバー118-06 カレラ 47

(72)発明者 ストーン, リチャード
アメリカ合衆国, ペンシルベニア州 19104-6075, フィラデルフィア, ディー-603
リチャーズ ビルディング, スクール オブ メディシン, ユニヴァーシティー オブ ペンシ
ルバニア

F ターム(参考) 4C057 AA17 BB02 CC01 CC05 DD01 DD03 LL31 LL34
4C084 AA17 MA28 MA52 MA58 MA66 NA14 ZA331 ZC422
4C086 AA01 AA02 EA18 MA01 MA04 MA28 MA52 MA58 MA66 NA14
ZA33 ZC42