



(19) **MD** ⁽¹¹⁾ **2 296** ⁽¹³⁾ **B2**
(51)МПК ⁷ **A 61 B 17/00**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ПО ОХРАНЕ
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) РЕШЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ПАТЕНТА

(21), (22) Заявка: а 2001 0173, 05.06.2001

(45) Дата публикации решения о выдаче
патента: 30.11.2003

(71) Заявитель:

УНИВЕРСИТАТЯ ДЕ СТАТ ДЕ МЕДИЦИНЭ ШИ
ФАРМАЧИЕ "НИКОЛАЕ ТЕСТЕМИЦАНУ" ДИН
РЕПУБЛИКА МОЛДОВА, MD

(72) Изобретатель:

ЧИКАЛА ЕВСТАФИЙ, MD,
КУРКА Виктор, MD,
ГУЗУН Василе, MD,
МОРОЗ Серджиу, MD

(73) Патентовладелец:

УНИВЕРСИТАТЯ ДЕ СТАТ ДЕ МЕДИЦИНЭ ШИ
ФАРМАЧИЕ "НИКОЛАЕ ТЕСТЕМИЦАНУ" ДИН
РЕПУБЛИКА МОЛДОВА, MD

(54) Метод лечения ятрогенных повреждений желчных протоков, осложненных диффузным билиарным перитонитом

(57) Реферат:

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургии и гастроэнтерологии.

Предложенный метод включает повторную лапаротомию, санацию брюшной полости, тотальное дренирование общего желчного протока. Одновременно с дренированием накладывают микроеюностому на расстоянии 60 см от Трейтцовой связки, затем, на 4-й день

после операции, в микроеюностому капельно вводят желчь, выделенную из дренажной трубки, через 2 недели соединяют дренажную трубку с микроеюностомой. Через 6 месяцев после операции накладывают гепатикоеюностому по Ру и удаляют дренажную трубку.

П. формулы: 1

Фиг.: 1



(19) **MD** ⁽¹¹⁾ **2 296** ⁽¹³⁾ **B2**
(51) Int. Cl.⁷ **A 61 B 17/00**

STATE AGENCY ON INDUSTRIAL
PROPERTY PROTECTION OF THE
REPUBLIC OF MOLDOVA

(12) **GRANTED PATENT FOR INVENTION**

(21), (22) Application: a 2001 0173, 05.06.2001

(45) Data of publication of patent granting
decision: 30.11.2003

(71) Applicant:

UNIVERSITATYA DE STAT DE MEDICHINA SHI
FARMACHIE "NICKOLAE TESTEMITSANU" DIN
REPUBLIKA MOLDOVA, MD

(72) Inventor:

CHICALA Eustafii, MD,
KURKA Victor, MD,
GUZUN Vasile, MD,
MOROZ Sergiu, MD

(73) Proprietor:

UNIVERSITATYA DE STAT DE MEDICHINA SHI
FARMACHIE "NICKOLAE TESTEMITSANU" DIN
REPUBLIKA MOLDOVA, MD

(54) Method of treatment of iatrogenic lesions of the biliary ducts, complicated with diffuse biliary peritonitis

(57) Abstract:

The invention refers to medicine, namely to the surgical gastroenterology.

The proposed method includes the relaparotomy, sanitation of the abdominal cavity, the total choledochotomy. Concomitantly with the drainage it is applied the microjejunostomy at a distance of 60 cm from the Treitz ligament, then on the 4-th day after operation, into the

microjejunostomy is introduced in drops the bile eliminated from the drainage tube, and in 2 weeks the drainage tube is joined with the microjejunostomy. In 6 months after operation it is applied the hepaticojejunostomy according to the Roux method and the drainage tube is removed.

Claims: 1

Fig.: 1



(19) **MD** ⁽¹¹⁾ **2 296** ⁽¹³⁾ **B2**
(51) ⁷ **A 61 B 17/00**

AGENȚIA DE STAT PENTRU PROTECȚIA
PROPRIETĂȚII INDUSTRIALE A REPUBLICII
MOLDOVA

(12) **BREVET DE INVENȚIE ACORDAT**

(21), (22) a 2001 0173, 05.06.2001

(45) Data publicării hotărârii de acordare a
brevetului: 30.11.2003

(71) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI
FARMACIE "NICOLAE TESTEMIȚANU" DIN
REPUBLICA MOLDOVA, MD

(72) CICALA Eustafii, MD,
CURCA Victor, MD,
GUZUN Vasilie, MD,
MOROZ Sergiu, MD

(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI
FARMACIE "NICOLAE TESTEMIȚANU" DIN
REPUBLICA MOLDOVA, MD

(54) Metodă de tratament al leziunilor iatrogene ale căilor biliare, complicate cu peritonită biliară difuză

(57) Invenția se referă la medicină, și anume la
gastroenterologia chirurgicală.

Metoda propusă include relaparotomia,
sanarea cavității abdominale, drenarea totală a
coledocului. Concomitent cu drenarea se aplică
microjejunostoma la distanța de 60 cm de
ligamentul Treitz, apoi în a patra zi după operație, în

microjejunostomă se introduce în picătură bila
eliminată prin dren, iar peste 2 săptămâni drenul se
unește cu microjejunostoma. Peste 6 luni
după operație se aplică hepaticojejunostoma după
metoda Roux și drenul se înlătură.

Revendicări: 1

Figuri: 1