



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 101306093 B

(45) 授权公告日 2012.05.30

(21) 申请号 200810109770.4

(22) 申请日 2008.06.06

(73) 专利权人 王丽城

地址 311400 浙江省富阳市富春街道杨梅山村1号信箱

(72) 发明人 王丽城

(51) Int. Cl.

A61K 36/71 (2006.01)

A61P 35/00 (2006.01)

A61P 7/04 (2006.01)

(56) 对比文件

CN 1772202 A, 2006.05.17,

CN 101081267 A, 2007.12.05,

CN 1814136 A, 2006.08.09,

王泽中. 上消化道出血的中医治疗. 《云南中医杂志》. 1992, 第13卷(第5期),

审查员 张娜

权利要求书 1 页 说明书 2 页

(54) 发明名称

一种治疗食道癌呕血的汤剂药物

(57) 摘要

本发明涉及一种中药制剂,即一种治疗食道癌呕血的汤剂药物。其药物是由下述重量份的原料制成的:干苔、红半边莲各13-15克,回回蒜7-8克,羽叶三七、红木耳各9-12克。它具有成本低、制备易、毒副作用小、疗效显著的特点。

1. 一种治疗食道癌呕血的汤剂药物,其特征在于该药物是由下述原料制成的:干苔、红半边莲各 13-15 克,回回蒜 7-8 克,羽叶三七、红木耳各 9-12 克。

一种治疗食道癌呕血的汤剂药物

技术领域：

[0001] 本发明涉及一种中药制剂,即治疗食道癌呕血效果十分理想的一种治疗食道癌呕血的汤剂药物。

背景技术：

[0002] 呕血是一种出血性疾病,引起的原因多种多样,一般由外感邪毒,内伤情志,使血液不循常道,迫血妄行,从口腔呕出。食道癌呕血是因癌肿迫使停于食管内的血液从口中呕出。其症状表现为:小量持续性呕血、伴有吞咽困难、返食、呃逆等症状。目前,国内外治疗食道癌呕血的药物较多,有西药也有中药,但是,存在药物价格高、治疗效果不令人满意等缺点。

发明内容：

[0003] 本发明的目的是针对目前治疗食道癌呕血使用药物所存在的不足之处,而提供一种价格低廉、疗效显著的治疗食道癌呕血的汤剂药物。

[0004] 本发明的技术方案是这样实现的：

[0005] 一种治疗食道癌呕血的汤剂药物,其药物是由下述重量份的原料制成的:干苔、红半边莲各 13-15 克,回回蒜 7-8 克,羽叶三七、红木耳各 9-12 克。

[0006] 一种治疗食道癌呕血的汤剂药物,其药物的制备方法为:将上述中药原料按配比量放入煎药器具砂锅、瓦罐或铝锅内,加入洁净水,加水量以浸过药面 2-3cm 为宜,煎熬前先浸泡半小时,使原料充分湿润,以利药汁充分煎出,然后,用武火煮沸,再改用文火煎熬,当煎熬 20 分钟左右,即每剂煎成 180-200 毫升药汁时停止,滤去药渣,取药汁即成。

[0007] 一种治疗食道癌呕血的汤剂药物,其药物配方原料价格便宜,取料容易,可降低治疗费用,减轻患者经济负担。

[0008] 一种治疗食道癌呕血的汤剂药物,其治疗原则是消积散瘀、凉血止血。在原料配方上遵循药性经属,偏重消积散瘀,兼顾整体平衡,落脚凉血止血。药物中干苔具有软坚、消积、化痰作用,红半边莲具有清热解毒、消肿止痛作用,回回蒜具有消炎退肿作用,羽叶三七具有散瘀止血作用,红木耳具有凉血止血作用。上述中药原料经辨证配伍,在作用上相辅相成,从而有效地发挥出消积散瘀、凉血止血的功效,以达到治愈食道癌呕血之目的。

[0009] 本发明具有如下特点:成本低、制备易、毒副作用小、疗效显著。

[0010] 服用方法：

[0011] 1、药量:每日一剂。每剂先后煎两次,将头煎、二煎两次煎成的药汁合并后,分两次服用。

[0012] 2、服药时间:上、下午各一次。在饭后两小时服药。

[0013] 3、药温控制:温服。

[0014] 禁忌事项：

[0015] 服药期间禁忌食油炸粘腻、寒冷固硬、不易消化及有刺激性的食物。

具体实施方式：

[0016] 实施例 1：一种治疗食道癌呕血的汤剂药物的原料组合为：干苔、红半边莲各 13 克，回回蒜 7 克，羽叶三七、红木耳各 9 克。药物的制备方法为：将上述中药原料按配比量放入煎药器具砂锅、瓦罐或铝锅内，加入洁净水，加水量以浸过药面 2-3cm 为宜，煎熬前先浸泡半小时，使原料充分湿润，以利药汁充分煎出，然后，用武火煮沸，再改用文火煎熬，当煎熬 20 分钟左右，即每剂煎成 180-200 毫升药汁时停止，滤去药渣，取药汁即成。

[0017] 实施例 2：一种治疗食道癌呕血的汤剂药物的原料组合为：干苔、红半边莲各 15 克，回回蒜 8 克，羽叶三七、红木耳各 12 克。药物的制备方法为：将上述中药原料按配比量放入煎药器具砂锅、瓦罐或铝锅内，加入洁净水，加水量以浸过药面 2-3cm 为宜，煎熬前先浸泡半小时，使原料充分湿润，以利药汁充分煎出，然后，用武火煮沸，再改用文火煎熬，当煎熬 20 分钟左右，即每剂煎成 180-200 毫升药汁时停止，滤去药渣，取药汁即成。

[0018] 临床治疗效果：

[0019] 疗效标准：一种治疗食道癌呕血的汤剂药物治疗食道癌呕血之疗效判断主要依据于食道癌呕血症状是否消失。用药 6 天为 1 个疗程。具体疗效分以下三级：治愈——食道癌呕血症状全部消失；好转——食道癌呕血症状明显减轻；无效——用药 1 个疗程后，食道癌呕血症状毫无消失。

[0020] 效果：用本发明药物治疗食道癌呕血患者 6 例，治疗 1 个疗程，其中治愈 5 例，好转 1 例，治愈率为 83%，有效率为 100%。

[0021] 典型病例：

[0022] 邓某，男，64 岁，退休教师。2006 年 2 月就诊。患者家人介绍，患者是食道癌病人，已动过几次手术治疗，近几天发生呕血，血量不大，但呕血频繁，吞食困难，呃逆。经诊查后，诊断为食道癌呕血。采用本发明汤剂药物，先服 3 剂，呕血次数明显减少，继而又服 3 剂，呕血停止。一周后，上门随访，未出现呕血现象。