

①9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

①1 N° de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

2 555 573

②1 N° d'enregistrement national : **83 19056**

⑤1 Int Cl⁴ : C 07 C 93/06; A 61 K 31/135.

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②2 Date de dépôt : 29 novembre 1983.

③0 Priorité :

④3 Date de la mise à disposition du public de la
demande : BOPI « Brevets » n° 22 du 31 mai 1985.

⑥0 Références à d'autres documents nationaux appa-
rentés :

⑦1 Demandeur(s) : Société à responsabilité limitée dite :
INSTITUT DE RECHERCHES CHIMIQUES ET BIOLOGI-
QUES APPLIQUEES (IRCEBA). — FR.

⑦2 Inventeur(s) : Jean-Yves Lacolle et Bernard Danrée.

⑦3 Titulaire(s) :


⑦4 Mandataire(s) : SA Fédit-Loriot.

⑤4 Dérivés de β -[2-(halogénobenzyl)-phénoxy]-éthylamine, procédé de préparation et utilisation en thérapeutique.


⑤7 La présente invention concerne en tant que produits
industriels nouveaux des dérivés de β -[2-(halogénobenzyl)-phé-
noxy]-éthylamine de formule :

où Y est F, Cl ou Br, et, Y₂ et Y₃ identiques ou différents
représentent chacun H, F, Cl ou Br, leurs sels d'addition
d'acide et leurs sels d'ammonium. Ces nouveaux produits sont
utiles en thérapeutique.

L'invention concerne également leur procédé de préparation.



(où R est un groupe alkyle en C₁-C₈ à chaîne hydrocarbonée
linéaire ou ramifiée; R₁ et R₂, identiques ou différents, repré-
sentent chacun un groupe alkyle en C₁-C₄; et Ar représente un
groupe halogénophényle de formule :



FR 2 555 573 - A1

Dérivés de β -[2-(halogénobenzyl)-phénoxy]-
éthylamine, procédé de préparation et utilisation en thérapeutique.

La présente invention concerne en tant que produits industriels nouveaux des dérivés de β -[2-(halogénobenzyl)-phénoxy]-éthylamine. Elle concerne également le
5 procédé de préparation et l'utilisation en thérapeutique de ces nouveaux produits.


On sait que l'on a déjà préconisé dans le passé d'utiliser des 2-(halogénobenzyl)-4-alkylphénols (où le
10 groupe 4-alkyle est un radical hydrocarboné ramifié, notamment un radical isopropyle, s-butyle, t-butyle ou 1,1,3,3-tétraméthylbutyle) en tant que substances bactériostatiques, voir à cet effet US-A-3 830 852, US-A-3 855 317 et US-A-3 984 482, d'une part, et l'article de BUU-HOI et al., J. Org. Chem., 20,
15 1129-1134 (1955), d'autre part.

On sait en particulier que le 2-(2,4-dichlorobenzyl)-4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)-phénol (qui a pour N° de code B.11 et qui est décrit à l'exemple 1 de US-A-3 830 852 précité) a été commercialisé en France en tant que médicament
20 anti-infectieux (Dénomination Commune Internationale : "CLOFOCTOL" ; nom de marque de la spécialité : "OCTOFENE"). Or, il se trouve que ce produit, qui est particulièrement efficace dans le traitement des maladies infectieuses dues aux bactéries Gram⁺, et ses analogues du type 2-(halogénobenzyl)-4-alkylphénol ne sont pas naturellement
25 hydrosolubles ni hydrodispersables. La faible affinité pour l'eau constitue un inconvénient qui limite, sur le plan galénique, l'utilisation de ces produits.

Selon l'invention, on préconise de nouveaux composés, structurellement différents de ceux de l'art antérieur précité, d'une part, et particulièrement intéressants sur le plan

thérapeutique en raison notamment de leur affinité pour l'eau et de leurs propriétés anti-infectieuses et /ou antidépressives, d'autre part.

Les nouveaux composés selon l'invention, qui
 5 sont des dérivés de β -[2-(halogénobenzyl)-phénoxy]-éthylamine, sont caractérisés en ce qu'ils sont choisis parmi l'ensemble constitué par (i) les N,N-dialkyl- β -[2-(halogénobenzyl)-4-alkylphénoxy]-éthylamines répondant à la formule générale




dans laquelle

R représente un groupe alkyle en C_1 - C_8 à chaîne hydrocarbonée linéaire ou ramifiée,

20 R_1 et R_2 , identiques ou différents, représentent chacun un groupe alkyle en C_1 - C_4 , et

Ar représente un groupe halogénophényle de formule




(où Y_1 est F, Cl ou Br, et, Y_2 et Y_3 ,
identiques ou différents, représentent
chacun H, F, Cl ou Br) ; et

(ii) leurs sels d'addition.

5 Parmi les groupes alkyle R qui conviennent,
on peut notamment mentionner les groupes CH_3 , CH_2CH_3 ,
 $CH(CH_3)_2$, $C(CH_3)_3$, $CH(CH_3)CH_2CH_3$, $(CH_2)_3CH_3$, $CH_2C(CH_3)_3$,
15 $CH_2CH(CH_3)CH_2CH_3$, $C(CH_3)_2CH_2C(CH_3)_3$, $C(CH_3)_2CH_2CH_3$, $(CH_2)_5CH_3$.


Par sels d'addition, on entend ici, d'une
10 part, les sels d'addition d'acide obtenus par réaction de la
base libre de formule I avec des acides minéraux ou organiques,
et, d'autre part, les sels d'ammonium. Parmi les acides utilisables
pour salifier la base de formule I, on peut notamment citer les
15 acides chlorhydrique, bromhydrique, acétique, formique, propionique,
oxalique, fumarique, maléique, succinique, benzoïque, cinnamique,
mandélique, citrique, malique, tartrique, aspartique, glutamique,
méthanesulfonique, p-toluènesulfonique. Parmi les composés
permettant d'obtenir des sels d'ammonium, on peut citer les composés
20 XR_3 (où X est F, Cl, Br ou I, et, R_3 est un groupe alkyle en
 C_1-C_{10} ou un groupe benzyle).

L'invention vise donc les bases libres de formule I
et leurs sels d'addition d'acide, d'une part, et leurs sels
d'ammonium de formule




(où Ar, R, R_1 , R_2 , R_3 et X sont définis comme ci-dessus), d'autre
part.

Les produits préférés selon l'invention
sont ceux où $R_1 = R_2 = \text{CH}_3$ ou CH_2CH_3 , et Y_1 est 4-Cl, Y_2 est H
et Y_3 est H, 2-Cl ou 3-Cl, et qui sont représentés par la formule




où R est un groupe alkyle en $\text{C}_1\text{-C}_8$, R' est CH_3 ou C_2H_5 ; leurs
sels d'addition d'acide, et, leurs sels d'ammonium quaternaire avec
 XR'_3 (où R'_3 est CH_3 , CH_2CH_3 ou $\text{CH}_2\text{C}_6\text{H}_5$, et, X est F, Cl, Br ou I). Les
15 sels d'ammonium préférés sus-visés peuvent être représentés par
la formule




(où X, R, R' et R_3 sont définis comme ci-dessus, X étant avanta-
25 geusement Cl, Br ou I).

Les composés selon l'invention peuvent être préparés selon une méthode connue en soi par application de mécanismes réactionnels classiques. Le procédé que l'on préconise selon l'invention consiste à faire réagir un 2-(halogénobenzyl)-4-alkylphénol de formule



où Ar et R sont définis comme ci-dessus, avec un halogénure de β -N,N-dialkylaminoéthyle de formule



(où Hal est Cl ou Br, et, R_1 et R_2 sont définis comme indiqué ci-dessus).

Cette réaction est avantageusement réalisée dans un solvant inerte, notamment le diméthylformamide, le tétrahydrofuranne, pendant au moins 5 heures à une température inférieure ou égale à la température de reflux du milieu réactionnel, à raison d'au moins 1,1 mole de V pour 1 mole de IV, l'halogénure étant de préférence le chlorure (Hal = Cl).

Les bases libres de formule I, leurs sels d'addition d'acide et leurs sels d'ammonium sont utiles en thérapeutique. Ils présentent tous des propriétés antiinfectieuses en ce sens qu'ils agissent selon les doses en tant que moyens bactériostatiques, bactéricides, fongistatiques, ou, fongicides ; d'une manière générale les sels d'ammonium sont plus actifs en tant que substances antiinfectieuses que les sels d'addition d'acides, ces derniers étant également plus actifs que les bases libres.

Par ailleurs, les bases libres et leurs sels d'addition d'acides présentent d'autres effets bénéfiques : ils agissent sur le système nerveux central en tant qu'agents antidépresseurs, et sont actifs vis-à-vis de l'énurésie.


5 Selon l'invention on préconise une composition thérapeutique qui est caractérisée en ce qu'elle renferme en association avec un excipient physiologiquement acceptable, au moins un composé de formule I ou l'un de ses sels d'addition, en tant que principe actif.

10 Bien entendu, dans une telle composition le principe actif, qui est choisi parmi les bases libres de formule I, leurs sels d'addition non-toxiques et, le cas échéant, leurs mélanges, intervient en quantité pharmaceutiquement efficace.

On a consigné de façon nullement limitative dans
15 les tableaux I, II et III qui suivent un certain nombre de composés selon l'invention ; les concentrations minimales inhibitrices (CMI) de ces composés vis-à-vis d'une souche de bactérie Gram+ (Staphylococcus aureus London), d'une souche de bactérie Gram⁻ (Escherichia coli) et d'une souche de champignon (Candida albicans) sont données dans le tableau IV ci-après. Dans le tableau
20 V on a consigné les CMI de deux produits selon l'invention qui sont particulièrement intéressants [composé B673 (exemple 26) et composé B 674 (exemple 29)]-vis-à-vis de plusieurs souches.

Les souches utilisées sont celles des catalogues de
25 l'"Institut Pasteur" (en abrégé "CIP"), du "Centre International de Distribution de Souches et d'Information sur les Types Microbiens de Lausanne" (en abrégé "La") et de l'"American Type Culture Collection" (en abrégé "ATCC").


TABLEAU I



Produit	No de Code	R	R ₁	R ₂	Y ₁	Y ₂	Y ₃	Eb(a) (°C)
Ex 1	B 715	CH ₃	C ₂ H ₅	C ₂ H ₅	4-Cl	H	2-Cl	-
Ex 2	B 776	CH ₂ CH ₃	C ₂ H ₅	C ₂ H ₅	4-Cl	H	2-Cl	180-190
Ex 3	B 770	CH(CH ₃) ₂	C ₂ H ₅	C ₂ H ₅	4-Cl	H	2-Cl	200-206
Ex 4	B 803	CH(CH ₃)CH ₂ CH ₃	C ₂ H ₅	C ₂ H ₅	4-Cl	H	2-Cl	172-174
Ex 5	B 680	C(CH ₃) ₃	C ₂ H ₅	C ₂ H ₅	4-Cl	H	2-Cl	195-197
Ex 6	B 748	C(CH ₃) ₂ CH ₂ CH ₃	C ₂ H ₅	C ₂ H ₅	4-Cl	H	2-Cl	180-184
Ex 7	B 760	(CH ₂) ₃ CH ₃	C ₂ H ₅	C ₂ H ₅	4-Cl	H	2-Cl	185-190
Ex 8	B 750	(CH ₂) ₅ CH ₃	C ₂ H ₅	C ₂ H ₅	4-Cl	H	2-Cl	210-215
Ex 9	B 629	C(CH ₃) ₂ CH ₂ C(CH ₃) ₃	C ₂ H ₅	C ₂ H ₅	4-Cl	H	2-Cl	-
Ex 10	-	CH(CH ₃) ₂	CH ₃	CH ₃	4-Cl	H	3-Cl	-

Note (a) : Point d'ébullition sous 0,5 mmHg (soit environ 66,6 pascals)

TABLEAU III



Produit	n° de code	R	R ₁	R ₂	R ₃	Y ₁	Y ₂	Y ₃	X	F(a) (°C)
Ex 21	B 794	C(CH ₃) ₂ CH ₂ CH ₃	C ₂ H ₅	C ₂ H ₅	CH ₃	4-Cl	H	2-Cl	I	138-140
Ex 22	B 622	C(CH ₃) ₂ CH ₂ C(CH ₃) ₃	C ₂ H ₅	C ₂ H ₅	CH ₃	4-Cl	H	2-Cl	I	157-158
Ex 23	B 798	C(CH ₃) ₂ CH ₂ CH ₃	C ₂ H ₅	C ₂ H ₅	(CH ₂) ₃ CH ₃	4-Cl	H	2-Cl	Br	104-108
Ex 24	B 808	C(CH ₃) ₂ CH ₂ C(CH ₃) ₃	C ₂ H ₅	C ₂ H ₅	(CH ₂) ₃ CH ₃	4-Cl	H	2-Cl	Br	167-168
Ex 25	B 852	C(CH ₃) ₃	C ₂ H ₅	C ₂ H ₅	(CH ₂) ₃ CH ₃	4-Cl	H	2-Cl	Br	124-125
Ex 26	B 673	CH ₃	C ₂ H ₅	C ₂ H ₅	CH ₂ C ₆ H ₅	4-Cl	H	2-Cl	Cl	134-136
Ex 27	B 791	CH ₂ CH ₃	C ₂ H ₅	C ₂ H ₅	CH ₂ C ₆ H ₅	4-Cl	H	2-Cl	Cl	125-130
Ex 28	B 774	CH(CH ₃) ₂	C ₂ H ₅	C ₂ H ₅	CH ₂ C ₆ H ₅	4-Cl	H	2-Cl	Cl	116-118
Ex 29	B 674	C(CH ₃) ₃	C ₂ H ₅	C ₂ H ₅	CH ₂ C ₆ H ₅	4-Cl	H	2-Cl	Cl	120-125

TABLEAU III (suite)

Produit	n° de code	R	R ₁	R ₂	R ₃	Y ₁	Y ₂	Y ₃	X	F(a) (°C)
Ex 30	B 768	$C(CH_3)_2CH_2CH_3$	C_2H_5	C_2H_5	$CH_2C_6H_5$	4-Cl	H	2-Cl	Cl	132-135
Ex 31	B 773	$(CH_2)_3CH_3$	C_2H_5	C_2H_5	$CH_2C_6H_5$	4-Cl	H	2-Cl	Cl	126-128
Ex 32	B 775	$(CH_2)_5CH_3$	C_2H_5	C_2H_5	$CH_2C_6H_5$	4-Cl	H	2-Cl	Cl	125-127
Ex 33	B 617	$C(CH_3)_2CH_2C(CH_3)_3$	C_2H_5	C_2H_5	$CH_2C_6H_5$	4-Cl	H	2-Cl	Cl	181-183
Ex 34	-	CH_3	CH_3	CH_3	CH_2CH_3	4-Cl	H	2-Cl	Cl	-
Ex 35	-	$CH(CH_3)CH_2CH_3$	CH_3	CH_3	$CH_2C_6H_5$	4-Cl	H	3-Cl	Cl	-
Ex 36	-	$CH(CH_3)_2$	CH_3	CH_3	$CH_2C_6H_5$	4-Cl	H	3-Cl	Cl	-
Ex 37	-	$C(CH_3)_3$	CH_3	CH_3	$CH_2C_6H_5$	4-Cl	H	3-Cl	Cl	-
Ex 38	-	$C(CH_3)_2CH_2C(CH_3)_3$	CH_3	CH_3	$CH_2C_6H_5$	4-Cl	H	2-Cl	F	-
Ex 39	-	$CH(CH_3)CH_2CH_3$	CH_3	CH_3	CH_2CH_3	4-Cl	H	2-Cl	F	-
Ex 40	-	$C(CH_3)_2CH_2CH_3$	C_2H_5	C_2H_5	CH_2CH_3	4-Cl	3-Cl	2-Cl	F	-

Note : (a) point de fusion instantané.

TABLEAU IV

Produit	n° de Code	CMI ($\mu\text{g/ml}$)		
		G ⁺	G ⁻	C
Ex 1	B 715	12,5	50	-
Ex 2	B 776	64	-	64
Ex 3	B 770	16	-	8
Ex 4	B 803	32	-	16
Ex 5	B 680	50	-	-
Ex 6	B 748	8	-	16
Ex 7	B 760	64	64	64
Ex 8	B 750	64	64	64
Ex 9	B 629	25	-	-
Ex 10	-	16	64	-
Ex 11	B 795	8	-	8
Ex 12	B 805	4	-	4
Ex 13	B 809	8	-	0,5
Ex 14	B 785	8	64	4
Ex 15	B 751	16	-	-
Ex 21	B 794	0,125	8	0,5
Ex 22	B 622	0,125	64	0,25
Ex 23	B 798	0,06	4	0,25
Ex 24	B 808	0,015	16	1
Ex 26	B 673	0,25	32	4
Ex 27	B 791	0,125	8	0,5
Ex 28	B 774	0,015	8	0,25
Ex 29	B 674	0,015	4	0,125
Ex 30	B 768	0,004	4	0,25
Ex 31	B 773	0,031	4	0,125
Ex 32	B 775	0,125	16	0,5
Ex 33	B 617	0,03	-	1
Notes : G⁺ = souche Gram⁺ : <u>Staphylococcus aureus</u> London CIP A.238 G⁻ = souche Gram⁻ : <u>Escherichia coli</u> CIP 54.8 C = souche de champignon : <u>Candida albicans</u> CIP 1180				

TABLEAU V

CMI (en $\mu\text{g/ml}$) vis-à-vis de plusieurs souches

	Souches	Exemple 26 (B 673)	Exemple 29 (B 674)
5	<u>Staphylococcus aureus</u> ATCC 6538 P	0,78	0,78
	<u>Streptococcus pyogenes</u> la 147	0,78	0,78
	<u>Streptococcus pyogenes</u> CIP A.241	0,78	0,78
	<u>Streptococcus pyogenes</u> CIP 56.42	0,78	0,78
	<u>Streptococcus faecalis</u> CIP 53.152	3,125	0,78
10	<u>Diplococcus pneumoniae</u> la 209	1,56	0,78
	<u>Bacillus subtilis</u> ATCC 6633	1,56	0,78
	<u>Corynebacterium diphtheriae</u> CIP A.102	25	3,125
	<u>Branhamella catarrhalis</u> la 987	0,78	0,78
	<u>Neisseria gonorrhoeae</u> CIP A.52	0,78	0,78
15	<u>Haemophilus influenzae</u> CIP 5293	0,78	0,78
	<u>Klebsiella pneumoniae</u> la 433	25	6,25
	<u>Streptococcus pyogenes</u> CIP 5641	0,78	0,78
	<u>Neisseria meningitidis</u> CIP 7310	0,78	0,78
	<u>Listeria monocytogenes</u> CIP 54153	1,56	0,78

20 D'une manière générale, les composés selon l'invention sont peu toxiques et bien tolérés par l'organisme. Le tableau VI ci-après montre en particulier que les sels d'ammonium des composés de formule I sont moins toxiques que des sels d'ammonium antérieurement connus en tant que moyens anti-infectieux.


TABLEAU VI
TOXICITE

Produit	n° de code	DL-50 souris (mg/kg)
Ex 23	B 798	> 1 000
Ex 26	B 673	> 1 000
Ex 27	B 791	850
Ex 29	B 674	> 1 000
Ex 30	B 768	> 1 000
Ex 31	B 773	> 1 000
A-1 (a)	-	550
A-2 (b)	-	750
<u>Notes</u> : (a) : chlorure de benzalkonium (b) : chlorure de cetrymonium		

D'autres avantages et caractéristiques de l'invention
seront mieux compris à la lecture qui va suivre d'exemples de pré-
paration nullement limitatifs, mais donnés à titre d'illustration.

PREPARATION I

Obtention de la β -[2-(2,4-dichlorobenzyl)-4-tertiobutylphénoxy]-N,N-
diéthyl-éthylamine.



(exemple 5 ; n° de code : B 680) ;

autre nomenclature : 2-[(2-diéthylamino-éthoxy)-5-tertiobutyl-2',4'-
dichlorodiphénylméthane.


On fait réagir dans un réacteur un mélange constitué par 1 mole (309,18 g) de 2-(2,4-dichlorobenzyl)-4-tertiobutyl-phénol, 2,4 mole de K_2CO_3 , 2 litres de diméthylformamide et 1,2 moles de chlorhydrate de 2-chloro-N,N-diéthyl-éthylamine, sous agitation pendant 15 heures à 120°C.

On verse le milieu réactionnel dans de l'eau saturée en NaCl, extrait au moyen de $CHCl_3$, lave la phase chloroformique avec de l'eau, sèche et évapore le solvant sous vide. Par distillation sous vide du résidu d'évaporation on obtient le B 680 avec un rendement de 76,1 %.

$Eb_{0,5 \text{ mmHg}} = 195-197^\circ C.$

PREPARATION II

Obtention du chlorure de N,N-diéthyl-N-{2-[2-(2,4-dichlorobenzyl)-4-tertiobutylphénoxy]-éthyl}-N-benzylammonium.



(exemple 29 ; n° de code : B 674).

On fait réagir dans un réacteur 1 mole (408,25 g) de β -[2-(2,4-dichlorobenzyl)-4-tertiobutylphénoxy]-N,N-diéthyl-éthylamine avec 1,25 mole de chlorure de benzyle, pendant 17 heures à 90-100°C, sous agitation. Après refroidissement jusqu'à la température ambiante (15-20°C), on lave le milieu réactionnel avec le diéthylether pour obtenir un précipité, qu'on lave à l'hexane puis à l'acétone à froid (15-20°C). Par recristallisation on obtient le B 674 avec un rendement de 85,8 %.

$F_{inst.} = 120-125^\circ C.$

PREPARATION III

Obtention du chlorhydrate de β -[2-(2,4-dichlorobenzyl)-4-(1,1-diméthylpropyl)-phénoxy]-N,N-diéthyl-éthylamine.

(exemple 14 ; n° de code : B 785)

- 5 Dans une solution de 1 mole (422,31 g) de β -[2-(2,4-dichlorobenzyl)-4-(1,1-diméthylpropyl)-phénoxy]-N,N-diéthyl-éthylamine (exemple 6 : n° de code : B 748) dans 800 ml de diéthyléther anhydre, on fait barboter un courant de HCl gaz. On concentre sous vide jusqu'à siccité, reprend le résidu d'évaporation avec du diéthyléther anhydre. Il se forme un précipité qu'on lave avec du diéthyléther anhydre. On obtient le B 785 avec un rendement de 83,3 %.
- 10 $F_{inst} = 145-150^{\circ}C$.

PREPARATION IV

- 15 Obtention du iodure de N,N-diéthyl-N-[2-[2-(2,4-dichlorobenzyl)-4-(1,1-diméthylpropyl)-phénoxy]-éthyl]-N-méthylammonium.
- (exemple 21 ; n° de code : B 794)

- On fait réagir pendant 2 heures à 45°C sous agitation un mélange de 1 mole (422,31 g) de β -[2-(2,4-dichlorobenzyl)-4-(1,1-diméthylpropyl)-phénoxy]-N,N-diéthyl-éthylamine, de 1,25 mole de ICH_3 et 1,2 l d'acétone anhydre. Après refroidissement, on verse le milieu réactionnel sur $CH_3CO_2C_2H_5$ froid (15°C). On obtient un précipité. Par recristallisation dans le mélange $CH_3CO_2C_2H_5 - C_2H_5OH$ (98 : 2) v/v on obtient le B 794 avec un rendement de 62,4 %.
- 20 $F_{inst} = 138-140^{\circ}C$.


PREPARATION V

- 25 Obtention du bromure de N,N-diéthyl-N-[2-[2-(2,4-dichlorobenzyl)-4-(1,1-diméthylpropyl)-phénoxy]-éthyl]-N-butylammonium.
- (exemple 23 ; n° de code : B 798).

- On fait réagir 1 mole (422,31 g) de β -[2-(2,4-dichlorobenzyl)-4-(1,1-diméthylpropyl)-phénoxy]-N,N-diéthyléthylamine avec 1,25 mole de 1-bromobutane, pendant 15 heures à 100°C, sous agitation. Après refroidissement, on lave le milieu réactionnel avec de l'hexane puis avec du diéthyléther pour obtenir un précipité. Par lavage du précipité à 30°C avec $CH_3CO_2C_2H_5$ on obtient le B 798 avec un rendement de 20,4 %.
- 30 $F_{inst} = 104-108^{\circ}C$.

REVENDICATIONS

1- Dérivé de β -[2-(halogénobenzyl)-phénoxy]-éthylamine
caractérisé en ce qu'il est choisi parmi l'ensemble constitué par
(i) les N,N-dialkyl- β -[2-(halogénobenzyl)-4-alkylphénoxy]-
éthylamines répondant à la formule générale




dans laquelle

R représente un groupe alkyle en C_1 - C_8 à chaîne hydro-
carbonée linéaire ou ramifiée,

R_1 et R_2 , indentiques ou différents, représentent chacun
un groupe alkyle en C_1 - C_4 , et

Ar représente un groupe halogénophényle de formule



(où Y_1 est F, Cl ou Br, et, Y_2 et Y_3 , indentiques ou
différents, représentent chacun H, F, Cl ou Br) ; et

(ii) leurs sels d'addition.

25 2 - Dérivé selon la revendication 1, caractérisé en ce que
R est un groupe CH_3 , CH_2CH_3 , $CH(CH_3)_2$, $C(CH_3)_3$, $CH(CH_3)CH_2CH_3$,
 $C(CH_3)_2CH_2CH_3$, $(CH_2)_3CH_3$, $(CH_2)_5CH_3$, $CH_2C(CH_3)_3$, $CH_2CH(CH_3)CH_2CH_3$,
 $C(CH_3)_2CH_2C(CH_3)_3$.

30 3 - Dérivé selon la revendication 1, caractérisé en ce
qu'il est choisi parmi l'ensemble constitué par les sels d'ammonium
de formule




10

15



25

5 - Dérivé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il est choisi parmi l'ensemble constitué par les sels d'ammonium de formule



où R' est CH₃, C₂H₅, R est un groupe alkyle en C₁-C₈,

R₃ est CH₃, CH₂CH₃ ou CH₂C₆H₅, et X est F, Cl, Br ou I.

10 6 - β-[2-(2,4-Dichlorobenzyl)-4-tertiobutylphénoxy]-N,N-diéthyl-éthylamine et ses sels d'addition.

7 - β-[2-(2,4-Dichlorobenzyl)-4-(1,1-diméthylpropyl)-phénoxy]-N,N-diéthyl-éthylamine et ses sels d'addition.


15 8 - Chlorure de N,N-diéthyl-N-[2-[2-(2,4-dichlorobenzyl)-4-tertiobutylphénoxy]-éthyl]-N-benzylammonium.

9. β-[2-(2,4-Dichlorobenzyl)-4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)-phénoxy]-N,N-diéthyl-éthylamine et ses sels d'addition.


10. Chlorure de N,N-diéthyl-N-[2-[2-(2,4-dichlorobenzyl)-4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)-phénoxy]-éthyl]-N-benzylammonium.

20 11. Composition thérapeutique caractérisée en ce qu'elle renferme, en association avec un excipient physiologiquement, au moins un composé de formule I ou l'un de ses sels d'addition selon l'une quelconque des revendications 1 à 10.

25 12. Procédé de préparation d'un composé de formule I ou l'un de ses sels d'addition selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on fait réagir un 2-(halogénobenzyl)-4-alkylphénol de formule



(où R et Ar sont définis comme indiqué ci-dessus) avec un halogénure de β -N,N-dialkylaminoéthyle de formule



- 5 (où Hal est Cl ou Br, et, R_1 et R_2 sont définis comme indiqués ci-dessus, dans un solvant inerte, pendant au moins 5 heures à une température inférieure ou égale à la température de reflux du milieu réactionnel, si nécessaire, les sels d'addition d'acide étant ensuite obtenus par réaction de la base libre avec un acide minéral ou organique, et les sels d'ammonium étant obtenus par réaction de
- 10 la base libre avec un halogénure R_3X (où X est F, Cl, Br ou I, et, R_3 est un groupe alkyle en $\text{C}_1\text{-C}_{10}$ ou un groupe benzyle).