



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 1994416 B

(45) 授权公告日 2010.05.12

(21) 申请号 200610130824.6

(22) 申请日 2006.12.28

(73) 专利权人 王玉秀

地址 311500 浙江省桐庐县工商分局

(72) 发明人 王玉秀

(51) Int. Cl.

A61K 36/8905(2006.01)

A61K 36/533(2006.01)

A61K 36/481(2006.01)

A61K 36/232(2006.01)

A61P 15/08(2006.01)

(56) 对比文件

CN 1435215 A, 2003.08.13, 摘要.

CN 1695700 A, 2005.11.16, 摘要.

CN 1401374 A, 2003.03.12, 摘要.

审查员 魏健

权利要求书 1 页 说明书 2 页

(54) 发明名称

一种治疗闭经的内服中药

(57) 摘要

一种治疗闭经的内服中药,涉及治疗闭经的中草药配方,其药物是由下述重量份的原料制成的:益母草 20-25 克,当归 13-15 克,黄芪 10-12 克,香附 8-9 克。本发明的特点是取材容易、制备方便、费用低廉、见效快。

1. 一种治疗闭经的内服中药,其特征在于该药物是由下述重量份的原料制成的:益母草 20-25 克,当归 13-15 克,黄芪 10-12 克,香附 8-9 克。

一种治疗闭经的内服中药

技术领域：

[0001] 本发明涉及中草药领域,尤其是涉及防治闭经效果十分理想的一种治疗闭经的内服中药。

背景技术：

[0002] 闭经是指超过青春期年满 18 岁以上的妇女,月经仍未来潮或正常月经周期建立之后,至绝经之前的任何时期,月经突然停止,且超过 3 个月以上仍未来潮的症状。引起闭经的原因较为复杂,一般认为因先天不足、后天失养造成,或因气滞血瘀、经脉不畅所致。目前,国内外治疗闭经的方法较多,如西药治疗法,常用药有溴隐停、炔雌醇、地塞米松等;如中药治疗法,常用药有十全大补丸、归脾丸、当归六黄散等。但是,在治愈率、治疗手段、治疗费用等方面难以达到满意的效果。

[0003] 经检索未发现与本发明相同的配方。

发明内容：

[0004] 本发明采用的治疗方法为中草药汤剂治疗法。

[0005] 本发明的目的在于克服目前在治疗闭经上的不足之处,并提供一种取材容易、制备方便、费用低廉且治愈率较高的治疗闭经的中草药汤剂药物及制备方法。

[0006] 本发明的技术方案是这样实现的：

[0007] 一种治疗闭经的内服中药,其药物是由下述重量份的原料制成的:益母草 20-25 克,当归 13-15 克,黄芪 10-12 克,香附 8-9 克。

[0008] 一种治疗闭经的内服中药,其药物的制备方法为:先将配比量益母草、当归、黄芪、香附等中草药放入煎药器具内,加入符合生活饮用水标准的洁净水,加水量以超过药面 2-3cm 为度。入煎前将上述中草药浸泡半小时,使其充分湿润,以利药汁充分煎出。然后,用武(猛)火煮沸再改用文(微)火煎熬。当煎熬 15 分钟左右停止,除去药渣,取汤剂即成。

[0009] 本发明内服中药里:益母草具有调经活血、利尿消肿作用;当归具有补血活血、调经止痛作用;黄芪具有补气固表、利水作用;香附具有理气疏肝、调经止痛作用。上述中草药经有机组合、辩证配伍和相互辅佐,增强了该药物补血活血、行气通经的功效,从而达到治愈闭经的目的。

[0010] 使用本发明的治疗闭经的内服中药治疗闭经有如下特点:取材容易、制备方便、费用低廉、见效快。

[0011] 服用方法：

[0012] 1、药量:每日一剂。将头煎、二煎两次煎成的汤剂混合后,分两次服用。

[0013] 2、服药时间:上、下午各一次,在饭后两小时服药。

[0014] 3、药温控制:温服。

[0015] 禁忌事项：

[0016] 治疗、服药期间禁忌食油炸粘腻、寒冷固硬、不易消化及有刺激性的食物。

具体实施方式：

[0017] 实施例 1：一种治疗闭经的内服中药的原料配方：益母草 20 克，当归 13 克，黄芪 10 克，香附 8 克。药物的制备方法为：先将配比量益母草、当归、黄芪、香附等中草药放入煎药器具内，加入符合生活饮用水标准的洁净水，加水量以超过药面 2-3cm 为度。入煎前将上述中草药浸泡半小时，使其充分湿润，以利药汁充分煎出。然后，用武（猛）火煮沸再改用文（微）火煎熬。当煎熬 15 分钟左右停止，除去药渣，取汤剂即成。

[0018] 实施例 2：一种治疗闭经的内服中药的原料配方：益母草 25 克，当归 15 克，黄芪 12 克，香附 9 克。药物的制备方法为：先将配比量益母草、当归、黄芪、香附等中草药放入煎药器具内，加入符合生活饮用水标准的洁净水，加水量以超过药面 2-3cm 为度。入煎前将上述中草药浸泡半小时，使其充分湿润，以利药汁充分煎出。然后，用武（猛）火煮沸再改用文（微）火煎熬。当煎熬 15 分钟左右停止，除去药渣，取汤剂即成。

[0019] 治疗效果：

[0020] 疗效标准：一种治疗闭经的内服中药治疗闭经之疗效判断主要依据于闭经症状是否消失。服药 6 天为 1 个疗程。具体疗效分以下三级：治愈——闭经症状全部消失；好转——闭经症状部分消失和减轻；无效——服药 1 个疗程后，闭经症状毫无消失。

[0021] 效果：用该药物治疗闭经患者 27 例，治疗 1 个疗程，其中治愈 21 例，好转 6 例，治愈率为 78%，有效率为 100%。

[0022] 典型病例：

[0023] 黄某某，女，27 岁，公司员工。2003 年 5 月就诊。患者自述自上次月经结束后，至今已快四个月没来月经，且时常身体乏力，带下量多且有臭味。诊查发现患者暖气泛恶、苔白、脉弦，又无怀孕。采用本发明内服中药，连服 6 剂，月经即来，恢复正常。3 个月后追访，未见复发。