



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106619096 A

(43)申请公布日 2017. 05. 10

(21)申请号 201610888893.7

A61P 29/00(2006.01)

(22)申请日 2016.10.12

A61P 19/04(2006.01)

(71)申请人 厦门市滋然生物科技有限公司

A61P 37/04(2006.01)

地址 361000 福建省厦门市湖里区东渡路
252号4D

A61P 39/00(2006.01)

A61P 25/00(2006.01)

A61K 35/02(2015.01)

(72)发明人 刘美梅 陈伟富

(74)专利代理机构 北京轻创知识产权代理有限公司 11212

代理人 刘洵

(51)Int.Cl.

A61H 39/06(2006.01)

A61M 37/00(2006.01)

A61H 39/00(2006.01)

A61K 36/9068(2006.01)

A61P 19/02(2006.01)


权利要求书2页 说明书9页 附图1页

(54)发明名称

砭术蕲艾针灸贴及其制作方法

(57)摘要

本发明涉及一种砭术蕲艾针灸贴及其制作方法,包括针灸贴本体及外包装,针灸贴本体包括敷贴层、发热包和药包,发热包内设有发热原料层,药包内设有艾灸用药物层,发热包面积小于敷贴层面积,发热包位于敷贴层中心处,并与其粘接,药包形状大小与发热包形状大小匹配,且药包与发热包紧密贴合并固定连接,其制作方法为先制作药包、发热包,然后将敷贴层、发热包和药包从上至下依次层叠并连接,再密封包装;与现有技术相比,本发明产品使用方便快捷,可有机结合砭术疗法与艾灸疗法配合中药理疗,直接外敷于患处,药效直达患处,医疗保健效果好且无毒副作用,还可提高人体免疫力,缓解疲劳、松弛神经,本发明方法简单易操作,投入成本低,适合推广。



1. 一种砭术蕪艾针灸贴, 其特征在于, 它包括针灸贴本体以及可密封包装所述针灸贴本体的外包装(7), 所述针灸贴本体包括从上至下依次层叠的可向下粘贴的敷贴层(1)、呈片状的发热包(2)和呈片状的药包(3), 所述发热包(2)内设有发热原料层, 所述药包(3)内设有艾灸用药物层, 所述艾灸用药物层是由5~10重量份砭石粉、15~20重量份艾绒粉、5~10重量份当归粉、10~15重量份藏红花粉末、5~10重量份生姜粉、10~15重量份泽兰粉、10~15重量份桂枝粉和5重量份透骨草粉混合均匀后放入药包(3)挤压而成, 所述发热包(2)的上表面面积小于所述敷贴层(1)的下表面面积, 所述发热包(2)位于所述敷贴层(1)下表面的中心处, 并与其粘接, 所述药包(3)的形状大小与所述发热包(2)的形状大小相互匹配, 且所述药包(3)的上表面与所述发热包(2)的下表面紧密贴合并固定连接。

2. 根据权利要求1所述的砭术蕪艾针灸贴, 其特征在于, 所述发热原料层是由25~45重量份铁粉、5~15重量份蛭石粉、2~6重量份盐粉、8~16重量份活性炭粉及8~18重量份水混合均匀后放入发热包(2)挤压而成。

3. 根据权利要求1所述的砭术蕪艾针灸贴, 其特征在于, 所述药包(3)的下表面设有一层蕪艾精油层(6)。

4. 根据权利要求3所述的砭术蕪艾针灸贴, 其特征在于, 所述针灸贴本体的下表面设有可保护蕪艾精油层(6)和敷贴层(1)下表面露出部分的保护膜层(5)。

5. 根据权利要求4所述的砭术蕪艾针灸贴, 其特征在于, 所述保护膜层(5)的形状大小与所述敷贴层(1)的形状大小相匹配, 或者与所述敷贴层(1)下表面露出部分的形状大小相匹配。

6. 根据权利要求1所述的砭术蕪艾针灸贴, 其特征在于, 所述药包(3)的下表面中心处还设有砭石层(4), 所述砭石层(4)的面积小于所述药包(3)下表面的面积, 且所述砭石层(4)与所述药包(3)的下表面中心处紧密贴合并固定连接。

7. 根据权利要求6所述的砭术蕪艾针灸贴, 其特征在于, 所述砭石层是由0.3~0.6重量份砭石粉、0.1~0.2重量份远红外陶瓷粉、0.1~0.2重量份磁粉、0.2~0.4重量份蕪艾精油、0.15~0.3重量份伸筋草精油和0.15~0.3重量份红花精油混合均匀后挤压成型的片状体。

8. 根据权利要求6所述的砭术蕪艾针灸贴, 其特征在于, 所述药包(3)的上表面与所述发热包(2)的下表面缝合连接或粘接, 所述砭石层(4)与所述药包(3)的下表面嵌入连接或粘接。

9. 一种如权利要求1至8中任一项所述的砭术蕪艾针灸贴的制作方法, 其特征在于, 它包括以下步骤:

A、制备药包

先取5~10重量份砭石粉、15~20重量份艾绒粉、5~10重量份当归粉、10~15重量份藏红花粉末、5~10重量份生姜粉、10~15重量份泽兰粉、10~15重量份桂枝粉和5重量份透骨草粉混合均匀, 然后放入设有开口的空药包(3)中, 并进行封口, 再取两块平板状物体从上下两个方向对其进行挤压, 即得到呈片状的药包(3), 然后取面积大于所述药包(3)的敷贴层(1)和面积等于所述药包(3)的呈片状的发热包(2);

B、层叠放置并连接

先将步骤A中所述的敷贴层(1)、发热包(2)和药包(3)从上至下依次层叠, 再将发热包

(2) 放置于敷贴层(1)下表面的中心处,并将发热包(2)的上表面与敷贴层(1)的下表面粘接,然后将发热包(2)的下表面与所述药包(3)的上表面紧密贴合并固定连接,即得到针灸贴本体;

C、密封包装

对步骤B中所述的针灸贴本体进行密封包装,即得到所述的砭术蕲艾针灸贴。

10. 根据权利要求9所述的砭术蕲艾针灸贴的制作方法,其特征在于,在步骤C中,密封包装采用抽真空或充入氮气的方式。

砭术蕪艾针灸贴及其制作方法

技术领域

[0001] 本发明涉及医药耗材领域,尤其涉及一种敷贴型医药耗材及其制作方法。

背景技术

[0002] 随着人们生活水平的不断提高,健康、养生与保健越来越得到人们的重视,尤其是中老年人群。

[0003] 砭术以中医经络穴位理论为宗旨,不口服、不刺破皮肤、不用介质、可直接在皮肤上操作、也可隔着棉织物操作、在无痛苦的前提下使用“感、压、滚、擦、刺、划、叩、刮、拍、揉、振、拔、温、凉、闻、挝”等方法,充分发挥砭石的场效应和“无形针”的作用,内病外治,以疏通经络调理气血为根本,排除经络中障碍气血运行、尤其是皮肤深部经脉中的病理产物,标本兼治,在短时间内极大缓解临床症状,达到痊愈的目的。在对心脑血管病、心脏病、颈、肩、腰、腿病等,及对广大的亚健康状态的人群都有意想不到的效果。

[0004] 艾灸疗法简称灸法,是运用艾绒或其他药物在体表的穴位上烧灼、温熨,借灸火的热力以及药物的作用,通过经络的传导,以起到温通气血、扶正祛邪,达到防治疾病的一种治法。艾是一种灸用最好的原料,艾叶能宣理气血,温中逐冷,除湿开郁,生肌安胎,利阴气,暖子宫,杀蛔虫,灸百病,能通十二经气血,能回垂绝之元阳。用于内服治宫寒不孕,行经腹痛,崩漏带下。外用能灸治百病,强壮元阳,温通经脉,驱风散寒,舒筋活络,回阳救逆。

[0005] 但是,无论是砭术疗法,还是艾灸疗法,治疗方法与过程比较繁琐,操作复杂,人们要想利用砭术疗法或艾灸疗法进行医疗保健,往往需要医师或懂得砭术疗法、艾灸疗法的人帮助治疗,还需要自己准备各种器材,容易受到地域、环境的限制,适用范围有限,不利于推广,并且砭术疗法或艾灸疗法见效慢,需要长期使用才能见效,不利于坚持。

发明内容

[0006] 本发明所要解决的技术问题是提供一种制作简单成本低、使用方便快捷、可有机结合砭术疗法与艾灸疗法、医疗保健效果好、见效快且无药物毒副作用的砭术蕪艾针灸贴及其制作方法。

[0007] 本发明解决上述技术问题的技术方案如下:

[0008] 一种砭术蕪艾针灸贴,它包括针灸贴本体以及可密封包装所述针灸贴本体的外包装,所述针灸贴本体包括从上至下依次层叠的可向下粘贴的敷贴层、呈片状的发热包和呈片状的药包,所述发热包内设有发热原料层,所述药包内设有艾灸用药物层,所述艾灸用药物层是由5~10重量份砭石粉、15~20重量份艾绒粉、5~10重量份当归粉、10~15重量份藏红花粉末、5~10重量份生姜粉、10~15重量份泽兰粉、10~15重量份桂枝粉和5重量份透骨草粉混合均匀后放入药包挤压而成,所述发热包的上表面面积小于所述敷贴层下表面的面积,所述发热包位于所述敷贴层下表面的中心处,并与其粘接,所述药包的形状大小与所述发热包的形状大小相互匹配,且所述药包的上表面与所述发热包的下表面紧密贴合并固定连接。

[0009] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:

[0010] 本产品中的药包内设由特定比例的砭石粉、艾绒粉、当归粉、藏红花粉末、生姜粉、泽兰粉、桂枝粉、透骨草粉混合均匀后挤压而成的艾灸用药物层,无任何药物毒副作用,直接外敷于患处,发热包发热后直接作用于药包,不但可有效实现砭术疗法,充分发挥砭石的场效应和“无形针”的作用,疏通经络、调理气血,排除经络中障碍气血运行,而且可同时实现艾灸疗法,可借助艾灸的热力以及当归、藏红花、生姜、透骨草的作用,通过经络的传导,温通气血、扶正祛邪,防治疾病,砭术疗法、艾灸疗法与当归、藏红花、生姜、透骨草的药效相辅相成,药效直达患处,对关节炎、风湿骨痛、跌打损伤、内伤等不适均具有显著疗效,并且见效快、无疼痛,还可以提高免疫力,有助于缓解疲劳、松弛神经,保健强身。

[0011] 在上述技术方案的基础上,本发明还可以做如下改进。

[0012] 作为本发明的一种优选实施方式,所述发热原料层是由25~45重量份铁粉、5~15重量份蛭石粉、2~6重量份盐粉、8~16重量份活性炭粉及8~18重量份水混合均匀后放入发热包挤压而成。

[0013] 采用上述优选方案的有益效果是:一遇空气即可发热,发热的实现简单、方便、快捷,并且对药包加热更加均匀,温度也不会过高,避免烫伤肌肤。

[0014] 作为本发明的另一种优选实施方式,所述药包的下表面设有一层蕪艾精油层。

[0015] 采用上述优选方案的有益效果是:既更加有利于艾灸疗法和砭术疗法的实施与疗效,又更加有利于人体肌肤对药物药效的吸收,更好的松弛神经、缓解疲劳,提高免疫力。

[0016] 作为本发明的另一种优选实施方式,所述针灸贴本体的下表面设有可保护蕪艾精油层和敷贴层下表面露出部分的保护膜层。

[0017] 采用上述优选方案的有益效果是:可保护蕪艾精油层和敷贴层的下表面露出部分,避免精油流失、敷贴层下表面粘性丧失。

[0018] 作为本发明的另一种优选实施方式,所述保护膜层的形状大小与所述敷贴层的形状大小相匹配,或者与所述敷贴层下表面露出部分的形状大小相匹配。

[0019] 采用上述优选方案的有益效果是:这样保护膜层就可以直接覆盖蕪艾精油层和敷贴层下表面的露出部分,或者覆盖所述敷贴层下表面的露出部分,然后将这部分向内折叠从而覆盖蕪艾精油层,有效保护蕪艾精油层和敷贴层的下表面露出部分,避免精油流失、敷贴层下表面粘性丧失。

[0020] 作为本发明的另一种优选实施方式,所述药包的下表面中心处还设有砭石层,所述砭石层的面积小于所述药包下表面的面积,且所述砭石层与所述药包的下表面中心处紧密贴合并固定连接。

[0021] 采用上述优选方案的有益效果是:在药包实现较大面积的砭术治疗的同时,可以进一步通过砭石层专门针对穴位进行砭术治疗。

[0022] 作为本发明的一种优选实施方式,所述砭石层是由0.3~0.6重量份砭石粉、0.1~0.2重量份远红外陶瓷粉、0.1~0.2重量份磁粉、0.2~0.4重量份蕪艾精油、0.15~0.3重量份伸筋草精油和0.15~0.3重量份红花精油混合均匀后挤压成型的片状体。

[0023] 采用上述优选方案的有益效果是:砭石层由砭石粉、远红外陶瓷粉、磁粉、蕪艾精油、伸筋草精油和红花精油混合均匀后挤压成型为片状体,不但更加有利于传热以及药效吸收,而且更加有利于砭术疗法的实现,能够更好的激发砭石的“无形针”效果,从而活血化

瘀、消肿止痛、疏通经络、松弛神经、缓解疲劳,保健效果更好、见效更快。

[0024] 作为本发明的另一种优选实施方式,所述药包的上表面与所述发热包的下表面缝合连接或粘接,所述砭石层与所述药包的下表面嵌入连接或粘接。

[0025] 采用上述优选方案的有益效果是:连接更加简单、方便、快捷、牢靠,并且更加利于传热,不会影响艾灸疗法、砭术疗法以及药效吸收。

[0026] 一种如上所述的制备方法,它包括以下步骤:

[0027] A、制备药包

[0028] 先取5~10重量份砭石粉、15~20重量份艾绒粉、5~10重量份当归粉、10~15重量份藏红花粉末、5~10重量份生姜粉、10~15重量份泽兰粉、10~15重量份桂枝粉和5重量份透骨草粉混合均匀,然后放入设有开口的空药包中,并进行封口,再取两块平板状物体从上下两个方向对其进行挤压,即得到呈片状的药包,然后取面积大于所述药包的敷贴层和面积等于所述药包的呈片状的发热包;

[0029] B、层叠放置并连接

[0030] 先将步骤A中所述的敷贴层、发热包和药包从上至下依次层叠,再将发热包放置于敷贴层下表面的中心处,并将发热包的上表面与敷贴层的下表面粘接,然后将发热包的下表面与所述药包的上表面紧密贴合并固定连接,即得到针灸贴本体;

[0031] C、密封包装

[0032] 对步骤B中所述的针灸贴本体进行密封包装,即得到所述的砭术蕲艾针灸贴。

[0033] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:

[0034] 本发明方法工艺简单,操作方便,投入成本低,适合推广,制备得到的砭术蕲艾针灸贴不但可有效实现砭术疗法,充分发挥砭石的场效应和“无形针”的作用,疏通经络、调理气血,排除经络中障碍气血运行,而且同时实现艾灸疗法,可借助艾灸的热力以及当归、藏红花、生姜、透骨草的作用,通过经络的传导,温通气血、扶正祛邪,防治疾病,砭术疗法、艾灸疗法与当归、藏红花、生姜、透骨草的药效相辅相成,药效直达患处,对关节炎、风湿骨痛、跌打损伤、内伤等不适均具有显著疗效,并且见效快、无疼痛,还可以提高免疫力,有助于缓解疲劳、松弛神经,保健强身。

[0035] 作为本发明的另一种优选实施方式,在步骤C中,密封包装采用抽真空或充入氮气的方式。

[0036] 采用上述优选方案的有益效果是:既有效保护艾针灸贴本体,避免敷贴层下表面粘性丧失,延长药包内药物的药效,又有效保护发热包,避免其与空气接触发生化学反应提前放热而失效。

[0037] 下面对本发明的最佳实施方式做进一步详细说明。

[0038] 一种砭术蕲艾针灸贴,它包括针灸贴本体以及可密封包装所述针灸贴本体的外包装(例如包装盒、包装袋等),所述针灸贴本体包括从上至下依次层叠的可向下粘贴的敷贴层、呈片状的发热包和呈片状的药包,所述发热包和药包最好均为无纺布袋,这样更加有利于发热、传热、艾灸疗法的实现以及药效的传递吸收,所述发热包内设有发热原料层,所述发热原料层是由25~45重量份铁粉、5~15重量份蛭石粉、2~6重量份盐粉、8~16重量份活性炭粉及8~18重量份水混合均匀后放入发热包挤压而成,所述发热包的上表面面积小于所述敷贴层下表面的面积,所述发热包位于所述敷贴层下表面的中心处,并与其粘接;

[0039] 所述药包内设有艾灸用药物层,所述艾灸用药物层是由5~10重量份砭石粉、15~20重量份艾绒粉、5~10重量份当归粉、10~15重量份藏红花粉末、5~10重量份生姜粉、10~15重量份泽兰粉、10~15重量份桂枝粉和5重量份透骨草粉混合均匀后放入药包挤压而成,所述药包的形状大小与所述发热包的形状大小相互匹配,且所述药包的上表面与所述发热包的下表面紧密贴合并固定连接,例如缝合连接或粘接等,还可以通过在药包3下表面覆盖缝合一层薄纱布使砭石层4与所述药包3的下表面紧密贴合并固定连接。

[0040] 一种如上所述的制备方法,它包括以下步骤:

[0041] A、制备药包

[0042] 先取5~10重量份砭石粉、15~20重量份艾绒粉、5~10重量份当归粉、10~15重量份藏红花粉末、5~10重量份生姜粉、10~15重量份泽兰粉、10~15重量份桂枝粉和5重量份透骨草粉混合均匀,然后放入设有开口的空药包中,并进行封口,再取两块平板状物体从上下两个方向对其进行挤压,即得到呈片状的药包,然后取面积大于所述药包的敷贴层和面积等于所述药包的呈片状的发热包,所述发热包内装有由25~45重量份铁粉、5~15重量份蛭石粉、2~6重量份盐粉、8~16重量份活性炭粉及8~18重量份水混合均匀后放入发热包挤压而成的发热原料层;

[0043] B、层叠放置并连接

[0044] 先将步骤A中所述的敷贴层、发热包和药包从上至下依次层叠,再将发热包放置于敷贴层下表面的中心处,并将发热包的上表面与敷贴层的下表面粘接,然后将发热包的下表面与所述药包的上表面紧密贴合并固定连接,即得到针灸贴本体;

[0045] C、密封包装

[0046] 采用抽真空或充入氮气的方式对步骤B中所述的针灸贴本体进行密封包装,即得到所述的砭术蕪艾针灸贴。

[0047] 本发明可以在外包装中直接放置蕪艾精油瓶等装有蕪艾精油的容器(蕪艾精油质量浓度达到6%以上),使用时直接涂抹在药包的下表面或人体皮肤上,也可以在所述药包的下表面涂覆一层蕪艾精油层(蕪艾精油质量浓度达到6%以上),并最好在所述针灸贴本体的下表面设置可保护蕪艾精油层和敷贴层下表面露出部分的保护膜层,所述保护膜层的形状大小可以与所述敷贴层的形状大小相互匹配,这样保护膜层就可以直接覆盖蕪艾精油层和敷贴层下表面的露出部分,也可以与所述敷贴层下表面露出部分的形状大小相互匹配,这样保护膜层可以覆盖所述敷贴层下表面的露出部分,然后将这部分向内折叠从而覆盖蕪艾精油层;

[0048] 本发明最好在所述药包的下表面中心处设置砭石层(最好是直径为2cm左右的圆片或边长为2cm的方片),所述砭石层的面积小于所述药包下表面的面积,且所述砭石层与所述药包的下表面中心处紧密贴合并固定连接,例如嵌入连接或粘接等方式,还可以通过在药包下表面覆盖缝合一层薄纱布使砭石层与所述药包的下表面紧密贴合并固定连接;所述砭石层4是由0.3~0.6重量份砭石粉、0.1~0.2重量份远红外陶瓷粉、0.1~0.2重量份磁粉、0.2~0.4重量份蕪艾精油、0.15~0.3重量份伸筋草精油和0.15~0.3重量份红花精油混合均匀后挤压成型的片状体。

[0049] 当归具有补血和血、调经止痛、润燥滑肠、抗癌、抗老防老、免疫之功效,多为内服;藏红花能活血化瘀、散郁开结、凉血解毒、解郁安神、止痛,用于治疗忧思郁结,胸膈痞闷,吐

血,伤寒发狂,惊怖恍惚,瘀血作痛,麻疹,跌打损伤等;生姜一般用作食品调料,在中医学里具有发散、止呕、止咳等功效,它不仅具有抗氧化作用,可抑制癌细胞生长,而且对金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、伤寒杆菌、宋内痢疾杆菌、绿脓杆菌均有明显抑制作用,还对创伤愈合有明显的促进作用;泽兰可活血祛瘀、利水消肿,治跌打损伤;桂枝发汗解肌、温经通脉、助阳化气、散寒止痛,能治感冒风寒、发热恶寒,能温通经脉,治疗寒湿性风湿痹痛;透骨草是民间用全草入药,治感冒、跌打损伤,外用治毒疮、湿疹、疥疮,祛风除湿,舒筋活络,活血止痛,解毒化疹;

[0050] 本产品中的药包内设由砭石粉、艾绒粉、当归粉、藏红花粉末、生姜粉、泽兰粉、桂枝粉、透骨草粉混合均匀后挤压而成的艾灸用药物层,无任何药物毒副作用,直接外敷于患处,发热包发热后直接作用于药包,不但可有效实现砭术疗法,充分发挥砭石的场效应和“无形针”的作用,疏通经络、调理气血,排除经络中障碍气血运行,而且同时实现艾灸疗法,可借助艾灸的热力以及当归、藏红花、生姜、透骨草的作用,通过经络的传导,温通气血、扶正祛邪,防治疾病,砭术疗法、艾灸疗法与当归、藏红花、生姜、透骨草的药效相辅相成,药效直达患处,对关节炎、风湿骨痛、跌打损伤、内伤等不适均具有显著疗效,并且见效快、无疼痛,还可以提高免疫力,有助于缓解疲劳、松弛神经,保健强身。

附图说明

[0051] 图1为本发明产品的结构示意图;

[0052] 附图中,各标号所代表的部件列表如下:

[0053] 1、敷贴层,2、发热包,3、药包,4、砭石层,5、保护膜层,6、蕲艾精油层,7、外包装。

具体实施方式

[0054] 以下结合附图对本发明的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本发明,并非用于限定本发明的范围。

[0055] 实施例1

[0056] 如图1所示,一种砭术蕲艾针灸贴,它包括针灸贴本体以及可密封包装所述针灸贴本体的外包装7,所述针灸贴本体包括从上至下依次层叠的可向下粘贴的敷贴层1、呈片状的发热包2和呈片状的药包3,所述发热包2内设发热原料层,所述发热原料层是由25g铁粉、5g蛭石粉、2g盐粉、8g活性炭粉及8g水混合均匀后放入发热包2挤压而成,所述发热包2的上表面面积小于所述敷贴层1下表面的面积,所述发热包2位于所述敷贴层1下表面的中心处,并与其粘接;

[0057] 所述药包3内设艾灸用药物层,所述艾灸用药物层是由5g砭石粉、15g艾绒粉、5g当归粉、10g藏红花粉末、5g生姜粉、10g泽兰粉、10g桂枝粉和5g透骨草粉混合均匀后放入药包3挤压而成,所述药包3的形状大小与所述发热包2的形状大小相互匹配,且所述药包3的上表面与所述发热包2的下表面紧密贴合并缝合连接;

[0058] 所述药包3的下表面中心处还设置有砭石层4,所述砭石层4的面积小于所述药包3下表面的面积,且所述砭石层4与所述药包3的下表面中心处紧密贴合并固定连接;所述砭石层是由0.3g砭石粉、0.1g远红外陶瓷粉、0.1g磁粉、0.2g蕲艾精油、0.15g伸筋草精油和0.15g红花精油混合均匀后挤压成型的片状体。

[0059] 另外,在外包装7中直接放置蕪艾精油瓶,以便于使用时直接涂抹在药包3的下表面或人体皮肤上。

[0060] 一种如上所述的的制备方法,它包括以下步骤:

[0061] A、制备药包

[0062] 先取5g砭石粉、15g艾绒粉、5g当归粉、10g藏红花粉末、5g生姜粉、10g泽兰粉、10g桂枝粉和5g透骨草粉混合均匀,然后放入设有开口的空药包中,并进行封口,再取两块平板状物体从上下两个方向对其进行挤压,即得到呈片状的药包3,然后取面积大于所述药包3的敷贴层1和面积等于所述药包3的呈片状的发热包2,所述发热包2内装有由25g铁粉、5g蛭石粉、2g盐粉、8g活性炭粉及8g水混合均匀后放入发热包2挤压而成的发热原料层;制备由0.3g砭石粉、0.1g远红外陶瓷粉、0.1g磁粉、0.2g蕪艾精油、0.15g伸筋草精油和0.15g红花精油混合均匀后挤压成型为片状体的砭石层4,所述砭石层4的面积小于所述药包3下表面的面积;

[0063] B、层叠放置并连接

[0064] 先将步骤A中所述的敷贴层1、发热包2和药包3从上至下依次层叠,再将发热包2放置于敷贴层1下表面的中心处,并将发热包2的上表面与敷贴层1的下表面粘接,然后将发热包2的下表面与所述药包3的上表面紧密贴合并固定连接,将所述砭石层4置于所述药包3下表面的中心处,并与所述药包3的下表面紧密贴合并固定连接,即得到针灸贴本体;

[0065] C、密封包装

[0066] 对步骤B中所述的针灸贴本体和蕪艾精油瓶进行密封包装,即得到所述的砭术蕪艾针灸贴。

[0067] 实施例2

[0068] 如图1所示,一种砭术蕪艾针灸贴,它包括针灸贴本体以及可密封包装所述针灸贴本体的外包装7,所述针灸贴本体包括从上至下依次层叠的可向下粘贴的敷贴层1、呈片状的发热包2和呈片状的药包3,所述发热包2和药包3均为无纺布袋,所述发热包2内设有发热原料层,所述发热原料层是由45g铁粉、15g蛭石粉、6g盐粉、16g活性炭粉及18g水混合均匀后放入发热包2挤压而成,所述发热包2的上表面面积小于所述敷贴层1下表面的面积,所述发热包2位于所述敷贴层1下表面的中心处,并与其粘接;

[0069] 所述药包3内设有艾灸用药物层,所述艾灸用药物层是由10g砭石粉、20g艾绒粉、10g当归粉、15g藏红花粉末、10g生姜粉、15g泽兰粉、15g桂枝粉和5g透骨草粉混合均匀后放入药包3挤压而成,所述药包3的形状大小与所述发热包2的形状大小相互匹配,且所述药包3的上表面与所述发热包2的下表面紧密贴合并粘接;

[0070] 所述药包3的下表面中心处还设置有砭石层4,所述砭石层4的面积小于所述药包3下表面的面积,且所述砭石层4与所述药包3的下表面中心处紧密贴合并固定连接,所述药包3的下表面与所述砭石层4的下表面还涂覆有一层蕪艾精油层6;所述砭石层是由0.6g砭石粉、0.2g远红外陶瓷粉、0.2g磁粉、0.4g蕪艾精油、0.3g伸筋草精油和0.3g红花精油混合均匀后挤压成型的片状体;

[0071] 所述药包3的下表面和所述砭石层3的下表面还涂覆有一层蕪艾精油层6,所述针灸贴本体的下表面设有可保护蕪艾精油层6和敷贴层1下表面露出部分的保护膜层5,所述保护膜层5的形状大小与所述敷贴层1的形状大小相匹配,这样保护膜层5就可以直接覆盖

蕲艾精油层6和敷贴层1下表面的露出部分。

[0072] 一种如上所述的的制备方法,它包括以下步骤:

[0073] A、制备药包

[0074] 先取10g砭石粉、20g艾绒粉、10g当归粉、15g藏红花粉末、10g生姜粉、15g泽兰粉、15g桂枝粉和5g透骨草粉混合均匀,然后放入设有开口的空药包中,并进行封口,再取两块平板状物体从上下两个方向对其进行挤压,即得到呈片状的药包3;然后取面积大于所述药包3的敷贴层1和面积等于所述药包3的呈片状的发热包2,所述发热包2内装有由45g铁粉、15g蛭石粉、6g盐粉、16g活性炭粉及18g水混合均匀后放入发热包2挤压而成的发热原料层;制备由0.6g砭石粉、0.2g远红外陶瓷粉、0.2g磁粉、0.4g蕲艾精油、0.3g伸筋草精油和0.3g红花精油混合均匀后挤压成型为片状体的砭石层4,所述砭石层4的面积小于所述药包3下表面的面积;

[0075] B、层叠放置并连接

[0076] 先将步骤A中所述的敷贴层1、发热包2和药包3从上至下依次层叠,再将发热包2放置于敷贴层1下表面的中心处,并将发热包2的上表面与敷贴层1的下表面粘接,然后将发热包2的下表面与所述药包3的上表面紧密贴合并固定连接,将所述砭石层4置于所述药包3下表面的中心处,并与所述药包3的下表面紧密贴合并固定连接,然后在所述药包3的下表面涂覆一层蕲艾精油层6,即得到针灸贴本体;

[0077] C、密封包装

[0078] 在所述针灸贴本体的下表面设置可保护蕲艾精油层6和敷贴层1下表面露出部分的保护膜层5,所述保护膜层5的形状大小与所述敷贴层1的形状大小相互匹配,采用抽真空的方式对步骤B中所述的针灸贴本体进行密封包装,即得到所述的砭术蕲艾针灸贴。

[0079] 实施例3

[0080] 如图1所示,一种砭术蕲艾针灸贴,它包括针灸贴本体以及可密封包装所述针灸贴本体的外包装7,所述针灸贴本体包括从上至下依次层叠的可向下粘贴的敷贴层1、呈片状的发热包2和呈片状的药包3,所述发热包2和药包3均为无纺布袋,所述发热包2内设有发热原料层,所述发热原料层是由35g铁粉、10g蛭石粉、4g盐粉、12g活性炭粉及13g水混合均匀后放入发热包2挤压而成,所述发热包2的上表面面积小于所述敷贴层1下表面的面积,所述发热包2位于所述敷贴层1下表面的中心处,并与其粘接;

[0081] 所述药包3内设有艾灸用药物层,所述艾灸用药物层是由7g砭石粉、17g艾绒粉、7g当归粉、13g藏红花粉末、7g生姜粉、12g泽兰粉、13g桂枝粉和5g透骨草粉混合均匀后放入药包3挤压而成,所述药包3的形状大小与所述发热包2的形状大小相互匹配,且所述药包3的上表面与所述发热包2的下表面紧密贴合并缝合连接,所述药包3的下表面设有一层蕲艾精油层6,所述针灸贴本体的下表面最好设置可保护蕲艾精油层6和敷贴层1下表面露出部分的保护膜层5,所述保护膜层5的形状大小与所述敷贴层1下表面露出部分的形状大小相匹配,这样保护膜层5可以覆盖所述敷贴层1下表面的露出部分,然后将这部分向内折叠从而覆盖蕲艾精油层6。

[0082] 一种如上所述的的制备方法,它包括以下步骤:

[0083] A、制备药包

[0084] 先取7g砭石粉、17g艾绒粉、7g当归粉、13g藏红花粉末、7g生姜粉、12g泽兰粉、13g

桂枝粉和5g透骨草粉混合均匀,然后放入设有开口的空药包中,并进行封口,再取两块平板状物体从上下两个方向对其进行挤压,即得到呈片状的药包3,然后取面积大于所述药包3的敷贴层1和面积等于所述药包3的呈片状的发热包2,所述发热包2内装有由35g铁粉、10g蛭石粉、4g盐粉、12g活性炭粉及13g水混合均匀后放入发热包2挤压而成的发热原料层;

[0085] B、层叠放置并连接

[0086] 先将步骤A中所述的敷贴层1、发热包2和药包3从上至下依次层叠,再将发热包2放置于敷贴层1下表面的中心处,并将发热包2的上表面与敷贴层1的下表面粘接,然后将发热包2的下表面与所述药包3的上表面紧密贴合并固定连接,在所述药包3的下表面涂覆一层蕪艾精油层6,即得到针灸贴本体;

[0087] C、密封包装

[0088] 在所述针灸贴本体的下表面设置可保护蕪艾精油层6和敷贴层1下表面露出部分的保护膜层5,所述保护膜层5的形状大小与所述敷贴层1下表面露出部分的形状大小相互匹配,再采用抽真空或充入氮气的方式对步骤B中所述的针灸贴本体进行密封包装,即得到所述的砭术蕪艾针灸贴。

[0089] 实施例4

[0090] 如图1所示,一种砭术蕪艾针灸贴,它包括针灸贴本体以及可密封包装所述针灸贴本体的外包装7,所述针灸贴本体包括从上至下依次层叠的可向下粘贴的敷贴层1、呈片状的发热包2和呈片状的药包3,所述发热包2和药包3均为无纺布袋,所述发热包2内设有发热原料层,所述发热原料层是由40g铁粉、12g蛭石粉、5g盐粉、15g活性炭粉及15g水混合均匀后放入发热包2挤压而成,所述发热包2的上表面面积小于所述敷贴层1下表面的面积,所述发热包2位于所述敷贴层1下表面的中心处,并与其粘接;

[0091] 所述药包3内设有艾灸用药物层,所述艾灸用药物层是由8g砭石粉、18g艾绒粉、8g当归粉、12g藏红花粉末、8g生姜粉、13g泽兰粉、12g桂枝粉和5g透骨草粉混合均匀后放入药包3挤压而成,所述药包3的形状大小与所述发热包2的形状大小相互匹配,且所述药包3的上表面与所述发热包2的下表面紧密贴合并缝合连接;

[0092] 所述药包3的下表面中心处还设置有砭石层4,所述砭石层4的面积小于所述药包3下表面的面积,且所述砭石层4与所述药包3的下表面中心处紧密贴合并固定连接,所述药包3的下表面与所述砭石层4的下表面还涂覆有一层蕪艾精油层6;所述砭石层是由0.45g砭石粉、0.15g远红外陶瓷粉、0.15g磁粉、0.3g蕪艾精油、0.22g伸筋草精油和0.22g红花精油混合均匀后挤压成型的片状体。

[0093] 一种如上所述的的制备方法,它包括以下步骤:

[0094] A、制备药包

[0095] 先取8g砭石粉、18g艾绒粉、8g当归粉、12g藏红花粉末、8g生姜粉、13g泽兰粉、12g桂枝粉和5g透骨草粉混合均匀,然后放入设有开口的空药包中,并进行封口,再取两块平板状物体从上下两个方向对其进行挤压,即得到呈片状的药包3,然后取面积大于所述药包3的敷贴层1和面积等于所述药包3的呈片状的发热包2,所述发热包2内装有由40g铁粉、12g蛭石粉、5g盐粉、15g活性炭粉及15g水混合均匀后放入发热包2挤压而成的发热原料层,制备由0.45g砭石粉、0.15g远红外陶瓷粉、0.15g磁粉、0.3g蕪艾精油、0.22g伸筋草精油和0.22g红花精油混合均匀后挤压成型为片状体的砭石层4,所述砭石层4的面积小于所述药

包3下表面的面积;

[0096] B、层叠放置并连接

[0097] 先将步骤A中所述的敷贴层1、发热包2和药包3从上至下依次层叠,再将发热包2放置于敷贴层1下表面的中心处,并将发热包2的上表面与敷贴层1的下表面粘接,然后将发热包2的下表面与所述药包3的上表面紧密贴合并固定连接,将所述砭石层4置于所述药包3下表面的中心处,且嵌入至所述药包3的下表面并紧密贴合,然后在所述药包3的下表面涂覆一层蕲艾精油层6,即得到针灸贴本体;

[0098] C、密封包装

[0099] 采用抽真空的方式对步骤B中所述的针灸贴本体进行密封包装,即得到所述的砭术蕲艾针灸贴。

[0100] 实施例5

[0101] 本发明中的砭术蕲艾针灸贴为外敷贴剂,使用时只需要外敷贴于关节炎、风湿骨痛、跌打损伤、内伤疼痛等不适处或者穴位处,3~5分钟后开始发热,可活血化瘀、消肿止痛、疏通经络,持续发热达8个小时,发热温度为45度左右,敷贴6~8小时后取下,每日一贴,七至九日为一疗程,有机结合砭术疗法、艾灸疗法与中药外敷疗法,医疗保健效果极佳,使用一至三个疗程可有效根治病痛而不复发,且具有缓解疲劳、松弛神经、提高免疫力之效果。

[0102] 现已有不少消费者得到治疗,疗效很好,患者反馈良好。

[0103] 1、刘先生,69岁,症状:双膝盖、脚背、手腕均出现红肿痛现象,经过三疗程现已康复。

[0104] 2、吴先生,57岁,病症:脚踝关节红肿痛、无法行走,经过一疗程后红肿消失,并能下地行走,三疗程之后完全康复。

[0105] 3、郑先生,48岁,病症:膝盖红肿、疼痛难忍,经过三个疗程治疗,现已完全康复。

[0106] 4、王先生,39岁,病症:脚踝关节肿痛,治疗一个半疗程,现已完全康复。

[0107] 5、韩女士,43岁,症状:脚踝、膝盖出现红肿痛现象,经过两疗程治疗后已完全康复。

[0108] 6、冯女士,51岁,症状:膝盖红肿、腿部肌肉萎缩,经过三疗程治疗现后已基本康复,现正在后续治疗中。

[0109] 7、白女士,61岁,症状:膝盖、脚踝、手腕均出现红肿痛现象,经过三疗程治疗后已基本康复,现正在后续治疗中。

[0110] 8、梁女士,70岁,症状:膝盖、手指均出现红肿痛现象,经过三疗程现已康复。

[0111] 对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其它的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内,不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0112] 以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。




图1