



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104815306 A

(43) 申请公布日 2015. 08. 05

(21) 申请号 201510232024. 4

(22) 申请日 2015. 05. 09

(71) 申请人 高淑贤

地址 236000 安徽省阜阳市颍东区冉庙乡八里村董张庄 64 号

(72) 发明人 高淑贤

(74) 专利代理机构 安徽省阜阳市科颖专利事务所 34108

代理人 徐宝泉

(51) Int. Cl.

A61K 36/9068(2006. 01)

A61P 1/16(2006. 01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗急性胆囊炎的药物及其制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗急性胆囊炎的药物及其制备方法,其主要是由柴胡、大黄、山楂、白芍药、枳实、黄芩按一定重量配比制备而成。本发明药物具有泻热毒,破积滞,和表解里,疏肝升阳,燥湿化痰,消痞散结的功能,用于治疗急性胆囊炎见效快、疗效好,无副作用。

1. 一种治疗急性胆囊炎的药物,其特征在于:它是由下列重量范围内的原料药制成:
柴胡 15-20 克 大黄 10-14 克 山楂 8-12 克
白芍药 9-13 克 枳实 8-12 克 黄芩 8-12 克
半夏 7-11 克 郁金 8-12 克 生姜 10-13 克。
2. 根据权利要求 1 所述的药物,其中各原料药的用量为:
柴胡 18 克 大黄 12 克 山楂 12 克 白芍药 10 克
枳实 10 克 黄芩 10 克 半夏 10 克 郁金 10 克 生姜 12 克。
3. 根据权利要求 1 或 2 所述药物的制备方法,它包括下列步骤:
 - (一) 备料
 - (1) 柴胡:拣去杂质,除去残茎,洗净泥沙,捞出,润透后及时切片,晒干;
 - (2) 大黄:拣净杂质,大小分档,焖润至内外湿度均匀,切片或切成小块、晒干;
 - (3) 山楂:拣净杂质,筛去核;
 - (4) 白芍药:拣去杂质,分开大小个,用水浸泡至八成透,捞出晾晒,润至内外温度均匀,切片,干燥;
 - (5) 枳实:拣净杂质,用水浸泡至八成透,捞出,润至内无硬心,切片,晾干;
 - (6) 黄芩:拣去杂质,除去残茎,用凉水浸润或置开水中稍浸捞出,润透后切片晒干,注意避免曝晒过度发红;
 - (7) 半夏:拣去杂质,筛去灰屑;
 - (8) 郁金:用水浸泡,洗净,捞出晒晾,润透,切片,晒干;
 - (9) 生姜:拣去杂质,洗净泥土,用时切片;
 - (二) 制备
 - (1) 将所述重量的柴胡、大黄、山楂、白芍药、枳实、黄芩、半夏、郁金、生姜原料药放入煎药容器内加水 6 倍量,浸泡 120 分钟后,武火煎煮沸腾,再用文火煎煮 30 分钟过滤得第一次煎煮液,将第一次煎煮液倒入容器内;
 - (2) 将过滤的药渣加水 5 倍量,武火煮沸,再用文火煎煮 20 分钟,将第二次煎煮液倒入容器内;
 - (3) 将两次煎煮液进行混合搅拌均匀,分成 2 剂服用。

一种治疗急性胆囊炎的药物及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗急性胆囊炎的药物及其制备方法,属中药领域。

背景技术

[0002] 急性胆囊炎是一种常见多发病,主要表现为右上腹持续性疼痛,阵发性绞痛,并向右肩胛部放散,多在进食油腻饮食后或半夜发病,常伴有恶心、呕吐及发热。病因病例主要为肝胆气滞和湿热壅阻中焦。治疗以疏肝理气,清利湿热为主。

[0003] 由于西药无法有效快速治疗急性胆囊炎,因此人们对有效治疗急性胆囊炎的中药药物存在极大的需求,至今为止,还没有发现关于本发明的有关报道。

发明内容

[0004] 本发明人依据中医理论的研究和临床试验的反复验证,终于找到了有效治疗急性胆囊炎的药物,从而完成了本发明。

[0005] 本发明的目的就是提供一种更有效的治疗急性胆囊炎的中药组合药物。

[0006] 本发明的另一目的就是提供了该中药组合药物的制备方法。

[0007] 本发明药物是选择柴胡、大黄、山楂、白芍药、枳实、黄芩、半夏、郁金、生姜药物进行组合制备的,将这些药物组合使得各药物功效产生协同作用,从而能够有效治疗急性胆囊炎。其中,选用柴胡是因为其性味苦,凉,入肝、胆经,有和解表里,疏肝,升阳的功能,治寒热往来,胸满胁痛,口苦耳聋,头痛目眩,疟疾,下利脱肛,月经不调,子宫下垂。选用大黄是因为其性味苦、寒,入胃、大肠、肝经,有泻热毒,破积滞,行瘀血的功能,治实热便秘,谵语发狂,食积痞满,痢疾初起,里急后重,瘀停经闭,癥瘕积聚,时行热疫,暴眼赤痛,吐血,衄血,阳黄,水肿,淋浊,溲赤,痈疡肿毒,疔疮,汤火伤。选用山楂是因为其性味酸甘,微温,入脾、胃、肝经,有消食积,散瘀血,驱绦虫的功能,治肉积,癥瘕,痰饮,痞满,吞酸,泻痢,肠风,腰痛,疝气,产后儿枕痛,恶露不尽,小儿乳食停滞。选用白芍药是因为其性味苦酸,凉,归肝脾经,有益血柔肝,缓中止痛,敛阴收汗的功能,治胸腹胁痛,泻痢腹痛,自汗盗汗,阴虚发热,月经不调。选用枳实是因为其性味苦,寒,入脾、胃经,有破气,散痞,泻痰,消积的功能,治胸腹胀痛,胸痹,痞满,痰癖,水肿,食积,便秘,胃下垂,子宫下垂,脱肛。选用黄芩是因为其性味苦,寒,入心、肺、胆、大肠经,有泻实火,除湿热,止血,安胎的功能,治壮热烦渴,肺热咳嗽,湿热泻痢,黄疸,热淋,吐、衄、崩、漏,目赤肿痛,胎动不安,痈肿疔疮。选用半夏是因为其性味辛,温,有毒,入脾、胃经,有燥湿化痰,降逆止呕,消痞散结的功能,治湿痰冷饮,呕吐,反胃,咳喘痰多,胸膈胀满,痰厥头痛,头晕不眠,外消痈肿。选用郁金是因为其性味辛苦,凉,入心、肺、肝经,有行气解郁,凉血破瘀的功能,治胸腹胁肋诸痛,失心癫狂,热病神昏,吐血,衄血,尿血,血淋,妇女倒经,黄疸。选用生姜是因为其性味辛,温,入肺、胃、脾经,有发表,散寒,止呕,开痰的功能,治感冒风寒,呕吐,痰饮,喘咳,胀满,泄泻,解半夏、天南星及鱼蟹、鸟兽肉毒。

具体实施方式

[0008] 本发明组分的药物用量也是发明人经过大量摸索总结得出的,各组分的用量在上述重量范围内都具有较好的疗效:

柴胡 15-20 克 大黄 10-14 克 山楂 8-12 克

白芍药 9-13 克 枳实 8-12 克 黄芩 8-12 克

半夏 7-11 克 郁金 8-12 克 生姜 10-13 克

优选为:

柴胡 18 克 大黄 12 克 山楂 12 克

白芍药 10 克 枳实 10 克 黄芩 10 克

半夏 10 克 郁金 10 克、生姜 12 克

本发明药物的制备方法如下

一、备料

1、柴胡:拣去杂质,除去残茎,洗净泥沙,捞出,润透后及时切片,晒干;

2、大黄:拣净杂质,大小分档,焖润至内外湿度均匀,切片或切成小块、晒干;

3、山楂:拣净杂质,筛去核;

4、白芍药:拣去杂质,分开大小个,用水浸泡至八成透,捞出晾晒,润至内外温度均匀,切片,干燥;

5、枳实:拣净杂质,用水浸泡至八成透,捞出,润至内无硬心,切片,晾干;

6、黄芩:拣去杂质,除去残茎,用凉水浸润或置开水中稍浸捞出,润透后切片晒干,注意避免曝晒过度发红;

7、半夏:拣去杂质,筛去灰屑;

8、郁金:用水浸泡,洗净,捞出晾晒,润透,切片,晒干;

9、生姜:拣去杂质,洗净泥土,用时切片。

[0009] 二、制备

1、将所述重量的柴胡、大黄、山楂、白芍药、枳实、黄芩、半夏、郁金、生姜原料药物放入煎药容器内加水 6 倍量,浸泡 120 分钟后,武火煎煮沸腾,再用文火煎煮 30 分钟过滤得第一次煎煮液,将第一次煎煮液倒入容器内;

2、将过滤的药渣加水 5 倍量,武火煮沸,再用文火煎煮 20 分钟,将第二次煎煮液倒入容器内;

3、将两次煎煮液进行混合搅拌均匀,分成 2 剂服用。

[0010] 组方中柴胡有和解表里,疏肝,升阳的功能为君药,大黄泻热毒,破积滞,行瘀血,半夏有燥湿化痰,降逆止呕,消痞散结的功能,二者为臣药,三味药共同发挥泻热毒,破积滞,疏肝升阳,和表解里,燥湿化痰,消痞散结的作用,治疗急性胆囊炎效力全面,且以疏肝升阳,消痞散结为主,可治本,郁金行气解随,凉血破瘀为佐药,白芍药有益血柔肝,缓中止痛的功能,为使药,与下余诸药是治标。

[0011] 本发明药物具有泻热毒,行瘀血,益血柔肝,缓中止痛,消痞散结的功能,用于治疗急性胆囊炎,疗程短、见效快、治愈后不复发、无毒副作用。

[0012] 具体实施方式:

以下通过试验例来进一步阐述本发明所述药物的有益效果,这些试验例包括本发明药

物的动物毒性试验报告和临床疗效观察资料。

[0013] [试验例 1] 本发明药物的动物毒性试验报告：

取家兔 30 只，雌雄兼用，体重 2.0—2.5kg，分两组，每组 10 只，其中一组为超剂量试验组，另一组为正常量试验组。超常量组为 20ml/kg，正常量为 10ml/kg，给药方式为灌胃法给药，每天 2 次，连服 7 天，每天观察给药反应，结果表明二组家兔活动、饮食正常，药物无不良毒副作用。

[0014] [试验例 2] 本发明药物的临床疗效观察

1、一般资料

收治急性胆囊炎门诊患者共 44 例。

[0015] 2、诊断标准

①疼痛 右上腹剧痛或绞痛，多为结石或寄生虫嵌顿梗阻胆囊颈部所致的急性胆囊炎；疼痛常突然发作，十分剧烈，或呈现绞痛样，疼痛呈现放射性，最常见的放射部位是右肩部和右肩胛骨下角等处，乃系胆囊炎症刺激右膈神经末梢和腹壁周围神经所致；

②恶心、呕吐 是最常见的症状，如恶心、呕吐顽固或频繁，可造成脱水，虚脱和电解质紊乱，多见于结石或蛔虫梗阻胆囊管时；

③畏寒、寒战、发热 轻型病例常有畏寒和低热；重型病例则可有寒战和高热，热度可达 39℃ 以上，并可出现谵语、谵妄等精神症状；

④黄疸 较少见，如有黄疸一般程度较轻，表示感染经淋巴管蔓延到了肝脏，造成了肝损害，或炎症已侵犯胆总管。

[0016] 3、治疗方法

选用上述药剂，给患者服用，每次服用 1 剂，每隔 4 小时服用 1 次，7 天为一个疗程，连续服用 2 个疗程。

[0017] 4、疗效评定标准

显效：急性胆囊炎症状消失，痊愈，体质恢复正常；

好转：急性胆囊炎疼痛症状消除，病症明显好转，体质逐步恢复；

无效：达不到好转标准者。

[0018] 5、治疗结果(见下表)

类 型	病例 总数	治疗 时间	显 效		好 转		无 效		总有效 率%
			例 数	显效率 %	例 数	好转率 %	例 数	无效率 %	
急性胆囊炎	44	14 天	39	88.63%	4	9.09%	1	2.27%	97.73%

在上述治疗中，用本发明药物治疗急性胆囊炎患者 44 例，结果显效 39 例，显效率为 88.63%，好转 4 例，好转率为 9.09%，无效 1 例，总有效率为 97.73%。