

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl⁷

A61K 35/78

A61P 7/04



[12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 200410005719.0

[43] 公开日 2005 年 5 月 11 日

[11] 公开号 CN 1613490A

[22] 申请日 2004.2.17

[21] 申请号 200410005719.0

[71] 申请人 李克成

地址 154625 黑龙江省七台河市北兴农场职工医院

[72] 发明人 李克成

权利要求书 1 页 说明书 3 页

[54] 发明名称 海茜妇科止血口服液

[57] 摘要

本发明公开了一种治疗妇科异常子宫出血的药物“海茜妇科止血口服液”。由海螵蛸、茜草、党参、黄芪、炒白术、当归、白茯苓、升麻、柴胡、熟地、杜仲、川断、山萸肉、阿胶、仙鹤草、旱莲草、棕榈炭、地榆炭、炒黄芩、甘草等中草药组成。它可有效地治愈各种妇女异常子宫出血症，而且能收到良好效果。

I S S N 1 0 0 8 - 4 2 7 4

“海茜妇科止血口服液”由：海螵蛸、茜草、党参、黄芪、炒白术、当归、白茯苓、升麻、柴胡、熟地、杜仲、川断、山萸肉、阿胶、仙鹤草、旱莲草、棕榈炭、地榆炭、炒黄芩、甘草等中草药组成。

其方剂为：海螵蛸50g、茜草15g、党参20g、黄芪50g、炒白术20g、当归10g、白茯苓20g、升麻10g、柴胡10g、熟地黄30g、炒杜仲20g、炒川断20g、山萸肉20g、阿胶（单包）15g、仙鹤草30g、旱莲草20g、棕榈炭30g、地榆炭20g、炒黄芩15g、甘草10g。

煎制方法：将上药除阿胶外全部混合一起放入煎药锅内，加凉水800ml，浸泡15分钟后，煎二次取汁400ml然后将阿胶烊化放入药液中装瓶，每瓶200ml，密封常温保存。

海茜妇科止血口服液

所属领域:

本发明涉及一种中药的配制方法，特别是能治疗妇女异常子宫出血的药物——“海茜妇科止血口服液”

背景技术:

目前，治疗妇科异常子宫出血的药物以中药冲剂、片剂、胶囊为主，其疗效都不太理想，这样不但给患者在经济上造成了很重负担，在身心上也承受了长期的痛苦，为弥补现有技术的不足，现提供本人发明的“海茜妇科止血口服液”，此药经多年临床研究实践，它可以有效地治愈妇女子宫异常出血症，并能起到立竿见影的效果。

发明内容:

“海茜妇科止血口服液”由：海螵蛸、茜草、党参、黄芪、仙鹤草、旱莲草、杜仲、川断、柴胡、升麻、山萸肉等药物组成。

其方剂为：海螵蛸50g、茜草15g、党参20g、黄芪50g、炒白术20g、当归10g、白茯苓20g、升麻10g、柴胡10g、熟地黄30g、炒杜仲20g、炒川断20g、山萸肉20g、阿胶（单包）15g、仙鹤草30g、旱莲草20g、棕榈炭30g、地榆炭20g、炒黄芩15g、甘草10g。

煎制方法：将上药除阿胶外全部混合一起放入煎药锅内，加凉水800ml，浸泡15分钟后，煎二次取汁400ml然后将阿胶烊化放入药液中，装瓶，每瓶200ml，密封常温保存。

用法与用量：成人每次服200ml,每日二次早晚服。

禁忌：服药期间禁房事及辛辣食物。

功能：补气养血、滋阴补肾、升阳举陷、收敛止血。

主治：崩漏下血、月经过多、经期延长、产后大流血、青春期流血不止、胎动流血、上环流血和绝经后流血、子宫肌瘤流血等病症。

5天为一个疗程，一般一个疗程基本治疗全愈，最多二个疗程就能治愈。

附：“海茜妇科止血散”与“海茜妇科止血口服液”药物、药味、药量完全相同。

配制方法：将上药干燥后粉碎过120目筛，混匀后装袋，每袋10g, 20袋为一盒。

用法与用量：成人每次10g, 日服3次，凉开水调服。

功能与主治：同“海茜妇科止血口服液”相同。

“海茜妇科止血口服液”还可以制成针剂注射液，应用于临床，疗效等同。

本发明方剂配制精良，配方独特，在现有的通用方剂基础上，增加了几味特效止血药，起到了显著的疗效。特点是用药量大，是现有同类口服药量的二倍；疗效好，服后可取得立竿见影的效果；疗程短，轻者3天，重一般不超过7天，而且治愈率在98%以上。

实施例：由以下二个病例，详细说明“海茜妇科止血口服液”的疗效。

病例一：李某，女，30岁，工人。

自述，月经不调，二年每月来月经持续15天，淋漓不净，色淡红，

周身乏力，时有头晕、心悸面色痿黄，活动后汗出，腰膝酸软无力，舌淡苔薄白，脉细无力。

诊断：崩漏。

治疗方药：自拟“海茜妇科止血口服液”。

方药：海螵蛸50g、茜草15g、党参20g、黄芪50g、炒白术20g、当归10g、白茯苓20g、升麻10g、柴胡10g、熟地黄30g、炒杜仲20g、炒川断20g、山萸肉20g、阿胶（单包）15g、仙鹤草30g、旱莲草20g、棕榈炭30g、地榆炭20g、炒黄芩15g、甘草10g。

5剂水煎服，日二次早晚服。

服上药后血止，月经正常，观察1年未复发。

病例二：刘某，女，42岁，工人。

自述：因带避孕环流血不止，服用宫血停五天不见好转，妇科随后把避孕环取出，血仍不止，求治本医生。用“海茜妇科止血口服液”原方原量三剂血止，止后，月经正常来潮，无复发再流血，观察一年余，月经正常。