



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104069386 A

(43) 申请公布日 2014. 10. 01

(21) 申请号 201410287131. 2

(22) 申请日 2014. 06. 17

(66) 本国优先权数据

201410028106. 2 2014. 01. 15 CN

(71) 申请人 朱峰

地址 036900 山西省朔州市山阴县二小西朱
丰诊所

(72) 发明人 朱峰

(51) Int. Cl.

A61K 36/8994 (2006. 01)

A61K 36/90 (2006. 01)

A61P 15/00 (2006. 01)

权利要求书1页 说明书2页

(54) 发明名称

一种用于治疗慢性宫颈炎的中药

(57) 摘要

一种用于治疗慢性宫颈炎的中药,是由下列药物制备而成的:土茯苓、败酱草、红藤、蒲公英、薏苡仁、丹参、赤芍、益母草、车前草、当归、甘草,将上述药物第一剂加水 700 毫升煎至 200 毫升,第二剂加水 500 毫升煎至 200 毫升,每日两次,早晚空腹。

1. 一种用于治疗慢性宫颈炎的中药,是由以下重量的药物制成的:

土茯苓 30 克 败酱草 30 克 红藤 30 克 蒲公英 30 克 薏苡仁 15 克 丹参 15 克
赤芍 15 克

益母草 15 克 车前草 10 克 当归 10 克 甘草 6 克。

2. 根据权利要求 1 所述一种用于治疗慢性宫颈炎的中药,其特征是将所述药物用水煎服成汤剂口服。

一种用于治疗慢性宫颈炎的中药

技术领域：

[0001] 本发明涉及一种中药，特别是涉及一种用于治疗慢性宫颈炎的中药。

背景技术：

[0002] 慢性宫颈炎是指妇女子宫颈发生的炎症性病变，急性宫颈炎较为少见，但不及时治疗，就可能变成慢性宫颈炎。临床主要症状是患者子宫颈部红肿、疼痛、宫颈糜烂、宫颈肥大、子宫颈息肉、宫颈腺体囊肿、子宫颈炎管炎等。

[0003] 临床上治疗慢性宫颈炎较为棘手，一般的治疗口服消炎药或西药输液，治标不治本，达不到治疗的目的。

发明内容：

[0004] 本发明是一种见效快、疗效好，无任何副作用的中药制剂。

[0005] 本发明的药物是由以下重量的中药为原料制备而成的：

[0006] 土茯苓 30 克 败酱草 30 克 红藤 30 克 蒲公英 30 克 薏苡仁 15 克 丹参 15 克 赤芍 15 克

[0007] 益母草 15 克 车前草 10 克 当归 10 克 甘草 6 克

[0008] 可以将上述药物制成药剂学上的任何一种内服剂型，本发明优选的剂型是汤剂。

[0009] 本发明的药物的具体制备方法是：将上述药物第一剂加水 700 毫升煎至 200 毫升，第二剂加水 500 毫升煎至 200 毫升。

[0010] 使用方法是：将煎好的汤剂口服，每日两次，早晚空腹。

[0011] 中医认为：治疗慢性宫颈炎应以清热利湿、解毒化淤为治疗原则。方中土茯苓、败酱草、蒲公英、薏苡仁、车前草清热利湿；红藤、丹参、赤芍、益母草、当归解毒化淤；甘草调和诸药。上述药物配伍使用，协同作用，从而达到治疗的目的。

[0012] 本发明的药物疗效好、见效快、服用方便、无副作用，对慢性宫颈炎有很好的治疗效果。

[0013] 为进一步证明本发明药物的临床疗效和安全性。选择 69 例患者对本发明药物进行临床观察。

[0014] 69 例病人中一周内痊愈者 20 例，二周内痊愈者 21 例，二周以上痊愈者 26 例，无效 2 例。全部使用本发明进行治疗，每日一剂，每日两次，早晚空腹。

[0015] 疗效标准：显效：子宫颈部红肿、疼痛、宫颈糜烂、宫颈肥大症状消失；有效：子宫颈部红肿、疼痛、宫颈糜烂、宫颈肥大症状减轻或消失；无效：治疗前后无明显变化。

[0016] 表 1 治疗后疗效统计结果

[0017]

患者	例数	显效 (%)	有效 (%)	无效 (%)	总有效率 (%)
一周内痊愈者	20	18(90)	2(10)	0(0)	20(100)

二周内痊愈者	21	15 (71. 4)	6 (29. 6)	0 (0)	21 (100)
二周以上痊愈者	28	12 (42. 3)	14 (50)	2 (7. 7)	26 (92. 3)
总计	69	45 (65. 2)	22 (31. 9)	2 (2. 9)	67 (97. 1)

具体实施方式：

[0018] 土茯苓 30 克 败酱草 30 克 红藤 30 克 蒲公英 30 克 薏苡仁 15 克 丹参 15 克 赤芍 15 克

[0019] 益母草 15 克 车前草 10 克 当归 10 克 甘草 6 克

[0020] 将上述药物混合后煎成汤剂，第一剂加水 700 毫升煎至 200 毫升，第二剂加水 500 毫升煎至 200 毫升，每日两次，早晚空服。