(12) Ausschließungspatent

Erteilt gemäß § 17 Absatz 1 Patentgesetz

(19) DD (11) 249 271 A5

4(51) C 07 D 281/10

AMT FÜR ERFINDUNGS- UND PATENTWESEN

In der vom Anmelder eingereichten Fassung veröffentlicht

(21)	AP C 07 D / 294 053 2	(22)	15.11.85	(44)	02.09.87
(31)	8429102	(32)	17.11.84	(33)	GB

(71) siehe (73)
 (72) Takeda, Mikio; Oh-ishi, Tokuro; Nakajima, Hiromichi; Nagao, Taku, JP
 (73) Tanabe Seiyaku Co. Ltd., Osaka-fu, JP

(54) Verfahren zur Herstellung von 9-Chlor-1,5- benzothiazepin-Derivaten

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von 9-Chlor-1,5-benzothiazepin-Derivaten der allgemeinen Formel I, in der R¹ ein Wasserstoffatom oder einen Niederalkanoylrest bedeutet, und ihrer Salze. Die erfindungsgemäß hergestellten Verbindungen sind wertvolle Zwischenprodukte zur Herstellung von Benzothiazepinderivaten, die als blutdrucksenkende Wirkstoffe und/oder zur Gefäßerweiterung im Gehirn und in den Herzkranzgefäßen einsetzbar sind. Formel I

1

- 1 -

5

10 Titel der Erfindung:

Verfahren zur Herstellung von 9-Chlor-1,5-benzothiazepin-Derivaten

15

Anwendungsgebiet der Erfindung:

Die Anwendung der vorliegenden Erfindung erfolgt auf dem Gebiet der Herstellung von Arzneistoffen zur Behandlung von Bluthochdruck, Gefäßverengung im Gehirn und in den Herzkranzgefäßen und zur Verhinderung von Thrombozyten-Aggregation.

25 Charakteristik der bekannten technischen Lösungen:

US-PS 3 562 257 beschreibt verschiedene Benzothiazepin-Derivate, darunter 7-Chlor-1,5-benzothiazepin-Derivate, beispielsweise 2-(4-Methoxy-phenyl)-3-hydroxy(oder acetoxy)-5-[2-(dimethylamino)äthyl]-7-chlor-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5H)-on, und deren Verwendung als Antidepressiva und Tranquillizer und/oder zur Erweiterung der Herzkranzgefäße.

35

1 Ziel der Erfindung:

Ziel der Erfindung ist es, neue Benzothiazepin-Derivate bereitzustellen, die wertvolle Zwischenprodukte bei der
5 Synthese neuer 5-Alkyl-9-chlor-1,5-benzothiazepin-Deriva-
te mit Eignung zur Behandlung von Bluthochdruck und Gefäß-
verengung im Gehirn und in den Herzkranzgefäßen und zur
Verhinderung von Thrombozyten-Aggregation darstellen.

10

Darlegung des Wesens der Erfindung:

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, neue Zwischen-
produkte zur Herstellung neuer Arzneistoffe zur Behand-
15 lung von Bluthochdruck und Gefäßverengung im Gehirn und
in den Herzkranzgefäßen und zur Verhinderung von Thrombo-
zyten-Aggregation bereitzustellen, die durch erhöhte und
längere Wirksamkeit und eine niedrige Toxizität gekenn-
zeichnet sind.

20

Die Erfindung betrifft somit Verfahren zur Herstellung
von neuen 9-Chlor-1,5-benzothiazepin-Derivaten der allge-
meinen Formel I

25

(I)

30

in der R¹ ein Wasserstoffatom oder einen Niederalkanoyl-
rest bedeutet und ihrer Salze.

35

Typische Beispiele von erfindungsgemäß hergestellten Ver-
bindungen umfassen solche der allgemeinen Formel I, in

1 denen R¹ ein Wasserstoffatom oder ein Niederalkanoylrest
 von 2 bis 5 C-Atomen, beispielsweise Acetyl, Propionyl,
 Butyryl oder Valeryl, ist. Eine bevorzugte Untergruppe
 der erfindungsgemäß hergestellten Verbindungen sind die
 5 Verbindungen der allgemeinen Formel I, in denen R¹ ein
 Wasserstoffatom oder eine Acetylgruppe ist.

Beispiele für geeignete Salze der Verbindungen der allge-
 meinen Formel I sind die Alkalimetallsalze, wie Natrium-
 10 oder Kaliumsalze, und die Erdalkalimetallsalze, wie die
 Calcium- oder Bariumsalze. Diese Salze können ohne weite-
 res durch Behandlung einer Verbindung der Formel I mit
 beispielsweise einem Alkalimetallhydroxid oder Erdalkali-
 metallhydroxid in einem Lösungsmittel, erhalten werden.

15 Aufgrund der zwei asymmetrischen C-Atome kann die erfin-
 dungsgemäß hergestellte Verbindung I in Form von zwei
 Stereoisomeren (d.h. cis- und trans-Isomere) oder in der
 Form von vier optischen Isomeren (d.h. (+)-cis-, (-)-cis-,
 20 (+)-trans- und (-)-trans-Isomeren) vorliegen. Alle diese
 optischen Isomeren und deren Gemische fallen in den Be-
 reich der Erfindung.

Die Verbindungen der Formel I können durch folgende
 25 Schritte erhalten werden:

(A)-a) Umsetzung von 2-Amino-6-chlorthiophenol (II) mit
 einem Glycidester der allgemeinen Formel III

30

in der R² ein Niederalkylrest ist, zu einer Verbindung der
 allgemeinen Formel I-a

35

1

(I-a)

5

oder

b) intramolekulare Cyclisierung einer Propionsäure-
verbindung der allgemeinen Formel IV

10

(IV)

15

in der R^3 ein Wasserstoffatom oder ein Niederalkylrest ist,
zu der Verbindung I-a, und

(B) gegebenenfalls Acylierung ~~der Verbindung~~ I-a mit einer
Niederalkansäure der allgemeinen Formel V

20

in der R^4 einen Niederalkylrest bedeutet, oder einem reak-
tionsfähigen Derivat davon zu einer Verbindung der allge-
meinen Formel I-b

25

(I-b)

in der R^4 die vorstehend angegebene Bedeutung hat, und

(C) falls gewünscht, weiter Umwandlung des Produktes (I-a)
oder (I-b) in ein Salz.

30

Die Umsetzung von 2-Amino-6-chlorthiophenol (II) mit dem
Glycidester (III) kann durch Erhitzen eines Gemisches die-
ser Verbindungen bei einer Temperatur von 130 bis 180°C
erfolgen. Die Umsetzung kann entweder in einem Lösungsmit-
tel (beispielsweise Xylol, Diphenyläther oder p-Cymol)

35

oder ohne Lösungsmittel durchgeführt werden. Wenn das so
erhaltene Reaktionsprodukt ein Gemisch aus der Verbindung

1 I-a und der Propionsäureverbindung IV (wobei R^3 ein Nie-
deralkylrest ist) oder ein Gemisch aus zwei Stereoisome-
ren (d.h. cis- und trans-Isomeren) der Verbindung I-a ist,
können diese durch ihre unterschiedliche Löslichkeit in
5 einem Lösungsmittel, wie z.B. einem Niederalkanol (bei-
spielsweise Äthanol) und/oder durch Säulenchromatographie
getrennt werden.

Die intramolekulare Cyclisierung der Propionsäureverbin-
10 dung (IV) kann durch Erhitzen in einem Lösungsmittel oder
ohne Lösungsmittel durchgeführt werden. Geeignete Lösungs-
mittel sind Xylol, Toluol, Diphenyläther, p-Cymol und Es-
sigsäure. Die Umsetzung wird vorzugsweise bei einer Tempe-
ratur von 110 bis 160°C, besonders bevorzugt unter Rück-
15 fluß, durchgeführt. In einer anderen Ausführungsform kann
die intramolekulare Cyclisierung der Propionsäureverbin-
dung (IV) (wobei R^3 ein Niederalkylrest ist) bei 0 bis
30°C in Gegenwart des Methylsulfinylcarbanions ($\text{CH}_3\text{SOCH}_2^-$),
das aus Dimethylsulfoxid und Natriumhydrid hergestellt wur-
20 de, in einem Lösungsmittel, beispielsweise Dimethylsulf-
oxid, durchgeführt werden. Die intramolekulare Cyclisie-
rung der Propionsäureverbindung (IV) (wobei R^3 ein Was-
serstoffatom ist) kann auch in Gegenwart eines Kondensa-
tionsmittels erfolgen. Als Kondensationsmittel wird Di-
25 cyclohexylcarbodiimid allein oder zusammen mit 1-Hydroxy-
benzotriazol, 4-Dimethylaminopyridin, N-Hydroxyphthal-
imid, N-Hydroxysuccinimid, Trichlorphenol, p-Nitrophenol
oder 3-Hydroxy-4-oxo-3,4-dihydro-1,2,3-benzotriazin ver-
wendet. Als Kondensationsmittel können ebenso Carbonyldi-
30 imidazol, Äthoxyacetylen und 1-Methyl-2-halopyridinhalo-
genid (beispielsweise 1-Methyl-2-chlorpyridinjodid oder
1-Methyl-2-brompyridinjodid) verwendet werden. Wenn ein
1-Methyl-2-halopyridinhalogenid als Kondensationsmittel
verwendet wird, kann es zusammen mit einer Base, beispiels-
35 weise Triäthylamin oder Tributylamin, eingesetzt werden.
Geeignete Lösungsmittel sind Chloroform, Dimethylformamid,

- 1 Tetrachlorkohlenstoff, Dichlormethan, 1,2-Dichloräthan, Äthylacetat und Dioxan. Die Umsetzung wird vorzugsweise bei einer Temperatur von -10 bis 70°C durchgeführt.
- 5 Die Ausgangsverbindung (IV), die im Verfahren der Erfindung eingesetzt wird, liegt infolge der zwei asymmetrischen Kohlenstoffatome in 2- und 3-Stellung der Propionsäureverbindung (IV) in Form von vier optischen Isomeren vor. Da jedoch die vorstehend erwähnte intermolekulare Cyclisierung ohne Racemisierung durchgeführt werden kann, kann
10 eine Verbindung (I-a) der Erfindung in optisch aktiver Form ohne weiteres aus dem entsprechenden optisch aktiven Isomeren der Verbindung (IV) erhalten werden.
- 15 Außerdem kann, falls gewünscht, die racemische Modifikation der so erhaltenen Verbindung I-a in ihre optischen Enantiomeren aufgetrennt werden, indem ein optisch aktives 1-(2-Naphthylsulfonyl)-pyrrolidin-2-carbonylchlorid als Trennmittel verwendet wird, beispielsweise indem die Ver-
20 bindung I-a mit (S)-1-(2-Naphthylsulfonyl)-pyrrolidin-2-carbonylchlorid umgesetzt wird, wobei ein Paar von Diastereoisomeren erhalten wird, und dann die erhaltenen Diastereoisomeren durch selektive Kristallisation oder Säulenchromatographie voneinander getrennt werden. Die Hydrolyse jeder dieser Diastereoisomeren ergibt dann die optisch aktive Verbindung I-a. Wenn ein Gemisch der optisch aktiven Verbindung I-a und der optisch aktiven Verbindung IV (wobei R³ ein Wasserstoffatom ist) durch die Hydrolyse der Diastereoisomeren erhalten wird, können diese aufgrund
25 ihrer unterschiedlichen Löslichkeit voneinander getrennt
30 werden.

Die gegebenenfalls durchgeführte Acylierung der Verbindung I-a oder ihres Salzes mit dem reaktionsfähigen Derivat der
35 Niederalkansäure V kann in einem Lösungsmittel in Gegenwart oder Abwesenheit eines Säureakzeptors erfolgen. Bei-

1 spiele für die Salze der Verbindung I-a sind ihre Alkali-
metallsalze, wie die Natrium- oder Kaliumsalze, und die
Erdalkalimetallsalze, wie die Calcium- oder Bariumsalze.
Zu den reaktionsfähigen Derivaten der Niederalkansäure V
5 gehören z.B. Niederalkansäureanhydrid (beispielsweise Essig-
säureanhydrid oder Propionsäureanhydrid) und Niederalkanoyl-
halogenide (beispielsweise Acetylchlorid, Propionylchlorid,
Butyrylchlorid oder Valerylchlorid). Als Säureakzeptor
dienen z.B. Pyridin, Triäthylamin, N-Methylpiperidin, N-
10 Methylmorpholin, N-Methylpyrrolidin und N-Äthyl-N,N-di-
isopropylamin. Geeignete Lösungsmittel sind Essigsäure,
Chloroform, Dichlormethan, Dimethylformamid und Tetrahydro-
furan. Wenn ein Überschuß von Essigsäureanhydrid als re-
aktionsfähiges Derivat der Niederalkansäure V verwendet
15 wird, muß man nicht immer ein Lösungsmittel benutzen, da
das Essigsäureanhydrid auch als Lösungsmittel dienen kann.
Die Umsetzung wird vorzugsweise bei einer Temperatur zw-
ischen -10 bis 140°C durchgeführt, z.B. bei einer Tempera-
tur von 20 bis 140°C, wenn als reaktionsfähiges Derivat
20 der Niederalkansäure V ein Niederalkansäureanhydrid ver-
wendet wird, oder bei einer Temperatur von -10 bis 100°C,
wenn als reaktionsfähiges Derivat ein Niederalkansäure-
halogenid verwendet wird.

25 Die gegebenenfalls vorgenommene Acylierung der Verbindung
I-a oder ihres Salzes mit der Niederalkansäure V kann
auch in einem Lösungsmittel in der Gegenwart eines Konden-
sationsmittels durchgeführt werden. Kondensationsmittel
sind z.B. Dicyclohexylcarbodiimid, N,N'-Carbonyldiimidazol,
30 1-Methyl-2-halopyridinjodid (beispielsweise 1-Methyl-2-
brompyridinjodid), Methoxyacetylen und $(C_6H_5)_3P-CCl_4$. Ge-
eignete Lösungsmittel sind Methylenchlorid, 1,2-Dichlor-
äthan, Chloroform, Benzol, Toluol, Tetrahydrofuran und
Dioxan. Die Umsetzung wird vorzugsweise bei einer Tempera-
35 tur von 0 bis 50°C (besonders bevorzugt bei 0 bis 25°C)
durchgeführt.

- 1 Die vorstehend erläuterte, gegebenenfalls durchgeführte
Acylierung der Verbindung I-a, kann ohne Racemisierung
vorgenommen werden. Die Verbindungen I-b der Erfindung
können somit ohne weiteres in optisch aktiver Form aus
5 den entsprechenden optisch aktiven Isomeren der Verbin-
dung I-a erhalten werden.

Die in der vorstehend beschriebenen Umsetzung eingesetzte
Ausgangsverbindung (IV) kann beispielsweise gemäß den in
10 den geprüften japanischen Patentveröffentlichungen Nr.
9383/1970, 8982/1971, 36221/1974 oder 24954/1975 oder den
ungeprüften japanischen Patentveröffentlichungen Nr.
142963/1982, 176951/1982 oder 193449/1982 beschriebenen
Verfahren durchgeführt werden.

15 Die nach dem Verfahren der Erfindung erhaltenen Verbin-
dungen der allgemeinen Formel I sind wertvolle Zwischen-
produkte für die Herstellung neuer 5-Alkyl-9-chlor-1,5-
benzothiazepin-Derivate der allgemeinen Formel VI

20

25

in der die Reste R^5 und R^6 Niederalkylreste darstellen,
und R^1 wie vorstehend definiert ist.

30 Die Verbindungen VI können aus den erfindungsgemäß erhal-
tenen Verbindungen I beispielsweise durch Kondensation von
Letzteren oder eines Salzes davon mit einer Aminoalkyl-
verbindung der allgemeinen Formel VII

35

- 1 in der X ein Halogenatom bedeutet und R⁵ und R⁶ wie vor-
stehend definiert sind, oder einem Salz davon (z.B. dem
Hydrochlorid oder Hydrobromid) hergestellt werden. Die Um-
setzung kann in Gegenwart oder Abwesenheit einer alkali-
5 schen Verbindung, wie einem Alkalimetallhydroxid, z.B.
Kaliumhydroxid oder Natriumhydroxid, einem Alkalimetall-
carbonat, z.B. Kaliumcarbonat oder Natriumcarbonat, oder
einem Alkalimetallhydrid, z.B. Natriumhydrid, in einem Lö-
10 sungsmittel, wie Aceton, Essigsäureäthylester, Dimethyl-
sulfoxid, Dimethylformamid, Acetonitril, Dioxan, wäßri-
ges Aceton oder wäßriger Essigsäureäthylester, durchge-
führt werden. Falls gewünscht, kann das erhaltene Produkt
in gleicher Weise wie die Verbindung I-a acyliert werden.
- 15 Die vorstehend erläuterten Umsetzungen können ohne Race-
misierung durchgeführt werden. Deshalb kann die Verbindung
VI in optisch aktiver Form durch Einsatz des entsprechen-
den optischen Isomeren der Verbindung I erhalten werden.
- 20 Wie vorstehend erwähnt, wirken die so erhaltenen Verbindun-
gen VI stark blutdrucksenkend, stark gefäßerweiternd im
Gehirn und in den Herzkranzgefäßen und zeigen eine deut-
liche thrombozytenaggregationshemmende Wirkung. Daher eig-
net sich die Verbindung VI für die Behandlung, Verbes-
25 serung oder Prophylaxe von Bluthochdruck, Erkrankungen des
Gehirns, wie z.B. Gefäßkrampf oder Infarkt und Herzer-
krankungen, wie z.B. Angina pectoris, Arrhythmie oder
Koronar- oder Herzinfarkt in Warmblütern einschließlich
des Menschen.
- 30 Da die Verbindungen VI eine stärkere und länger anhaltende
therapeutische Wirkung (d.h. blutdrucksenkende und gefäß-
erweiternde Wirkung im Gehirn und in den Herzkranzgefäßen)
entfalten, verglichen mit dem 7-Chlor-Derivat (z.B. (+-cis-
35 2-(4-Methoxyphenyl)-3-acetoxy-5-[2-(dimethylamino)äthyl]-
7-chlor-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5H)-on) der US-PS

1 3'562 257, ist die erfindungsgemäß hergestellte Verbindung VI als blutdrucksenkendes Mittel oder zur Gefäßerweiterung im Gehirn oder in den Herzkranzgefäßen viel wertvoller als das vorstehend erwähnte 7-Chlor-Derivat.

5

Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung sind im folgenden erläutert. Die Ausdrücke "Niederalkylrest", "Niederalkanoylrest" und "Niederalkansäure" bedeuten in der Beschreibung und im Erfindungsanspruch unverzweigte oder
10 verzweigte Alkylreste mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, unverzweigte oder verzweigte Alkanoylreste mit 2 bis 5 Kohlenstoffatomen bzw. unverzweigte oder verzweigte Alkansäurereste mit 2 bis 5 Kohlenstoffatomen. Der Ausdruck "threo" bedeutet in der Beschreibung und im Erfindungsanspruch, daß die Hydroxylgruppe und die 2-Amino-6-chlor-phenylthio- oder die 2-Chlor-6-nitrophenylthiogruppe, die sich in der 2- und 3-Stellung der Propionsäure befinden, die threo-Konfiguration aufweisen, d.h. die beiden Gruppen befinden sich auf den gegenüberliegenden Seiten der zentralen Bindung in der Fischer-Projektionsformel.
20

Ausführungsbeispiele:

25

Beispiel 1

(1) Ein Gemisch aus 40,58 g 2-Chlor-6-nitrothiophenol, 60,15 g Methyl-trans-3-(4-methoxyphenyl)glycidat, 1 g Zinkacetatdihydrat und 410 ml Toluol wird bei Raumtemperatur 3 Stunden in einer Argonatmosphäre gerührt. Das Reaktionsgemisch wird zur Entfernung des Toluols unter vermindertem Druck eingedampft. Der Rückstand wird mit Isopropyläther versetzt, und die ausgefallenen Kristalle werden abfiltriert. Die Kristalle werden aus einem Gemisch von Äthylacetat und Hexan umkristallisiert (das Filtrat wird nachfolgend mit "Mutterlauge I" bezeichnet). Es werden
30
35 den 62,37 g threo-2-Hydroxy-3-(2-chlor-6-nitrophenylthio)-

1 3-(4-methoxyphenyl)propionsäuremethylester mit einem F.
von 110 bis 111,5°C erhalten.

Die Mutterlauge I wird an Silikagel chromatographiert, wo-
5 bei als Lösungsmittel ein Gemisch aus Benzol-Äthylacetat
im Verhältnis 20 : 1 verwendet wird. Es werden 2,93 g
threo-2-Hydroxy-3-(2-chlor-6-nitrophenylthio)-3-(4-methoxyphenyl)propionsäuremethylester mit einem F. von 109,5 bis 111°C erhalten.

10

(2) Ein Gemisch aus 62 g threo-2-Hydroxy-3-(2-chlor-6-nitrophenylthio)-3-(4-methoxyphenyl)propionsäuremethylester, 7 g 10prozentiger Palladium-Aktivkohle, 500 ml Essigsäure und 500 ml Äthanol wird bei Raumtemperatur
15 11 Stunden lang unter Atmosphärendruck in einer Wasserstoffatmosphäre geschüttelt. Die unlöslichen Substanzen werden abfiltriert. Das Filtrat wird zur Entfernung des Lösungsmittels unter vermindertem Druck eingedampft und der Rückstand aus einem Gemisch von Äthylacetat und Hexan
20 umkristallisiert. Es werden 51,74 g threo-2-Hydroxy-3-(2-amino-6-chlorphenylthio)-3-(4-methoxyphenyl)propionsäuremethylester mit einem F. von 114 bis 116°C erhalten.

(3) 2 ml Dimethylsulfoxid werden mit 84 mg Natrium-
25 hydrid (60prozentige Öldispersion) versetzt und das Gemisch bei 70°C 40 Minuten unter einer Argonatmosphäre gerührt. Nach dem Abkühlen des Gemisches wird eine Lösung von 0,368 g threo-2-Hydroxy-3-(2-amino-6-chlorphenylthio)-3-(4-methoxyphenyl)propionsäuremethylester in 1 ml Di-
30 methylsulfoxid hinzugegeben und das Gemisch bei Raumtemperatur 40 Minuten gerührt. Sodann wird das Reaktionsgemisch in ein Gemisch aus Eis und Essigsäure gegossen, und die ausgefallenen Kristalle werden abfiltriert. Die Kristalle werden mit Wasser gewaschen, getrocknet und aus
35 einem Gemisch von Chloroform und Äthanol umkristallisiert. Es werden 0,163 g (+)-cis-2-(4-Methoxyphenyl)-3-hydroxy-

1 9-chlor-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5H)-on mit einem
F. von 249 bis 252°C (Zers.) erhalten.

Beispiel 2

5 (1) Ein Gemisch aus 18,39 g threo-2-Hydroxy-3-(2-amino-
6-chlorphenylthio)-3-(4-methoxyphenyl)propionsäuremethyl-
ester, 90 ml 10prozentiger Natronlauge, 200 ml Methanol
und 90 ml Wasser wird bei Raumtemperatur 4 Stunden ge-
rührt. Das Reaktionsgemisch wird unter Eiskühlung auf
10 einen pH-Wert von etwa 2 gebracht und dann bei Raumtempera-
tur über Nacht gerührt. Die ausgefallenen Kristalle werden
abfiltriert, mit Wasser gewaschen und getrocknet. Es wer-
den 16,77 g threo-2-Hydroxy-3-(2-amino-6-chlorphenylthio)-
3-(4-methoxyphenyl)propionsäurehemihydrat mit einem F.
15 von 108 bis 110°C erhalten (Umkristallisation aus einem
Gemisch von Äthanol und Wasser).

(2) Ein Gemisch aus 15,77 g threo-2-Hydroxy-3-(2-amino-
6-chlorphenylthio)-3-(4-methoxyphenyl)propionsäurehemi-
20 hydrat und 630 ml Xylol wird 18 Stunden unter Rückfluß er-
hitzt und das entstandene Wasser durch eine Dehydratisie-
rungsvorrichtung entfernt. Nach dem Abkühlen des Reaktions-
gemisches werden die ausgefallenen Kristalle abfiltriert.
Es werden 10,44 g (+)-cis-2-(4-Methoxyphenyl)-3-hydroxy-
25 9-chlor-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5H)-on mit einem
F. von 249 bis 251°C (Zers.) erhalten.

Wenn das Produkt aus einem Gemisch von Dimethylformamid
und Isopropyläther umkristallisiert wird, weist das er-
30 haltene Produkt einen F. von 247 bis 250°C (Zers.) auf.

Beispiel 3

(1) Ein Gemisch aus 22,39 g (+)-cis-2-(4-Methoxyphenyl)-
3-hydroxy-9-chlor-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5H)-
35 on und 60 ml Pyridin wird mit Eiswasser gekühlt und mit
28,4 g (S)-1-(2-Naphthylsulfonyl)pyrrolidin-2-carbonyl-

1 chlorid (hergestellt aus (S)-1-(2-Naphthylsulfonyl)pyrro-
lidin-2-carbonsäure und Oxalylchlorid in wasserfreiem Ben-
zol) versetzt. Das Gemisch wird 18 Stunden bei Raumtempe-
ratur gerührt und anschließend mit Wasser und einem Gemisch
5 aus Äthylacetat und Chloroform (1 : 1) versetzt. Die dabei
erhaltene organische Schicht wird nacheinander mit 10pro-
zentiger Salzsäure, Wasser, einer wäßrigen 5prozentigen
Natriumbicarbonatlösung und Wasser gewaschen. Die Lösung
wird getrocknet und dann eingedampft. Der Rückstand wird
10 an Silikagel chromatographiert, wobei als Lösungsmittel
ein Gemisch aus Benzol-Äthylacetat im Verhältnis von 9 : 1
verwendet wird. Es werden 18,22 g des Produktes "A" (Öl,
 $[\alpha]_D^{20}$ -113,2° (C = 0,326, Chloroform)) und 17,01 g des
Produkts "B" (kristallin, F. 106 bis 123°C, $[\alpha]_D^{20}$ + 22,8°
15 (C = 0,324, Chloroform)) erhalten.

(2-a) Ein Gemisch aus 17,46 g des nach Abschnitt 1) er-
haltenen Produkts A, 41 g Kaliumcarbonat, 100 ml Wasser
und 200 ml Methanol wird bei Raumtemperatur 19 Stunden ge-
20 rührt. Nach Beendigung der Umsetzung werden die ausgefal-
lenen Kristalle (Nadeln) abfiltriert und aus wäßrigem Me-
thanol umkristallisiert. Es werden 7,85 g des optisch ak-
tiven cis-2-(4-Methoxyphenyl)-3-hydroxy-9-chlor-2,3-di-
hydro-1,5-benzothiazepin-4(5H)-ons (Lactam A) mit einer
25 Ausbeute von 83,4 % und einem F. von 188 bis 189°C erhal-
ten.

$[\alpha]_D^{20}$ 0° (C = 0,275, Dimethylformamid).

30 (2-b) Ein Gemisch aus 12,75 g des nach Abschnitt 1) er-
haltenen Produkts B, 30 g Kaliumcarbonat, 75 ml Wasser und
150 ml Methanol werden bei Raumtemperatur 20 Stunden gerührt.
Nach Beendigung der Umsetzung werden die ausgefallenen
Kristalle (Nadeln) abfiltriert und aus wäßrigem Methanol
35 umkristallisiert. Es werden 6,01 g des optisch aktiven
cis-2-(4-Methoxyphenyl)-3-hydroxy-9-chlor-2,3-dihydro-1,5-

1 benzothiazepin-4(5H)-ons (Lactam B) mit einer Ausbeute von
91,3 % und einem F. von 188 bis 189°C erhalten.

$[\alpha]_D^{20} 0^\circ$ (C = 0,477, Dimethylformamid).

5

B e i s p i e l 4

Ein Gemisch aus 2,27 g des in Beispiel 3-(1) erhaltenen
Produkts B, 40 ml wäßriger 5prozentiger Natronlauge und
40 ml Methanol werden bei Raumtemperatur 18 Stunden gerührt.

10 Nach Beendigung der Umsetzung wird das Gemisch mit Wasser
verdünnt und dann mit Chloroform extrahiert. Der Extrakt
wird mit Wasser gewaschen, getrocknet und zur Entfernung
des Lösungsmittels eingedampft. Der Rückstand wird aus wäß-
rigem Methanol umkristallisiert; es werden 287 mg des op-
15 tisch aktiven cis-2-(4-Methoxyphenyl)-3-hydroxy-9-chlor-
2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5H)-ons (Lactam B) er-
halten.

Die bei der Extraktion erhaltene wäßrige Schicht wird mit
20 10prozentiger Salzsäure auf einen pH-Wert von 3 bis 4 ein-
gestellt und dann mit Chloroform extrahiert. Der Extrakt
wird mit Wasser gewaschen, getrocknet und zur Entfernung
des Lösungsmittels eingedampft. Der ölige Rückstand (1,7 g)
wird in Benzol-Äther gelöst und dann mit konzentrierter
25 Salzsäure extrahiert. Die Salzsäureschicht wird mit Ka-
liumcarbonat auf einen pH-Wert von 4 eingestellt und dann
mit Chloroform extrahiert. Der Extrakt wird mit Wasser ge-
waschen, getrocknet und zur Entfernung des Lösungsmittels
eingedampft. Es werden 640 mg (-)-threo-2-Hydroxy-3-(2-
30 amino-6-chlorphenylthio)-3-(4-methoxyphenyl)propionsäure
als Öl erhalten.

$[\alpha]_D^{20} -158^\circ$ (C = 0,520, Chloroform).

35

B e i s p i e l 5

600 mg (-)-threo-2-Hydroxy-3-(2-amino-6-chlorphenylthio)-

1 3-(4-methoxyphenyl)propionsäure werden in einem Gemisch aus
2 ml Dimethylformamid und 5 ml Dichlormethan gelöst.
Daraufhin wird die Lösung mit 150 mg 1-Hydroxybenzotria-
zol und 550 mg Dicyclohexylcarbodiimid versetzt. Anschlie-
5 Bend wird der ausgefallene Dicyclohexylharnstoff (270 mg)
abfiltriert und das Filtrat zur Entfernung des Lösungs-
mittels unter vermindertem Druck eingedampft. Der Rückstand
wird in Äthylacetat gelöst und die Lösung mit einer wäß-
rigen 5prozentigen Natriumbicarbonatlösung und anschlie-
10 Bend mit Wasser gewaschen. Die gewaschene Lösung wird ge-
trocknet und zur Entfernung des Äthylacetats eingedampft.
Der Rückstand wird aus wäßrigem Methanol umkristallisiert.
Es werden 414 mg des optisch aktiven cis-2-(4-Methoxy-
phenyl)-3-hydroxy-9-chlor-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-
15 4(5H)-ons (Lactam B) mit einer Ausbeute von 72,6 % und
einem F. von 188 bis 189°C erhalten.

B e i s p i e l 6

220 mg (+)-cis-2-(4-Methoxyphenyl)-3-hydroxy-9-chlor-2,3-
20 dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5H)-on werden in 1,5 ml
Pyridin gelöst und mit 61 mg Acetylchlorid unter Eisküh-
lung versetzt. Das Gemisch wird bei Raumtemperatur 1 Stunde
gerührt. Das Reaktionsgemisch wird dann zur Entfernung des
Lösungsmittels unter vermindertem Druck eingedampft. Der
25 Rückstand wird in Äthylacetat gelöst und die Lösung dann
nacheinander mit 10prozentiger Salzsäure, Wasser, einer
5prozentigen wäßrigen Natriumbicarbonatlösung und Wasser
gewaschen. Die gewaschene Lösung wird getrocknet und zur
Entfernung des Lösungsmittels eingedampft. Der Rückstand
30 wird aus Äthylacetat umkristallisiert. Es werden 206 mg
(+)-cis-2-(4-Methoxyphenyl)-3-acetoxy-9-chlor-2,3-dihydro-
1,5-benzothiazepin-4(5H)-on mit einer Ausbeute von 83,4 %
und einem F. von 217 bis 219°C erhalten.

B e z u g s b e i s p i e l 1

35 Ein Gemisch aus 4,00 g optisch aktivem cis-2-(4-Methoxy-

1 phenyl)-3-hydroxy-9-chlor-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-
 4(5H)-on (Lactam A, das in Beispiel 3 (2-a) erhalten wird),
 1,80 g 2-(Dimethylamino)äthylchloridhydrochlorid, 5,7 g
 gepulvertem Kaliumcarbonat und 150 ml Aceton wird 20 Stun-
 5 den unter Rückfluß erhitzt. Nach der Beendigung der Um-
 setzung werden die unlöslichen Substanzen abfiltriert. Das
 Filtrat wird zur Entfernung des Lösungsmittels eingedampft.
 Der Rückstand wird in sein Perchlorat überführt und aus
 Methanol umkristallisiert. Es werden 4,63 g (+)-cis-2-
 10 (4-Methoxyphenyl)-3-hydroxy-5-[2-(dimethylamino)-äthyl]-
 9-chlor-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5H)-on-per-
 chlorat x 1/4 Hydrat mit einer Ausbeute von 76,0 % und
 einem F. von 190 bis 192°C erhalten.

15 $[\alpha]_D^{20} +10,2^\circ$ (C = 0,334, Dimethylformamid).

Bezugsbeispiele 2 bis 6

Die entsprechenden Ausgangsverbindungen werden in glei-
 cher Weise wie in Bezugsbeispiel 1 behandelt, wobei die
 20 folgenden Verbindungen erhalten werden.

30

35

1

Tabelle I

5	Bezugs- beisp. Nr.	Verbindung A		Physikalische Eigen- schaften	
		R ¹	optische Aktivität Salz		
10	2	OH	±	freie Base	F. 143 - 144°C (umkristalli- siert aus Essigsäureäthyl- ester)
				HCl· H ₂ O	F. 228 - 230°C (Zers.) (trü- be Schmelze bei 143°C) (um- kristallisiert aus Methanol)
15	3	OCOCH ₃	±	HCl· H ₂ O	F. 185 - 189°C (trübe Schmel- ze bei etwa 150°C) (umkri- stallisiert aus Methanol- Äther)
				HCl· H ₂ O	F. 140 - 143°C (umkristalli- siert aus Äthanol-Äther) [α] _D ²⁰ +13,0° (C=0,347, Metha- nol)
20	5	OH	-	HClO ₄ · 1/4H ₂ O	F. 190 - 192°C (umkristalli- siert aus Methanol) [α] _D ²⁰ -10,3° (C=0,321, Di- methylformamid)
				HCl· H ₂ O	F. 139 - 142° (umkristalli- siert aus Äthanol-Äther) [α] _D ²⁰ -13,0° (C=0,348, Me- thanol)
25	6	OCOCH ₃	-	HCl· H ₂ O	F. 139 - 142° (umkristalli- siert aus Äthanol-Äther) [α] _D ²⁰ -13,0° (C=0,348, Me- thanol)

30

35

1 Versuch 1

Blutdrucksenkende Wirkung

Eine Testverbindung wird in Wasser gelöst oder suspendiert
5 und spontan hypertensiven Ratten (SHR) in einer Dosis von
30 mg/kg oral verabreicht. Eine Gruppe umfaßt dabei drei
über Nacht ohne Nahrung gehaltene Ratten. Der systolische
Blutdruck der Ratten wird nach der plethysmographischen Me-
thode am Schwanz gemessen (The Journal of Laboratory and
10 Clinical Medicine, Bd. 78 (1971), S. 957). Die blutdruck-
senkende Wirkung der Testverbindung wird 1 oder 4 Stunden
nach der Gabe gemessen und mit "-" bezeichnet, wenn die Ab-
nahme des Blutdrucks weniger als 10 mm Hg beträgt, mit "+",
wenn die Abnahme mindestens 10 mm Hg, aber weniger als
15 20 mm Hg beträgt, mit "++", wenn die Abnahme mindestens
20 mm Hg, aber weniger als 40 mm Hg beträgt, mit "+++",
wenn die Abnahme mindestens 40 mm Hg, aber weniger als
60 mm Hg beträgt, oder mit "++++", wenn die Abnahme minde-
stens 60 mm Hg beträgt. Die Ergebnisse sind in Tabelle II
20 zusammengefaßt.

25

30

35

1

Tabelle II

5	Testverbindungen	Blutdrucksenkende Wirkung	
		Zeit nach Verabreichung	
		1 h	4 h
10	(+)-cis-2-(4-Methoxyphenyl)-3-acetoxy-5-[2-(dimethylamino)äthyl]-9-chlor-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5H)-on-hydrochlorid	+++	+++
15	(+)-cis-2-(4-Methoxyphenyl)-3-hydroxy-5-[2-(dimethylamino)äthyl]-9-chlor-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5H)-on-perchlorat	+++	++
20	(+)-cis-2-(4-Methoxyphenyl)-3-acetoxy-5-[2-(dimethylamino)äthyl]-9-chlor-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5H)-on-hydrochlorid	++++	+++
25	(bekannte Verbindung) (+)-cis-2-(4-Methoxyphenyl)-3-acetoxy-5-[2-(dimethylamino)äthyl]-7-chlor-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5H)-on-hydrochlorid	++	+

30

Versuch. 2

Gefäßerweiternde Wirkung im Gehirn

Männliche Hunde mit einem Gewicht von 10 bis 20 kg werden mit Natriumpentobarbital (30 mg/kg, i.v.) narkotisiert.

35

Die Durchblutung der Wirbelarterie wird unter künstlicher Beatmung fortlaufend mit einem elektromagnetischen Durch-

1 flußmesser gemessen. Eine in wäßriger 5prozentiger Glu-
 coselösung gelöste Testverbindung wird in die Wirbel-
 arterie injiziert. Die gefäßerweiternde Wirkung der Test-
 5 verbindung im Gehirn wird bestimmt, indem der aus den
 Dosisreaktionskurven berechnete Verstärkungseffekt dieser
 Verbindung gegenüber Papaverin gemessen wird. Die Ergeb-
 nisse sind in Tabelle III zusammengefaßt.

Tabelle III

10	Testverbindungen	Gefäßerweiternde Wirkung im Gehirn (Verstärkungseffekt)
15	(+)-cis-2-(4-Methoxyphenyl)-3-hydroxy-5-[2-(dimethylamino)-äthyl]-9-chlor-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5H)-on-perchlorat	22
20	(+)-cis-2-(4-Methoxyphenyl)-3-acetoxy-5-[2-(dimethylamino)-äthyl]-9-chlor-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5H)-on-hydrochlorid	15
25	(bekannte Verbindung) (+)-cis-2-(4-Methoxyphenyl)-3-acetoxy-5-[2-(dimethylamino)-äthyl]-7-chlor-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5H)-on-hydrochlorid	5
30	(Positivkontrolle) Papaverin	1

Versuch 3

35 Gefäßerweiternde Wirkung auf die Herzkranzgefäße

- 1 Die Langendorff'sche Methode wird zur Untersuchung der
Wirkung auf die Durchblutung der Herzkranzgefäße des iso-
lierten Herzens des Meerschweinchens (etwa 280 g) verwendet.
Das isolierte Herz wird mit Locke-Ringer-Lösung perfundiert.
5 Sie enthält 2 % defibriniertes Kaninchenblut, das mit
einem Gemisch aus 95 % O₂ und 5 % CO₂ (30° C) gesättigt
ist. Der Perfusionsdruck wird bei 40 cm H₂O gehalten.
Eine Lösung der Testverbindung in wäßriger 5prozentiger
10 Glucoselösung wird mit einem Volumen von 0,1 ml pro Herz
in die Perfusionslösung injiziert. Der Abfluß der Perfu-
sionslösung wird mit einem Tropfenzähler gemessen.

Die gefäßerweiternde Wirkung der Testverbindung auf die
Herzkranzgefäße wird als "+" angegeben, wenn der Anstieg
15 der Durchblutung der Herzkranzgefäße bei einer Dosis von
~~100 µg pro Herz~~ weniger als 0,5 ml pro Minute beträgt, als
"+", wenn der Anstieg bei einer Dosis von 100 µg pro Herz
mindestens 0,5 ml pro Minute beträgt, als "++", wenn der
Anstieg bei einer Dosis von 30 µg pro Herz mindestens
20 0,5 ml pro Minute beträgt und als "+++", wenn der Anstieg
bei einer Dosis von höchstens 10 µg pro Herz mindestens
0,5 ml pro Minute beträgt. Die Ergebnisse sind in Tabelle
IV zusammengefaßt.

25

30

35

1 Tabelle IV.

Testverbindungen	Gefäßerweiternde Wirkung in den Herzkranzgefäßen
5 10 (+)-cis-2-(4-Methoxyphenyl)-3-hydroxy-5-[2-(dimethylamino)-äthyl]-9-chlor-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5H)-on-hydrochlorid	+++
15 (+)-cis-2-(4-Methoxyphenyl)-3-acetoxy-5-[2-(dimethylamino)-äthyl]-9-chlor-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5H)-on-hydrochlorid	+++
20 (+)-cis-2-(4-Methoxyphenyl)-3-hydroxy-5-[2-(dimethylamino)-äthyl]-9-chlor-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5H)-on-perchlorat	+++
25 (+)-cis-2-(4-Methoxyphenyl)-3-acetoxy-5-[2-(dimethylamino)-äthyl]-9-chlor-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5H)-on-hydrochlorid	+++
25 (Positivkontrolle) Papaverin	+

30

35

1

5 Erfindungsanspruch:

1. Verfahren zur Herstellung eines 1,5-Benzothiazepin-Derivats der allgemeinen Formel I

10

15

in der R¹ ein Wasserstoffatom oder einen Niederalkanoylrest bedeutet, oder eines Salzes davon, gekennzeichnet dadurch, daß man
 (A)-a) 2-Amino-6-chlorthiophenol (II) mit einem Glycid-
 ester der allgemeinen Formel III

20

25 in der R² einen Niederalkylrest bedeutet, zu einer Verbindung der allgemeinen Formel I-a umsetzt

30

oder

-b) eine Propionsäureverbindung der allgemeinen Formel IV

35

1

5

in der R^3 ein Wasserstoffatom oder einen Niederalkylrest bedeutet, intramolekular zu einer Verbindung der allgemeinen Formel I-a cyclisiert, und

10

(B) die so erhaltene Verbindung I-a gegebenenfalls mit einer Niederalkansäure der Formel V

in der R^4 einen Niederalkylrest darstellt, oder mit einem reaktiven Derivat davon zu einer Verbindung der Formel I-b

15

20

in der R^4 die vorstehend angegebene Bedeutung hat, acyliert, und

(C) gewünschtenfalls die Verbindung der Formel I-a oder I-b weiter in ein Salz davon umwandelt.

25

2. Verfahren nach Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, daß die Verbindung I-a in ihre Stereoisomeren oder optischen Isomeren aufgetrennt wird.

30

3. Verfahren nach Punkt 1 oder 2, gekennzeichnet dadurch, daß R^1 ein Wasserstoffatom oder einen Alkanoylrest mit 2 bis 5 Kohlenstoffatomen darstellt.

35 4. Verfahren nach Punkt 3, gekennzeichnet dadurch, daß R^1 ein Wasserstoffatom oder eine Acetylgruppe darstellt.

1 5. Verfahren nach Punkt 1, 2, 3 oder 4, gekennzeichnet
dadurch, daß die Verbindung I ein cis-Isomeres ist.

6. Verfahren nach Punkt 5, gekennzeichnet dadurch, daß
5 die Verbindung I das cis-2-(4-Methoxyphenyl)-3-hydroxy-9-
chlor-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5H)-on oder ein
Salz davon ist.

7. Verfahren nach Punkt 5, gekennzeichnet dadurch, daß
10 die Verbindung I das cis-2-(4-Methoxyphenyl)-3-azetoxy-9-
chlor-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5H)-on oder ein
Salz davon ist.

15

20

25

30

35