Office de la Propriété Intellectuelle du Canada
Un organisme d'Industrie Canada

Canadian Intellectual Property Office
An agency of Industry Canada

CA 2364199 A1 2002/06/14

(21) 2 364 199

(12) DEMANDE DE BREVET CANADIEN
CANADIAN PATENT APPLICATION

(13) A1

(22) Date de dépôt/Filing Date: 2001/12/13

(41) Mise à la disp. pub./Open to Public Insp.: 2002/06/14

(30) Priorité/Priority: 2000/12/14 (00/16321) FR

(51) Cl.Int.^{7}/Int.Cl.^{7} C07D 487/22, A61K 31/5355, A61K 31/4985, C07D 487/12, C07D 471/22, C07D 471/14


(71) Demandeur/Applicant:
LES LABORATOIRES SERVIER, FR

(72) Inventeurs/Inventors:
DE NANTEUIL, GUILLAUME, FR;
GLOANEC, PHILIPPE, FR;
VERBEUREN, TONY, FR;
RUPIN, ALAIN, FR;
VALLEZ, MARIE-ODILE, FR

(74) Agent: OGILVY RENAULT

(54) Titre : NOUVEAUX DERIVES BICYCLIQUES D'AMINO-PYRAZINONES, LEUR PROCEDE DE PREPA RATION ET LES COMPOSITIONS PHARMACEUTIQUES QUI LES CONTIENNENT


(54) Title: NOVEL BICYCLIC DERIVATIVES OF AMINOPYRAZINONE, PROCESS FOR THEIR PREPARATION AND PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS CONTAINING THEM




(I)



(II)






(III)

(57) Abrégé/Abstract:
L'invention concerne de nouveaux composés répondant à la formule (I): (voir formule I) dans laquelle R_1 représente un atome d'hydrogène ou un groupement alkyle; (voir formule II) représente un cycle saturé de 4 à 7 chaînons; n représente un entier tel que $1 \leq n \leq 6$; R_2 représente l'un quelconque des groupements suivants ; (voir formules a et b) dans lequel: X représente un groupement CH ou un atome d'azote, R_4 représente un atome d'hydrogène ou d'halogène, R_5 représente l'un quelconque des groupements : ~ R_a NHCOHN- dans lequel R a représente un atome d'hydrogène ou un groupement alkyle en C_1-C_6 linéaire ou ramifié, ~ R_b $SO_2NHCO(NH)_p$-, dans lequel R_b représente un groupement alkyle en C_1-C_6 linéaire ou ramifié et p représente 0 ou I, ~ HON = $C(NH_2)$-, HN=C(NHOH)-, ~ R_c-$(CH_2)_m$-Y- dans lequel Y représente CH_2, O, S ou R_a N, m représente un nombre entier tel que $0 \leq m \leq 3$, et R_c représente un hétérocycle à 5 ou 7 chaînons; ou c) un système bicyclique de formule; (voir formule III) dans laquelle X est tel que défini précédemment et B forme, avec les atomes de carbone auquel il est attaché, un groupement aryle ou un hétérocycle à 5 ou 7 chaînons. L'invention vise également les isomères des composés de formule (I), leurs N-oxydes ainsi que leurs sels d'addition à un acide ou à une base pharmaceutiquement acceptables. Les composés selon l'invention sont utiles en tant qu'inhibiteurs de protéases à sérine apparentées à la trypsine.


ABRÉGÉ


L'invention concerne de nouveaux composés répondant à la formule (I) :



(I)

dans laquelle R_1 représente un atome d'hydrogène ou un groupement alkyle;  représente un cycle saturé de 4 à 7 chaînons; n représente un entier tel que $1 \leq n \leq 6$; R_2 représente l'un quelconque des groupements suivants :


a) 

b)  dans lequel :

X représente un groupement CH ou un atome d'azote, R_4 représente un atome d'hydrogène ou d'halogène, R_5 représente l'un quelconque des groupements :

- $R_aNHCOHN$- dans lequel R_a représente un atome d'hydrogène ou un groupement alkyle en C_1-C_6 linéaire ou ramifié,
- $R_bSO_2NHCO(NH)_p$-, dans lequel R_b représente un groupement alkyle en C_1-C_6 linéaire ou ramifié et p représente 0 ou 1,
- $HON = C(NH_2)$-, $HN=C(NHOH)$-,
- R_c-$(CH_2)_m$-Y- dans lequel Y représente CH_2, O, S ou R_aN, m représente un nombre entier tel que $0 \leq m \leq 3$, et R_c représente un hétérocycle à 5 ou 7 chaînons;

ou c) un système bicyclique de formule :



dans laquelle X est tel que défini précédemment et B forme, avec les atomes de carbone auquel il est attaché, un groupement aryle ou un hétérocycle à 5 ou 7 chaînons. L'invention

vise également les isomères des composés de formule (I), leurs N-oxydes ainsi que leurs sels d'addition à un acide ou à une base pharmaceutiquement acceptables. Les composés selon l'invention sont utiles en tant qu'inhibiteurs de protéases à sérine apparentées à la trypsine.

La présente invention concerne des nouveaux dérivés bicycliques d'amino-pyrazinones, leur procédé de préparation, les compositions pharmaceutiques qui les contiennent ainsi que leur utilisation en tant qu'inhibiteurs de protéases à sérine apparentées à la trypsine.

L'une de ces protéases à sérine, la thrombine, est l'enzyme clé de la coagulation et joue un rôle central dans la pathologie des thromboses veineuses et artérielles, en raison notamment de son fort pouvoir d'auto-amplification de la cascade de la coagulation (F. Toti et coll., Sang, Thrombose, Vaisseaux 1992, 4, 483-494 et T.M. Reilly et coll., Blood Coagulation and Fibrinolysis 1992, 3, 513-517).

L'inhibition directe et spécifique de la thrombine est plus efficace et présente moins de risques d'hémorragie que le traitement par l'héparine. Il existe actuellement des inhibiteurs directs de thrombine, mais ces substances peptidiques présentent l'inconvénient de ne pas être actives par voie orale.


Des dérivés peptidomimétiques, présentant une activité anti-thrombotique orale, ont déjà été décrits dans la littérature. C'est le cas notamment des dérivés de l'acide boronique décrits dans les brevets EP 293 881, EP 471 651, EP 615 978 et EP 792 883 et des dérivés décrits dans les brevets WO 94 29336 et WO 95 23609.

Il était donc particulièrement intéressant de synthétiser de nouveaux inhibiteurs de protéases à sérine afin d'augmenter la puissance et la sélectivité des composés déjà décrits dans la littérature.

L'activité de ces nouveaux composés est objectivée par l'augmentation de différents temps de coagulation.

De plus, ces composés sont actifs par voie orale.

Plus spécifiquement, la présente invention concerne les composés de formule (I) :



(I)


dans laquelle :


* R_1 représente un atome d'hydrogène ou un groupement alkyle (C_1-C_6) linéaire ou ramifié éventuellement substitué par un ou plusieurs groupements, identiques ou différents, choisis parmi aryle, hétéroaryle, cycloalkyle et hétérocycloalkyle,

*  représente un cycle saturé de 4 à 7 chaînons pouvant contenir, en plus de l'atome d'azote, un ou deux hétéroatomes choisis parmi O, S et groupements $-NR_3$,
dans lequel R_3 représente un atome d'hydrogène ou un groupement alkyle (C_1-C_6) linéaire ou ramifié,

* n représente un entier tel que $1 \leq n \leq 6$,

* R_2 représente l'un quelconque des groupements suivants :

a : 

b :  dans lequel :

  - ✓ X représente un groupement CH ou un atome d'azote,
  - ✓ R_4 représente un atome d'hydrogène ou d'halogène
  - ✓ R_5 représente l'un quelconque des groupements :
    - ◆ $R_aNHCOHN$- dans lequel R_a représente un atome d'hydrogène ou un groupement alkyle (C_1-C_6) linéaire ou ramifié,
    - ◆ $R_bSO_2NHCO(NH)_p$-, dans lequel R_b représente un groupement alkyle

(C_1-C_6) linéaire ou ramifié et p représente 0 ou 1,


- HON = $C(NH_2)$-, HN=C(NHOH)-,
- R_c-$(CH_2)_m$-Y- dans lequel :

Y représente CH_2, O, S ou R_aN,

m représente un nombre entier tel que $0 \leq m \leq 3$,

R_c représente un hétérocycle à 5 ou 7 chaînons, saturé ou insaturé contenant de 1 à 4 hétéroatomes choisis parmi oxygène, azote ou soufre, ledit hétérocycle contenant éventuellement une ou plusieurs fonctions carbonyles et éventuellement substitué, par un ou plusieurs, identiques ou différents, atomes d'halogène, groupements alkyle (C_1-C_6) linéaire ou ramifié, alkoxy (C_1-C_6) linéaire ou ramifié ou amino (lui-même éventuellement substitué par un ou deux groupements alkyle (C_1-C_6) linéaire ou ramifié),

ou c : un système bicyclique de formule



dans laquelle :

X est tel que défini précédemment et B, avec les atomes de carbone auquel il est attaché, forme un groupement aryle ou un hétérocycle à 5 ou 7 chaînons, saturé ou insaturé, contenant de 1 à 4 hétéroatomes choisis parmi oxygène, azote ou soufre, ledit hétérocycle contenant éventuellement au moins une fonction carbonyle et éventuellement substitué, par un ou plusieurs, identiques ou différents, atomes d'halogène, groupements alkyle (C_1-C_6) linéaire ou ramifié, alkoxy (C_1-C_6) linéaire ou ramifié ou amino (éventuellement substitué par un ou deux groupements alkyle (C_1-C_6) linéaire ou ramifié),

leurs isomères, leurs N-oxyde ainsi que leurs sels d'addition à un acide ou à une base pharmaceutiquement acceptables.

Parmi les acides pharmaceutiquement acceptables, on peut citer à titre non limitatif les acides chlorhydrique, bromhydrique, sulfurique, phosphonique, acétique, trifluoroacétique, lactique, pyruvique, malonique, succinique, glutarique, fumarique, tartrique, maléique,

citrique, ascorbique, oxalique, méthanesulfonique, benzènesulfonique, camphorique, etc.

Parmi les bases pharmaceutiquement acceptables, on peut citer à titre non limitatif l'hydroxyde de sodium, l'hydroxyde de potassium, la triéthylamine, la tertbutylamine, etc.

Par groupement aryle, on entend phényle, biphénylyle ou naphtyle, chacun de ces groupements étant éventuellement substitué par un ou plusieurs groupements, identiques ou différents, choisis parmi halogène, alkyle (C_1-C_6) linéaire ou ramifié (éventuellement substitué par un groupement hydroxy, carboxy, amino (lui-même éventuellement substitué par un ou deux groupements alkyle (C_1-C_6) linéaire ou ramifié) ou carbamoyle (lui-même éventuellement substitué par un ou deux groupements alkyle (C_1-C_6) linéaire ou ramifié)), alkoxy (C_1-C_6) linéaire ou ramifié, hydroxy, trihalogénoalkyle (C_1-C_6) linéaire ou ramifié, trihalogénoalkoxy (C_1-C_6) linéaire ou ramifié, amino (éventuellement substitué par un ou deux groupements alkyle (C_1-C_6) linéaire ou ramifié), alkylcarbonyloxy (C_1-C_6) linéaire ou ramifié, carboxyméthoxy et carbamoylméthoxy (éventuellement N-substitué par un ou deux groupements alkyle (C_1-C_6) linéaire ou ramifié).

Par groupement hétéroaryle, on entend un groupement aromatique mono- ou bicyclique de 5 à 12 chaînons contenant un, deux ou trois hétéroatomes choisis parmi oxygène, azote ou soufre, étant entendu que l'hétéroaryle peut être éventuellement substitué par un ou plusieurs groupements, identiques ou différents, choisis parmi halogène, alkyle (C_1-C_6) linéaire ou ramifié (éventuellement substitué par un groupement hydroxy, carboxy, amino (lui-même éventuellement substitué par un ou deux groupements alkyle (C_1-C_6) linéaire ou ramifié) ou carbamoyle (lui-même éventuellement substitué par un ou deux groupements alkyle (C_1-C_6) linéaire ou ramifié)), hydroxy, alkoxy (C_1-C_6) linéaire ou ramifié, trihalogénoalkyle (C_1-C_6) linéaire ou ramifié, phényle, amino (éventuellement N-substitué par un ou plusieurs groupements alkyle (C_1-C_6) linéaire ou ramifié), carboxyméthoxy et carbamoylméthoxy (éventuellement substitué par un ou deux groupements alkyle (C_1-C_6) linéaire ou ramifié).

Parmi les groupements hétéroaryle, on peut citer à titre non limitatif les groupements thiényle, pyridyle, furyle, pyrrolyle, imidazolyle, oxazolyle, isoxazolyle, thiazolyle, isothiazolyle, pyrimidinyle, pyrazinyle, pyridazinyle.

Par groupement cycloalkyle, on entend un groupement hydrocarboné mono- ou bicyclique, saturé ou insaturé, de 3 à 12 chaînons, étant entendu que le cycle peut être éventuellement substitué par un ou plusieurs groupements, identiques ou différents, choisis parmi halogène, alkyle (C_1-C_6) linéaire ou ramifié, alkoxy (C_1-C_6) linéaire ou ramifié, hydroxy, trihalogénoalkyle (C_1-C_6) linéaire ou ramifié, amino (substitué éventuellement par un ou plusieurs alkyle (C_1-C_6) linéaire ou ramifié) et aryle.

Parmi les groupements cycloalkyle, on peut citer à titre non limitatif les groupements cyclopentyle, cyclohexyle, indanyle, tétrahydronaphtyle.

Par groupement hétérocycloalkyle, on entend un groupement mono- ou bicyclique, saturé ou insaturé, de 4 à 12 chaînons contenant un, deux ou trois hétéroatomes choisis parmi oxygène, azote ou soufre, étant entendu que l'hétérocycle peut être éventuellement substitué par un ou plusieurs groupements, identiques ou différents, choisis parmi halogène, alkyle (C_1-C_6) linéaire ou ramifié, alkoxy (C_1-C_6) linéaire ou ramifié, hydroxy, trihalogénoalkyle (C_1-C_6) linéaire ou ramifié, amino (substitué éventuellement par un ou plusieurs alkyle (C_1-C_6) linéaire ou ramifié), aryle et diarylméthyle.

Parmi les groupements hétérocycloalkyle, on peut citer à titre non limitatif les groupements azétidinyle, pyrrolidinyle, pipéridyle, dihydrocyclopenta[b]pyridyle.

Les composés préférés de formule (I) sont ceux pour lesquels n est égal à 1.

Le cycle  tel que défini dans la formule (I) est préférentiellement un groupement pyrrolidinyle.

Lorsque  représente un cycle pyrrolidine, la configuration de ce cycle est préférentiellement S.

Les groupements R_1 préférés sont les groupements alkyles (C_1-C_6) linéaires ou ramifiés substitués par un ou plusieurs groupements aryle ou hétéroaryle.

De manière encore plus préférentielle, les groupements R_1 préférés sont les groupements alkyles (C_1-C_6) linéaires ou ramifiés substitués par un ou plusieurs groupements phényle ou pyridinyle.

A titre très préférentiel, les groupements R_1 sont les groupements (2,2-diphényl)éthyle ou (2-pyridinyl)éthyle.

Lorsque R_2 représente un groupement b, X représente préférentiellement un groupement CH et R_5 préférentiellement un groupement HN=C(NHOH)- ou Rc-$(CH_2)_m$-Y. Dans ce cas, R_c sera de manière encore plus préférentielle un groupement pyridine, pyrrolidinone, imidazole ou imidazoline.


Lorsque R_2 représente un système bicyclique c, celui-ci sera préférentiellement tel que soit X représente un groupement CH et, dans ce cas, B représente un cycle morpholinone, isoxazole ou pyrrole, soit X représente un atome d'azote et, dans ce cas, B représente un cycle phényle.

Les composés préférés de l'invention sont :

- (6S)-*N*-{4-[amino(hydroxyimino)méthyl]benzyl}-3-[(2,2-diphényl-éthyl)amino]-4-oxo-4,6,7,8-tétrahydropyrrolo[1,2-*a*]pyrazine-6-carboxamide,
- (6S)-*N*-{4-[amino(hydroxyimino)méthyl]benzyl}-4-oxo-3-{(2-(2-pyridinyl)éthyl]amino}-4,6,7,8-tétrahydropyrrolo[1,2-*a*]pyrazine-6-carboxamide,
- (6S)-*N*-[2-({[amino(imino)méthyl]amino}oxy)éthyl]-3-[(2,2-diphényl-éthyl)amino]-4-oxo-4,6,7,8-tétrahydropyrrolo[1,2-*a*]pyrazine-6-carboxamide,
- (6S)-4-oxo-*N*-[(3-oxo-3,4-dihydro-2*H*-benzoxazin-8-yl)méthyl]-3-{[2-(2-pyridinyl)éthyl]amino}-4,6,7,8-tétrahydropyrrolo[1,2-*a*]pyrazine-6-carboxamide,
- (6S)-4-oxo-3-{[2-(2-pyridinyl)éthyl]amino}-*N*-[2-(2-pyridinyl-méthoxy)benzyl]-4,6,7,8-tétrahydropyrrolo[1,2-*a*]pyrazine-6-carboxamide,
- (6S)-4-oxo-*N*-{2-[(2-oxo-3-pyrrolidinyl)oxy]benzyl}-3-{[2-(2-pyridinyl)éthyl]amino}-4,6,7,8-tétrahydropyrrolo[1,2-*a*]pyrazine-6-carboxamide,
- (6S)-*N*-[2-(4,5-dihydro-1*H*-imidazol-2-ylméthoxy)benzyl]-4-oxo-3-{[2-(2-pyridinyl)éthyl]amino}-4,6,7,8-tétrahydropyrrolo[1,2-*a*]pyrazine-6-carboxamide,
- (6S)-*N*-[2-(1*H*-imidazol-2-ylméthoxy)benzyl]-4-oxo-3-{[2-(2-pyridinyl)éthyl]amino}-4,6,7,8-tétrahydropyrrolo[1,2-*a*]pyrazine-6-carboxamide,
- (6S)-*N*-[1*H*-indol-6-ylméthyl)-4-oxo-3-{[2-(2-pyridinyl)éthyl]amino}-4,6,7,8-

tétrahydropyrrolo[1,2-*a*]pyrazine-6-carboxamide,

L'invention s'étend également au procédé de préparation des composés de formule (I) caractérisé en ce que l'on réduit un composé de formule (II) :




(II)

dans laquelle A a la même signification que dans la formule (I), P_1 représente un groupement protecteur de la fonction amino et Bn représente le groupement benzyle,

à l'aide d'un agent réducteur approprié.


pour conduire au composé de formule (III) :



(III)

dans laquelle A, P_1 et Bn ont la même signification que précédemment,


composé de formule (III) dont on transforme la fonction hydroxy en méthoxy puis en fonction cyano par des réactions classiques de la chimie organique, pour conduire, après déprotection de la fonction amino, au composé de formule (IV) :



(IV)

dans laquelle A et Bn ont la même signification que précédemment,

composé de formule (IV) que l'on met en réaction avec du chlorure d'oxalyle pour conduire au composé de formule (V) :




(V)

dans laquelle A et Bn ont la même signification que précédemment,

composé de formule (V) que l'on met en réaction avec un composé de formule (VI) :

$$R_1 - NH_2 \qquad \text{(VI)}$$


dans laquelle R_1 a la même signification que dans la formule (I), pour conduire au composé de formule (VII) :



(VII)

dans laquelle A, Bn et R_1 ont la même signification que précédemment,


composé de formule (VII) que l'on transforme ensuite par hydrogénation catalytique en composé de formule (VIII) :



(VIII)

dans laquelle A et R_1 ont la même signification que précédemment,


composé de formule (VIII) que l'on transforme ensuite, par hydrogénation catalytique en milieu alcalin, en composé de formule (IX) :



(IX)

dans laquelle A et R_1 ont la même signification que précédemment,

composé de formule (IX) que l'on met en réaction avec un composé de formule (X) :



(X)

dans laquelle n et R_2 ont la même signification que dans la formule (I),

pour conduire, après éventuelle déprotection, au composé de formule (I),

composé de formule (I) que l'on transforme éventuellement en N-oxyde correspondant, que l'on purifie, le cas échéant, selon une technique classique de purification, dont on sépare, si on le souhaite, les isomères selon une technique classique de séparation, et que l'on transforme, si on le souhaite, en ses sels d'addition à un acide ou à une base pharmaceutiquement acceptable.

Les composés de formule (II) sont obtenus par benzylation des acides correspondants.

Les composés de la présente invention, outre le fait qu'ils soient nouveaux, présentent des propriétés pharmacologiques particulièrement intéressantes.

Ce sont de puissants inhibiteurs de protéases à sérine apparentées à la trypsine qui présentent une importante sélectivité vis-à-vis de la thrombine par rapport à d'autres protéases à sérine de la coagulation et de la fibrinolyse.

Ces propriétés les rendent donc utiles dans le traitement des angines stables ou non, des maladies d'origine thrombotique et/ou donnant lieu à des complications thrombotiques, dans le traitement ou la prévention de l'infarctus du myocarde et des thromboses veineuses ou artérielles, ainsi que dans le traitement des complications des maladies vasculaires et

cardiovasculaires telles que l'athérosclérose, l'artérite, la maladie veineuse, et dans le traitement de toutes les maladies impliquant une formation et/ou une activité de la thrombine.

Ils peuvent également être utilisés en association thérapeutique avec un thrombolytique.

L'invention s'étend aussi aux compositions pharmaceutiques renfermant comme principe actif un composé de formule (I) avec un ou plusieurs excipients inertes, non toxiques et appropriés. Parmi les compositions pharmaceutiques selon l'invention, on pourra citer plus particulièrement celles qui conviennent pour l'administration orale, parentérale (intraveineuse ou sous-cutanée), nasale, les comprimés simples ou dragéifiés, les comprimés sublinguaux, les gélules, les tablettes, les suppositoires, les crèmes, les pommades, les gels dermiques, les préparations injectables, les suspensions buvables, etc.

La posologie utile est adaptable selon la nature et la sévérité de l'affection, la voie d'administration ainsi que l'âge et le poids du patient. Cette posologie varie de 1 à 500 mg par jour en une ou plusieurs prises.

Les exemples suivants illustrent l'invention mais ne la limitent en aucune façon.

Les produits de départ utilisés sont des produits connus ou préparés selon des modes opératoires connus.

Les structures des composés décrits dans les exemples ont été déterminées selon les techniques spectrophotométriques usuelles (infrarouge, RMN, spectrométrie de masse).

EXEMPLE 1 : <u>(6S)-*N*-{4-[amino(hydroxyimino)méthyl]benzyl}-3-[(2,2-diphényl-éthyl)amino]-4-oxo-4,6,7,8-tétrahydropyrrolo[1,2-*a*]pyrazine-6-carboxamide</u>

A 2,5 mmoles d'acide (6S)-3-[(2,2-diphényléthyl)amino]-4-oxo-4,6,7,8-tétrahydropyrrolo [1,2-a]pyrazine-6-carboxylique obtenu selon le procédé décrit dans la demande

FR 9907538 dans 50 ml de diméthylformamide anhydre sont ajoutés 0,9 g de chlorhydrate de 4-(aminométhyl)-*N'*-hydroxybenzènecarboximidamide obtenu selon le procédé décrit dans Synth. Comm. (28 (23), 4419-4429, 1998), 1,3 ml de diisopropyléthylamine et 0,4 g d'hydroxybenzotriazole. Après solubilisation, 0,9 g de tétrafluoroborate de O-benzotriazolyl-tétraméthylisouronium sont ajoutés et l'ensemble est maintenu une nuit sous agitation. Après filtration et évaporation, le résidu est repris par de l'acétate d'éthyle. La phase organique est lavée, séchée, filtrée et évaporée. Le produit attendu est obtenu sous forme solide après purification du résidu par chromatographie sur gel de silice en utilisant comme éluant un mélange dichlorométhane/méthanol (95/5).

Spectre de masse : $[MH]^+$ m/z = 522

EXEMPLE 2 : (6S)-*N*-{4-[amino(hydroxyimino)méthyl]benzyl}-4-oxo-3-{(2-(2-pyridinyl)éthyl]amino}-4,6,7,8-tétrahydropyrrolo[1,2-*a*]pyrazine-6-carboxamide

Le produit attendu est obtenu selon le procédé décrit dans l'exemple 1 en remplaçant l'acide (6S)-3-[(2,2-diphényléthyl)amino]-4-oxo-4,6,7,8-tétrahydropyrrolo[1,2-*a*]pyrazine-6-carboxylique par l'acide (6S)-3-{[2-(2-pyridinyl)éthyl]amino}-4-oxo-4,6,7,8-tétrahydro-pyrrolo-[1,2-*a*]pyrazine-6-carboxylique.

Microanalyse élémentaire :

	C %	*H %*	*N %*
Calculé	*61,73*	*5,63*	*21,91*
Trouvé	*62,03*	*5,50*	*21,78*

EXEMPLE 3 : (6S)-*N*-[2-({[amino(imino)méthyl]amino}oxy)éthyl]-3-[(2,2-diphényl-éthyl)amino]-4-oxo-4,6,7,8-tétrahydropyrrolo[1,2-*a*]pyrazine-6-carboxamide dichlorhydrate

***Stade A* : (6S)-N-[2-({[(tertbutyloxycarbonylamino)(tertbutyloxycarbonylimino)méthyl]-amino}oxy)éthyl]-3-[(2,2-diphényléthyl)amino]-4-oxo-4,6,7,8-tétrahydro-pyrrolo[1,2-a]pyrazine-6-carboxamide**

Le produit attendu est obtenu selon le procédé décrit dans l'exemple 1 en remplaçant le chlorhydrate de 4-(aminométhyl)-*N'*-hydroxybenzènecarboximidamide par la *N*-(2-aminoéthoxy)-*N',N''*-(ditertbutyloxycarbonyl)guanidine

Stade B **: *(6S)*-N-*[2-({[amino(imino)méthyl]amino}oxy)éthyl]*-3-*[(2,2-diphényl-éthyl)amino]*-4-oxo-4,6,7,8-*tétrahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine*-6-*carboxamide dichlorhydrate***

A 1,8 mmoles du composé décrit au stade précédent dans 20 ml de dichlorométhane anhydre, sont ajoutés 10 ml d'une solution d'acide chlorhydrique 4M dans le dioxane. L'ensemble est agité une nuit à température ambiante. Après évaporation des solvants, le résidu est repris par de l'eau. La solution est filtrée et lyophilisée et conduit au produit attendu.

Spectre de masse : $[M+H^+]$ m/z = 475

Les exemples suivants ont été préparés selon le procédé décrit dans l'exemple 1 en utilisant les produits de départ correspondants.

EXEMPLE 4 : (6S)-4-oxo-*N*-[(2-oxo-2,3-dihydro-1*H*-pyrrolo[2,3-*c*]pyridin-5-yl)méthyl]-3-{[2-(2-pyridinyl)éthyl]amino}-4,6,7,8-tétrahydropyrrolo[1,2-*a*]pyrazine-6-carboxamide

EXEMPLE 5 : (6S)-4-oxo-*N*-[(2-oxo-2,3-dihydro-1*H*-imidazo[4,5-*c*]pyridin-6-yl)méthyl]-3-{[2-(2-pyridinyl)éthyl]amino}-4,6,7,8-tétrahydropyrrolo[1,2-*a*]pyrazine-6-carboxamide

EXEMPLE 6 : (6S)-4-oxo-*N*-[(2-oxo-2,3-dihydro-1*H*-benzimidazol-4-yl)méthyl]-3-{[2-(2-pyridinyl)éthyl]amino}-4,6,7,8-tétrahydropyrrolo[1,2-*a*]pyrazine-6-carboxamide

EXEMPLE 7 : (6S)-4-oxo-*N*-[(2-oxo-2,3-dihydro-1*H*-benzimidazol-5-yl)méthyl]-3-{[2-(2-pyridinyl)éthyl]amino}-4,6,7,8-tétrahydropyrrolo[1,2-*a*]pyrazine-6-carboxamide

EXEMPLE 8 : **(6S)-4-oxo-*N*-[(3-oxo-3,4-dihydro-2*H*-benzoxazin-8-yl)méthyl]-3-{[2-(2-pyridinyl)éthyl]amino}-4,6,7,8-tétrahydropyrrolo[1,2-*a*]pyrazine-6-carboxamide**

EXEMPLE 9 : **(6S)-4-oxo-*N*-[(4-oxo-3,4-dihydro-2*H*-1,3-benzoxazin-8-yl)méthyl]-3-{[2-(2-pyridinyl)éthyl]amino}-4,6,7,8-tétrahydropyrrolo[1,2-*a*]pyrazine-6-carboxamide**

EXEMPLE 10 : **(6S)-4-oxo-3-{[2-(2-pyridinyl)éthyl]amino}-*N*-[2-(2-pyridinyl-méthoxy)benzyl]-4,6,7,8-tétrahydropyrrolo[1,2-*a*]pyrazine-6-carboxamide**

EXEMPLE 11 : **(6S)-*N*-{2-[(2,4-dioxo-1,3-thiazolidin-5-yl)méthyl]benzyl}-4-oxo-3-{[2-(2-pyridinyl)éthyl]amino}-4,6,7,8-tétrahydropyrrolo[1,2-*a*]pyrazine-6-carboxamide**

EXEMPLE 12 : **(6S)-*N*-{2-[(2,4-dioxo-1,3-thiazolidin-5-yl)oxy]benzyl}-4-oxo-3-{[2-(2-pyridinyl)éthyl]amino}-4,6,7,8-tétrahydropyrrolo[1,2-*a*]pyrazine-6-carboxamide**

EXEMPLE 13 : **(6S)-4-oxo-*N*-{2-[(5-oxo-4,5-dihydro-3*H*-1,2,4-triazol-3-yl)oxy]benzyl}-3-{[2-(2-pyridinyl)éthyl]amino}-4,6,7,8-tétrahydropyrrolo[1,2-*a*]pyrazine-6-carboxamide**

EXEMPLE 14 : **(6S)-4-oxo-*N*-{2-[(2-oxo-3-pyrrolidinyl)oxy]benzyl}-3-{[2-(2-pyridinyl)éthyl]amino}-4,6,7,8-tétrahydropyrrolo[1,2-*a*]pyrazine-6-carboxamide**

EXEMPLE 15 : **(6S)-*N*-[2-(4,5-dihydro-1*H*-imidazol-2-ylméthoxy)benzyl]-4-oxo-3-{[2-(2-pyridinyl)éthyl]amino}-4,6,7,8-tétrahydropyrrolo[1,2-*a*]pyrazine-6-carboxamide**

EXEMPLE 16 : (6S)-*N*-[2-(1*H*-imidazol-2-ylméthoxy)benzyl]-4-oxo-3-{[2-(2-pyridinyl)éthyl]amino}-4,6,7,8-tétrahydropyrrolo[1,2-*a*]pyrazine-6-carboxamide

EXEMPLE 17 : (6S)-*N*-[3-amino-1,2-benzisoxazol-6-yl)méthyl]-4-oxo-3-{[2-(2-pyridinyl)éthyl]amino}-4,6,7,8-tétrahydropyrrolo[1,2-*a*]pyrazine-6-carboxamide

EXEMPLE 18 : (6S)-*N*-[1*H*-indol-6-ylméthyl)-4-oxo-3-{[2-(2-pyridinyl)éthyl]amino}-4,6,7,8-tétrahydropyrrolo[1,2-*a*]pyrazine-6-carboxamide

EXEMPLE 19 : (6S)-*N*-[3-isoquinolinylméthyl)-4-oxo-3-{[2-(2-pyridinyl)éthyl]amino}-4,6,7,8-tétrahydropyrrolo[1,2-*a*]pyrazine-6-carboxamide

ETUDE PHARMACOLOGIQUE DES DERIVES DE L'INVENTION

EXEMPLE A : Inhibition de la thrombine et de protéases à sérine de la fibrinolyse

Pour évaluer in vitro l'activité inhibitrice des produits de l'invention sur la thrombine humaine (Sigma, activité spécifique 3230 UNIH/mg), le fibrinogène humain purifié (4 mM, Stago) (Fg) a été ajouté à une quantité donnée de thrombine (0.7 nM) préalablement incubée avec ou sans l'inhibiteur à tester (20°C, 10 minutes).

Pour évaluer in vitro la sélectivité de ces produits vis-à-vis de la plasmine, le même protocole a été appliqué à la plasmine humaine purifiée (2 nM, Stago), en utilisant pour substrat un peptide paranitroanilidé : <Glu-Phe-Lys-pNA (0.50 mM, S 2403, Kabi).

Inhibiteurs, enzymes et substrats sont dilués dans le même tampon (tampon phosphate 0.01 mM, pH 7.4, contenant 0.12 M de chlorure de sodium et 0.05 % de sérum albumine bovine) puis distribués dans une microplaque en polystyrène sous un volume de 50 µl.

La fibrine formée par la thrombine ou par le paranitroanilide libéré par l'action de la

protéase à sérine est mesurée spectrophotométriquement à 405 nm après 15 à 30 minutes de réaction à 20°C.

Lors de ce test, il a été montré notamment que la concentration en nM inhibant 50 % de l'activité enzymatique (CI_{50}) de la thrombine par rapport au contrôle sans produit est égale à 141 nM pour le composé de l'exemple 1, 313 nM pour le composé de l'exemple 2, 4 nM pour le composé de l'exemple 3, 136 nM pour le composé de l'exemple 10, 12 nM pour le composé de l'exemple 15, 140 nM pour le composé de l'exemple 17 et 22 nM pour le composé de l'exemple 18.

Les composés de l'invention sont, d'autre part, très sélectifs vis-à-vis de la thrombine par rapport à d'autres protéases à sérine de la fibrinolyse (plasmine, tPa et uPa).

<u>EXEMPLE B</u> : Activité anti-coagulante, mesure de temps de thrombine et temps de céphaline activée chez l'homme

Afin d'évaluer l'activité anti-coagulante des composés de l'invention, le temps de thrombine (TT) et le temps de céphaline activée (TCA) ont été déterminés dans des échantillons de plasma humain. Un coagulomètre ST_4 a été utilisé. Un plasma, pauvre en plaquettes, lyophilisé, est repris dans de l'eau distillée. Le TT est réalisé avec le réactif Thrombine Prest et le TCA avec le réactif Céphaline PTT Automate.
L'inhibiteur ou le solvant (10 µl) est additionné au plasma (90 µl), puis incubé 2 minutes à 37°C. 100 µl de Thrombine Prest (TT) ou de Céphaline PTT Automate (TCA) sont ajoutés en déclenchant le chronomètre.

Dans ces conditions, le TT est de l'ordre de 18 secondes, le TCA est de l'ordre de 12 secondes. L'activité d'un antagoniste est évaluée par sa capacité de prolonger le TT et le TCA par rapport au témoin. L'effet des inhibiteurs est exprimé par la concentration en µM qui multiplie de 2 le temps de coagulation (Ctt_2).

Les composés de l'invention ont produit des prolongations des temps de coagulation très importantes et certains Ctt_2 sont exemplifiés dans le tableau 1 ci-dessous :

Tableau 1

Exemple	*TT Ctt_2 (μM)*	*TCA Ctt_2 (μM)*
2	3,6	20
3	0,10	1,1
15	0,19	1,91
18	0,28	3,07


EXEMPLE DE COMPOSITION PHARMACEUTIQUE :

Formule de préparation pour 1000 comprimés dosés à 10 mg :

Composé de l'exemple 1 ..... 10 g
Hydroxypropylcellulose ..... 2 g
Amidon de blé ..... 10 g
Lactose ..... 100 g
Stéarate de magnésium ..... 3 g
Talc ..... 3 g

Les réalisations de l'invention, au sujet desquelles un droit exclusif de propriété ou de privilège est revendiqué, sont définies comme suit:

1. Composés de formule (I) :



(I)


dans laquelle :


R_1 représente un atome d'hydrogène ou un groupement alkyle en C_1-C_6 linéaire ou ramifié, éventuellement substitué par un ou plusieurs groupements, identiques ou différents, choisis dans le groupe constitué par les groupements aryle, hétéroaryle, cycloalkyle et hétérocycloalkyle,

 représente un cycle saturé de 4 à 7 chaînons contenant éventuellement, en plus de l'atome d'azote, un ou deux hétéroatomes choisis parmi O et S, ou un groupement -NR_3,dans lequel R_3 représente un atome d'hydrogène ou un groupement alkyle en C_1-C_6 linéaire ou ramifié,

n représente un entier tel que $1 \leq n \leq 6$,

R_2 représente l'un quelconque des groupements suivants :

a) 

b)  dans lequel :

X représente un groupement CH ou un atome d'azote,

R_4 représente un atome d'hydrogène ou d'halogène,

R_5 représente l'un quelconque des groupements :

- $R_aNHCOHN$- dans lequel R_a représente un atome d'hydrogène ou un groupement alkyle en C_1-C_6 linéaire ou ramifié,


- $R_bSO_2NHCO(NH)_p$-, dans lequel R_b représente un groupement alkyle en C_1-C_6 linéaire ou ramifié et p représente 0 ou 1,
- HON = $C(NH_2)$-, HN=C(NHOH)-,
- R_c-$(CH_2)_m$-Y- dans lequel :

  Y représente CH_2, O, S ou R_aN,

  m représente un nombre entier tel que $0 \leq m \leq 3$,

  R_c représente un hétérocycle à 5 ou 7 chaînons, saturé ou insaturé contenant de 1 à 4 hétéroatomes choisis dans le groupe constitué par les atomes d'oxygène, d'azote et de soufre, ledit hétérocycle contenant éventuellement une ou plusieurs fonctions carbonyles et éventuellement substitué par un ou plusieurs atomes ou groupements, identiques ou différents, choisis dans le groupe constitué par les atomes d'halogène et les groupements alkyle en C_1-C_6 linéaire ou ramifié, alkoxy en C_1-C_6 linéaire ou ramifié, et amino, le groupement amino étant éventuellement substitué par un ou deux groupements alkyle en C_1-C_6 linéaire ou ramifié,

ou c) un système bicyclique de formule :



dans laquelle :

X est tel que défini précédemment et B forme, avec les atomes de carbone auquel il est attaché, un groupement aryle ou un hétérocycle à 5 ou 7 chaînons, saturé ou insaturé, contenant de 1 à 4 hétéroatomes choisis dans le groupe constitué par les atomes d'oxygène, d'azote et de soufre, ledit hétérocycle contenant éventuellement au moins une fonction carbonyle et étant éventuellement substitué par un ou plusieurs atomes ou groupements, identiques ou différents, choisis dans le groupe constitué par les atomes d'halogène et les groupements alkyle en C_1-C_6 linéaire ou ramifié, alkoxy en C_1-C_6 linéaire ou ramifié et amino, le groupement amino étant éventuellement substitué par un ou deux groupements alkyle en C_1-C_6 linéaire ou ramifié,

leurs isomères, leurs N-oxydes ainsi que leurs sels d'addition à un acide ou à une base pharmaceutiquement acceptables,

étant entendu que:

par groupement aryle, on entend un groupement phényle, biphénylyle ou naphtyle, chacun de ces groupements étant éventuellement substitué par un ou plusieurs atomes ou groupements, identiques ou différents, choisis dans le groupe constitué par les atomes d'halogène et les groupements alkyle en C_1-C_6 linéaire ou ramifié, alkoxy en C_1-C_6 linéaire ou ramifié, hydroxy, trihalogénoalkyle en C_1-C_6 linéaire ou ramifié, trihalogénoalkoxy en C_1-C_6 linéaire ou ramifié, amino, alkylcarbonyloxy en C_1-C_6 linéaire ou ramifié, carboxyméthoxy et carbamoylméthoxy, le groupement alkyle étant éventuellement substitué par un groupement hydroxy, carboxy, amino ou carbamoyle, les groupements amino et carbamoyle étant éventuellement substitués par un ou deux groupements alkyle en C_1-C_6 linéaire ou ramifié, et le groupement carbamoylméthoxy étant éventuellement N-substitué par un ou deux groupements alkyle en C_1-C_6 linéaire ou ramifié,

par groupement hétéroaryle, on entend un groupement aromatique mono- ou bicyclique de 5 à 12 chaînons contenant un, deux ou trois hétéroatomes choisis dans le groupe constitué par les atomes d'oygène, d'azote et de soufre, et étant éventuellement substitué par un ou plusieurs atomes ou groupements, identiques ou différents, choisis dans le groupe constitué par les atomes d'halogène, et les groupements alkyle en C_1-C_6 linéaire ou ramifié, hydroxy, alkoxy en C_1-C_6 linéaire ou ramifié, trihalogénoalkyle en C_1-C_6 linéaire ou ramifié, phényle, amino, carboxyméthoxy et carbamoylméthoxy, le groupement alkyle étant éventuellement substitué par un groupement hydroxy, carboxy, amino ou carbamoyle, les groupements amino et carbamoyle étant éventuellement substitués par un ou deux groupements alkyle en C_1-C_6 linéaire ou ramifié, et le groupement carbamoylméthoxy étant éventuellement N-substitué par un ou deux groupements alkyle en C_1-C_6 linéaire ou ramifié,

par groupement cycloalkyle, on entend un groupement hydrocarboné mono- ou bicyclique, saturé ou insaturé, de 3 à 12 chaînons, et éventuellement substitué par un ou plusieurs atomes ou groupements, identiques ou différents, choisis dans le groupe constitué par les atomes d'halogène et les groupements alkyle en C_1-C_6 linéaire ou ramifié, alkoxy en C_1-C_6 linéaire ou ramifié, hydroxy, trihalogénoalkyle en C_1-C_6 linéaire ou ramifié, amino et aryle, le groupement amino étant substitué éventuellement par un ou plusieurs alkyle en C_1-C_6

linéaire ou ramifié,

par groupement hétérocycloalkyle, on entend un groupement mono- ou bicyclique, saturé ou insaturé, de 4 à 12 chaînons contenant un, deux ou trois hétéroatomes choisis dans le groupe constitué par les atomes d'oxygène, d'azote et de soufre, et étant éventuellement substitué par un ou plusieurs atomes ou groupements, identiques ou différents, choisis dans le groupe constitué par les atomes d'halogène et les groupements alkyle en C_1-C_6 linéaire ou ramifié, alkoxy en C_1-C_6 linéaire ou ramifié, hydroxy, trihalogénoalkyle en C_1-C_6 linéaire ou ramifié, amino, aryle et diarylméthyle, le groupement amino étant substitué éventuellement par un ou plusieurs alkyle en C_1-C_6 linéaire ou ramifié.


2. Composés de formule (I) selon la revendication 1, caractérisés en ce que n est égal à 1.

3. Composés de formule (I) selon la revendication 1, caractérisés en ce que le cycle  est un cycle pyrrolidinyle.


4. Composés de formule (I) selon la revendication 1, caractérisés en ce que R_1 représente un groupement alkyle en C_1-C_6 linéaire ou ramifié substitué par un ou plusieurs groupements aryle ou hétéroaryle.

5. Composés de formule (I) selon la revendication 4, caractérisés en ce que le groupement aryle est un groupement phényle.

6. Composés de formule (I) selon la revendication 4, caractérisés en ce que le groupement hétéroaryle est le groupement pyridinyle.

7. Composés de formule (I) selon la revendication 1, caractérisés en ce que R_2 représente un groupement .

8. Composés de formule (I) selon la revendication 1, caractérisés en ce que R_2

représente un groupement  dans lequel :

X représente un groupement CH ou un atome d'azote,

R_4 représente un atome d'hydrogène ou d'halogène,


R_5 représente l'un quelconque des groupements :

- $R_aNHCOHN$- dans lequel R_a représente un atome d'hydrogène ou un groupement alkyle en C_1-C_6 linéaire ou ramifié,
- $R_bSO_2NHCO(NH)_p$-, dans lequel R_b représente un groupement alkyle en C_1-C_6 linéaire ou ramifié et p représente 0 ou 1,
- $HON = C(NH_2)$-, $HN=C(NHOH)$-,
- R_c-$(CH_2)_m$-Y- dans lequel :

  Y représente CH_2, O, S ou R_aN,

  m représente un nombre entier tel que $0 \leq m \leq 3$,

  R_c représente un hétérocycle à 5 ou 7 chaînons, saturé ou insaturé contenant de 1 à 4 hétéroatomes choisis dans le groupe constitué par les atomes d'oxygène, d'azote et de soufre, ledit hétérocycle contenant éventuellement une ou plusieurs fonctions carbonyles et étant éventuellement substitué par un ou plusieurs atomes ou groupements, identiques ou différents, choisis dans le groupe constitué par les atomes d'halogène et les groupements alkyle en C_1-C_6 linéaire ou ramifié, alkoxy en C_1-C_6 linéaire ou ramifié, et amino, le groupement amino étant éventuellement substitué par un ou deux groupements alkyle en C_1-C_6 linéaire ou ramifié.

9. Composés de formule (I) selon la revendication 1, caractérisés en ce que R_2 représente un système bicyclique de formule  dans lequel X représente un groupement CH ou un atome d'azote, et B forme, avec les atomes de carbone auquel il est attaché, un hétérocycle à 5 ou 7 chaînons, saturé ou insaturé, contenant de 1 à 4 hétéroatomes choisis dans le groupe constitué par les atomes d'oxygène, d'azote et de soufre, ledit hétérocycle contenant éventuellement au moins une fonction carbonyle et étant éventuellement substitué par un ou plusieurs atomes ou groupements, identiques ou

différents, choisis dans le groupe constitué par les atomes d'halogène et les groupements alkyle en C_1-C_6 linéaire ou ramifié, alkoxy en C_1-C_6 linéaire ou ramifié, et amino, le groupement amino étant éventuellement substitué par un ou deux groupements alkyle en C_1-C_6) linéaire ou ramifié.

10. Le (6S)-*N*-{4-[amino(hydroxyimino)méthyl]benzyl}-3-[(2,2-diphényl-éthyl)amino]-4-oxo-4,6,7,8-tétrahydropyrrolo[1,2-*a*]pyrazine-6-carboxamide, ses isomères, ses N-oxyde ainsi que ses sels d'addition à un acide ou à une base pharmaceutiquement acceptables.

11. Le (6S)-*N*-{4-[amino(hydroxyimino)méthyl]benzyl}-4-oxo-3-{(2-(2-pyridinyl)-éthyl]amino}-4,6,7,8-tétrahydropyrrolo[1,2-*a*]pyrazine-6-carboxamide, ses isomères, ses N-oxyde ainsi que ses sels d'addition à un acide ou à une base pharmaceutiquement acceptables.

12. Le (6S)-*N*-[2-({[amino(imino)méthyl]amino}oxy)éthyl]-3-[(2,2-diphényléthyl)amino]-4-oxo-4,6,7,8-tétrahydropyrrolo[1,2-*a*]pyrazine-6-carboxamide, ses isomères, ses N-oxyde ainsi que ses sels d'addition à un acide ou à une base pharmaceutiquement acceptables.

13. Le (6S)-4-oxo-*N*-[(3-oxo-3,4-dihydro-2*H*-benzoxazin-8-yl)méthyl]-3-{[2-(2-pyridinyl)éthyl]amino}-4,6,7,8-tétrahydropyrrolo[1,2-*a*]pyrazine-6-carboxamide, ses isomères, ses N-oxyde ainsi que ses sels d'addition à un acide ou à une base pharmaceutiquement acceptables.

14. Le (6S)-4-oxo-3-{[2-(2-pyridinyl)éthyl]amino}-*N*-[2-(2-pyridinyl-méthoxy)benzyl]-4,6,7,8-tétrahydropyrrolo[1,2-*a*]pyrazine-6-carboxamide, ses isomères, ses N-oxyde ainsi que ses sels d'addition à un acide ou à une base pharmaceutiquement acceptables.

15. Le (6S)-4-oxo-*N*-{2-[(2-oxo-3-pyrrolidinyl)oxy]benzyl}-3-{[2-(2-pyridinyl)éthyl]-amino}-4,6,7,8-tétrahydropyrrolo[1,2-*a*] pyrazine-6-carboxamide, ses isomères, ses N-oxyde ainsi que ses sels d'addition à un acide ou à une base pharmaceutiquement


acceptables.

16. Le (6S)-*N*-[2-(4,5-dihydro-1*H*-imidazol-2-ylméthoxy)benzyl]-4-oxo-3-{[2-(2-pyridinyl)éthyl]amino}-4,6,7,8-tétrahydro-pyrrolo[1,2-a]pyrazine-6-carboxamide, ses isomères, ses N-oxyde ainsi que ses sels d'addition à un acide ou à une base pharmaceutiquement acceptables.

17. Le (6S)-*N*-[2-(1*H*-imidazol-2-ylméthoxy)benzyl]-4-oxo-3-{[2-(2-pyridinyl)éthyl]-amino}-4,6,7,8-tétrahydropyrrolo[1,2-*a*]pyrazine-6-carboxamide, ses isomères, ses N-oxyde ainsi que ses sels d'addition à un acide ou à une base pharmaceutiquement acceptables.


18. Le (6S)-*N*-[1*H*-indol-6-yl-méthyl)-4-oxo-3-{[2-(2-pyridinyl)éthyl]amino}-4,6,7,8-tétrahydropyrrolo[1,2-*a*]pyrazine-6-carboxamide, ses isomères, ses N-oxyde ainsi que ses sels d'addition à un acide ou à une base pharmaceutiquement acceptables.

19. Procédé de préparation des composés de formule (I) telle que définie dans la revendication 1, caractérisé en ce que l'on réduit un composé de formule (II) :



(II)

dans laquelle A a la même signification que dans la revendication 1, P_1 représente un groupement protecteur de la fonction amino et Bn représente le groupement benzyle, à l'aide d'un agent réducteur pour conduire à un composé de formule (III) :




(III)

dans laquelle A, P_1 et Bn ont la même signification que précédemment,

composé de formule (III) dont on transforme la fonction hydroxy en méthoxy, puis en


fonction cyano pour conduire, après déprotection de la fonction amino, à un composé de formule (IV) :



(IV)

dans laquelle A et Bn ont la même signification que précédemment,

composé de formule (IV) que l'on met en réaction avec du chlorure d'oxalyle pour conduire à un composé de formule (V) :




(V)

dans laquelle A et Bn ont la même signification que précédemment,

composé de formule (V) que l'on met en réaction avec un composé de formule (VI) :

$$R_1 - NH_2 \qquad \text{(VI)}$$


dans laquelle R_1 a la même signification que dans la revendication 1, pour conduire à un composé de formule (VII) :



(VII)

dans laquelle A, Bn et R_1 ont la même signification que précédemment,


composé de formule (VII) que l'on transforme ensuite par hydrogénation catalytique en composé de formule (VIII) :



(VIII)

dans laquelle A et R_1 ont la même signification que précédemment,


composé de formule (VIII) que l'on transforme ensuite, par hydrogénation catalytique en milieu alcalin, en composé de formule (IX) :



(IX)

dans laquelle A et R_1 ont la même signification que précédemment,

composé de formule (IX) que l'on met en réaction avec un composé de formule (X) :



(X)

dans laquelle n et R_2 ont la même signification que dans la revendication 1, pour conduire, après éventuelle déprotection, à un composé de formule (I),

composé de formule (I) que l'on transforme éventuellement en N-oxyde correspondant, que l'on purifie le cas échéant, dont on sépare éventuellement les isomères et que l'on transforme, le cas échéant, en ses sels d'addition à un acide ou à une base pharmaceutiquement acceptable.

20. Composition pharmaceutique contenant comme principe actif un composé selon l'une quelconque des revendications 1 à 18, en association avec au moins un véhicule inerte, non toxique et pharmaceutiquement acceptable.

21. Composition pharmaceutique selon la revendication 20, caractérisée en ce quelle est utile en tant qu'inhibiteur de protéases à sérine apparentées à la trypsine.

22. Composition pharmaceutique selon la revendication 21, caractérisée en ce qu'elle est utile en tant qu'inhibiteur de thrombine.