



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103356802 A

(43) 申请公布日 2013. 10. 23

(21) 申请号 201310317487. 1

(22) 申请日 2013. 07. 26

(71) 申请人 张佳奇

地址 236400 安徽省阜阳市临泉县城关镇水  
上新村一巷 14 号 2 户

(72) 发明人 张佳奇

(74) 专利代理机构 安徽省阜阳市科颖专利事务  
所 34108

代理人 徐宝泉

(51) Int. Cl.

A61K 36/804 (2006. 01)

A61P 15/14 (2006. 01)

权利要求书1页 说明书4页

(54) 发明名称

一种治疗乳腺炎的药物及其制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗乳腺炎的药物及其制备方法,它主要是由蒲公英、甘草、天花粉、瓜蒌子、金银花、连翘、当归、白芍按一定重量配比制备而成,本发明具有清热解毒,行气开郁,活血散结,消肿止痛的功能,用于治疗乳腺炎见效快,疗效好,治愈率高。

1. 一种治疗乳腺炎的药物,其特征在于:它是由下列重量范围内的原料药制成:

蒲公英 10—20 克 甘 草 10—20 克 天花粉 5—15 克  
瓜蒌子 5—10 克 金银花 15—25 克 连 翘 6—11 克  
当 归 15—25 克 白 芍 5—15 克 柴 胡 10—20 克  
川 芎 5—10 克 蜂 房 10—20 克 生地黄 5—15 克。

2. 根据权利要求 1 所述的药物,其中各原料药的用量为:

蒲公英 15 克 甘 草 15 克 天花粉 10 克  
瓜蒌子 8 克 金银花 20 克 连 翘 9 克  
当 归 20 克 白 芍 10 克 柴 胡 15 克  
川 芎 8 克 蜂 房 15 克 生地黄 10 克。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述药物的制备方法,它包括下列步骤:

(一) 备料

(1) 蒲公英:拣去杂质,洗净泥土,切段,晒干;

(2) 甘草:拣去杂质,洗净,用水浸泡至八成透时,捞出,润透,切片,凉干;

(3) 天花粉:拣去杂质,大小块分开,用水泡至六成透,捞出,闷润至内外湿度均匀,切片,晒干,或用水洗净,捞出,晒至极干,捣成小块;

(4) 瓜蒌子:取原药材,除去干瘪种子、杂质,用时捣碎;

(5) 金银花:筛去泥沙,拣净杂质;

(6) 连翘:拣净杂质,搓开,除去枝梗;

(7) 当归:拣去杂质,洗净,闷润,稍晾至内外湿度适宜时,切片晒干;

(8) 白芍:拣去杂质,分开大小个,用水浸泡至八成透,捞出,晒晾,润至内外湿度均匀,切片,干燥;

(9) 柴胡:拣去杂质,除去残茎,洗净泥沙,捞出,润透后及时切片,随即晒干;

(10) 川芎:拣去杂质,分开大、小个,用水浸泡,晒晾,闷润后切片,干燥;

(11) 蜂房:取原药材,除去杂质,切块,筛去碎屑;

(12) 生地黄:取原药材,除去杂质,洗净,稍润,切厚片,干燥,筛去碎屑;

(二) 制备

(1) 将所述重量的蒲公英、甘草、天花粉、瓜蒌子、金银花、连翘、当归、白芍、柴胡、川芎、蜂房、生地黄药物加水煎煮二次,第一次加水 6 倍量,浸泡 120 分钟后,武火煎煮沸腾 10 分钟,再用文火煎煮 30 分钟,过滤得第一次煎煮液;

(2) 将过滤的药渣加水 4 倍量,武火煮沸,再用文火煎煮 15 分钟,得第二次煎煮液;

(3) 将两次煎煮液药液合并,武火煮沸,再用文火煎煮 10 分钟,将药液分成 3 剂服用。

## 一种治疗乳腺炎的药物及其制备方法

### 技术领域

[0001] 本发明涉及一种用于治疗乳腺炎的药物及其制备方法,属中药领域。

### 技术背景

[0002] 乳腺炎是指乳腺的急性化脓性感染,是产褥期的常见病,是引起产后发热的原因之一,最常见于哺乳妇女,尤其是初产妇。哺乳期的任何时间均可发生,而哺乳的开始最为常见。乳腺炎是初产妇常见的一种病症,轻者不能给婴儿正常喂奶,重者则要手术治疗。目前,西药治疗乳腺炎效果不佳,且有较多副作用,因此,人们对有效治疗乳腺炎的中药存在极大的需求。

### 发明内容

[0003] 本发明人依据中医理论的研究及临床反复的试验和验证,终于找到了有效治疗乳腺炎的药物,从而完成了本发明。

[0004] 本发明的目的就是提供一种能够有效治疗乳腺炎的组合药物。

[0005] 本发明的另一个目的就是提供了该组合药物的制备方法。

[0006] 本发明药物是选用蒲公英、甘草、天花粉、瓜蒌子、金银花、连翘、当归、白芍、柴胡、川芎、蜂房、生地黄药物进行组合的,将这些药物组合使得各药物功效产生协同作用,从而能够快速治疗乳腺炎的复发。其中选用蒲公英是因为其性味甘苦,寒,入肝、胃经,有清热解毒,利尿散结的功能,治急性乳腺炎,淋巴腺炎,瘰疬,疔毒疮肿,急性结膜炎,感冒发热,急性扁桃体炎,急性支气管炎,胃炎,肝炎,胆囊炎,尿路感染。选用甘草是因为其性味甘,平,入脾、胃、肺经,有和中缓急,润肺,解毒,调和诸药的功能,炙用,治脾胃虚弱,食少,腹痛便溏,劳倦发热,肺痿咳嗽,心悸,惊痫;生用,治咽喉肿痛,消化性溃疡,痈疽疮疡,解药毒及食物中毒。选用天花粉是因为其性味甘苦酸,凉,入肺、胃经,有生津,止渴,降火,润燥,排脓,消肿的功能,治热病口渴,消渴,黄疸,肺燥咳血,痈肿,痔瘕。选用瓜蒌子是因为其性味甘,寒,归肺、胃、大肠经,有润肺化痰,滑肠通便的功能,治燥咳痰黏,肠燥便秘。选用金银花是因为其性味甘,寒,入肺、胃经,有清热,解毒的功能,治温病发热,热毒血痢,痈疡,肿毒,瘰疬,痔漏。选用连翘是因为其性味苦,凉,入心、肝、胆经,有清热,解毒,散结,消肿的功能,治温热,丹毒,斑疹,痈疡肿毒,瘰疬,小便淋闭。选用当归是因为其性味甘辛,温,入心、肝、脾经,有补血和血,调经止痛,润燥滑肠的功能,治月经不调,经闭腹痛,癥瘕结聚,崩漏,血虚头痛,眩晕,痿痹,肠燥难便,赤痢后重,痈疽疮疡,金疮,跌扑损伤。选用白芍是因为其性味苦酸,凉,入肝、脾经,有养血柔肝,缓中止痛,敛阴收汗的功能,治胸腹胁肋疼痛,泻痢腹痛,自汗盗汗,阴虚发热,月经不调,崩漏,带下。选用柴胡是因为其性味苦,凉,入肝、胆经,有和解表里,疏肝,升阳的功能,治寒热往来,胸满胁痛,口苦耳聋,头痛目眩,疟疾,下利脱肛,月经不调,子宫下垂。选用川芎是因为其性味辛,温,入肝、胆经,有行气开郁,祛风燥湿,活血止痛的功能,治风冷头痛眩晕,胁痛腹疼,寒痹筋挛,经闭,难产,产后瘀阻块痛,痈疽疮疡。选用蜂房是因为其性味甘,平,归胃经,有祛风,攻毒,杀虫,止痛的功能,用于龋齿牙痛,疮

疡肿毒,乳痈,瘰疬,皮肤顽癣,鹅掌风。选用生地黄是因为其性味甘,寒,归心、肝、肾经,有清热凉血,养阴,生津的功能,治热病烦渴,阴虚内热,骨蒸劳热,内热消渴,吐血,衄血,发斑发疹。

[0007] 本发明组合的药物用量也是发明人经过大量摸索总结得出的,各组分的用量在上述重量范围内都具有较好疗效

蒲公英	10—20 克	甘草	10—20 克	天花粉	5—15 克
瓜蒌子	5—10 克	金银花	15—25 克	连翘	6—11 克
当归	15—25 克	白芍	5—15 克	柴胡	10—20 克
川芎	5—10 克	蜂房	10—20 克	生地黄	5—15 克

优选用量为

蒲公英	15 克	甘草	15 克	天花粉	10 克
瓜蒌子	8 克	金银花	20 克	连翘	9 克
当归	20 克	白芍	10 克	柴胡	15 克
川芎	8 克	蜂房	15 克	生地黄	10 克

本发明药物的制备方法如下

#### 一、备料

- 1、蒲公英:拣去杂质,洗净泥土,切段,晒干;
- 2、甘草:拣去杂质,洗净,用水浸泡至八成透时,捞出,润透,切片,凉干;
- 3、天花粉:拣去杂质,大小块分开,用水泡至六成透,捞出,闷润至内外湿度均匀,切片,晒干,或用水洗净,捞出,晒至极干,捣成小块;
- 4、瓜蒌子:取原药材,除去干瘪种子、杂质,用时捣碎;
- 5、金银花:筛去泥沙,拣净杂质;
- 6、连翘:拣净杂质,搓开,除去枝梗;
- 7、当归:拣去杂质,洗净,闷润,稍晾至内外湿度适宜时,切片晒干;
- 8、白芍:拣去杂质,分开大小个,用水浸泡至八成透,捞出,晒晾,润至内外湿度均匀,切片,干燥;
- 9、柴胡:拣去杂质,除去残茎,洗净泥沙,捞出,润透后及时切片,随即晒干;
- 10、川芎:拣去杂质,分开大、小个,用水浸泡,晒晾,闷润后切片,干燥;
- 11、蜂房:取原药材,除去杂质,切块,筛去碎屑;
- 12、生地黄:取原药材,除去杂质,洗净,稍润,切厚片,干燥,筛去碎屑。

#### [0008] 二、制备

1、将所述重量的蒲公英、甘草、天花粉、瓜蒌子、金银花、连翘、当归、白芍、柴胡、川芎、蜂房、生地黄药物加水煎煮二次,第一次加水 6 倍量,浸泡 120 分钟后,武火煎煮沸腾 10 分钟,再用文火煎煮 30 分钟,过滤得第一次煎煮液。

[0009] 2、将过滤的药渣加水 4 倍量,武火煮沸,再用文火煎煮 15 分钟,得第二次煎煮液。

[0010] 3、将两次煎煮液药液合并,武火煮沸,再用文火煎煮 10 分钟,将药液分成 3 剂服用。

[0011] 本发明药物具有清热解毒,行气开郁,活血止痛,散结,消肿的功能,用于治疗乳腺炎,疗程短、见效快、无毒副作用。

## 具体实施方式

[0012] 以下通过试验例来进一步阐述本发明所述药物的有益效果,这些试验例包括了本发明药物的动物毒性试验报告和临床观察资料。

[0013] [试验例 1] 本发明药物的动物毒性试验报告

取家兔 30 只,雌雄兼用,体重 2.0—2.5kg,分两组,每组 15 只,其中一组为超剂量试验组,另一组为正常量试验组。超常量组为 20ml/kg,正常量为 10ml/kg,给药方式为灌胃法给药,每天 2 次,连服 7 天,每天观察给药反应,结果表明二组家兔活动、饮食正常,药物无不良毒副作用。

[0014] [试验例 2] 本发明药物治疗乳腺炎的观察资料

### 1、一般资料

收治乳腺炎患者共 200 例。

[0015] 2、诊断标准

初起阶段:初起常有乳头破裂,哺乳时感觉乳头刺痛,伴有乳汁淤积不畅或结块,有时可有一二个乳管阻塞不通。继而乳房局部肿胀疼痛,结块或有或无,伴有压痛,皮色不红或微红,皮肤不热或微热。全身症状不明显,或伴有恶寒发热,胸闷头痛,烦躁容易发脾气,食欲不振。

成脓阶段:患乳肿块不消或逐渐增大,局部疼痛加重,或有搏动性疼痛,甚持续性剧烈疼痛,伴有明显的触痛,皮色红,皮肤灼热,并有壮热不退,口渴思饮,恶心厌食,同侧腋窝淋巴结肿大压痛。至乳房红肿热痛第 10 天左右,乳房肿块中央渐渐变软,按之有波动感,局部红肿发热,压痛明显,穿刺抽吸有脓液,有时脓液可从乳窍中流出,全身症状加剧。

溃后阶段:当急性脓肿成熟时,可自行破溃出脓,或手术切开排脓。若脓出通畅,则局部肿痛减轻,发热,怕冷症状消失,疮口逐渐愈合。若溃后脓出不畅,肿势不消,疼痛不减,身热不退,可能形成袋脓,或脓液波及其他乳络形成传囊乳痛。亦有溃后乳汁从疮口溢出,久治不愈,形成乳漏。

[0016] 3、治疗方法

选用上述药剂,给患者服用,每次服用 1 剂,每天早、中、晚各服 1 次,15 天为一个疗程,连续服用 4 个疗程。

[0017] 4、疗效评定标准

显效:乳腺炎症状消失,观察半年无复发者;

好转:乳腺炎症状明显改善,体质逐步增强;

无效:乳腺炎症状无改变,达不到好转标准者。

[0018] 5、治疗结果(见下表)

类 型	病例 总数	治 疗 时 间	显 效		好 转		无 效		总有效 率%
			例 数	显效率 %	例 数	好转率 %	例 数	无效率 %	
乳腺炎	200	60 天	192	96	5	2.5	3	1.5	98.5

在上述的治疗中,用本发明药物治疗乳腺炎患者 200 例,结果显效 192 例,显效率为 96%,好转 5 例,好转率为 2.5%,无效 3 例,总有效率为 98.5%。