



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102210846 A

(43) 申请公布日 2011. 10. 12

(21) 申请号 201110144322. X

(22) 申请日 2011. 05. 31

(71) 申请人 袁宗保

地址 274600 山东省菏泽市曹县健康新街 1
号

(72) 发明人 袁宗保

(74) 专利代理机构 济南泉城专利商标事务所
37218

代理人 张贵宾

(51) Int. Cl.

A61K 36/9068 (2006. 01)

A61P 15/00 (2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 2 页

(54) 发明名称

治疗痛经的药物

(57) 摘要

本发明的治疗痛经的药物,其特殊之处在于:
包括以下重量份数的原料:玫瑰花干品 7-9 份,
玉米须 4-6 份,荔枝核 3-5 份,韭子 3-5 份,骨碎
补 5-7 份,五味子 4-6 份,王不留行 4-6 份,红糖
30-40 份,生姜 8-10 份,山楂 8-10 份,山药 10-12
份。本发明的有益效果是,疗效好,见效快,制备简
单,服用方便,无毒副作用,取材方便,价格低,主
要用于治疗原发性痛经。

1. 一种治疗痛经的药物,其特征在于:由以下重量份数的原料制成:

玫瑰花干品 7-9 份,玉米须 4-6 份,荔枝核 3-5 份,韭子 3-5 份,骨碎补 5-7 份,五味子 4-6 份,王不留行 4-6 份,红糖 30-40 份,生姜 8-10 份,山楂 8-10 份,山药 10-12 份。

治疗痛经的药物

技术领域

[0001] 本发明属于中药组合物,特别涉及一种治疗痛经的药物。

背景技术

[0002] 痛经是临床常见多发的难顽病症,痛苦大,发病率高,严重影响人们的工作和生活。原发性痛经大多由于气滞、血瘀、寒凝而成。现有技术中治疗痛经,中西医的药物都有不少,中药疗程长,效果慢,西药通常采用止痛片暂时止痛,效果不佳。也有人用乌鸡白凤丸治疗,但是该药偏重于气血虚弱型痛经,普适性差,而且价格高,制备工艺复杂。

发明内容

[0003] 本发明为了弥补现有技术的不足,提供了一种疗效好、见效快、制备简单的治疗痛经的药物。

[0004] 本发明是通过如下技术方案实现的:

本发明的治疗痛经的药物,其特殊之处在于:包括以下重量份数的原料:玫瑰花干品 7-9 份,玉米须 4-6 份,荔枝核 3-5 份,韭子 3-5 份,骨碎补 5-7 份,五味子 4-6 份,王不留行 4-6 份,红糖 30-40 份,生姜 8-10 份,山楂 8-10 份,山药 10-12 份。

[0005] 制作方法:水煎法,煎两次混合滤液,然后分成两份。

[0006] 用法用量:月经干净第一天开始服用,每日 2 次,即一剂,连服 7 日。7 日为一疗程。

[0007] 本发明的有益效果是,疗效好,见效快,制备简单,服用方便,无毒副作用,取材方便,价格低,主要用于治疗原发性痛经。

具体实施方式

[0008] 实施例 1

本发明的治疗痛经的药物,由以下重量的原料制成:玫瑰花干品 8 克,玉米须 5 克,荔枝核 4 克,韭子 4 克,骨碎补 6 克,五味子 5 克,王不留行 5 克,红糖 35 克,生姜 9 克,山楂 9 克,山药 11 克。

[0009] 制作方法:水煎法,煎两次混合滤液,然后分成两份。

[0010] 用法用量:月经干净第一天开始服用,每日 2 次,即一剂,连服 7 日。7 日为一疗程。

[0011] 实施例 2

本发明的治疗痛经的药物,由以下重量的原料制成:玫瑰花干品 7 克,玉米须 4 克,荔枝核 3 克,韭子 3 克,骨碎补 5 克,五味子 4 克,王不留行 4 克,红糖 30 克,生姜 8 克,山楂 8 克,山药 10 克。

[0012] 其余与实施例 1 相同。

[0013] 实施例 3

本发明的治疗痛经的药物,由以下重量的原料制成:玫瑰花干品 9 克,玉米须 6 克,荔枝核 5 克,韭子 5 克,骨碎补 7 克,五味子 6 克,王不留行 6 克,红糖 40 克,生姜 10 克,山楂 10

克,山药 12 克。

[0014] 其余与实施例 1 相同。

[0015] 实施例 4 临床验证

(1) 一般资料

应用该药物对 100 例女性患者进行临床观察治疗,年龄 14 到 40 岁,均为痛经。

[0016] (2) 治疗方法:月经干净第一天开始服用,每日 2 次,即一剂,连服 7 日。7 日为一疗程。若一个疗程没治愈,则下次月经干净第一天开始第二疗程。

[0017] (3) 疗效评定标准

“治愈”:临床症状体征消失,功能活动恢复正常,下次月经无下腹疼痛。

[0018] “有效”:临床症状明显好转或基本消失,功能活动基本恢复正常,下次月经下腹轻微疼痛。

[0019] “无效”:临床症状体征无改善。

[0020] (4) 治疗效果:

一个疗程治愈 68 例,两个疗程治愈 28 例,治愈占 96 %;4 例疼痛减轻,有效占 4 %;总有效率 100%。