

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges
Eigentum

Internationales Büro

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum
24. Dezember 2014 (24.12.2014)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2014/202505 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

C07D 233/34 (2006.01) A61K 31/402 (2006.01)
C07D 233/74 (2006.01) A01N 43/653 (2006.01)
C07D 233/96 (2006.01) A01N 43/36 (2006.01)
C07D 249/12 (2006.01) A01N 43/78 (2006.01)
C07D 207/22 (2006.01) A61K 31/4196 (2006.01)
C07D 207/404 (2006.01) A61K 31/4166 (2006.01)
C07D 277/54 (2006.01) A61K 31/426 (2006.01)
A01N 43/50 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2014/062510

(22) Internationales Anmeldedatum:
16. Juni 2014 (16.06.2014)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
13172993.1 20. Juni 2013 (20.06.2013) EP

(71) Anmelder: BAYER CROPSCIENCE AG [DE/DE];
Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim (DE).

(72) Erfinder: ALIG, Bernd; Im Rothsiefen 7, 53639
Königswinter (DE). CEREZO-GALVEZ, Silvia;
Pestalozzistr. 39a, 40764 Langenfeld (DE). FISCHER,
Reiner; Nelly-Sachs-Str. 23, 40789 Monheim (DE).
KÖHLER, Adeline; Heimchenweg 9, 40764 Langenfeld
(DE). HAHN, Julia, Johanna; Kölner Landstr. 146,
40591 Düsseldorf (DE). BECKER, Angela; Hoffeldstr.
86, 40235 Düsseldorf (DE). ILG, Kerstin; Neusser Wall
32, 50670 Köln (DE). VOERSTE, Arnd; Mozartstr. 3-5,

50674 Köln (DE). PORTZ, Daniela; Oststr. 1, 52391
Vettweiß (DE).

(74) Anwalt: BIP PATENTS; c/o Bayer Intellectual Property
GmbH, Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein
(DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW,
BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,
DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP,
KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD,
ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI,
NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU,
RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH,
TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA,
ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ,
TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ,
RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY,
CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT,
LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE,
SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA,
GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).


Erklärungen gemäß Regel 4.17:

— hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu
beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii)

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: ARYL SULFIDE DERIVATIVES AND ARYL SULFOXIDE DERIVATIVES AS ACARICIDES AND
INSECTICIDES

(54) Bezeichnung : ARYLSULFID- UND ARYLSULFOXID-DERIVATE ALS AKARIZIDE UND INSEKTIZIDE



(57) Abstract: The invention relates to aryl sulfoxide derivatives, use thereof as acaricides and insecticides for controlling animal
pests, and methods and intermediate products for the production thereof. The aryl sulfide derivatives and aryl sulfoxide derivatives
have the general structure (I) in which the respective groups have the meanings as cited in the description.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft Arylsulfoxid-Derivate, deren Verwendung als Akarizide und Insektizide
zur Bekämpfung tierischer Schädlinge und Verfahren und Zwischenprodukte zu ihrer Herstellung. Die Arylsulfid- und Arylsulfoxid-
Derivate weisen die allgemeine Struktur (I) auf in welcher die jeweiligen Reste die in der Beschreibung angegebenen Bedeutungen
haben.

WO 2014/202505 A1



Veröffentlicht:

- *mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)*

Arylsulfid- und Arylsulfoxid-Derivate als Akarizide und Insektizide


Die vorliegende Erfindung betrifft Arylsulfid-, Arylsulfoxid- und Arylsulfon-Derivate, deren Verwendung als Akarizide und Insektizide zur Bekämpfung tierischer Schädlinge und Verfahren und Zwischenprodukte zu ihrer Herstellung.

- 5 Verschiedene Arylsulfide und Arylsulfoxide sowie deren insektizide und akarizide Wirkung sind bereits aus WO 2007/131680 A, WO 2010/100189 A und JP 2011/42611 bekannt.

Die gemäß den oben genannten Schriften bereits bekannten Wirkstoffe weisen bei ihrer Anwendung Nachteile auf, beispielsweise dahingehend, dass sie gegebenenfalls keine oder aber eine nur unzureichende insektizide und/oder akarizide Wirkung gegen tierische Schädlinge, insbesondere bei niedrigeren Aufwandmengen, besitzen.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, Arylsulfid-, Arylsulfoxid- und Arylsulfon-Derivate bereitzustellen, welche als Insektizide und/oder Akarizide mit einer zufriedenstellenden insektiziden und/oder akariziden Wirkung gegen tierische Schädlinge, insbesondere bei niedrigeren Aufwandmengen, mit einer hohen Selektivität und verbesserten Verträglichkeit in Nutzpflanzenkulturen eingesetzt werden können.

Es wurden nun neue Verbindungen der Formel (I)



gefunden,

in welcher

- 20 A und B gemeinsam mit den Atomen, an die sie gebunden sind, für einen gegebenenfalls substituierten gesättigten Fünfring, der gegebenenfalls durch eine weitere Carbonylgruppe, Thiocarbonylgruppe, eine gegebenenfalls substituierte Iminogruppe und/oder durch ein oder mehrere Heteroatome unterbrochen sein kann, stehen;

- 2 -

W für Wasserstoff oder Halogen steht;

V für Sauerstoff; Schwefel, einen gegebenenfalls substituierten Stickstoff oder Salze eines gegebenenfalls substituierten Stickstoffs steht;

X, Y und Z, jeweils unabhängig voneinander,

5 für Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Amino, Cyano, Nitro, OCN, SCN, SF₅, stehen; oder

für Trialkylsilyl, Alkyl, Halogenalkyl, Cyanoalkyl, Hydroxyalkyl, Alkoxyalkylalkyl, Alkoxyalkyl, Alkenyl, Halogenalkenyl, Cyanoalkenyl, Alkyl, Halogenalkyl, Cyanoalkyl, Alkoxy, Halogenalkoxy, Cyanoalkoxy, Hydroxycarbonylalkoxy, Alkoxyalkoxy, Alkylhydroxyimino, Alkoxyimino, Alkylalkoxyimino, Halogenalkylalkoxyimino, Alkylthio, Halogenalkylthio, Alkoxyalkylthio, Alkylthioalkyl, Alkylsulfinyl, Halogenalkylsulfinyl, Alkoxyalkylsulfinyl, Alkylsulfinylalkyl, Alkylsulfonyl, Halogenalkylsulfonyl, Alkoxyalkylsulfonyl, Alkylsulfonylalkyl, Alkylsulfonyloxy, Alkylcarbonyl, Halogenalkylcarbonyl, Carboxyl, Alkylcarbonyloxy, Alkoxyalkoxy, Halogenalkoxy, Aminocarbonyl, Alkylaminocarbonyl, Dialkylaminocarbonyl, Alkenylaminocarbonyl, Dialkenylaminocarbonyl, Cycloalkylaminocarbonyl, Alkylsulfonylamino, Aminosulfonyl, Alkylaminosulfonyl, Dialkylaminosulfonyl, Alkylsulfoximino, Aminothiocarbonyl, Alkylaminothiocarbonyl oder Dialkylaminothiocarbonyl stehen, wobei alle vorgenannten Reste gegebenenfalls substituiert sein können; oder

20 für Phenylalkyl, Phenoxy, Phenylalkyloxy, Phenoxyalkyl, Phenylthio, Phenylthioalkyl, Phenylsulfinyl, Phenylsulfonyl, Hetarylalkyl, Hetaryloxy, Hetarylalkyloxy, Hetarylthio, Hetarylsulfinyl oder Hetarylsulfonyl stehen, wobei alle vorgenannten Reste gegebenenfalls substituiert sein können; oder

25 für Cycloalkylalkyl, Cycloalkyloxy, Cycloalkylalkoxy, Cycloalkylthio, Cycloalkylalkylthio, Cycloalkylsulfinyl, Cycloalkylalkylsulfinyl, Cycloalkylsulfonyl, Cycloalkylalkylsulfonyl oder Cycloalkenyl stehen, wobei alle vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können; oder

für NR'R'' stehen,

wobei R' und R'' unabhängig voneinander

- 3 -

für Wasserstoff, Cyano, Alkyl, Halogenalkyl, Cyanoalkyl, Hydroxyalkyl, Alkoxyalkyl, Alkylthioalkyl, Alkenyl, Halogenalkenyl, Cyanoalkenyl, Alkinyl, Halogenalkinyl, Cyanoalkinyl, Acyl oder Alkoxycarbonyl stehen; oder

5 R' und R'' gemeinsam mit dem N-Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls substituierten und gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome, welche unabhängig ausgewählt werden aus der Gruppe, bestehend aus O, S und N, unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten fünf- bis achtgliedrigen Ring bilden können; oder

10 für einen 3- bis 6-gliedrigen gesättigten, teilgesättigten oder aromatischen Ring, der gegebenenfalls ein bis drei Heteroatome, welche unabhängig ausgewählt werden aus der Gruppe, bestehend aus O, S und N, enthalten kann und der gegebenenfalls substituiert sein kann stehen;

15 oder X und Z, oder Y und Z, mit den C-Atomen, an die sie gebunden sind, einen 5 oder 6-gliedrigen Ring ausbilden, der gegebenenfalls substituiert ist und gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome, welche unabhängig ausgewählt werden, aus der Gruppe, bestehend aus O, S, N und CO, unterbrochen ist; und

n für die Zahl 0, 1 oder 2 steht.

20 Die Verbindungen der Formel (I) können gegebenenfalls in verschiedenen polymorphen Formen oder als Mischung verschiedener polymorpher Formen vorliegen. Sowohl die reinen Polymorphe als auch die Polymorphgemische sind Gegenstand der Erfindung und können erfindungsgemäß verwendet werden.





Die Verbindungen der Formel (I) umfassen gegebenenfalls Diastereomere oder Enantiomere.

Die erfindungsgemäßen Verbindungen sind durch die Formel (I) allgemein definiert.

In einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung weisen die Verbindungen eine Struktur der allgemeinen Formel (I) auf, in welcher

25 A und B gemeinsam mit den Atomen, an die sie gebunden sind, für eine Substruktur stehen, die ausgewählt ist aus der Gruppe, bestehend aus

- 4 -



wobei

V^1 , V^2 und V^3 , jeweils unabhängig voneinander,

5 für Sauerstoff; Schwefel, einen gegebenenfalls substituierten Stickstoff oder Salze eines gegebenenfalls substituierten Stickstoffs stehen;

Q^1 und Q^2 , jeweils unabhängig voneinander,

für Sauerstoff, Schwefel oder einen gegebenenfalls substituierten Stickstoff stehen; oder

10 für ein gegebenenfalls substituiertes Kohlenstoffatom stehen; mit der Maßgabe, dass Q_1 keinen Alkylcarbonylaminoest darstellt;

R^4 , R^5 , R^6 , und R^7 , jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff, Cyano, Halogen oder Nitro stehen; oder

15 für Alkyl, Cycloalkylalkyl, Halogenalkyl, Cyanoalkyl, Hydroxyalkyl, Alkoxyalkyl, Aminoalkyl, Alkoxyacetylalkyl, Alkylthioalkyl, Halogenalkylthioalkyl, Alkoxyalkylthioalkyl, Alkylsulfanylalkyl, Alkylsulfinylalkyl, Alkylsulfonylalkyl, Halogenalkylsulfanylalkyl, Halogenalkylsulfinylalkyl, Halogenalkylsulfonylalkyl, Alkoxyalkylsulfanylalkyl, Alkoxyalkylsulfinylalkyl, Alkoxyalkylsulfonylalkyl, Phenylalkyl, Phenoxyalkyl, Phenylsulfanylalkyl, Phenylsulfinylalkyl, Phenylsulfonylalkyl, Hetarylalkyl, Hetaryloxyalkyl oder Hetarylthioalkyl stehen, wobei die vorgenannten Reste
20 jeweils gesättigt oder ungesättigt und/oder gegebenenfalls substituiert sein können; oder

für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes Cycloalkyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome unterbrochen sein kann, stehen; oder

- 5 -

für Alkylcarbonyl, Halogenalkylcarbonyl, Hydroxyalkylcarbonyl, Alkoxyalkylcarbonyl, Phenylcarbonyl, Hetarylcarbonyl, Alkoxycarbonyl, Halogenalkoxycarbonyl, Aryloxycarbonyl, Aminocarbonyl, Alkylaminocarbonyl, Dialkylaminocarbonyl, Cycloalkylaminocarbonyl, Dicycloalkylaminocarbonyl, Cycloalkyl(alkyl)aminocarbonyl, Arylaminocarbonyl, Diarylaminocarbonyl, Alkyl(aryl)aminocarbonyl, Cycloalkyl(aryl)aminocarbonyl, Alkylaminothiocarbonyl, Dialkylaminothiocarbonyl oder Aminothiocarbonyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gesättigt oder ungesättigt und/oder gegebenenfalls substituiert sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl stehen; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl stehen;

für Alkoxy, Halogenalkoxy, Alkoxyalkoxy, Aryloxy, Arylalkyloxy, Cycloalkyloxy, Cycloalkylalkyloxy oder Carbonyloxy stehen, wobei die vorgenannten Reste gesättigt oder ungesättigt und/oder gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Hydroxy stehen; oder

für Alkylamino, Dialkylamino, Halogenalkylamino, Dihalogendialkylamino, Cycloalkylamino, Dicycloalkylamino, Cycloalkyl(alkyl)amino, Arylamino, Diarylamino, Hetarylamino, Dihetarylamino, Alkyl(aryl)amino, Cycloalkyl(aryl)amino, Alkylcarbonylamino, Arylcarbonylamino, Alkoxycarbonylamino, Aryloxycarbonylamino, Alkylcarbamoylelamino, Arylcarbamoylelamino, Alkylsulfonylamino, oder Arylsulfonylamino stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gesättigt oder ungesättigt und/oder gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Amino stehen; oder

für Alkylsulfanyl, Alkylsulfinyl, Alkylsulfonyl, Halogenalkylsulfanyl, Halogenalkylsulfinyl, Halogenalkylsulfonyl, Cycloalkylsulfanyl, Cycloalkylsulfinyl, Cycloalkylsulfonyl, Cycloalkylalkylsulfanyl, Cycloalkylalkylsulfinyl, Cycloalkylalkylsulfonyl, Arylsulfanyl, Arylsulfinyl, Arylsulfonyl, Arylalkylsulfanyl, Arylalkylsulfinyl, Arylalkylsulfonyl, Aminosulfonyl, Alkylaminosulfonyl, Dialkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gesättigt oder ungesättigt und/oder gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Sulfanyl stehen; oder

R⁴ und R⁵ gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls substituierten und gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome, welche unabhängig ausgewählt werden, aus der Gruppe, bestehend aus O, S und N, unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis achtgliedrigen Ring bilden können; oder

- 6 -

R^6 und R^7 gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls substituierten und gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome, welche unabhängig ausgewählt werden, aus der Gruppe, bestehend aus O, S und N, unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis achtgliedrigen Ring bilden können;

5 W für Wasserstoff oder Halogen steht;

X, Y und Z jeweils und abhängig voneinander die zuvor genannten Bedeutungen haben; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

In dieser bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung weisen die Verbindungen eine Struktur der allgemeinen Formel (I) auf, in welcher

10 A und B gemeinsam mit den Atomen, an die sie gebunden sind, für eine Substruktur stehen, die ausgewählt ist aus der Gruppe, bestehend aus (I-A) bis (I-D),

wobei

V^1 , V^2 und V^3 , jeweils unabhängig voneinander,

für Sauerstoff; Schwefel, NR^{11} oder ein Salz von NR^{11} stehen;

15 Q^1 für Sauerstoff, Schwefel, NR^1 oder CR^2R steht;

Q^2 NR^{10} oder CR^8R^9 steht;

R^1 für Wasserstoff, Cyano oder Nitro stehen; oder

20 für Alkyl, Cycloalkylalkyl, Halogenalkyl, Cyanoalkyl, Hydroxyalkyl, Alkoxyalkyl, Aminoalkyl, Alkoxycarbonylalkyl, Alkylsulfanylalkyl, Alkylsulfinylalkyl, Alkylsulfonylalkyl, Halogenalkylsulfanylalkyl, Halogenalkylsulfinylalkyl, Halogenalkylsulfonylalkyl, Alkoxyalkylsulfanylalkyl, Alkoxyalkylsulfinylalkyl, Alkoxyalkylsulfonylalkyl, Phenylalkyl, Phenoxyalkyl, Phenylsulfanylalkyl, Phenylsulfinylalkyl, Phenylsulfonylalkyl, Hetarylalkyl, Hetaryloxyalkyl, Hetarylthioalkyl, , Alkoxycarbonyl, Aryloxycarbonyl, Arylcarbamoyl steht, wobei die vorgenannten Reste
25 jeweils gesättigt oder ungesättigt und/oder gegebenenfalls substituiert sein können; oder

für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes Cycloalkyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome unterbrochen sein kann, steht; oder

- 7 -

für Halogenalkylcarbonyl, Hydroxyalkylcarbonyl, Alkoxyalkylcarbonyl, Phenylcarbonyl, Hetarylcarbonyl, Halogenalkoxycarbonyl, Aminocarbonyl, Alkylaminocarbonyl, Dialkylaminocarbonyl, Cycloalkylaminocarbonyl, Dicycloalkylaminocarbonyl, Cycloalkyl(alkyl)aminocarbonyl, Arylaminocarbonyl, Diarylaminocarbonyl, Alkyl(aryl)aminocarbonyl, Cycloalkyl(aryl)aminocarbonyl, Alkylaminothiocarbonyl, Dialkylaminothiocarbonyl oder Aminothiocarbonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gesättigt oder ungesättigt und/oder gegebenenfalls substituiert sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl steht; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl steht; oder

für Alkoxy, Halogenalkoxy, Cycloalkyloxy, Aryloxy, Arylalkyloxy oder Carbonyloxy steht, wobei die vorgenannten Reste gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Hydroxy steht; oder

für Alkylamino, Halogenalkylamino, Dihalogenalkylamino, Dialkylamino, Cycloalkylamino, Dicycloalkylamino, Cycloalkyl(alkyl)amino, Arylamino, Diarylamino, Hetarylamino, Dihetarylamino, Alkyl(aryl)amino, Cycloalkyl(aryl)amino, Alkylcarbonylamino, Arylcarbonylamino, Alkoxycarbonylamino, Aryloxycarbonylamino, Alkylcarbamoylelamino, Arylcarbamoylelamino, Alkylsulfonylamino, oder Arylsulfonylamino steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gesättigt oder ungesättigt und/oder gegebenenfalls substituiert sein können, oder Amino steht; oder

für Alkylsulfanyl, Alkylsulfinyl, Alkylsulfonyl, Halogenalkylsulfanyl, Halogenalkylsulfinyl, Halogenalkylsulfanyl, Cycloalkylsulfanyl, Cycloalkylsulfinyl, Cycloalkylsulfonyl, Cycloalkylalkylsulfanyl, Cycloalkylalkylsulfinyl, Cycloalkylalkylsulfonyl, Arylsulfanyl, Arylsulfinyl, Arylsulfonyl, Arylalkylsulfanyl, Arylalkylsulfinyl, Arylalkylsulfonyl, Aminosulfonyl, Alkylaminosulfonyl, Dialkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gesättigt oder ungesättigt und/oder gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Sulfanyl steht; und

R¹⁰ und R¹¹, jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff, Cyano oder Nitro stehen; oder

- 8 -

für Alkyl, Cycloalkylalkyl, Halogenalkyl, Cyanoalkyl, Hydroxyalkyl, Alkoxyalkyl, Aminoalkyl, Alkoxycarbonylalkyl, Alkylsulfanylalkyl, Alkylsulfinylalkyl, Alkylsulfonylalkyl, Halogenalkylsulfanylalkyl, Halogenalkylsulfinylalkyl, Halogenalkylsulfonylalkyl, Alkoxyalkylsulfanylalkyl, Alkoxyalkylsulfinylalkyl, Alkoxyalkylsulfonylalkyl, Phenylalkyl, Phenoxyalkyl, Phenylsulfanylalkyl, Phenylsulfinylalkyl, Phenylsulfonylalkyl, Hetarylalkyl, Hetaryloxyalkyl, Hetarylthioalkyl, Alkoxycarbonyl, Aryloxycarbonyl, Arylcarbamoyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gesättigt oder ungesättigt und/oder gegebenenfalls substituiert sein können; oder

für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes Cycloalkyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome unterbrochen sein kann, steht; oder

für Alkylcarbonyl, Halogenalkylcarbonyl, Hydroxyalkylcarbonyl, Alkoxyalkylcarbonyl, Phenylcarbonyl, Hetarylcarbonyl, Halogenalkoxycarbonyl, Aminocarbonyl, Alkylaminocarbonyl, Dialkylaminocarbonyl, Cycloalkylaminocarbonyl, Dicycloalkylaminocarbonyl, Cycloalkyl(alkyl)aminocarbonyl, Arylaminocarbonyl, Diarylaminocarbonyl, Alkyl(aryl)aminocarbonyl, Cycloalkyl(aryl)aminocarbonyl, Alkylaminothiocarbonyl, Dialkylaminothiocarbonyl oder Aminothiocarbonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gesättigt oder ungesättigt und/oder gegebenenfalls substituiert sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl steht; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl steht; oder

für Alkoxy, Halogenalkoxy, Cycloalkyloxy, Aryloxy, Arylalkyloxy oder Carbonyloxy steht, wobei die vorgenannten Reste gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Hydroxy steht; oder

für Alkylamino, Halogenalkylamino, Dihalogenalkylamino, Dialkylamino, Cycloalkylamino, Dicycloalkylamino, Cycloalkyl(alkyl)amino, Arylamino, Diarylamino, Hetarylamino, Dihetarylamino, Alkyl(aryl)amino, Cycloalkyl(aryl)amino, Alkylcarbonylamino, Arylcarbonylamino, Alkoxycarbonylamino, Aryloxycarbonylamino, Alkylcarbamoylamino, Arylcarbamoylamino, Alkylsulfonylamino, oder Arylsulfonylamino steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gesättigt oder ungesättigt und/oder gegebenenfalls substituiert sein können, oder Amino steht; oder

für Alkylsulfanyl, Alkylsulfinyl, Alkylsulfonyl, Halogenalkylsulfanyl, Halogenalkylsulfinyl, Halogenalkylsulfonyl, Cycloalkylsulfanyl, Cycloalkylsulfinyl, Cycloalkylsulfonyl, Cycloalkylalkylsulfanyl, Cycloalkylalkylsulfinyl, Cycloalkylalkylsulfonyl, Arylsulfanyl, Arylsulfinyl, Arylsulfonyl, Arylalkylsulfanyl, Arylalkylsulfinyl, Arylalkylsulfonyl, Aminosulfonyl, Alkylaminosulfonyl, Dialkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gesättigt oder ungesättigt und/oder gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Sulfanyl steht; und

$R^2, R^3, R^4, R^5, R^6, R^7, R^8$ und R^9 , jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff, Cyano, Halogen oder Nitro stehen; oder

für Alkyl, Cycloalkylalkyl, Halogenalkyl, Cyanoalkyl, Hydroxyalkyl, Alkoxyalkyl, Aminoalkyl, Alkoxy-carbonylalkyl, Alkylthioalkyl, Halogenalkylthioalkyl, Alkoxyalkylthioalkyl, Alkylsulfanylalkyl, Alkylsulfinylalkyl, Alkylsulfonylalkyl, Halogenalkylsulfanylalkyl, Halogenalkylsulfinylalkyl, Halogenalkylsulfonylalkyl, Alkoxyalkylsulfanylalkyl, Alkoxyalkylsulfinylalkyl, Alkoxyalkylsulfonylalkyl, Phenylalkyl, Phenoxyalkyl, Phenylsulfanylalkyl, Phenylsulfinylalkyl, Phenylsulfonylalkyl, Hetarylalkyl, Hetaryloxyalkyl oder Hetarylthioalkyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gesättigt oder ungesättigt und/oder gegebenenfalls substituiert sein können; oder

für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes Cycloalkyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome unterbrochen sein kann, stehen; oder

für Alkylcarbonyl, Halogenalkylcarbonyl, Hydroxyalkylcarbonyl, Alkoxyalkylcarbonyl, Phenylcarbonyl, Hetarylcarbonyl, Alkoxy-carbonyl, Halogenalkoxy-carbonyl, Aryloxy-carbonyl, Aminocarbonyl, Alkylaminocarbonyl, Dialkylaminocarbonyl, Cycloalkylaminocarbonyl, Dicycloalkylaminocarbonyl, Cycloalkyl(alkyl)aminocarbonyl, Arylaminocarbonyl, Diarylaminocarbonyl, Alkyl(aryl)aminocarbonyl, Cycloalkyl(aryl)aminocarbonyl, Alkylaminothiocarbonyl, Dialkylaminothiocarbonyl oder Aminothiocarbonyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gesättigt oder ungesättigt und/oder gegebenenfalls substituiert sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl stehen; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl stehen;

für Alkoxy, Halogenalkoxy, Alkoxyalkoxy, Aryloxy, Arylalkyloxy, Cycloalkyloxy, Cycloalkylalkyloxy oder Carbonyloxy stehen, wobei die vorgenannten Reste gesättigt oder ungesättigt und/oder gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Hydroxy stehen; oder

für Alkylamino, Dialkylamino, Halogenalkylamino, Dihalogendialkylamino, Cycloalkylamino, Dicycloalkylamino, Cycloalkyl(alkyl)amino, Arylamino, Diarylamino, Hetarylamino, Dihetarylamino, Alkyl(aryl)amino, Cycloalkyl(aryl)amino, Alkylcarbonylamino, Arylcarbonylamino, Alkoxycarbonylamino, Aryloxycarbonylamino, Alkylcarbamoylamino, Arylcarbamoylamino, Alkylsulfonylamino, oder Arylsulfonylamino stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gesättigt oder ungesättigt und/oder gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Amino stehen; oder

für Alkylsulfanyl, Alkylsulfinyl, Alkylsulfonyl, Halogenalkylsulfanyl, Halogenalkylsulfinyl, Halogenalkylsulfonyl, Cycloalkylsulfanyl, Cycloalkylsulfinyl, Cycloalkylsulfonyl, Cycloalkylalkylsulfanyl, Cycloalkylalkylsulfinyl, Cycloalkylalkylsulfonyl, Arylsulfanyl, Arylsulfinyl, Arylsulfonyl, Arylalkylsulfanyl, Arylalkylsulfinyl, Arylalkylsulfonyl, Aminosulfonyl, Alkylaminosulfonyl, Dialkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gesättigt oder ungesättigt und/oder gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Sulfanyl stehen; oder

R^2 und R^3 gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls substituierten und gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome, welche unabhängig ausgewählt werden, aus der Gruppe, bestehend aus O, S und N, unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis achtegliedrigen Ring bilden können; oder

R^4 und R^5 gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls substituierten und gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome, welche unabhängig ausgewählt werden, aus der Gruppe, bestehend aus O, S und N, unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis achtegliedrigen Ring bilden können; oder

R^6 und R^7 gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls substituierten und gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome, welche unabhängig ausgewählt werden, aus der Gruppe, bestehend aus O, S und N, unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis achtegliedrigen Ring bilden können; oder

- 11 -

R^8 und R^9 gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls substituierten und gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome, welche unabhängig ausgewählt werden, aus der Gruppe, bestehend aus O, S und N, unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis achtegliedrigen Ring bilden können;

5 W für Wasserstoff oder Halogen steht;

X, Y und Z jeweils und abhängig voneinander die zuvor genannten Bedeutungen haben; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

Erfindungsgemäße Verbindungen, welche in tautomeren Formen vorliegen können, sind allesamt von der vorliegenden Erfindung umfasst.

10 In einer besonders bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung weisen die Verbindungen eine Struktur der allgemeinen Formel (I) auf, in welcher

A und B gemeinsam mit den Atomen, an die sie gebunden sind, für eine Substruktur stehen, die ausgewählt ist aus der Gruppe, bestehend aus (I-A) bis (I-D),

wobei

15 V^1 , V^2 und V^3 , jeweils unabhängig voneinander,

für Sauerstoff; Schwefel, NR^{11} oder ein Salz von NR^{11} stehen;

Q^1 für Sauerstoff, Schwefel, NR^1 oder CR^2R^3 steht;

Q^2 NR^{10} oder CR^8R^9 steht;

R^1 für Wasserstoff, Cyano oder Nitro steht; oder

20 für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₂-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, Amino(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Phenoxy(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl,

25

- 12 -

Phenylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryloxy(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl, Aryloxycarbonyl, Arylcarbamoyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können; oder

für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes (C₃-C₆)Cycloalkyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome unterbrochen sein kann, steht; oder

für Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Phenylcarbonyl, Hetarylcarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, Di(C₃-C₆)cycloalkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)aminocarbonyl, Arylaminocarbonyl, Diarylaminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl oder Aminothiocarbonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl steht; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl steht; oder

für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, Aryloxy, Aryl(C₁-C₆)alkyloxy oder Carbonyloxy steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Hydroxy steht; oder

für (C₁-C₆)Alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)amino, Arylamino, Diarylamino, Hetarylamino, Dihetarylamino, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)amino, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)amino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, Arylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkoxycarbonylamino, Aryloxycarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbamoylamino, Arylcarbamoylamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, oder Arylsulfonylamino steht, wobei die vorgenannten Reste

- 13 -

jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können, oder Amino steht; oder

5 für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Arylsulfanyl, Arylsulfinyl, Arylsulfonyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl steht, wobei
10 die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Sulfanyl steht; und

15 R¹⁰ und R¹¹, jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff, Cyano oder Nitro steht; oder

für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₂-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, Amino(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy-carbonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Phenoxy(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryloxy(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy-carbonyl, Aryloxy-carbonyl, (C₁-C₆)Alkyl-carbonyl, Aryl-carbamoyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils
20
25
30 gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können; oder

- 14 -

für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes (C₃-C₆)Cycloalkyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome unterbrochen sein kann, steht; oder

Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Phenylcarbonyl, Hetarylcarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxycarbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, Di(C₃-C₆)cycloalkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)aminocarbonyl, Arylaminocarbonyl, Diarylaminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl oder Aminothiocarbonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl steht; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl steht; oder

für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, Aryloxy, Aryl(C₁-C₆)alkyloxy oder Carbonyloxy steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Hydroxy steht; oder

für (C₁-C₆)Alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)amino, Arylamino, Diarylamino, Hetarylamino, Dihetarylamino, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)amino, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)amino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, Arylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkoxycarbonylamino, Aryloxycarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, Arylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonlamino, oder Arylsulfonlamino steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können, oder Amino steht; oder

für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-

- 15 -

C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Arylsulfanyl, Arylsulfinyl, Arylsulfonyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der

5 Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Sulfanyl steht; und

R², R³, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷, R⁸ und R⁹, jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff, Cyano, Halogen oder Nitro stehen; oder

10 für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, Amino(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylthio(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylthio(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylthioalkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Phenoxy(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryloxy(C₁-C₆)alkyl oder Hetarylthio(C₁-C₆)alkyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gesättigt oder ungesättigt und/oder gegebenenfalls substituiert sein können; oder

für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes (C₃-C₆)Cycloalkyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome unterbrochen sein kann, stehen; oder

25 für (C₁-C₆)Alkylcarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Phenylcarbonyl, Hetarylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxycarbonyl, Aryloxycarbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, Di(C₃-C₆)cycloalkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)aminocarbonyl, Arylamino-carbonyl, Diarylamino-carbonyl, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl oder Aminothiocarbonyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können

30

und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl stehen; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl stehen;

5 für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkoxy, Aryloxy, Aryl(C₁-C₆)alkyloxy, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyloxy oder Carbonyloxy stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein
10 können oder für Hydroxy stehen; oder

für (C₁-C₆)Alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)amino, Arylamino, Diarylamino, Hetarylamino, Dihetarylamino, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)amino, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)amino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, Arylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkoxy carbonylamino, Aryloxy carbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbamoylamino, Arylcarbamoylamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, oder Arylsulfonylamino stehen, wobei die vorgenannten Reste
15 jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Amino stehen; oder
20

für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Arylsulfanyl, Arylsulfinyl, Arylsulfonyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder
25 unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Sulfanyl stehen; oder
30

- 17 -

- 5 R^2 und R^3 gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes (C_3 - C_6)Cycloalkyl, substituierten und gegebenenfalls durch Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis sechsgliedrigen Ring bilden können; oder
- 10 R^4 und R^5 gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes (C_3 - C_6)Cycloalkyl, substituierten und gegebenenfalls durch Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis sechsgliedrigen Ring bilden können; oder
- 15 R^6 und R^7 gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind-einen gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes (C_3 - C_6)Cycloalkyl, substituierten und gegebenenfalls durch Heteroatome aus
- 20 der Reihe O, S oder N unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis sechsgliedrigen Ring bilden können; oder
- 25 R^8 und R^9 gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes (C_3 - C_6)Cycloalkyl, substituierten und gegebenenfalls durch Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis sechsgliedrigen Ring bilden können;
- W für Wasserstoff oder Halogen steht;
- 30 X, Y und Z jeweils und abhängig voneinander die zuvor genannten Bedeutungen haben; und
- n für die Zahl 0 oder 1 steht.

In dieser bevorzugten Ausführungsform ist es besonders bevorzugt, dass

X, Y und Z, jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Amino, Cyano, Nitro, OCN, SCN, SF₅, stehen; oder

für Tri(C₁-C₆)alkylsilyl, (C₁-C₆)Alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl,
 5 Hydroxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy-carbonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl,
 (C₂-C₆)Alkenyl, Halogen(C₂-C₆)alkenyl, Cyano(C₂-C₆)alkenyl, (C₂-C₆)Alkynyl,
 Halogen(C₂-C₆)alkynyl, Cyano(C₂-C₆)alkynyl, (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy,
 Cyano(C₁-C₆)alkoxy, Hydroxycarbonyl(C₁-C₆)alkoxy, (C₁-C₆)Alkoxy-carbonyl(C₁-
 10 C₆)alkoxy, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkoxy, (C₁-C₆)Alkylhydroxyimino, (C₁-C₆)Alkoxyimino,
 (C₁-C₆)Alkyl(C₁-C₆)alkoxyimino, Halogen(C₁-C₆)alkyl(C₁-C₆)alkoxyimino, (C₁-
 C₆)Alkylthio, Halogen(C₁-C₆)alkylthio, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylthio, (C₁-
 C₆)Alkylthio(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₁-
 C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl,
 Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₁-
 15 C₆)Alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyloxy, (C₁-C₆)Alkylcarbonyl,
 Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Carboxyl, (C₁-C₆)Alkylcarbonyloxy, (C₁-
 C₆)Alkoxy-carbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxy-carbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-
 C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₂-C₆)Alkenylaminocarbonyl,
 Di(C₂-C₆)alkenylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, (C₁-
 20 C₆)Alkylsulfonylamino, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-
 C₆)alkylaminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylsulfoximino, Aminothiocarbonyl, (C₁-
 C₆)Alkylaminothiocarbonyl oder Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl stehen, wobei alle
 vorgenannten Reste gegebenenfalls durch Halogen substituiert sein können; oder

für Phenyl(C₁-C₃)alkyl, Phenoxy, Phenyl(C₁-C₃)alkyloxy, Phenoxy(C₁-C₃)alkyl, Phenylthio,
 25 Phenylthio(C₁-C₃)alkyl, Phenylsulfinyl, Phenylsulfonyl, Hetaryl(C₁-C₃)alkyl, Hetaryloxy,
 Hetaryl(C₁-C₃)alkyloxy, Hetarylthio, Hetarylsulfinyl oder Hetarylsulfonyl stehen, wobei
 alle vorgenannten Reste gegebenenfalls einfach bis dreifach durch Halogen, Cyano, Nitro,
 Amino, Hydroxy, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl,
 Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls
 30 durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes Cyclopropyl substituiert sein können; oder

für (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₃)alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₃)alkoxy,
 (C₃-C₆)Cycloalkylthio, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₃)alkylthio, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfinyl, (C₃-

- 19 -

C₆)Cycloalkyl(C₁-C₃)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₃)alkylsulfonyl oder (C₃-C₆)Cycloalkenyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls einfach bis dreifach durch Halogen, Cyano, Nitro, Amino, Hydroxy, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes Cyclopropyl substituiert sein können; oder

für NR'R'' stehen,

wobei R' und R'' unabhängig voneinander

für Wasserstoff, Cyano, (C₁-C₆)Alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylthio(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)Alkenyl, Halogen(C₂-C₆)alkenyl, Cyano(C₂-C₆)alkenyl, (C₂-C₆)Alkinyl, Halogen(C₂-C₆)alkinyl, Cyano(C₂-C₆)alkinyl, Acyl oder (C₁-C₆)Alkoxy-carbonyl stehen; oder


R' und R'' gemeinsam mit dem N-Atom, an dem sie gebunden sind, einen gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes Cyclopropyl, substituierten und gegebenenfalls durch Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten fünf- bis siebengliedrigen Ring bilden können; oder

für einen (C₃-C₆)Cycloalkyl, Oxetan, Oxolan, Oxan, (C₃-C₆)Cycloalkenyl, Phenyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Pyridazinyl, Pyrazinyl, Triazinyl, Thiazolyl, Thiadiazolyl, Oxazolyl, Oxadiazolyl, Pyrazolyl oder Triazolyl, der gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden mit einem Substituenten S1 substituiert sein kann, welcher ausgewählt wird aus der Gruppe, bestehend aus Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes Cyclopropyl, stehen;


oder X und Z, oder Y und Z, können die folgenden 5 oder 6-gliedrigen Ring ausbilden, die gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Wasserstoff, Halogen, Cyano, Nitro,

- 20 -

Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes Cyclopropyl, substituiert sind,



- 5 oder X und Z, oder Y und Z, können die folgenden anellierten Ringe ausbilden, die gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden substituiert sind, wobei die Substituenten unabhängig voneinander ausgewählt sein können aus Wasserstoff, Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder
- 10 gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes Cyclopropyl,




Weitere bevorzugte isolierte Ausführungsformen werden im Folgenden näher beschreiben:

Erste Ausführungsform (I-A):

In einer ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung weisen die erfindungsgemäßen Verbindungen eine Struktur der allgemeinen Formel (I) auf, in welcher

5 A und B gemeinsam mit den Atomen, an die sie gebunden sind, für eine Substruktur der Formel (I-A) stehen



wobei

V¹ für Sauerstoff; Schwefel, NR₁₁ oder ein Salz von NR¹¹ steht;

Q¹ für Sauerstoff, Schwefel, NR¹ oder CR²R³ steht;

10 R¹ für Wasserstoff, Cyano oder Nitro steht; oder

für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₂-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, Amino(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy-carbonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Phenoxy(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryloxy(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy-carbonyl, Aryloxy-carbonyl, Aryl-carbamoyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte

- 22 -

Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können; oder

für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes (C₃-C₆)Cycloalkyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome unterbrochen sein kann, steht; oder

5 für Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Phenylcarbonyl, Hetarylcarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxycarbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, Di(C₃-C₆)cycloalkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)aminocarbonyl, Arylaminocarbonyl, Diarylaminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl oder Aminothiocarbonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl steht; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl steht; oder

20 für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, Aryloxy, Aryl(C₁-C₆)alkyloxy oder Carbonyloxy steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Hydroxy steht; oder

25 für (C₁-C₆)Alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)amino, Arylamino, Diarylamino, Hetarylamino, Dihetarylamino, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)amino, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)amino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, Arylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkoxycarbonylamino, Aryloxycarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbamoylelamino, Arylcarbamoylelamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, oder Arylsulfonylamino steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können, oder Amino steht; oder

5 für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Arylsulfanyl, Arylsulfinyl, Arylsulfonyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Sulfanyl steht; und

R¹¹ für Wasserstoff, Cyano oder Nitro steht; oder

15 für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₂-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, Amino(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Phenoxy(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryloxy(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl, Aryloxycarbonyl, (C₁-C₆)Alkylcarbonyl, Arylcarbonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils

20 gegebenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können; oder

für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes (C₃-C₆)Cycloalkyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome unterbrochen sein kann, steht; oder

30 für Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Phenylcarbonyl, Hetarylcarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxycarbonyl, Aryloxycarbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, Di(C₃-

- 24 -

- (C₆)cycloalkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)aminocarbonyl, Arylaminocarbonyl, Diarylaminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl oder Aminothiocarbonyl steht, wobei die vorgenannten Reste
- 5 jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl steht; oder
- für gegebenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenfalls substituiertes Hetaryl steht; oder
- 10 für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, Aryloxy, Aryl(C₁-C₆)alkyloxy oder Carbonyloxy steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Hydroxy steht; oder
- für (C₁-C₆)Alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)amino, Arylamino, Diarylamino, Hetarylamino, Dihetarylamino, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)amino, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)amino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, Arylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkoxy carbonylamino, Aryloxy carbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbamoylelamino, Arylcarbamoylelamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, oder Arylsulfonylamino steht, wobei die vorgenannten Reste
- 15 jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können, oder Amino steht; oder
- 20 für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Arylsulfanyl, Arylsulfinyl, Arylsulfonyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl steht, wobei
- 25 die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Sulfanyl steht; und
- 30

R², R³, R⁴, R⁵, R⁶ und R⁷, jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff, Cyano, Halogen oder Nitro stehen; oder

für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, Amino(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy-carbonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylthio(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylthio(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylthioalkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Phenoxy(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryloxy(C₁-C₆)alkyl oder Hetarylthio(C₁-C₆)alkyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gesättigt oder ungesättigt und/oder gegebenenfalls substituiert sein können; oder

für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes (C₃-C₆)Cycloalkyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome unterbrochen sein kann, stehen; oder

für (C₁-C₆)Alkylcarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Phenylcarbonyl, Hetarylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy-carbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxy-carbonyl, Aryloxy-carbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, Di(C₃-C₆)cycloalkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)aminocarbonyl, Arylaminocarbonyl, Diarylaminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl oder Amino-thiocarbonyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl stehen; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl stehen;

für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkoxy, Aryloxy, Aryl(C₁-C₆)alkyloxy, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyloxy oder Carbonyloxy

- 26 -

stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Hydroxy stehen; oder

5 für (C₁-C₆)Alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)amino, Arylamino, Diarylamino, Hetarylamino, Dihetarylamino, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)amino, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)amino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, Arylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkoxy carbonylamino, Aryloxy carbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbamoylamino, Arylcarbamoylamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, oder Arylsulfonylamino stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Amino stehen; oder

15 für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Arylsulfanyl, Arylsulfinyl, Arylsulfonyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Sulfanyl stehen; oder

25 R² und R³ gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, substituierten und gegebenenfalls durch Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis sechsgliedrigen Ring bilden können; oder


30

- 27 -

- 5 R⁴ und R⁵ gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituier-
tes (C₃-C₆)Cycloalkyl, substituierten und gegebenenfalls durch Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis sechsgliedrigen Ring bilden können;-oder
- 10 R⁶ und R⁷ gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind-einen gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituier-
tes (C₃-C₆)Cycloalkyl, substituierten und gegebenenfalls durch Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis sechsgliedrigen Ring bilden können; oder
- 15 W für Wasserstoff, Fluor oder Chlor steht;
- X, Y und Z unabhängig voneinander für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, Amino, Hydroxy, (C₁-C₄)Alkyl, (C₁-C₄)Halogenalkyl, (C₂-C₄)Alkenyl, (C₂-C₄)Alkynyl, (C₁-C₄)Alkoxy, (C₁-C₄)Halogenalkoxy oder Aminothiocarbonyl stehen;
- 20 oder für ein Benzyl, Phenoxy, Phenylthio, Cyclopropylmethyl, Cyclopropyloxy oder Cyclopropylthio, der gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden substituiert ist mit Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituier-
tes Cyclopropyl stehen;
- 25 oder für einen Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl oder Phenyl, der gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden substituiert ist mit Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituier-
tes Cyclopropyl stehen; und
- 30 n für die Zahl 0 oder 1 steht.

- 28 -

In einer bevorzugten Ausgestaltung dieser ersten Ausführungsform steht die Substruktur der Formel (I-A) für eine Substruktur, welche ausgewählt wird aus der Gruppe, bestehend aus



wobei

5 R^1 für Wasserstoff steht; oder

für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₂-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy-carbonyl(C₁-C₆)alkyl, Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)Alkenyl, Halogen(C₂-C₆)Alkenyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)Alkynyl, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können steht; oder

10

für gegebenenfalls substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochen sein kann, steht; oder

für Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy-carbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxy-carbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-

15

- 29 -

(C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl, (C₂-C₆)Alkenylcarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₂-C₆)Alkinylcarbonyl oder Aminothiocarbonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituirt sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl steht; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl steht; oder

für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, oder Carbonyloxy steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituirt sein können, oder für Hydroxy steht; oder

für (C₁-C₆)Alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkoxycarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, (C₂-C₆)Alkenylamino, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkylamino, (C₂-C₆)Alkinylamino steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituirt sein können oder Amino steht; oder

für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituirt sein können oder für Sulfanyl steht; und

R¹¹ für Wasserstoff steht; oder

für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₂-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl(C₁-C₆)alkyl, Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)Alkenyl, Halogen(C₂-C₆)Alkenyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)Alkinyl, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituirt sein können steht; oder

für gegebenenfalls substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochen sein kann, steht; oder

- 30 -

für (C₁-C₆)Alkylcarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxycarbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl, (C₂-C₆)Alkenylcarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₂-C₆)Alkinylcarbonyl oder Aminothiocarbonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl steht; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl steht; oder

für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, oder Carbonyloxy steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Hydroxy steht; oder

für (C₁-C₆)Alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkoxycarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbamoylamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, (C₂-C₆)Alkenylamino, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkylamino, (C₂-C₆)Alkinylamino steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder Amino steht; oder

für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylamino-sulfonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Sulfanyl steht; und

R², R³, R⁴, R⁵, R⁶ und R⁷, jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff, Cyano, Halogen oder Nitro stehen; oder

für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)Alkenyl, Halogen(C₂-C₆)Alkenyl, (C₃-

C₆Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)Alkynyl, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für gegebenenfalls substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochen sein kann, steht; oder

5 für (C₁-C₆)Alkylcarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxycarbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl, (C₂-C₆)Alkenylcarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₂-C₆)Alkynylcarbonyl oder Aminothiocarbonyl steht, wobei die
10 vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl steht; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl stehen;

15 für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkoxy, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyloxy, (C₂-C₆)Alkenyloxy, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkoxy, (C₂-C₆)Alkinyloxy oder Carbonyloxy stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Hydroxy stehen; oder

20 für (C₁-C₆)Alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, , (C₁-C₆)Alkoxycarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbamoylamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, (C₂-C₆)Alkenylamino, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkylamino, (C₂-C₆)Alkynylamino steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder Amino steht; oder

25 für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils
30 gegebenenfalls substituiert sein können oder für Sulfanyl steht; oder

- 32 -

R^2 und R^3 gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituierendes (C_3-C_6)Cycloalkyl, substituierten und gegebenenfalls durch Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis sechsgliedrigen Ring bilden können; oder

R^4 und R^5 gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituierendes (C_3-C_6)Cycloalkyl, substituierten und gegebenenfalls durch Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis sechsgliedrigen Ring bilden können; oder

R^6 und R^7 gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituierendes (C_3-C_6)Cycloalkyl, substituierten und gegebenenfalls durch Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis sechsgliedrigen Ring bilden können; oder

W für Wasserstoff oder Fluor steht;

X und Y, unabhängig voneinander, für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, (2,2)-Difluoromethyl, Difluoromethoxy, Trifluoromethoxy, Cyclopropyl, Cyano, Amino, Hydroxy oder Nitro stehen;

Z für Wasserstoff steht; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

Hierbei sind insbesondere bei den Substrukturen (I-A-5) und (I-A-6) E- und Z-Isomere der exocyclischen Doppelbindung zum Stickstoff umfasst. Ebenso sind die Salze des an der exocyclischen Doppelbindung befindlichen Stickstoffs der Substrukturen (I-A-5) und (I-A-6) umfasst. Bevorzugt handelt es sich hier um die Salze durch Addition von Halogensäuren. Ganz besonders bevorzugt handelt es sich hier um

Hydrochloride.

Dabei ist es insbesondere bevorzugt, dass

R^1 und R^{11} , jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff stehen; oder

5 (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₃)alkyl, (C₂-C₆)Alkenyl, (C₂-C₆)Alkynyl, Halogen(C₂-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl oder Phenyl(C₁-C₃)alkyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können; oder

für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes (C₃-C₆)Cycloalkyl oder gegebenenfalls substituiertes Phenyl steht;

10 R^2 , R^3 , R^4 , R^5 , R^6 und R^7 , jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff stehen;

für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₃)alkyl, (C₂-C₆)Alkenyl, (C₂-C₆)Alkynyl, Halogen(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl oder Phenyl(C₁-C₃)alkyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können; oder

15 für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes (C₃-C₆)Cycloalkyl, oder gegebenenfalls substituiertes Phenyl steht; oder

W für Wasserstoff oder Fluor steht;


X und Y, unabhängig voneinander, für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, (2,2)-Difluoromethyl, Difluoromethoxy, Trifluoromethoxy, Cyclopropyl, 20 Cyano, Amino, Hydroxy oder Nitro stehen;

Z für Wasserstoff steht; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

Bevorzugt steht die Substruktur der Formel (I-A) für eine Substruktur, welche ausgewählt wird aus der Gruppe, bestehend aus

- 34 -



wobei

R^1 und R^{11} , jeweils unabhängig voneinander,

5 für Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Cyclopropyl, Cyclopropylmethyl, CH_2CF_3 , CH_2CHF_2 , $\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CF}_3$, $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CF}_3$, $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHF}_2$ stehen; oder

R^2 , R^3 , R^4 , R^5 , R^6 und R^7 , jeweils unabhängig voneinander für Wasserstoff, Methyl, Trifluoromethyl oder Phenyl stehen;

W Wasserstoff oder Fluor steht;

X für Wasserstoff, Chlor, Fluor oder Methyl steht;

10 Y für Chlor, Brom, Cyano, Methyl, Trifluoromethyl, Fluor oder Methoxy steht;




X und Y insbesondere für folgende Kombinationen (Y,X) stehen: (Me, F), (Me,H), (Me,Cl), (Me,Me), (Cl,Cl), (Cl,F), (CN,F), (MeO,F), (MeO,H), (Cl,H), (Me,H), (Br,H), (Br,F), (CN,H), (F,F), (CF₃,H);

Z für Wasserstoff steht; und

15 n für die Zahl 0 oder 1 steht.

Die Salze des an der exocyclischen Doppelbindung befindlichen Stickstoffs der Substruktur (I-A-6) sind ebenfalls umfasst. Bevorzugt handelt es sich hier um die Salze durch Addition von Halogensäuren. Ganz besonders bevorzugt handelt es sich hier um Hydrochloride.

Ebenfalls bevorzugt steht die Substruktur der Formel (I-A) für eine Substruktur, welche ausgewählt wird aus der Gruppe, bestehend aus



wobei

- 5 R^1 und R^{11} , jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Cyclopropyl, Cyclopropylmethyl, CH_2CF_3 , CH_2CHF_2 , $\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CF}_3$, $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CF}_3$, $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHF}_2$ stehen; oder

R^2 , R^3 , R^4 , R^5 , R^6 und R^7 , jeweils unabhängig voneinander für Wasserstoff, Methyl, Trifluoromethyl oder Phenyl stehen;

- 10 W für Wasserstoff oder Fluor steht;

X für Wasserstoff, Chlor, Fluor oder Methyl steht;

Y für Chlor, Brom, Cyano, Methyl, Trifluoromethyl oder Fluor steht;

X und Y insbesondere für folgende Kombinationen (Y,X) stehen: (Me, F), (Me,H), (Me,Cl), (Me,Me), (Cl,Cl), (Cl,F), (CN,F), (Cl,H), (Br,H), (Br,F), (CN,H), (F,F), (CF_3 ,H);

- 15 Z für Wasserstoff steht; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

Handelt es sich bei der Substruktur der Formel (I-A) um die Substrukturformel (I-A-1), so ist es bevorzugt, dass

R^1 für Wasserstoff, Methyl, Ethyl, CH_2CF_3 , Cyclopropyl oder Cyclopropylmethyl steht;

- 36 -

R^4 , R^5 , R^6 und R^7 , jeweils unabhängig voneinander für Wasserstoff, Methyl, Trifluoromethyl oder Phenyl stehen;

W Wasserstoff oder Fluor steht;

X für Wasserstoff, Chlor, Fluor oder Methyl steht;

5 Y für Chlor, Brom, Cyano, Methyl, Trifluoromethyl, Fluor oder Methoxy steht;

X und Y insbesondere für folgende Kombinationen (Y,X) stehen: (Me, F), (Me,H), (Me,Cl), (Me,Me), (Cl,Cl), (Cl,F), (CN,F), (MeO,F), (MeO,H), (Cl,H), (Me,H), (Br,H), (Br,F), (CN,H), (F,F), (CF₃,H);

Z für Wasserstoff steht; und

10 n für die Zahl 0 oder 1 steht.

Hierbei ist es besonders bevorzugt, dass

R^1 für Wasserstoff steht;

R^4 , R^5 , R^6 und R^7 für Wasserstoff stehen;

W für Fluor steht;

15 X für Methyl oder Fluor steht;

Y für Methyl steht;

X und Y stehen insbesondere für folgende Kombinationen (Y, X): (Me, F), (Me, Me)

Z für Wasserstoff steht; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

20 Handelt es sich bei der Substruktur der Formel (I-A) um die Substrukturformel (I-A-1), so ist es ebenfalls bevorzugt, dass

R^1 für Wasserstoff, Methyl, Ethyl, CH₂CF₃, Cyclopropyl oder Cyclopropylmethyl steht;

R^4 , R^5 , R^6 und R^7 , jeweils unabhängig voneinander für Wasserstoff, Methyl, Trifluoromethyl oder Phenyl stehen;

- 37 -

W Wasserstoff oder Fluor steht;

X für Wasserstoff, Chlor, Fluor oder Methyl steht;

Y für Chlor, Brom, Cyano, Methyl, Trifluoromethyl oder Fluor steht;

5 X und Y insbesondere für folgende Kombinationen (Y,X) stehen: (Me, F), (Me,H), (Me,Cl), (Me,Me), (Cl,Cl), (Cl,F), (CN,F), (Cl,H), (Br,H), (Br,F), (CN,H), (F,F), (CF₃,H);

Z für Wasserstoff steht; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

Hierbei ist es besonders bevorzugt, dass

R¹ für Wasserstoff oder Methyl steht;

10 R⁴, R⁵, R⁶ und R⁷ für Wasserstoff stehen;

W für Fluor steht;

X für Methyl oder Fluor steht;

Y für Methyl steht;

X und Y stehen insbesondere für folgende Kombinationen (Y, X): (Me, F), (Me, Me)

15 Z für Wasserstoff steht; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

Handelt es sich bei der Substruktur der Formel (I-A) um die Substrukturformel (I-A-2), so ist es bevorzugt, dass

20 R⁴, R⁵, R⁶ und R⁷, jeweils unabhängig voneinander für Wasserstoff, Methyl, Trifluoromethyl oder Phenyl stehen;

W Wasserstoff oder Fluor steht;

X für Wasserstoff, Chlor, Fluor oder Methyl steht;

Y für Chlor, Brom, Cyano, Methyl, Trifluoromethyl oder Fluor steht;

- 38 -

X und Y insbesondere für folgende Kombinationen (Y,X) stehen: (Me, F), (Me,H), (Me,Cl), (Me,Me), (Cl,Cl), (Cl,F), (CN,F), (Cl,H), (Br,H), (Br,F), (CN,H), (F,F), (CF₃,H);

Z für Wasserstoff steht; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

5 Hierbei ist es besonders bevorzugt, dass

R⁴ für Wasserstoff oder Methyl steht;

R⁵ für Wasserstoff steht;

R⁶ für Wasserstoff oder Methyl steht;

R⁷ für Wasserstoff steht;

10 W für Fluor steht;

X für Fluor steht;

Y für Methyl steht;

Z für Wasserstoff steht; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

15 Handelt es sich bei der Substruktur der Formel (I-A) um die Substrukturformel (I-A-6), so ist es bevorzugt, dass

R¹¹ für Wasserstoff, Methyl, Ethyl, CH₂CF₃, CH₂CHF₂, CH(CH₃)CF₃, CH₂CH₂CF₃ oder CH₂CH₂CHF₂, Cyclopropyl oder Cyclopropylmethyl steht;

20 R², R³, R⁴, R⁵, R⁶ und R⁷, jeweils unabhängig voneinander für Wasserstoff, Methyl, Trifluoromethyl oder Phenyl stehen;

W Wasserstoff oder Fluor steht;

X für Wasserstoff, Chlor, Fluor oder Methyl steht;

Y für Chlor, Brom, Cyano, Methyl, Trifluoromethyl, Fluor oder Methoxy steht;

- 39 -

X und Y insbesondere für folgende Kombinationen (Y,X) stehen: (Me, F), (Me,H), (Me,Cl), (Me,Me), (Cl,Cl), (Cl,F), (CN,F), (MeO,F), (MeO,H), (Cl,H), (Me,H), (Br,H), (Br,F), (CN,H), (F,F), (CF₃,H);

Z für Wasserstoff steht; und

5 n für die Zahl 0 oder 1 steht,

wobei der an der exocyclischen Doppelbindung befindliche Stickstoff auch als Hydrohalogenid vorliegen kann.

Hierbei ist es besonders bevorzugt, dass

R¹¹ für CH₂CF₃ oder CH(CH₃)CF₃ steht;

10 R², R³, R⁴, R⁵, R⁶ und R⁷ für Wasserstoff stehen;

W für Fluor steht;

X für Methyl oder Fluor steht;

Y für Methyl steht;

X und Y stehen insbesondere für folgende Kombinationen (Y, X): (Me, F), (Me, Me)

15 Z für Wasserstoff steht; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht,


wobei der an der exocyclischen Doppelbindung befindliche Stickstoff auch als Hydrochlorid vorliegen kann.

Zweite Ausführungsform (I-B):

20 In einer zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung weisen die erfindungsgemäßen Verbindungen eine Struktur der allgemeinen Formel (I) auf, in welcher

A und B gemeinsam mit den Atomen, an die sie gebunden sind, für eine Substruktur der Formel (I-B) stehen

- 40 -



(I-B)

wobei

V^1 und V^2 , jeweils unabhängig voneinander,

für Sauerstoff; Schwefel, NR^{11} oder ein Salz von NR^{11} stehen;

5 Q^1 für Sauerstoff, Schwefel, NR^1 oder CR^2R^3 steht;

Q^2 NR^{10} oder CR^8R^9 steht;

R^1 für Wasserstoff, Cyano oder Nitro steht; oder

10 für (C_1-C_6) Alkyl, (C_3-C_6) Cycloalkyl (C_1-C_6) alkyl, Halogen (C_2-C_6) alkyl, Cyano (C_1-C_6) alkyl, Hydroxy (C_1-C_6) alkyl, (C_1-C_6) Alkoxy (C_1-C_6) alkyl, Amino (C_1-C_6) alkyl, (C_1-C_6) Alkoxy-carbonyl (C_1-C_6) alkyl, (C_1-C_6) Alkylsulfanyl (C_1-C_6) alkyl, (C_1-C_6) Alkylsulfinyl (C_1-C_6) alkyl, (C_1-C_6) Alkylsulfonyl (C_1-C_6) alkyl, Halogen (C_1-C_6) alkylsulfanyl (C_1-C_6) alkyl, Halogen (C_1-C_6) alkylsulfinyl (C_1-C_6) alkyl, Halogen (C_1-C_6) alkylsulfonyl (C_1-C_6) alkyl, (C_1-C_6) Alkoxy (C_1-C_6) alkylsulfanyl (C_1-C_6) alkyl, (C_1-C_6) Alkoxy (C_1-C_6) alkylsulfinyl (C_1-C_6) alkyl, (C_1-C_6) Alkoxy (C_1-C_6) alkylsulfonyl (C_1-C_6) alkyl, Phenyl (C_1-C_6) alkyl, Phenoxy (C_1-C_6) alkyl, Phenylsulfanyl (C_1-C_6) alkyl, Phenylsulfinyl (C_1-C_6) alkyl, Phenylsulfonyl (C_1-C_6) alkyl, Hetaryl (C_1-C_6) alkyl, Hetaryloxy (C_1-C_6) alkyl, Hetarylsulfanyl (C_1-C_6) alkyl, Hetarylsulfinyl (C_1-C_6) alkyl, Hetarylsulfonyl (C_1-C_6) alkyl, (C_1-C_6) Alkoxy-carbonyl, Aryloxy-carbonyl, Aryl-carbamoyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können; oder

20 für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes (C_3-C_6) Cycloalkyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome unterbrochen sein kann, steht; oder

für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes (C_3-C_6) Cycloalkyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome unterbrochen sein kann, steht; oder

für Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Phenylcarbonyl, Hetarylcarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxycarbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, Di(C₃-C₆)cycloalkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)aminocarbonyl, Arylaminocarbonyl, Diarylaminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl oder Aminothiocarbonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl steht; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl steht; oder

für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, Aryloxy, Aryl(C₁-C₆)alkyloxy oder Carbonyloxy steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Hydroxy steht; oder

für (C₁-C₆)Alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)amino, Arylamino, Diarylamino, Hetarylamino, Dihetarylamino, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)amino, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)amino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, Arylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkoxycarbonylamino, Aryloxycarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, Arylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, oder Arylsulfonylamino steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können, oder Amino steht; oder

für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Arylsulfanyl, Arylsulfinyl, Arylsulfonyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl steht, wobei

die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Sulfanyl steht; und

5 R¹⁰ und R¹¹, jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff, Cyano oder Nitro steht; oder

für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₂-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, Amino(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Phenoxy(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryloxy(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl, Aryloxycarbonyl, (C₁-C₆)Alkylcarbonyl, Arylcarbonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können; oder

für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes (C₃-C₆)Cycloalkyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome unterbrochen sein kann, steht; oder

für Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Phenylcarbonyl, Hetarylcarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxy carbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, Di(C₃-C₆)cycloalkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)aminocarbonyl, Arylaminocarbonyl, Diarylaminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl oder Aminothiocarbonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte

- 43 -

Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl steht; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl steht; oder

5 für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₃-C₆)Cycloalkoxy, Aryloxy, Aryl(C₁-C₆)alkoxy oder Carbonyloxy steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Hydroxy steht; oder

10 für (C₁-C₆)Alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)amino, Arylamino, Diarylamino, Hetarylamino, Dihetarylamino, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)amino, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)amino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, Arylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkoxy carbonylamino, Aryloxy carbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbamoylamino, Arylcarbamoylamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, oder Arylsulfonylamino steht, wobei die vorgenannten Reste
15 jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können, oder Amino steht; oder

20 für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Arylsulfanyl, Arylsulfinyl, Arylsulfonyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl steht, wobei
25 die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Sulfanyl steht; und

R², R³, R⁸ und R⁹, jeweils unabhängig voneinander,

30 für Wasserstoff, Cyano, Halogen oder Nitro stehen; oder

für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, Amino(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy-carbonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylthio(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylthio(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylthioalkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Phenoxy(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryloxy(C₁-C₆)alkyl oder Hetarylthio(C₁-C₆)alkyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gesättigt oder ungesättigt und/oder gegebenenfalls substituiert sein können; oder

für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes (C₃-C₆)Cycloalkyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome unterbrochen sein kann, stehen; oder

für (C₁-C₆)Alkylcarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Phenylcarbonyl, Hetarylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy-carbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxy-carbonyl, Aryloxy-carbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, Di(C₃-C₆)cycloalkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)aminocarbonyl, Arylaminocarbonyl, Diarylaminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl oder Aminothiocarbonyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl stehen; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl stehen;

für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkoxy, Aryloxy, Aryl(C₁-C₆)alkyloxy, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyloxy oder Carbonyloxy stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Hydroxy stehen; oder

für (C₁-C₆)Alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)amino, Arylamino, Diarylamino, Hetarylamino, Dihetarylamino, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)amino, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)amino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, Arylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkoxy carbonylamino, Aryloxy carbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbamoylelamino, Arylcarbamoylelamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, oder Arylsulfonylamino stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Amino stehen; oder

für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Arylsulfanyl, Arylsulfinyl, Arylsulfonyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Sulfanyl stehen; oder

R² und R³ gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, substituierten und gegebenenfalls durch Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis sechsgliedrigen Ring bilden können; oder

R⁸ und R⁹ gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, substituierten und gegebenenfalls durch Heteroatome aus

- 46 -

der Reihe O, S oder N unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis sechsgliedrigen Ring bilden können;

W für Wasserstoff, Fluor oder Chlor steht;

5 X, Y und Z unabhängig voneinander für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, Amino, Hydroxy, (C₁-C₄)Alkyl, (C₁-C₄)Halogenalkyl, (C₂-C₄)Alkenyl, (C₂-C₄)Alkynyl, (C₁-C₄)Alkoxy, (C₁-C₄)Halogenalkoxy oder Aminothiocarbonyl stehen;


10 oder für ein Benzyl, Phenoxy, Phenylthio, Cyclopropylmethyl, Cyclopropyloxy oder Cyclopropylthio, der gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden substituiert ist mit Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes Cyclopropyl stehen;

15 oder für einen Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl oder Phenyl, der gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden substituiert ist mit Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes Cyclopropyl stehen; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

20 In einer bevorzugten Ausgestaltung dieser zweiten Ausführungsform steht die Substruktur der Formel (I-B) für eine Substruktur, welche ausgewählt wird aus der Gruppe, bestehend aus

- 47 -



wobei

R^1 für Wasserstoff steht; oder

5 für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₂-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl(C₁-C₆)alkyl, Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)Alkenyl, Halogen(C₂-C₆)Alkenyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)Alkynyl, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können steht; oder

10 für gegebenenfalls substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochen sein kann, steht; oder

15 für Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxycarbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl, (C₂-C₆)Alkenylcarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₂-C₆)Alkynylcarbonyl oder Aminothiocarbonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl steht; oder

- 48 -

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl steht; oder

für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₃-C₆)Cycloalkoxy, oder Carbonyloxy steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Hydroxy steht; oder

für (C₁-C₆)Alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkoxycarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbamoylamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, (C₂-C₆)Alkenylamino, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkylamino, (C₂-C₆)Alkylamino steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder Amino steht; oder

für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Sulfanyl steht; und

R¹⁰ und R¹¹, jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff steht; oder

für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₂-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl(C₁-C₆)alkyl, Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)Alkenyl, Halogen(C₂-C₆)Alkenyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)Alkyl, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können steht; oder

für gegebenenfalls substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochen sein kann, steht; oder

für (C₁-C₆)Alkylcarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxycarbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-

- 49 -

C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl, (C₂-C₆)Alkenylcarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₂-C₆)Alkinylcarbonyl oder Aminothiocarbonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl steht; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl steht; oder

für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, oder Carbonyloxy steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Hydroxy steht; oder

für (C₁-C₆)Alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkoxycarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, (C₂-C₆)Alkenylamino, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkylamino, (C₂-C₆)Alkinylamino steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder Amino steht; oder

für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Sulfanyl steht; und

R², R³, R⁸ und R⁹, jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff, Cyano, Halogen oder Nitro steht; oder

für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)Alkenyl, Halogen(C₂-C₆)Alkenyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)Alkinyl, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können ; oder

- 50 -

für gegebenenfalls substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochen sein kann, steht; oder

für (C₁-C₆)Alkylcarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxycarbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl, (C₂-C₆)Alkenylcarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₂-C₆)Alkinylcarbonyl oder Aminothiocarbonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl steht; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl steht; oder

für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkoxy, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyloxy, (C₂-C₆)Alkenyloxy, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkoxy, (C₂-C₆)Alkinyloxy oder Carbonyloxy stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Hydroxy stehen; oder

für (C₁-C₆)Alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, , (C₁-C₆)Alkoxycarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbamoylamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, (C₂-C₆)Alkenylamino, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkylamino, (C₂-C₆)Alkinylamino steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder Amino steht; oder

für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylamino-sulfonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Sulfanyl steht; oder

- 51 -

R^2 und R^3 gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituierendes (C_3 - C_6)Cycloalkyl, substituierten und gegebenenfalls durch Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis sechsgliedrigen Ring bilden können; oder

R^8 und R^9 gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituierendes (C_3 - C_6)Cycloalkyl, substituierten und gegebenenfalls durch Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis sechsgliedrigen Ring bilden können;

für Wasserstoff oder Fluor steht;

unabhängig voneinander, für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, (2,2)-Difluoromethyl, Difluoromethoxy, Trifluoromethoxy, Cyclopropyl, Cyano, Amino, Hydroxy oder Nitro stehen;

für Wasserstoff steht; und

für die Zahl 0 oder 1 steht.

Hierbei ist es bevorzugt, dass

R^1 , R^{10} und R^{11} , jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff stehen; oder

für (C_1 - C_6)Alkyl, (C_3 - C_6)Cycloalkyl(C_1 - C_3)alkyl, (C_2 - C_6)Alkenyl, (C_2 - C_6)Alkynyl, Halogen(C_2 - C_6)alkyl, (C_1 - C_6)Alkoxy(C_1 - C_6)alkyl oder Phenyl(C_1 - C_3)alkyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können; oder

für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes (C_3 - C_6)Cycloalkyl oder gegebenenfalls substituiertes Phenyl steht;

- 52 -

R^2 , R^3 , R^8 und R^9 , jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff stehen; oder

für (C_1-C_6) Alkyl, (C_3-C_6) Cycloalkyl(C_1-C_3)alkyl, (C_2-C_6) Alkenyl, (C_2-C_6) Alkynyl, Halogen(C_1-C_6)alkyl, (C_1-C_6) Alkoxy(C_1-C_6)alkyl oder Phenyl(C_1-C_3)alkyl steht, wobei die

für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes (C_3-C_6) Cycloalkyl, oder gegebenenfalls substituiertes Phenyl steht; oder




W für Wasserstoff oder Fluor steht;

X und Y, unabhängig voneinander, für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, (2,2)-Difluoromethyl, Difluoromethoxy, Trifluoromethoxy, Cyclopropyl, Cyano, Amino, Hydroxy oder Nitro stehen;

Z für Wasserstoff steht; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

Bevorzugt steht die Substruktur der Formel (I-B) für eine Substruktur, welche ausgewählt wird aus der Gruppe, bestehend aus



wobei

R^1 und R^{11} , jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Cyclopropyl, Cyclopropylmethyl, CH_2CF_3 , CH_2CHF_2 , $CH(CH_3)CF_3$, $CH_2CH_2CF_3$, $CH_2CH_2CHF_2$ stehen; oder

- 53 -

R^2 , R^3 , R^8 und R^9 , jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff, Methyl, Trifluoromethyl oder Phenyl stehen;

W für Wasserstoff oder Halogen steht;


X, Y und Z, jeweils unabhängig voneinander,

5 für Wasserstoff; Halogen, Cyano oder Nitro stehen; oder

für (C_1-C_6) Alkyl; (C_1-C_6) Alkoxy; Halogen (C_1-C_6) alkyl; Halogen (C_1-C_6) alkoxy, wobei die vorgenannten Reste gegebenenfalls substituiert sein können, stehen; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

10 Ebenfalls bevorzugt steht die Substruktur der Formel (I-B) für eine Substruktur, welche ausgewählt wird aus der Gruppe, bestehend aus



wobei

R^1 , R^{10} und R^{11} , jeweils unabhängig voneinander,

- 54 -

für Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, n-Butyl, Cyclopropyl, Cyclopropylmethyl, CH_2CF_3 , CH_2CHF_2 , $\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CF}_3$, $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CF}_3$, $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHF}_2$, $\text{CH}_2\text{C}(\text{CH}_3)_3$, $\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)_2$, $\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2$ (= Allyl), CH_2CCH (= Vinyl) oder Benzyl stehen;

5 R^2 , R^3 , R^8 und R^9 , jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff, Methyl, Trifluoromethyl oder Phenyl stehen;

W für Wasserstoff oder Fluor steht;


X, Y und Z, jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff; Fluor, Brom, Chlor, Cyano oder Nitro stehen; oder


10 für $(\text{C}_1\text{-C}_6)\text{Alkyl}$; $(\text{C}_1\text{-C}_6)\text{Alkoxy}$; Halogen $(\text{C}_1\text{-C}_6)\text{alkyl}$; Halogen $(\text{C}_1\text{-C}_6)\text{alkoxy}$, wobei die vorgenannten Reste gegebenenfalls substituiert sein können, stehen; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

Ebenfalls bevorzugt steht die Substruktur der Formel (I-B) für eine Substruktur, welche ausgewählt wird aus der Gruppe, bestehend aus



- 55 -



wobei

R^1 , R^{10} und R^{11} , jeweils unabhängig voneinander,

5 für Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, n-Butyl, Cyclopropyl, Cyclopropylmethyl, CH_2CF_3 , CH_2CHF_2 , $\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CF}_3$, $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CF}_3$, $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHF}_2$, $\text{CH}_2\text{C}(\text{CH}_3)_3$, $\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)_2$, $\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2$ (= Allyl), CH_2CCH (= Vinyl) oder Benzyl stehen;

R^2 , R^3 , R^8 und R^9 , jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff, Methyl, Trifluoromethyl oder Phenyl stehen;

10 W für Wasserstoff oder Fluor steht;

X für Wasserstoff, Chlor, Fluor oder Methyl steht;

Y für Chlor, Brom, Cyano, Methyl, Trifluoromethyl oder Fluor steht;

X und Y insbesondere für folgende Kombinationen (Y,X) stehen: (Me, F), (Me,H), (Me,Cl), (Me,Me), (Cl,Cl), (Cl,F), (CN,F), (Cl,H), (Br,H), (Br,F), (CN,H), (F,F), (CF₃,H);

15 Z für Wasserstoff steht; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

Handelt es sich bei der Substruktur der Formel (I-B) um die Substrukturformel (I-B-1), so ist es bevorzugt, dass

20 R^1 für Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, CH_2CF_3 , Cyclopropyl oder Cyclopropylmethyl steht;

- 56 -

- R⁸ und R⁹ unabhängig voneinander für Wasserstoff, Methyl, Trifluoromethyl oder Phenyl stehen;
- W Wasserstoff oder Fluor steht;
- X für Wasserstoff, Chlor, Fluor oder Methyl steht;
- Y für Chlor, Brom, Cyano, Methyl, Trifluoromethyl, Fluor oder Methoxy steht;
- 5 X und Y insbesondere für folgende Kombinationen (Y,X) stehen: (Me, F), (Me,H), (Me,Cl), (Me,Me), (Cl,Cl), (Cl,F), (CN,F), (MeO,F), (MeO,H), (Cl,H), (Me,H), (Br,H), (Br,F), (CN,H), (F,F), (CF₃,H);
- Z für Wasserstoff steht; und
- n für die Zahl 0 oder 1 steht.
- 10 Hierbei ist es besonders bevorzugt, dass
- R¹ für Methyl steht;
- R⁸ und R⁹ jeweils für Methyl stehen;
- W für Fluor steht;
- X für Wasserstoff oder Fluor steht;
- 15 Y für Methyl steht;
- Z für Wasserstoff steht; und
- n für die Zahl 0 oder 1 steht.
- Handelt es sich bei der Substruktur der Formel (I-B) um die Substrukturformel (I-B-1), so ist es ebenfalls bevorzugt, dass
- 20 R¹ für Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, n-Butyl, CH₂CF₃, CH₂CH=CH₂, Cyclopropyl, Cyclopropylmethyl oder Benzyl steht;
- R⁸ und R⁹ unabhängig voneinander für Wasserstoff, Methyl, Trifluoromethyl oder Phenyl stehen;
- W Wasserstoff oder Fluor steht;

- 57 -

X für Wasserstoff, Chlor, Fluor oder Methyl steht;

Y für Chlor, Brom, Cyano, Methyl, Trifluoromethyl oder Fluor steht;

X und Y insbesondere für folgende Kombinationen (Y,X) stehen: (Me, F), (Me,H), (Me,Cl), (Me,Me), (Cl,Cl), (Cl,F), (CN,F), (Cl,H), (Br,H), (Br,F), (CN,H), (F,F), (CF₃,H);

5 Z für Wasserstoff steht; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

Hierbei ist es besonders bevorzugt, dass

R¹ für Methyl, n-Butyl, CH₂CH=CH₂ oder Benzyl steht;

R⁸ und R⁹ jeweils für Wasserstoff oder Methyl stehen;

10 W für Fluor steht;

X für Wasserstoff oder Fluor steht;

Y für Methyl steht;

Z für Wasserstoff steht; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

15 Handelt es sich bei der Substruktur der Formel (I-B) um die Substrukturformel (I-B-2), so ist es bevorzugt, dass

R⁸ und R⁹ unabhängig voneinander für Wasserstoff, Methyl, Trifluoromethyl oder Phenyl stehen;

W Wasserstoff oder Fluor steht;

X für Wasserstoff, Chlor, Fluor oder Methyl steht;

20 Y für Chlor, Brom, Cyano, Methyl, Trifluoromethyl oder Fluor steht;

X und Y insbesondere für folgende Kombinationen (Y,X) stehen: (Me, F), (Me,H), (Me,Cl), (Me,Me), (Cl,Cl), (Cl,F), (CN,F), (Cl,H), (Br,H), (Br,F), (CN,H), (F,F), (CF₃,H);

Z für Wasserstoff steht; und

- 58 -

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

Hierbei ist es besonders bevorzugt, dass

R^8 und R^9 unabhängig voneinander für Wasserstoff oder Methyl stehen;

W für Fluor steht;

5 X für Fluor steht;

Y für Methyl steht;

Z für Wasserstoff steht; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

10 Handelt es sich bei der Substruktur der Formel (I-B) um die Substrukturformel (I-B-4), so ist es bevorzugt, dass

R^2 , R^3 , R^8 und R^9 , jeweils unabhängig voneinander unabhängig voneinander für Wasserstoff, Methyl, Trifluoromethyl oder Phenyl stehen;

W Wasserstoff oder Fluor steht;

X für Wasserstoff, Chlor, Fluor oder Methyl steht;

15 Y für Chlor, Brom, Cyano, Methyl, Trifluoromethyl, Fluor oder Methoxy steht;

X und Y insbesondere für folgende Kombinationen (Y,X) stehen: (Me, F), (Me,H), (Me,Cl), (Me,Me), (Cl,Cl), (Cl,F), (CN,F), (MeO,F), (MeO,H), (Cl,H), (Me,H), (Br,H), (Br,F), (CN,H), (F,F), (CF₃,H);

Z für Wasserstoff steht; und

20 n für die Zahl 0 oder 1 steht.

Hierbei ist es besonders bevorzugt, dass

R^2 , R^3 , R^8 und R^9 für Wasserstoff stehen;

W für Fluor steht;

- 59 -

X für Fluor steht;

Y für Methyl steht;

Z für Wasserstoff steht; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

5 Handelt es sich bei der Substruktur der Formel (I-B) um die Substrukturformel (I-B-5), so ist es bevorzugt, dass

R¹¹ für Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Cyclopropyl, Cyclopropylmethyl, CH₂CF₃, CH₂CHF₂, CH(CH₃)CF₃, CH₂CH₂CF₃, CH₂CH₂CHF₂ steht;

10 R⁸ und R⁹, jeweils unabhängig voneinander, für Wasserstoff, Methyl, Trifluoromethyl oder Phenyl stehen;

W Wasserstoff oder Fluor steht;

X für Wasserstoff, Chlor, Fluor oder Methyl steht;

Y für Chlor, Brom, Cyano, Methyl, Trifluoromethyl, Fluor oder Methoxy steht;

15 X und Y insbesondere für folgende Kombinationen (Y,X) stehen: (Me, F), (Me,H), (Me,Cl), (Me,Me), (Cl,Cl), (Cl,F), (CN,F), (MeO,F), (MeO,H), (Cl,H), (Me,H), (Br,H), (Br,F), (CN,H), (F,F), (CF₃,H);

Z für Wasserstoff steht; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

Hierbei ist es besonders bevorzugt, dass

20 R¹¹ für CH₂CF₃ oder Cyclopropyl steht;

R⁸ und R⁹ jeweils für Methyl stehen;

W für Fluor steht;

X für Methyl oder Fluor steht;

Y für Methyl steht;

- 60 -

Z für Wasserstoff steht; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

Handelt es sich bei der Substruktur der Formel (I-B) um die Substrukturformel (I-B-5), so ist es ebenfalls bevorzugt, dass

5 R¹¹ für Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, CH₂C(CH₃)₃, CH₂CH(CH₃)₂, Cyclopropyl, Cyclopropylmethyl, CH₂CF₃, CH₂CHF₂, CH(CH₃)CF₃, CH₂CH₂CF₃, CH₂CH₂CHF₂ steht;

R⁸ und R⁹, jeweils unabhängig voneinander, für Wasserstoff, Methyl, Trifluoromethyl oder Phenyl stehen;

10 W Wasserstoff oder Fluor steht;

X für Wasserstoff, Chlor, Fluor oder Methyl steht;

Y für Chlor, Brom, Cyano, Methyl, Trifluoromethyl oder Fluor steht;

X und Y insbesondere für folgende Kombinationen (Y,X) stehen: (Me, F), (Me,H), (Me,Cl), (Me,Me), (Cl,Cl), (Cl,F), (CN,F), (Cl,H), (Br,H), (Br,F), (CN,H), (F,F), (CF₃,H);

15 Z für Wasserstoff steht; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

Hierbei ist es ebenfalls besonders bevorzugt, dass

R¹¹ für CH₂C(CH₃)₃, CH₂CH(CH₃)₂, CH₂CF₃ oder Cyclopropyl steht;

R⁸ und R⁹ jeweils für Methyl stehen;

20 W für Fluor steht;

X für Methyl oder Fluor steht;

Y für Methyl steht;

Z für Wasserstoff steht; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

- 61 -

Handelt es sich bei der Substruktur der Formel (I-B) um die Substrukturformel (I-B-6), so ist es bevorzugt, dass

R^1 und R^{10} jeweils unabhängig voneinander, für Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, $CH_2CH=CH_2$, CH_2CCH , CH_2CF_3 , Cyclopropyl oder Cyclopropylmethyl stehen;

5 W Wasserstoff oder Fluor steht;

X für Wasserstoff, Chlor, Fluor oder Methyl steht;

Y für Chlor, Brom, Cyano, Methyl, Trifluoromethyl oder Fluor steht;

X und Y insbesondere für folgende Kombinationen (Y,X) stehen: (Me, F), (Me,H), (Me,Cl), (Me,Me), (Cl,Cl), (Cl,F), (CN,F), (Cl,H), (Br,H), (Br,F), (CN,H), (F,F), (CF₃,H);

10 Z für Wasserstoff steht; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

Hierbei ist es besonders bevorzugt, dass

R^1 für Methyl, Ethyl oder $CH_2CH=CH_2$ steht;

R^{10} für Methyl, Ethyl, Isopropyl, $CH_2CH=CH_2$, CH_2CCH oder Cyclopropylmethyl stehen;

15 W für Fluor steht;

X für Fluor steht;

Y für Methyl steht;

Z für Wasserstoff steht; und


n für die Zahl 0 oder 1 steht.

20 Dritte Ausführungsform (I-C):

In einer dritten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung weisen die erfindungsgemäßen Verbindungen eine Struktur der allgemeinen Formel (I) auf, in welcher

A und B gemeinsam mit den Atomen, an die sie gebunden sind, für eine Substruktur der Formel (I-C) stehen

- 62 -



(I-C)

wobei

V^1 und V^2 , jeweils unabhängig voneinander,

für Sauerstoff; Schwefel, NR_{11} oder ein Salz von NR_{11} stehen;

5 Q^1 für Sauerstoff, Schwefel, NR_1 oder CR_2R_3 steht;

Q^2 NR_{10} oder CR_8R_9 steht;

R^1 für Wasserstoff, Cyano oder Nitro steht; oder

10 für (C_1-C_6) Alkyl, (C_3-C_6) Cycloalkyl (C_1-C_6) alkyl, Halogen (C_2-C_6) alkyl, Cyano (C_1-C_6) alkyl, Hydroxy (C_1-C_6) alkyl, (C_1-C_6) Alkoxy (C_1-C_6) alkyl, Amino (C_1-C_6) alkyl, (C_1-C_6) Alkoxycarbonyl (C_1-C_6) alkyl, (C_1-C_6) Alkylsulfanyl (C_1-C_6) alkyl, (C_1-C_6) Alkylsulfinyl (C_1-C_6) alkyl, (C_1-C_6) Alkylsulfonyl (C_1-C_6) alkyl, Halogen (C_1-C_6) alkylsulfanyl (C_1-C_6) alkyl, Halogen (C_1-C_6) alkylsulfinyl (C_1-C_6) alkyl, Halogen (C_1-C_6) alkylsulfonyl (C_1-C_6) alkyl, (C_1-C_6) Alkoxy (C_1-C_6) alkylsulfanyl (C_1-C_6) alkyl, (C_1-C_6) Alkoxy (C_1-C_6) alkylsulfinyl (C_1-C_6) alkyl, (C_1-C_6) Alkoxy (C_1-C_6) alkylsulfonyl (C_1-C_6) alkyl, Phenyl (C_1-C_6) alkyl, Phenoxy (C_1-C_6) alkyl, Phenylsulfanyl (C_1-C_6) alkyl, Phenylsulfinyl (C_1-C_6) alkyl, Phenylsulfonyl (C_1-C_6) alkyl, Hetaryl (C_1-C_6) alkyl, Hetaryloxy (C_1-C_6) alkyl, Hetarylsulfanyl (C_1-C_6) alkyl, Hetarylsulfinyl (C_1-C_6) alkyl, Hetarylsulfonyl (C_1-C_6) alkyl, (C_1-C_6) Alkoxycarbonyl, Aryloxycarbonyl, Arylcarbamoyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können; oder

20 für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes (C_3-C_6) Cycloalkyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome unterbrochen sein kann, steht; oder

für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes (C_3-C_6) Cycloalkyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome unterbrochen sein kann, steht; oder

für Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Phenylcarbonyl, Hetarylcarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxycarbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, Di(C₃-C₆)cycloalkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)aminocarbonyl, Arylaminocarbonyl, Diarylaminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl oder Aminothiocarbonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl steht; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl steht; oder

für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, Aryloxy, Aryl(C₁-C₆)alkyloxy oder Carbonyloxy steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Hydroxy steht; oder

für (C₁-C₆)Alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)amino, Arylamino, Diarylamino, Hetarylamino, Dihetarylamino, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)amino, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)amino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, Arylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkoxycarbonylamino, Aryloxycarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, Arylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, oder Arylsulfonylamino steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können, oder Amino steht; oder

für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Arylsulfanyl, Arylsulfinyl, Arylsulfonyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl steht, wobei

- 64 -

die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Sulfanyl steht; und

5 R¹⁰ und R¹¹, jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff, Cyano oder Nitro steht; oder

für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₂-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, Amino(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy-carbonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Phenoxy(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryloxy(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy-carbonyl, Aryloxy-carbonyl, (C₁-C₆)Alkyl-carbonyl, Aryl-carbamoyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können; oder

für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes (C₃-C₆)Cycloalkyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome unterbrochen sein kann, steht; oder

für Halogen(C₁-C₆)alkyl-carbonyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkyl-carbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl-carbonyl, Phenyl-carbonyl, Hetaryl-carbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxy-carbonyl, Aminocar-bonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocar-bonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocar-bonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocar-bonyl, Di(C₃-C₆)cycloalkylaminocar-bonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)aminocar-bonyl, Arylaminocar-bonyl, Diarylaminocar-bonyl, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)aminocar-bonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)aminocar-bonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocar-bonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocar-bonyl oder Aminothiocar-bonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte

- 65 -

Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl steht; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl steht; oder

5 für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₃-C₆)Cycloalkoxy, Aryloxy, Aryl(C₁-C₆)alkoxy oder Carbonyloxy steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Hydroxy steht; oder

10 für (C₁-C₆)Alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)amino, Arylamino, Diarylamino, Hetarylamino, Dihetarylamino, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)amino, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)amino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, Arylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkoxy carbonylamino, Aryloxy carbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbamoylamino, Arylcarbamoylamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, oder Arylsulfonylamino steht, wobei die vorgenannten Reste
15 jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können, oder Amino steht; oder

20 für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Arylsulfanyl, Arylsulfinyl, Arylsulfonyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl steht, wobei
25 die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Sulfanyl steht; und

R², R³, R⁸ und R⁹, jeweils unabhängig voneinander,

30 für Wasserstoff, Cyano, Halogen oder Nitro stehen; oder

- 66 -

5 für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, Amino(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy-carbonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylthio(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylthio(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylthioalkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Phenoxy(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryloxy(C₁-C₆)alkyl oder Hetarylthio(C₁-C₆)alkyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gesättigt oder ungesättigt und/oder gegebenenfalls substituiert sein können; oder

für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes (C₃-C₆)Cycloalkyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome unterbrochen sein kann, stehen; oder

15 für (C₁-C₆)Alkylcarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Phenylcarbonyl, Hetarylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy-carbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxy-carbonyl, Aryloxy-carbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, Di(C₃-C₆)cycloalkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)aminocarbonyl, Arylaminocarbonyl, Diarylaminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl oder Aminothiocarbonyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl stehen; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl stehen;

30 für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkoxy, Aryloxy, Aryl(C₁-C₆)alkyloxy, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyloxy oder Carbonyloxy stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Hydroxy stehen; oder

- 67 -

für (C₁-C₆)Alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)amino, Arylamino, Diarylamino, Hetarylamino, Dihetarylamino, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)amino, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)amino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, Arylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkoxy carbonylamino, Aryloxy carbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbamoylelamino, Arylcarbamoylelamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, oder Arylsulfonylamino stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Amino stehen; oder

für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Arylsulfanyl, Arylsulfinyl, Arylsulfonyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Sulfanyl stehen; oder

R² und R³ gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, substituierten und gegebenenfalls durch Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis sechsgliedrigen Ring bilden können; oder

R⁸ und R⁹ gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, substituierten und gegebenenfalls durch Heteroatome aus

- 68 -

der Reihe O, S oder N unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis sechsgliedrigen Ring bilden können;

W für Wasserstoff, Fluor oder Chlor steht;

X, Y und Z, jeweils unabhängig voneinander,

5 für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, Amino, Hydroxy, (C₁-C₄)Alkyl, (C₁-C₄)Halogenalkyl, (C₂-C₄)Alkenyl, (C₂-C₄)Alkynyl, (C₁-C₄)Alkoxy, (C₁-C₄)Halogenalkoxy oder Aminothiocarbonyl stehen;


10 oder für ein Benzyl, Phenoxy, Phenylthio, Cyclopropylmethyl, Cyclopropyloxy oder Cyclopropylthio, der gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden substituiert ist mit Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes Cyclopropyl stehen;

15 oder für einen Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl oder Phenyl, der gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden substituiert ist mit Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes Cyclopropyl stehen; und

20 n für die Zahl 0 oder 1 steht.

In einer bevorzugten Ausgestaltung dieser dritten Ausführungsform steht die Substruktur der Formel (I-C) für eine Substruktur, welche ausgewählt wird aus der Gruppe, bestehend aus

- 69 -



R¹ für Wasserstoff steht; oder

für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₂-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl(C₁-C₆)alkyl, Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)Alkenyl, Halogen(C₂-C₆)Alkenyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)Alkynyl, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können steht; oder

für gegebenenfalls substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochen sein kann, steht; oder

für Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxycarbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl, (C₂-C₆)Alkenylcarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₂-C₆)Alkynylcarbonyl oder Aminothiocarbonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl steht; oder

- 70 -

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl steht; oder

für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, oder Carbonyloxy steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Hydroxy steht; oder

für (C₁-C₆)Alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkoxycarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, (C₂-C₆)Alkenylamino, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkylamino, (C₂-C₆)Alkylamino steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder Amino steht; oder

für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Sulfanyl steht; und

R¹⁰ für Wasserstoff steht; oder

für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₂-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl(C₁-C₆)alkyl, Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)Alkenyl, Halogen(C₂-C₆)Alkenyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)Alkyl, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können steht; oder

für gegebenenfalls substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochen sein kann, steht; oder

für (C₁-C₆)Alkylcarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxycarbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl, (C₂-C₆)Alkenylcarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-

- 71 -

C_6)alkylcarbonyl, (C_2-C_6) Alkynylcarbonyl oder Aminothiocarbonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl steht; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl steht; oder

für (C_1-C_6) Alkoxy, Halogen (C_1-C_6) alkoxy, (C_3-C_6) Cycloalkyloxy, oder Carbonyloxy steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Hydroxy steht; oder

für (C_1-C_6) Alkylamino, Halogen (C_1-C_6) alkylamino, Dihalogen (C_1-C_6) alkylamino, Di (C_1-C_6) alkylamino, (C_3-C_6) Cycloalkylamino, Di (C_3-C_6) cycloalkylamino, (C_1-C_6) Alkylcarbonylamino, (C_1-C_6) Alkoxycarbonylamino, (C_1-C_6) Alkylcarbonylamino, (C_1-C_6) Alkylsulfonylamino, (C_2-C_6) Alkenylamino, (C_3-C_6) Cycloalkenyl (C_1-C_6) alkylamino, (C_2-C_6) Alkynylamino steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder Amino steht; oder

für (C_1-C_6) Alkylsulfanyl, (C_1-C_6) Alkylsulfinyl, (C_1-C_6) Alkylsulfonyl, Halogen (C_1-C_6) alkylsulfanyl, Halogen (C_1-C_6) alkylsulfinyl, Halogen (C_1-C_6) alkylsulfonyl, (C_3-C_6) Cycloalkyl (C_1-C_6) alkylsulfanyl, (C_3-C_6) Cycloalkyl (C_1-C_6) alkylsulfinyl, (C_3-C_6) Cycloalkyl (C_1-C_6) alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C_1-C_6) Alkylaminosulfonyl, Di (C_1-C_6) alkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Sulfanyl steht; und

R^2 , R^3 , R^8 und R^9 , jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff, Cyano, Halogen oder Nitro steht; oder

für (C_1-C_6) Alkyl, (C_3-C_6) Cycloalkyl (C_1-C_6) alkyl, Halogen (C_1-C_6) alkyl, Cyano (C_1-C_6) alkyl, (C_1-C_6) Alkoxy (C_1-C_6) alkyl, (C_1-C_6) Alkoxycarbonyl (C_1-C_6) alkyl, (C_1-C_6) Alkylsulfanyl (C_1-C_6) alkyl, (C_1-C_6) Alkylsulfinyl (C_1-C_6) alkyl, Phenyl (C_1-C_6) alkyl, Hetaryl (C_1-C_6) alkyl, (C_2-C_6) Alkenyl, Halogen (C_2-C_6) Alkenyl, (C_3-C_6) Cycloalkenyl (C_1-C_6) alkyl, (C_2-C_6) Alkynyl, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können ; oder

für gegebenenfalls substituiertes (C_3-C_6) Cycloalkyl, (C_3-C_6) Cycloalkenyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochen sein kann, steht; oder

- 72 -

für (C₁-C₆)Alkylcarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxycarbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl, (C₂-C₆)Alkenylcarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₂-C₆)Alkinylcarbonyl oder Aminothiocarbonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl steht; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl steht; oder

für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkoxy, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyloxy, (C₂-C₆)Alkenyloxy, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkoxy, (C₂-C₆)Alkinyloxy oder Carbonyloxy stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Hydroxy stehen; oder

für (C₁-C₆)Alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkoxycarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, (C₂-C₆)Alkenylamino, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkylamino, (C₂-C₆)Alkinylamino steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder Amino steht; oder

für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Sulfanyl steht; oder

R² und R³ gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, substituierten und gegebenenfalls durch Heteroatome aus

- 73 -

der Reihe O, S oder N unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis sechsgliedrigen Ring bilden können; oder

5 R^8 und R^9 gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes (C_3 - C_6)Cycloalkyl, substituierten und gegebenenfalls durch Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis sechsgliedrigen Ring bilden können;

10 W für Wasserstoff oder Fluor steht;

X und Y, jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, (2,2)-Difluoromethyl, Difluoromethoxy, Trifluoromethoxy, Cyclopropyl, Cyano, Amino, Hydroxy oder Nitro stehen;

15 Z für Wasserstoff steht; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

Hierbei ist es bevorzugt, dass

R^1 und R^{10} , jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff stehen; oder

20 für (C_1 - C_6)Alkyl, (C_3 - C_6)Cycloalkyl(C_1 - C_3)alkyl, (C_2 - C_6)Alkenyl, (C_2 - C_6)Alkynyl, Halogen(C_2 - C_6)alkyl, (C_1 - C_6)Alkoxy(C_1 - C_6)alkyl oder Phenyl(C_1 - C_3)alkyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können; oder

für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes (C_3 - C_6)Cycloalkyl oder gegebenenfalls substituiertes Phenyl steht;

25 R^2 , R^3 , R^8 und R^9 , jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff stehen; oder

- 74 -

für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₃)alkyl, (C₂-C₆)Alkenyl, (C₂-C₆)Alkynyl, Halogen(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl oder Phenyl(C₁-C₃)alkyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können; oder

5 für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes (C₃-C₆)Cycloalkyl, oder gegebenenfalls substituiertes Phenyl steht; oder

W für Wasserstoff oder Fluor steht;


X und Y, jeweils unabhängig voneinander,

10 für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, (2,2)-Difluoromethyl, Difluoromethoxy, Trifluoromethoxy, Cyclopropyl, Cyano, Amino, Hydroxy oder Nitro stehen;

Z für Wasserstoff steht; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

Bevorzugt steht die Substruktur der Formel (I-C) für die Substruktur (I-C-1)



15 wobei

R¹ und R¹⁰, jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff, (C₁-C₄)Alkyl, (C₁-C₄)Halogenalkyl oder (C₂-C₄)Alkenyl stehen; oder

20 für gesättigtes oder ungesättigtes (C₃-C₆)Cycloalkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₂)alkyl, Phenyl oder Phenyl(C₁-C₂)alkyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach durch Halogen, Cyano, Nitro, Amino, Hydroxy, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl,

- 75 -

Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy, Trifluoroethylsulfanyl oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes Cyclopropyl substituiert sein können;

W Wasserstoff oder Fluor steht;

5 X für Wasserstoff, Chlor, Fluor oder Methyl steht;






Y für Chlor, Brom, Cyano, Methyl, Trifluoromethyl, Fluor oder Methoxy steht;

X und Y insbesondere für folgende Kombinationen (Y,X) stehen: (Me, F), (Me,H), (Me,Cl), (Me,Me), (Cl,Cl), (Cl,F), (CN,F), (MeO,F), (MeO,H), (Cl,H), (Me,H), (Br,H), (Br,F), (CN,H), (F,F), (CF₃,H);

10 Z für Wasserstoff steht; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

Ebenfalls bevorzugt steht die Substruktur der Formel (I-C) für eine Substruktur, welche ausgewählt wird aus der Gruppe, bestehend aus



15

wobei

- 76 -

R¹ und R¹⁰, jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff, (C₁-C₄)Alkyl, (C₂-C₄)Halogenalkyl, (C₁-C₃)Alkoxy(C₁-C₄)alkyl oder (C₂-C₄)Alkenyl stehen; oder

für gesättigtes oder ungesättigtes (C₃-C₆)Cycloalkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₂)alkyl,

5 Phenyl oder Phenyl(C₁-C₂)alkyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach durch Halogen, Cyano, Nitro, Amino, Hydroxy, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy, Trifluoroethylsulfanyl oder
10 gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes Cyclopropyl substituiert sein können;

R², R³, R⁸ und R⁹, jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff stehen; oder

für (C₁-C₆)Alkyl, (C₂-C₆)Alkenyl, (C₂-C₆)Alkynyl, Halogen(C₁-C₆)alkyl oder Phenyl(C₁-C₃)alkyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach
15 durch Halogen, Cyano, Nitro, Amino, Hydroxy, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy, Trifluoroethylsulfanyl oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes Cyclopropyl substituiert sein können; oder

für (C₃-C₆)Cycloalkyl oder Phenyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils
20 gegebenenfalls einfach oder mehrfach durch Halogen, Cyano, Nitro, Amino, Hydroxy, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy, Trifluoroethylsulfanyl oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes Cyclopropyl substituiert sein können; oder

25 R² und R³ gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, substituiertes Cyclopropyl-, Cyclobutyl-, Cyclopentyl-
30 oder Cyclohexylring bilden können; oder

- 77 -

- 5 R⁸ und R⁹ gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, substituiertes Cyclopropyl-, Cyclobutyl-, Cyclopentyl- oder Cyclohexylring bilden können;
- W Wasserstoff oder Fluor steht;
- X für Wasserstoff, Chlor, Fluor oder Methyl steht;
- Y für Chlor, Brom, Cyano, Methyl, Trifluoromethyl oder Fluor steht;
- 10 X und Y insbesondere für folgende Kombinationen (Y,X) stehen: (Me, F), (Me,H), (Me,Cl), (Me,Me), (Cl,Cl), (Cl,F), (CN,F), (Cl,H), (Me,H), (Br,H), (Br,F), (CN,H), (F,F), (CF₃,H);
- Z für Wasserstoff steht; und
- n für die Zahl 0 oder 1 steht.
- 15 Handelt es sich bei der Substruktur der Formel (I-C) um die Substrukturformel (I-C-1), so ist es bevorzugt, dass
- R¹ für Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Tertbutyl, Isobutyl, 2-Butyl, Allyl, CH₂CF₃ steht; oder,
- 20 für gesättigtes oder ungesättigtes Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl, Cyclopentenyl, Cyclohexenyl, Cyclopropylmethyl, Phenyl, Benzyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach durch Halogen, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy, Trifluoroethylsulfanyl oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes Cyclopropyl substituiert sein können;
- 25 R¹⁰ für Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Tertbutyl, Isobutyl, 2-Butyl, Allyl, Cyclopropyl, Cyclopropylmethyl oder ein gegebenenfalls einfach oder mehrfach durch Halogen, Methyl, Trifluoromethyl, Cyclopropyl, Cyano substituiertes Phenyl steht;
- steht;
- W Wasserstoff oder Fluor steht;

- 78 -

X für Wasserstoff, Chlor, Fluor oder Methyl steht;

Y für Chlor, Brom, Cyano, Methyl, Trifluoromethyl, Fluor oder Methoxy steht;

X und Y insbesondere für folgende Kombinationen (Y,X) stehen: (Me, F), (Me,H), (Me,Cl), (Me,Me), (Cl,Cl), (Cl,F), (CN,F), (MeO,F), (MeO,H), (Cl,H), (Me,H), (Br,H), (Br,F), (CN,H), (F,F), (CF₃,H);

Z für Wasserstoff steht; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

Hierbei ist es besonders bevorzugt, dass

R¹ für Wasserstoff, Cyclopentyl, Cyclohex-2-en-1-yl, Methyl, Ethyl, CH₂CH(CH₃)₂, CH(CH₃)CH₂CH₃, CH(CH₃)₂, CH₂-Cyclopropyl, CH₂CH=CH₂, Benzyl, 4-Cyano-2,5-difluoro-phenyl, 3-(2,2,2-Trifluoroethylsulfinyl)-4-methyl-phenyl, 3-(2,2,2-Trifluoroethylsulfanyl)-4-methyl-phenyl oder (2-chlorophenyl)methyl steht;

R¹⁰ für Methyl, Ethyl, CH₂CH=CH₂, CH(CH₃)₂, C(CH₃)₃, Cyclopropyl, Phenyl oder 3-(Trifluoromethyl)phenyl steht;

W für Fluor steht;

X für Wasserstoff, Fluor oder Methyl steht;

Y für Brom, Chlor, Fluor, Cyano, Methyl, Methoxy oder CF₃ steht;

Z für Wasserstoff steht; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

Handelt es sich bei der Substruktur der Formel (I-C) um die Substrukturformel (I-C-1), so ist es ebenfalls bevorzugt, dass

R¹ für Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Tertbutyl, Isobutyl, 2-Butyl, Allyl, CH₂CF₃ steht; oder,

für gesättigtes oder ungesättigtes Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl, Cyclopentenyl, Cyclohexenyl, Cyclopropylmethyl, Phenyl oder Benzyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach durch Cyano, Halogen,

- 79 -

Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy, Trifluoroethylsulfanyl, Trifluoroethylsulfinyl oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor oder Cyano substituiertes Cyclopropyl substituiert sein können;

- 5 R^{10} für Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Tertbutyl, Isobutyl, 2-Butyl, CH_2CHF_2 , $CH_2CH_2CH_2OCH_3$, Allyl, Cyclopropyl, Cyclohexyl, Cyclopropylmethyl oder ein gegebenenfalls einfach oder mehrfach durch Halogen, Methyl, Trifluoromethyl, Cyclopropyl, Cyano substituiertes Phenyl steht;
- W Wasserstoff oder Fluor steht;
- 10 X für Wasserstoff, Chlor, Fluor oder Methyl steht;
- Y für Chlor, Brom, Cyano, Methyl, Trifluoromethyl oder Fluor steht;
- X und Y insbesondere für folgende Kombinationen (Y,X) stehen: (Me, F), (Me,H), (Me,Cl), (Me,Me), (Cl,Cl), (Cl,F), (CN,F), (Cl,H), (Br,H), (Br,F), (CN,H), (F,F), (CF₃,H);
- Z für Wasserstoff steht; und
- 15 n für die Zahl 0 oder 1 steht.

Hierbei ist es ebenfalls besonders bevorzugt, dass

- R^1 für Wasserstoff, Cyclopentyl, Cyclohex-2-en-1-yl, Methyl, Ethyl, Propyl, $CH_2CH(CH_3)_2$, $CH(CH_3)CH_2CH_3$, $CH(CH_3)_2$, $C(CH_3)_3$, Cyclopropylmethyl, $CH_2CH=CH_2$, CH_2CF_3 , Benzyl, 4-Cyano-2,5-difluoro-phenyl, 3-(2,2,2-Trifluoroethylsulfinyl)-4-methyl-phenyl, 3-(2,2,2-Trifluoroethylsulfanyl)-4-methyl-phenyl oder (2-Chlorophenyl)methyl steht;
- 20 R^{10} für Methyl, Ethyl, Propyl, $CH_2CH=CH_2$, $CH(CH_3)_2$, $C(CH_3)_3$, CH_2CHF_2 , $CH_2CH_2CH_2OCH_3$, Cyclopropyl, Cyclohexyl, Phenyl, 3-Chlorphenyl oder 3-(Trifluoromethyl)phenyl steht;
- W für Fluor steht;
- 25 X für Wasserstoff, Fluor oder Methyl steht;
- Y für Brom, Chlor, Fluor, Cyano, Methyl oder CF₃ steht;

- 80 -

- X und Y insbesondere für folgende Kombinationen (Y,X) stehen: (Me, F), (Me,H), (Me,Me), (Cl,F), (Cl,H), (Br,H), (Br,F), (CN,H), (F,F), (CF₃,H);
- Z für Wasserstoff steht; und
- n für die Zahl 0 oder 1 steht.
- 5 Handelt es sich bei der Substruktur der Formel (I-C) um die Substrukturformel (I-C-2), so ist es bevorzugt, dass
- R¹ für Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Tertbutyl, Isobutyl, 2-Butyl, Allyl, CH₂CF₃ steht; oder,
- 10 für gesättigtes oder ungesättigtes Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl, Cyclopentenyl, Cyclohexenyl, Cyclopropylmethyl, Phenyl, Benzyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach durch Cyano, Halogen, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy, Trifluoroethylsulfanyl oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes Cyclopropyl substituiert sein können;
- 15 R⁸ und R⁹ unabhängig voneinander für Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl oder Phenyl stehen; oder
- bilden einen Cyclobutylring;
- W Wasserstoff oder Fluor steht;
- X für Wasserstoff, Chlor, Fluor oder Methyl steht;
- 20 Y für Chlor, Brom, Cyano, Methyl, Trifluoromethyl oder Fluor steht;
- X und Y insbesondere für folgende Kombinationen (Y,X) stehen: (Me, F), (Me,H), (Me,Cl), (Me,Me), (Cl,Cl), (Cl,F), (CN,F), (Cl,H), (Br,H), (Br,F), (CN,H), (F,F), (CF₃,H);
- Z für Wasserstoff steht; und
- n für die Zahl 0 oder 1 steht.
- 25 Hierbei ist es besonders bevorzugt, dass
- R¹ für Methyl, Benzyl oder Phenyl steht;

- 81 -

R^8 und R^9 jeweils für Methyl oder Ethyl stehen; oder
bilden einen Cyclobutylring;

W für Fluor steht;

X für Wasserstoff, Fluor oder Methyl steht;

5 Y für Brom, Chlor, Fluor, Cyano, Methyl oder CF_3 steht;

Z für Wasserstoff steht; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

Handelt es sich bei der Substruktur der Formel (I-C) um die Substrukturformel (I-C-3), so ist es bevorzugt, dass

10 R^{10} für Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Tertbutyl, Isobutyl, 2-Butyl, CH_2CHF_2 , $CH_2CH_2CH_2OCH_3$, Allyl, Cyclopropyl, Cyclohexyl, Cyclopropylmethyl oder ein gegebenenfalls einfach oder mehrfach durch Halogen, Methyl, Trifluoromethyl, Cyclopropyl, Cyano substituiertes Phenyl steht;

15 R^2 und R^3 unabhängig voneinander für Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl oder Phenyl stehen; oder
bilden einen Cyclopropyl- oder einen Cyclobutylring;

W Wasserstoff oder Fluor steht;

X für Wasserstoff, Chlor, Fluor oder Methyl steht;

Y für Chlor, Brom, Cyano, Methyl, Trifluoromethyl oder Fluor steht;

20 X und Y insbesondere für folgende Kombinationen (Y,X) stehen: (Me, F), (Me,H), (Me,Cl), (Me,Me), (Cl,Cl), (Cl,F), (CN,F), (Cl,H), (Br,H), (Br,F), (CN,H), (F,F), (CF_3 ,H);

Z für Wasserstoff steht; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

Hierbei ist es besonders bevorzugt, dass

- 82 -

R¹⁰ für Methyl oder Cyclopropyl steht;

R² und R³ unabhängig voneinander für Wasserstoff oder Methyl stehen;

W für Fluor steht;

X für Fluor steht;

5 Y für Methyl steht;

Z für Wasserstoff steht; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

Handelt es sich bei der Substruktur der Formel (I-C) um die Substrukturformel (I-C-5), so ist es bevorzugt, dass

10 R¹ für Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Isopropyl, Tertbutyl, Isobutyl oder Trifluoromethyl steht; oder,

für Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopropylmethyl, Phenyl oder Benzyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach durch Cyano, Halogen, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, 15 Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy, Trifluoroethylsulfanyl oder gegebenenfalls durch gegebenenfalls einfach durch Methyl, Fluor, Chlor oder Cyano substituiertes Cyclopropyl substituiert sein können;

R¹⁰ für Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Tertbutyl, Isobutyl, Trifluoromethyl oder Allyl steht; oder,

20 für gesättigtes oder ungesättigtes Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopropylmethyl, Phenyl oder Benzyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach durch Cyano, Halogen, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy, Trifluoroethylsulfanyl oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor oder Cyano 25 substituiertes Cyclopropyl substituiert sein können;

W Wasserstoff oder Fluor steht;

X für Wasserstoff, Chlor, Fluor oder Methyl steht;

- 83 -

Y für Chlor, Brom, Cyano, Methyl, Trifluoromethyl oder Fluor steht;

X und Y insbesondere für folgende Kombinationen (Y,X) stehen: (Me, F), (Me,H), (Me,Cl), (Me,Me), (Cl,Cl), (Cl,F), (CN,F), (Cl,H), (Br,H), (Br,F), (CN,H), (F,F), (CF₃,H);

Z für Wasserstoff steht; und

5 n für die Zahl 0 oder 1 steht.

Hierbei ist es besonders bevorzugt, dass

R¹ für Methyl steht;

R¹⁰ für Cyclopropyl steht;

W für Fluor steht;

10 X für Fluor steht;

Y für Methyl steht;

Z für Wasserstoff steht; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

15 Handelt es sich bei der Substruktur der Formel (I-C) um die Substrukturformel (I-C-6), so ist es bevorzugt, dass

R¹ für Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Isopropyl, Tertbutyl, Isobutyl oder Trifluoromethyl steht; oder,

20 für Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopropylmethyl, Phenyl oder Benzyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach durch Cyano, Halogen, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy, Trifluoroethylsulfanyl oder gegebenenfalls durch gegebenenfalls einfach durch Methyl, Fluor, Chlor oder Cyano substituiertes Cyclopropyl substituiert sein können;

25 R¹⁰ für Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Tertbutyl, Isobutyl, Trifluoromethyl oder Allyl steht; oder,

- 84 -


- 5 für gesättigtes oder ungesättigtes Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopropylmethyl, Phenyl oder Benzyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach durch Cyano, Halogen, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy, Trifluoroethylsulfanyl oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor oder Cyano substituiertes Cyclopropyl substituiert sein können;
- W Wasserstoff oder Fluor steht;
- X für Wasserstoff, Chlor, Fluor oder Methyl steht;
- Y für Chlor, Brom, Cyano, Methyl, Trifluoromethyl oder Fluor steht;
- 10 X und Y insbesondere für folgende Kombinationen (Y,X) stehen: (Me, F), (Me,H), (Me,Cl), (Me,Me), (Cl,Cl), (Cl,F), (CN,F), (Cl,H), (Br,H), (Br,F), (CN,H), (F,F), (CF₃,H);
- Z für Wasserstoff steht; und
- n für die Zahl 0 oder 1 steht.
- Hierbei ist es besonders bevorzugt, dass
- 15 R¹ für Methyl steht;
- R¹⁰ für Cyclopropyl steht;
- W für Fluor steht;
- X für Fluor steht;
- Y für Methyl steht;
- 20 Z für Wasserstoff steht; und
- n für die Zahl 0 oder 1 steht.

Vierte Ausführungsform (I-D):

In einer vierten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung weisen die erfindungsgemäßen Verbindungen eine Struktur der allgemeinen Formel (I) auf, in welcher

- 85 -

A und B gemeinsam mit den Atomen, an die sie gebunden sind, für eine Substruktur der Formel (I-D) stehen



(I-D)

wobei

5 V^1 , V^2 und V^3 , jeweils unabhängig voneinander,

für Sauerstoff; Schwefel, NR_{11} oder ein Salz von NR_{11} stehen;

Q^2 NR^{10} oder CR^8R^9 steht;

R^{10} für Wasserstoff, Cyano oder Nitro steht; oder

10 für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₂-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, Amino(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy-carbonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Phenoxy(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryloxy(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Arylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy-carbonyl, Aryloxycarbonyl, (C₁-C₆)Alkylcarbonyl, Aryl-carbamoyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können; oder

20

für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes (C₃-C₆)Cycloalkyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome unterbrochen sein kann, steht; oder

für Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Phenylcarbonyl, Hetarylcarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxycarbonyl, Aryloxycarbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, Di(C₃-C₆)cycloalkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)aminocarbonyl, Arylaminocarbonyl, Diarylaminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl oder Aminothiocarbonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl steht; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl steht; oder

für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, Aryloxy, Aryl(C₁-C₆)alkyloxy oder Carbonyloxy steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Hydroxy steht; oder

für (C₁-C₆)Alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)amino, Arylamino, Diarylamino, Hetarylamino, Dihetarylamino, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)amino, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)amino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, Arylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkoxycarbonylamino, Aryloxycarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbamoylamino, Arylcarbamoylamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, oder Arylsulfonylamino steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können, oder Amino steht; oder

für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-

(C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Arylsulfanyl, Arylsulfinyl, Arylsulfonyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der

5 Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Sulfanyl steht; und

R⁸ und R⁹, jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff, Cyano, Halogen oder Nitro stehen; oder

10 für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, Amino(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy-carbonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylthio(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylthio(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylthioalkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Phenoxy(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryloxy(C₁-C₆)alkyl oder Hetarylthio(C₁-C₆)alkyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gesättigt oder ungesättigt und/oder gegebenenfalls substituiert sein können; oder

15 20

für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes (C₃-C₆)Cycloalkyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome unterbrochen sein kann, stehen; oder

25 für (C₁-C₆)Alkylcarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Phenylcarbonyl, Hetarylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy-carbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxy-carbonyl, Aryloxy-carbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, Di(C₃-C₆)cycloalkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)aminocarbonyl, Arylamino-carbonyl, Diarylamino-carbonyl, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl oder Aminothiocarbonyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können

30

und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl stehen; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl stehen;

5 für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkoxy, Aryloxy, Aryl(C₁-C₆)alkyloxy, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyloxy oder Carbonyloxy stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein
10 können oder für Hydroxy stehen; oder

für (C₁-C₆)Alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)amino, Arylamino, Diarylamino, Hetarylamino, Dihetarylamino, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)amino, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)amino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, Arylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkoxy carbonylamino, Aryloxy carbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbamoylamino, Arylcarbamoylamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, oder Arylsulfonylamino stehen, wobei die vorgenannten Reste
15 jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Amino stehen; oder
20


für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Arylsulfanyl, Arylsulfinyl, Arylsulfonyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder
25 unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Sulfanyl stehen; oder
30

- 89 -

- 5 R^8 und R^9 gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes (C_3 - C_6)Cycloalkyl, substituierten und gegebenenfalls durch Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis sechsgliedrigen Ring bilden können;
- W für Wasserstoff, Fluor oder Chlor steht;
- X, Y und Z, jeweils unabhängig voneinander,
- 10 für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, Amino, Hydroxy, (C_1 - C_4)Alkyl, (C_1 - C_4)Halogenalkyl, (C_2 - C_4)Alkenyl, (C_2 - C_4)Alkinyl, (C_1 - C_4)Alkoxy, (C_1 - C_4)Halogenalkoxy oder Aminothiocarbonyl stehen;
- 15 oder für ein Benzyl, Phenoxy, Phenylthio, Cyclopropylmethyl, Cyclopropyloxy oder Cyclopropylthio, der gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden substituiert ist mit Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes Cyclopropyl stehen;
- 20 oder für einen Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl oder Phenyl, der gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden substituiert ist mit Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes Cyclopropyl stehen; und
- 25 n für die Zahl 0 oder 1 steht.

In einer bevorzugten Ausgestaltung dieser vierten Ausführungsform steht die Substruktur der Formel (I-D) für eine Substruktur, welche ausgewählt wird aus der Gruppe, bestehend aus

- 90 -



wobei

R^{10} für Wasserstoff steht; oder

5 für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₂-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl(C₁-C₆)alkyl, Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)Alkenyl, Halogen(C₂-C₆)Alkenyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)Alkynyl, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können steht; oder

10 für gegebenenfalls substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochen sein kann, steht; oder

15 für (C₁-C₆)Alkylcarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxycarbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl, (C₂-C₆)Alkenylcarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₂-C₆)Alkynylcarbonyl oder Aminothiocarbonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl steht; oder

20 für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl steht; oder

- 91 -

für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, oder Carbonyloxy steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Hydroxy steht; oder

5 für (C₁-C₆)Alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkoxycarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, (C₂-C₆)Alkenylamino, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkylamino, (C₂-C₆)Alkynylamino steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder Amino steht; oder

10 für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils
15 gegebenenfalls substituiert sein können oder für Sulfanyl steht; und

R⁸ und R⁹, jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff, Cyano, Halogen oder Nitro steht; oder

20 für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)Alkenyl, Halogen(C₂-C₆)Alkenyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)Alkynyl, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können ; oder

25 für gegebenenfalls substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochen sein kann, steht; oder

30 für (C₁-C₆)Alkylcarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxycarbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl, (C₂-C₆)Alkenylcarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₂-C₆)Alkynylcarbonyl oder Aminothiocarbonyl steht, wobei die

- 92 -

vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl steht; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl steht; oder

5 für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkoxy, (C₃-C₆)Cycloalkoxy, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkoxy, (C₂-C₆)Alkenyloxy, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkoxy, (C₂-C₆)Alkinyloxy oder Carbonyloxy stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Hydroxy stehen; oder

10 für (C₁-C₆)Alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkoxycarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, (C₂-C₆)Alkenylamino, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkylamino, (C₂-C₆)Alkinylamino steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder Amino steht; oder

15 für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Sulfanyl steht; oder

20 R⁸ und R⁹ gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, substituierten und gegebenenfalls durch Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis sechsgliedrigen Ring bilden können;

W für Wasserstoff oder Fluor steht;

30 X und Y, jeweils unabhängig voneinander, für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, (2,2)-Difluoromethyl, Difluoromethoxy, Trifluoromethoxy, Cyclopropyl,

- 93 -

Cyano, Amino, Hydroxy oder Nitro stehen;

Z für Wasserstoff steht; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

Hierbei ist es bevorzugt, dass

5 R¹⁰ für Wasserstoff steht; oder

für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₃)alkyl, (C₂-C₆)Alkenyl, (C₂-C₆)Alkynyl, Halogen(C₂-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl oder Phenyl(C₁-C₃)alkyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können; oder

10 für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes (C₃-C₆)Cycloalkyl oder gegebenenfalls substituiertes Phenyl steht;

R⁸ und R⁹, jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff stehen; oder

15 für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₃)alkyl, (C₂-C₆)Alkenyl, (C₂-C₆)Alkynyl, Halogen(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl oder Phenyl(C₁-C₃)alkyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können; oder

für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes (C₃-C₆)Cycloalkyl, oder gegebenenfalls substituiertes Phenyl steht; oder

W für Wasserstoff oder Fluor steht;


20 X und Y, unabhängig voneinander, für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, (2,2)-Difluoromethyl, Difluoromethoxy, Trifluoromethoxy, Cyclopropyl, Cyano, Amino, Hydroxy oder Nitro stehen;

Z für Wasserstoff steht; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

Bevorzugt steht die Substruktur der Formel (I-D) für die Substruktur (I-D-1)

- 94 -



wobei

R^{10} für Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Cyclopropylmethyl, CH_2CF_3 , CH_2CHF_2 , $CH(CH_3)CF_3$, $CH_2CH_2CF_3$, $CH_2CH_2CHF_2$ oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes Cyclopropyl steht;

W für Wasserstoff oder Fluor steht;

X für Wasserstoff, Chlor, Fluor oder Methyl steht;



Y für Chlor, Brom, Cyano, Methyl, Trifluoromethyl, Fluor oder Methoxy steht;

X und Y insbesondere für folgende Kombinationen (Y,X) stehen: (Me, F), (Me,H), (Me,Cl), (Me,Me), (Cl,Cl), (Cl,F), (CN,F), (MeO,F), (MeO,H), (Cl,H), (Me,H), (Br,H), (Br,F), (CN,H), (F,F), (CF₃,H);

Z für Wasserstoff steht; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

Ebenfalls bevorzugt steht die Substruktur der Formel (I-D) für eine Substruktur, welche ausgewählt wird aus der Gruppe, bestehend aus



- 95 -

wobei

- 5 R^{10} für Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, tert-Butyl, Cyclopropylmethyl, $CH_2CH(CH_3)_2$, $CH_2C(CH_3)_3$, CH_2CF_3 , CH_2CHF_2 , $CH(CH_3)CF_3$, $CH_2CH_2CF_3$, $CH_2CH_2CHF_2$ oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes Cyclopropyl oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes Cyclohexyl oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes Cyclopropylmethyl steht;
- W für Wasserstoff oder Fluor steht;
- X für Wasserstoff, Chlor, Fluor oder Methyl steht;
- Y für Chlor, Brom, Cyano, Methyl, Trifluoromethyl oder Fluor steht;
- 10 X und Y insbesondere für folgende Kombinationen (Y,X) stehen: (Me, F), (Me,H), (Me,Cl), (Me,Me), (Cl,Cl), (Cl,F), (CN,F), (Cl,H), (Me,H), (Br,H), (Br,F), (CN,H), (F,F), (CF₃,H);
- Z für Wasserstoff steht; und
- n für die Zahl 0 oder 1 steht.
- 15 Handelt es sich bei der Substruktur der Formel (I-D) um die Substrukturformel (I-D-1), so ist es bevorzugt, dass
- R^{10} für Wasserstoff, Methyl, Ethyl, CH_2CF_3 , CH_2CHF_2 , $CH(CH_3)CF_3$, $CH_2CH_2CF_3$, $CH_2CH_2CHF_2$, Cyclopropyl oder Cyclopropylmethyl steht;
- W Wasserstoff oder Fluor steht;
- X für Wasserstoff, Chlor, Fluor oder Methyl steht;
- 20 Y für Chlor, Brom, Cyano, Methyl, Trifluoromethyl, Fluor oder Methoxy steht;
- X und Y insbesondere für folgende Kombinationen (Y,X) stehen: (Me, F), (Me,H), (Me,Cl), (Me,Me), (Cl,Cl), (Cl,F), (CN,F), (MeO,F), (MeO,H), (Cl,H), (Me,H), (Br,H), (Br,F), (CN,H), (F,F), (CF₃,H);
- Z für Wasserstoff steht;
- 25 n für die Zahl 0 oder 1 steht.

- 96 -

Hierbei ist es besonders bevorzugt, dass

- R^{10} für CH_2CHF_2 oder Cyclopropyl steht;
- W für Fluor steht;
- X für Wasserstoff oder Fluor steht;
- 5 Y für Methyl steht;
- Z für Wasserstoff steht; und
- n für die Zahl 0 oder 1 steht.

Handelt es sich bei der Substruktur der Formel (I-D) um die Substrukturformel (I-D-1), so ist es ebenfalls bevorzugt, dass

- 10 R^{10} für Wasserstoff, Methyl, Ethyl, CH_2CF_3 , CH_2CHF_2 , $CH(CH_3)CF_3$, $CH_2CH_2CF_3$, $CH_2CH_2CHF_2$, Cyclopropyl, Cyclohexyl oder Cyclopropylmethyl steht;
- W Wasserstoff oder Fluor steht;
- X für Wasserstoff, Chlor, Fluor oder Methyl steht;
- Y für Chlor, Brom, Cyano, Methyl, Trifluoromethyl oder Fluor steht;
- 15 X und Y insbesondere für folgende Kombinationen (Y,X) stehen: (Me, F), (Me,H), (Me,Cl), (Me,Me), (Cl,Cl), (Cl,F), (CN,F), (Cl,H), (Br,H), (Br,F), (CN,H), (F,F), (CF₃,H);
- Z für Wasserstoff steht;
- n für die Zahl 0 oder 1 steht.

Hierbei ist es ebenfalls besonders bevorzugt, dass

- 20 R^{10} für CH_2CHF_2 , Cyclopropyl oder Cyclohexyl steht;
- W für Fluor steht;
- X für Wasserstoff, Methyl oder Fluor steht;
- Y für Methyl steht;

- 97 -

X und Y insbesondere für folgende Kombinationen (Y,X) stehen: (Me, F), (Me,H), (Me,Me);

Z für Wasserstoff steht; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

Handelt es sich bei der Substruktur der Formel (I-D) um die Substrukturformel (I-D-3), so ist es bevorzugt,
5 dass

R¹⁰ für Wasserstoff, Methyl, Ethyl, tert-Butyl, CH₂CH(CH₃)₂, CH₂C(CH₃)₃, CH₂CF₃, CH₂CHF₂,
CH(CH₃)CF₃, CH₂CH₂CF₃, CH₂CH₂CHF₂, Cyclopropyl oder Cyclopropylmethyl steht;

W Wasserstoff oder Fluor steht;

X für Wasserstoff, Chlor, Fluor oder Methyl steht;

10 Y für Chlor, Brom, Cyano, Methyl, Trifluoromethyl oder Fluor steht;

X und Y insbesondere für folgende Kombinationen (Y,X) stehen: (Me, F), (Me,H), (Me,Cl),
(Me,Me), (Cl,Cl), (Cl,F), (CN,F), (Cl,H), (Br,H), (Br,F), (CN,H), (F,F), (CF₃,H);

Z für Wasserstoff steht;

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

15 Hierbei ist es besonders bevorzugt, dass

R¹⁰ für tert-Butyl, CH₂CH(CH₃)₂, CH₂C(CH₃)₃ oder CH₂CF₃ steht;

W für Fluor steht;

X für Methyl oder Fluor steht;

Y für Methyl steht;

20 X und Y insbesondere für folgende Kombinationen (Y,X) stehen: (Me, F), (Me,Me);

Z für Wasserstoff steht; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

Die oben aufgeführten allgemeinen oder in Vorzugsbereichen aufgeführten Restdefinitionen bzw. Erläuterungen können untereinander, also auch zwischen den jeweiligen Bereichen und Vorzugsbereichen beliebig kombiniert werden. Sie gelten für die Endprodukte sowie für die Vor- und Zwischenprodukte entsprechend.

- 5 Erfindungsgemäß bevorzugt werden die Verbindungen der Formel (I), in welchen eine Kombination der vorstehend als bevorzugt aufgeführten Bedeutungen vorliegt.

Erfindungsgemäß besonders bevorzugt werden die Verbindungen der Formel (I), in welchen eine Kombination der vorstehend als besonders bevorzugt aufgeführten Bedeutungen vorliegt.

- 10 Gesättigte oder ungesättigte Kohlenwasserstoffreste wie Alkyl, Alkandiyl oder Alkenyl können, auch in Verbindung mit Heteroatomen, wie z.B. in Alkoxy, soweit möglich, jeweils geradkettig oder verzweigt sein.

Gegebenenfalls substituierte Reste können, sofern nichts anderes angegeben ist, einfach oder mehrfach substituiert sein, wobei bei Mehrfachsubstitutionen die Substituenten gleich oder verschieden sein können.

Im Rahmen der vorliegenden Erfindung steht Halogen für Fluor, Chlor, Brom und Jod, besonders bevorzugt für Fluor, Chlor und Brom, und ganz besonders bevorzugt für Fluor und Chlor.

- 15 Ferner steht Alkyl für geradkettiges oder verzweigtes C₁- bis C₈-Alkyl, bevorzugt geradkettiges oder verzweigtes C₁- bis C₆-Alkyl, weiter bevorzugt geradkettiges oder verzweigtes C₁- bis C₄-Alkyl, insbesondere Methyl und Ethyl.

- 20 Alkoxy steht für geradkettiges oder verzweigtes C₁- bis C₈-Alkoxy, bevorzugt geradkettiges oder verzweigtes C₁- bis C₆-Alkoxy, weiter bevorzugt geradkettiges oder verzweigtes C₁- bis C₄-Alkoxy, insbesondere Methoxy.

Halogenalkyl und Halogenalkoxy ergeben sich aus substituierten Alkyl- bzw. Alkoxyresten gemäß der vorstehenden Definition.

Alkylreste in Cycloalkyl, Alkoxycarbonyl, Alkylthioalkyl, Alkylsulfinylalkyl, Phenylalkyl, Hetarylalkyl und Alkylsulfonylalkyl ergeben sich ebenfalls aus der vorstehenden Definition von Alkyl.


25 **Herstellverfahren**

Die Verbindungen der allgemeinen Formel (I) lassen sich in Verbindungen mit n=0 (Ia) und n=1 (Ib) unterteilen und können nach folgenden Schemata hergestellt werden.

Die Verbindungen der allgemeinen Formel (I) lassen sich in Verbindungen mit $n=0$ (Ia) und $n=1$ (Ib) unterteilen und können prinzipiell nach den allgemeinen Verfahren V1, V2, V3 und V3' hergestellt werden.

Verfahren V1

- 5 Unter Verfahren V1 lassen sich alle Methoden zusammenfassen, die –meistens in einem mehrstufigen Prozess- einen Aufbau des 5-gliedrigen Ringes ermöglichen, insbesondere ausgehend aus den Anilinen der allgemeinen Formel (IVa), nach folgendem Schema,



wobei X, Y, Z, A, B und V die oben angegebene Bedeutung haben.


- 10 Durch Oxidation der Thioether der allgemeinen Formel (Ia) nach literaturbekannten Methoden können die Sulfoxide der allgemeinen Formel (Ib) erhalten werden.

Alternativ können einige der in Verfahren V1 beschriebenen Methoden auch ausgehend von Sulfoxiden der allgemeinen Formel (IVb) zu den Sulfoxiden der allgemeinen Formel (Ib) angewandt werden. Die Sulfoxide der Formel (IVb) können aus den Sulfiden (IVa) nach literaturbekannten Methoden hergestellt werden.

- 15 Verfahren V1 eignet sich insbesondere zur Darstellung der Ausführungsformen I-A bis I-D.

Verfahren V2

- 100 -



wobei Z, A, B, V und W die oben angegebene Bedeutung haben, X steht für Wasserstoff oder eine elektronenziehende Gruppe (insbesondere Nitro, Chlor, Fluor, Cyano), Y stellt elektronenziehende Substituenten (insbesondere Nitro, Chlor, Fluor, Cyano) dar, LG¹ steht für typische Abgangsgruppen in nucleophilen Substitutionsreaktionen (insbesondere Fluorid, Chlorid) und LG² kann für Wasserstoff oder für typische Abgangsgruppen in nucleophilen Substitutionsreaktionen (insbesondere Fluorid, Chlorid) stehen.

Die Umsetzung von Verbindungen der allgemeinen Formel (XXIII) mit heterocyclischen Verbindungen der allgemeinen Formel (XXII), meistens unter basischen Reaktionsbedingungen wie zum Beispiel in US 6906006 und DE 19500439 für Triazolinone, WO 2010/0119194 für Hydantoine, DE 4431218 für Pyrimidin(thi)one, WO 2009/012275 und WO 2008/155034 für Pyridone oder DE 19528305 für Uracile beschrieben, liefert die Verbindungen der allgemeinen Formel (XXIV). Durch erneute nukleophile aromatische Substitution mit Thiolen der allgemeinen Formel (XXV) können die Thioether der Formel (Ia) hergestellt werden. Geeignete Reaktionsbedingungen für solche Reaktionen werden in WO 2007/131680 und WO 2008/086226 beschrieben.

Durch Oxidation der Thioether der allgemeinen Formel (Ia) nach literaturbekannten Methoden können die Sulfoxide der allgemeinen Formel (Ib) erhalten werden.

Verbindungen der Formel (XXIII) in denen LG² für Wasserstoff steht werden als (XXIII') genannt und können auf ähnlicher Weise wie oben dargestellt mit Verbindungen der Formel (XXII) umgesetzt werden, in diesem Fall zu Verbindungen der Formel (XXIV').

Verbindungen der Formel (XXIV') sind zum Teil kommerziell erhältlich.

Die Verbindungen der Formel (XXIV') können in einem mehrstufigen Prozess zu den erfindungsgemäßen Verbindungen (Ia) umgesetzt werden. Zu den benötigten Schritten gehören Chlorsulfonierung, Reduktion und Alkylierung mit Haloalkylelektrophilen der Formel (XV), alle möglich nach literaturbekannten Methoden. Die Chlorsulfonierung der Verbindungen (XXIV') mit Chlorsulfonsäure liefert die entsprechenden Sulfonylchloride und diese können in deren Disulfide mit literaturbekannten Methoden wie zum Beispiel Eisen in Salzsäure oder Iodid überführt werden. Die Umsetzung der Disulfide mit Haloalkylelektrophilen der Formel (XV) liefert die Sulfide (Ia).


Durch Oxidation der Thioether der allgemeinen Formel (Ia) nach literaturbekannten Methoden können die Sulfoxide der allgemeinen Formel (Ib) erhalten werden.

- 10 Hierbei stellen LG¹ und LG² typische Abgangsgruppen in nucleophilen Substitutionsreaktionen wie zum Beispiel Fluorid oder Chlorid dar, X und Y stellen in Verfahren V3 elektronenziehende Substituenten wie zum Beispiel Nitro, Chlorid, Fluorid, Cyano dar.

- Verfahren V2 eignet sich insbesondere zur Darstellung der Ausführungsformen I-A bis I-D, bei denen X für Wasserstoff oder elektronenziehende Substituenten (insbesondere Nitro, Chlorid, Fluorid, Cyano) und Y für elektronenziehende Substituenten (insbesondere Nitro, Chlorid, Fluorid, Cyano) stehen.

Verfahren V3 & Verfahren V3'

Alternativ können die Verbindungen der allgemeinen Formel (Ia) nach **Verfahren V3 und V3'** hergestellt werden, wie im folgendem Schema dargestellt,



- 20 wobei X, Y, Z, W, A, B und V die oben angegebene Bedeutung haben und Hal steht für Halogen (bevorzugt Chlor, Brom Iod).

Verfahren V3

Laut Verfahren V3 können Verbindungen der allgemeinen Formel (Ia) nach literaturbekannten Methoden durch Umsetzung von Arylhalogeniden der allgemeinen Formel (VIIa) mit heterocyclischen Verbindungen der allgemeinen Formel (XXII) hergestellt werden. Bevorzugt findet die Umsetzung durch
5 Übergangsmetall-Katalyse oder –Vermittlung statt. Beispielhafte Reaktionsbedingungen sind in der Literatur zahlreich bekannt, zum Beispiel in WO 2006/117657 A1, in US 2010/99725 A1, in WO 2010/47956 A1, in Chem. Pharm. Bull. 1997, Vol. 45, No. 4, 719-721, in J. Amer. Chem. Soc. 2003, Vol. 125, No. 37, 11253-11258 oder auch in Bull. Korean Chem. Soc. 2010, Vol. 31, No. 8, 2143-2146. Bevorzugt werden Kupfer oder Kupfersalze, zum Beispiel Kupfer(I)-iodid, Kupfer(I)-oxid, Kupfer(I)-triflat
10 oder Kupfer(II)-triflat, als Katalysator verwendet, häufig in Gegenwart eines Liganden, zum Beispiel Diamin-Liganden wie *N,N'*-Dimethylethyldiamin, *N,N*-Dimethylethyldiamin oder *trans-N,N'*-Dimethyl-1,2-cyclohexandiamin. Eine Übersicht findet sich zum Beispiel in Chem. Sci. 2010, Vol. 1, 13-31. Alternativ können 1,3-Diketone, wie z. B. 2,4-Pentandion, 2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptandion oder Dibenzoylmethan, Aminosäuren, wie z.B. L-Prolin oder Glycin oder andere Verbindungen wie
15 8-Hydroxychinolin (Tetrahedron Lett. 2009, Vol. 50, 7293-7296), Dibenzylidenacetone, Bipyridin oder Phenanthrolin Verwendung finden. In der Regel wird die Umsetzung unter Anwesenheit einer Base, häufig Carbonat- oder Phosphat-Basen, wie zum Beispiel Kaliumcarbonat, Natriumcarbonat, Cäsiumcarbonat oder Kaliumphosphat, in geeigneten Lösungsmitteln wie zum Beispiel Dioxan, Toluol, Dimethylsulfoxid oder *N,N*-Dimethylformamid durchgeführt. Desweiteren können Additive wie z. B. Kaliumiodid, Cäsiumfluorid
20 oder andere Salze Einsatz finden.

Alternativ lassen sich derartige Umsetzungen unter Palladiumkatalyse durchführen, etwa durch Einsatz von Katalysatoren wie zum Beispiel Palladiumacetat, Tetrakis(triphenylphosphin)palladium, Bis-(triphenylphosphin)-palladium(II)-chlorid, Tris-(dibenzylidenacetone)-dipalladium(0) in Gegenwart von
25 Liganden, zum Beispiel 2,2'-Bis-(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, 9,9-Dimethyl-4,5-bis-(diphenylphosphino)-xanthen, 1,1'-Bis-(diphenylphosphino)-ferrocen, und Basen wie zum Beispiel Kaliumcarbonat, Natriumcarbonat, Cäsiumcarbonat oder Kaliumphosphat, in geeigneten Lösungsmitteln wie zum Beispiel Dioxan, Toluol, Dimethylsulfoxid oder *N,N*-Dimethylformamid.

Verfahren V3 ist insbesondere zur Darstellung der Ausführungsformen I-A-1, I-A-2, I-A-3, I-A-4 und I-C-1 geeignet.

Verfahren V3'

Verbindungen der allgemeinen Formel (Ia) können alternativ nach Verfahren V3' durch Umsetzung von Boronsäuren der allgemeinen Formel (VIIIa) mit heterocyclischen Verbindungen der allgemeinen Formel

(XXII) hergestellt werden.

In der Regel finden die Reaktionen unter Katalyse oder Vermittlung durch Kupfer(II)-salze wie zum Beispiel Kupfer(II)-acetat, Kupfer(II)triflat oder auch durch Kupfer(I)-salze wie zum Beispiel Kupfer(I)-chlorid, Kupfer(I)-acetat unter Luft- oder Sauerstoffatmosphäre, häufig unter wasserentziehenden Bedingungen (zum Beispiel mit Molekularsieb) statt. Als Basen werden zum Beispiel Triethylamin, *N*-Ethyl-diisopropylamin, Pyridin, 2,6-Lutidin, *N*-Methylmorpholin oder 1,8-Diazabicycloundec-7-en in geeigneten Lösungsmitteln wie zum Beispiel Dichlormethan, Dichlorethan, Methanol, *N,N*-Dimethylformamid, Tetrahydrofuran, Dioxan, Acetonitril, Essigester oder Toluol verwendet. In der Literatur werden zahlreiche Beispiele beschrieben, unter anderem in Bioorg. Med. Chem. Lett. 2010, Vol. 20, No. 13, 3920-3924, in Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2011, Vol. 108, No. 17, 6781-6786, in Chem. Eur. J. 2009, Vol. 15, No. 29, 7044-7047, in Synlett 2004, Vol. 6, 1095-97, in J. Org. Chem. 2005, 70, 4, 1486-1489, in Tetrahedron Lett. 1998, Vol. 39, 2933-2936, in WO 2005/85226 A1 oder in WO 2008/62905 A2. Zusammenfassende Übersichten finden sich zum Beispiel in Synthesis 2011, No. 6, 829-856 oder in Tetrahedron 2012, Vol. 68, 7735-7754. Anstelle der Boronsäure können auch andere Borverbindungen wie etwa Kaliumtrifluorborate, Boronsäureester etc. sowie andere Organometallverbindungen wie etwa Stannane, Silane oder Bismuthane verwendet werden.

Durch Oxidation der Thioether der allgemeinen Formel (Ia) nach literaturbekannten Methoden können die Sulfoxide der allgemeinen Formel (Ib) erhalten werden. Alternativ kann die oxidative übergangsmetallvermittelte Kohlenstoff-Stickstoff-Kupplung zu Arylsulfoxiden der allgemeinen Formel (Ib) ausgehend von Boronsäure-Sulfoxiden der allgemeinen Formel (VIIIb), welche durch Oxidation der Boronsäuren (VIIIa), zum Beispiel mit Natriumperiodat, oder analoger Derivate zugänglich sind, ermöglicht werden.


Verfahren V3' ist insbesondere zur Darstellung der Ausführungsformen I-B-1, I-B-4, I-C-1 und I-C-2 geeignet.

Verfahren Va1 - Va8 eignen sich zur Herstellung der Ausführungsform I-A der Verbindungen der Formel (I).

Verfahren Va1 (zur Herstellung von I-A-1)

Die Imidazolidinonen der allgemeinen Formel (I-A-1) können in (I-A-1a) (für $n=0$) und (I-A-1b) (für $n=1$) unterteilt werden. Sie können beispielsweise nach Verfahren Va1 hergestellt werden.

- 104 -



wobei W, X, Y, Z und R¹ die oben angegebene Bedeutung haben und AG für eine Abgangsgruppe wie z.B. Chlorid, Bromid, Iodid, Triflat und Mesylat steht.

Aniline der Formel (IVa) können durch die Umsetzung mit 2-Chlorethyl-isocyanat zu den cyclischen Amidinen der allgemeinen Formel (XXVIa) - ggf. unter Zwischenisolierung der Harnstoffe der Formel (IIa) – umgesetzt werden.

Die Herstellung von Harnstoffen ist literaturbekannt, z.B. aus JP 2011/042611.

1,3-Oxazolidin-2-yliden-aniline der allgemeinen Formel (XXVIa) werden in Gegenwart von Basen in die 1-Aryl-imidazolidin-2-one der allgemeinen Formel (I-A-1'a) umgewandelt.

Die Thioether (I-A-1'a) können dann nach literaturbekannten Methoden zu den Verbindungen der allgemeinen Formel (I-A-1a) umgesetzt werden. Geeignete Mittel zur Alkylierung sind zum Beispiel Alkylelektrophile der Formel R^1 -AG, wobei AG z.B. für Chlorid, Bromid, Iodid, Triflat und Mesylat steht.


Weitere Herstellungsbeispiele und die Verwendung von 1-Aryl-imidazolidin-2-onen als Zwischenprodukte sind z.B. in den folgenden Patentschriften publiziert: WO 2012149413, WO 2011110575, WO 2011098776, WO 2010149755, WO 2008077597, WO 2008057254, WO 2007038367, US 20070066588, WO 2005111038 oder WO 2005092890.

Die Herstellung von 1-Aryl-imidazolidin-2-onen durch die Reduktion von 1-Aryl-imidazolin-2-onen wird im J.Med.Chem. 1966, 9(6), 858-860 beschrieben.

N-Alkylierungen von 1-Aryl-imidazolidin-2-onen und die Herstellung von 1-Aryl-imidazolidin-2-onen durch die Umsetzung von N-Aryl-1,2-diaminen in Gegenwart von z.B. 1,1'-Carbonyldiimidazol werden in Can. J. Chem. 2004,82,1649 beschrieben.

Verfahren Va2 (zur Herstellung von I-A-2)

Die Oxazolidinone der allgemeinen Formel (I-A-2) können in (I-A-2a) (für $n=0$) und (I-A-2b) (für $n=1$) unterteilt werden. Sie können beispielsweise nach Verfahren Va2 hergestellt werden.



wobei W, X, Y, Z, R³, R⁴, R⁵ und R⁶ die oben angegebene Bedeutung haben.

- 106 -


Aniline der Formel (IVa) können zu den Oxazolidinone der Formel (I-A-2a) nach literaturbekannten Methoden hergestellt werden, zum Beispiel durch die Umsetzung mit 2-Chlorethylchlorocarbonat, beispielsweise analog Molecules 2012, 17, 1233-1240.

Alternativ können Aniline der Formel (IVa) mit einem Epoxid zu Aminoalkohole der Formel (XXVIIa) reagieren, die mit Phosgen zu Oxazolidinone der Formel (I-A-2a) umgesetzt werden können, beispielsweise analog Organic Process Research and Development 2010, 14, 1457-1463 und Journal of Heterocyclic Chemistry 1986, 23, 1427-1429.

Verfahren Va3 (zur Herstellung von I-A-2 und I-A-3)

Die Oxazolidinonen der allgemeinen Formel (I-A-2) können in (I-A-2a) (für n=0) und (I-A-2b) (für n=1) unterteilt werden. Sie können beispielsweise nach Verfahren Va3 hergestellt werden.

Die Thiazolidinonen der allgemeinen Formel (I-A-3) können in (I-A-3a) (für n=0) und (I-A-3b) (für n=1) unterteilt werden. Sie können beispielsweise auch nach Verfahren Va3 hergestellt werden.



wobei W, X, Y, z, R⁴, R⁵, R⁶ und R⁷ die oben angegebene Bedeutung haben, Q¹ für Sauerstoff oder Schwefel steht, und Hal für einen Halogen aus der Reihe Cl, Br oder Iod.


Halogenide der Formel (VIIa) können mit Oxazolidinone (Q¹=O) beziehungsweise Thiazolidinone (Q¹=S) der Formel (XXVIII) mit Hilfe eines Katalysators zu den Oxazolidinonen der Formel (I-A-2a) beziehungsweise Thiazolidinonen der Formel (I-A-3a) beispielsweise analog Chemical Biology & Drug Design 2007, 70, 100-112.

1,3-Oxazolidin-2-one (XXVIII, Q¹=O), die in der präparativen Chemie als Auxiliare (Evans-Auxiliar) bekannt sind, sind kommerziell erhältlich oder durch bekannte Methoden herstellbar.

1,3-Thiazolidin-2-one (XXVIII, Q¹=S) sind kommerziell erhältlich wie zum Beispiel 1,3-thiazolidin-2-one, 5-methyl-1,3-thiazolidin-2-one oder 5,5-dimethyl-1,3-thiazolidin-2-one, oder durch bekannte Methoden herstellbar.

Verfahren Va4 (zur Herstellung von I-A-4)

Die Pyrrolidin-2-one der allgemeinen Formel (I-A-4) können in (I-A-4a) (für n=0) und (I-A-4b) (für n=1) unterteilt werden. Sie können beispielsweise nach Verfahren Va4 hergestellt werden.



5 wobei W, X, Y, z, R², R³, R⁵ und R⁶ die oben angegebene Bedeutung haben.

Die Herstellung der Verbindungen der allgemeinen Formel I-A-4 erfolgt z.B. nach dem in der DE 2650604 beschriebenen Verfahren.

10 Aniline der allgemeinen Formel (IVa) werden durch die Umsetzung von ggf. substituierten Itaconsäuren zu den 5-Oxo-1-arylpyrrolidin-3-carbonsäuren der allgemeinen Formel (XXIX) umgesetzt. Deren Decarboxylierung liefert die 1-Arylpyrrolidine-2-one der allgemeinen Struktur (I-A-4a).


Ein weiteres allgemeines Herstellungsverfahren für die 1-Arylpyrrolidin-2-one besteht in der Umsetzung von Dihydrofuran-2(3H)-on mit Anilinen. Dieses Verfahren ist z.B. in der WO 2004/037787 oder in J. Het. Chem. 3, 311 (1966) beschrieben. Analoge Umsetzungen sind bekannt, z.B. aus Tetrahedron Lett., 1990, 31 (21) 2991.

15 Die Cyclisierung von 4-Chlor-N-Arylbutanamiden zu den 1-Arylpyrrolidin-2-onen ist in einem spanischen Patent, ES 1982-516898, beschrieben.

Verfahren Va5 (zur Herstellung von I-A-5)

Die 2-Imino-1,3-thiazolidine der allgemeinen Formel (I-A-5) können in (I-A-5a) (für n=0) und (I-A-5b) (für n=1) unterteilt werden. Sie können beispielsweise nach Verfahren Va5 hergestellt werden.

- 108 -




wobei W, X, Y, Z, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷ und R¹¹ die oben angegebenen Bedeutungen haben.

Aniline der Formel (IVa) können zu Arylcyanamiden der Formel (XXXa) mit Hilfe von Halocyanverbindungen, wie z.B. mit Bromcyan nach der in US2007/27125 beschriebenen Methode, umgesetzt werden. Alternativ können die Aniline (IVa) erst nach literaturbekannten Methoden in deren Thioharnstoffen umgewandelt werden und diese werden dann zu Arylcyanamiden (XXXa) umgesetzt, zum Beispiel durch Übergangsmetall-katalysierte Reaktionen, wie von S. K. Sahoo in Adv. Synth. and Catal. 2010, 352, 2538-2548, beschrieben. Die Arylcyanamiden (XXXa) können zum Beispiel mit geeigneten Thiiranen reagieren, wie im Patent US5266701, um die unsubstituierten 2-Imino-1,3-thiazolidine (I-A-5') zu bilden. Verbindungen der Formel (I-A-5'a) lassen sich nach literaturbekannten Methoden am Stickstoffatom substituieren, zum Beispiel mit Alkyljodiden wie vom Y. V. Raschkes in J. Org. Chem. USSR (Engl.) 1981, 17, 529-536, beschrieben.

Verfahren Va6 (zur Herstellung von I-A-5)


Alternativ kann die Synthese der 2-Imino-1,3-thiazolidine (I-A-5) nach Verfahren Va6 erfolgen.



Aniline der Formel (IVa) können z.B. mit N-Alkylthiocyanaten zu den Produkten (XXXIa) umgesetzt werden, zum Beispiel in einem Alkohol als Lösungsmittel und mit Salzsäure als saures Medium, wie in US4665083 beschrieben.


5 Verfahren Va7 (zur Herstellung von I-A-5)

Alternativ ist die Synthese der 2-Imino-1,3-thiazolidine (I-A-5) über Thioharnstoffe der Formel (II') nach Verfahren Va7.



- 110 -

wobei W, X, Y, Z, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷ und R¹¹ die oben angegebenen Bedeutungen haben und LG für eine Abgangsgruppe (bevorzugt Halogen und Alkoxy).




Thioharnstoffe der Formel (II') können aus Anilinen (IV) nach literaturbekannten Methoden hergestellt werden, zum Beispiel über Thioharnstoffen (II) und geeignete Alkylierungsmittel oder über alkylierte Aniline und Isothiocyanate, wie zum Beispiel im Patent US6353006. Die anschließende Cyclisierung zu den Thiazolidinen (I-A-5) kann spontan erfolgen oder gegebenenfalls mit Hilfe eines Aktivierungsreagenzien stattfinden. Hierfür können sich Mesylate, Tosylate oder Triflate als Intermediate bilden. Im Patent WO2003/97605 wird die Umsetzung eines Alkohols mit Mesylchlorid in Anwesenheit von Triethylamin und Dichlormethan als Lösungsmittel beschrieben.

Die Reihenfolge der Syntheseschritte ist variabel und so lassen sich z.B. mit 1,2-Dibrommethan (R⁴=R⁵=R⁶=R⁷) nach H. G. Hoker in Synthesis 2009, 7, 1195-1203 die Cyclisierungen zu den Thiazolidinen (I-A-5) direkt aus den Harnstoffen (II) durchführen, ohne die Syntheseintermediaten (II') zu isolieren.

Verfahren Va8 (zur Herstellung von I-A-6)

Die N-Arylpyrrolidin-2-yliden-ethanamine der allgemeinen Formel (I-A-6) können in (I-A-6a) (für n=0) und (I-A-6b) (für n=1) unterteilt werden. Sie können beispielsweise nach Verfahren Va8 hergestellt werden.




wobei W, X, Y, Z und R¹¹ die oben angegebene Bedeutung haben und AG für eine Abgangsgruppe wie Chlorid, Bromid, Iodid, Triflat oder Tosylat beispielsweise steht.

- Die erfindungsgemäßen N-Arylpyrrolidin-2-yliden-ethanamine der allgemeinen Formel (I-A-6a) werden durch die Umsetzung von Anilinen der Formel (IVa) mit Butanamiden der Formel (XXXII) in Gegenwart von Phosphorylchlorid erhalten. Butanamide der Formel (XXXII) sind teilweise kommerziell erhältlich oder können nach bekannten Verfahren hergestellt werden.

Verfahren Vb1 – Vb9 eignen sich zur Darstellung der Ausführungsform I-B der Verbindungen der Formel (I).


Verfahren Vb1 und Vb2 (zur Herstellung von I-B-1)

- Die Imidazolidin-2,4-dione der allgemeinen Formel (I-B-1) können in (I-B-1a) (für n=0) und (I-B-1b) (für n=1) unterteilt werden. Sie können beispielsweise nach Verfahren Vb1 und Verfahren Vb2 hergestellt werden.



wobei W, X, Y, Z, R¹, R⁸ und R⁹ die oben angegebene Bedeutung haben.

- Imidazolidin-2,4-dione der allgemeinen Formel (I-B-1a) können alternativ nach Verfahren Vb1 durch Kondensation von Isocyanaten Formel (IIIa) mit unterschiedlichen α-Aminoestern oder deren Surrogaten z. B. nach J. Med. Chem. 2012, 55, 8225-8235, Synth. Commun. 2010, 40, 1377-1390 oder Tetrahedron Lett. 2012, 53, 5593-5596. Alternativ können α-Aminoester auch in situ durch reduktive Aminierung, wie in J. Org. Chem. 1997, 62, 3230-3235 beschrieben, hergestellt und eingesetzt werden. Desweiteren können Isocyanate der Formel (IIIa) in situ durch Umsetzung mit Phosgen, Diphosgen oder Triphosgen dargestellt werden, wie zum Beispiel in J. Med. Chem. 2012, 55, 8236-8247, in US2011/53947 A1 oder in WO2005/103054 A2 beschrieben, und direkt eingesetzt werden.




Alternativ können die Imidazolidin-2,4-dione der allgemeinen Formel (I-B-1a) nach Verfahren Vb2 durch Kondensation von Isocyanaten der Formel (IIIa) mit Chloracetylchlorid und Aminen (R^1-NH_2) durch Einsatz von Polymerträgern und Mikrowellenbestrahlung nach Tetrahedron Lett. 2004, 45 ,437-440 hergestellt werden.

5 **Verfahren Vb3 (I-B-2)**

Die Oxazolidindione der allgemeinen Formel (I-B-2) können in (I-B-2a) (für $n=0$) und (I-B-2b) (für $n=1$) unterteilt werden. Sie können beispielsweise nach Verfahren Vb3 hergestellt werden.

- 113 -



wobei X, Y, z, R^8 und R^9 die oben angegebene Bedeutung haben, LG für eine Abgangsgruppe wie Chlor, Brom, Iod, Tosylat, Mesylat, Tosylat oder Triflat beispielsweise steht und ALK für eine kleine Alkylgruppe wie Methyl oder Ethyl beispielsweise steht.

5 Aniline der Formel (IVa) können zu den α -Hydroxycarboxamiden der Formel (XXXIII) durch Umsetzung

mit einer α -Hydroxycarbonsäure mit Hilfe eines Chlorierungsmittels wie Thionylchlorid beispielsweise und einer Base wie Triethylamin beispielsweise umgesetzt werden. Alternativ können die Aniline (IVa) aktiviert werden, zum Beispiel mit Trimethylaluminium, und dann mit α -Hydroxycarbonsäureestern zu den Carboxamiden der Formel (XXXIII) umgewandelt werden. α -Hydroxycarboxamide der Formel (XXXIII) können zu den Oxazolidindionen der Formel (I-B-2a) nach literaturbekannten Methoden hergestellt werden, zum Beispiel durch die Umsetzung mit Carbonyldiimidazol in Gegenwart einer Base, beispielsweise analog Bioorg. & Med. Chem 2002, 3267-3276.

Aniline der Formel (IVa) können zu den Carbamaten der Formel (XXXIV) durch Umsetzung mit einem α -Hydroxyester mit Hilfe von Carbonyldiimidazol beispielsweise und einer Base wie Triethylamin beispielsweise umgesetzt werden. Carbamate der Formel (XXXIV) können zu den Oxazolidindionen der Formel (I-B-2a) nach literaturbekannten Methoden hergestellt werden, zum Beispiel durch die Umsetzung mit einer Base wie Natriummethoxid, beispielsweise analog Bioorg. & Med. Chem 2012, 3242-3254.


Aniline der Formel (IVa) können zu den Carboxamiden der Formel (XXXV), durch Umsetzung mit einem Kupplungsreagenz oder einem Chlorierungsmittel umgesetzt werden. Carboxamide der Formel (XXXV) können zu den Oxazolidindionen der Formel (I-B-2a) nach literaturbekannten Methoden hergestellt werden beispielsweise analog Tetrahedron 1999, 193-200, Tetrahedron Letters 2009, 50, 5123-5125 oder Pharmazie 1992, 47, 340.

Allgemeine Synthese von Oxazolidindione sind in JACS 1959, 6498-6503 beschrieben.

Verfahren Vb4 (zur Herstellung von I-B-3)

Die Thiazolidindione der allgemeinen Formel (I-B-3) können in (I-B-3a) (für $n=0$) und (I-B-3b) (für $n=1$) unterteilt werden. Sie können beispielsweise nach Verfahren Vb4 hergestellt werden.

- 115 -




wobei X, Y, z, R³ und R⁴ die oben angegebene Bedeutung haben, LG für eine Abgangsgruppe wie Chlor, Brom, Iod, Tosylat, Mesylat, Triflat beispielsweise steht.

Aniline der Formel (IV) können zu den Carboxamiden der Formel (XXXV) durch Umsetzung mit einem Kupplungsreagenz oder einem Chlorierungsmittel hergestellt werden. Carboxamide der Formel (XXXV) können zu den Thiocyanaten der Formel (XXXVI) durch Umsetzung mit Kaliumthiocyanat beispielsweise. Thiocyanate der Formel (XXXVI) können zu den Thiazolidindionen der Formel (I-B-3a) nach literaturbekannten Methoden hergestellt werden, beispielsweise analog Pharmazie 1992, 47, 340.

Verfahren Vb5 (zur Herstellung von I-B-4)

Die N-Aryl-pyrrolidin-2,5-dione der allgemeinen Formel (I-B-4) können in (I-B-4a) (für n=0) und (I-B-4b) (für n=1) unterteilt werden. Sie können beispielsweise nach Verfahren Vb5 hergestellt werden.

- 116 -



wobei W, X, Y, z, R' und R'' die oben angegebene Bedeutung haben und R⁸ für eine ggf. substituierte Aminogruppe steht.

Die Herstellung der Verbindungen der allgemeinen Formel (I-B-4) erfolgt dadurch, dass man Aniline der Formel (IV) mit Furan-2,5-dionen gemäß Angewandte Makromolekulare Chemie (1988), 157 59-78 oder der US 3853912 in die N-Arylmaleinimide der allgemeinen Formel (I-B-4a) überführt.

Die erfindungsgemäßen N-Aryl-pyrrolidin-2,5-dione der allgemeinen Formel (I-B-4a) bzw. (I-B-4b) werden aus N-Arylmaleinimiden der allgemeinen Formel (XXXVII) durch die Umsetzung mit Aminen der Formel (R⁸-H) erhalten, gegebenenfalls in Anwesenheit eines inerten, organischen Lösungsmittels.


10 Die Reaktion von Maleinimiden mit Aminen ist literaturbekannt, z.B. aus Biochemistry, 1966, 5 (9), 2963–2971 oder J. Org. Chem. (2007), 43(3), 393-396.

Weitere Syntheseverfahren sind z.B. beschrieben in Tetrahedron (1999), 55(40), 11859-11870 oder Acta Chem. Scand. (1999), 53(1), 48-56 oder Indian Drugs (1992), 29(7), 306-307 oder Bioorg. Med. Chem. Lett. (2006), 16(3), 525-528 oder Arzneimittel-Forsch. (2003), 53(4), 280-288.

15 Verfahren Vb6 (zur Herstellung von I-B-4)

Alternativ können die N-Aryl-pyrrolidin-2,5-dione der allgemeinen Formel (I-B-4) nach Verfahren Vb6 hergestellt werden.

- 117 -



wobei W, X, Y und Z die oben angegebene Bedeutung haben.

Die erfindungsgemäßen N-Arylpyrrolidin-2,5-dione der allgemeinen Formel (I-B-4) werden durch die Umsetzung von Anilinen der allgemeinen Formel (IVa) mit 5-Hydroxyfuran-2(5H)-on in Gegenwart eines Lösungsmittels erhalten.


Weitere Syntheseverarianten sind z.B. beschrieben in Bioorg. Med. Chem. Lett. (2012), 22(23), 7019-7023 oder in Tetrahedron Lett. (2010), 51, 2215-2217 oder in Revue Roumaine de Chimie (2005), 50(7-8), 655-661 oder J. Am. Chem. Soc. 1924,46, 2069-2078. (Für $R^2=H$)

Verfahren Vb7 (zur Herstellung von I-B-5 und I-B-7)

- 10 Die 3-Arylimino-1,3-thiazolidin-4-one ($Q^1=S$) der allgemeinen Formel (I-B-5) können in (I-B-5a) (für $n=0$) und (I-B-5b) (für $n=1$) unterteilt werden.

Die 3-Arylimino-1,3-oxazolidin-4-one ($Q^1=O$) der allgemeinen Formel (I-B-7) können in (I-B-7a) (für $n=0$) und (I-B-7b) (für $n=1$) unterteilt werden.

I-B-5 und I-B-7 können beispielsweise nach Verfahren Vb7 hergestellt werden.




wobei W, X, Y, Z, A, R⁸, R⁹ und R¹¹ die oben angegebenen Bedeutungen haben.

Aniline der Formel (IV) können zu den Harnstoffen (Q¹=O) und Thioharnstoffen (Q¹=S) der Formel (II) nach literaturbekannten Methoden umgesetzt werden, zum Beispiel nach JP2011/042611, in dem sie mit Isocyanaten (für Q¹=O) und Isothiocyanaten (für Q¹=S) gegebenenfalls in Anwesenheit einer Base und
5 gegebenenfalls in Anwesenheit eines organischen Lösungsmittels versetzt werden oder in dem sie nach allgemein bekannten Methoden in deren Isocyanaten (Q¹=O) und Isothiocyanaten (Q¹=S) umgewandelt und diese mit Aminen zu den Harnstoffen oder Thioharnstoffen umgesetzt werden.

Aus den Harnstoffen (Q¹=O) und Thioharnstoffen (Q¹=S) der allgemeinen Formel (II) kann die Synthese der 3-Arylimino-1,3-oxazolidin-4-one (Q¹=O) bzw. -thiazolidin-4-one (Q¹=S) der allgemeinen Formel (I-B-
10 7) bzw. (I-B-5) erfolgen, zum Beispiel durch Cycloacylierung mit einem adäquaten Halocarbonylderivaten in einem inerten Lösungsmittel, meistens bei Temperaturen höher als 100 °C. Geeignete Halocarbonylderivaten sind zum Beispiel Chloressigsäure und deren Säurechlorid, Bromessigsäure und deren Säurechlorid oder -bromid; wie von C. F. Howell in J. Org. Chem. 1962, 27, 1691 für Umsetzungen zu Oxazolidinonen und V.N.Britsun in Russ. J. Org. Chem. 2006, 41 (11), 1719-1729 für Thiazolidinonen
15 beschrieben.

Verfahren Vb8 und Vb9 (zur Herstellung von I-B-6)

Die 4-Aryl-1,2,4-triazolidin-3,5-dionen der allgemeinen Formel (I-B-6) bzw. (I-B-6') können in (I-B-6a) bzw. (I-B-6'a) (für n=0) und (I-B-6b) bzw. (I-B-6'b) (für n=1) unterteilt werden. Sie können beispielsweise nach Verfahren Vb8, Vb9 und Vb10 hergestellt werden.



wobei W, X, Y, z, R^1 und R^{10} die oben angegebene Bedeutung haben und ALK und ALK' für eine kleine Alkylgruppe wie Methyl oder Ethyl steht.

4-Aryl-1,2,4-triazolidin-3,5-dione der allgemeinen Formel (I-B-6'a) können alternativ nach Verfahren Vb8 durch Reaktion der Aniline (IVa) mit Chlorameisensäureestern und Semicarbaziden wie zum Beispiel in Synlett 2007, 8, 1255-1256 oder in Synth. Commun. 2007, 37, 1927-1934 beschrieben, hergestellt werden.

Alternativ können 4-Aryl-1,2,4-triazolidin-3,5-dione der allgemeinen Formel (I-B-6'a) durch Kondensation der Aniline (IVa) mit Diharnstoff nach Verfahren Vb8 hergestellt werden, wie zum Beispiel in Phamaceutical Bulletin 1954, 2, 403-411 beschrieben wird.

In Synthesis 1982, 2, 159-160 wird die Synthese von 4-Aryl-1,2,4-triazolidin-3,5-dione der allgemeinen Formel (I-B-6'a) durch Acylierung mit Alkyl-2-(chlorcarbonyl)hydrazincarboxylaten zu Verbindungen der allgemeinen Formel (XXXVIIIa) und anschließender Cyclisierung nach Verfahren Vb9 beschrieben.

Anschließende Alkylierung von (I-B-6'a) mit entsprechenden Alkylierungsmittel R^1-LG^1 bzw. $R^{10}-LG^2$ ergibt 4-Aryl-1,2,4-triazolidin-3,5-dione der allgemeinen Formel (I-B-6a), wobei LG^1 und LG^2 für klassische Abgangsgruppen wie Iodid, Bromid, Chlorid, Tosylat, Mesylat oder Triflat stehen.

Alternativ können 4-Aryl-1,2,4-triazolidin-3,5-dione der allgemeinen Formel (I-B-6'a) nach Verfahren Vb10 durch Cyclisierung von Verbindungen der allgemeinen Formel (XXXVIII'a) hergestellt werden, die wiederum durch Umsetzung der Aniline (IVa) mit Chlorameisensäureestern, substituierten Hydrazinen und

- 120 -


erneuter Acylierung mit Chlorameisensäureestern zugänglich sind.

Anschließende Alkylierung von (I-B-6''a) mit entsprechenden Alkylierungsmittel R^{10} -LG² ergibt 4-Aryl-1,2,4-triazolidin-3,5-dione der allgemeinen Formel (I-B-6a), wobei LG² für klassische Abgangsgruppen wie Iodid, Bromid, Chlorid, Tosylat, Mesylat oder Triflat stehen.

- 5 Verfahren Vc1 – Vc11 eignen sich zur Darstellung der Ausführungsform I-C der Verbindungen der Formel (I).

Verfahren Vc1 & Vc2 (zur Herstellung von I-C-1)


Die 2-Aryl-1,2,4-triazolidin-3,5-dione der allgemeinen Formel (I-C-1) können in (I-C-1a) (für n=0) und (I-C-1b) (für n=1) unterteilt werden.



10


2-Aryl-1,2,4-triazolidin-3,5-dione der allgemeinen Formel (I-C-1''a) bzw. (I-C-1a) können alternativ nach Verfahren Vc1 durch Kondensation von Hydrazinen der Formel (Va) mit Ethylisocyanatocarbonat hergestellt werden, wie zum Beispiel in Monatsh. Chem. 1999, 130, 2, 327-332 beschrieben wird.

Verfahren Vc2




Nach J. Org. Chem. 1991, 56, 5643-5651 können 2-Aryl-1,2,4-triazolidin-3,5-dione der allgemeinen Formel (I-C-1a) alternativ nach Verfahren Vc2 hergestellt werden. Durch Kondensation von Hydrazinen der Formel (Va) mit Chlorameisensäureestern werden die entsprechenden Ethylphenylhydrazincarboxylaten (XXXIXa) erhalten, die anschließend mit Isocyanaten zu den entsprechenden substituierten Ethyl-2-(carbamoyl)-2-phenylhydrazincarboxylaten der allgemeinen Formel (XLa) reagieren und anschließend mit starken Basen wie zum Beispiel Kaliumhydroxid zu den 2-Aryl-1,2,4-triazolidin-3,5-dionen der allgemeinen Formel (I-C-1'a) cyclisiert werden können.

Anschließende Alkylierung mit entsprechendem Alkylierungsmittel R^1-LG^1 ergibt 2-Aryl-1,2,4-triazolidin-3,5-dione der allgemeinen Formel (I-C-1a), wobei LG^1 für eine klassische Abgangsgruppen wie Iodid, Bromid, Chlorid, Tosylat, Mesylat oder Triflat steht. Literaturvorschriften zur Alkylierung finden sich zum Beispiel in J. Org. Chem. 1991, 56, 5643-5651, in Amer. Chem. J. 1910, 43, 532-543 oder in Amer. Chem. J. 1910, 43, 380.

Verfahren Vc3 & Vc4 (zur Herstellung von I-C-1)

2-Aryl-1,2,4-triazolidin-3,5-dione der allgemeinen Formel (I-C-1a) können alternativ nach Verfahren Vc3 durch Umsetzung von Arylhalogeniden der Formel (VIIa) mit Triazolinonen hergestellt werden, wobei R¹ in diesem Fall für Methyl, cyclo-Alkyl-alkyl oder substituiertes Benzyl stehen kann. Bevorzugt findet die Umsetzung durch Übergangsmetall-Katalyse oder –Vermittlung statt, zum Beispiel durch Einsatz von Kupfersalzen wie zum Beispiel Kupfer(I)iodid in Anwesenheit von Liganden wie zum Beispiel N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexandiamin und einer Base wie Kaliumcarbonat in geeigneten Lösungsmitteln wie Dioxan oder Toluol statt.


- 10 Für R¹ = Allyl können 2-Aryl-1,2,4-triazolidin-3,5-dione der allgemeinen Formel (I-C-1a) alternativ nach Verfahren Vc4 durch Umsetzung von Boronsäuren der Formel (VIII) mit Triazolinonen hergestellt werden. Bevorzugt finden die Reaktionen unter Katalyse oder Vermittlung durch Kupfer(II)-salze wie zum Beispiel Kupfer(II)-acetat, unter Luft- oder Sauerstoffatmosphäre, unter wasserentziehenden Bedingungen (zum Beispiel mit Molekularsieb) statt. Als Basen werden zum Beispiel Triethylamin oder Pyridin in geeigneten
- 15 Lösungsmitteln wie zum Beispiel Dichlormethan verwendet.

Verfahren Vc5 & Vc6 (zur Herstellung von I-C-2)

Pyrazol-3,5(2H,4H)-dione der allgemeinen Formel (I-C-2a) können alternativ nach Verfahren Vc5 durch Kondensation von Hydrazinen der Formel (Va) mit Malonsäuren oder Malonsäurediestern hergestellt werden wie zum Beispiel in Helv. Chim. Acta 1953, 36, 75-81, Can. J. of Research, Section B 1950, 28, 720-725 oder Tetrahedron Letters 2010, 51, 5328-5332 beschrieben wird.

Pyrazol-3,5(2H,4H)-dione der allgemeinen Formel (I-C-2a) können alternativ nach Verfahren Vc6 hergestellt werden wie zum Beispiel in Arch. Pharm. 1980, 313, 577-582 beschrieben wird. Hierbei werden durch Kondensation von Hydrazinen der Formel (Va) mit Cyanessigsäuren mit Dicyclohexylcarbodiimid zunächst die jeweiligen 2-Cyan-N'-Arylacetohydrazide erhalten, die unter sauren Bedingungen wie z. B. mit verdünnte Schwefelsäure zu den entsprechenden Iminopyrazolidinonen (XLIa) cyclisiert werden. Hydrolyse mit verdünnter Base wie z. B. Natriumhydroxid liefert Pyrazol-3,5(2H,4H)-dione der allgemeinen Formel (I-C-2'a).

- 124 -



Anschließende Alkylierung mit entsprechendem Alkylierungsmittel R¹-LG¹ ergibt Pyrazol-3,5(2H,4H)-dione der allgemeinen Formel (I-C-2a), wobei LG¹ für eine klassische Abgangsgruppen wie Iodid, Bromid, Chlorid, Tosylat, Mesylat oder Triflat steht. Literaturvorschriften zur Alkylierung finden sich zum Beispiel


5

Verfahren Vc7 und Vc8 (I-C-3)

Für die Herstellung der Imidazolidin-2,4-dione der allgemeinen Formel (I-C-3) können Verfahren Vc7 und Verfahren Vc8 beispielsweise verwendet werden.

Die Imidazolidin-2,4-dione der allgemeinen Formel (I-C-3) können in (I-C-3a) (für n=0) und (I-C-3b) (für n=1) unterteilt werden.

10



wobei W, X, Y, Z, R^2 , R^3 und R^{10} die oben angegebenen Bedeutungen haben, n kann für 0 oder 1 stehen, Hal für Halogen (bevorzugt Chlor und Brom) und LG und LG' für eine Abgangsgruppe (z.B. Halogen, Hydroxy, Alkoxy) stehen.

5 Verfahren Vc7

Aniline der Formel (IVa) können mit adäquaten Halogencarbonylverbindungen nach literaturbekannten Methoden alkyliert werden. Zum Beispiel für $R^2=R^3$ =Wasserstoff kann die Reaktion mit Bromessigsäureethylester nach US2012/277273 erfolgen. Die alkylierten Anilinen der Formel (XLIIa) können mit Isocyanaten oder 4-Nitrophenylalkylcarbamaten zu den Harnstoffen der Formel (II'a), gegebenenfalls mit Hilfe einer Base, umgesetzt werden, wie im US2012/277273. Anschließend erfolgt der

Ringschluss zu den Imidazolidin-2,4-dionen (I), zum Beispiel nach US2012/277273, in dem die alkylierten Harnstoffe (II'a) mit einer Base in einem inerten organischen Lösungsmittel, gegebenenfalls bei erhöhter Temperatur, versetzt werden. Alternativ kann die Cyclisierung durch Versetzung der Harnstoffe (II'a) gegebenenfalls in einem Lösungsmittel mit neutralem Alox.


- 5 Alternativ können die Imidazolidin-2,4-dione der Formel (I) nach *Verfahren Vc8* hergestellt werden, nach WO2006/124118.

Aniline der Formel (IV) können mit adäquaten Nitrilverbindungen zu den Verbindungen (XLIIIa) alkyliert werden. Zum Beispiel für $R^2=R^3=\text{Methyl}$ kann die Reaktion mit 2-Hydroxy-2-methylpropanonitril erfolgen.

- Alternativ kann die Herstellung von den alkylierten Anilinen (XLIIIa) aus den Anilinen (IVa) durch
10 Reaktion mit einer Cyanidquelle und einem Keton, z.B. mit Kaliumcyanid und Aceton in Essigsäure wie im
Bull. Chem. Soc. Japan 1926, 1, 202. Die alkylierten Anilinen der Formel (XLIIIa) können mit
Isothiocyanaten zu den 3-Aryl-5-imino-imidazolidinthionen der Formel (XLIVa), gegebenenfalls mit Hilfe
einer Base, in einem inerten organischen Lösungsmittel, umgesetzt werden, wie im US2012/277273. Die
Imidazolidinthione (XLIVa) können zu den Imidazolidinonen (XLVa) führen, wenn sie mit einer Säure
15 (beispielsweise Salzsäure) behandelt werden. Anschließend durch Reaktion mit einem Oxidationsmittel
können die Imidazolidinonen (XLVa) in den Imidazolidindionen (I-C-3a) umgewandelt werden.

Verfahren Vc9 (zur Herstellung von I-C-3)

Imidazolidin-2,4-dione der Formel (I-C-3), wo R⁴ für Wasserstoff steht, können auch nach Verfahren Vc9 hergestellt werden.




Aniline der Formel (IVa) können zu den 2-*N*-Trichloroacetylaminoacetamiden der Formel (XLVIa) nach literaturbekannten Methoden umgesetzt werden, zum Beispiel nach Tetrahedron 2012, 68, 2621-2629. Dafür

wird das benötigte Aldehyd mit dem Anilin (IVa) versetzt, zum Beispiel in Methanol bei Raumtemperatur, und das resultierende Imin wird mit einem Isocyanid und Trichloressigsäure umgesetzt. Aus den 2-N-Trichloroacetylaminoacetamiden (XLVIa) lassen sich die Imidazolidin-2,4-dione der allgemeinen Formel (I-C-3a) herstellen, zum Beispiel durch Reaktion mit Natriummethanolat in Methanol, wie im oben genannten Artikel beschrieben.

Verfahren Vc10 (zur Herstellung von I-C-4)

Die 5-Thioxo-1,2,4-triazolidin-3-one der allgemeinen Formel (I-C-4) können in (I-C-4a) (für n=0) und (I-C-4b) (für n=1) unterteilt werden und können beispielsweise nach Verfahren Vc10 hergestellt werden.



10 wobei W, X, Z, z, R^1 und R^{10} die oben angegebene Bedeutung haben.

Durch die Umsetzung von Hydrazinen der allgemeinen Formel (Va) mit Isocyanaten ($R^{10}-NCO$) werden die Semicarbazide der Formel (XLVII) erhalten, die durch die anschließende Umsetzung mit z.B. 1,1'-Thiocarbonyldiimidazol in die 1-Aryl-5-thioxo-1,2,4-triazolidin-3-one der Formel (I-C-4a) umgewandelt werden.

15 Die Herstellung der Semicarbazide der Formel (XLVII) erfolgt nach Verfahren, die z.B. in Rec. Trav. Chim. 52, 979 (1933) oder in den Chem. Ber. 36, 1362 (1903) beschrieben werden.

Ein weiteres Herstellverfahren für 1-Aryl-5-thioxo-1,2,4-triazolidin-3-one besteht in der selektiven Umwandlung einer Carbonylgruppe entsprechender 1-Aryl-1,2,4-triazolin-3,5-dione in die Thiocarbonylgruppe mit Hilfe geeigneter Schwefelungsreagenzien wie beispielsweise Phosphorpentasulfid

- 128 -

oder Lawessons Reagenz in einem geeigneten Lösungsmittel, beispielsweise Xylol oder Cumol. Dieses Verfahren ist z.B. in der DE 2554866 beschrieben.

Die Synthese von 1-Aryl-1,2,4-triazolin-3,5-dionen durch die Umsetzung von 1-Alkoxycarbonyl-Hydrazinen mit Isocyanaten ist ebenfalls in der DE 2554866 beschrieben. Die Verwendung von
5 Isothiocyanaten liefert die entsprechenden 1-Aryl-5-thioxo-1,2,4-triazolidin-3-one.

In Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft (1910),42, 4763-4769 und (1911),44, 560-583 werden 1-Aryl-5-thioxo-1,2,4-triazolidin-3-one durch die Umsetzung spezieller Thiosemicarbazide mit Phosgen hergestellt.

Die Herstellung und Verwendung von 1-Aryl-1,2,4-triazolin-3,5-dionen als Herbizide und Insektizide
10 werden in der WO 9726248 beschrieben.


Die Herstellung weiterer 1-Aryl-1,2,4-triazolin-3,5-dion-Vorstufen wird auch beschrieben in der US 3663564 und der US 3621099.

Verfahren Vc11 (zur Herstellung von I-C-5 und I-C-6)

Die 1-Aryl-5-Thioxo-1,2,4-triazolidin-3-one der allgemeinen Formel (I-C-5) können in (I-C-5a) (für n=0)
15 und (I-C-5b) (für n=1) unterteilt werden und können beispielsweise nach Verfahren Vc11 hergestellt werden.

1-Aryl-1,2,4-triazolidin-3,5-dithione der allgemeinen Formel (I-C-6) können in (I-C-6a) (für n=0) und (I-C-6b) (für n=1) unterteilt werden und können beispielsweise nach Verfahren Vc11 hergestellt werden.

- 129 -



wobei W, X, Z, z, R^1 und R^{10} die oben angegebene Bedeutung haben.

Durch die Umsetzung von Hydrazinen der allgemeinen Formel (Va) mit Isothiocyanaten ($R^{10}-NCS$) werden die Thiosemicarbazide der allgemeinen Formel (XLVIIIa) erhalten, die durch die anschließende
 5 Umsetzung mit z.B. 1,1'-Carbonyldiimidazol in die 1-Aryl-5-Thioxo-1,2,4-triazolidin-3-one der Formel (I-C-5a) oder durch die anschließende Umsetzung mit z.B. 1,1'-Thiocarbonyldiimidazol in die 1-Aryl-1,2,4-triazolidin-3,5-dithione der Formel (I-C-6a) umgewandelt werden.

Die Herstellung der Thiosemicarbazide der Formel (XLVIII) erfolgt nach Verfahren, die z.B. in Rec. Trav. Chim. **55**, 101 (1936), in J. Am. Chem. Soc. 1552 (1931) oder in den Chem. Ber. **34**, 320 (1901)
 10 beschrieben werden.

Ein weiteres allgemeines Herstellverfahren für die 2-Aryl-5-thioxo-1,2,4-triazolidin-3-one und der 2-Aryl-1,2,4-triazolidin-3,5-dithione besteht in der selektiven Umwandlung einer Carbonylgruppe entsprechender 1-Aryl-1,2,4-triazolin-3,5-dione in die Thiocarbonylgruppe mit Hilfe geeigneter Schwefelungsreagenzien wie beispielsweise Phosphorpentasulfid oder Lawssons Reagenz in einem geeigneten Lösungsmittel,
 15 beispielsweise Xylol oder Cumol. Dieses Verfahren ist z.B. in der DE 2554866 beschrieben.

Die Synthese der entsprechenden 1-Aryl-1,2,4-triazolin-3,5-dione durch die Umsetzung von 1-Alkoxy-carbonyl-Hydrazinen mit Isocyanaten ist ebenfalls in der DE 2554866 beschrieben. Die Verwendung von 1-Alkoxythiocarbonyl-Hydrazinen ergibt 1-Aryl-5-thioxo-1,2,4-triazolidin-3-one.


In Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft (1910), 42, 4763-4769 und (1911), 44, 560-583 werden die 1-Aryl-5-thioxo-1,2,4-triazolidin-3-one durch die Umsetzung spezieller Thiosemicarbazide mit Phosgen hergestellt.

Durch Oxidation der Thioether der Formel (I-C-5a) bzw. (I-C-6a) nach literaturbekannten Methoden werden die Sulfoxide der Formel (I-C-5b) bzw. (I-C-6b) erhalten.

Verfahren Vd1 – Vd3 eignen sich zur Darstellung der Ausführungsform I-D der Verbindungen der Formel (I).

Verfahren Vd1 (I-D-1)

Die 3-Arylimidazolidin-2,4,5-trione der allgemeinen Formel (I-D-1) können in (I-D-1a) (für n=0) und (I-D-1b) (für n=1) unterteilt werden und können beispielsweise nach Verfahren Vd1 hergestellt werden.



Die Herstellung von Phenylharnstoffen der Formel (II, $Q^1=O$) erfolgt nach literaturbekannten Methoden, beispielsweise beschrieben im Patent JP2011/042611.


Durch die Umsetzung von Phenylharnstoffen der Formel (II) mit Oxalylchlorid werden die 1-R-3-Arylimidazolidin-2,4,5-trione der Formel (I-D-1) erhalten, in Analogie zu den Vorschriften aus J. Korean Chem. Soc. (1999), 43(4), 491-493 oder JP 1976-92865 oder Tetrahedron Lett. 2012, 53, 4758-4762.

Weitere Syntheseverfahren sind beschrieben in Synthesis (1977), (9), 641-2 oder Liebigs Ann. Chem. (1927), 458, 76-92 oder Recl. Trav. Chim. Pays-Bas (1915), 34 289-325 oder J. Fluorine Chem. 2011,132, 596-611 oder Bioorg. Med. Chem. Lett. (2009), 19(9), 2570-2573 oder Asian J. Chem. (2007), 19(2), 1455-1460 oder J. Het. Chem. 2003, 40(5), 885-893 oder US 20030119889 oder US 20030119890 oder J. Het. Chem. (1994), 31(6), 1535-9 oder J. Het. Chem. (1971), 8(4), 669-70 oder Pharmazie (1990), 45(10), 795-6 oder Zeitschrift f. Chemie (1989), 29(8), 281-3 oder J. Org. Chem., 1979, 44 (22), 3858-3861 oder Synthesis (1977), (9), 641-2 oder in der DE 1969-1916932 bzw. der DE 19660523.

Einige 3-Arylimidazolidin-2,4,5-trione sind auch kommerziell erhältlich, z.B. 1-[3 (Methylsulfonyl)phenyl]imidazolidin-2,4,5-trion [CAS-RN: 1152595-83-9] .

10 Verfahren Vd2 (zur Herstellung von I-D-2)

Die Pyrrolidin-2,3,5-trione der allgemeinen Formel (I-D-2) können in (I-D-2a) (für n=0) und (I-D-2b) (für n=1) unterteilt werden. Sie können beispielsweise nach Verfahren Vd2 hergestellt werden




wobei W, X, Y, Z, R⁸ und R⁹ die oben angegebenen Bedeutungen haben und LG für OH oder Halogen (insbesondere Chlor) steht.

Aniline der Formel (IV) können mit Carbonsäuren oder Carbonsäurederivaten (insbesondere Chloride) zu den Amiden der Formel (XLIX) umgesetzt werden, gegebenenfalls in Anwesenheit einer Base und gegebenenfalls in Anwesenheit eines organischen Lösungsmittels, wie zum Beispiel von G. S. Skinner in J. Amer. Chem. Soc. 1950, 72, 5569-5573, beschrieben. Die Amiden (XLIX) können zum Beispiel mit Oxalylchlorid oder Oxalsäurediethylester versetzt werden, um die Pyrrolidin-2,3,5-trionen (I) zu liefern.

Wie von G. S. Skinner beschrieben, kann die Umsetzung in einem inerten organischen Lösungsmittel wie Toluol bei 60 °C erfolgen. Alternativ, und je nach Natur der R⁸ und R⁹ Reste, können die Amiden (XLIX) mit Oxalsäurediethylester zu Oxazolidindionen führen, die dann in einem Alkohol zu den gewünschten Pyrrolidintrionen der Formel (I-D-2) umlagern. Dies wurde vom G. S. Skinner in J. Amer. Chem. Soc. 1956, 77, 4656-4659, veröffentlicht.

Verfahren Vd3 (zur Herstellung von I-D-3)

Die 2-Thioxoimidazolidin-4,5-dione der allgemeinen Formel (I-D-3) können in (I-D-3a) (für n=0) und (I-D-3b) (für n=1) unterteilt werden. Sie können beispielsweise nach Verfahren Vd3 hergestellt werden.



10 wobei W, X, Y, Z, A und R¹⁰ die oben angegebenen Bedeutungen haben.

Aniline der Formel (IV) können zu den Thioharnstoffen der Formel (II) nach literaturbekannten Methoden umgesetzt werden, zum Beispiel nach JP2011/042611, in dem sie mit Isothiocyanaten, gegebenenfalls in Anwesenheit einer Base und gegebenenfalls in Anwesenheit eines organischen Lösungsmittels, versetzt werden oder in dem sie nach allgemein bekannten Methoden in deren Isothiocyanaten umgewandelt und diese dann mit Aminen zu den Thioharnstoffen umgesetzt werden.

Aus den Thioharnstoffen der allgemeinen Formel (II) kann die Synthese der 2-Thioxoimidazolidin-4,5-dione der allgemeinen Formel (I-D-3a) bzw. (I-D-3b) erfolgen, zum Beispiel durch Umsetzung mit Oxalsäuredichlorid oder Oxalsäureethylesterchlorid in einem inerten Lösungsmittel, wie Chloroform, Dichlormethan oder Acetonitril, gegebenenfalls bei erhöhter Temperatur. Beispiele solcher Reaktionen finden sich unter anderem in J. Med. Chem. 2004, 47, 681-695 und US2003/119889.

Reaktionen in der Mikrowelle

Bei der Durchführung der erfindungsgemäßen Verfahren kann gegebenenfalls jede für diese Reaktionen geeignete, handelsübliche Mikrowellenapparatur verwendet werden (z.B. Anton Paar Monowave 300, CEM Discover S, Biotage Initiator 60).

5 Thionierung

Ein weiteres allgemeines Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemäßen Verbindungen der allgemeinen Formel (Ia) oder (Ib), in denen V für Schwefel steht, besteht in der Umwandlung der Carbonylgruppe entsprechender Vorstufen in die Thiocarbonylgruppe mit Hilfe geeigneter Schwefelungsreagenzien wie beispielsweise Phosphorpentasulfid oder Lawessons Reagenz in einem geeigneten Lösungsmittel, 10 beispielsweise Pyridin, Xylol oder Cumol. Diese Variante ist in zahlreichen Publikationen beschrieben, z.B. in J. Amer. Chem. Soc. 1956, 1938-1941, Chem. Pharm. Bull. 1962, 10, 647-652, US 3007927, DE 2554866 oder WO 2000026194.

Allgemeine Herstellverfahren für die Oxidation von Thioethern zu Sulfoxiden

Verbindungen der allgemeinen Formel (Ib) lassen sich durch Oxidation nach literaturbekannten Verfahren 15 aus Verbindungen der allgemeinen Formel (Ia) herstellen, beispielsweise durch ein Oxidationsmittel in einem geeignetem Lösungs- und Verdünnungsmittel. Als Oxidationsmittel eignen sich zum Beispiel verdünnte Salpetersäure, Wasserstoffperoxid und Peroxycarbonsäuren, wie etwa *meta*-Chlorperbenzoesäure. Als Lösungsmittel eignen sich inerte organische Lösungsmittel, typischerweise Acetonitril und halogenierte Lösungsmittel wie Dichlormethan, Chloroform oder Dichlorethan.


20 Zur Erzeugung enantiomeren angereicherten Sulfoxide eignen sich eine Vielfalt von Methoden, wie von A.R. Maguire in ARKIVOC, 2011(i), 1-110, beschrieben: metall-katalysierte asymmetrische Oxidationen von Thioethern, zum Beispiel mit Titatium und Vanadium als meistbenutzten Katalysatorquellen, in Form von $\text{Ti}(\text{O}^i\text{Pr}_4)$ und $\text{VO}(\text{acac})_2$, zusammen mit einem chiralen Liganden und einem Oxidationsmittel wie tert-Butylwasserstoffperoxid (TBHP), 2-Phenylpropan-2-ylhydroperoxid (CHP) oder Wasserstoffperoxid; nicht- 25 metall katalysierte asymmetrische Oxidationen durch Verwendung von chiralen Oxidationsmitteln oder chiralen Katalysatoren; elektrochemische oder biologische asymmetrische Oxidationen sowie kinetische Resolution von Sulfoxiden und nukleophile Versetzung (nach Andersens Methode).

Die Enantiomere können auch aus dem Racemat gewonnen werden, in dem sie zum Beispiel präparativ auf einer chiralen HPLC getrennt werden.

Erläuterung der Ausgangsstoffe und Zwischenprodukte

Aniline der Formel (IV), der Halogenide der Formel (VII), Boronsäuren der Formel (VIII), Hydrazine der Formel (V) und Isocyanate der Formel (III) sind zentrale Bausteine um die Verbindungen der Formel (I) herzustellen.


- 5 Die *Aniline der allgemeinen Formel (IV)* lassen sich in Verbindungen mit $n=0$ (IVa) und $n=1$ (IVb) unterteilen.



Aniline der Formel (IVa) sind teilweise literaturbekannt, z.B. aus JP 2007/284356, oder können anhand literaturbekannter Verfahren synthetisiert werden, insbesondere nach den in den Herstellbeispielen genannten Bedingungen.

Die Verbindungen der Formel (IVb) sind neu und lassen sich durch Oxidation, insbesondere nach den in den Herstellbeispielen genannten Bedingungen, herstellen.

Die Aniline der allgemeinen Formel (IVa) können beispielsweise wie im folgenden Schema hergestellt werden.



wobei X, Y, Z und W die oben angegebenen Bedeutungen haben, AG für eine Abgangsgruppe und PG für


eine Schutzgruppe steht.

Aniline der Formel (XIV) sind entweder kommerziell erhältlich oder können durch bekannte Methoden hergestellt werden. Sie können mit einer geeigneten Schutzgruppe, wie z.B. einer Acetylgruppe, zu Verbindungen der Formel (XIII) geschützt werden. Beispielsweise in Gegenwart von Säuren, 5 Säureanhydriden oder Säurechloriden können die Aniline (XIV) in die entsprechenden Anilide (XIII) überführt werden. Die Chlorsulfonierung der geschützten Aniline (XIII) mit Chlorsulfonsäure liefert die entsprechenden Sulfonylchloride (XII). Die Reduktion der Sulfonylchloride (XII) in die Disulfide (XI) ist mit literaturbekannten Methoden wie zum Beispiel Eisen in Salzsäure oder Iodid möglich. Die Umsetzung der Disulfide (XI) mit Haloalkylelektrophilen der Formel (XV), wobei AG für eine Abgangsgruppe wie zum 10 Beispiel Chlor, Brom, Tosylat, Mesylat oder Triflat steht, liefert die Sulfide (X). Die Schutzgruppe kann durch geeignete literaturbekannte Methoden abgespalten werden, so dass man Aniline der Formel (IVa) erhält.

Anstatt der Reduktion zum Disulfid (XI), kann das Sulfonylchlorid (XII) mit einem geeigneten Reduktionsmittel wie zum Beispiel Iod/Phosphor zum Alkylthioat (XVII) reduziert und anschließend durch 15 eine geeignete Methode, wie zum Beispiel die Umsetzung mit Kaliumhydroxidlösung, zu Thiolen der Formel (XVI) entschützt werden. Die Umsetzung der Thiole (XVI) mit Haloalkylelektrophilen der Formel (XV), wobei AG für eine Abgangsgruppe wie zum Beispiel Chlor, Brom, Tosylat, Mesylat oder Triflat steht, liefert die Sulfide (IVa).

Die Verbindungen der Formel (X), (XI), (XII), (XIII), (XVI) und (XVII) sind neu und lassen sich 20 insbesondere nach den in den Herstellbeispielen genannten Bedingungen herstellen.


Ebenfalls bevorzugt können die Thioether der Formel (IVa) alternativ nach folgendem Schema hergestellt werden,



wobei X, Y, Z und W die oben angegebenen Bedeutungen haben, AG für eine Abgangsgruppe und PG für eine Schutzgruppe steht.


Die Chlorsulfonierung der Nitroaromaten der Formel (XXI) mit Chlorsulfonsäure liefert die entsprechenden
 5 Sulfonylechloride (XX). Die Reduktion der Sulfonylechloride (XX) in die Bis(nitroaryl)disulfide (XIX) ist mit
 literaturbekannten Methoden, wie zum Beispiel Iodid, möglich. Die Reduktion der Disulfide (XXI) in die
 Disulfanediyl dianiline (XIX), die teilweise als Gemisch mit den entsprechenden Aminoarylthiolen (XVI)
 entstehen, ist mit allgemein bekannten Reduktionsmittel, wie zum Beispiel Wasserstoff, gegebenenfalls mit
 Hilfe heterogener Katalysatoren, wie zum Beispiel Raney-Nickel, Platin auf Aktivkohle oder Palladium auf
 10 Aktivkohle, möglich. Die Umsetzung der Disulfide (XVIII) bzw. Thiophenole (XVI) mit
 Haloalkylelektrophilen der Formel (XV), wobei AG für eine Abgangsgruppe wie zum Beispiel Chlor,
 Brom, Iod, Tosylat, Mesylat oder Triflat steht, liefert die 3-[(2,2,2-Trifluorethyl)sulfanyl]aniline der Formel
 (IVa).

Die Verbindungen der Formel (XVI), (XVIII), (XIX) und (XX) sind neu und lassen sich insbesondere nach
 15 den in den Herstellbeispielen genannten Bedingungen herstellen.


Halogenide der allgemeinen Formel (VIIa)

in welcher X, Y, Z und W die oben angegebenen Bedeutungen haben und Hal für Chlor, Brom oder Iod steht, sind literaturbekannt aus WO 2007/034755, JP 2007/081019, JP 2007/284385, JP 2008/260706, JP 2008/308448, JP 2009/023910 oder WO 2012/176856 oder können anhand literaturbekannter Verfahren synthetisiert werden, die gegebenenfalls geringfügig modifiziert sein können, insbesondere wie in den konkreten Synthesebeispielen beschrieben.


Als Ausgangsstoffe für die Synthese der Iodide der allgemeinen Formel (VIIa) eignen sich Bromide derselben Formel, zum Beispiel in Halogen austauschreaktionen nach literaturbekannten Methoden gegebenenfalls unter Metallkatalyse (s. H. Suzuki, Chem. Let. 1985, 3, 411-412; S. L. Buchwald, J. Amer. Chem. Soc. 2002, 124 (50), 14844-14845). Ebenso ist die Synthese möglich ausgehend von Anilinen der Formel (IVa) unter Sandmeyers Reaktionsbedingungen, wie von E. B. Merkushev in Synthesis 1988, 12, 923-937, beschrieben.

Boronsäuren der allgemeinen Formel (VIIIa) und (VIIIb)

in welcher X, Y, Z und W die oben angegebenen Bedeutungen haben, sind literaturbekannt, z.B. aus WO2007/034755, JP2007/284385, JP2009/023910 und WO2012/176856 oder können anhand literaturbekannter Verfahren synthetisiert werden, insbesondere wie in den konkreten Synthesebeispielen beschrieben.


Hydrazine der allgemeinen Formel (Va)

Hydrazine der allgemeinen Formel (Va) sind teilweise literaturbekannt, zum Beispiel aus EP 1803712 A1 und WO 2006043635, oder können anhand literaturbekannter Verfahren synthetisiert werden, wie zum Beispiel in J. Med. Chem. 2003, 46, 4405-4418 beschrieben.


Isocyanate der Formel (IIIa)

Isocyanate der allgemeinen Formel (IIIa) sind teilweise literaturbekannt, zum Beispiel aus JP 2011/042611 A, oder können anhand literaturbekannter Verfahren synthetisiert werden, wie zum Beispiel in EP 1183229 B1, in J. Amer. Chem. Soc. 1940, 62, 2965-2966, in Angew. Chem. 1995, 107, 2746-2749 oder in US2010/160388 A1 beschrieben, insbesondere wie in den konkreten Synthesebeispielen beschrieben.


- 139 -

Heterocyclischen Verbindungen der Formel (XXII)


in welcher A und B die vorstehende Bedeutung aufweisen sind kommerziell erhältlich, literaturbekannt oder können anhand literaturbekannter Verfahren synthetisiert werden. Als Beispiele werden die
5 unterschiedlichen heterocyclischen Verbindungen in ihre Subklassen unterteilt und dort genannt.

Imidazolidin-2,4-dione der allgemeinen Formel (XXII-B-1)

Imidazolidin-2,4-dione der allgemeinen Formel (XXII-B-1) sind kommerziell erhältlich, literaturbekannt oder können anhand literaturbekannter Verfahren synthetisiert werden. Als Beispiel sei genannt: 1,5,5-
10 Trimethylimidazolidin-2,4-dion (kommerziell erhältlich)


Pyrrolidin-2,5-dione der allgemeinen Formel (XXII-B-4)

Pyrrolidin-2,5-dione der allgemeinen Formel (XXII-B-4) sind kommerziell erhältlich, literaturbekannt oder können anhand literaturbekannter Verfahren synthetisiert werden. Als Beispiel sei genannt: Pyrrolidin-2,5-
15 dion (kommerziell erhältlich)

1,2,4-Triazolidin-3,5-dione der allgemeinen Formel (XXII-C-1)

(XXII-C-1)

1,2,4-Triazolidin-3,5-dione der allgemeinen Formel (XXII-C-1) sind kommerziell erhältlich, literaturbekannt oder können anhand literaturbekannter Verfahren synthetisiert werden (siehe auch
 5 Synthesebeispiele). Als Beispiele seien genannt: 4-Methyl-1,2,4-triazolidin-3,5-dion, [16312-79-1] (kommerziell erhältlich), 4-Ethyl-1,2,4-triazolidin-3,5-dion (siehe zum Beispiel Bioorg. Med. Chem. 2010, 18, 1573-1582), 1,4-Diethyl-1,2,4-triazolidin-3,5-dion (siehe zum Beispiel J. Org. Chem. 1986, 51, 1719-1723; J. Org. Chem. 1973, 38, 2442-2446; siehe Synthesebeispiele), 1-Ethyl-4-phenyl-1,2,4-triazolidin-3,5-dion (siehe zum Beispiel JP 53053655 A; WO 2012149335 A2; siehe Synthesebeispiele), 1-Benzyl-4-methyl-1,2,4-triazolidin-3,5-dion (siehe zum Beispiel WO 2012149335 A2), 1-Ethyl-4-methyl-1,2,4-triazolidin-3,5-dion (siehe zum Beispiel JP 53053655 A; WO 2012149335 A2), 2,5-Difluor-4-(4-methyl-3,5-dioxo-1,2,4-triazolidin-1-yl)benzonitril (siehe zum Beispiel WO 9726248 A1), 1-(Cyclohex-2-en-1-yl)-4-methyl-1,2,4-triazolidin-3,5-dion (siehe zum Beispiel Org. Lett. 2000, 2, 1295-1297; J. Org. Chem. 1980, 45, 3472-3476), 1,4-Dimethyl-1,2,4-triazolidin-3,5-dion (siehe zum Beispiel Arch. Pharm. 1971, 304, 706-712; J. Org. Chem. 1991, 56, 5643-5651), 1-Allyl-4-methyl-1,2,4-triazolidin-3,5-dion (siehe zum Beispiel J. Org. Chem. 1981, 46, 614-9), 4-Cyclopropyl-1-isobutyl-1,2,4-triazolidin-3,5-dion, 4-tert-Butyl-1-methyl-1,2,4-triazolidin-3,5-dion, 4-tert-Butyl-1-ethyl-1,2,4-triazolidin-3,5-dion, 1-Cyclopentyl-4-methyl-1,2,4-triazolidin-3,5-dion, 1-Ethyl-4-isopropyl-1,2,4-triazolidin-3,5-dion, 1-Benzyl-4-cyclopropyl-1,2,4-triazolidin-3,5-dion, 4-Isopropyl-1-methyl-1,2,4-triazolidin-3,5-dion, 1-Methyl-4-[3-(trifluormethyl)phenyl]-1,2,4-triazolidin-3,5-dion, 4-Cyclopropyl-1-isopropyl-1,2,4-triazolidin-3,5-dion, 4-Cyclopropyl-1,2,4-triazolidin-3,5-dion, 1-Isopropyl-4-methyl-1,2,4-triazolidin-3,5-dion, 1-sec-Butyl-4-cyclopropyl-1,2,4-triazolidin-3,5-dion, 4-Ethyl-1-methyl-1,2,4-triazolidin-3,5-dion.

2,4-Dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one

25 2,4-Dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one sind kommerziell erhältlich, literaturbekannt oder können anhand literaturbekannter Verfahren synthetisiert werden. Als Beispiele seien genannt: 4-Allyl-5-methoxy-2,4-

dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-on (siehe zum Beispiel US5541337 A1; EP 507171 A1), 4-Cyclopropyl-5-methoxy-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-on (siehe zum Beispiel US5541337 A1; EP 507171 A1; WO 2010063402 A1), 5-(Allyloxy)-4-cyclopropyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-on (siehe zum Beispiel US5541337 A1), 5-(Cyclopropylmethoxy)-4-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-on, 5-[(2-Chlorbenzyl)oxy]-4-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-on.

Verwendung

Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe eignen sich bei guter Pflanzenverträglichkeit, günstiger Warmblüttoxizität und guter Umweltverträglichkeit zum Schutz von Pflanzen und Pflanzenorganen, zur Steigerung der Ernteerträge, Verbesserung der Qualität des Erntegutes und zur Bekämpfung von tierischen Schädlingen, insbesondere Insekten, Spinnentieren, Helminthen, Nematoden und Mollusken, die in der Landwirtschaft, im Gartenbau, bei der Tierzucht, in Forsten, in Gärten und Freizeiteinrichtungen, im Vorrats- und Materialschutz sowie auf dem Hygienesektor vorkommen. Sie können vorzugsweise als Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Sie sind gegen normal sensible und resistente Arten sowie gegen alle oder einzelne Entwicklungsstadien wirksam. Zu den oben erwähnten Schädlingen gehören:

15 Aus der Ordnung der Anoplura (Phthiraptera) z.B. *Damalinia* spp., *Haematopinus* spp., *Linognathus* spp., *Pediculus* spp., *Trichodectes* spp..

Aus der Klasse der Arachnida z.B. *Acarus* spp., *Aceria sheldoni*, *Aculops* spp., *Aculus* spp., *Amblyomma* spp., *Amphitetranynchus viennensis*, *Argas* spp., *Boophilus* spp., *Brevipalpus* spp., *Bryobia praetiosa*, *Choriopetes* spp., *Dermanyssus gallinae*, *Eotetranychus* spp., *Epitrimerus pyri*, *Eutetranychus* spp., *Eriophyes* spp., *Halotydeus destructor*, *Hemitarsonemus* spp., *Hyalomma* spp., *Ixodes* spp., *Latrodectus mactans*, *Metatetranychus* spp., *Nuphessa* spp., *Oligonychus* spp., *Ornithodoros* spp., *Panonychus* spp., *Phyllocoptruta oleivora*, *Polyphagotarsonemus latus*, *Psoroptes* spp., *Rhipicephalus* spp., *Rhizoglyphus* spp., *Sarcoptes* spp., *Scorpio maurus*, *Stenotarsonemus* spp., *Tarsonemus* spp., *Tetranychus* spp., *Vasates lycopersici*.

25 Aus der Klasse der Bivalva z.B. *Dreissena* spp.

Aus der Ordnung der Chilopoda z.B. *Geophilus* spp., *Scutigera* spp.

Aus der Ordnung der Coleoptera z.B. *Acalymma vittatum*, *Acanthoscelides obtectus*, *Adoretus* spp., *Agelastica alni*, *Agriotes* spp., *Amphimallon solstitialis*, *Anobium punctatum*, *Anoplophora* spp., *Anthonomus* spp., *Anthrenus* spp., *Apion* spp., *Apogonia* spp., *Atomaria* spp., *Attagenus* spp., *Bruchidius obtectus*, *Bruchus* spp., *Cassida* spp., *Cerotoma trifurcata*, *Ceutorrhynchus* spp., *Chaetocnema* spp., *Cleonus mendicus*, *Conoderus* spp., *Cosmopolites* spp., *Costelytra zealandica*, *Ctenicera* spp., *Curculio* spp.,

- 142 -

- Cryptorhynchus lapathi, Cyllindrocopturus spp., Dermestes spp., Diabrotica spp., Dichocrocis spp., Diloboderus spp., Epilachna spp., Epitrix spp., Faustinus spp., Gibbium psylloides, Hellula undalis, Heteronychus arator, Heteronyx spp., Hylamorpha elegans, Hylotrupes bajulus, Hypera postica, Hypothenemus spp., Lachnosterna consanguinea, Lema spp., Leptinotarsa decemlineata, Leucoptera spp., Lissorhoptrus oryzophilus, Lixus spp., Luperodes spp., Lyctus spp., Megascelis spp., Melanotus spp., Meligethes aeneus, Melolontha spp., Migdolus spp., Monochamus spp., Naupactus xanthographus, Niptus hololeucus, Oryctes rhinoceros, Oryzaephilus surinamensis, Oryzaphagus oryzae, Otiorrhynchus spp., Oxycetonia jucunda, Phaedon cochleariae, Phyllophaga spp., Phyllotreta spp., Popillia japonica, Premnotrypes spp., Psylliodes spp., Ptinus spp., Rhizobius ventralis, Rhizopertha dominica, Sitophilus spp., Sphenophorus spp., Sternechus spp., Symphyletes spp., Tanymericus spp., Tenebrio molitor, Tribolium spp., Trogoderma spp., Tychius spp., Xylotrechus spp., Zabrus spp.

Aus der Ordnung der Collembola z.B. Onychiurus armatus.

Aus der Ordnung der Diplopoda z.B. Blaniulus guttulatus.

- Aus der Ordnung der Diptera z.B. Aedes spp., Agromyza spp., Anastrepha spp., Anopheles spp., Asphondylia spp., Bactrocera spp., Bibio hortulanus, Calliphora erythrocephala, Ceratitis capitata, Chironomus spp., Chrysomya spp., Cochliomyia spp., Contarinia spp., Cordylobia anthropophaga, Culex spp., Cuterebra spp., Dacus oleae, Dasyneura spp., Delia spp., Dermatobia hominis, Drosophila spp., Echinocnemus spp., Fannia spp., Gastrophilus spp., Hydrellia spp., Hylemyia spp., Hyppobosca spp., Hypoderma spp., Liriomyza spp., Lucilia spp., Musca spp., Nezara spp., Oestrus spp., Oscinella frit, Pegomyia spp., Phorbia spp., Prodiptosis spp., Psila rosae, Rhagoletis spp., Stomoxys spp., Tabanus spp., Tannia spp., Tetanops spp., Tipula spp.

Aus der Klasse der Gastropoda z.B. Arion spp., Biomphalaria spp., Bulinus spp., Deroceras spp., Galba spp., Lymnaea spp., Oncomelania spp., Pomacea spp., Succinea spp.

- Aus der Klasse der Helminthen z.B. Ancylostoma duodenale, Ancylostoma ceylanicum, Ancylostoma braziliensis, Ancylostoma spp., Ascaris lubricoides, Ascaris spp., Brugia malayi, Brugia timori, Bunostomum spp., Chabertia spp., Clonorchis spp., Cooperia spp., Dicrocoelium spp., Dictyocaulus filaria, Diphyllbothrium latum, Dracunculus medinensis, Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Enterobius vermicularis, Faciola spp., Haemonchus spp., Heterakis spp., Hymenolepis nana, Hyostrogylus spp., Loa Loa, Nematodirus spp., Oesophagostomum spp., Opisthorchis spp., Onchocerca volvulus, Ostertagia spp., Paragonimus spp., Schistosomen spp., Strongyloides fuelleborni, Strongyloides stercoralis, Strongyloides spp., Taenia saginata, Taenia solium, Trichinella spiralis, Trichinella nativa, Trichinella

britovi, *Trichinella nelsoni*, *Trichinella pseudopsiralis*, *Trichostrongylus* spp., *Trichuris trichuria*, *Wuchereria bancrofti*.

Weiterhin lassen sich Protozoen, wie *Eimeria*, bekämpfen.

- Aus der Ordnung der Heteroptera z.B. *Anasa tristis*, *Antestiopsis* spp., *Blissus* spp., *Calocoris* spp.,
 5 *Campylomma livida*, *Cavelerius* spp., *Cimex* spp., *Collaria* spp., *Creontiades dilutus*, *Dasynus piperis*,
Dichelops furcatus, *Diconocoris hewetti*, *Dysdercus* spp., *Euschistus* spp., *Eurygaster* spp., *Heliopeltis* spp.,
Horcias nobilellus, *Leptocoris* spp., *Leptoglossus phyllopus*, *Lygus* spp., *Macropes excavatus*, *Miridae*,
Monalonion atratum, *Nezara* spp., *Oebalus* spp., *Pentomidae*, *Piesma quadrata*, *Piezodorus* spp., *Psallus*
 spp., *Pseudacysta persea*, *Rhodnius* spp., *Sahlbergella singularis*, *Scaptocoris castanea*, *Scotinophora* spp.,
 10 *Stephanitis nashi*, *Tibraca* spp., *Triatoma* spp.

- Aus der Ordnung der Homoptera z.B. *Acyrtosipon* spp., *Acrogonia* spp., *Aeneolamia* spp., *Agonoscena*
 spp., *Aleurodes* spp., *Aleurolobus barodensis*, *Aleurothrix* spp., *Amrasca* spp., *Anuraphis cardui*, *Aoni-*
diella spp., *Aphanostigma piri*, *Aphis* spp., *Arboridia apicalis*, *Aspidiella* spp., *Aspidiotus* spp., *Atanus* spp.,
Aulacorthum solani, *Bemisia* spp., *Brachycaudus helichrysi*, *Brachycolus* spp., *Brevicoryne brassicae*,
 15 *Calligypona marginata*, *Carneocephala fulgida*, *Ceratovacuna lanigera*, *Cercopidae*, *Ceroplastes* spp.,
Chaetosiphon fragaefolii, *Chionaspis tegalensis*, *Chlorita onukii*, *Chromaphis juglandicola*, *Chrysomphalus*
ficus, *Cicadulina mbila*, *Cocomytilus halli*, *Coccus* spp., *Cryptomyzus ribis*, *Dalbulus* spp., *Dialeurodes*
 spp., *Diaphorina* spp., *Diaspis* spp., *Drosicha* spp., *Dysaphis* spp., *Dysmicoccus* spp., *Empoasca* spp., *Erio-*
soma spp., *Erythroneura* spp., *Euscelis bilobatus*, *Ferrisia* spp., *Geococcus coffeae*, *Hieroglyphus* spp.,
 20 *Homalodisca coagulata*, *Hyalopterus arundinis*, *Icerya* spp., *Idiocerus* spp., *Idioscopus* spp., *Laodelphax*
striatellus, *Lecanium* spp., *Lepidosaphes* spp., *Lipaphis erysimi*, *Macrosiphum* spp., *Mahanarva* spp.,
Melanaphis sacchari, *Metcalfiella* spp., *Metopolophium dirhodum*, *Monellia costalis*, *Monelliopsis pecanis*,
Myzus spp., *Nasonovia ribisnigri*, *Nephotettix* spp., *Nilaparvata lugens*, *Oncometopia* spp., *Orthezia prae-*
longa, *Parabemisia myricae*, *Paratrioza* spp., *Parlatoria* spp., *Pemphigus* spp., *Peregrinus maidis*,
 25 *Phenacoccus* spp., *Phloeomyzus passerinii*, *Phorodon humuli*, *Phylloxera* spp., *Pinnaspis aspidistrae*,
Planococcus spp., *Protopulvinaria pyriformis*, *Pseudaulacaspis pentagona*, *Pseudococcus* spp., *Psylla* spp.,
Pteromalus spp., *Pyrilla* spp., *Quadraspidotus* spp., *Quesada gigas*, *Rastrococcus* spp., *Rhopalosiphum* spp.,
Saissetia spp., *Scaphoides titanus*, *Schizaphis graminum*, *Selenaspis articulatus*, *Sogata* spp., *Sogatella*
furcifera, *Sogatodes* spp., *Stictocephala festina*, *Tenalaphara malayensis*, *Tinocallis caryaefoliae*, *Tomaspis*
 30 spp., *Toxoptera* spp., *Trialeurodes* spp., *Trioza* spp., *Typhlocyba* spp., *Unaspis* spp., *Viteus vitifolii*, *Zygina*
 spp.

Aus der Ordnung der Hymenoptera z.B. *Athalia* spp., *Diprion* spp., *Hoplocampa* spp., *Lasius* spp., *Mono-*
morium pharaonis, *Vespa* spp.

Aus der Ordnung der Isopoda z.B. *Armadillidium vulgare*, *Oniscus asellus*, *Porcellio scaber*.

Aus der Ordnung der Isoptera z.B. *Acromyrmex* spp., *Atta* spp., *Cornitermes cumulans*, *Microtermes obesi*, *Odontotermes* spp., *Reticulitermes* spp.

- Aus der Ordnung der Lepidoptera z.B. *Acronicta major*, *Adoxophyes* spp., *Aedia leucomelas*, *Agrotis* spp.,
 5 *Alabama* spp., *Amyelois transitella*, *Anarsia* spp., *Anticarsia* spp., *Argyroplote* spp., *Barathra brassicae*,
Borbo cinnara, *Bucculatrix thurberiella*, *Bupalus piniarius*, *Busseola* spp., *Cacoecia* spp., *Caloptilia theivora*,
Capua reticulana, *Carpocapsa pomonella*, *Carposina niponensis*, *Cheimatobia brumata*, *Chilo* spp.,
Choristoneura spp., *Clysia ambiguella*, *Cnaphalocerus* spp., *Cnephasia* spp., *Conopomorpha* spp.,
Conotrachelus spp., *Copitarsia* spp., *Cydia* spp., *Dalaca noctuides*, *Diaphania* spp., *Diatraea saccharalis*,
 10 *Earias* spp., *Ecdytolopha aurantium*, *Elasmopalpus lignosellus*, *Eldana saccharina*, *Ephestia kuehniella*,
Epinotia spp., *Epiphyas postvittana*, *Etiella* spp., *Eulia* spp., *Eupoecilia ambiguella*, *Euproctis* spp., *Euxoa*
 spp., *Feltia* spp., *Galleria mellonella*, *Gracillaria* spp., *Grapholitha* spp., *Hedylepta* spp., *Helicoverpa* spp.,
Heliiothis spp., *Hofmannophila pseudospretella*, *Homoeosoma* spp., *Homona* spp., *Hyponomeuta padella*,
Kakivoria flavofasciata, *Laphygma* spp., *Laspeyresia molesta*, *Leucinodes orbonalis*, *Leucoptera* spp.,
 15 *Lithocolletis* spp., *Lithophane antennata*, *Lobesia* spp., *Loxagrotis albicosta*, *Lymantria* spp., *Lyonetia* spp.,
Malacosoma neustria, *Maruca testulalis*, *Mamestra brassicae*, *Mocis* spp., *Mythimna separata*, *Nymphula*
 spp., *Oiketicus* spp., *Oria* spp., *Orthaga* spp., *Ostrinia* spp., *Oulema oryzae*, *Panolis flammea*, *Parnara* spp.,
Pectinophora spp., *Perileucoptera* spp., *Phthorimaea* spp., *Phyllocnistis citrella*, *Phyllonorycter* spp., *Pieris*
 spp., *Platynota stultana*, *Plusia* spp., *Plutella xylostella*, *Prays* spp., *Prodenia* spp., *Protoparce* spp., *Pseu-*
 20 *daletia* spp., *Pseudoplusia includens*, *Pyrausta nubilalis*, *Rachiplusia nu*, *Schoenobius* spp., *Scirpophaga*
 spp., *Scotia segetum*, *Sesamia* spp., *Sparganothis* spp., *Spodoptera* spp., *Stathmopoda* spp., *Stomopteryx*
subsecivella, *Synanthedon* spp., *Tecia solanivora*, *Thermesia gemmatilis*, *Tinea pellionella*, *Tineola*
bisselliella, *Tortrix* spp., *Trichoplusia* spp., *Tuta absoluta*, *Virachola* spp.

- Aus der Ordnung der Orthoptera z.B. *Acheta domesticus*, *Blatta orientalis*, *Blattella germanica*, *Dichroplus*
 25 spp., *Gryllotalpa* spp., *Leucophaea maderae*, *Locusta* spp., *Melanoplus* spp., *Periplaneta americana*,
Schistocerca gregaria.

Aus der Ordnung der Siphonaptera z.B. *Ceratophyllus* spp., *Xenopsylla cheopis*.

Aus der Ordnung der Symphyla z.B. *Scutigera* spp.

- Aus der Ordnung der Thysanoptera z.B. *Anaphothrips obscurus*, *Baliothrips bififormis*, *Drepanothrips reuteri*,
 30 *Enneothrips flavens*, *Frankliniella* spp., *Heliiothrips* spp., *Hercinothrips femoralis*, *Rhipiphorothrips*
cruentatus, *Scirtothrips* spp., *Taeniothrips cardamoni*, *Thrips* spp.

Aus der Ordnung der Thysanura z.B. *Lepisma saccharina*.

Zu den pflanzenparasitären Nematoden gehören z.B. *Aphelenchoides* spp., *Bursaphelenchus* spp., *Ditylenchus* spp., *Globodera* spp., *Heterodera* spp., *Longidorus* spp., *Meloidogyne* spp., *Pratylenchus* spp., *Radopholus similis*, *Trichodorus* spp., *Tylenchulus semipenetrans*, *Xiphinema* spp.

- 5 Die erfindungsgemäßen Verbindungen können gegebenenfalls in bestimmten Konzentrationen bzw. Aufwandmengen auch als Herbizide, Safener, Wachstumsregulatoren oder Mittel zur Verbesserung der Pflanzeigenschaften, oder als Mikrobizide, beispielsweise als Fungizide, Antimykotika, Bakterizide, Virizide (einschließlich Mittel gegen Viroide) oder als Mittel gegen MLO (*Mycoplasma-like-organism*) und RLO (*Rickettsia-like-organism*) verwendet werden. Sie lassen sich gegebenenfalls auch als Zwischen- oder
- 10 Vorprodukte für die Synthese weiterer Wirkstoffe einsetzen.

- Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin Formulierungen und daraus bereitete Anwendungsformen als Pflanzenschutzmittel und/oder Schädlingsbekämpfungsmittel wie z.B. Drench-, Drip- und Spritzbrühen, umfassend mindestens einen der erfindungsgemäßen Wirkstoffe. Gegebenenfalls enthalten die Anwendungsformen weitere Pflanzenschutzmittel und/oder Schädlingsbekämpfungsmittel und/oder die
- 15 Wirkung verbessernde Adjuvantien wie Penetrationsförderer, z.B. vegetative Öle wie beispielsweise Rapsöl, Sonnenblumenöl, Mineralöle wie beispielsweise Paraffinöle, Alkylester vegetativer Fettsäuren wie beispielsweise Rapsöl- oder Sojaölmethylester oder Alkanolalkoxylate und/oder Spreitmittel wie beispielsweise Alkylsiloxane und/oder Salze z.B. organische oder anorganische Ammonium- oder Phosphoniumsalze wie beispielsweise Ammoniumsulfat oder Diammonium-hydrogenphosphat und/oder die
- 20 Retention fördernde Mittel wie z.B. Dioctylsulfosuccinat oder Hydroxypropyl-guar Polymere und/oder Humectants wie z.B. Glycerin und/oder Dünger wie beispielsweise Ammonium-, Kalium- oder Phosphor-enthaltende Dünger.

- Übliche Formulierungen sind beispielsweise wasserlösliche Flüssigkeiten (SL), Emulsionskonzentrate (EC), Emulsionen in Wasser (EW), Suspensionskonzentrate (SC, SE, FS, OD), in Wasser dispergierbare
- 25 Granulate (WG), Granulate (GR) und Kapselkonzentrate (CS); diese und weitere mögliche Formuliertypen sind beispielsweise durch Crop Life International und in Pesticide Specifications, Manual on development and use of FAO and WHO specifications for pesticides, FAO Plant Production and Protection Papers – 173, prepared by the FAO/WHO Joint Meeting on Pesticide Specifications, 2004, ISBN: 9251048576 beschrieben. Gegebenenfalls enthalten die Formulierungen neben einem oder mehreren erfindungsgemäßen
- 30 Wirkstoffen weitere agrochemische Wirkstoffe.

Vorzugsweise handelt es sich um Formulierungen oder Anwendungsformen, welche Hilfsstoffe wie beispielsweise Streckmittel, Lösemittel, Spontanitätsförderer, Trägerstoffe, Emulgiermittel,

Dispergiermittel, Frostschutzmittel, Biozide, Verdicker und/oder weitere Hilfsstoffe wie beispielsweise Adjuvantien enthalten. Ein Adjuvant in diesem Kontext ist eine Komponente, die die biologische Wirkung der Formulierung verbessert, ohne dass die Komponente selbst eine biologische Wirkung hat. Beispiele für Adjuvantien sind Mittel, die die Retention, das Spreitverhalten, das Anhaften an der Blattoberfläche oder die Penetration fördern.

Diese Formulierungen werden in bekannter Weise hergestellt, z.B. durch Vermischen der Wirkstoffe mit Hilfsstoffen wie beispielsweise Streckmitteln, Lösemitteln und/oder festen Trägerstoffen und/oder weiteren Hilfsstoffen wie beispielsweise oberflächenaktive Stoffe. Die Herstellung der Formulierungen erfolgt entweder in geeigneten Anlagen oder auch vor oder während der Anwendung.

Als Hilfsstoffe können solche Stoffe Verwendung finden, die geeignet sind, der Formulierung des Wirkstoffs oder den aus diesen Formulierungen bereiteten Anwendungsformen (wie z.B. gebrauchsfähigen Pflanzenschutzmitteln wie Spritzbrühen oder Saatgutbeizen) besondere Eigenschaften, wie bestimmte physikalische, technische und/oder biologische Eigenschaften zu verleihen.

Als Streckmittel eignen sich z.B. Wasser, polare und unpolare organische chemische Flüssigkeiten z.B. aus den Klassen der aromatischen und nicht-aromatischen Kohlenwasserstoffe (wie Paraffine, Alkylbenzole, Alkyl-naphthaline, Chlorbenzole), der Alkohole und Polyole (die gegebenenfalls auch substituiert, verethert und/oder verestert sein können), der Ketone (wie Aceton, Cyclohexanon), Ester (auch Fette und Öle) und (Poly-)Ether, der einfachen und substituierten Amine, Amide, Lactame (wie N-Alkylpyrrolidone) und Lactone, der Sulfone und Sulfoxide (wie Dimethylsulfoxid).

Im Falle der Benutzung von Wasser als Streckmittel können z.B. auch organische Lösemittel als Hilfslösemittel verwendet werden. Als flüssige Lösemittel kommen im Wesentlichen infrage: Aromaten wie Xylol, Toluol oder Alkyl-naphthaline, chlorierte Aromaten oder chlorierte aliphatische Kohlenwasserstoffe wie Chlorbenzole, Chlorethylene oder Methylenchlorid, aliphatische Kohlenwasserstoffe, wie Cyclohexan oder Paraffine, z.B. Erdölfraktionen, mineralische und pflanzliche Öle, Alkohole wie Butanol oder Glykol sowie deren Ether und Ester, Ketone wie Aceton, Methylethylketon, Methylisobutylketon oder Cyclohexanon, stark polare Lösemittel wie Dimethylformamid und Dimethylsulfoxid sowie Wasser.

Grundsätzlich können alle geeigneten Lösemittel verwendet werden. Geeignete Lösemittel sind beispielsweise aromatische Kohlenwasserstoffe wie z.B. Xylol, Toluol oder Alkyl-naphthaline, chlorierte aromatische oder aliphatische Kohlenwasserstoffe wie z.B. Chlorbenzol, Chlorethylen, oder Methylenchlorid, aliphatische Kohlenwasserstoffe wie z.B. Cyclohexan, Paraffine, Erdölfraktionen, mineralische und pflanzliche Öle, Alkohole wie z.B. Methanol, Ethanol, iso-Propanol, Butanol oder Glykol sowie deren Ether

und Ester, Ketone wie z.B. Aceton, Methylethylketon, Methylisobutylketon oder Cyclohexanon, stark polare Lösemittel wie Dimethylsulfoxid sowie Wasser.

Grundsätzlich können alle geeigneten Trägerstoffe eingesetzt werden. Als Trägerstoffe kommen insbesondere infrage: z.B. Ammoniumsalze und natürliche Gesteinsmehle wie Kaoline, Tonerden, Talkum, Kreide, Quarz, Attapulgit, Montmorillonit oder Diatomeenerde und synthetische Gesteinsmehl, wie hochdisperse Kieselsäure, Aluminiumoxid und natürliche oder synthetische Silikate, Harze, Wachse und /oder feste Düngemittel. Mischungen solcher Trägerstoffe können ebenfalls verwendet werden. Als Trägerstoffe für Granulate kommen infrage: z.B. gebrochene und fraktionierte natürliche Gesteine wie Calcit, Marmor, Bims, Sepiolith, Dolomit sowie synthetische Granulate aus anorganischen und organischen Mehlen sowie Granulate aus organischem Material wie Sägemehl, Papier, Kokosnussschalen, Maiskolben und Tabakstängel.

Auch verflüssigte gasförmige Streckmittel oder Lösemittel können eingesetzt werden. Insbesondere eignen sich solche Streckmittel oder Trägerstoffe, welche bei normaler Temperatur und unter Normaldruck gasförmig sind, z.B. Aerosol-Treibgase wie Halogenkohlenwasserstoffe sowie Butan, Propan, Stickstoff und Kohlendioxid.

Beispiele für Emulgier- und/oder Schaum erzeugende Mittel, Dispergiermittel oder Benetzungsmittel mit ionischen oder nicht-ionischen Eigenschaften oder Mischungen dieser oberflächenaktiven Stoffe sind Salze von Polyacrylsäure, Salze von Lignosulphonsäure, Salze von Phenolsulphonsäure oder Naphthalinsulphonsäure, Polykondensate von Ethylenoxid mit Fettalkoholen oder mit Fettsäuren oder mit Fettaminen, mit substituierten Phenolen (vorzugsweise Alkylphenole oder Arylphenole), Salze von Sulphobernsteinsäureestern, Taurinderivate (vorzugsweise Alkyltaurate), Phosphorsäureester von polyethoxylierten Alkoholen oder Phenole, Fettsäureester von Polyolen und Derivate der Verbindungen enthaltend Sulphate, Sulphonate und Phosphate, z.B. Alkylarylpolyglycoether, Alkylsulfonate, Alkylsulfate, Arylsulfonate, Eiweißhydrolysate, Lignin-Sulfitablaugen und Methylcellulose. Die Anwesenheit einer oberflächenaktiven Substanz ist vorteilhaft, wenn einer der Wirkstoff und/oder einer der inerten Trägerstoffe nicht in Wasser löslich ist und wenn die Anwendung in Wasser erfolgt.

Als weitere Hilfsstoffe können in den Formulierungen und den daraus abgeleiteten Anwendungsformen Farbstoffe wie anorganische Pigmente, z.B. Eisenoxid, Titanoxid, Ferrocyanblau und organische Farbstoffe wie Alizarin, Azo- und Metallphthalocyaninfarbstoffe und Nähr- und Spurennährstoffe wie Salze von Eisen, Mangan, Bor, Kupfer, Kobalt, Molybdän und Zink vorhanden sein.

Weiterhin enthalten sein können Stabilisatoren wie Kältestabilisatoren, Konservierungsmittel, Oxidationsschutzmittel, Lichtschutzmittel oder andere die chemische und/oder physikalische Stabilität verbessernde Mittel. Weiterhin enthalten sein können schaum erzeugende Mittel oder Entschäumer.

Ferner können die Formulierungen und daraus abgeleiteten Anwendungsformen als zusätzliche Hilfsstoffe auch Haftmittel wie Carboxymethylcellulose, natürliche und synthetische pulverige, körnige oder latexförmige Polymere enthalten wie Gummiarabikum, Polyvinylalkohol, Polyvinylacetat sowie natürliche Phospholipide wie Kephaline und Lecithine und synthetische Phospholipide. Weitere Hilfsstoffe können mineralische und vegetabile Öle sein.

Gegebenenfalls können noch weitere Hilfsstoffe in den Formulierungen und den daraus abgeleiteten Anwendungsformen enthalten sein. Solche Zusatzstoffe sind beispielsweise Duftstoffe, schützende Kolloide, Bindemittel, Klebstoffe, Verdicker, thixotrope Stoffe, Penetrationsförderer, Retentionsförderer, Stabilisatoren, Sequestermittel, Komplexbildner, Humectans, Spreitmittel. Im Allgemeinen können die Wirkstoffe mit jedem festen oder flüssigen Zusatzstoff, welches für Formulierungszwecke gewöhnlich verwendet wird, kombiniert werden.

Als Retentionsförderer kommen alle diejenigen Substanzen in Betracht, die die dynamische Oberflächenspannung verringern wie beispielsweise Dioctylsulfosuccinat oder die die Visko-Elastizität erhöhen wie beispielsweise Hydroxypropyl-guar Polymere.

Als Penetrationsförderer kommen im vorliegenden Zusammenhang alle diejenigen Substanzen in Betracht, die üblicherweise eingesetzt werden, um das Eindringen agrochemischer Wirkstoffe in Pflanzen zu verbessern. Penetrationsförderer werden in diesem Zusammenhang dadurch definiert, dass sie aus der (in der Regel wässrigen) Applikationsbrühe und/oder aus dem Spritzbelag in die Kutikula der Pflanze eindringen und dadurch die Stoffbeweglichkeit (Mobilität) der Wirkstoffe in der Kutikula erhöhen können.

Die in der Literatur (Baur et al., 1997, Pesticide Science 51, 131-152) beschriebene Methode kann zur Bestimmung dieser Eigenschaft eingesetzt werden. Beispielhaft werden genannt Alkoholalkoxylate wie beispielsweise Kokosfettethoxylat (10) oder Isotridecylethoxylat (12), Fettsäureester wie beispielsweise Rapsöl- oder Sojaölmethylester, Fettamine Alkoxylate wie beispielsweise Tallowamine ethoxylat (15) oder Ammonium- und/oder Phosphonium-Salze wie beispielsweise Ammoniumsulfat oder Diammoniumhydrogenphosphat.

Die Formulierungen enthalten bevorzugt zwischen 0,00000001 und 98 Gew.-% Wirkstoff oder, besonders bevorzugt zwischen 0,01 und 95 Gew.-% Wirkstoff, besonders bevorzugt zwischen 0,5 und 90 Gew.-% Wirkstoff, bezogen auf das Gewicht der Formulierung.

Der Wirkstoffgehalt der aus den Formulierungen bereiteten Anwendungsformen (Pflanzenschutzmittel) kann in weiten Bereichen variieren. Die Wirkstoffkonzentration der Anwendungsformen kann üblicherweise zwischen 0,00000001 und 95 Gew.-% Wirkstoff, vorzugsweise zwischen 0,00001 und 1 Gew.-%, bezogen

auf das Gewicht der Anwendungsform, liegen. Die Anwendung geschieht in einer den Anwendungsformen angepaßten üblichen Weise.

Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe können als solche oder in ihren Formulierungen auch in Mischung mit einem oder mehreren geeigneten Fungiziden, Bakteriziden, Akariziden, Nematiziden, Insektiziden, Mikrobiologika, Düngemittel, Lockstoffen, Phytotonics, Sterilantien, Synergisten, Safenern, Semiochemicals und/oder Pflanzenwachstumsregulatoren verwendet werden, um so z.B. das Wirkungsspektrum zu verbreitern, die Wirkdauer zu verlängern, die Wirkgeschwindigkeit zu steigern, Repellenz zu verhindern oder Resistenzentwicklungen vorzubeugen. Des Weiteren können solche Kombinationen das Pflanzenwachstum verbessern, die Toleranz gegenüber abiotischen Faktoren wie z.B. hohen oder niedrigen Temperaturen, gegen Trockenheit oder gegen erhöhten Wasser- bzw. Bodensalzgehalt. Auch lässt sich das Blüh- und Fruchtverhalten verbessern, die Keimfähigkeit und Bewurzelung optimieren die Ernte erleichtern und Ernteerträge steigern, die Reife beeinflussen, die Qualität und/oder den Ernährungswert der Ernteprodukte steigern, die Lagerfähigkeit verlängern und/oder die Bearbeitbarkeit der Ernteprodukte verbessern. In der Regel erhält man durch Kombination der erfindungsgemäßen Wirkstoffe und Mischpartnern synergistische Effekte, d.h. die Wirksamkeit der jeweiligen Mischung ist größer als die Wirksamkeit der Einzelkomponenten. Generell können die Kombinationen sowohl in Vor-, Tank- oder Fertigmischungen als auch in Saatgutanwendungen verwendet werden.

Besonders günstige Mischungspartner sind z.B. die Folgenden:

20 **Insektizide/Akarizide/Nematizide**

Die hier mit ihrem „common name“ genannten Wirkstoffe sind bekannt und beispielsweise im Pestizidhandbuch („The Pesticide Manual“ 14th Ed., British Crop Protection Council 2006) beschrieben oder im Internet recherchierbar (z.B. <http://www.alanwood.net/pesticides>).

(1) Acetylcholinesterase (AChE) Inhibitoren, wie beispielsweise

25 Carbamate, z.B. Alanycarb, Aldicarb, Bendiocarb, Benfuracarb, Butocarboxim, Butoxycarboxim, Carbaryl, Carbofuran, Carbosulfan, Ethiofencarb, Fenobucarb, Formetanate, Furathiocarb, Isoprocab, Methiocarb, Methomyl, Metolcarb, Oxamyl, Pirimicarb, Propoxur, Thiodicarb, Thiofanox, Triazamate, Trimethacarb, XMC und Xylcarb; oder

30 Organophosphate, z.B. Acephate, Azamethiphos, Azinphos-ethyl, Azinphos-methyl, Cadusafos, Chlorethoxyfos, Chlorfenvinphos, Chlormephos, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl, Coumaphos, Cyanophos, Demeton-S-methyl, Diazinon, Dichlorvos/DDVP, Dicrotophos, Dimethoate, Dimethylvinphos,

- 150 -

Disulfoton, EPN, Ethion, Ethoprophos, Famphur, Fenamiphos, Fenitrothion, Fenthion, Fosthiazate, Heptenophos, Imicyafos, Isofenphos, Isopropyl O-(methoxyaminothio-phosphoryl) salicylat, Isoxathion, Malathion, Mecarbam, Methamidophos, Methidathion, Mevinphos, Monocrotophos, Naled, Omethoate, Oxydemeton-methyl, Parathion, Parathion-methyl, Phenthoate, Phorate, Phosalone, Phosmet,
 5 Phosphamidon, Phoxim, Pirimiphos-methyl, Profenofos, Propetamphos, Prothiofos, Pyraclofos, Pyridaphenthion, Quinalphos, Sulfotep, Tebupirimfos, Temephos, Terbufos, Tetrachlorvinphos, Thiometon, Triazophos, Trichlorfon und Vamidothion.

(2) GABA-gesteuerte Chlorid-Kanal-Antagonisten, wie beispielsweise

Cyclodien-organochlorine, z.B. Chlordane und Endosulfan; oder

10 Phenylpyrazole (Fiprole), z.B. Ethiprole und Fipronil.

(3) Natrium-Kanal-Modulatoren / Spannungsabhängige Natrium-Kanal-Blocker, wie beispielsweise

Pyrethroide, z.B. Acrinathrin, Allethrin, d-cis-trans Allethrin, d-trans Allethrin, Bifenthrin, Bioallethrin, Bioallethrin S-cyclopentenyl Isomer, Bioresmethrin, Cycloprothrin, Cyfluthrin, beta-Cyfluthrin, Cyhalothrin, lambda-Cyhalothrin, gamma-Cyhalothrin, Cypermethrin, alpha-Cypermethrin, beta-
 15 Cypermethrin, theta-Cypermethrin, zeta-Cypermethrin, Cyphenothrin [(1R)-trans-Isomere], Deltamethrin, Empenthrin [(EZ)-(1R)-Isomere), Esfenvalerate, Etofenprox, Fenpropathrin, Fenvalerate, Flucythrinate, Flumethrin, tau-Fluvalinate, Halfenprox, Imiprothrin, Kadethrin, Permethrin, Phenothrin [(1R)-trans-Isomere), Prallethrin, Pyrethrine (pyrethrum), Resmethrin, Silafluofen, Tefluthrin, Tetramethrin, Tetramethrin [(1R)- Isomere)], Tralomethrin und Transfluthrin; oder

20 DDT; oder Methoxychlor.

(4) Nikotinerge Acetylcholin-Rezeptor (nAChR) Agonisten, wie beispielsweise

Neonikotinoide, z.B. Acetamiprid, Clothianidin, Dinotefuran, Imidacloprid, Nitenpyram, Thiacloprid und Thiamethoxam; oder

Nikotin.

25 (5) Nikotinerge Acetylcholin-Rezeptor (nAChR) allosterische Aktivatoren, wie beispielsweise

Spinosine, z.B. Spinetoram und Spinosad.

(6) Chlorid-Kanal-Aktivatoren, wie beispielsweise

- 151 -

Avermectine/Milbemycine, z.B. Abamectin, Emamectin-benzoat, Lepimectin und Milbemectin.

(7) Juvenilhormon-Imitatoren, wie beispielsweise

Juvenilhormon-Analoga, z.B. Hydroprene, Kinoprene und Methoprene; oder

Fenoxycarb; oder Pyriproxyfen.

5 (8) Wirkstoffe mit unbekannten oder nicht spezifischen Wirkmechanismen, wie beispielsweise

Alkylhalide, z.B. Methylbromid und andere Alkylhalide; oder

Chloropicrin; oder Sulfurylfluorid; oder Borax; oder Brechweinstein.

(9) Selektive Fraßhemmer, z.B. Pymetrozine; oder Flonicamid.

(10) Milbenwachstumshemmer, z.B. Clofentezine, Hexythiazox und Diflovidazin; oder

10 Etoxazole.

(11) Mikrobielle Disruptoren der Insektendarmmembran, z.B. *Bacillus thuringiensis* Subspezies israelensis, *Bacillus sphaericus*, *Bacillus thuringiensis* Subspezies aizawai, *Bacillus thuringiensis* Subspezies kurstaki, *Bacillus thuringiensis* Subspezies tenebrionis und BT Pflanzenproteine: Cry1Ab, Cry1Ac, Cry1Fa, Cry2Ab, mCry3A, Cry3Ab, Cry3Bb, Cry34/35Ab1.

15 (12) Inhibitoren der oxidativen Phosphorylierung, ATP-Disruptoren, wie beispielsweise Diafenthiuron; oder

Organozinnverbindungen, z.B. Azocyclotin, Cyhexatin und Fenbutatin-oxid; oder

Propargite; oder Tetradifon.

(13) Entkoppler der oxidativen Phosphorylierung durch Unterbrechung des H-Protongradienten, wie beispielsweise Chlorfenapyr, DNOC und Sulfluramid.

20 (14) Nikotinerge Acetylcholin-Rezeptor-Antagonisten, wie beispielsweise Bensultap, Cartap-hydrochlorid, Thiocyclam und Thiosultap-Natrium.

(15) Inhibitoren der Chitinbiosynthese, Typ 0, wie beispielsweise Bistrifluron, Chlorfluazuron, Diflubenzuron, Flucycloxuron, Flufenoxuron, Hexaflumuron, Lufenuron, Novaluron, Noviflumuron, Teflubenzuron und Triflumuron.

- 152 -

(16) Inhibitoren der Chitinbiosynthese, Typ 1, wie beispielsweise Buprofezin.

(17) Häutungsstörende Wirkstoffe, Dipteran, wie beispielsweise Cyromazine.

(18) Ecdyson-Rezeptor Agonisten, wie beispielsweise Chromafenozide, Halofenozide, Methoxyfenozide und Tebufenozide.

5 (19) Oktopaminerge Agonisten, wie beispielsweise Amitraz.

(20) Komplex-III-Elektronentransportinhibitoren, wie beispielsweise Hydramethylnon; oder Acequinocyl; oder Fluacrypyrim.

(21) Komplex-I-Elektronentransportinhibitoren, beispielsweise

10 METI-Akarizide, z.B. Fenazaquin, Fenpyroximate, Pyrimidifen, Pyridaben, Tebufenpyrad und Tolfenpyrad; oder

Rotenone (Derris).

(22) Spannungsabhängige Natriumkanal-Blocker, z.B. Indoxacarb; oder Metaflumizone.

(23) Inhibitoren der Acetyl-CoA-Carboxylase, wie beispielsweise

Tetron- und Tetramsäurederivate, z.B. Spirodiclofen, Spiromesifen und Spirotetramat.

15 (24) Komplex-IV-Elektronentransportinhibitoren, wie beispielsweise

Phosphine, z.B. Aluminiumphosphid, Calciumphosphid, Phosphin und Zinkphosphid; oder

Cyanid.

(25) Komplex-II-Elektronentransportinhibitoren, wie beispielsweise Cyenopyrafen.

(28) Ryanodinrezeptor-Effektoren, wie beispielsweise

20 Diamide, z.B. Chlorantraniliprole und Flubendiamide.

Weitere Wirkstoffe mit unbekanntem Wirkmechanismus, wie beispielsweise Amidoflumet, Azadirachtin, Benclonthiaz, Benzoximate, Bifenazate, Bromopropylate, Chinomethionat, Cryolite, Cyantraniliprole (Cyazapyr), Cyflumetofen, Dicofol, Diflovidazin, Fluensulfone, Flufenerim, Flufiprole, Fluopyram, Fufenozide, Imidaclothiz, Iprodione, Meperfluthrin, Pyridalyl, Pyrifluquinazon, Tetramethylfluthrin und

Iodmethan; desweiteren Präparate auf Basis von *Bacillus firmus* (insbesondere Stamm CNCM I-1582, beispielsweise VOTiVO™, BioNem) sowie folgende bekannte wirksame Verbindungen:

3-Brom-N-{2-brom-4-chlor-6-[(1-cyclopropylethyl)carbamoyl]phenyl}-1-(3-chlorpyridin-2-yl)-1H-pyrazol-5-carboxamid (bekannt aus WO2005/077934), 4-[[[(6-Brompyrid-3-yl)methyl](2-fluorethyl)amino]furan-2(5H)-on (bekannt aus WO2007/115644), 4-[[[(6-Fluorpyrid-3-yl)methyl](2,2-difluorethyl)amino]furan-2(5H)-on (bekannt aus WO2007/115644), 4-[[[(2-Chlor-1,3-thiazol-5-yl)methyl](2-fluorethyl)amino]furan-2(5H)-on (bekannt aus WO2007/115644), 4-[[[(6-Chlorpyrid-3-yl)methyl](2-fluorethyl)amino]furan-2(5H)-on (bekannt aus WO2007/115644), Flupyradifurone, 4-[[[(6-Chlor-5-fluorpyrid-3-yl)methyl](methyl)amino]furan-2(5H)-on (bekannt aus WO2007/115643), 4-[[[(5,6-Dichlorpyrid-3-yl)methyl](2-fluorethyl)amino]furan-2(5H)-on (bekannt aus WO2007/115646), 4-[[[(6-Chlor-5-fluorpyrid-3-yl)methyl](cyclopropyl)amino]furan-2(5H)-on (bekannt aus WO2007/115643), 4-[[[(6-Chlorpyrid-3-yl)methyl](cyclopropyl)amino]furan-2(5H)-on (bekannt aus EP-A-0 539 588), 4-[[[(6-Chlorpyrid-3-yl)methyl](methyl)amino]furan-2(5H)-on (bekannt aus EP-A-0 539 588), {[1-(6-Chlorpyridin-3-yl)ethyl](methyl)oxido- λ^4 -sulfanylidene}cyanamid (bekannt aus WO2007/149134) und seine Diastereomere

15 {[[(1R)-1-(6-Chlorpyridin-3-yl)ethyl](methyl)oxido- λ^4 -sulfanylidene}cyanamid (A) und {[[(1S)-1-(6-Chlorpyridin-3-yl)ethyl](methyl)oxido- λ^4 -sulfanylidene}cyanamid (B) (ebenfalls bekannt aus WO2007/149134) sowie Sulfoxaflor und seine Diastereomere [(R)-Methyl(oxido){(1R)-1-[6-(trifluormethyl)pyridin-3-yl]ethyl}- λ^4 -sulfanylidene]cyanamid (A1) und [(S)-Methyl(oxido){(1S)-1-[6-(trifluormethyl)pyridin-3-yl]ethyl}- λ^4 -sulfanylidene]cyanamid (A2), bezeichnet als Diastereomerengruppe A

20 (bekannt aus WO 2010/074747, WO 2010/074751), [(R)-Methyl(oxido){(1S)-1-[6-(trifluormethyl)pyridin-3-yl]ethyl}- λ^4 -sulfanylidene]cyanamid (B1) und [(S)-Methyl(oxido){(1R)-1-[6-(trifluormethyl)pyridin-3-yl]ethyl}- λ^4 -sulfanylidene]cyanamid (B2), bezeichnet als Diastereomerengruppe B (ebenfalls bekannt aus WO 2010/074747, WO 2010/074751) und 11-(4-Chlor-2,6-dimethylphenyl)-12-hydroxy-1,4-dioxo-9-azadispiro[4.2.4.2]tetradec-11-en-10-on (bekannt aus WO2006/089633), 3-(4'-Fluor-2,4-dimethylbiphenyl-3-yl)-4-hydroxy-8-oxa-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-2-on (bekannt aus WO2008/067911), 1-{2-Fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfinyl]phenyl}-3-(trifluormethyl)-1H-1,2,4-triazol-5-amin (bekannt aus WO2006/043635), [(3S,4aR,12R,12aS,12bS)-3-[(Cyclopropylcarbonyl)oxy]-6,12-dihydroxy-4,12b-dimethyl-11-oxo-9-(pyridin-3-yl)-1,3,4,4a,5,6,6a,12,12a,12b-decahydro-2H,11H-benzo[f]pyrano[4,3-b]chromen-4-yl]methylcyclopropanecarboxylat (bekannt aus WO2008/066153), 2-Cyan-3-(difluormethoxy)-N,N-dimethylbenzolsulfonamid (bekannt aus WO2006/056433), 2-Cyan-3-(difluormethoxy)-N-methylbenzolsulfonamid (bekannt aus WO2006/100288), 2-Cyan-3-(difluormethoxy)-N-ethylbenzolsulfonamid (bekannt aus WO2005/035486), 4-(Difluormethoxy)-N-ethyl-N-methyl-1,2-benzothiazol-3-amin-1,1-dioxid (bekannt aus WO2007/057407), N-[1-(2,3-Dimethylphenyl)-2-(3,5-dimethylphenyl)ethyl]-4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-amin (bekannt aus WO2008/104503), {1'-[(2E)-3-(4-

Chlorphenyl)prop-2-en-1-yl]-5-fluorspiro[indol-3,4'-piperidin]-1(2H)-yl}(2-chlorpyridin-4-yl)methanon
 (bekannt aus WO2003/106457), 3-(2,5-Dimethylphenyl)-4-hydroxy-8-methoxy-1,8-diazaspiro[4.5]dec-3-
 en-2-on (bekannt aus WO2009/049851), 3-(2,5-Dimethylphenyl)-8-methoxy-2-oxo-1,8-diazaspiro[4.5]dec-
 3-en-4-yl-ethylcarbonat (bekannt aus WO2009/049851), 4-(But-2-in-1-yloxy)-6-(3,5-dimethylpiperidin-1-
 5 yl)-5-fluorpyrimidin (bekannt aus WO2004/099160), (2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluorpentyl)(3,3,3-
 trifluorpropyl)malononitril (bekannt aus WO2005/063094), (2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluorpentyl)(3,3,4,4,4-
 pentafluorbutyl)malononitril (bekannt aus WO2005/063094), 8-[2-(Cyclopropylmethoxy)-4-
 (trifluormethyl)phenoxy]-3-[6-(trifluormethyl)pyridazin-3-yl]-3-azabicyclo[3.2.1]octan (bekannt aus
 WO2007/040280), Flometoquin, PF1364 (CAS-Reg.Nr. 1204776-60-2) (bekannt aus JP2010/018586), 5-[5-
 10 (3,5-Dichlorphenyl)-5-(trifluormethyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzonitril
 (bekannt aus WO2007/075459), 5-[5-(2-Chlorpyridin-4-yl)-5-(trifluormethyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-
 2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzonitril (bekannt aus WO2007/075459), 4-[5-(3,5-Dichlorphenyl)-5-
 (trifluormethyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-2-methyl-N-{2-oxo-2-[(2,2,2-
 trifluorethyl)amino]ethyl}benzamid (bekannt aus WO2005/085216), 4-[[[(6-Chlorpyridin-3-
 15 yl)methyl](cyclopropyl)amino]-1,3-oxazol-2(5H)-on, 4-[[[(6-Chlorpyridin-3-yl)methyl](2,2-
 difluorethyl)amino]-1,3-oxazol-2(5H)-on, 4-[[[(6-Chlorpyridin-3-yl)methyl](ethyl)amino]-1,3-oxazol-
 2(5H)-on, 4-[[[(6-Chlorpyridin-3-yl)methyl](methyl)amino]-1,3-oxazol-2(5H)-on (alle bekannt aus
 WO2010/005692), NNI-0711 (bekannt aus WO2002/096882), 1-Acetyl-N-[4-(1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-
 methoxypropan-2-yl)-3-isobutylphenyl]-N-isobutyryl-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-carboxamid (bekannt aus
 20 WO2002/096882), Methyl-2-[2-([3-brom-1-(3-chlorpyridin-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]carbonyl)amino]-5-
 chlor-3-methylbenzoyl]-2-methylhydrazincarboxylat (bekannt aus WO2005/085216), Methyl-2-[2-([3-
 brom-1-(3-chlorpyridin-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]carbonyl)amino]-5-cyan-3-methylbenzoyl]-2-
 ethylhydrazincarboxylat (bekannt aus WO2005/085216), Methyl-2-[2-([3-brom-1-(3-chlorpyridin-2-yl)-
 1H-pyrazol-5-yl]carbonyl)amino]-5-cyan-3-methylbenzoyl]-2-methylhydrazincarboxylat (bekannt aus
 25 WO2005/085216), Methyl-2-[3,5-dibrom-2-([3-brom-1-(3-chlorpyridin-2-yl)-1H-pyrazol-5-
 yl]carbonyl)amino]benzoyl]-1,2-diethylhydrazincarboxylat (bekannt aus WO2005/085216), Methyl-2-[3,5-
 dibrom-2-([3-brom-1-(3-chlorpyridin-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]carbonyl)amino]benzoyl]-2-
 ethylhydrazincarboxylat (bekannt aus WO2005/085216), (5RS,7RS;5RS,7SR)-1-(6-Chlor-3-pyridylmethyl)-
 1,2,3,5,6,7-hexahydro-7-methyl-8-nitro-5-propoxyimidazo[1,2-a]pyridin (bekannt aus WO2007/101369), 2-
 30 {6-[2-(5-Fluorpyridin-3-yl)-1,3-thiazol-5-yl]pyridin-2-yl}pyrimidin (bekannt aus WO2010/006713), 2-{6-
 [2-(Pyridin-3-yl)-1,3-thiazol-5-yl]pyridin-2-yl}pyrimidin (bekannt aus WO2010/006713), 1-(3-
 Chlorpyridin-2-yl)-N-[4-cyan-2-methyl-6-(methylcarbamoyl)phenyl]-3-{[5-(trifluormethyl)-1H-tetrazol-1-
 yl]methyl}-1H-pyrazol-5-carboxamid (bekannt aus WO2010/069502), 1-(3-Chlorpyridin-2-yl)-N-[4-cyan-
 2-methyl-6-(methylcarbamoyl)phenyl]-3-{[5-(trifluormethyl)-2H-tetrazol-2-yl]methyl}-1H-pyrazol-5-
 35 carboxamid (bekannt aus WO2010/069502), N-[2-(tert-Butylcarbamoyl)-4-cyan-6-methylphenyl]-1-(3-

chlorpyridin-2-yl)-3-[[5-(trifluormethyl)-1H-tetrazol-1-yl]methyl]-1H-pyrazol-5-carboxamid (bekannt aus WO2010/069502), N-[2-(tert-Butylcarbamoyl)-4-cyan-6-methylphenyl]-1-(3-chlorpyridin-2-yl)-3-[[5-(trifluormethyl)-2H-tetrazol-2-yl]methyl]-1H-pyrazol-5-carboxamid (bekannt aus WO2010/069502), (1E)-N-[(6-Chlorpyridin-3-yl)methyl]-N'-cyan-N-(2,2-difluorethyl)ethanimidamid (bekannt aus
 5 WO2008/009360), N-[2-(5-Amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-4-chlor-6-methylphenyl]-3-brom-1-(3-chlorpyridin-2-yl)-1H-pyrazol-5-carboxamid (bekannt aus CN102057925) und Methyl-2-[3,5-dibrom-2-({[3-brom-1-(3-chlorpyridin-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]carbonyl}amino)benzoyl]-2-ethyl-1-methylhydrazincarboxylat (bekannt aus WO2011/049233).

Fungizide

- 10 (1) Inhibitoren der Ergosterol-Biosynthese, wie beispielsweise (1.1) Aldimorph (1704-28-5), (1.2) Azaconazol (60207-31-0), (1.3) Bitertanol (55179-31-2), (1.4) Bromuconazol (116255-48-2), (1.5) Cyproconazol (113096-99-4), (1.6) Diclobutrazol (75736-33-3), (1.7) Difenconazol (119446-68-3), (1.8) Diniconazol (83657-24-3), (1.9) Diniconazol-M (83657-18-5), (1.10) Dodemorph (1593-77-7), (1.11) Dodemorph Acetat (31717-87-0), (1.12) Epoxiconazol (106325-08-0), (1.13) Etaconazol (60207-93-4),
 15 (1.14) Fenarimol (60168-88-9), (1.15) Fenbuconazol (114369-43-6), (1.16) Fenhexamid (126833-17-8), (1.17) Fenpropidin (67306-00-7), (1.18) Fenpropimorph (67306-03-0), (1.19) Fluquinconazol (136426-54-5), (1.20) Flurprimidol (56425-91-3), (1.21) Flusilazol (85509-19-9), (1.22) Flutriafol (76674-21-0), (1.23) Furconazol (112839-33-5), (1.24) Furconazol-Cis (112839-32-4), (1.25) Hexaconazol (79983-71-4), (1.26) Imazalil (60534-80-7), (1.27) Imazalil Sulfat (58594-72-2), (1.28) Imibenconazol (86598-92-7), (1.29)
 20 Ipconazol (125225-28-7), (1.30) Metconazol (125116-23-6), (1.31) Myclobutanil (88671-89-0), (1.32) Naftifin (65472-88-0), (1.33) Nuarimol (63284-71-9), (1.34) Oxpoconazol (174212-12-5), (1.35) Paclobutrazol (76738-62-0), (1.36) Pefurazoat (101903-30-4), (1.37) Penconazol (66246-88-6), (1.38) Piperalin (3478-94-2), (1.39) Prochloraz (67747-09-5), (1.40) Propiconazol (60207-90-1), (1.41) Prothioconazol (178928-70-6), (1.42) Pyributicarb (88678-67-5), (1.43) Pyrifenoxy (88283-41-4), (1.44)
 25 Quinconazol (103970-75-8), (1.45) Simeconazol (149508-90-7), (1.46) Spiroxamin (118134-30-8), (1.47) Tebuconazol (107534-96-3), (1.48) Terbinafin (91161-71-6), (1.49) Tetraconazol (112281-77-3), (1.50) Triadimefon (43121-43-3), (1.51) Triadimenol (89482-17-7), (1.52) Tridemorph (81412-43-3), (1.53) Triflumizol (68694-11-1), (1.54) Triforin (26644-46-2), (1.55) Triticonazol (131983-72-7), (1.56) Uniconazol (83657-22-1), (1.57) Uniconazol-p (83657-17-4), (1.58) Viniconazol (77174-66-4), (1.59)
 30 Voriconazol (137234-62-9), (1.60) 1-(4-Chlorphenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)cycloheptanol (129586-32-9), (1.61) Methyl-1-(2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl)-1H-imidazol-5-carboxylat (110323-95-0), (1.62)
 N'-{5-(Difluormethyl)-2-methyl-4-[3-(trimethylsilyl)propoxy]phenyl}-N-ethyl-N-methylimidofornamid, (1.63) N-Ethyl-N-methyl-N'-{2-methyl-5-(trifluormethyl)-4-[3-

(trimethylsilyl)propoxy]phenyl}imidoformamid und (1.64) O-[1-(4-Methoxyphenoxy)-3,3-dimethylbutan-2-yl]-1H-imidazol-1-carbothioat (111226-71-2).

(2) Inhibitoren der Respiration (Atmungsketten-Inhibitoren), wie beispielsweise (2.1) Bixafen (581809-46-3), (2.2) Boscalid (188425-85-6), (2.3) Carboxin (5234-68-4), (2.4) Diflumetorim (130339-07-0), (2.5) Fenfuram (24691-80-3), (2.6) Fluopyram (658066-35-4), (2.7) Flutolanil (66332-96-5), (2.8) Fluxapyroxad (907204-31-3), (2.9) Furametpyr (123572-88-3), (2.10) Furmecyclox (60568-05-0), (2.11) Isopyrazam Mischung des syn-epimeren Razemates 1RS,4SR,9RS und des anti-empimeren Razemates 1RS,4SR,9SR (881685-58-1), (2.12) Isopyrazam (anti-epimeres Razemat), (2.13) Isopyrazam (anti-epimeres Enantiomer 1R,4S,9S), (2.14) Isopyrazam (anti-epimeres Enantiomer 1S,4R,9R), (2.15) Isopyrazam (syn-epimeres Razemat 1RS,4SR,9RS), (2.16) Isopyrazam (syn-epimeres Enantiomer 1R,4S,9R), (2.17) Isopyrazam (syn-epimeres Enantiomer 1S,4R,9S), (2.18) Mepronil (55814-41-0), (2.19) Oxycarboxin (5259-88-1), (2.20) Penflufen (494793-67-8), (2.21) Penthiopyrad (183675-82-3), (2.22) Sedaxane (874967-67-6), (2.23) Thifluzamid (130000-40-7), (2.24) 1-Methyl-N-[2-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)phenyl]-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-4-carboxamid, (2.25) 3-(Difluormethyl)-1-methyl-N-[2-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)phenyl]-1H-pyrazol-4-carboxamid, (2.26) 3-(Difluormethyl)-N-[4-fluor-2-(1,1,2,3,3,3-hexafluorpropoxy)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, (2.27) N-[1-(2,4-Dichlorphenyl)-1-methoxypropan-2-yl]-3-(difluormethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid (1092400-95-7), (2.28) 5,8-Difluor-N-[2-(2-fluor-4-[[4-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)ethyl]quinazolin-4-amin (1210070-84-0) (bekannt aus WO2010025451), (2.29) N-[9-(Dichlormethylen)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaphthalen-5-yl]-3-(difluormethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, (2.30) N-[(1S,4R)-9-(Dichlormethylen)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaphthalen-5-yl]-3-(difluormethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid und (2.31) N-[(1R,4S)-9-(Dichlormethylen)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaphthalen-5-yl]-3-(difluormethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid.

(3) Inhibitoren der Respiration (Atmungsketten-Inhibitoren) am Komplex III der Atmungskette, wie beispielsweise (3.1) Ametoctradin (865318-97-4), (3.2) Amisulbrom (348635-87-0), (3.3) Azoxystrobin (131860-33-8), (3.4) Cyazofamid (120116-88-3), (3.5) Coumethoxystrobin (850881-30-0), (3.6) Coumoxystrobin (850881-70-8), (3.5) Dimoxystrobin (141600-52-4), (3.6) Enestroburin (238410-11-2) (bekannt aus WO 2004/058723), (3.9) Famoxadon (131807-57-3) (bekannt aus WO 2004/058723), (3.10) Fenamidon (161326-34-7) (bekannt aus WO 2004/058723), (3.11) Fenoxystrobin (918162-02-4), (3.12) Fluoxastrobin (361377-29-9) (bekannt aus WO 2004/058723), (3.13) Kresoxim-Methyl (143390-89-0) (bekannt aus WO 2004/058723), (3.14) Metominostrobin (133408-50-1) (bekannt aus WO 2004/058723), (3.15) Orysastrobin (189892-69-1) (bekannt aus WO 2004/058723), (3.16) Picoxystrobin (117428-22-5) (bekannt aus WO 2004/058723), (3.17) Pyraclostrobin (175013-18-0) (bekannt aus WO 2004/058723), (3.18) Pyrametostrobin (915410-70-7) (bekannt aus WO 2004/058723), (3.19) Pyraoxystrobin (862588-11-

- 2) (bekannt aus WO 2004/058723), (3.20) Pyribencarb (799247-52-2) (bekannt aus WO 2004/058723), (3.21) Triclopyricarb (902760-40-1), (3.22) Trifloxystrobin (141517-21-7) (bekannt aus WO 2004/058723), (3.23) (2E)-2-(2-[[6-(3-Chlor-2-methylphenoxy)-5-fluorpyrimidin-4-yl]oxy]phenyl)-2-(methoxyimino)-N-methylethanamid (bekannt aus WO 2004/058723), (3.24) (2E)-2-(Methoxyimino)-N-methyl-2-(2-[[((1E)-1-[3-(trifluormethyl)phenyl]ethyliden)amino]oxy)methyl]phenyl)ethanamid (bekannt aus WO 5 2004/058723), (3.25) (2E)-2-(Methoxyimino)-N-methyl-2-{2-[(E)-({1-[3-(trifluormethyl)phenyl]ethoxy}imino)methyl]phenyl}ethanamid (158169-73-4), (3.26) (2E)-2-{2-[[((1E)-1-(3-[(E)-1-Fluor-2-phenylethenyl]oxy)phenyl)ethyliden]amino]oxy)methyl]phenyl}-2-(methoxyimino)-N-methylethanamid (326896-28-0), (3.27) (2E)-2-{2-[[((2E,3E)-4-(2,6-Dichlorphenyl)but-3-en-2-yliden]amino]oxy)methyl]phenyl}-2-(methoxyimino)-N-methylethanamid, (3.28) 2-Chlor-N-(1,1,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)pyridin-3-carboxamid (119899-14-8), (3.29) 5-Methoxy-2-methyl-4-(2-[[((1E)-1-[3-(trifluormethyl)phenyl]ethyliden)amino]oxy)methyl]phenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-on, (3.30) Methyl-(2E)-2-{2-[(cyclopropyl[(4-methoxyphenyl)imino]methyl)sulfanyl]methyl]phenyl}-3-methoxyprop-2-enoat (149601-03-6), (3.31) N-(3-Ethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl)-3-(formylamino)-2-hydroxybenzamid (226551-21-9), (3.32) 2-{2-[(2,5-Dimethylphenoxy)methyl]phenyl}-2-methoxy-N-methylacetamid (173662-97-0) und (3.33) (2R)-2-{2-[(2,5-Dimethylphenoxy)methyl]phenyl}-2-methoxy-N-methylacetamid (394657-24-0).
- (4) Inhibitoren der Mitose und Zellteilung, wie beispielsweise (4.1) Benomyl (17804-35-2), (4.2) Carbendazim (10605-21-7), (4.3) Chlorfenazol (3574-96-7), (4.4) Diethofencarb (87130-20-9), (4.5) Ethaboxam (162650-77-3), (4.6) Fluopicolid (239110-15-7), (4.7) Fuberidazol (3878-19-1), (4.8) Pencycuron (66063-05-6), (4.9) Thiabendazol (148-79-8), (4.10) Thiophanat-Methyl (23564-05-8), (4.11) Thiophanat (23564-06-9), (4.12) Zoxamid (156052-68-5), (4.13) 5-Chlor-7-(4-methylpiperidin-1-yl)-6-(2,4,6-trifluorphenyl)[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin (214706-53-3) und (4.14) 3-Chlor-5-(6-chlorpyridin-3-yl)-6-methyl-4-(2,4,6-trifluorphenyl)pyridazin (1002756-87-7).
- (5) Verbindungen mit Multisite-Aktivität, wie beispielsweise (5.1) Bordeauxmischung (8011-63-0), (5.2) Captafol (2425-06-1), (5.3) Captan (133-06-2) (bekannt aus WO 02/12172), (5.4) Chlorothalonil (1897-45-6), (5.5) Kupferzubereitungen wie Kupferhydroxid (20427-59-2), (5.6) Kupfernaphthenat (1338-02-9), (5.7) Kupferoxid (1317-39-1), (5.8) Kupferoxychlorid (1332-40-7), (5.9) Kupfersulfat (7758-98-7), (5.10) Dichlofluanid (1085-98-9), (5.11) Dithianon (3347-22-6), (5.12) Dodine (2439-10-3), (5.13) Dodine freie 25 Base, (5.14) Ferbam (14484-64-1), (5.15) Fluorofolpet (719-96-0), (5.16) Folpet (133-07-3), (5.17) Guazatin (108173-90-6), (5.18) Guazatinacetat, (5.19) Iminoctadin (13516-27-3), (5.20) Iminoctadinalbesilat (169202-06-6), (5.21) Iminoctadintriacetat (57520-17-9), (5.22) Mankupfer (53988-93-5), (5.23) Mancozeb (8018-01-7), (5.24) Maneb (12427-38-2), (5.25) Metiram (9006-42-2), (5.26) Zinkmetiram (9006-42-2), (5.27) Kupfer-Oxin (10380-28-6), (5.28) Propamidin (104-32-5), (5.29) Propineb 30

- 158 -

(12071-83-9), (5.30) Schwefel und Schwefelzubereitungen wie beispielsweise Calciumpolysulfid (7704-34-9), (5.31) Thiram (137-26-8), (5.32) Tolyfluanid (731-27-1), (5.33) Zineb (12122-67-7) und (5.34) Ziram (137-30-4).

5 (6) Resistenzinduktoren, wie beispielsweise (6.1) Acibenzolar-S-Methyl (135158-54-2), (6.2) Isotianil (224049-04-1), (6.3) Probenazol (27605-76-1) und (6.4) Tiadinil (223580-51-6).

(7) Inhibitoren der Aminosäure- und Protein-Biosynthese, wie beispielsweise (7.1) Andoprim (23951-85-1), (7.2) Blastidicin-S (2079-00-7), (7.3) Cyprodinil (121552-61-2), (7.4) Kasugamycin (6980-18-3), (7.5) Kasugamycin Hydrochlorid Hydrat (19408-46-9), (7.6) Mepanipyrim (110235-47-7), (7.7) Pyrimethanil (53112-28-0) und (7.8) 3-(5-Fluor-3,3,4,4-tetramethyl-3,4-dihydroisoquinolin-1-yl)quinolin (861647-32-7)
10 (bekannt aus WO2005070917).

(8) Inhibitoren der ATP Produktion, wie beispielsweise (8.1) Fentin Acetat (900-95-8), (8.2) Fentin Chlorid (639-58-7), (8.3) Fentin Hydroxid (76-87-9) und (8.4) Silthiofam (175217-20-6).

(9) Inhibitoren der Zellwandsynthese, wie beispielsweise (9.1) Benthiavalicarb (177406-68-7), (9.2) Dimethomorph (110488-70-5), (9.3) Flumorph (211867-47-9), (9.4) Iprovalicarb (140923-17-7), (9.5)
15 Mandipropamid (374726-62-2), (9.6) Polyoxins (11113-80-7), (9.7) Polyoxorim (22976-86-9), (9.8) Validamycin A (37248-47-8) und (9.9) Valifenalat (283159-94-4; 283159-90-0).

(10) Inhibitoren der Lipid- und Membran-Synthese, wie beispielsweise (10.1) Biphenyl (92-52-4), (10.2) Chloroneb (2675-77-6), (10.3) Dicloran (99-30-9), (10.4) Edifenphos (17109-49-8), (10.5) Etridiazol (2593-15-9), (10.6) Iodocarb (55406-53-6), (10.7) Iprobenfos (26087-47-8), (10.8) Isoprothiolan (50512-35-1),
20 (10.9) Propamocarb (25606-41-1), (10.10) Propamocarb Hydrochlorid (25606-41-1), (10.11) Prothiocarb (19622-08-3), (10.12) Pyrazophos (13457-18-6), (10.13) Quintozen (82-68-8), (10.14) Tecnazene (117-18-0) und (10.15) Tolclofos-Methyl (57018-04-9).

(11) Inhibitoren der Melanin-Biosynthese, wie beispielsweise (11.1) Carpropamid (104030-54-8), (11.2) Diclocymet (139920-32-4), (11.3) Fenoxanil (115852-48-7), (11.4) Fthalid (27355-22-2), (11.5) Pyroquilon
25 (57369-32-1), (11.6) Tricyclazol (41814-78-2) und (11.7) 2,2,2-Trifluorethyl {3-methyl-1-[(4-methylbenzoyl)amino]butan-2-yl}carbammat (851524-22-6) (bekannt aus WO2005042474).

(12) Inhibitoren der Nukleinsäuresynthese, wie beispielsweise (12.1) Benalaxyl (71626-11-4), (12.2) Benalaxyl-M (Kiralaxyl) (98243-83-5), (12.3) Bupirimat (41483-43-6), (12.4) Clozylacon (67932-85-8), (12.5) Dimethirimol (5221-53-4), (12.6) Ethirimol (23947-60-6), (12.7) Furalaxyl (57646-30-7), (12.8)
30 Hymexazol (10004-44-1), (12.9) Metalaxyl (57837-19-1), (12.10) Metalaxyl-M (Mefenoxam) (70630-17-0), (12.11) Ofurace (58810-48-3), (12.12) Oxadixyl (77732-09-3) und (12.13) Oxolinsäure (14698-29-4).

- 159 -

(13) Inhibitoren der Signaltransduktion, wie beispielsweise (13.1) Chlozolinat (84332-86-5), (13.2) Fenpiclonil (74738-17-3), (13.3) Fludioxonil (131341-86-1), (13.4) Iprodion (36734-19-7), (13.5) Procymidon (32809-16-8), (13.6) Quinoxifen (124495-18-7) und (13.7) Vinclozolin (50471-44-8).

(14) Entkoppler, wie beispielsweise (14.1) Binapacryl (485-31-4), (14.2) Dinocap (131-72-6), (14.3) Ferimzon (89269-64-7), (14.4) Fluazinam (79622-59-6) und (14.5) Meptyldinocap (131-72-6).

(15) Weitere Verbindungen, wie beispielsweise (15.1) Benthiazol (21564-17-0), (15.2) Bethoxazin (163269-30-5), (15.3) Capsimycin (70694-08-5), (15.4) Carvon (99-49-0), (15.5) Chinomethionat (2439-01-2), (15.6) Pyriofenon (Chlazafenon) (688046-61-9), (15.7) Cufraneb (11096-18-7), (15.8) Cyflufenamid (180409-60-3), (15.9) Cymoxanil (57966-95-7), (15.10) Cyprosulfamide (221667-31-8), (15.11) Dazomet (533-74-4), (15.12) Debacarb (62732-91-6), (15.13) Dichlorophen (97-23-4), (15.14) Diclomezin (62865-36-5), (15.15) Difenzoquat (49866-87-7), (15.16) Difenzoquat Methylsulphat (43222-48-6), (15.17) Diphenylamin (122-39-4), (15.18) Ecomat, (15.19) Fenpyrazamin (473798-59-3), (15.20) Flumetover (154025-04-4), (15.21) Fluoromid (41205-21-4), (15.22) Flusulfamid (106917-52-6), (15.23) Flutianil (304900-25-2), (15.24) Fosetyl-Aluminium (39148-24-8), (15.25) Fosetyl-Calcium, (15.26) Fosetyl-Natrium (39148-16-8), (15.27) Hexachlorbenzol (118-74-1), (15.28) Irumamycin (81604-73-1), (15.29) Methasulfocarb (66952-49-6), (15.30) Methylisothiocyanat (556-61-6), (15.31) Metrafenon (220899-03-6), (15.32) Mildiomycin (67527-71-3), (15.33) Natamycin (7681-93-8), (15.34) Nickel Dimethyldithiocarbamat (15521-65-0), (15.35) Nitrothal-Isopropyl (10552-74-6), (15.36) Octhilinone (26530-20-1), (15.37) Oxamocarb (917242-12-7), (15.38) Oxyfenthiin (34407-87-9), (15.39) Pentachlorphenol und dessen Salze (87-86-5), (15.40) Phenothrin, (15.41) Phosphorsäure und deren Salze (13598-36-2), (15.42) Propamocarb-Fosetyl, (15.43) Propanosin-Natrium (88498-02-6), (15.44) Proquinazid (189278-12-4), (15.45) Pyrimorph (868390-90-3), (15.45e) (2E)-3-(4-Tert-butylphenyl)-3-(2-chlorpyridin-4-yl)-1-(morpholin-4-yl)prop-2-en-1-on (1231776-28-5), (15.45z) (2Z)-3-(4-Tert-butylphenyl)-3-(2-chlorpyridin-4-yl)-1-(morpholin-4-yl)prop-2-en-1-on (1231776-29-6), (15.46) Pyrrolnitrin (1018-71-9) (bekannt aus EP-A 1 559 320), (15.47) Tebufloquin (376645-78-2), (15.48) Tecloftalam (76280-91-6), (15.49) Tolnifanid (304911-98-6), (15.50) Triazoxid (72459-58-6), (15.51) Trichlamid (70193-21-4), (15.52) Zarilamid (84527-51-5), (15.53) (3S,6S,7R,8R)-8-Benzyl-3-[(3-[(isobutyryloxy)methoxy]-4-methoxypyridin-2-yl)carbonylamino]-6-methyl-4,9-dioxo-1,5-dioxonan-7-yl 2-methylpropanoat (517875-34-2) (bekannt aus WO2003035617), (15.54) 1-(4-{4-[(5R)-5-(2,6-Difluorphenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-1,3-thiazol-2-yl}piperidin-1-yl)-2-[5-methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanon (1003319-79-6), (15.55) 1-(4-{4-[(5S)-5-(2,6-Difluorphenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-1,3-thiazol-2-yl}piperidin-1-yl)-2-[5-methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanon (1003319-80-9), (15.56) 1-(4-{4-[5-(2,6-Difluorphenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-1,3-thiazol-2-yl}piperidin-1-yl)-2-[5-methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanon (1003318-67-9), (15.57) 1-(4-Methoxyphenoxy)-3,3-dimethylbutan-2-yl-1H-imidazol-1-carboxylat (111227-17-9), (15.58)

2,3,5,6-Tetrachlor-4-(methylsulfonyl)pyridin (13108-52-6), (15.59) 2,3-Dibutyl-6-chlorthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-on (221451-58-7), (15.60) 2,6-Dimethyl-1H,5H-[1,4]dithiino[2,3-c:5,6-c']dipyrrol-1,3,5,7(2H,6H)-tetron, (15.61) 2-[5-Methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1-(4-{4-[(5R)-5-phenyl-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-1,3-thiazol-2-yl}piperidin-1-yl)ethanon (1003316-53-7), (15.62) 2-[5-Methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1-(4-{4-[(5S)-5-phenyl-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-1,3-thiazol-2-yl}piperidin-1-yl)ethanon (1003316-54-8), (15.63) 2-[5-Methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1-{4-[4-(5-phenyl-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl)-1,3-thiazol-2-yl]piperidin-1-yl}ethanon (1003316-51-5), (15.64) 2-Butoxy-6-iod-3-propyl-4H-chromen-4-on, (15.65) 2-Chlor-5-[2-chlor-1-(2,6-difluor-4-methoxyphenyl)-4-methyl-1H-imidazol-5-yl]pyridin, (15.66) 2-Phenylphenol und dessen Salze (90-43-7), (15.67) 3-(4,4,5-Trifluor-3,3-dimethyl-3,4-dihydroisoquinolin-1-yl)quinolin (861647-85-0) (bekannt aus WO2005070917), (15.68) 3,4,5-Trichlorpyridin-2,6-dicarbonitril (17824-85-0), (15.69) 3-[5-(4-Chlorphenyl)-2,3-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-yl]pyridin, (15.70) 3-Chlor-5-(4-chlorphenyl)-4-(2,6-difluorphenyl)-6-methylpyridazin, (15.71) 4-(4-Chlorphenyl)-5-(2,6-difluorphenyl)-3,6-dimethylpyridazin, (15.72) 5-Amino-1,3,4-thiadiazol-2-thiol, (15.73) 5-Chlor-N'-phenyl-N'-(prop-2-in-1-yl)thiophen-2-sulfonohydrazid (134-31-6), (15.74) 5-Fluor-2-[(4-fluorbenzyl)oxy]pyrimidin-4-amin (1174376-11-4) (bekannt aus WO2009094442), (15.75) 5-Fluor-2-[(4-methylbenzyl)oxy]pyrimidin-4-amin (1174376-25-0) (bekannt aus WO2009094442), (15.76) 5-Methyl-6-octyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amin, (15.77) Ethyl-(2Z)-3-amino-2-cyan-3-phenylprop-2-enoat, (15.78) N'-(4-{[3-(4-Chlorbenzyl)-1,2,4-thiadiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidofornamid, (15.79) N-(4-Chlorbenzyl)-3-[3-methoxy-4-(prop-2-in-1-yloxy)phenyl]propanamid, (15.80) N-[(4-Chlorphenyl)(cyan)methyl]-3-[3-methoxy-4-(prop-2-in-1-yloxy)phenyl]propanamid, (15.81) N-[(5-Brom-3-chlorpyridin-2-yl)methyl]-2,4-dichlorpyridin-3-carboxamid, (15.82) N-[1-(5-Brom-3-chlorpyridin-2-yl)ethyl]-2,4-dichlorpyridin-3-carboxamid, (15.83) N-[1-(5-Brom-3-chlorpyridin-2-yl)ethyl]-2-fluor-4-iodpyridin-3-carboxamid, (15.84) N-{(E)-[(Cyclopropylmethoxy)imino][6-(difluormethoxy)-2,3-difluorphenyl]methyl}-2-phenylacetamid (221201-92-9), (15.85) N-{(Z)-[(Cyclopropylmethoxy)imino][6-(difluormethoxy)-2,3-difluorphenyl]methyl}-2-phenylacetamid (221201-92-9), (15.86) N'-{4-[(3-Tert-butyl-4-cyano-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2-chlor-5-methylphenyl}-N-ethyl-N-methylimidofornamid, (15.87) N-Methyl-2-(1-{[5-methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetyl}piperidin-4-yl)-N-(1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)-1,3-thiazol-4-carboxamid (922514-49-6), (15.88) N-Methyl-2-(1-{[5-methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetyl}piperidin-4-yl)-N-[(1R)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl]-1,3-thiazol-4-carboxamid (922514-07-6), (15.89) N-Methyl-2-(1-{[5-methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetyl}piperidin-4-yl)-N-[(1S)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl]-1,3-thiazol-4-carboxamid (922514-48-5), (15.90) Pentyl-{6-[[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)(phenyl)methylen]amino]oxy)methyl}pyridin-2-yl}carbam, (15.91) Phenazin-1-carbonsäure, (15.92) Chinolin-8-ol (134-31-6), (15.93) Chinolin-8-olsulfat(2:1) (134-31-6) und (15.94) Tert-butyl {6-[[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)(phenyl)methylen]amino]oxy)methyl}pyridin-2-yl}carbam.

(16) Weitere Verbindungen, wie beispielsweise (16.1) 1-Methyl-3-(trifluormethyl)-N-[2'-(trifluormethyl)biphenyl-2-yl]-1H-pyrazol-4-carboxamid, (16.2) N-(4'-Chlorbiphenyl-2-yl)-3-(difluormethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, (16.3) N-(2',4'-Dichlorbiphenyl-2-yl)-3-(difluormethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, (16.4) 3-(Difluormethyl)-1-methyl-N-[4'-(trifluormethyl)biphenyl-2-yl]-1H-pyrazol-4-carboxamid, (16.5) N-(2',5'-Difluorbiphenyl-2-yl)-1-methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-4-carboxamid, (16.6) 3-(Difluormethyl)-1-methyl-N-[4'-(prop-1-in-1-yl)biphenyl-2-yl]-1H-pyrazol-4-carboxamid, (16.7) 5-Fluor-1,3-dimethyl-N-[4'-(prop-1-in-1-yl)biphenyl-2-yl]-1H-pyrazol-4-carboxamid, (16.8) 2-Chlor-N-[4'-(prop-1-in-1-yl)biphenyl-2-yl]pyridin-3-carboxamid, (16.9) 3-(Difluormethyl)-N-[4'-(3,3-dimethylbut-1-in-1-yl)biphenyl-2-yl]-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, (16.10) N-[4'-(3,3-Dimethylbut-1-in-1-yl)biphenyl-2-yl]-5-fluor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, (16.11) 3-(Difluormethyl)-N-(4'-ethinylbiphenyl-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, (16.12) N-(4'-Ethinylbiphenyl-2-yl)-5-fluor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, (16.13) 2-Chlor-N-(4'-ethinylbiphenyl-2-yl)pyridin-3-carboxamid, (16.14) 2-Chlor-N-[4'-(3,3-dimethylbut-1-in-1-yl)biphenyl-2-yl]pyridin-3-carboxamid (bekannt aus EP-A 1 559 320), (16.15) 4-(Difluormethyl)-2-methyl-N-[4'-(trifluormethyl)biphenyl-2-yl]-1,3-thiazol-5-carboxamid, (16.16) 5-Fluor-N-[4'-(3-hydroxy-3-methylbut-1-in-1-yl)biphenyl-2-yl]-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, (16.17) 2-Chlor-N-[4'-(3-hydroxy-3-methylbut-1-in-1-yl)biphenyl-2-yl]pyridin-3-carboxamid, (16.18) 3-(Difluormethyl)-N-[4'-(3-methoxy-3-methylbut-1-in-1-yl)biphenyl-2-yl]-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, (16.19) 5-Fluor-N-[4'-(3-methoxy-3-methylbut-1-in-1-yl)biphenyl-2-yl]-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, (16.20) 2-Chlor-N-[4'-(3-methoxy-3-methylbut-1-in-1-yl)biphenyl-2-yl]pyridin-3-carboxamid, (16.21) (5-Brom-2-methoxy-4-methylpyridin-3-yl)(2,3,4-trimethoxy-6-methylphenyl)methanon, (16.22) N-[2-(4-[[3-(4-Chlorphenyl)prop-2-in-1-yl]oxy]-3-methoxyphenyl)ethyl]-N2-(methylsulfonyl)valinamid (220706-93-4), (16.23) 4-Oxo-4-[(2-phenylethyl)amino]butansäure und (16.24) But-3-yn-1-yl {6-[[[(Z)-(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)(phenyl)methylen]amino]oxy)methyl]pyridin-2-yl}carbamat.

Alle genannten Mischpartner der Klassen (1) bis (16) können, wenn sie auf Grund ihrer funktionellen Gruppen dazu imstande sind, gegebenenfalls mit geeigneten Basen oder Säuren Salze bilden.

Auch eine Mischung mit anderen bekannten Wirkstoffen, wie Herbiziden, Düngemitteln, Wachstumsregulatoren, Safenern, Semiochemicals, oder auch mit Mitteln zur Verbesserung der Pflanzeigenschaften ist möglich.

Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe können ferner beim Einsatz als Insektizide in ihren handelsüblichen Formulierungen sowie in den aus diesen Formulierungen bereiteten Anwendungsformen in Mischung mit Synergisten vorliegen. Synergisten sind Verbindungen, durch die die Wirkung der Wirkstoffe gesteigert wird, ohne daß der zugesetzte Synergist selbst aktiv wirksam sein muß.

Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe können ferner beim Einsatz als Insektizide in ihren handelsüblichen Formulierungen sowie in den aus diesen Formulierungen bereiteten Anwendungsformen in Mischungen mit Hemmstoffen vorliegen, die einen Abbau des Wirkstoffes nach Anwendung in der Umgebung der Pflanze, auf der Oberfläche von Pflanzenteilen oder in pflanzlichen Geweben vermindern.

- 5 Erfindungsgemäß können alle Pflanzen und Pflanzenteile behandelt werden. Unter Pflanzen werden hierbei alle Pflanzen und Pflanzenpopulationen verstanden, wie erwünschte und unerwünschte Wildpflanzen oder Kulturpflanzen (einschließlich natürlich vorkommender Kulturpflanzen). Kulturpflanzen können Pflanzen sein, die durch konventionelle Züchtungs- und Optimierungsmethoden oder durch biotechnologische und gentechnologische Methoden oder Kombinationen dieser Methoden erhalten werden können, einschließlich
10 der transgenen Pflanzen und einschließlich der durch Sortenschutzrechte schützbaren oder nicht schützbaren Pflanzensorten. Unter Pflanzenteilen sollen alle oberirdischen und unterirdischen Teile und Organe der Pflanzen, wie Sproß, Blatt, Blüte und Wurzel verstanden werden, wobei beispielhaft Blätter, Nadeln, Stengel, Stämme, Blüten, Fruchtkörper, Früchte und Saatgut sowie Wurzeln, Knollen und Rhizome aufgeführt werden. Zu den Pflanzenteilen gehört auch Erntegut sowie vegetatives und generatives
15 Vermehrungsmaterial, beispielsweise Stecklinge, Knollen, Rhizome, Ableger und Saatgut.

- Die erfindungsgemäße Behandlung der Pflanzen und Pflanzenteile mit den Wirkstoffen erfolgt direkt oder durch Einwirkung auf deren Umgebung, Lebensraum oder Lagerraum nach den üblichen Behandlungsmethoden, z.B. durch Tauchen, Sprühen, Verdampfen, Vernebeln, Streuen, Aufstreichen, Injizieren und bei Vermehrungsmaterial, insbesondere bei Saatgut, weiterhin durch ein- oder mehrschichtiges
20 Umhüllen.

- Wie bereits oben erwähnt, können erfindungsgemäß alle Pflanzen und deren Teile behandelt werden. In einer bevorzugten Ausführungsform werden wild vorkommende oder durch konventionelle biologische Zuchtmethoden, wie Kreuzung oder Protoplastenfusion erhaltenen Pflanzenarten und Pflanzensorten sowie deren Teile behandelt. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform werden transgene Pflanzen und
25 Pflanzensorten, die durch gentechnologische Methoden gegebenenfalls in Kombination mit konventionellen Methoden erhalten wurden (Genetically Modified Organisms) und deren Teile behandelt. Die Begriffe "Teile" bzw. "Teile von Pflanzen" oder "Pflanzenteile" wurden oben erläutert.

- Besonders bevorzugt werden erfindungsgemäß Pflanzen der jeweils handelsüblichen oder in Gebrauch befindlichen Pflanzensorten behandelt. Unter Pflanzensorten versteht man Pflanzen mit neuen
30 Eigenschaften ("Traits"), die sowohl durch konventionelle Züchtung, durch Mutagenese oder durch rekombinante DNA-Techniken gezüchtet worden sind. Dies können Sorten, Bio- und Genotypen sein.

Je nach Pflanzenarten bzw. Pflanzensorten, deren Standort und Wachstumsbedingungen (Böden, Klima, Vegetationsperiode, Ernährung) können durch die erfindungsgemäße Behandlung auch überadditive ("synergistische") Effekte auftreten. So sind beispielsweise erniedrigte Aufwandmengen und/oder Erweiterungen des Wirkungsspektrums und/oder eine Verstärkung der Wirkung der erfindungsgemäß verwendbaren Stoffe und Mittel, besseres Pflanzenwachstum, erhöhte Toleranz gegenüber hohen oder niedrigen Temperaturen, erhöhte Toleranz gegen Trockenheit oder gegen Wasser- bzw. Bodensalzgehalt, erhöhte Blühleistung, erleichterte Ernte, Beschleunigung der Reife, höhere Ernteerträge, höhere Qualität und/oder höherer Ernährungswert der Ernteprodukte, höhere Lagerfähigkeit und/oder Bearbeitbarkeit der Ernteprodukte möglich, die über die eigentlich zu erwartenden Effekte hinausgehen.

- 10 Zu den bevorzugten erfindungsgemäß zu behandelnden transgenen (gentechnologisch erhaltenen) Pflanzen bzw. Pflanzensorten gehören alle Pflanzen, die durch die gentechnologische Modifikation genetisches Material erhielten, welches diesen Pflanzen besondere vorteilhafte wertvolle Eigenschaften ("Traits") verleiht. Beispiele für solche Eigenschaften sind besseres Pflanzenwachstum, erhöhte Toleranz gegenüber hohen oder niedrigen Temperaturen, erhöhte Toleranz gegen Trockenheit oder gegen Wasser- bzw.
- 15 Bodensalzgehalt, erhöhte Blühleistung, erleichterte Ernte, Beschleunigung der Reife, höhere Ernteerträge, höhere Qualität und/oder höherer Ernährungswert der Ernteprodukte, höhere Lagerfähigkeit und/oder Bearbeitbarkeit der Ernteprodukte. Weitere und besonders hervorgehobene Beispiele für solche Eigenschaften sind eine erhöhte Abwehr der Pflanzen gegen tierische und mikrobielle Schädlinge, wie gegenüber Insekten, Milben, pflanzenpathogenen Pilzen, Bakterien und/oder Viren sowie eine erhöhte Toleranz der
- 20 Pflanzen gegen bestimmte herbizide Wirkstoffe. Als Beispiele transgener Pflanzen werden die wichtigen Kulturpflanzen, wie Getreide (Weizen, Reis), Mais, Soja, Kartoffel, Zuckerrüben, Tomaten, Erbsen und andere Gemüsesorten, Baumwolle, Tabak, Raps, sowie Obstpflanzen (mit den Früchten Äpfel, Birnen, Zitrusfrüchten und Weintrauben) erwähnt, wobei Mais, Soja, Kartoffel, Baumwolle, Tabak und Raps besonders hervorgehoben werden. Als Eigenschaften ("Traits") werden besonders hervorgehoben die erhöhte Abwehr der Pflanzen gegen Insekten, Spinnentiere, Nematoden und Schnecken durch in den Pflanzen entstehende Toxine, insbesondere solche, die durch das genetische Material aus *Bacillus Thuringiensis* (z.B. durch die Gene CryIA(a), CryIA(b), CryIA(c), CryIIA, CryIIIA, CryIIIB2, Cry9c Cry2Ab, Cry3Bb und CryIF sowie deren Kombinationen) in den Pflanzen erzeugt werden (im folgenden "Bt Pflanzen"). Als Eigenschaften ("Traits") werden auch besonders hervorgehoben die erhöhte Abwehr von Pflanzen gegen
- 25 Pilze, Bakterien und Viren durch Systemische Akquirierte Resistenz (SAR), Systemin, Phytoalexine, Elicitoren sowie Resistenzgene und entsprechend exprimierte Proteine und Toxine. Als Eigenschaften ("Traits") werden weiterhin besonders hervorgehoben die erhöhte Toleranz der Pflanzen gegenüber bestimmten herbiziden Wirkstoffen, beispielsweise Imidazolinonen, Sulfonylharnstoffen, Glyphosate oder Phosphinotricin (z.B. "PAT"-Gen). Die jeweils die gewünschten Eigenschaften ("Traits") verleihenden
- 30

Gene können auch in Kombinationen miteinander in den transgenen Pflanzen vorkommen. Als Beispiele für "Bt Pflanzen" seien Maissorten, Baumwollsorten, Sojasorten und Kartoffelsorten genannt, die unter den Handelsbezeichnungen YIELD GARD® (z.B. Mais, Baumwolle, Soja), KnockOut® (z.B. Mais), StarLink® (z.B. Mais), Bollgard® (Baumwolle), Nucotn® (Baumwolle) und NewLeaf® (Kartoffel) vertrieben werden.

- 5 Als Beispiele für Herbizid-tolerante Pflanzen seien Maissorten, Baumwollsorten und Sojasorten genannt, die unter den Handelsbezeichnungen Roundup Ready® (Toleranz gegen Glyphosate z.B. Mais, Baumwolle, Soja), Liberty Link® (Toleranz gegen Phosphinotricin, z.B. Raps), IMI® (Toleranz gegen Imidazolinone) und STS® (Toleranz gegen Sulfonylharnstoffe z.B. Mais) vertrieben werden. Als Herbizid- resistente (konventionell auf Herbizid-Toleranz gezüchtete) Pflanzen seien auch die unter der Bezeichnung
- 10 Clearfield® vertriebenen Sorten (z.B. Mais) erwähnt. Selbstverständlich gelten diese Aussagen auch für in der Zukunft entwickelte bzw. zukünftig auf den Markt kommende Pflanzensorten mit diesen oder zukünftig entwickelten genetischen Eigenschaften ("Traits").

- Die aufgeführten Pflanzen können besonders vorteilhaft erfindungsgemäß mit den Verbindungen der allgemeinen Formel I bzw. den erfindungsgemäßen Wirkstoffmischungen behandelt werden. Die bei den
- 15 Wirkstoffen bzw. Mischungen oben angegebenen Vorzugsbereiche gelten auch für die Behandlung dieser Pflanzen. Besonders hervorgehoben sei die Pflanzenbehandlung mit den im vorliegenden Text speziell aufgeführten Verbindungen bzw. Mischungen.

- Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe wirken nicht nur gegen Pflanzen-, Hygiene- und Vorratsschädlinge, sondern auch auf dem veterinärmedizinischen Sektor gegen tierische Parasiten (Ekto- und Endoparasiten)
- 20 wie Schildzecken, Lederzecken, Räude milben, Laufmilben, Fliegen (stechend und leckend), parasitierende Fliegenlarven, Läuse, Haarlinge, Federlinge und Flöhe. Zu diesen Parasiten gehören:

Aus der Ordnung der Anoplurida z.B. Haematopinus spp., Linognathus spp., Pediculus spp., Phtirus spp., Solenopotes spp.

- Aus der Ordnung der Mallophagida und den Unterordnungen Amblycerina sowie Ischnocerina z.B.
- 25 Trimenopon spp., Menopon spp., Trinoton spp., Bovicola spp., Werneckiella spp., Lepikentron spp., Damalina spp., Trichodectes spp., Felicola spp.

- Aus der Ordnung Diptera und den Unterordnungen Nematocerina sowie Brachyocerina z.B. Aedes spp., Anopheles spp., Culex spp., Simulium spp., Eusimulium spp., Phlebotomus spp., Lutzomyia spp., Culicoides spp., Chrysops spp., Hybomitra spp., Atylotus spp., Tabanus spp., Haematopota spp.,
- 30 Philipomyia spp., Braula spp., Musca spp., Hydrotaea spp., Stomoxys spp., Haematobia spp., Morellia spp., Fannia spp., Glossina spp., Calliphora spp., Lucilia spp., Chrysomyia spp., Wohlfahrtia spp., Sarcophaga spp., Oestrus spp., Hypoderma spp., Gasterophilus spp., Hippobosca spp., Lipoptena spp., Melophagus spp.

Aus der Ordnung der Siphonapterida z.B. *Pulex* spp., *Ctenocephalides* spp., *Xenopsylla* spp., *Ceratophyllus* spp.

Aus der Ordnung der Heteropterida z.B. *Cimex* spp., *Triatoma* spp., *Rhodnius* spp., *Panstrongylus* spp.

5 Aus der Ordnung der Blattarida z.B. *Blatta orientalis*, *Periplaneta americana*, *Blattella germanica*, *Supella* spp.

Aus der Unterklasse der Acari (Acarina) und den Ordnungen der Meta- sowie Mesostigmata z.B. *Argas* spp., *Ornithodoros* spp., *Otobius* spp., *Ixodes* spp., *Amblyomma* spp., *Boophilus* spp., *Dermacentor* spp., *Haemophysalis* spp., *Hyalomma* spp., *Rhipicephalus* spp., *Dermanyssus* spp., *Railletia* spp., *Pneumonyssus* spp., *Sternostoma* spp., *Varroa* spp.

10 Aus der Ordnung der Actinedida (Prostigmata) und Acaridida (Astigmata) z.B. *Acarapis* spp., *Cheyletiella* spp., *Ornithocheyletia* spp., *Myobia* spp., *Psorergates* spp., *Demodex* spp., *Trombicula* spp., *Listrophorus* spp., *Acarus* spp., *Tyrophagus* spp., *Caloglyphus* spp., *Hypodectes* spp., *Pterolichus* spp., *Psoroptes* spp., *Chorioptes* spp., *Otodectes* spp., *Sarcoptes* spp., *Notoedres* spp., *Knemidocoptes* spp., *Cytodites* spp., *Laminosioptes* spp.

15 Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe der Formel (I) eignen sich auch zur Bekämpfung von Arthropoden, die landwirtschaftliche Nutztiere, wie z.B. Rinder, Schafe, Ziegen, Pferde, Schweine, Esel, Kamele, Büffel, Kaninchen, Hühner, Puten, Enten, Gänse, Bienen, sonstige Haustiere wie z.B. Hunde, Katzen, Stubenvögel, Aquarienfische sowie sogenannte Versuchstiere, wie z.B. Hamster, Meerschweinchen, Ratten und Mäuse befallen. Durch die Bekämpfung dieser Arthropoden sollen Todesfälle und Leistungsminderungen (bei
20 Fleisch, Milch, Wolle, Häuten, Eiern, Honig usw.) vermindert werden, so daß durch den Einsatz der erfindungsgemäßen Wirkstoffe eine wirtschaftlichere und einfachere Tierhaltung möglich ist.

Die Anwendung der erfindungsgemäßen Wirkstoffe geschieht im Veterinärsektor und bei der Tierhaltung in bekannter Weise durch enterale Verabreichung in Form von beispielsweise Tabletten, Kapseln, Tränken, Drenchen, Granulaten, Pasten, Boli, des feed-through-Verfahrens, von Zäpfchen, durch parenterale
25 Verabreichung, wie zum Beispiel durch Injektionen (intramuskulär, subcutan, intravenös, intraperitoneal u.a.), Implantate, durch nasale Applikation, durch dermale Anwendung in Form beispielsweise des Tauchens oder Badens (Dippen), Sprühens (Spray), Aufgießens (Pour-on und Spot-on), des Waschens, des Einpuderns sowie mit Hilfe von wirkstoffhaltigen Formkörpern, wie Halsbändern, Ohrmarken, Schwanzmarken, Gliedmaßenbändern, Halftern, Markierungsvorrichtungen usw.

30 Bei der Anwendung für Vieh, Geflügel, Haustiere etc. kann man die Wirkstoffe der Formel (I) als Formulierungen (beispielsweise Pulver, Emulsionen, fließfähige Mittel), die die Wirkstoffe in einer Menge

von 1 bis 80 Gew.-% enthalten, direkt oder nach 100 bis 10 000-facher Verdünnung anwenden oder sie als chemisches Bad verwenden.

Außerdem wurde gefunden, daß die erfindungsgemäßen Verbindungen eine hohe insektizide Wirkung gegen Insekten zeigen, die technische Materialien zerstören.

- 5 Beispielhaft und vorzugsweise - ohne jedoch zu limitieren - seien die folgenden Insekten genannt:

Käfer wie *Hylotrupes bajulus*, *Chlorophorus pilosis*, *Anobium punctatum*, *Xestobium rufovillosum*, *Ptilinus pecticornis*, *Dendrobium pertinex*, *Ernobius mollis*, *Priobium carpini*, *Lyctus brunneus*, *Lyctus africanus*, *Lyctus planicollis*, *Lyctus linearis*, *Lyctus pubescens*, *Trogoxylon aequale*, *Minthes rugicollis*, *Xyleborus spec.*, *Tryptodendron spec.*, *Apate monachus*, *Bostrychus capucins*, *Heterobostrychus brunneus*, *Sinoxylon spec.*, *Dinoderus minutus*;

Hautflügler wie *Sirex juveneus*, *Urocerus gigas*, *Urocerus gigas taignus*, *Urocerus augur*;

Termiten wie *Kaloterme flavicollis*, *Cryptoterme brevis*, *Heteroterme indicola*, *Reticuliterme flavipes*, *Reticuliterme santonensis*, *Reticuliterme lucifugus*, *Mastoterme darwiniensis*, *Zootermopsis nevadensis*, *Coptoterme formosanus*;

- 15 Borstenschwänze wie *Lepisma saccharina*.

Unter technischen Materialien sind im vorliegenden Zusammenhang nicht-lebende Materialien zu verstehen, wie vorzugsweise Kunststoffe, Klebstoffe, Leime, Papiere und Kartone, Leder, Holz, Holzverarbeitungsprodukte und Anstrichmittel.

- 20 Die anwendungsfertigen Mittel können gegebenenfalls noch weitere Insektizide und gegebenenfalls noch ein oder mehrere Fungizide enthalten.

Zugleich können die erfindungsgemäßen Verbindungen zum Schutz vor Bewuchs von Gegenständen, insbesondere von Schiffskörpern, Sieben, Netzen, Bauwerken, Kaianlagen und Signalanlagen, welche mit See- oder Brackwasser in Verbindung kommen, eingesetzt werden.

- 25 Weiter können die erfindungsgemäßen Verbindungen allein oder in Kombinationen mit anderen Wirkstoffen als Antifouling-Mittel eingesetzt werden.

Die Wirkstoffe eignen sich auch zur Bekämpfung von tierischen Schädlingen im Haushalts-, Hygiene- und Vorratsschutz, insbesondere von Insekten, Spinnentieren und Milben, die in geschlossenen Räumen, wie beispielsweise Wohnungen, Fabrikhallen, Büros, Fahrzeugkabinen u.ä. vorkommen. Sie können zur

Bekämpfung dieser Schädlinge allein oder in Kombination mit anderen Wirk- und Hilfsstoffen in Haushaltsinsektizid-Produkten verwendet werden. Sie sind gegen sensible und resistente Arten sowie gegen alle Entwicklungsstadien wirksam. Zu diesen Schädlingen gehören:

Aus der Ordnung der Scorpionidea z.B. *Buthus occitanus*.

- 5 Aus der Ordnung der Acarina z.B. *Argas persicus*, *Argas reflexus*, *Bryobia* spp., *Dermanyssus gallinae*, *Glyciphagus domesticus*, *Ornithodoros moubat*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Trombicula alfreddugesi*, *Neutrombicula autumnalis*, *Dermatophagoides pteronissimus*, *Dermatophagoides farinae*.

Aus der Ordnung der Araneae z.B. *Aviculariidae*, *Araneidae*.

- 10 Aus der Ordnung der Opiliones z.B. *Pseudoscorpiones chelifer*, *Pseudoscorpiones cheiridium*, *Opiliones phalangium*.

Aus der Ordnung der Isopoda z.B. *Oniscus asellus*, *Porcellio scaber*.

Aus der Ordnung der Diplopoda z.B. *Blaniulus guttulatus*, *Polydesmus* spp.

Aus der Ordnung der Chilopoda z.B. *Geophilus* spp.

Aus der Ordnung der Zygentoma z.B. *Ctenolepisma* spp., *Lepisma saccharina*, *Lepismodes inquilinus*.

- 15 Aus der Ordnung der Blattaria z.B. *Blatta orientalis*, *Blattella germanica*, *Blattella asahinai*, *Leucophaea maderae*, *Panchlora* spp., *Parcoblatta* spp., *Periplaneta australasiae*, *Periplaneta americana*, *Periplaneta brunnea*, *Periplaneta fuliginosa*, *Supella longipalpa*.

Aus der Ordnung der Saltatoria z.B. *Acheta domesticus*.

Aus der Ordnung der Dermaptera z.B. *Forficula auricularia*.

- 20 Aus der Ordnung der Isoptera z.B. *Kaloterme* spp., *Reticuliterme* spp.

Aus der Ordnung der Psocoptera z.B. *Lepinatus* spp., *Liposcelis* spp.

Aus der Ordnung der Coleoptera z.B. *Anthrenus* spp., *Attagenus* spp., *Dermestes* spp., *Latheticus oryzae*, *Necrobia* spp., *Ptinus* spp., *Rhizopertha dominica*, *Sitophilus granarius*, *Sitophilus oryzae*, *Sitophilus zeamais*, *Stegobium paniceum*.

- 25 Aus der Ordnung der Diptera z.B. *Aedes aegypti*, *Aedes albopictus*, *Aedes taeniorhynchus*, *Anopheles* spp., *Calliphora erythrocephala*, *Chrysosoma pluvialis*, *Culex quinquefasciatus*, *Culex pipiens*, *Culex tarsalis*,

- 168 -

Drosophila spp., *Fannia canicularis*, *Musca domestica*, *Phlebotomus* spp., *Sarcophaga carnaria*, *Simulium* spp., *Stomoxys calcitrans*, *Tipula paludosa*.

Aus der Ordnung der Lepidoptera z.B. *Achroia grisella*, *Galleria mellonella*, *Plodia interpunctella*, *Tinea cloacella*, *Tinea pellionella*, *Tineola bisselliella*.

- 5 Aus der Ordnung der Siphonaptera z.B. *Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*, *Pulex irritans*, *Tunga penetrans*, *Xenopsylla cheopis*.

Aus der Ordnung der Hymenoptera z.B. *Camponotus herculeanus*, *Lasius fuliginosus*, *Lasius niger*, *Lasius umbratus*, *Monomorium pharaonis*, *Paravespula* spp., *Tetramorium caespitum*.

- 10 Aus der Ordnung der Anoplura z.B. *Pediculus humanus capitis*, *Pediculus humanus corporis*, *Pemphigus* spp., *Phylloera vastatrix*, *Phthirus pubis*.

Aus der Ordnung der Heteroptera z.B. *Cimex hemipterus*, *Cimex lectularius*, *Rhodinus prolixus*, *Triatoma infestans*.

- 15 Die Anwendung im Bereich der Haushaltsinsektizide erfolgt allein oder in Kombination mit anderen geeigneten Wirkstoffen wie Phosphorsäureestern, Carbamaten, Pyrethroiden, Neo-nicotinoiden, Wachstumsregulatoren oder Wirkstoffen aus anderen bekannten Insektizidklassen.

- 20 Die Anwendung erfolgt in Aerosolen, drucklosen Sprühmitteln, z.B. Pump- und Zerstäubersprays, Nebelautomaten, Foggern, Schäumen, Gelen, Verdampferprodukten mit Verdampferplättchen aus Cellulose oder Kunststoff, Flüssigverdampfern, Gel- und Membranverdampfern, propellergetriebenen Verdampfern, energielosen bzw. passiven Verdampfungssystemen, Mottenpapieren, Mottensäckchen und Mottengelen, als Granulate oder Stäube, in Streuködern oder Köderstationen.

Beispiele

Herstellungsbeispiele einschließlich der weiteren Erläuterung der Verfahren und Zwischenprodukte

- 25 Die folgenden Herstellungs- und Verwendungsbeispiele illustrieren die Erfindung, ohne sie zu beschränken. Die Produkte wurden mittels ¹H-NMR Spektroskopie und/oder LC-MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry) und/oder GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry) charakterisiert.

Die Bestimmung der logP Werte erfolgte analog OECD Guideline 117 (EC Directive 92/69/EEC) durch HPLC (High Performance Liquid Chromatography) an reversed-phase Säulen (C 18), mit nachfolgenden Methoden:

[a] Die Bestimmung mit der LC-MS im sauren Bereich erfolgt bei pH 2,7 mit 0,1 % wässriger Ameisensäure und Acetonitril (enthält 0,1% Ameisensäure) als Eluenten; linearer Gradient von 10% Acetonitril bis 95% Acetonitril. $\text{LogP}^{[a]}$ wird auch $\text{logP}(\text{HCOOH})$ genannt.

- 5 [b] Die Bestimmung mit der LC-MS im neutralen Bereich erfolgt bei pH 7.8 mit 0,001 molarer wässriger Ammoniumhydrogencarbonat-Lösung und Acetonitril als Eluenten; linearer Gradient von 10 % Acetonitril bis 95 % Acetonitril. $\text{LogP}^{[b]}$ wird auch $\text{logP}(\text{neutral})$ genannt.

Die Eichung erfolgt mit Lösungen einer homologen Reihe unverzweigter Alkan-2-onen (mit 3 bis 16 Kohlenstoffatomen), deren logP -Werte bekannt sind (Bestimmung der logP -Werte anhand der Retentionszeiten durch lineare Interpolation zwischen zwei aufeinander folgenden Alkanonen).

- 10 Die NMR-Spektren wurden mit einem Bruker II Avance 400, ausgestattet mit einem 1,7 mm TCI-Probenkopf, gemessen. In Einzelfällen wurden die NMR Spektren mit einem Bruker Avance II 600 bestimmt.

- 15 Die NMR-Daten ausgewählter Beispiele werden in klassischer Form (δ -Werte, Multiplettaufspaltung, Anzahl der H-Atome) aufgeführt. Die Aufspaltung der Signale wurde wie folgt beschrieben: s (Singulett), d (Duplett), t (Triplett), q (Quartett), m (Multiplett), breit (für breite Signale). Als Lösungsmittel wurden CD_3CN , CDCl_3 oder $\text{D}_6\text{-DMSO}$ verwendet, wobei als Referenz Tetramethylsilan (0.00 ppm) eingesetzt wurde.


- 20 Die GC-MS-Spektren wurden mit einem Agilent 6890 GC, HP 5973 MSD an Dimethylsilikonphase bestimmt, mit einem Temperaturgradient von 50 °C bis 320 °C. GC-MS-Indices wurden als Kovats-Indices mit Lösung einer homologen Reihe von n-Alkanen (mit geradzahlgiger Anzahl von 8 bis 38 Kohlenstoffatomen) bestimmt.

Die Enantiomere wurden aus dem Racemat gewonnen, in dem sie präparativ mittels HPLC über einer chiralen Säule (ChiralCel OJ-H z.B. 5nm 250 x4.6 mm) mit Laufmittel Heptan / Methanol / Ethanol (95:2.5:2.5) getrennt wurden.

- 25 **Synthese von Anilinen der Formel (IVa), (IVb) und Zwischenstufen (X), (XI), (XII), (XIII), (XVI), (XVII), (XVIII), (XIX) und (XX)**

2,2,2-Trifluor-N-(2-fluor-4-methylphenyl)acetamid (XIII-1)

- 170 -




27,5 g 2-Fluor-4-methylanilin werden bei 0 °C in 300 mL Dichlormethan vorgelegt, 26,7 g Triethylamin werden zugegeben und anschließend werden 50,8 g Trifluoressigsäureanhydrid zugetropft. Es wird 2 h bei 0 °C nachgerührt und anschließend einrotiert. Der Rückstand wird in Wasser aufgenommen und zweimal
5 mit Ethylacetat extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet, filtriert, und das Lösemittel wird im Vakuum entfernt. Es werden 49,0 g (100% d.Th.) der Titelverbindung erhalten. logP[a]: 2,40

- 171 -


Analog erhalten wurde:

***N*-(4-Chlor-2-fluorphenyl)-2,2,2-trifluoracetamid (XIII-2)**




logP[a]: 2,53; logP[b]: 2,40; ¹H-NMR (D₆-DMSO, 400MHz) δ ppm 11,29(s,1H), 7,62(dd,1H), 7,55(dd,1H),
 5 7,37(dd,1H)

4-Fluor-2-methyl-5-[(trifluoroacetyl)amino]benzolsulfonylchlorid (XII-1)



258 g Chlorsulfonsäure werden vorgelegt und bei Raumtemperatur werden 49 g 2,2,2-Trifluor-*N*-(2-fluor-4-methylphenyl)acetamid in Portionen zugesetzt. Bei Raumtemperatur wird noch 16 h nachgerührt. Die
 10 Mischung wird unter Rühren auf Eis gegeben und zweimal mit Ethylacetat extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet, filtriert, und das Lösemittel wird im Vakuum entfernt. Es werden 70,8 g des Chlorsulfonyls (XII-1) erhalten. Das Rohprodukt wird sofort weiter umgesetzt.

***N,N'*-[Disulfanediylbis(6-fluor-4-methylbenzol-3,1-diyl)]bis(2,2,2-trifluoracetamid) (XI-1)**




298,8 g Natriumiodid werden in 1000 mL Trifluoressigsäure gelöst und 70,8 g 4-Fluor-2-methyl-5-[(trifluoroacetyl)amino]benzoylchlorid werden bei Raumtemperatur zugegeben. Es wird 16 h bei
 Raumtemperatur nachgerührt und anschließend das Lösemittel im Vakuum entfernt. Der Rückstand wird

- 172 -

mit Wasser verrührt und abgesaugt. Es werden 62,3 g (86% d.Th.) der Titelverbindung als Feststoff erhalten. logP[a]: 4,41

Analog erhalten wurde:


***N,N'*-[Disulfanediylbis(4-chlor-6-fluorbenzol-3,1-diyl)]bis(2,2,2-trifluoracetamid) (XI-2)**



5

logP[a]: 4,60; logP[b]: 3,82; ¹H-NMR (D₆-DMSO, 400MHz) δ ppm 11,44(s,2H), 7,95(d,2H), 7,83(d,2H)

2,2,2-Trifluor-*N*-{2-fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}acetamid (X-1)




- 3,4 g *N,N'*-[Disulfanediylbis(6-fluor-4-methylbenzol-3,1-diyl)]bis(2,2,2-trifluoracetamid) werden in 150 ml *N,N*-Dimethylformamid gelöst und mit 1,86 g Kaliumcarbonat, 3,11 g 1,1,1-Trifluoriodethan, 2,39 g Rongalit und einigen Tropfen Wasser versetzt. Die Reaktionsmischung wird 16 h bei Raumtemperatur gerührt. Die Hauptmenge des *N,N*-Dimethylformamids wird im Vakuum abdestilliert. Der Rückstand wird in Wasser aufgenommen und zweimal mit Ethylacetat extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet, filtriert, und anschließend wird das Lösemittel im Vakuum entfernt.
- Es werden 4,48 g (90% d.Th.) der Titelverbindung erhalten. logP[a]: 3,31

Analog erhalten wurde:


***N*-{4-Chlor-2-fluor-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}-2,2,2-trifluoracetamid (X-2)**

- 173 -




logP[a]: 3,34; logP[b]: 3,14; ¹H-NMR (D₆-DMSO, 400MHz) δ ppm 11,47(bs,1H), 7,85(d,1H), 7,76(d,1H), 4,09(q,2H)

S-(5-Acetamido-4-fluor-2-methylphenyl)ethanthioat (XVII-1)




99,3 g 5-Acetamido-4-fluor-2-methylbenzenesulfonylchlorid werden in 700 mL Eisessig suspendiert, mit 0,9 g Iod und 38,7 g rotem Phosphor versetzt und 5 h bei Rückfluß nachgerührt. Nach Abkühlen wird der Feststoff abfiltriert und das Filtrat einrotiert. Der Rückstand wird mit Wasser verrührt und abgesaugt. 57,6 g (67% d.Th.) der Titelverbindung werden als Feststoff erhalten. logP[a]: 1,78

5-Amino-4-fluor-2-methylbenzothiol (XVI-1)




57,4 g S-(5-Acetamido-4-fluor-2-methylphenyl)ethanthioat werden in 750 mL Wasser und 96,6 g Kaliumhydroxid gelöst. Die Reaktionsmischung wird 16 h bei Rückfluß gekocht. Nach Abkühlen wird die Lösung mit Salzsäure auf pH 2-3 gestellt und der ausgefallene Feststoff abgesaugt. 35,8 g (94% d.Th.) der Titelverbindung werden als Feststoff erhalten. logP[a]: 3,70

2-Fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfinyl]anilin (IVb-1)

5,00 g (0,21 mmol) 2-Fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]anilin werden bei 0-4 °C in 100 ml Dichlormethan vorgelegt, 6,18 g (0,25 mmol) *meta*-Chlorperbenzoesäure werden dazu gegeben und das Reaktionsgemisch wird 2 h bei Raumtemperatur nachgerührt. Anschließend mit einer 33%igen Natriumthiosulfatlösung versetzt (Peroxid-Test durchgeführt) und zweimal mit Dichlormethan ausgeschüttelt. Die vereinigten organischen Phasen werden mit einer gesättigten Natriumcarbonatlösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet, filtriert, und das Lösemittel wird im Vakuum entfernt. Der Rückstand enthält 5,10 g (90% Reinheit, 86% d.Th.) der Titelverbindung als brauner Öl.


logP[a]: 1,77; logP[b]: 1,72; ¹H-NMR (D₆-DMSO, 400MHz) δ ppm 7,26(d,1H), 7,02(d,1H), 5,45(bs,2H), 4,08-3,95(m,1H), 3,88-3,75(m,1H), 2,19(s,3H)

1,1'-Disulfanediylbis(2-chlor-5-nitrobenzol) (XIX-3)


52,0 g (203,1 mmol) 2-Chlor-5-nitrobenzolsulfonylchlorid werden unter starkem Rühren mit 236,1 g (1,02 mol) Chlorsulfonsäure versetzt und über Nacht bei Raumtemperatur gerührt. Nach Zugabe von 40%iger wässriger Natriumhydrogensulfid-Lösung wird der gebildete Feststoff abgesaugt, mit Wasser gewaschen und über Nacht auf einer Tonplatte getrocknet. Es werden 36,1 g (100% Reinheit, 94% d.Th.) der Titelverbindung als graubrauner Feststoff erhalten.

logP[a]: 5,03; logP[b]: 5,01; ¹H-NMR (D₆-DMSO, 400MHz) δ ppm 8,40(d,2H), 8,18-8,16(m,2H), 7,91(d,2H); GC-MS: EI-Masse (m/z): 376 (2Cl) [M]⁺

- 175 -

1,1'-Disulfanediylbis(2,4-dichlor-5-nitrobenzol) (XIX-6)

logP[a]: 5,69; logP[b]: 5,64; ¹H-NMR (D6-DMSO, 400MHz) δ ppm 8,33(s,2H), 8,21(s,2H)

3,3'-Disulfanediylbis(4-chloranilin) (XVIII-3)

8,00 g (21,2 mmol) 1,1'-Disulfanediylbis(2-chlor-5-nitrobenzol) werden in 150 mL THF gelöst, mit 1,6 g Raney-Nickel versetzt und 72 h bei 50 °C unter Wasserstoffatmosphäre (20 bar) gerührt. Die Reaktionsmischung wird mit THF über Kieselgur filtriert, das Filtrat wird unter vermindertem Druck vom Lösungsmittel befreit. Es werden 6,64 g (90% Reinheit, 89% der Theorie) eines Gemisches aus 1,1'-Disulfanediylbis(2-chlor-5-nitrobenzol) und 5-Amino-2-chlorbenzothiol erhalten, das ohne weitere Aufreinigung alkyliert wird.

1,1'-Disulfanediylbis(2-chlor-5-nitrobenzol) (XIX-3):


logP[a]: 3,31; logP[b]: 3,35; ¹H-NMR (D6-DMSO, 400MHz) δ ppm 7,10(d,2H), 6,73(d,2H), 6,47-6,44(m,2H), 5,51(breit,4H); GC-MS: EI-Masse (m/z): 316 (2Cl) [M]⁺

5-Amino-2-chlorbenzothiol (XVI-3):


logP[a]: 1,64; logP[b]: nicht messbar; ¹H-NMR (D6-DMSO, 400MHz) δ ppm 7,01(d,1H), 6,54(d,1H), 6,35-6,32(m,1H), 5,28(breit,3H); GC-MS: EI-Masse (m/z): 159 (1Cl) [M]⁺

Analog erhalten wurden:

- 176 -

3,3'-Disulfanediylbis(4,6-dichloranilin) (XVIII-6)

logP[a]: 5,14; logP[b]: 4,95; $^1\text{H-NMR}$ (D6-DMSO, 400MHz) δ ppm 7,41(s,2H), 6,95(s,2H), 5,78(breit,4H); GC-MS: EI-Masse (m/z): 386 (4Cl) $[\text{M}]^+$


5 4-Chlor-3-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]anilin (IVa-3)

6,40 g eines Gemisches aus Disulfanediylbis(2-chlor-5-nitrobenzol) und 5-Amino-2-chlorbenzothiol (ca. 20 mmol) werden in 100 mL N,N-Dimethylformamid vorgelegt und mit 7,02 g (40,3 mmol) Natriumdithionit, 5,58 g (40,3 mmol) Kaliumcarbonat und 5,49 g (40,3 mmol) Rongalit versetzt und auf 0 °C abgekühlt. 9,32 g 1,1,1-Trifluor-2-iodethan werden bei 0 °C zugetropft. Die Reaktionsmischung wird über Nacht bei Raumtemperatur gerührt. Ein Großteil des Lösungsmittels wird unter vermindertem Druck entfernt, der Rückstand wird mit Wasser versetzt und mit Essigester extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden sukzessive mit Wasser, gesättigter wässriger Natriumchlorid-Lösung gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet, filtriert und unter vermindertem Druck vom Lösungsmittel befreit. Nach säulenchromatographischer Reinigung an Kieselgel mittels MPLC mit Cyclohexan/Essigester als Laufmittel erhält man 4,70 g (98% Reinheit, 47% der Theorie) der Titelverbindung als gelbe Flüssigkeit.

logP[a]: 2,64; logP[b]: 2,69; $^1\text{H-NMR}$ (D6-DMSO, 400MHz) δ ppm 7,09(d,1H), 6,78(d,1H), 6,49-6,46(m,1H), 5,37(breit,2H), 3,90(q,2H) ; GC-MS: EI-Masse (m/z): 241 (1Cl) $[\text{M}]^+$



Analog erhalten wurden:

- 177 -

4-Chlor-2-fluor-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]anilin (IVa-2)

11,0 g (30,9 mmol) *N*-{4-Chlor-2-fluor-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}-2,2,2-trifluoracetamid in 150 ml Dioxan werden vorsichtig zu einer Lösung aus 10,3 ml (186 mmol) Schwefelsäure (96%ig) in 100 ml Wasser zu gegeben. Anschließend wird das Reaktionsgemisch über Nacht refluxiert. Nach Abkühlen wird die Lösung mit einer gesättigten Natriumhydrogencarbonatlösung und etwas Natriumcarbonat auf pH 7 gebracht und dreimal mit Essigester extrahiert. Die vereinten organischen Phasen werden mit einer gesättigten Natriumchloridlösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet, filtriert und eingeeengt. Der Rückstand enthält 8,27 g (96% Reinheit, 99% d.Th.) der Titelverbindung als schwarzes Öl/Feststoff-Gemisch.

logP[a]: 3,02; logP[b]: 3,00; ¹H-NMR (D₆-DMSO, 400MHz) δ ppm 7,27(d,1H), 7,04(d,1H), 5,46(bs,2H), 3,85(q,2H)

Synthese von Bromiden der Formel (VIIa)**5-Brom-2-methylphenyl-2,2,2-trifluorethylsulfid (VIIa-7)****Stufe 1: 5-Brom-2-methylbenzolsulfonylchlorid**


69,50 g (406,3 mmol) 4-Bromtoluol werden in 250 ml Dichlormethan vorgelegt und bei -5 - 5 °C tropfenweise mit 175,33 g (1,50 mol) Chlorsulfonsäure versetzt. Die Reaktionsmischung wird über Nacht unter Rühren auf Raumtemperatur gebracht, mit 1000 mL Eiswasser versetzt und mit Dichlormethan extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden mit gesättigter wässriger Kochsalzlösung gewaschen,

- 178 -

über Magnesiumsulfat getrocknet, filtriert und unter vermindertem Druck vom Lösungsmittel befreit. Man erhält 89,54 g (95% Reinheit, 78% der Theorie) der Titelverbindung als gelbe Flüssigkeit, die ohne weitere Aufreinigung weiter umgesetzt wird.

logP[a]: 3,73; logP[b]: 3,74; GC-MS: EI-Masse (m/z): 270 (1Cl,1Br) [M]⁺; ¹H-NMR (CDCl₃, 400 MHz): 8,19(d,1H), 7,73-7,72(m,1H), 7,31(d,1H), 2,73(s,3H); ¹H-NMR (CD₃CN, 400 MHz): 8,18(d,1H), 7,88-7,85(m,1H), 7,46(d,1H), 2,71(s,3H)


Stufe 2: 1,1'-Disulfanediylbis(5-brom-2-methylbenzol)



25,00 g (92,7 mmol) 5-Brom-2-methylbenzolsulfonylchlorid werden mit 145,7 g wässriger Iodwasserstoffsäure (57%ig, 649,2 mmol) unter kräftigem Rühren versetzt. Die Reaktionsmischung wird 3 d bei Raumtemperatur gerührt, dann mit 40%iger wässriger Natriumhydrogensulfidlösung versetzt. Der Feststoff wird abgesaugt, gründlich mit Wasser gewaschen und über Nacht auf einer Tonplatte getrocknet. Man erhält 19,50 g (95% Reinheit, 99% der Theorie) der Titelverbindung als gelben Feststoff, der ohne weitere Aufreinigung weiter umgesetzt wird.

logP[a]: >7,36; logP[b]: >7,36; GC-MS: EI-Masse (m/z): 404 (2Br) [M]⁺; ¹H-NMR (D₆-DMSO): 7,56(d,2H), 7,46-7,43(m,2H), 7,26(d,2H), 2,35(s,6H)

Stufe 3: 5-Brom-2-methylphenyl-2,2,2-trifluorethylsulfid (VIIa-7)



27,70 g (68,5 mmol) 1,1'-Disulfanediylbis(5-brom-2-methylbenzol) werden in 350 mL *N,N*-Dimethylformamid vorgelegt, mit 23,86 g (137,1 mmol) Natriumdithionit, 18,66 g (137,1 mmol) Rongalit® sowie 18,94 g (137,1 mmol) Kaliumcarbonat versetzt und auf 0 °C gekühlt. 31,65 g (150,8 mmol) 1,1,1-Trifluor-2-iodethan in 20 mL *N,N*-Dimethylformamid werden bei 0 °C tropfenweise zugegeben. Die Reaktionsmischung wird über Nacht unter Rühren auf Raumtemperatur gebracht, mit 500 mL Wasser versetzt und mit *tert*-Butyl-methylether extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen

- 179 -

werden mit Wasser, gesättigter wässriger Natriumbicarbonatlösung und gesättigter wässriger Kochsalzlösung gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet, filtriert und unter vermindertem Druck vom Lösungsmittel befreit. Nach säulenchromatographischer Reinigung an Kieselgel mittels MPLC mit Cyclohexan/Essigester als Laufmittel erhält man 30,01 g (93% Reinheit, 71% der Theorie) der


5 Titelverbindung als farblose Flüssigkeit.

logP[a]: 4,29; logP[b]: 4,26; GC-MS: EI-Masse (m/z): 286 (1Br) [M]⁺;

¹H-NMR (D6-DMSO, 400MHz) δ ppm: 7,70(d,1H), 7,39-7,36(m,1H), 7,21(d,1H), 4,09(q,2H), 2,30(s,3H)

Analog erhalten wurden:


4-Brom-1-methoxy-2-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]benzol (VIIa-8)



logP[a]: 3,69; logP[b]: 3,81; GC-MS: EI-Masse (m/z): 302 (1Br) [M]⁺;

¹H-NMR (D6-DMSO, 400MHz) δ ppm: 7,59(d,1H), 7,45-7,42(m,1H), 7,00(d,1H), 4,02(q,2H), 3,85(s,3H)

4-Brom-1-chlor-2-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]benzol (VIIa-3)




- 15 Erhalten als Mischung aus 60% 4-Brom-1-chlor-2-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]benzol und 40% 1-Brom-4-chlor-2-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]benzol.

logP[a]: 4,20; logP[b]: 4,21; GC-MS: EI-Masse (m/z): 306 (1Br,1Cl) [M]⁺;

¹H-NMR (D6-DMSO, 400MHz) δ ppm: 7,85(breit,1H), 7,70(d,1'H), 7,67(d,1'H), 7,50-7,44(m,2H), 7,27-7,24(m,1'H), 4,30-4,22(m,2H+2'H)

- 20 **1-Brom-2-fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]benzol (VIIa-1)**


- 180 -



logP[a]: 4,30; logP[b]: 4,34; GC-MS: EI-Masse (m/z): 304 (1Br) [M]⁺;

¹H-NMR (D6-DMSO, 400MHz): 7,87(d,1H), 7,36(d,1H), 4,02(q,2H), 2,35(s,3H)

1-Brom-2,4-dichlor-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]benzol (VIIa-6)




5

logP[a]: 4,80; logP[b]: 4,77; GC-MS: EI-Masse (m/z): 340 (1Br,2Cl) [M]⁺;

¹H-NMR (D6-DMSO, 400MHz): 8,04(s,1H), 7,91(s,1H), 4,28(q,2H)


1-Brom-2,4-dimethyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]benzol (VIIa-11)



10 logP[a]: 4,81; logP[b]: 4,77; GC-MS: EI-Masse (m/z): 340 (1Br,2Cl) [M]⁺;

¹H-NMR (D6-DMSO, 400MHz): 8,04(s,1H), 7,91(s,1H), 4,28(q,2H)


1-Brom-4-chlor-2-fluor-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]benzol (VIIa-2)




logP[a]: 4,28; logP[b]: 4,29; GC-MS: EI-Masse (m/z): 324 (1Cl,1Br) [M]⁺; ¹H-NMR (D6-DMSO,

15 400MHz): 8,04(d,1H), 7,77(d,1H), 4,20(q,2H)


- 181 -

1,4-Dibrom-2-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]benzol (VIIa-13)

logP[a]: 4,29; logP[b]: 4,25; GC-MS: EI-Masse (m/z): 350 (2Br) [M]⁺; ¹H-NMR (D6-DMSO, 400MHz): 7,81(d,1H), 7,60(d,1H), 7,39-7,37(m,1H), 4,26(q,2H)


5 1,4-Dibrom-2-fluor-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]benzol (VIIa-14)

logP[a]: 4,39; logP[b]: 4,36; GC-MS: EI-Masse (m/z): 368 (2Br) [M]⁺; ¹H-NMR (D6-DMSO, 400MHz): 8,00(d,1H), 7,87(d,1H), 4,21(q,2H)

1-Brom-2,4-difluor-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]benzol (VIIa-15)

10

logP[a]: 3,89; logP[b]: 3,86; GC-MS: EI-Masse (m/z): 308 [M]⁺; ¹H-NMR (D6-DMSO, 400MHz): 8,07(t,1H), 7,63(t,1H), 4,03(q,2H)

4-Brom-2-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]benzonitril (VIIa-9)

15 24,0 g (86,4 mmol) Natriumhydrid (60%ig in Mineralöl) werden in 300 ml *N,N*-Dimethylformamid


- 182 -

vorgelegt und bei 0 °C tropfenweise mit 10,0 g (86,4 mmol) 2,2,2-Trifluorethanthiol versetzt. Die Reaktionsmischung wird bei 0 °C tropfenweise zu einer Lösung aus 14,4 g (72,0 mmol) 4-Brom-2-fluorbenzonitril in 100 mL *N,N*-Dimethylformamid gegeben und über Nacht unter Rühren auf Raumtemperatur gebracht. Die Reaktionsmischung wird in Wasser gegossen, mit gesättigter wässriger Ammoniumchloridlösung neutralisiert und mit *tert*-Butyl-methylether extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden sukzessive mit Wasser und gesättigter wässriger Kochsalzlösung gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet, filtriert und unter vermindertem Druck vom Lösungsmittel befreit. Der Rückstand wird mit Petrolether verrührt, abfiltriert und aus Diethylether umkristallisiert. Man erhält 17,6 g (99% Reinheit, 82% der Theorie) der Titelverbindung als farblosen Feststoff.

- 10 logP[a]: 3,21; logP[b]: 3,16; ¹H-NMR (D6-DMSO, 400MHz) δ ppm: 8,12(d,1H), 7,83(d,1H), 7,72-7,69(m,1H), 4,33(q,2H)


Analog erhalten wurde:

4-Brom-2-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]-1-(trifluormethyl)benzol (VIIa-10)




- 15 logP[a]: 4,22; logP[b]: 4,20; ¹H-NMR (D6-DMSO, 400MHz): 8,18(s,1H), 7,73-7,68(m,2H), 4,30(q,2H)

Synthese von Iodiden der Formel (VIIa)



1-Fluor-2-iod-5-methyl-4-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]benzol (VIIa-1-I)



- 20 10,0 g (33,0 mmol) 5-Brom-2-methylphenyl-2,2,2-trifluorethylsulfid, 9,89 g (66,0 mmol) Natriumiodid,

- 183 -

314 mg (1,65 mmol) Kupfer(I)-iodid und 469 mg (3,3 mmol) *trans*-*N,N'*-Dimethylcyclohexan-1,2-diamin (racemisch) wurden in 33 mL entgastem Dioxan über Nacht bei 110 °C gerührt. Erneut wurden 9,89 g (66,0 mmol) Natriumiodid, 314 mg (1,65 mmol) Kupfer(I)-iodid und 234 mg (1,65 mmol) *trans*-*N,N'*-Dimethylcyclohexan-1,2-diamin (racemisch) zugesetzt und über Nacht bei 110 °C gerührt.


- 5 Erneut wurden 9,89 g (66,0 mmol) Natriumiodid und 314 mg (1,65 mmol) Kupfer(I)-iodid sowie 20 mL Dioxan zugesetzt und über Nacht bei 110 °C gerührt. Nach Abkühlen auf Raumtemperatur wurde mit Essigester verdünnt, über Kieselgur filtriert und konzentriert. Nach säulenchromatographischer Reinigung an Kieselgel mittels MPLC mit Cyclohexan/Essigester als Laufmittel erhält man 8,77 g (97% Reinheit, 74% der Theorie) der Titelverbindung als farbloses Öl.

- 10 logP[a]: 4,44; logP[b]: 4,44; GC-MS: EI-Masse (m/z): 350 [M]⁺

¹H-NMR (D6-DMSO, 400MHz): 7,97(d,1H), 7,24(d,1H), 3,96(q,2H), 2,35(s,3H)

Analog erhalten wurde:


4-Iod-1-methyl-2-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]benzol (VIIa-7-I)




- 15 logP[a]: 4,49; logP[b]: 4,48; GC-MS: EI-Masse (m/z): 332 [M]⁺


¹H-NMR (D6-DMSO, 400 MHz): 7,83(d,1H), 7,55-7,53(m,1H), 7,05(d,1H), 4,05(q,2H), 2,30(s,3H)

Synthese von Boronsäuren der Formel (VIII)



{4-Methyl-3-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}boronsäure (VIIIa-7)




Stufe 1: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-{4-methyl-3-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}-1,3,2-dioxaborolan

15,0 g (52,6 mmol) 5-Brom-2-methylphenyl-2,2,2-trifluorethylsulfid, 14,7 g (57,9 mmol) 4,4,4',4',5,5,5',5'-
 Octamethyl-2,2'-bi-1,2,3-dioxaborolan, 10,3 g (105,2 mmol) Kaliumacetat und 2,15 g (2,63 mmol)
 5 1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen-palladium(II)dichlorid-Methylenchlorid-Addukt werden in 78 ml
 entgastem trockenen Dioxan vorgelegt und 40 min unter Mikrowellenbestrahlung (Anton Paar Multiwave)
 bei 160 °C gerührt. Die Reaktionsmischung wird mit Essigester über Kieselgel filtriert und unter
 vermindertem Druck vom Lösungsmittel befreit. Nach säulenchromatographischer Reinigung an Kieselgel
 mittels MPLC mit Cyclohexan/Essigester als Laufmittel erhält man 14,07 g (90% Reinheit, 72% der
 10 Theorie) der Titelverbindung als grünes Öl.

logP[a]: 3,73; logP[b]: 3,74; ESI-Masse (m/z): 333 [M+1]⁺; GC-MS: EI-Masse (m/z): 332 [M]⁺

¹H-NMR(D6-DMSO, 400MHz) δ ppm: 7,77(s,1H), 7,52(d,1H), 7,30(d,1H), 3,87(q,2H), 2,42(s,3H),
 1,29(s,12H)

Stufe 2: {4-Methyl-3-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}boronsäure (VIIIa-7) und {4-Methyl-3-[(2,2,2-
 15 trifluorethyl)sulfinyl]phenyl}boronsäure (VIIIb-7)



730 mg (2,2 mmol) 4,4,5,5-Tetramethyl-2-{4-methyl-3-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}-1,3,2-
 dioxaborolan werden in 20 ml Aceton und 20 mL Wasser vorgelegt und bei 0 °C mit 381 mg (4,9 mmol)
 Ammoniumacetat sowie 1,06 g (4,9 mmol) Natriumperiodat versetzt. Die Reaktionsmischung wird über
 20 Nacht bei Raumtemperatur gerührt und anschließend unter vermindertem Druck von Aceton befreit. Die
 saure wässrige Phase wird mit Essigester extrahiert, die vereinigten organischen Phasen werden sukzessive
 mit Wasser und gesättigter wässriger Kochsalzlösung gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet, filtriert
 und unter vermindertem Druck vom Lösungsmittel befreit. Nach säulenchromatographischer Reinigung an
 Kieselgel mittels MPLC mit Cyclohexan/Essigester als Laufmittel erhält man 105 mg (96% Reinheit, 18%
 25 der Theorie) {4-Methyl-3-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}boronsäure sowie 138 mg (97% Reinheit,

- 185 -

23% der Theorie) {4-Methyl-3-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfinyl]phenyl}boronsäure als farblose Feststoffe.

{4-Methyl-3-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfinyl]phenyl}boronsäure

logP[a]: 2,30; logP[b]: 2,24; ESI-Masse (m/z): pos.[a]: 251 [M+1]⁺, neg.[b]: 249 [M-1]⁻

¹H-NMR (D6-DMSO, 400 MHz): 8,08(s,2H), 7,92(s,1H), 7,61-7,59(m,1H), 7,23(d,1H), 3,90(q,2H),
5 2,38(s,3H)


{4-Methyl-3-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfinyl]phenyl}boronsäure

logP[a]: 1,41; logP[b]: 1,36; ESI-Masse (m/z): pos.[a]: 267 [M+1]⁺;

¹H-NMR (D6-DMSO, 400 MHz): 8,31(s,1H), 8,24(s,2H), 7,89-7,87(m,1H), 7,31(d,1H), 4,12-4,02(m,1H),
3,94-3,82(m,1H), 2,39(s,3H)


10 Analog erhalten wurden:

2-{2-Fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan



logP[a]: 4,91; logP[b]: 4,81; ESI-Masse (m/z): pos.[a]: 351 [M+1]⁺; GC-MS: EI-Masse (m/z): 350 [M]⁺; ¹H-NMR (D6-DMSO, 400MHz): 7,77(d,1H), 7,17(d,1H), 3,79(q,2H), 2,46(s,3H), 1,30(s,12H)


15 **{2-Fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}boronsäure (VIIIa-1)**



logP[a]: 2,34; logP[b]: 2,41; ESI-Masse (m/z): pos.[a]: 269 [M+1]⁺, neg.[a]: 313 [M+HCOO]⁻, neg.[b]: 267 [M-1]⁻; ¹H-NMR (D6-DMSO, 400MHz): 8,21(s,2H), 7,74(d,1H), 7,06(d,1H), 3,82(q,2H), 2,40(s,3H)


2-{2,4-Dimethyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan

- 186 -



logP[a]: 5,75; logP[b]: 5,64; ESI-Masse (m/z): pos.[a]: 347 [M+1]⁺; GC-MS: EI-Masse (m/z): 346 [M]⁺; ¹H-NMR (D6-DMSO, 400MHz): 7,75(s,1H), 7,13(s,1H), 3,74(q,2H), 2,41(s,3H), 2,40(s,3H), 1,30(s,12H)

{2,4-Dimethyl-5-[(2,2,2-trifluoroethyl)sulfanyl]phenyl}boronsäure (VIIIa-11)




(VIIIa-11)

5


logP[a]: 2,58; logP[b]: 2,57; ESI-Masse (m/z): neg.[a]: 309 [M+HCOO]⁻; ¹H-NMR (D6-DMSO, 400MHz): 8,02(breit,2H), 7,61(s,1H), 7,03(s,1H), 3,81(q,2H), 2,36(s,3H), 2,34(s,3H)

2-{2,4-Dichlor-5-[(2,2,2-trifluoroethyl)sulfanyl]phenyl}-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan



10 logP[a]: 5,68; logP[b]: 5,31; ESI-Masse (m/z): pos.[a]: 387 [M+1]⁺; GC-MS: EI-Masse (m/z): 386[M]⁺; ¹H-NMR (D6-DMSO, 400MHz): 7,79(s,1H), 7,72(s,1H), 4,08(q,2H), 1,32(s,12H)

{2,4-Dichlor-5-[(2,2,2-trifluoroethyl)sulfanyl]phenyl}boronsäure (VIIIa-6)




(VIIIa-6)

15 logP[a]: 2,61; logP[b]: 2,52; ESI-Masse (m/z): neg.[a]: 348 [M+HCOO]⁻; ¹H-NMR (D6-DMSO, 400MHz): 8,50(breit,2H), 7,68(s,1H), 7,60(s,1H), 4,11(q,2H)


2-{4-Chlor-3-[(2,2,2-trifluoroethyl)sulfanyl]phenyl}-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan

- 187 -



logP[a]: 5,27; logP[b]: 5,16; ESI-Masse (m/z): pos.[a]: 353 [M+1]⁺; GC-MS: EI-Masse (m/z): 352[M]⁺; ¹H-NMR (D6-DMSO, 400MHz): 7,87(d,1H), 7,62-7,60(m,1H), 7,50(d,1H), 3,71(q,2H), 1,33(s,12H)

{4-Chlor-3-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}boronsäure (VIIIa-3)




(VIIIa-3)

5


logP[a]: 2,40; logP[b]: 2,41; ESI-Masse (m/z): neg.[a]: 315 [M+HCOO]⁻; ¹H-NMR (D6-DMSO, 400MHz): 8,30(breit,2H), 8,00(d,1H), 7,67-7,64(m,1H), 7,49(d,1H), 4,07(q,2H)

2-{4-Methoxy-3-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan



10 logP[a]: 4,54; logP[b]: 4,46; ESI-Masse (m/z): pos.[a]: 349 [M+1]⁺; GC-MS: EI-Masse (m/z): 348[M]⁺; ¹H-NMR (D6-DMSO, 400MHz): 7,67(d,1H), 7,64-7,62(m,1H), 7,07(d,1H), 3,89(s,3H), 3,83(q,2H), 1,29(s,12H)


{4-Methoxy-3-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}boronsäure (VIIIa-8)



(VIIIa-8)

15 logP[a]: 1,94; logP[b]: 1,93; ESI-Masse (m/z): neg.[a]: 311 [M+HCOO]⁻; ¹H-NMR (D6-DMSO, 400MHz): 7,98(breit,2H), 7,86(d,1H), 7,74-7,71(m,1H), 7,02(d,1H), 3,87(s,3H), 3,84(q,2H)

- 188 -


{2-Fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfinyl]phenyl}boronsäure (VIIIb-1)

300 mg (1,12 mmol) {2-Fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfinyl]phenyl}boronsäure werden in Acetonitril gelöst, mit 396,4 g (1,12 mmol) Selectfluor[®] versetzt und über Nacht bei Raumtemperatur gerührt. Weitere 39,8 mg (0,12 mmol) Selectfluor[®] werden zugegeben und die Reaktionsmischung wird 2 h gerührt, dann mit Essigester verdünnt und mit 1N Salzsäure gewaschen. Die organische Phase wird über Magnesiumsulfat getrocknet, filtriert und unter vermindertem Druck vom Lösungsmittel befreit. Nach säulenchromatographischer Reinigung an Kieselgel mittels MPLC mit Cyclohexan/Essigester als Laufmittel erhält man 102 mg (97% Reinheit, 31% der Theorie der Titelverbindung als farbloses Öl, das bei Lagerung langsam zu farblosem Feststoff kristallisiert.


logP[a]: 1,38; logP[b]: 1,11; ESI-Masse (m/z): pos.[a]: 285 [M+1]⁺, neg.[a]: 329 [M+HCOO]⁻

¹H-NMR (D6-DMSO, 400MHz): 8,36(s,2H), 8,08(d,1H), 7,15(d,1H), 4,14-3,92(m,2H), 2,39(s,3H)

Analog erhalten wurden:

{2,4-Dimethyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfinyl]phenyl}boronsäure (VIIIb-11)


logP[a]: 1,61; logP[b]: 1,61; ESI-Masse (m/z): pos.[a]: 281 [M+1]⁺; ¹H-NMR (D6-DMSO, 400MHz): 8,15(s,2H), 7,96(s,1H), 7,09(s,1H), 4,05-3,85(m,2H), 2,44(s,3H), 2,33(s,3H)

{2,4-Dichlor-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfinyl]phenyl}boronsäure (VIIIb-6)


logP[a]: 1,86; logP[b]: 1,51; ESI-Masse (m/z): pos.[a]: 321 [M+1]⁺; ¹H-NMR (D6-DMSO, 400MHz):

- 189 -


8,64(breit,2H), 7,92(s,1H), 7,79(s,1H), 4,29-4,04(m,2H)

{4-Chlor-3-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfinyl]phenyl}boronsäure (VIIIb-3)logP[a]: 1,74; logP[b]: 1,68; ESI-Masse (m/z): pos.[a]: 287 [M+1]⁺; ¹H-NMR (D6-DMSO, 400MHz):

5 8,45(breit,2H), 8,33(d,1H), 8,01-7,99(m,1H), 7,62(d,1H), 4,24-4,12(m,1H), 4,08-3,96(m,1H)

{4-Methoxy-3-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfinyl]phenyl}boronsäure (VIIIb-8)logP[a]: 1,36; logP[b]: 1,37; ESI-Masse (m/z): pos.[a]: 283 [M+1]⁺; ¹H-NMR (D6-DMSO, 400MHz):

8,15(s,1H), 8,13(s,2H), 8,02-8,00(m,1H), 7,17(d,1H), 4,08-3,99(m,1H), 3,90(s,3H), 3,87-3,78(m,1H)


10 **1,2,4-Triazolidin-3,5-dione der allgemeinen Formel (XXII-C-1)**

R ¹	R ¹⁰	log P [a]	log P [b]	[M+1] +	NMR	LöMi	M ⁺ (GCMS)	GCMS -Index
CH ₂ CH(CH ₃) ₂	Cyclopropyl	0,94	n.d.	198	10,36(s,1H), 3,17(d,2H), 2,60- 2,56(m,1H), 1,96- 1,89(m,1H), 0,85- 0,78(m,10H)	D6- DMSO	197	1651

R ¹	R ¹⁰	log P [a]	logP [b]	[M+1] +	NMR	LöMi	M ⁺ (GCMS)	GCMS -Index
CH ₃	C(CH ₃) ₃	0,83	n.d.	172	10,15(s,1H), 2,94(s,3H), 1,52(s,9H)	D6- DMSO	171	1380
CH ₂ CH ₃	C(CH ₃) ₃	1,15	n.d.	186	10,11(s,1H), 3,36(q,2H), 1,52(s,9H), 1,07(t,3H)	D6- DMSO	185	1436
Cyclopentyl	CH ₃	0,78	n.d.	184	10,25(s,1H), 4,38- 4,30(m,1H), 2,87(s,3H), 1,81- 1,75(m,2H), 1,66- 1,56(m,4H), 1,53- 1,48(m,2H)	D6- DMSO	183	1672
CH ₂ CH ₃	CH(CH ₃) ₂	0,62	n.d.	172	10,27(s,1H), 4,14- 4,07(m,1H), 3,39(q,2H), 1,32(d,6H), 1,08(t,3H)	D6- DMSO	171	1392
Benzyl	Cyclopropyl	1,21	n.d.	232	10,39(s,1H), 7,38- 7,28(m,3H), 7,25- 7,23(m,2H), 4,56(s,2H), 2,63- 2,59(m,1H), 0,84- 0,81(m,4H)	D6- DMSO	231	2054
CH ₃	CH(CH ₃) ₂	0,27	n.d.	158	10,31(s,1H), 4,14- 4,07(m,1H), 2,98(s,3H), 1,32(d,6H)	D6- DMSO	157	1341
CH ₃	3-Trifluor- methylpheny l	1,53	n.d.	260	7,86(s,1H), 7,82- 7,80(m,1H), 7,70- 7,67(m,2H), 3,16(s,3H)	CD ₃ CN	259	1826

R ¹	R ¹⁰	log P [a]	logP [b]	[M+1] +	NMR	LöMi	M ⁺ (GCMS)	GCMS -Index
CH(CH ₃) ₂	Cyclopropyl	0,50	n.d.	184	7,53(breit,1H), 4,20- 4,09(m,1H), 2,58- 2,50(m,1H), 1,14(d,6H), 0,89- 0,83(m,4H)	CD ₃ CN	183	1557
H	Cyclopropyl	n.d.	n.d.	142	9,90(s,2H), 2,61- 2,52(m,1H), 0,86- 0,76(m,4H)	D ₆ - DMSO	141	1563
CH(CH ₃) ₂	CH ₃	0,12	n.d.	158	10,20(s,1H), 4,16- 4,08(m,1H), 2,87(s,3H), 1,11(d,6H)	D ₆ - DMSO	157	1359
CH(CH ₃)CH ₂ CH ₃	Cyclopropyl	0,82	n.d.	198	7,53(breit,1H), 3,96- 3,88(m,1H), 2,59- 2,51(m,1H), 1,61- 1,46(m,2H), 1,11(d,3H), 0,91- 0,86(m,7H)	CD ₃ CN	197	1634
CH ₃	CH ₂ CH ₃	n.d.	n.d.	144	10,40(s,1H), 3,40(q,2H), 3,00(s,3H), 1,10(t,3H)	D ₆ - DMSO	143	1306


Analytik der 2,4-Dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one



R ¹	R ¹⁰	logP [a]	logP [b]	NMR	LöMi	M+ (GCMS)	GCMS- Index
CH ₃	CH ₂ CH=CH ₂	0,45	0,47	10,97(s,1H), 5,87-5,76(m,1H), 5,15-5,11(m,1H), 5,03-4,97(m,1H), 4,06-4,03(m,2H), 3,87(s,3H)	D6-DMSO	155	1381
CH ₃	Cyclopropyl	0,27	0,31	10,79(s,1H), 3,86(s,3H), 2,68-2,61(m,1H), 0,85-0,80(m,1H)	D6-DMSO	155	1448
CH ₂ CH=CH ₂	Cyclopropyl	1,00	1,03	8,67(s,1H), 6,10-6,00(m,1H), 5,47-5,39(m,1H), 5,33-5,28(m,1H), 4,72-4,69(m,2H), 2,65-2,58(m,1H), 0,93-0,84(m,4H)	CD ₃ CN	181	1588
CH ₂ - Cyclopropyl	CH ₃	0,84	0,88	10,85(s,1H), 4,04(d,2H), 2,98(s,3H), 1,28-1,22(m,1H), 0,60-0,52(m,2H), 0,39-0,30(m,2H)	D6-DMSO	169	1576
2- Chlorbenzyl	CH ₃	1,66	1,63	8,85(s,1H), 7,58-7,55(m,1H), 7,50-7,46(m,1H), 7,42-7,35(m,2H), 5,36(s,2H), 3,03(s,3H)	CD ₃ CN	239	2101

Herstellbeispiel 1: 2,2,2-Trifluor-N-(1-{2-fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfinyl]phenyl}pyrrolidin-2-yliden)ethanamin (Bsp. Nr. 3)

5 **Stufe 1:** 2,2,2-Trifluor-N-(1-{2-fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}pyrrolidin-2-yliden)ethanamin (Bsp. Nr. 6)




- 193 -

200 mg (0,836 mmol) 2-Fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]anilin und 190 mg (0,933 mmol) 4-Chlor-N-(2,2,2-trifluorethyl)butanamid [CAS-RN: 1017050-83-7] werden mit 3 g (19,565 mmol) Phosphorylchlorid 18 h bei 95°C gerührt. Nach Entfernen von überschüssigem Phosphorylchlorid unter vermindertem Druck wird der Rückstand mit Eiswasser versetzt, mit Kaliumcarbonat basisch gestellt und
 5 mehrmals mit Dichlormethan extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet und filtriert. Nach Entfernen des Lösungsmittels unter vermindertem Druck werden 320 mg Produkt erhalten (98,5 % der Theorie, Reinheit 86,6 % nach LC/MS).

¹H-NMR(D₆-DMSO) δ ppm: 7,64-7,62(m,1H), 7,29-7,26(m,1H), 4,30-3,87(m,6H), 3,33(m,2H), 2,38(s,3H), 2,33(m,2H)

10 logP(HCOOH): 1,68 logP(neutral): 4,24

Stufe 2: 2,2,2-Trifluor-N-(1-{2-fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfinyl]phenyl}pyrrolidin-2-yliden)ethanamin (Bsp. Nr. 3)



315 mg (0,81 mmol) 2,2,2-Trifluor-N-(1-{2-fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-


15 trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}pyrrolidin-2-yliden)ethanamin werden bei 0-4 °C in 20 ml Trichlormethan vorgelegt. Nach der Zugabe von 300 mg Puffer-Lösung pH 7 (KH₂PO₄/Na₂HPO₄) und 55 mg Benzyltriethylammoniumchlorid werden bei 0-4 °C portionsweise 25,4 mg (77 %ig, 0,93 mmol) *meta*-Chlorperbenzoesäure dazugegeben und das Reaktionsgemisch wird 24 h bei Raumtemperatur gerührt. Nach der Zugabe einer 33% igen wäßrigen Natrium-Bisulfit-Lösung wird das Gemisch zweimal mit
 20 Dichlormethan extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden mit Wasser gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet und filtriert. Nach Entfernen des Lösungsmittels unter vermindertem Druck wird der Rückstand säulenchromatographisch mittels MPLC über RP(C-18) mit Wasser/Acetonitril aufgereinigt. Man erhält 54,3 mg Produkt als weissen Feststoff (16,5 % der Theorie, Reinheit 96,6 % nach LC/MS).

¹H-NMR(D₆-DMSO) δ ppm: 7,99-7,97(m,1H), 7,32-7,29(m,1H), 4,20-4,11(m,1H), 3,90-3,64(m,5H),
 25 2,62(t,2H), 2,37(s,3H), 2,12-2,05(m,2H)

logP(HCOOH): 1,02 logP(neutral): 2,88

Herstellbeispiel 2: 1-{2,4-Dimethyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfinyl]phenyl}imidazolidin-2-on (Bsp. Nr. 4)


Stufe 1: 1-(2-Chlorethyl)-3-{2,4-dimethyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}harnstoff



- 5 Zu einer Lösung von 0,7 g (6,63 mmol) 2-Chlorethylisothiocyanat in 50 ml tert.-Butylmethylether und einer katalytischen Menge 1,8-Diazabicyclo[5.4.0] undec-7-en (DBU) werden portionsweise 1,45 g (6,16 mmol) 2,4-Dimethyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]anilin dazugegeben und anschließend noch 18 h bei Raumtemperatur gerührt. Das Gemisch wird fast vollständig im Vakuum vom Lösungsmittel befreit, der anfallende weiße Feststoff wird abgesaugt. Es verbleiben 2 g Produkt (88,5 % der Theorie, Reinheit 94,4 % nach LC/MS.

¹H-NMR(D₆-DMSO) δ ppm: 8,01(s,1H), 7,83(s,1H), 7,04(s,1H), 7,43-7,40(m,1H), 6,83(t,1H), 3,77-3,69(q,2H), 3,68-3,65(m,2H), 3,45-3,40(m,2H), 2,30(s,3H), 2,14(s,3H)

Stufe 2: 1-{2,4-Dimethyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}imidazolidin-2-on (Bsp. Nr. 1)



- 15 900 mg (2,64 mmol) 1-(2-Chlorethyl)-3-{2,4-Dimethyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}harnstoff werden in einem Gemisch aus 15 ml Wasser und 20 ml Propionitril mit 4 g Kaliumcarbonat 18 h unter Rückfluß erhitzt. Das Gemisch wird im Vakuum vom Lösungsmittel befreit und der verbleibende Feststoffbrei wird mit verdünnter Salzsäure angesäuert. Man lässt 18 h stehen und saugt anschließend den beigen Niederschlag ab. Man erhält 560 mg Rohprodukt. Nach säulenchromatographischer Aufreinigung mit Essigester / Cyclohexan 2:1 v/v als Laufmittel werden 118 mg Produkt erhalten (14,6 % der Theorie, Reinheit nach LC/MS 91,1 %).


¹H-NMR(D₆-DMSO) δ ppm: 7,37(s,1H), 7,14(s,1H), 6,64(s,1H), 3,92-3,87(q,2H), 3,73-3,70(m,2H), 3,42-3,39(m,2H), 2,33(s,3H), 2,15(s,3H)

- 195 -

¹³C-NMR(D₆-DMSO) δ ppm: 160.3, 137.6, 136.7, 135.6, 132.6, 129.8, 128.9, 126.3, 47.6, 38.1, 35.1, 19.7, 17.6

logP(HCOOH): 2,43 logP(neutral): 2,39

Stufe 3: 1-{2,4-Dimethyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfinyl]phenyl}imidazolidin-2-on (Bsp. Nr. 4)



5


30 mg (0,099 mmol) 1-{2,4-Dimethyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfinyl]phenyl}imidazolidin-2-on werden bei 0-4 °C in 10 ml Trichlormethan vorgelegt. Nach der Zugabe von 100 mg Puffer-Lösung pH 7 (KH₂PO₄/Na₂HPO₄) und 15 mg Benzyltriethylammoniumchlorid werden bei 0-4 °C portionsweise 25,4 mg (77 %ig, 0,113 mmol) *meta*-Chlorperbenzoesäure dazugegeben und das Reaktionsgemisch wird 24 h bei 10 Raumtemperatur gerührt. Nach der Zugabe einer 33% igen wäßrigen Natrium-Bisulfit-Lösung wird das Gemisch zweimal mit Dichlormethan extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden mit Wasser gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet und filtriert. Nach Entfernen des Lösungsmittels unter vermindertem Druck wird der Rückstand säulenchromatographisch mittels MPLC über RP(C-18) mit Wasser/Acetonitril aufgereinigt. Man erhält 9,1 mg Produkt als beigen Feststoff (28,8 % der Theorie, 15 Reinheit 88,4 % nach LC/MS).

¹³C-NMR(D₆-DMSO) δ ppm: 159.9, 139.8, 138.2, 138.2, 132.8, 132.6, 121.0, 56.9, 47.1, 37.7, 17.7, 16.7

¹H-NMR(D₆-DMSO) δ ppm: 7,67(s,1H), 7,24(s,1H), 6,77(breit,1H), 4,13-3,93(m,2H), 3,78-3,71(m,2H), 3,44(t,2H), 2,33(s,3H), 2,24(s,3H)

logP(HCOOH): 1,51 logP(neutral): 1,52

20 **Herstellbeispiel 3:** 1-{2-Fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}imidazolidin-2-on (Bsp. Nr. 9)



28 mg (0,09 mmol) 2-Fluor-4-methyl-N-(1,3-oxazolidin-2-yliden)-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]anilin werden in 5 ml Methyl *tert*-Butylether nach der Zugabe von 20 mg Triethylamin 24 h bei Raumtemperatur

- 196 -


gerührt. Nach Entfernen des Lösungsmittels unter vermindertem Druck verbleiben 23 mg Produkt als weisser Feststoff (82,1 % der Theorie, Reinheit 100 % nach ¹H-NMR).

¹H-NMR(D₆-DMSO) δ ppm: 7,67-7,65(m,1H), 7,23-7,20(m,1H), 6,90(breit,1H), 3,91-3,83(q,2H), 3,80(t,2H), 3,41(t,2H), 2,37(s,3H)

5 logP(HCOOH): 2,36 logP(neutral): 2,31

Herstellbeispiel 4: 3-{2-Fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfinyl]phenyl}-2-[(2,2,2-trifluorethyl)imino]-1,3-thiazolidin-4-on (Bsp. Nr. 13)


Stufe 1: 1-{2-Fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfinyl]phenyl}-3-(2,2,2-trifluorethyl)thioharnstoff



- 10 1,00 g (4,18 mmol) 2-Fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfinyl]anilin wird in 5 ml Dichlormethan vorgelegt und dazu werden 0,006 ml (0,042 mmol) Triethylamin gegeben. Nach der Zugabe von 0,59 g (4,18 mmol) 1,1,1-Trifluor-2-isothiocyanatoethan wird das Reaktionsgemisch über Nacht bei Raumtemperatur gerührt. Unter Vakuum wird das Lösungsmittel entfernt, der Rückstand wird mit etwas Toluol verrührt und der unlösliche Teil wird abgesaugt und getrocknet. Es werden 0,31 g (100% Reinheit,
- 15 20% d.Th.) der Titelverbindung als weißer Feststoff erhalten. Das Filtrat wird unter Vakuum von Lösungsmittel befreit. Der Rückstand aus 1,30 g enthält die Titelverbindung mit einer Reinheit von 77%.

logP(HCOOH): 3,32; logP(neutral): 3,24; ¹H-NMR (D₆-DMSO, 400MHz) δ ppm 9,62(bs,1H), 8,34(bs,1H), 7,76(d,1H), 7,26(d,1H), 4,46-4,40(m,2H), 3,87(q,2H), 2,38(s,3H)

- Stufe 2:** 3-{2-Fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfinyl]phenyl}-2-[(2,2,2-trifluorethyl)imino]-1,3-thiazolidin-4-on (Bsp. Nr. 11)
- 20




- 197 -

In 80 ml Toluol werden 3,00 g (7,89 mmol) 1-{2-Fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}-3-(2,2,2-trifluorethyl)thioharnstoff und 1,10 g (7,89 mmol) Bromessigsäure vorgelegt und 6 h bei Rückfluss gerührt. Nach Abkühlen wird das Reaktionsgemisch mit einer gesättigten Natriumchloridlösung versetzt, die organische Phase wird getrennt, über Natriumsulfat getrocknet und unter Vakuum vom Lösungsmittel befreit. Der Rückstand wird auf RP(C-18) Material aufgezogen und mittels MPLC über RP(C-18) mit Wasser/Acetonitril aufgereinigt. Es werden 0,30 g (95% Reinheit, 9% d. Th.) der Titelverbindung als weißer Feststoff isoliert.

logP(HCOOH): 3,60; logP(neutral): 3,50; ¹H-NMR (D₆-DMSO, 400MHz) δ ppm 7,62 (d,1H), 7,39(d,1H), 4,39(d,1H), 4,26(d,1H), 4,00-3,83(m,4H), 2,43(s,3H)


Stufe 3: 3-{2-Fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfinyl]phenyl}-2-[(2,2,2-trifluorethyl)imino]-1,3-thiazolidin-4-on (Bsp. Nr. 13)



270 mg (0,64 mmol) 3-{2-Fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}-2-[(2,2,2-trifluorethyl)imino]-1,3-thiazolidin-4-on werden bei 0-4 °C in 5 mL Dichlormethan vorgelegt, 166 mg (0,67 mmol) *meta*-Chlorperbenzoesäure (70%ig) werden dazu gegeben und das Reaktionsgemisch wird 2 h bei Raumtemperatur nachgerührt. Anschließend mit einer 33%igen Natriumthiosulfatlösung (Peroxid-Test durchgeführt) und einer gesättigten Natriumhydrogencarbonatlösung versetzt und zweimal mit Dichlormethan ausgeschüttelt. Die vereinten organischen Phasen werden mit einer gesättigten Natriumcarbonatlösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet, filtriert, und das Lösemittel wird im Vakuum entfernt. Der Rückstand wird auf RP(C-18) Material aufgezogen und mittels MPLC über RP(C-18) mit Wasser/Acetonitril aufgereinigt. Es werden 195 mg (100% Reinheit, 70% d. Th.) der Titelverbindung als weißer Feststoff isoliert.


logP(HCOOH): 2,70; logP(neutral): 2,64; ¹H-NMR (D₆-DMSO, 400MHz) δ ppm 7,92(dd,1H), 7,52(dd,1H), 4,41-4,25(m,3H), 4,06-3,69(m,3H), 2,43(s,3H)

Herstellbeispiel 5: 3-{2-Fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}-1,5,5-trimethylimidazolidin-2,4-dion (Bsp. Nr. 18)




- 268,0 mg (1,0 mmol) {2-Fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}boronsäure, 284 mg
 5 (2,0 mmol) 1,5,5-Trimethylimidazolidin-2,4-dion, 272 mg (1,5 mmol) Kupfer(II)-acetat, 158 mg (2,0 mmol)
 Pyridin sowie 0,5 g aktiviertes 3Å-Molsieb werden in 5 mL trockenem Dichlormethan 4 d bei
 Raumtemperatur gerührt. Die Reaktionsmischung wird auf Kieselgur adsorbiert und
 säulenchromatographisch an Kieselgel mittels MPLC mit Cyclohexan/Essigester als Laufmittel gereinigt.
 Man erhält 34 mg (99% Reinheit, 9% der Theorie) der Titelverbindung als farbloses Öl.
- 10 logP(HCOOH): 2,96; logP(neutral): 2,92; ¹H-NMR (D6-DMSO, 400MHz) δ ppm 7,69(d,1H), 7,39(d,1H),
 3,93(q,2H), 2,88(s,3H), 2,43(s,3H), 1,43(s,6H)

Herstellbeispiel 6: 3-{2-Fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfinyl]phenyl}-1,5,5-trimethylimidazolidin-2,4-dion (Bsp. Nr. 17)




- 15 Zu einer Lösung aus 24,0 mg (0,07 mmol) 3-{2-Fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}-
 1,5,5-trimethylimidazolidin-2,4-dion in 10 mL Dichlormethan werden bei 0 °C 14,7 mg (0,07 mmol) *meta*-
 Chlorperbenzoesäure (ca. 77%ig) gegeben. Die Reaktionsmischung wird 2 h bei 0 °C gerührt, mit 1M
 Natronlauge gewaschen und unter vermindertem Druck vom Lösungsmittel befreit. Man erhält 25 mg (97%
 Reinheit, 97% der Theorie) der Titelverbindung als farblosen Feststoff.
- 20 logP(HCOOH): 2,04; logP(neutral): 2,01; ¹H-NMR (D6-DMSO, 400MHz) δ ppm 7,97(d,1H), 7,51(d,1H),
 4,32-4,20(m,1H), 4,00-3,89(m,1H), 2,89(s,3H), 2,43(s,3H), 1,45(s,3H), 1,44(s,3H)

Herstellbeispiel 7: 1-{2-Fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}pyrrolidin-2,5-dion
(Bsp. Nr. 19)



- 268 mg (1,0 mmol) {2-Fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}boronsäure, 198 mg
5 (2,0 mmol) Pyrrolidin-2,5-dion, 272 mg (1,5 mmol) Kupfer(II)-acetat, 158 mg (2,0 mmol) Pyridin sowie
0,5 g aktiviertes 3Å -Molsieb werden in 5 mL trockenem Dichlormethan 4 d bei Raumtemperatur gerührt.
Die Reaktionsmischung wird auf Kieselgur adsorbiert und säulenchromatographisch an Kieselgel mittels
MPLC mit Cyclohexan/Essigester als Laufmittel gereinigt. Man erhält 28 mg (100% Reinheit, 9% der
Theorie) der Titelverbindung als farbloses Öl.
- 10 logP(HCOOH): 2,52; logP(neutral): 2,45; ¹H-NMR (D6-DMSO, 400MHz) δ ppm 7,56(d,1H), 7,40(d,1H),
3,87(q,2H), 2,86(breit,4H), 2,44(s,3H)

Herstellbeispiel 8: 1,4-Dimethyl-2-{4-methyl-3-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}-1,2,4-triazolidin-
3,5-dion (Bsp. Nr. 20)




- 15 350 mg (1,2 mmol) 5-Brom-2-methylphenyl-2,2,2-trifluorethylsulfid, 190,2 mg (1,5 mmol) 5-Methoxy-4-
methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-on, 23,4 mg (0,12 mmol) Kupfer(I)-iodid, 34,9 mg (0,25 mmol)
trans-*N,N'*-Dimethylcyclohexan-1,2-diamin (racemisch), 61 mg (0,37 mmol) Kaliumiodid sowie 508,9 mg
(3,7 mmol) Kaliumcarbonat werden in 3 mL entgastem, trockenem Dioxan über Nacht bei 110 °C gerührt.
Nach Abkühlen auf Raumtemperatur wird die Reaktionsmischung mit Essigester verdünnt und mit
20 Essigester über Kieselgel filtriert. Nach Adsorption auf Kieselgur und säulenchromatographischer
Reinigung an Kieselgel mittels MPLC mit Cyclohexan/Essigester als Laufmittel erhält man 123 mg (90%
Reinheit, 27% der Theorie) der Titelverbindung als farbloses Öl.

logP(HCOOH): 2,59; logP(neutral): 2,58; ¹H-NMR (D6-DMSO, 400MHz) δ ppm 7,49(d,1H), 7,38(d,1H),
7,23-7,21(m,1H), 4,03(q,2H), 3,00(s,3H), 2,99(s,3H), 2,38(s,3H)

- 200 -

Herstellbeispiel 9: 1,4-Dimethyl-2-{4-methyl-3-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfinyl]phenyl}-1,2,4-triazolidin-3,5-dion (Bsp. Nr. 21)




Zu einer Lösung aus 85,0 mg (0,25 mmol) 1,4-Dimethyl-2-{4-methyl-3-
 5 [(2,2,2-trifluorethyl)sulfinyl]phenyl}-1,2,4-triazolidin-3,5-dion in 10 mL Dichlormethan werden bei 0 °C
 57,1 mg (0,25 mmol) *meta*-Chlorperbenzoesäure (ca. 77%ig) gegeben. Die Reaktionsmischung wird 2 h bei
 0 °C gerührt, mit 1M Natronlauge gewaschen und unter vermindertem Druck vom Lösungsmittel befreit.
 Nach Adsorption auf Kieselgur und säulenchromatographischer Reinigung an Kieselgel mittels MPLC mit
 Cyclohexan/Essigester als Laufmittel erhält man 80,0 mg (87% Reinheit, 78% der Theorie) der
 10 Titelverbindung als farbloses Öl.

logP(HCOOH): 1,63; logP(neutral): 1,63; ¹H-NMR (D6-DMSO, 400MHz) δ ppm 7,79(d,1H), 7,47-
 7,54(m,2H), 4,12-4,22(m,1H), 4,02-4,08(m,1H), 3,04(s,3H), 3,00(s,3H), 2,38(s,3H)

Herstellbeispiel 10: 1-Ethyl-2-{2-fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfinyl]phenyl}-4-phenyl-
 1,2,4-triazolidin-3,5-dion (Bsp. Nr. 87)

15 **Stufe 1:** 1-Ethyl-4-phenyl-1,2,4-triazolidin-3,5-dion




1,35 g (24,0 mmol) Kaliumhydroxid werden in 60 mL Ethanol bei 0 °C mit 3,54 g (20,0 mmol)
 4-Phenylurazol versetzt und 30 min bei 0 °C gerührt. 2,50 g (16,0 mmol) Ethyliodid werden bei 0 °C
 zugesetzt und die Reaktionsmischung wird über Nacht bei Raumtemperatur gerührt. Erneut werden 2,50 g
 20 (16,0 mmol) Ethyliodid und 20 mL Ethanol zugesetzt und 3 d bei Raumtemperatur gerührt. Die
 Reaktionsmischung wird 3 h auf 60 °C erhitzt, dann abgekühlt, in Wasser gegossen, mit verdünnter
 Salzsäure auf pH = 2-3 gebracht und unter vermindertem Druck vom Lösungsmittel befreit. Nach
 säulenchromatographischer Reinigung an RP(C-18)-Kieselgel mittels MPLC mit Wasser/Acetonitril (1%

- 201 -

Ameisensäure) als Laufmittel erhält man 1,54 g (100% Reinheit, 37% der Theorie) der Titelverbindung als farblosen Feststoff.

logP(HCOOH): 0,91; $^1\text{H-NMR}$ (D6-DMSO, 400MHz) δ ppm 10,79(s,1H), 7,51-7,37(m,5H), 3,54(q,2H), 1,18(t,3H)


- 5 **Stufe 2:** 1-Ethyl-2-{2-fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}-4-phenyl-1,2,4-triazolidin-3,5-dion (Bsp. Nr. 87)



- 230,0 mg (0,86 mmol) {2-Fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}boronsäure, 352 mg (1,72 mmol) 1-Ethyl-4-phenyl-1,2,4-triazolidin-3,5-dion, 233,8 mg (1,29 mmol) Kupfer(II)-acetat, 136 mg (1,72 mmol) Pyridin sowie 0,5 g aktiviertes 3Å -Molsieb werden in 5 mL trockenem Dichlormethan 4 d bei Raumtemperatur gerührt. Die Reaktionsmischung wird auf Kieselgur adsorbiert und säulenchromatographisch an Kieselgel mittels MPLC mit Cyclohexan/Essigester als Laufmittel gereinigt. Man erhält 160 mg (96% Reinheit, 42% der Theorie) der Titelverbindung als farbloses Öl.

- 15 logP(HCOOH): 3,71; logP(neutral): 3,69; $^1\text{H-NMR}$ (D6-DMSO, 400MHz) δ ppm 7,87(d,1H), 7,57-7,44(m,6H), 4,05(q,2H), 3,49(q,2H), 2,44(s,3H), 1,08(t,3H)

Herstellbeispiel 11: 1-Ethyl-2-{2-fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfinyl]phenyl}-4-phenyl-1,2,4-triazolidin-3,5-dion (Bsp. Nr. 88)



- 20 Zu einer Lösung aus 80,0 mg (0,19 mmol) 1-Ethyl-2-{2-fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}-4-phenyl-1,2,4-triazolidin-3,5-dion in 10 mL Dichlormethan werden bei 0 °C 44,0 mg (0,20 mmol) *meta*-Chlorperbenzoesäure (ca. 77%ig) gegeben. Die Reaktionsmischung wird 2 h bei


- 202 -

0 °C gerührt, mit 1M Natronlauge gewaschen und unter vermindertem Druck vom Lösungsmittel befreit. Nach Adsorption auf Kieselgur und säulenchromatographischer Reinigung an Kieselgel mittels MPLC mit Cyclohexan/Essigester als Laufmittel erhält man 74 mg (100% Reinheit, 89% der Theorie) der Titelverbindung als farblosen Feststoff.

- 5 logP(HCOOH): 2,71; logP(neutral): 2,66; ¹H-NMR (D6-DMSO, 400MHz) δ ppm 8,10(d,1H), 7,59(d,1H), 7,55-7,51(m,4H), 7,48-7,44(m,1H), 4,31-4,09(m,2H), 3,57-3,51(m,2H), 2,44(s,3H), 1,09(t,3H)

Herstellbeispiel 12: 1,4-Diethyl-2-{4-methyl-3-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}-1,2,4-triazolidin-3,5-dion (Bsp. Nr. 100)

Stufe 1: 1,4-Diethyl-1,2,4-triazolidin-3,5-dion



10


5,00 g (83,2 mmol) Ethylhydrazin werden mit 10,32 g (87,4 mmol) Diethylcarbonat versetzt und über Nacht zum Rückfluss erhitzt. Nach Abkühlen auf Raumtemperatur wird das Lösungsmittel unter vermindertem Druck entfernt. Der Rückstand wird in 50 mL Toluol aufgenommen, mit 7,10 g (99,8 mmol) Ethylisocyanat versetzt, 30 min zum Rückfluss erhitzt und nach Abkühlen auf Raumtemperatur unter vermindertem Druck vom Lösungsmittel befreit. Der Rückstand wird mit 83,2 mL einer 4N Kaliumhydroxid-Lösung (332,8 mmol) versetzt und 20 min zum Rückfluss erhitzt. Nach Abkühlen auf Raumtemperatur wird die Reaktionslösung unter Kühlung mit halbkonzentrierter Salzsäure sauer gestellt und mit Dichlormethan extrahiert. Die vereinten organischen Phasen werden über Magnesiumsulfat getrocknet, filtriert und unter vermindertem Druck vom Lösungsmittel befreit. Nach Gefriertrocknung erhält man 4,61 g (100% Reinheit, 35% der Theorie) der Titelverbindung als farblosen Feststoff.

15

20

logP(HCOOH): 0,14; ¹H-NMR (D6-DMSO, 400MHz) δ ppm 10,35(s,1H), 3,42(q,2H), 3,38(q,2H), 1,10(t,3H), 1,09(t,3H)

Stufe 2: 1,4-Diethyl-2-{4-methyl-3-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}-1,2,4-triazolidin-3,5-dion (Bsp. Nr. 100)



25


- 203 -

250,0 mg (1,0 mmol) {4-Methyl-3-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}boronsäure, 314,3 mg (2,0 mmol) 1,4-Diethyl-1,2,4-triazolidin-3,5-dion, 272,5 mg (1,5 mmol) Kupfer(II)-acetat, 158 mg (2,0 mmol) Pyridin sowie 0,5 g aktiviertes 3 Å -Molsieb werden in 5 mL trockenem Dichlormethan 4 d bei Raumtemperatur gerührt. Die Reaktionsmischung wird auf Kieselgur adsorbiert und säulenchromatographisch an Kieselgel
 5 mittels MPLC mit Cyclohexan/Essigester als Laufmittel sowie säulenchromatographisch an RP(C-18)-Kieselgel mittels MPLC mit Wasser/Acetonitril als Laufmittel gereinigt. Man erhält man 177,0 mg (100% Reinheit, 49% der Theorie) der Titelverbindung als farbloses Öl.

logP(HCOOH): 3,32; logP(neutral): 3,29; ¹H-NMR (D6-DMSO, 400MHz) δ ppm 7,52(d,1H), 7,38(d,1H), 7,25-7,22(m,1H), 4,05(q,2H), 3,52(q,2H), 3,46(q,2H), 2,37(s,3H), 1,17(t,3H), 0,96(t,3H)

Herstellbeispiel 13 : 1-(2,2-Difluorethyl)-3-{2-fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfinyl]phenyl}imidazolidin-2,4,5-trion (Bsp. Nr. 103)


Stufe 1: 1-(2,2-Difluorethyl)-3-{2-fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}harnstoff



Zu einer Lösung von 600 mg (2,51 mmol) 2-Fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]anilin in 40 ml Methyl *tert*-Butylether und einer katalytischen Menge 1,8-Diazabicyclo[5.4.0] undec-7-en (DBU) werden portionsweise 300 mg (2,8 mmol) 1,1-Difluor-2-isocyanatoethan hinzugefügt und es wird anschliessend noch 18 h bei Raumtemperatur gerührt. Das Gemisch wird fast vollständig im Vakuum vom Lösungsmittel befreit, der anfallende weisse Feststoff wird abgesaugt. Es verbleiben 660 mg Produkt (76 % der Theorie, Reinheit 96,5 % nach LC/MS).

¹H-NMR(D6-DMSO) δ ppm: 8,52(s,1H), 8,31-8,29(m,1H), 7,20-7,17(m,1H), 6,92(t,1H), 6,07(tt,1H), 3,79-3,71(q,2H), 3,60-3,48(m,2H), 2,34(s,3H)

Stufe 2: 1-(2,2-Difluorethyl)-3-{2-fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}imidazolidin-2,4,5-trion (Bsp. Nr. 101)



- 204 -


Zu 200 mg (0,578 mmol) 1-(2,2-Difluorethyl)-3-{2-fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}harnstoff in 20 ml Acetonitril tropft man 160 mg (1,261 mmol) Oxalylchlorid (gelöst in 5 ml Acetonitril) und rührt noch 18 h unter Rückfluß. Der nach dem Einrotieren im Vakuum verbleibende Rückstand wird mit Wasser verrührt und abgesaugt. Als Rückstand verbleiben 195 mg Produkt als weisser Feststoff (84,4 % der Theorie, Reinheit 100 % nach ¹H-NMR).

¹H-NMR(D₆-DMSO) δ ppm: 7,70-7,68(m,1H), 7,51-7,48(m,1H), 6,25(tt,1H), 4,10-4,01(dt,2H), 3,90-3,82(q,2H), 2,48(s,3H)

¹³C-NMR(D₆-DMSO) δ ppm: 156.4, 156.3, 151.6, 144.1, 133.0, 128.4, 125.3, 118.3, 115.4, 112.8, 40.4, 35.0, 19.9

logP(HCOOH): 3,22 logP(neutral): 1,73

Stufe 3: 1-(2,2-Difluorethyl)-3-{2-fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfinyl]phenyl}imidazolidin-2,4,5-trion (Bsp. Nr. 103)



195 mg (0,487 mmol) 1-(2,2-Difluorethyl)-3-{2-fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}imidazolidin-2,4,5-trion werden bei 0 °C in 10 ml Essigsäure vorgelegt. Nach der Zugabe katalytischer Mengen von Natriumwolframat werden bei 0-4 °C portionsweise 765 mg (0,675 mmol) 3 % ige wässrige Wasserstoffperoxidlösung dazugegeben und das Reaktionsgemisch wird 24 h bei


5 RT gerührt. Nach der Zugabe einer 33% igen wäßrigen Bisulfit-Lösung wird das Gemisch zweimal mit Dichlormethan extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden mit Wasser gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet und filtriert. Nach Entfernen des Lösungsmittels unter vermindertem Druck wird der Rückstand säulenchromatographisch mittels MPLC über RP(C-18) aufgereinigt. Mit Wasser/Acetonitril erhält man 100 mg Produkt als weissen Feststoff (44,4 % der Theorie, Reinheit 90 % nach ¹H-NMR).

10 ¹H-NMR(D₆-DMSO) δ ppm: 8,04-8,03(m,1H), 7,61-7,58(m,1H), 6,24(tt,1H), 4,36-4,27(m,1H), 4,10-4,01(dt,2H), 3,92-3,83(m,1H), 2,43(s,3H)

logP(HCOOH): 2,32 logP(neutral): 0,87

Herstellbeispiel 14: 3-[2-Fluor-4-methyl-5-(2,2,2-trifluorethylsulfanyl)phenyl]-oxazolidin-2-on (Bsp. Nr. 105)

Stufe 1: 2-Chlorethyl-N-[2-fluor-4-methyl-5-(2,2,2-trifluorethylsulfanyl)phenyl]carbamat




- 5 2-Fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]anilin (500 mg, 2,09 mmol) wird in 5 ml THF bei 0 °C vorgelegt. Dazu werden Triethylamin (435 µL, 2 mmol) und 2-Chlorethylchlorformiat (218 µL, 2,09 mmol) gegeben und die Reaktionsmischung wird 4 h unter Rückfluss gerührt. Die Lösung wird abgekühlt und mit Wasser versetzt. Nach der Extraktion mit Ethylacetat werden die vereinigten organischen Phasen mit Wasser und ges. NaCl-Lösung gewaschen und danach über Na₂SO₄ getrocknet. Das Lösungsmittel wird am Rotationsverdampfer entfernt. Durch säulenchromatographische Reinigung (25% EtOAc/Petrolether) des Rohprodukts werden 360 mg (1,04 mmol, 50% der Theorie) der Titelverbindung erhalten.

¹H-NMR (D₆-DMSO, 400MHz) δ ppm: 9,51 (s,1H), 7,78 (d,1H), 7,22 (d,1H), 4,34 (t,2H), 3,87-3,77 (m,4H), 2,37 (s,3H)

- 15 logP(HCOOH): 3,45

Stufe 2: 3-[2-Fluor-4-methyl-5-(2,2,2-trifluorethylsulfanyl)phenyl]oxazolidin-2-on (Bsp. Nr. 104)




- 20 2-Chlorethyl-N-[2-fluor-4-methyl-5-(2,2,2-trifluorethylsulfanyl)phenyl]carbamate (400 mg, 1,16 mmol) wird in 5 mL DMF gelöst und mit Cäsiumcarbonat (565 mg, 1,74 mmol) versetzt. Die Mischung wird 8 h bei 80 °C gerührt. Die Lösung wird auf Raumtemperatur gekühlt, mit Wasser versetzt und es wird mit Ethylacetat extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden mit Wasser und ges. NaCl-Lösung gewaschen und danach über Na₂SO₄ getrocknet. Das Lösungsmittel wird am Rotationsverdampfer entfernt. Durch säulenchromatographische Reinigung (35% EtOAc/Petrolether) des Rohprodukts werden 250 mg (0,81 mmol, 70% der Theorie) der Titelverbindung erhalten.

- 206 -

¹H-NMR (CDCl₃, 400MHz) δ ppm: 7.71 (d,1H), 7.03 (d,1H), 4.54-4.49 (m,2H), 4.08-4.03 (m,2H), 3.37-3.31 (m,2H), 2.46 (s,3H)

logP(HCOOH): 2,66

Stufe 3: 3-[2-Fluor-4-methyl-5-(2,2,2-trifluorethylsulfanyl)phenyl]oxazolidin-2-on (Bsp. Nr. 105)



5

3-[2-Fluor-4-methyl-5-(2,2,2-trifluorethylsulfanyl)phenyl]oxazolidin-2-on (170 mg, 0,55 mmol) wird in 3 mL Aceton/Wasser (1:1) gelöst und mit Oxon (169 mg, 0,34 mmol) versetzt. Die Lösung wird 2 h bei Raumtemperatur gerührt. Die Mischung wird im Vakuum eingeeengt und der Rückstand wird mit Wasser versetzt. Es wird mit Ethylacetat extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden mit Wasser und gesättigter Natriumchlorid-Lösung gewaschen und danach über Natriumsulfat getrocknet. Das Lösungsmittel wird am Rotationsverdampfer entfernt. Durch säulenchromatographische Reinigung (40% EtOAc/Petrolether) des Rohprodukts werden 90 mg (0,23 mmol, 50% der Theorie) der Titelverbindung erhalten.

10


¹H-NMR (CDCl₃, 400MHz) δ ppm: 8.11 (d,1H), 7.19 (d,1H), 4.58-4.49 (m,2H), 4.18-4.10 (m,1H), 4.04-3.96 (m,1H), 3.59-3.33 (m,2H), 2.41 (s,3H)

15

logP(HCOOH): 1,64

Herstellbeispiel 15: 3-[2-Fluor-4-methyl-5-(2,2,2-trifluorethylsulfanyl)phenyl]-5-methyl-oxazolidin-2-on (Bsp. Nr. 109)

Stufe 1: 1-[2-Fluor-4-methyl-5-(2,2,2-trifluorethylsulfanyl)anilin]propan-2-ol



20

2-Fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]anilin (700 mg, 2,93 mmol) wird in 10 ml Dichlormethan vorgelegt. Dazu werden Propylenoxid (4,39 mmol) und LiBr (76,2 mg, 0,88 mmol) gegeben und die Reaktionsmischung wird 16 h bei Raumtemperatur gerührt. Die Lösung wird abgekühlt und mit Wasser versetzt. Nach der Extraktion mit Dichlormethan werden die vereinigten organischen Phasen mit Wasser


- 207 -

und gesättigter Natriumchlorid-Lösung gewaschen und danach über Natriumsulfat getrocknet. Das Lösungsmittel wird am Rotationsverdampfer entfernt. Durch säulenchromatographische Reinigung (25% EtOAc/Petrolether) des Rohprodukts werden 200 mg (0,67 mmol, 23% der Theorie) der Titelverbindung erhalten.

- 5 $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3 , 400MHz) δ ppm: 6.91 (d,1H), 6.86 (d,1H), 4.10-4.02 (m,2H), 3.32-3.20 (m,3H), 3.05-3.00 (m,1H), 2.37 (s,3H), 1.85-1.80 (m,1H), 1.30-1.29 (m,3H)

$\log\text{P}(\text{HCOOH})$: 3,01

Stufe 2: 3-[2-Fluor-4-methyl-5-(2,2,2-trifluorethylsulfanyl)phenyl]-5-methyl-oxazolidin-2-on (Bsp. Nr. 106)




- 10 1-[2-Fluor-4-methyl-5-(2,2,2-trifluorethylsulfanyl)anilin]propan-2-ol (200 mg, 0,67 mmol) wird in 5 mL THF gelöst und mit Phosgen (1,01 mmol, als 20%ige Lösung in Toluol) und DIPEA (172 μL , 1,01 mmol) versetzt. Die Mischung wird 16 h bei Raumtemperatur gerührt. Die Lösung wird auf Raumtemperatur gekühlt, mit Wasser versetzt und es wird mit Ethylacetat extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden mit Wasser und gesättigter Natriumchlorid-Lösung gewaschen und danach über Natriumsulfat
- 15 getrocknet. Das Lösungsmittel wird am Rotationsverdampfer entfernt. Durch säulenchromatographische Reinigung (15% EtOAc/Petrolether) des Rohprodukts werden 120 mg (0,37 mmol, 55% der Theorie) der Titelverbindung erhalten.

$^1\text{H-NMR}$ ($\text{D}_6\text{-DMSO}$, 400MHz) δ ppm: 7.74 (d,1H), 7.31 (d,1H), 4.87-4.80 (m,1H), 4.10-4.04 (m,1H), 3.98-3.88 (m,2H), 3.64-3.59 (m,1H), 2.39 (s,3H), 1.43 (d,3H)

- 20 $\log\text{P}(\text{HCOOH})$: 2.98

Stufe 3: 3-[2-Fluor-4-methyl-5-(2,2,2-trifluorethylsulfinyl)phenyl]-5-methyl-oxazolidin-2-on (Bsp. Nr. 109)



- 208 -


3-[2-Fluor-4-methyl-5-(2,2,2-trifluorethylsulfanyl)phenyl]-5-methyl-oxazolidin-2-on (120 mg, 0,37 mmol) wird in 3 mL Aceton/Wasser (1:1) gelöst und mit Oxon (184 mg, 0,37 mmol) versetzt. Die Lösung wird 2 h bei Raumtemperatur gerührt. Die Mischung wird im Vakuum eingengt und der Rückstand wird mit Wasser versetzt. Es wird mit Ethylacetat extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden mit Wasser und ges. NaCl-Lösung gewaschen und danach über Na₂SO₄ getrocknet. Das Lösungsmittel wird am Rotationsverdampfer entfernt. Durch säulenchromatographische Reinigung (40% EtOAc/Petrolether) des Rohprodukts werden 82 mg (0,24 mmol, 65% der Theorie) der Titelverbindung erhalten.

¹H-NMR (CDCl₃, 400MHz) δ ppm 8.11 (d,1H), 7.08 (d,1H), 4.90-4.81 (m,1H), 4.20-4.01 (m,1H), 3.76-3.37 (m,3H), 2.40 (s,3H), 1.57-1.54 (m,3H)

10 logP(HCOOH): 1,93; logP (neutral): 1,89

Herstellbeispiel 16: 3-[2-Fluor-4-methyl-5-(2,2,2-trifluorethylsulfinyl)phenyl]-4-methyl-oxazolidin-2-on (Bsp. Nr. 107)

Stufe 1: *Allyl N-[2-fluor-4-methyl-5-(2,2,2-trifluorethylsulfanyl)phenyl]carbamat*



15 2-Fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]anilin (1.0 g, 4,18 mmol) wird in 10 ml THF vorgelegt. Dazu werden Allyloxycarbonylchlorid (530 µL, 5,02 mmol) und Cäsiumcarbonat (2,04 g, 6,27 mmol) gegeben und die Reaktionsmischung wird 16 h bei Raumtemperatur gerührt. Die Lösung wird abgekühlt und mit Wasser versetzt. Nach der Extraktion mit Ethylacetat werden die vereinigten organischen Phasen mit Wasser und gesättigter Natriumchlorid-Lösung gewaschen und danach über Natriumsulfat getrocknet.


20 Das Lösungsmittel wird am Rotationsverdampfer entfernt. Durch säulenchromatographische Reinigung (10% EtOAc/Petrolether) des Rohprodukts werden 800 mg (2,47 mmol, 59% der Theorie) der Titelverbindung erhalten.

¹H-NMR (CDCl₃, 400MHz) δ ppm 8.27 (s,1H), 6.98-6.79 (m,2H), 6.03-5.93 (m,1H), 5.41-5.28 (m,2H), 4.69 (d,2H), 3.38 (q,2H), 2.42 (s,3H)

25 logP(HCOOH): 3,59

Stufe 2: *3-[2-Fluor-4-methyl-5-(2,2,2-trifluorethylsulfanyl)phenyl]-4-methyl-oxazolidin-2-on (Bsp. Nr. 108)*

- 209 -




Allyl *N*-[2-fluor-4-methyl-5-(2,2,2-trifluorethylsulfanyl)phenyl]carbamate (800 mg, 2,5 mmol) wird in 10 mL THF/DMSO/Fluorbenzol (8:1:1) gelöst und mit IBX (12,3 mmol) versetzt. Die Mischung wird 48 h auf 120 °C in einem verschlossenen, druckstabilen Gefäß erhitzt. Die Lösung wird auf Raumtemperatur
 5 gekühlt, mit Wasser versetzt und es wird mit Ethylacetat extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden mit Wasser und gesättigter Natriumchlorid-Lösung gewaschen und danach über Natriumsulfat getrocknet. Das Lösungsmittel wird am Rotationsverdampfer entfernt. Durch säulenchromatographische Reinigung (25% EtOAc/Petrolether) des Rohprodukts werden 171 mg (0,53 mmol, 21% der Theorie) der Titelverbindung erhalten.

10 ¹H-NMR (CDCl₃, 400MHz) δ ppm 7.56 (d, 1H), 7.06 (d, 1H), 4.65-4.60 (m, 1H), 4.45-4.38 (m, 1H), 4.06-4.01 (m, 1H), 3.35 (q, 2H), 2.48 (s, 3H), 1.26-1.22 (m, 3H)

logP(HCOOH): 2,92

Stufe 3: 3-[2-Fluor-4-methyl-5-(2,2,2-trifluorethylsulfanyl)phenyl]-4-methyl-oxazolidin-2-on (Bsp. Nr. 107)




15 3-[2-Fluor-4-methyl-5-(2,2,2-trifluorethylsulfanyl)phenyl]-4-methyl-oxazolidin-2-on (103 mg, 0,32 mmol) wird in 3 mL Aceton/Wasser (1:1) gelöst und mit Oxon (184 mg, 0,37 mmol) versetzt. Die Lösung wird 2 h bei Raumtemperatur gerührt. Die Mischung wird im Vakuum eingengt und der Rückstand wird mit Wasser versetzt. Es wird mit Ethylacetat extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden mit Wasser
 20 und gesättigter Natriumchlorid-Lösung gewaschen und danach über Natriumsulfat getrocknet. Das Lösungsmittel wird am Rotationsverdampfer entfernt. Durch säulenchromatographische Reinigung (40% EtOAc/Petrolether) des Rohprodukts werden 67 mg (0,20 mmol, 62% der Theorie) der Titelverbindung erhalten.

25 ¹H-NMR (CDCl₃, 400MHz) δ ppm 7.98 (dd, 1H), 7.26-7.07 (m, 1H), 4.68-4.62 (m, 1H), 4.51-4.42 (m, 1H), 4.11-4.02 (m, 1H), 3.53-3.39 (m, 2H), 2.41 (s, 3H), 1.26-1.23 (m, 3H)

- 210 -


logP(HCOOH): 1,79

Herstellbeispiel 17: 3-[2-fluor-4-methyl-5-(2,2,2-trifluorethylsulfinyl)phenyl]-5,5-dimethyl-oxazolidin-2,4-dion (Bsp. Nr. 110)**Stufe 1:** *N*-[2-fluor-4-methyl-5-(2,2,2-trifluorethylsulfinyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methyl-propanamid

5 2-Fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfinyl]anilin (1,00 g, 4,18 mmol) wird in 10 ml Dichlormethan bei 0 °C vorgelegt. Dazu werden 2-Hydroxyisobuttersäureethylester (1,15 mL, 8,36 mmol) und AlMe₃ (10,5 mmol, als 2 M Lösung in Toluol) gegeben und die Reaktionsmischung wird 16 h bei 65 °C in einem verschlossenen, druckstabilen Gefäß gerührt. Die Lösung wird abgekühlt und mit Wasser versetzt. Nach
 10 der Extraktion mit Dichlormethan werden die vereinigten organischen Phasen mit 1 N HCl und gesättigter Natriumchlorid-Lösung gewaschen und danach über Natriumsulfat getrocknet. Das Lösungsmittel wird am Rotationsverdampfer entfernt. Durch säulenchromatographische Reinigung (15% EtOAc/Petrolether) des Rohprodukts werden 500 mg (1,53 mmol, 37% der Theorie) der Titelverbindung erhalten.

1H-NMR (CDCl₃, 400MHz) δ ppm 8.89 (s,1H), 8.57 (d,1H), 6.98 (d,1H), 3.40 (q,2H), 2.43 (s,3H), 2.15
 15 (s,1H), 1.57 (s,6H)

logP(HCOOH): 2,81

Stufe 2: 3-[2-Fluor-4-methyl-5-(2,2,2-trifluorethylsulfinyl)phenyl]-5,5-dimethyl-oxazolidin-2,4-dion (Bsp. Nr. 111)

20 *N*-[2-fluor-4-methyl-5-(2,2,2-trifluorethylsulfinyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methyl-propanamid (400 mg, 1,23 mmol) wird in 5 mL THF gelöst und mit Phosgen (1,84 mmol, als 20%ige Lösung in Toluol) sowie Diisopropylethylamin (418 µL, 2,36 mmol) versetzt. Die Mischung wird 16 h bei Raumtemperatur gerührt. Die Lösung wird mit Wasser versetzt und es wird mit Ethylacetat extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden mit Wasser und gesättigter Natriumchlorid-Lösung gewaschen und danach


- 211 -

über Natriumsulfat getrocknet. Das Lösungsmittel wird am Rotationsverdampfer entfernt. Durch säulenchromatographische Reinigung (10% EtOAc/Petrolether) des Rohprodukts werden 200 mg (0,57 mmol, 46% der Theorie) der Titelverbindung erhalten.

¹H-NMR (CDCl₃, 400MHz) δ ppm 7.50 (d,1H), 7.16 (d,1H), 3.39-3.32 (m,2H), 2.53 (s,3H), 1.71 (s,6H)

5 logP(HCOOH): 3,35

Stufe 3: 3-[2-fluor-4-methyl-5-(2,2,2-trifluorethylsulfinyl)phenyl]-5,5-dimethyl-oxazolidin-2,4-dione (Bsp. Nr. 110)




3-[2-Fluor-4-methyl-5-(2,2,2-trifluorethylsulfonyl)phenyl]-5,5-dimethyl-oxazolidin-2,4-dion (120 mg, 0,34 mmol) wird in 3 mL Aceton/Wasser (1:1) gelöst und mit Oxon (105 mg, 0,34 mmol) versetzt. Die Lösung wird 2 h bei Raumtemperatur gerührt. Die Mischung wird im Vakuum eingeeengt und der Rückstand wird mit Wasser versetzt. Es wird mit Ethylacetat extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden mit Wasser und gesättigter Natriumchlorid-Lösung gewaschen und danach über Natriumsulfat getrocknet. Das Lösungsmittel wird am Rotationsverdampfer entfernt. Durch säulenchromatographische Reinigung (20% EtOAc/Petrolether) des Rohprodukts werden 85 mg (0,23 mmol, 68% der Theorie) der Titelverbindung erhalten.

¹H-NMR (CDCl₃, 400MHz) δ ppm 7.99 (d,1H), 7.24 (d,1H), 3.52-3.41 (m,2H), 2.45 (s,3H), 1.72 (s,6H)

logP(HCOOH): 2,38

Herstellbeispiel 18: 4-[2-Fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfonyl]phenyl]-1,2-dimethyl-1,2,4-triazolidin-3,5-dion (Bsp. Nr. 116)




- 212 -

Eine Lösung von 1,0 g (4,18 mmol) 2-Fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]anilin in 10 mL Toluol wird mit 2,1 mL (4,18 mmol) einer Lösung von Trimethylaluminium in Toluol (2M) versetzt und 30 min unter Argon bei Raumtemperatur gerührt. 426,8 mg (2,09 mmol) Diethyl-1,2-dimethylhydrazin-1,2-dicarboxylat werden zugegeben. Die Reaktionsmischung wird 30 min bei Raumtemperatur gerührt und anschließend über Nacht zum Rückfluss erhitzt. Nach Abkühlen wird die Reaktionsmischung in eine Mischung aus Essigester und 1N Salzsäure gegeben, die Phasen werden getrennt, die organische Phase wird über Magnesiumsulfat getrocknet, filtriert und konzentriert. Nach säulenchromatographischer Reinigung an Kieselgel mittels MPLC mit Cyclohexan/Essigester als Laufmittel erhält man 486 mg (97% Reinheit, 64% der Theorie) der Titelverbindung als beigen Feststoff.

- 10 logP[a]: 2,40; logP[b]: 2,39; $^1\text{H-NMR}$ ($\text{D}^6\text{-DMSO}$, 400MHz) ppm: 7,72(d,1H), 7,42(d,1H), 3,93(q,2H), 3,19(s,6H), 2,44(s,3H)


Herstellbeispiel 19: 4-{2-Fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfinyl]phenyl}-1,2-dimethyl-1,2,4-triazolidin-3,5-dion (Bsp. Nr. 117)



- 15 Zu einer Lösung von 243 mg (0,69 mmol) 4-{2-Fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}-1,2-dimethyl-1,2,4-triazolidin-3,5-dion in 10 mL Dichlormethan werden bei 0 °C 155 mg (0,69 mmol) *meta*-Chlorperbenzoesäure (ca. 77%ig) gegeben. Die Reaktionsmischung wird 2 h bei 0 °C gerührt, mit 1M Natronlauge gewaschen und unter vermindertem Druck vom Lösungsmittel befreit. Man erhält 270 mg (100% Reinheit, 100% der Theorie) der Titelverbindung als farbloses Öl.
- 20 logP[a]: 1,54; logP[b]: 1,50; $^1\text{H-NMR}$ ($\text{D}^6\text{-DMSO}$, 400MHz) δ ppm: 7,99(d,1H), 7,54(d,1H), 4,29-4,25(m,1H), 3,96-3,89(m,1H), 3,19(s,6H), 2,50(s,3H)

Herstellbeispiel 20: 1,2-Diethyl-4-{2-fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}-1,2,4-triazolidin-3,5-dion (Bsp. Nr. 118)

Stufe 1: Ethyl-2-({2-fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}carbonyl)hydrazin-carboxylat




- 213 -

Zu einer Lösung von 1,10 g (3,53 mmol) Ethyl-{2-fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}carbammat (siehe z. B. JP2011/042611) in Ethanol (15 mL) werden bei Raumtemperatur 404,3 mg (3,88 mmol) Ethyl-hydrazincarboxylat gegeben. Die Reaktionsmischung wird 4 h zum Rückfluss erhitzt, dann auf Raumtemperatur abgekühlt, mit Wasser verdünnt und mit Essigester extrahiert. Die vereinten organische Phasen werden mit Wasser und wässriger gesättigter Natriumchloridlösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet, filtriert und unter vermindertem Druck konzentriert. Nach säulenchromatographischer Reinigung an Kieselgel mit Petrolether/Essigester (85/15) als Laufmittel erhält man 850 mg (100% Reinheit, 65% der Theorie) der Titelverbindung als beigen Feststoff.

10 logP[a]: 2,41; ¹H-NMR (D⁶-DMSO, 400MHz) δ ppm: 9,00(breit,1H), 8,49(breit,1H), 8,25(breit,1H), 8,17(breit,1H), 7,21(d,1H), 4,06(q,2H), 3,76(q,2H), 2,36(s,3H), 1,19(t,3H)


Stufe 2: 4-{2-Fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}-1,2,4-triazolidin-3,5-dion



15 Eine Lösung von 500 mg (1,35 mmol) Ethyl-2-({2-fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}carbamoyl)hydrazincarboxylat in Ethanol (8 mL) und 6N wässriger Kaliumhydroxidlösung (2 mL) wird 4 h zum Rückfluss erhitzt. Nach Abkühlen auf Raumtemperatur wird die Reaktionsmischung in kaltes Wasser gegossen. Der gebildete Feststoff wird filtriert, mit Wasser gewaschen und getrocknet. Man erhält 270 mg (90% Reinheit, 56% der Theorie) der Titelverbindung als beigen Feststoff.

20 logP[a]: 1,82; ¹H-NMR (D⁶-DMSO, 400MHz) δ ppm: 10,58(breit,2H), 7,70(d,1H), 7,39(d,1H), 3,96(q,2H), 2,43(s,3H)

Stufe 3: 1,2-Diethyl-4-{2-fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}-1,2,4-triazolidin-3,5-dion (Bsp. Nr. 118)




- 214 -

Zu einer Lösung von 500 mg (1,55 mmol) 4-{2-Fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}-1,2,4-triazolidin-3,5-dion in *N,N*-Dimethylformamid (5 mL) werden bei 0 °C 322 mg (2,33 mmol) Kaliumcarbonat und 484 mg (3,10 mmol) Ethyliodid gegeben. Die Reaktionsmischung wird 6 h bei Raumtemperatur gerührt, dann in kaltes Wasser gegossen. Der gebildete Feststoff wird filtriert, mit Wasser gewaschen und getrocknet. Man erhält 170 mg (98% Reinheit, 28% der Theorie) der Titelverbindung als beigen Feststoff.

logP[a]: 3,03; ¹H-NMR (D⁶-DMSO, 400MHz) δ ppm: 7,72(d,1H), 7,40(d,1H), 3,96(q,2H), 3,61(q,4H), 2,42(s,3H), 1,10(t,6H)

Herstellbeispiel 21: 1,2-Diethyl-4-{2-fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfinyl]phenyl}-1,2,4-triazolidin-3,5-dion (Bsp. Nr. 119)




Zu einer Lösung von 120 mg (0,32 mmol) 1,2-Diethyl-4-{2-fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}-1,2,4-triazolidin-3,5-dion in Aceton/Wasser (1:1) werden bei Raumtemperatur 98 mg (0,32 mmol) Oxon gegeben. Die Reaktionsmischung wird 2 h bei Raumtemperatur gerührt, dann unter vermindertem Druck konzentriert. Der Rückstand wird mit Wasser verdünnt und mit Essigester extrahiert. Die vereinten organische Phasen werden mit Wasser und wässriger gesättigter Natriumchloridlösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet, filtriert und unter vermindertem Druck konzentriert. Nach säulenchromatographischer Reinigung an Kieselgel mit Petrolether/Essigester (75/25) als Laufmittel erhält man 50 mg (98% Reinheit, 39% der Theorie) der Titelverbindung als beigen Feststoff.

logP[a]: 2,07; ¹H-NMR (D⁶-DMSO, 400MHz) δ ppm: 7,99(d,1H), 7,55(d,1H), 4,38-4,18(m,1H), 4,15-3,92(m,1H), 3,80-3,58(m,4H), 2,44(s,3H), 1,13(t,6H)

Herstellbeispiel 22: 1-Ethyl-4-{2-fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}-2-methyl-1,2,4-triazolidin-3,5-dion (Bsp. Nr. 122)

Stufe 1: *N*-{2-Fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}-1-methylhydrazincarboxamid




- 215 -

Zu einer Lösung von 2,5 g (8,0 mmol) Ethyl-2-({2-fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}carbamat (siehe z. B. JP2011/042611) in Dichlormethan (25 mL) werden bei Raumtemperatur 2,1 g (16,1 mmol) Diisopropylethylamin und 407 mg (8,8 mmol) Methylhydrazin gegeben. Die Reaktionsmischung wird 6 h bei Raumtemperatur gerührt, dann mit Wasser verdünnt und mit

5 Dichlormethan extrahiert. Die vereinten organische Phasen werden mit Wasser und wässriger gesättigter Natriumchloridlösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet, filtriert und unter vermindertem Druck konzentriert. Nach säulenchromatographischer Reinigung an Kieselgel mit Petrolether/Essigester (80/20) als Laufmittel erhält man 2,0 g (80% der Theorie) der Titelverbindung.

Stufe 2: Ethyl-2-({2-fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}carbamoyl)-2-methylhydrazincarboxylat

10




Zu einer Lösung von 2,0 g (6,4 mmol) N-{2-Fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}-1-methylhydrazincarboxamid in Tetrahydrofuran (20 mL) werden bei Raumtemperatur 4,2 g (12,8 mmol) Caesiumcarbonat und 764 mg (7,0 mmol) Chlorameisensäureethylester gegeben. Die Reaktionsmischung

15 wird 6 h bei Raumtemperatur gerührt, dann mit Wasser verdünnt und mit Essigester extrahiert. Die vereinten organische Phasen werden mit Wasser und wässriger gesättigter Natriumchloridlösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet, filtriert und unter vermindertem Druck konzentriert. Nach säulenchromatographischer Reinigung an Kieselgel mit Petrolether/Essigester (90/10) als Laufmittel erhält man 2,0 g (81% der Theorie) der Titelverbindung.

Stufe 3: 4-{2-Fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}-1-methyl-1,2,4-triazolidin-3,5-dion

20



Eine Lösung von 2,0 g (5,2 mmol) Ethyl-2-({2-fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}carbamoyl)-2-methylhydrazincarboxylat in Ethanol (16 mL) und 6N wässriger Kaliumhydroxidlösung (4 mL) wird 1 h zum Rückfluss erhitzt. Nach Abkühlen auf


25 Raumtemperatur wird die Reaktionsmischung in kaltes Wasser gegossen. Der gebildete Feststoff wird

- 216 -

filtriert, mit Wasser gewaschen und getrocknet. Man erhält 1,4 g (80% der Theorie) der Titelverbindung als beigen Feststoff.

logP[a]: 2,02; $^1\text{H-NMR}$ ($\text{D}^6\text{-DMSO}$, 400MHz) δ ppm: 10,96(breit,1H), 7,70(d,1H), 7,40(d,1H), 3,95(q,2H), 3,12(s,3H), 2,43(s,3H)


- 5 **Stufe 4:** 1-Ethyl-4-{2-fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}-2-methyl-1,2,4-triazolidin-3,5-dion(Bsp. Nr. 122)



- 10 Zu einer Lösung von 300 mg (0,89 mmol) 4-{2-Fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}-1-methyl-1,2,4-triazolidin-3,5-dion in N,N Dimethylformamid (5 mL) werden bei 0 °C 184 mg (1,33 mmol) Kaliumcarbonat und 207 mg (1,33 mmol) Ethyliodid gegeben. Die Reaktionsmischung wird 16 h bei Raumtemperatur gerührt, dann in kaltes Wasser gegossen. Der gebildete Feststoff wird filtriert, mit Wasser gewaschen und getrocknet. Man erhält 270 mg (98% Reinheit, 81% der Theorie) der Titelverbindung als beigen Feststoff.

- 15 logP[a]: 2,71; $^1\text{H-NMR}$ ($\text{D}^6\text{-DMSO}$, 400MHz) δ ppm: 7,71(d,1H), 7,40(d,1H), 3,93(q,2H), 3,66(q,2H), 3,16(s,3H), 2,42(s,3H), 1,10(t,3H)

Herstellbeispiel 23: 1-{2-Fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}-2,4,4-trimethylpyrazolidin-3,5-dion (Bsp. Nr. 174)




- 20 268,0 mg (1,0 mmol) {2-Fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}boronsäure, 284 mg (2,00 mmol) 1,4,4-Trimethylpyrazolidin-3,5-dion, 272 mg (1,5 mmol) Kupfer(II)-acetat, 158 mg (2,0 mmol) Pyridin sowie 1,0 g aktiviertes 3Å-Molsieb werden in 5 mL trockenem Dichlormethan 4 d bei Raumtemperatur gerührt. Die Reaktionsmischung wird auf Kieselgur adsorbiert und

- 217 -

säulenchromatographisch an Kieselgel mittels MPLC mit Cyclohexan/Essigester als Laufmittel gereinigt. Man erhält 109 mg (99% Reinheit, 30% der Theorie) der Titelverbindung als farbloses Öl.

logP[a]: 2,84; logP[b]: 2,79; ¹H-NMR (D⁶-DMSO, 400MHz) δ ppm: 7,76(d,1H), 7,45(d,1H), 4,04(q,2H), 2,93(s,3H), 2,43(s,3H), 1,30(s,6H)


- 5 **Herstellbeispiel 24:** 1-{2-Fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfinyl]phenyl}-2,4,4-trimethylpyrazolidin-3,5-dion (Bsp. Nr. 177)



- 10 Zu einer Lösung von 55,0 mg (0,15 mmol) 1-{2-Fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfinyl]phenyl}-2,4,4-trimethylpyrazolidin-3,5-dion in 10 mL Dichlormethan werden bei 0 °C 35,5 mg (0,16 mmol) *meta*-Chlorperbenzoesäure (ca. 77%ig) gegeben. Die Reaktionsmischung wird 2 h bei 0 °C gerührt, mit 1M Natronlauge gewaschen und unter vermindertem Druck vom Lösungsmittel befreit. Man erhält 50 mg (97% Reinheit, 84% der Theorie) der Titelverbindung als farbloses Öl.

logP[a]: 1,89; logP[b]: 1,85; ¹H-NMR (D⁶-DMSO, 400MHz) δ ppm: 7,98(d,1H), 7,57(d,1H), 4,30-4,10(m,2H), 2,98(s,3H), 2,44(s,3H), 1,32(s,6H)

- 15 **Herstellbeispiel 25:** 4-Cyclopropyl-2-{2-fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfinyl]phenyl}-1-methyl-5-thioxo-1,2,4-triazolidin-3-on (Bsp. Nr. 181) und 4-Cyclopropyl-1-{2-fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfinyl]phenyl}-2-methyl-1,2,4-triazolidin-3,5-dithion (Bsp. Nr. 182)



- 20 Zu einer Lösung von 223 mg (0,59 mmol) 4-Cyclopropyl-1-{2-fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfinyl]phenyl}-2-methyl-1,2,4-triazolidin-3,5-dion in 10 mL Toluol werden 239 mg (0,59 mmol) 2,4-Bis(4-methoxyphenyl)-1,3,2,4-dithiadiphosphetan-2,4-disulfid (Lawessons Reagenz) gegeben. Die Reaktionsmischung wird über Nacht unter Argon zum Rückfluss erhitzt, dann konzentriert. Nach mehrfacher säulenchromatographischer Reinigung mittels MPLC an Kieselgel mit

- 218 -


Cyclohexan/Essigester als Laufmittel und an RP(C-18) mit Wasser/Acetonitril erhält man 13 mg (85% Reinheit, 5% der Theorie) 4-Cyclopropyl-2-{2-fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}-1-methyl-5-thioxo-1,2,4-triazolidin-3-on, 26 mg (88% Reinheit, 9% der Theorie) 4-Cyclopropyl-1-{2-fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}-2-methyl-1,2,4-triazolidin-3,5-dithion sowie 7 mg 4-Cyclopropyl-1-{2-fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}-2-methyl-5-thioxo-1,2,4-triazolidin-3-on jeweils als farblose Feststoffe.

4-Cyclopropyl-2-{2-fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}-1-methyl-5-thioxo-1,2,4-triazolidin-3-on (Bsp. Nr. 181): logP[a]: 3,44; logP[b]: 3,39; ¹H-NMR (D⁶-DMSO, 400MHz) δ ppm: 7,85(d,1H), 7,50(d,1H), 4,03(q,2H), 3,31(s,3H), 2,92-2,87(m,1H), 2,44(s,3H), 1,04-0,97(m,4H)

4-Cyclopropyl-1-{2-fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}-2-methyl-1,2,4-triazolidin-3,5-dithion (Bsp. Nr. 182): logP[a]: 3,83; logP[b]: 3,76; ¹H-NMR (D⁶-DMSO, 400MHz) δ ppm: 7,96(d,1H), 7,55(d,1H), 4,11-3,95(m,2H), 3,39(s,3H), 3,00-2,91(m,1H), 2,46(s,3H), 1,25-1,10(m,4H)

4-Cyclopropyl-1-{2-fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}-2-methyl-5-thioxo-1,2,4-triazolidin-3-on: logP[a]: 3,24; logP[b]: 3,18; ¹H-NMR (D⁶-DMSO, 400MHz) δ ppm: 7,81(d,1H), 7,48(d,1H), 4,10-3,92(m,2H), 2,98(s,3H), 2,92-2,87(m,1H), 2,44(s,3H), 1,11-0,99(m,4H)

Herstellbeispiel 26: 1-Cyclohexyl-3-{2-fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]-phenyl}-imidazolidin-2,4,5-trion (Bsp. Nr. 185)




268,0 mg (1,0 mmol) {2-Fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfanyl]phenyl}boronsäure, 392 mg (2,00 mmol) 1-Cyclohexylimidazolidin-2,4,5-trion, 272 mg (1,5 mmol) Kupfer(II)-acetat, 158 mg (2,0 mmol) Pyridin sowie 0,5 g aktiviertes 3 Å -Molsieb werden in 5 mL trockenem Dichlormethan 3 d bei Raumtemperatur gerührt. Die Reaktionsmischung wird auf Kieselgur adsorbiert und säulenchromatographisch an Kieselgel mittels MPLC mit Cyclohexan/Essigester als Laufmittel gereinigt. Man erhält 82 mg (96% Reinheit, 19% der Theorie) der Titelverbindung als farbloses Öl.

- 219 -

logP[a]: 4,32; logP[b]: 4,27; $^1\text{H-NMR}$ ($\text{D}^6\text{-DMSO}$, 400MHz) δ ppm: 7,67(d,1H), 7,47(d,1H), 4,00-3,90(m,1H), 3,84(q,2H), 2,47(s,3H), 2,00-1,89(m,2H), 1,86-1,75(m,4H), 1,67-1,58(m,1H), 1,39-1,25(m,2H), 1,20-1,09(m,1H)

Herstellbeispiel 27: 1-Cyclohexyl-3-{2-fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfinyl]-phenyl}-imidazolidin-2,4,5-trion (Bsp. Nr. 186)




Zu einer Lösung von 41,0 mg (0,10 mmol) 1-Cyclohexyl-3-{2-fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfinyl]phenyl}imidazolidin-2,4,5-trion in 10 mL Dichlormethan werden bei 0 °C 23,1 mg (0,10 mmol) *meta*-Chlorperbenzoesäure (ca. 77%ig) gegeben. Die Reaktionsmischung wird 2 h bei 0 °C gerührt, mit 1M Natronlauge gewaschen und unter vermindertem Druck vom Lösungsmittel befreit. Man erhält 29 mg (92% Reinheit, 63% der Theorie) der Titelverbindung als farbloses Öl.

logP[a]: 3,36; logP[b]: 3,33; $^1\text{H-NMR}$ ($\text{D}^6\text{-DMSO}$, 400MHz) δ ppm: 8,03(d,1H), 7,57(d,1H), 4,35-4,26(m,1H), 3,99-3,83(m,2H), 2,43(s,3H), 2,00-1,90(m,2H), 1,86-1,75(m,3H), 1,69-1,60(m,1H), 1,39-1,22(m,2H), 1,22-1,09(m,2H)

Herstellbeispiel 28: 1-[2-Fluor-4-methyl-5-(2,2,2-trifluoroethylsulfinyl)phenyl]-3,5,5-trimethylimidazolidin-2,4-dion (Bsp. Nr. 216)

Stufe 1: Ethyl 2-[2-Fluor-4-methyl-5-(2,2,2-trifluoroethylsulfinyl)anilino]-2-methyl-propanoat




Zu einer Lösung von 5,00 g (20,8 mmol) 2-Fluor-4-methyl-5-(2,2,2-trifluoroethylsulfinyl)anilin in *N,N*-Dimethylacetamid (90 mL) wurden bei Raumtemperatur 4,47 g (41,8 mmol) 2,6-Lutidin und 4,60 g (25,1 mmol) 2-Bromisobuttersäureethylester gegeben. Die Reaktionsmischung wurde 6 h bei 90 °C gerührt. Nach Abkühlen wurde das Reaktionsgemisch mit Wasser verdünnt und mit Essigester extrahiert. Die vereinten organischen Phasen wurden mit gesättigter Natriumchlorid-Lösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet, filtriert und unter Vakuum vom Lösungsmittel befreit. Durch

- 220 -


säulenchromatographische Reinigung (20% EtOAc/Petrolether) des Rückstands wurden 1,50 g (20% der Theorie) der Titelverbindung erhalten.

Stufe 2: 4-Nitrophenyl-*N*-methylcarbamate



- 5 Zu einer Lösung von 1,00 g (4,97 mmol) Chlorameisensäure-4-nitrophenylester in 50 ml Tetrahydrofuran bei 0 °C wurden 3,00 ml (5,97 mmol) Methylamin. Das Reaktionsgemisch wurde auf Raumtemperatur gehen lassen und 4 h weiter gerührt. Anschließend wurde es eingengt und der Rückstand wurde mit Wasser verdünnt und mit Essigester extrahiert. Die vereinten organischen Phasen wurden mit gesättigter Natriumchlorid-Lösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet, filtriert und unter Vakuum vom
- 10 Lösungsmittel befreit. Das Rohprodukt wurde durch Waschungen mit Diethylether aufgereinigt. So wurden 600 mg (61% der Theorie) der Titelverbindung erhalten.


Stufe 3: Ethyl 2-[2-Fluor-4-methyl-*N*-(methylcarbamoyl)-5-(2,2,2-trifluoroethylsulfanyl)anilino]-2-methylpropanoat



- 15 Zu einer Lösung von 1,00 g (2,83 mmol) Ethyl 2-[2-Fluor-4-methyl-5-(2,2,2-trifluoroethylsulfanyl)anilino]-2-methylpropanoat in 40 ml Methylenchlorid bei Raumtemperatur wurden 665 mg (3,11 mmol) 4-Nitrophenyl-*N*-methylcarbamate und 379 mg (3,11 mmol) *N,N*-Dimethylaminopyridin gegeben. Das Reaktionsgemisch bei Raumtemperatur 36 h gerührt. Anschließend wurde das Reaktionsgemisch mit Wasser verdünnt und mit Methylenchlorid extrahiert. Die vereinten organischen Phasen wurden mit gesättigter Natriumchlorid-Lösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet, filtriert und unter Vakuum vom Lösungsmittel befreit. 850 mg vom Rohprodukt wurden isoliert und weiter umgesetzt.
- 20

Stufe 4: 1-[2-Fluor-4-methyl-5-(2,2,2-trifluoroethylsulfanyl)phenyl]-3,5,5-trimethyl-imidazolidin-2,4-dion (Bsp. Nr. 217)


- 221 -



Zu einer Lösung von 650 mg (1,78 mmol) Ethyl 2-[2-Fluor-4-methyl-N-(methylcarbamoyl)-5-(2,2,2-trifluoroethylsulfanyl)anilino]-2-methyl-propanoat in 25 ml Essigester wurde 1 g neutrales Alox bei Raumtemperatur gegeben und 16 h gerührt. Anschließend wurde das Reaktionsgemisch filtriert und das
 5 Filtrat wurde eingengt. Durch säulenchromatographische Reinigung (25% EtOAc/Petrolether) des Rückstands wurden 150 mg (26% der Theorie) der Titelverbindung erhalten.

logP(HCOOH): 3,11; $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3 , 400MHz) δ ppm 7,41(d,1H), 7,14(d,1H), 3,32(q,2H), 3,12(s,3H), 1,41(s,3H), 1,40(s,3H)

Stufe 5: 1-[2-Fluor-4-methyl-5-(2,2,2-trifluoroethylsulfanyl)phenyl]-3,5,5-trimethyl-imidazolidin-2,4-dion
 10 (Bsp. Nr. 216)




Zu einer Lösung aus 90,0 mg (0,21 mmol) 1-[2-Fluor-4-methyl-5-(2,2,2-trifluoroethylsulfanyl)phenyl]-3,5,5-trimethyl-imidazolidin-2,4-dion in 8 ml Aceton / Wasser (1:1) bei Raumtemperatur wurden 135 mg (0,21 mmol) Oxon gegeben. Die Lösung wurde 4 h bei Raumtemperatur gerührt und anschließend wurde
 15 das Lösungsmittel unter Vakuum entfernt. Der Rückstand wurde mit Wasser versetzt und mit Ethylacetat extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden mit Wasser und gesättigter Natriumchlorid-Lösung gewaschen und danach über Natriumsulfat getrocknet. Das Lösungsmittel wird am Rotationsverdampfer entfernt. Durch säulenchromatographische Reinigung (40% EtOAc/Petrolether) des Rohprodukts wurden 55 mg (59% der Theorie) der Titelverbindung erhalten.

20 logP(HCOOH): 2,05; $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3 , 400MHz) δ ppm 7,86(d,1H), 7,17(d,1H), 3,45(q,2H), 3,14(s,3H), 2,44(s,3H), 1,47(s,3H), 1,41(s,3H)

Gemäß den zuvor beschriebenen Verfahren wurden die folgenden Verbindungen der allgemeinen Formel (I) hergestellt:

- 222 -




(I) mit (I-A)

(Verbindung der allgemeinen Formel (I) mit (I-A) mit $Z = H$)

Beispiel-Nr.	W	n	Y	X	V ¹	Q ¹	R ⁴	R ⁵	R ⁶	R ⁷
1	F	0	CH ₃	CH ₃	O	NH	H	H	H	H
2	F	0	CH ₃	CH ₃	(NCH(CH ₃)CF ₃)HCl	CH ₂	H	H	H	H
3	F	1	CH ₃	F	NCH ₂ CF ₃	CH ₂	H	H	H	H
4	F	1	CH ₃	CH ₃	O	NH	H	H	H	H
5	F	0	CH ₃	CH ₃	(NCH ₂ CF ₃)HCl	CH ₂	H	H	H	H
6	F	0	CH ₃	F	NCH ₂ CF ₃	CH ₂	H	H	H	H
7	F	1	CH ₃	F	O	NH	H	H	H	H
8	F	0	CH ₃	F	NCH(CH ₃)CF ₃	CH ₂	H	H	H	H
9	F	0	CH ₃	F	O	NH	H	H	H	H
10	F	1	CH ₃	F	NCH(CH ₃)CF ₃	CH ₂	H	H	H	H
104	F	0	CH ₃	F	O	O	H	H	H	H
105	F	1	CH ₃	F	O	O	H	H	H	H
106	F	0	CH ₃	F	O	O	CH ₃	H	H	H
107	F	1	CH ₃	F	O	O	H	H	CH ₃	H
108	F	0	CH ₃	F	O	O	H	H	CH ₃	H
109	F	1	CH ₃	F	O	O	CH ₃	H	H	H
198	F	0	CH ₃	F	O	NCH ₃	H	H	H	H

- 223 -

199	F	1	CH ₃	F	O	NCH ₃	H	H	H	H
------------	---	---	-----------------	---	---	------------------	---	---	---	---




(I) mit (I-B)

(Verbindung der allgemeinen Formel (I) mit (I-B) mit Z = H)

Beispiel-Nr.	W	n	Y	X	V ²	Q ²	V ¹	Q ¹
11	F	0	CH ₃	F	O	CH ₂	NCH ₂ CF ₃	S
12	F	1	CH ₃	F	O	CH ₂	N-Cyclopropyl	S
13	F	1	CH ₃	F	O	CH ₂	NCH ₂ CF ₃	S
14	F	0	CH ₃	CH ₃	O	CH ₂	N-Cyclopropyl	S
15	F	1	CH ₃	CH ₃	O	CH ₂	N-Cyclopropyl	S
16	F	1	CH ₃	H	O	NCH ₃	O	C(CH ₃) ₂
17	F	1	CH ₃	F	O	NCH ₃	O	C(CH ₃) ₂
18	F	0	CH ₃	F	O	NCH ₃	O	C(CH ₃) ₂
19	F	0	CH ₃	F	O	CH ₂	O	CH ₂
110	F	1	CH ₃	F	O	C(CH ₃) ₂	O	O
111	F	0	CH ₃	F	O	C(CH ₃) ₂	O	O
112	F	0	CH ₃	CH ₃	O	CH ₂	N-Cyclopropyl	S
113	F	0	CH ₃	F	O	CH ₂	N-CH ₂ C(CH ₃) ₃	S
114	F	1	CH ₃	F	O	CH ₂	N-CH ₂ C(CH ₃) ₃	S
115	F	0	CH ₃	F	O	CH ₂	N-CH ₂ CH(CH ₃) ₂	S
116	F	0	CH ₃	F	O	NCH ₃	O	NCH ₃

- 224 -

117	F	1	CH ₃	F	O	NCH ₃	O	NCH ₃
118	F	0	CH ₃	F	O	NCH ₂ CH ₃	O	NCH ₂ CH ₃
119	F	1	CH ₃	F	O	NCH ₂ CH ₃	O	NCH ₂ CH ₃
120	F	1	CH ₃	F	O	NCH ₂ CH=CH ₂	O	NCH ₂ CH=CH ₂
121	F	0	CH ₃	F	O	NCH ₂ CCH	O	NCH ₃
122	F	0	CH ₃	F	O	NCH ₂ CH ₃	O	NCH ₃
123	F	1	CH ₃	F	O	NCH ₂ CCH	O	NCH ₃
124	F	1	CH ₃	F	O	NCH ₂ CH=CH ₂	O	NCH ₃
125	F	0	CH ₃	F	O	NCH ₂ CH=CH ₂	O	NCH ₃
126	F	0	CH ₃	F	O	NCH ₂ -Cyclopropyl	O	NCH ₃
200	F	0	CH ₃	F	O	CH ₂	O	NCH ₃
201	F	1	CH ₃	F	O	CH ₂	O	NCH ₂ CH=CH ₂
202	F	0	CH ₃	F	O	CH ₂	O	N-nButyl
203	F	1	CH ₃	F	O	CH ₂	O	N-nButyl
204	F	0	CH ₃	F	O	CH ₂	O	N-Benzyl
205	F	1	CH ₃	F	O	CH ₂	O	N-Benzyl
206	F	1	CH ₃	F	O	CH(CH ₃)	O	O



(I) mit (I-C)

(Verbindung der allgemeinen Formel (I) mit (I-C) mit Z = H)

Beispiel-Nr.	W	n	Y	X	V ¹	Q ¹	V ²	Q ²
--------------	---	---	---	---	----------------	----------------	----------------	----------------

20	F	0	CH ₃	H	O	NCH ₃	O	NCH ₃
21	F	1	CH ₃	H	O	NCH ₃	O	NCH ₃
22	F	0	CH ₃	F	O	NCH ₃	O	NCH ₃
23	F	1	CH ₃	F	O	NCH ₃	O	NCH ₃
24	F	1	Cl	H	O	NCH ₃	O	NCH ₃
25	F	0	CF ₃	H	O	NCH ₃	O	NCH ₃
26	F	1	CF ₃	H	O	NCH ₃	O	NCH ₃
27	F	1	CN	H	O	NCH ₃	O	NCH ₃
28	F	0	CN	H	O	NCH ₃	O	NCH ₃
29	F	1	Cl	F	O	NCH ₃	O	NCH ₃
30	F	0	Cl	F	O	NCH ₃	O	NCH ₃
31	F	0	Cl	H	O	NCH ₃	O	NCH ₃
32	F	1	OCH ₃	H	O	NCH ₃	O	NCH ₃
33	F	1	CH ₃	CH ₃	O	NCH ₃	O	NCH ₃
34	F	1	CH ₃	F	O	NCH ₃	O	N-Cyclopropyl
35	F	0	CH ₃	F	O	NCH ₃	O	N-Cyclopropyl
36	F	0	CH ₃	H	O	NCH ₃	O	N-Cyclopropyl
37	F	1	CH ₃	H	O	NCH ₃	O	N-Cyclopropyl
38	F	1	Cl	F	O	NCH ₃	O	N-Cyclopropyl
39	F	1	Cl	H	O	NCH ₃	O	N-Cyclopropyl
40	F	0	Cl	H	O	NCH ₃	O	N-Cyclopropyl
41	F	1	OCH ₃	H	O	NCH ₃	O	N-Cyclopropyl
42	F	0	OCH ₃	H	O	NCH ₃	O	N-Cyclopropyl
43	F	1	CN	H	O	NCH ₃	O	N-Cyclopropyl
44	F	0	CN	H	O	NCH ₃	O	N-Cyclopropyl
45	F	1	Br	H	O	NCH ₃	O	N-Cyclopropyl
46	F	0	Br	H	O	NCH ₃	O	N-Cyclopropyl
47	F	1	CH ₃	CH ₃	O	NCH ₃	O	N-Cyclopropyl

48	F	0	CH ₃	H	O	NCH ₂ CH=CH ₂	O	N-Cyclopropyl
49	F	1	CH ₃	H	O	NCH ₂ CH=CH ₂	O	N-Cyclopropyl
50	F	1	CH ₃	H	O	NCH ₂ CH(CH ₃) ₂	O	N-Cyclopropyl
51	F	0	CH ₃	H	O	NCH ₂ CH ₃	O	NCH ₃
52	F	0	CH ₃	H	O	NCH ₂ -Cyclopropyl	O	NCH ₃
53	F	0	CF ₃	H	O	NCH ₃	O	N-Cyclopropyl
54	F	1	CF ₃	H	O	NCH ₃	O	N-Cyclopropyl
55	F	0	CH ₃	F	O	NH	O	NCH ₃
56	F	0	CH ₃	H	O	N-(3-(2,2,2-trifluoroethylsulfanyl)-4-methylphenyl)	O	NCH ₃
57	F	0	CH ₃	H	O	N-Benzyl	O	NCH ₃
58	F	0	CH ₃	H	O	NCH ₂ CH=CH ₂	O	NCH ₃
59	F	1	CH ₃	H	O	NCH ₂ CH=CH ₂	O	NCH ₃
60	F	0	CH ₃	H	O	N-((2-chlorophenyl)methyl)	O	NCH ₃
61	F	0	CH ₃	H	O	NCH(CH ₃) ₂	O	NCH ₃
62	F	0	CH ₃	F	O	NCH(CH ₃) ₂	O	NCH ₃
63	F	0	CH ₃	H	O	NCH(CH ₃) ₂	O	N-Cyclopropyl
64	F	1	CH ₃	F	O	NCH(CH ₃) ₂	O	N-Cyclopropyl
65	F	0	CH ₃	F	O	NCH(CH ₃) ₂	O	N-Cyclopropyl
66	F	0	CH ₃	F	O	NH	O	N-Cyclopropyl
67	F	1	Br	H	O	NCH ₃	O	NCH ₃
68	F	0	Br	H	O	NCH ₃	O	NCH ₃
69	F	1	Br	F	O	NCH ₃	O	NCH ₃
70	F	1	F	F	O	NCH ₃	O	NCH ₃
71	F	0	F	F	O	NCH ₃	O	N-Cyclopropyl
72	F	1	Br	F	O	NCH ₃	O	N-Cyclopropyl
73	F	0	CH ₃	F	O	NCH(CH ₃)CH ₂ CH ₃	O	N-Cyclopropyl


74	F	1	CH ₃	F	O	NCH ₃	O	NCH ₂ CH ₃
75	F	1	CH ₃	F	O	NCH(CH ₃)CH ₂ CH ₃	O	N-Cyclopropyl
76	F	0	CH ₃	F	O	NCH ₃	O	N-((3-(trifluoromethyl)phenyl)
77	F	1	CH ₃	F	O	NCH ₃	O	N-((3-(trifluoromethyl)phenyl)
78	F	0	CH ₃	F	O	N-(4-cyano-2,5-difluoro-phenyl)	O	NCH ₃
79	F	0	CH ₃	H	O	N-(3-(2,2,2-trifluoroethylsulfanyl)-4-methyl-phenyl)	O	NCH ₂ CH=CH ₂
80	F	1	CH ₃	F	O	NCH ₃	O	NCH ₂ CH=CH ₂
81	F	0	CH ₃	F	O	NCH ₃	O	NCH ₂ CH=CH ₂
82	F	1	CH ₃	H	O	N-(3-(2,2,2-trifluoroethylsulfanyl)-4-methyl-phenyl)	O	NCH ₃
83	F	0	CH ₃	F	O	NCH ₃	O	NCH ₂ CH ₃
84	F	1	CH ₃	H	O	N-(3-(2,2,2-trifluoroethylsulfanyl)-4-methyl-phenyl)	O	NCH ₃
85	F	0	CH ₃	F	O	NH	O	NCH ₂ CH ₃
86	F	0	CH ₃	F	O	N-Cyclopentyl	O	NCH ₃
87	F	0	CH ₃	F	O	NCH ₂ CH ₃	O	N-Phenyl
88	F	1	CH ₃	F	O	NCH ₂ CH ₃	O	N-Phenyl
89	F	1	CH ₃	H	O	NCH ₃	O	NCH ₂ CH ₃
90	F	0	CH ₃	H	O	N-Benzyl	O	N-Cyclopropyl
91	F	0	CH ₃	F	O	NCH ₃	O	NCH(CH ₃) ₂
92	F	1	CH ₃	F	O	NCH ₃	O	NCH(CH ₃) ₂
93	F	1	CH ₃	F	O	NCH ₂ CH ₃	O	NCH(CH ₃) ₂
94	F	0	CH ₃	F	O	NCH ₃	O	NC(CH ₃) ₃
95	F	1	CH ₃	F	O	NCH ₃	O	NC(CH ₃) ₃

96	F	1	CH ₃	F	O	N-(Cyclohex-2-en-1-yl)	O	NCH ₃
97	F	0	CH ₃	F	O	NCH ₂ CH ₃	O	NCH ₃
98	F	1	CH ₃	F	O	NCH ₂ CH ₃	O	NCH ₃
99	F	0	CH ₃	F	O	NCH ₂ CH ₃	O	NC(CH ₃) ₃
100	F	0	CH ₃	H	O	NCH ₂ CH ₃	O	NCH ₂ CH ₃
127	F	0	CH ₃	F	O	NCH ₂ CH ₃	O	N-Cyclopropyl
128	F	0	CH ₃	F	O	NCH ₃	O	N-Cyclopropyl
129	F	0	CH ₃	F	O	NCH ₂ CF ₃	O	N-Cyclopropyl
130	F	0	CH ₃	F	O	NCH ₂ CH=CH ₂	O	N-Cyclopropyl
131	F	0	CH ₃	H	O	NCH ₃	O	NCH ₂ CH ₃
132	F	0	CH ₃	H	O	NCH ₃	O	NCH(CH ₃) ₂
133	F	0	CH ₃	H	O	NCH ₂ CH ₃	O	NCH(CH ₃) ₂
134	F	0	CH ₃	H	O	NCH ₂ CH ₃	O	NC(CH ₃) ₃
135	F	0	CH ₃	H	O	NCH(CH ₃) ₂	O	NC(CH ₃) ₃
136	F	0	CH ₃	F	O	NCH ₃	O	N-Cyclohexyl
137	F	1	CH ₃	F	O	NCH ₂ CH ₃	O	NC(CH ₃) ₃
138	F	1	CH ₃	H	O	NCH ₂ CH ₃	O	NCH ₂ CH ₃
139	F	1	CH ₃	H	O	NCH ₃	O	NC(CH ₃) ₃
140	F	1	CH ₃	H	O	NCH(CH ₃) ₂	O	NCH ₂ CH ₃
141	F	1	CH ₃	H	O	NCH ₃	O	NCH(CH ₃) ₂
142	F	0	CH ₃	F	O	NC(CH ₃) ₃	O	NCH ₂ CH ₃
143	F	0	CH ₃	F	O	NC(CH ₃) ₃	O	NCH(CH ₃) ₂
144	F	0	CH ₃	F	O	NC(CH ₃) ₃	O	N-Cyclopropyl
145	F	0	CH ₃	F	O	NCH ₂ CF ₃	O	NCH ₂ CH ₃
146	F	0	CH ₃	F	O	NCH ₂ CF ₃	O	NCH(CH ₃) ₂
147	F	0	CH ₃	F	O	NCH ₂ CF ₃	O	NC(CH ₃) ₃
148	F	0	CH ₃	F	O	NCH ₂ CH(CH ₃) ₂	O	NCH ₂ CH ₃
149	F	0	CH ₃	F	O	NCH ₂ CH(CH ₃) ₂	O	NCH(CH ₃) ₂

151	F	1	CH ₃	F	O	NCH ₃	O	N-Cyclopropyl
152	F	1	CH ₃	F	O	NC(CH ₃) ₃	O	NCH(CH ₃) ₂
153	F	1	CH ₃	F	O	NCH ₂ CF ₃	O	NCH(CH ₃) ₂
154	F	0	CH ₃	F	O	NCH ₂ CF ₃	O	NCH ₂ CH=CH ₂
155	F	0	CH ₃	F	O	NCH ₂ CF ₃	O	N-Phenyl
156	F	0	CH ₃	F	O	NCH ₂ CF ₃	O	NCH ₂ CHF ₂
157	F	0	CH ₃	F	O	NH	O	N-(3-Chlorophenyl)
158	F	1	CH ₃	F	O	NH	O	N-(3-Trifluoromethylphenyl)
159	F	0	CH ₃	F	O	NCH ₃	O	N(CH ₂) ₃ OCH ₃
160	F	0	CH ₃	F	O	NCH ₃	O	NCH ₂ CH ₂ CH ₃
161	F	0	CH ₃	F	O	NCH ₃	O	NCH ₂ CH(CH ₂) ₂
162	F	0	CH ₃	F	O	NCH ₃	O	N-Phenyl
163	F	1	CH ₃	F	O	NCH ₃	O	N-Phenyl
164	F	1	CH ₃	F	O	NCH ₂ CF ₃	O	N-Cyclopropyl
165	F	1	CH ₃	F	O	NCH ₂ CH=CH ₂	O	N-Cyclopropyl
166	F	1	CH ₃	F	O	NCH ₂ CF ₃	O	NCH ₂ CH=CH ₂
167	F	1	CH ₃	F	O	NCH ₂ CF ₃	O	N-Phenyl
168	F	1	CH ₃	F	O	NCH ₂ CF ₃	O	NCH ₂ CHF ₂
169	F	1	CH ₃	F	O	NCH ₃	O	NCH ₂ CH(CH ₂) ₂
170	F	1	CH ₃	F	O	NCH ₃	O	N(CH ₂) ₃ OCH ₃
171	F	1	CH ₃	F	O	NCH ₂ CH ₃	O	N-Cyclopropyl
172	F	1	CH ₃	F	O	NCH ₂ CH ₂ CH ₃	O	N-Cyclopropyl
173	F	0	CH ₃	F	O	N-Phenyl	O	C(CH ₃) ₂
174	F	0	CH ₃	F	O	NCH ₃	O	C(CH ₃) ₂
175	F	0	CH ₃	F	O	NCH ₃	O	C(CH ₂ CH ₃) ₂
176	F	1	CH ₃	F	O	NCH ₃	O	C(CH ₂ CH ₃) ₂
177	F	1	CH ₃	F	O	NCH ₃	O	C(CH ₃) ₂

- 230 -

178	F	0	CH ₃	F	O	NCH ₂ Phenyl	O	C(CH ₃) ₂
179	F	0	CH ₃	F	O	NCH ₃	O	C(CH ₂) ₃
180	F	1	CH ₃	F	O	NCH ₃	O	C(CH ₂) ₃
181	F	0	CH ₃	F	O	NCH ₃	S	N-Cyclopropyl
182	F	0	CH ₃	F	S	NCH ₃	S	N-Cyclopropyl
197	F	1	CH ₃	F	O	NCH ₃	O	N-Cyclopropyl
207	F	0	CH ₃	F	O	NH	O	N-Cyclopropyl
208	F	1	CH ₃	F	O	CH ₂	O	N-CH ₃
209	F	1	CH ₃	F	O	CH ₂	O	N-Cyclopropyl
210	F	0	CH ₃	F	O	CH ₂	O	N-Cyclopropyl
211	F	0	CH ₃	F	O	CH ₂	O	N-CH ₃
212	F	0	CH ₃	F	O	CH(CH ₃)	O	N-CH ₃
213	F	1	CH ₃	F	O	CH(CH ₃)	O	N-CH ₃
214	F	0	CH ₃	F	O	CH(CH ₃)	O	N-Cyclopropyl
215	F	1	CH ₃	F	O	CH(CH ₃)	O	N-Cyclopropyl
216	F	1	CH ₃	F	O	C(CH ₃) ₂	O	N-CH ₃
217	F	0	CH ₃	F	O	C(CH ₃) ₂	O	N-CH ₃



(I) mit (I-D)

(Verbindung der allgemeinen Formel (I) mit (I-D) mit $Z = H$)

Beispiel-Nr.	W	n	Y	X	V ¹	V ²	Q ²	V ³
101	F	0	CH ₃	H	O	O	NCH ₂ CHF ₂	O
102	F	0	CH ₃	F	O	O	N-Cyclopropyl	O
103	F	1	CH ₃	F	O	O	NCH ₂ CHF ₂	O
183	F	1	CH ₃	F	O	O	N-Cyclopropyl	O
184	F	1	CH ₃	CH ₃	O	O	NCH ₂ CHF ₂	O
185	F	0	CH ₃	F	O	O	N-Cyclohexyl	O
186	F	1	CH ₃	F	O	O	N-Cyclohexyl	O
187	F	0	CH ₃	CH ₃	S	O	NCH ₂ CF ₃	O
188	F	1	CH ₃	CH ₃	S	O	NCH ₂ CF ₃	O
189	F	0	CH ₃	F	S	O	NCH ₂ CF ₃	O
190	F	1	CH ₃	F	S	O	NCH ₂ CF ₃	O
191	F	0	CH ₃	F	S	O	NCH ₂ CH(CH ₃) ₂	O
192	F	0	CH ₃	F	S	O	NCH ₂ C(CH ₃) ₃	O
193	F	0	CH ₃	F	S	O	NC(CH ₃) ₃	O
194	F	1	CH ₃	F	S	O	NCH ₂ CH(CH ₃) ₂	O
195	F	1	CH ₃	F	S	O	NCH ₂ C(CH ₃) ₃	O
196	F	1	CH ₃	F	S	O	NC(CH ₃) ₃	O

Die Bestimmung der logP Werte erfolgte analog OECD Guideline 117 (EC Directive 92/69/EEC) durch HPLC (High Performance Liquid Chromatography) an reversed-phase Säulen (C 18), mit nachfolgenden Methoden:

- 5 [a] Die Bestimmung mit der LC-MS im sauren Bereich erfolgt bei pH 2,7 mit 0,1 % wässriger Ameisensäure und Acetonitril (enthält 0,1% Ameisensäure) als Eluenten; linearer Gradient von 10% Acetonitril bis 95% Acetonitril. LogP^[a] wird auch logP(HCOOH) genannt.

[b] Die Bestimmung mit der LC-MS im neutralen Bereich erfolgt bei pH 7.8 mit 0,001 molarer wässriger Ammoniumhydrogencarbonat-Lösung und Acetonitril als Eluenten; linearer Gradient von 10 % Acetonitril bis 95 % Acetonitril. $\log P^{[b]}$ wird auch $\log P(\text{neutral})$ genannt.

- Die Eichung erfolgt mit Lösungen einer homologen Reihe unverzweigter Alkan-2-onen (mit 3 bis 16 Kohlenstoffatomen), deren $\log P$ -Werte bekannt sind (Bestimmung der $\log P$ -Werte anhand der Retentionszeiten durch lineare Interpolation zwischen zwei aufeinander folgenden Alkanonen).

Die NMR-Spektren wurden mit einem Bruker II Avance 400, ausgestattet mit einem 1,7 mm TCI-Probenkopf, gemessen. In Einzelfällen wurden die NMR Spektren mit einem Bruker Avance II 600 bestimmt.

- 10 Die NMR-Daten ausgewählter Beispiele werden in klassischer Form (δ -Werte, Multiplettaufspaltung, Anzahl der H-Atome) aufgeführt. Die Aufspaltung der Signale wurde wie folgt beschrieben: s (Singulett), d (Duplett), t (Triplett), q (Quartett), m (Multiplett), breit (für breite Signale). Als Lösungsmittel wurden CD_3CN , CDCl_3 oder D6-DMSO verwendet, wobei als Referenz Tetramethylsilan (0.00 ppm) eingesetzt wurde.
- 15 Die GC-MS-Spektren werden mit einem Agilent 6890 GC, HP 5973 MSD an Dimethylsilikonphase bestimmt, mit einem Temperaturgradient von 50 °C bis 320 °C. GC-MS-Indices werden als Kovats-Indices mit Lösung einer homologen Reihe von n-Alkanen (mit geradzahlgiger Anzahl von 8 bis 38 Kohlenstoffatomen) bestimmt.

Bsp.-Nr.	$\log P$ (HCOOH)	$\log P$ (neutral)	NMR Daten	Lösungsmittel
1	2,43	2,39	7,37(s,1H), 7,14(s,1H), 6,64(s,1H), 3,92-3,87(q,2H), 3,73-3,70(m,2H), 3,42-3,39(m,2H), 2,33(s,3H), 2,15(s,3H)	D6-DMSO
2	2,42		9,32(m,1H), 7,64(s,1H), 7,37(s,1H), 4,73(m,1H), 3,99(m,4H), 2,38(d,3H), 2,30(m,2H), 2,15(s,3H), 2,09(s,3H), 1,34(m,2H)	D6-DMSO
3	1,02	2,88	7,99-7,97(m,1H), 7,32-7,29(m,1H), 4,20-4,11(m,1H), 3,90-3,64(m,5H), 2,62(t,2H), 2,37(s,3H), 2,12-2,05(m,2H)	D6-DMSO
4	1,51	1,52	7,67(s,1H), 7,24(s,1H), 6,77(breit,1H), 4,13-3,93(m,2H), 3,78-3,71(m,2H), 3,44(t,2H), 2,33(s,3H), 2,24(s,3H)	D6-DMSO

Bsp.- Nr.	logP (HCOOH)	logP (neutral)	NMR Daten	Lösungsmittel
5	1,50	4,38	9,46(t,1H), 7,64(s,1H), 7,37(s,1H), 4,30-4,19(m,2H), 4,05-3,95(m,4H), 3,30-3,26(m,2H), 2,38(s,3H), 2,34-2,27(m,2H), 2,12(s,3H)	D6-DMSO
6	1,68	4,24	7,64-7,62(m,1H), 7,29-7,26(m,1H), 4,30-3,87(m,6H), 3,33(m,2H), 2,38(s,3H), 2,33(m,2H)	D6-DMSO
7	1,47	1,43	7,99-7,97(m,1H), 7,34-7,32(m,1H), 7,03(breit,1H), 4,16-4,10(m,1H), 3,99-3,95(m,1H), 3,91-3,80(m,2H), 3,44(t,2H), 2,35(s,3H)	D6-DMSO
8	1,82	4,63	7,80(breit,1H), 7,50(breit,1H), 4,75(breit,1H), 4,10-3,90(m,4H), 3,17(m,2H), 2,42(s,3H), 2,25(m,2H), 1,35(breit,3H)	D6-DMSO
9	2,36	2,31	7,67-7,65(m,1H), 7,23-7,20(m,1H), 6,90(breit,1H), 3,91-3,83(q,2H), 3,80(t,2H), 3,41(t,2H), 2,37(s,3H)	D6-DMSO
10	1,10	3,20	7,99-7,96(m,1H), 7,32-7,29(m,1H), 4,21-3,59(m,5H), 2,68-2,61(m,2H), 2,37(s,3H), 2,12-2,05(m,2H), 1,11-1,09(d,3H)	D6-DMSO
11	3,60	3,50	7,62(d,1H), 7,39(d,1H), 4,39(d,1H), 4,26(d,1H), 4,00-3,83(m,4H), 2,43(s,3H)	D6-DMSO
12	3,96	3,90	7,91(s,1H), 7,80(s,1H), 4,33(m,1H), 4,23-4,00(m,3H), 2,68-2,65(m,1H), 0,76-0,72(m,2H), 0,41-0,37(m,2H)	D6-DMSO
13	2,70	2,64	7,92(dd,1H), 7,52(dd,1H), 4,41-4,25(m,3H), 4,06-3,69(m,3H), 2,43(s,3H)	D6-DMSO
14	2,68	3,00	7,34(s,1H), 7,23(s,1H), 4,25(d,1H), 4,14(d,1H), 3,92-3,84(m,2H), 2,95(s,3H), 2,36(s,3H), 2,00(s,3H)	D6-DMSO
15	2,48	2,48		D6-DMSO
16	1,96	1,91	7,91(d,1H), 7,55-7,52(m,1H), 7,47(d,1H), 4,24-4,18(m,1H), 3,93-3,87(m,1H), 2,89(s,3H), 2,40(s,3H), 1,45(s,3H), 1,43(s,3H)	D6-DMSO
17	2,04	2,01	7,97(d,1H), 7,51(d,1H), 4,32-4,20(m,1H), 4,00-3,89(m,1H), 2,89(s,3H), 2,43(s,3H), 1,45(s,3H), 1,44(s,3H)	D6-DMSO

Bsp.- Nr.	logP (HCOOH)	logP (neutral)	NMR Daten	Lösungsmittel
18	2,96	2,92	7,69(d,1H), 7,39(d,1H), 3,93(q,2H), 2,88(s,3H), 2,43(s,3H), 1,43(s,6H)	D6-DMSO
19	2,52	2,45	7,56(d,1H), 7,40(d,1H), 3,87(q,2H), 2,86(breit,4H), 2,44(s,3H)	D6-DMSO
20	2,59	2,58	7,49(d,1H), 7,38(d,1H), 7,23- 7,21(m,1H), 4,03(q,2H), 3,00(s,3H), 2,99(s,3H), 2,38(s,3H)	D6-DMSO
21	1,63	1,63	7,79(d,1H), 7,47-7,54(m,2H), 4,12- 4,22(m,1H), 4,02-4,08(m,1H), 3,04(s,3H), 3,00(s,3H), 2,38(s,3H)	D6-DMSO
22	2,61	2,56	7,70(d,1H), 7,43(d,1H), 4,01(q,2H), 3,01(s,3H), 2,95(s,3H), 2,42(s,3H)	D6-DMSO
23	1,64	1,63	7,92(d,1H), 7,55(d,1H), 4,26- 4,11(m,2H), 3,01(s,3H), 2,99(s,3H), 2,42(s,3H)	D6-DMSO
24	1,97	1,95	7,81(d,1H), 7,78(d,1H), 7,67- 7,64(m,1H), 4,31-4,14(m,2H), 3,07(s,3H), 3,00(s,3H)	D6-DMSO
25	3,04	2,97	7,89(d,1H), 7,81(d,1H), 7,51- 7,48(m,1H), 4,21(q,2H), 3,07(s,3H), 3,01(s,3H)	D6-DMSO
26	2,37	2,31	8,18(d,1H), 8,07(d,1H), 7,85- 7,82(m,1H), 4,30-4,20(m,2H), 3,12(s,3H), 3,02(s,3H)	D6-DMSO
27	1,67	1,64	8,19(d,1H), 7,98(d,1H), 7,80- 7,77(m,1H), 4,42-4,32(m,2H), 3,11(s,3H), 3,01(s,3H)	D6-DMSO
28	2,18	2,19	7,99(d,1H), 7,73(d,1H), 7,51- 7,47(m,1H), 4,26(q,2H), 3,07(s,3H), 3,00(s,3H)	D6-DMSO
29	1,93	1,91	8,03(d,1H), 7,94(d,1H), 4,34- 4,19(m,2H), 3,01(s,6H)	D6-DMSO
30	2,71	2,67	7,86(d,1H), 7,82(d,1H), 4,18(q,2H), 3,01(s,3H), 2,97(s,3H)	D6-DMSO
31	2,72	2,69	8,14(d,1H), 7,78-7,75(m,1H), 7,59(d,1H), 4,05(s,3H), 4,04(q,2H), 3,09(s,3H)	D6-DMSO
32	1,58	1,54	7,64-7,59(m,2H), 7,33(d,1H), 4,19- 4,10(m,1H), 4,00-3,94(m,1H), 3,92(s,3H), 3,00(s,3H), 2,99(s,3H)	D6-DMSO

Bsp.- Nr.	logP (HCOOH)	logP (neutral)	NMR Daten	Lösungsmittel
33	1,75	1,70	7,77-7,74(m,1H), 7,39(s,1H), 4,19-4,00(m,2H), 3,01(s,3H), 2,97-2,90(m,3H), 2,37(s,3H)m 2,34(s,3H)	D6-DMSO
34	1,91	1,88	7,90(d,1H), 7,53(d,1H), 4,25-4,10(m,2H), 2,95(s,3H), 2,73-2,67(m,1H), 2,42(s,3H), 0,93-0,88(m,4H)	D6-DMSO
35	2,83	2,81	7,68(d,1H), 7,42(d,1H), 4,00(q,2H), 2,91(s,3H), 2,73-2,68(m,1H), 2,42(s,3H), 0,91-0,88(m,4H)	D6-DMSO
36	2,89	2,87	7,46(d,1H), 7,37(d,1H), 7,21-7,19(m,1H), 4,02(q,2H), 2,96(s,3H), 2,70-2,65(m,1H), 2,37(s,3H), 0,91-0,87(m,4H)	D6-DMSO
37	1,89	1,87	7,77(d,1H), 7,52-7,46(m,2H), 4,21-4,15(m,1H), 4,06-4,00(m,1H), 3,01(s,3H), 2,71-2,66(m,1H), 2,38(s,3H), 0,92-0,87(m,4H)	D6-DMSO
38	2,18	2,16	8,02(d,1H), 7,92(d,1H), 4,34-4,18(m,2H), 2,97(s,3H), 2,71-2,67(m,1H), 0,93-0,88(m,4H)	D6-DMSO
39	2,20	2,17	7,80-7,76(m,2H), 7,64-7,62(m,1H), 4,30-4,12(m,2H), 3,03(s,3H), 2,71-2,66(m,1H), 0,93-0,87(m,4H)	D6-DMSO
40	3,04	2,98	7,63(d,1H), 7,55(d,1H), 7,30-7,27(m,1H), 4,18(q,2H), 2,98(s,3H), 2,70-2,67(m,1H), 0,92-0,87(m,4H)	D6-DMSO
41	1,77	1,75	7,62-7,57(m,2H), 7,32(d,1H), 4,19-4,10(m,1H), 4,06-3,95(m,1H), 3,92(s,3H), 2,97(s,3H), 2,71-2,66(m,1H), 0,93-0,86(m,4H)	D6-DMSO
42	2,51	2,46	7,42(d,1H), 7,29-7,27(m,1H), 7,14(d,1H), 3,97(q,2H), 3,89(s,3H), 2,91(s,3H), 2,70-2,65(m,1H), 0,91-0,86(m,4H)	D6-DMSO
43	1,93	1,90	8,18(d,1H), 7,96(d,1H), 7,77-7,74(m,1H), 4,42-4,30(m,2H), 3,08(s,3H), 2,72-2,66(m,1H), 0,91-0,89(m,4H)	D6-DMSO
44	2,53	2,45	7,98(d,1H), 7,70(d,1H), 7,48-7,45(m,1H), 4,25(q,2H), 3,03(s,3H), 2,71-2,65(m,1H), 0,91-0,88(m,4H)	D6-DMSO

Bsp.- Nr.	logP (HCOOH)	logP (neutral)	NMR Daten	Lösungsmittel
45	2,27	2,24	7,90(d,1H), 7,78(d,1H), 7,57-7,55(m,1H), 4,26-4,10(m,2H), 3,03(s,3H), 2,71-2,66(m,1H), 0,91-0,87(m,4H)	D6-DMSO
46	3,11	3,05	7,77(d,1H), 7,51(d,1H), 7,21-7,18(m,1H), 4,19(q,2H), 2,98(s,3H), 2,70-2,66(m,1H), 0,92-0,87(m,4H)	D6-DMSO
47	1,98	1,93	7,76-7,72(m,1H), 7,38(s,1H), 4,19-3,97(m,2H), 2,93-2,86(m,3H), 2,73-2,67(m,1H), 2,49-2,32(m,6H), 0,92-0,87(m,4H)	D6-DMSO
48	3,37	3,31	7,47(d,1H), 7,36(d,1H), 7,20-7,17(m,1H), 5,75-5,67(m,1H), 5,16-5,13(m,1H), 5,06-5,01(m,1H), 4,05-3,97(m,4H), 2,74-2,67(m,1H), 2,37(s,3H), 0,90-0,84(m,4H)	D6-DMSO
49	2,28	2,24	7,78(d,1H), 7,51-7,46(m,2H), 5,76-5,69(m,1H), 5,18-5,15(m,1H), 5,08-5,04(m,1H), 4,22-4,16(m,1H), 4,07-3,99(m,3H), 2,74-2,70(m,1H), 2,38(s,3H), 0,90-0,88(m,4H)	D6-DMSO
50	3,58	3,47	7,91(d,1H), 7,73(d,1H), 7,50-7,41(m,1H), 4,15-3,96(m,4H), 2,83-2,78(m,1H), 2,43(s,3H), 2,12-2,05(m,1H), 1,03-0,92(m,10H)	D6-DMSO
51	2,82	2,83	7,53(s,1H), 7,26(d,1H), 7,19-7,17(m,1H), 4,32(q,2H), 3,95(q,2H), 3,09(s,3H), 2,36(s,3H), 1,36(q,3H)	D6-DMSO
52	3,34	3,29	7,51(s,1H), 7,38(d,1H), 7,24-7,21(m,1H), 4,01(q,2H), 3,33(d,2H), 3,02(s,3H), 2,38(s,3H), 0,90-0,80(m,1H), 0,41-0,32(m,4H)	D6-DMSO
53	3,33	3,23	7,88(d,1H), 7,78(d,1H), 7,48-7,46(m,1H), 4,20(q,2H), 3,03(s,3H), 2,70-2,66(m,1H), 0,92-0,88(m,4H)	D6-DMSO
54	2,63	2,58	8,15(d,1H), 8,06(d,1H), 7,82-7,80(m,1H), 4,24-4,20(m,2H), 3,08(s,3H), 2,71-2,69(m,1H), 0,93-0,89(m,4H)	D6-DMSO
55	2,09	0,60	10,98(s,1H), 7,72(d,1H), 7,39(d,1H), 3,95(q,2H), 2,97(s,3H), 2,41(s,3H)	D6-DMSO
56	4,34	4,05	7,50(d,2H), 7,25(d,2H), 7,22-7,19(m,2H), 3,86(q,4H), 3,07(s,3H),	D6-DMSO

Bsp.- Nr.	logP (HCOOH)	logP (neutral)	NMR Daten	Lösungsmittel
			2,28(s,6H)	
57	3,62	3,56	7,44(d,1H), 7,37(d,1H), 7,30-7,28(m,3H), 7,14-7,12(m,1H), 7,04-7,02(m,2H), 4,61(s,2H), 3,97(q,2H), 2,98(s,3H), 2,39(s,3H)	D6-DMSO
58	3,03	2,88	7,49(d,1H), 7,37(d,1H), 7,22-7,19(m,1H), 5,75-5,68(m,1H), 5,17-5,14(m,1H), 5,08-5,04(m,1H), 4,06-3,98(m,4H), 3,00(s,3H), 2,38(s,3H)	D6-DMSO
59	2,03	2,00	7,80(d,1H), 7,53-7,47(m,2H), 5,77-5,71(m,1H), 5,19-5,16(m,1H), 5,11-5,06(m,1H), 4,22-4,13(m,1H), 4,11-4,01(m,3H), 3,01(s,3H), 2,39(s,3H)	D6-DMSO
60	3,80	3,75	7,42-7,36(m,2H), 7,31-7,26(m,2H), 7,24-7,16(m,2H), 7,06-7,04(m,1H), 4,78(s,2H), 3,90(q,2H), 3,02(s,3H), 2,35(s,3H)	D6-DMSO
61	3,33	3,27	7,55(d,1H), 7,37(d,1H), 7,25-7,23(m,1H), 4,04(q,2H), 3,79-3,71(m,1H), 3,97(s,3H), 2,37(s,3H), 1,17(d,6H)	D6-DMSO
62	3,29	3,23	7,77(d,1H), 7,41(d,1H), 4,01(q,2H), 3,89-3,85(m,1H), 2,99(s,3H), 2,41(s,3H)	D6-DMSO
63	3,65	3,57	7,53(d,1H), 7,36(d,1H), 7,24-7,21(m,1H), 4,03(q,2H), 3,75-3,68(m,1H), 2,71-2,66(m,1H), 2,37(s,3H), 1,15(d,6H); 0,89-0,86(m,4H)	D6-DMSO
64	2,51	2,45	8,01(d,1H), 7,52(d,1H), 4,27-4,18(m,1H), 4,12-4,02(m,1H), 3,92-3,85(m,1H), 2,75-2,69(m,1H), 2,41(s,3H), 1,12(d,3H), 1,08(d,3H), 0,90-0,88(m,4H)	D6-DMSO
65	3,59	3,51	7,76(d,1H), 7,40(d,1H), 4,00(q,2H), 3,89-3,82(m,1H), 2,74-2,67(m,1H), 2,41(s,3H), 1,09(d,6H), 0,90-0,86(m,4H)	D6-DMSO
66	2,30	0,69	10,86(s,1H), 7,70(d,1H), 7,37(d,1H), 3,94(q,2H), 2,71-2,65(m,1H), 2,41(s,3H), 0,94-0,84(m,4H)	D6-DMSO
67	2,05	2,02	7,91(d,1H), 7,80(d,1H), 7,60-7,57(m,1H), 4,26-4,11(m,2H), 3,07(s,3H), 3,00(s,3H)	D6-DMSO
68	2,83	2,78	7,77(d,1H), 7,54(d,1H), 7,23-7,20(m,1H), 4,19(q,2H), 3,02(s,3H),	D6-DMSO

Bsp.- Nr.	logP (HCOOH)	logP (neutral)	NMR Daten	Lösungsmittel
			2,99(s,3H)	
69	2,01	1,98	8,14(d,1H), 7,91(d,1H), 4,29-4,16(m,2H), 3,01(s,3H), 3,00(s,3H)	D6-DMSO
70	1,64	1,59	7,97(t,1H), 7,88(d,1H), 4,38(q,2H), 3,01(s,3H) 3,00(s,3H)	D6-DMSO
71	2,67	2,62	7,87(t,1H), 7,69(t,1H), 4,02(q,2H), 2,92(s,3H), 2,73-2,68(m,1H), 0,91-0,88(m,4H)	D6-DMSO
72	2,24	2,18	8,12(d,1H), 7,90(d,1H), 4,29-4,14(m,2H), 2,97(s,3H), 2,72-2,67(m,1H), 0,91-0,88(m,4H)	D6-DMSO
73	3,86	3,72	7,80(d,1H), 7,41(d,1H), 4,00(q,2H), 3,64-3,58(m,1H), 2,75-2,70(m,1H), 2,42(s,3H), 1,59-1,52(m,1H), 1,43-1,36(m,1H), 1,07(d,3H), 0,91-0,89(m,4H), 0,74(t,3H)	D6-DMSO
74	1,93	1,91	7,92(d,1H), 7,55(d,1H), 4,26-4,13(m,2H), 3,54(q,2H), 2,99(s,3H), 2,42(s,3H), 1,19(t,3H)	D6-DMSO
75	2,73	2,68	8,03-8,00(m,1H), 7,52(d,1H), 4,29-4,22(m,1H), 4,06-4,02(m,1H), 3,70-3,55(m,1H), 2,75-2,72(m,1H), 2,42(s,3H), 1,69-1,60(m,1H), 1,55-1,45(m,1H), 1,40(s,3H), 1,11-1,06(m,2H), 0,90(d,3H), 0,80-0,75(m,2H)	D6-DMSO
76	4,09	3,94	7,96(s,1H), 7,90-7,78(m,4H), 7,49(d,1H), 4,02(q,2H), 3,06(s,3H), 2,45(s,3H)	D6-DMSO
77	3,09	3,05	8,09(d,1H), 7,97(s,1H), 7,89(d,1H), 7,85-7,78(m,2H), 7,59(d,1H), 4,29-4,23(m,1H), 4,15-4,09(m,1H), 3,10(s,3H), 2,44(s,3H)	D6-DMSO
78	3,40	3,29	8,20-8,16(m,1H), 7,85-7,81(m,2H), 7,39(d,1H), 3,93(q,2H), 3,11(s,3H), 2,34(s,3H)	D6-DMSO
79	4,86	4,67	7,54(d,2H), 7,28-7,22(m,4H), 5,94-5,87(m,1H), 5,26-5,20(m,2H), 4,19(d,2H), 3,898q,4H), 2,26(s,6H)	D6-DMSO
80	2,07	2,03	7,95(d,1H), 7,56(d,1H), 5,93-5,81(m,1H), 5,21-5,17(m,2H), 4,27-4,14(m,2H), 4,14-4,11(m,2H),	D6-DMSO

Bsp.- Nr.	logP (HCOOH)	logP (neutral)	NMR Daten	Lösungsmittel
			3,01(s,3H), 2,43(s,3H)	
81	3,05	3,01	7,73(d,1H), 7,44(d,1H), 5,90-5,82(m,1H), 5,21-5,15(m,2H), 4,13-4,11(m,2H) 4,03(q,2H) 2,97(s,3H) 2,43(s,3H)	D6-DMSO
82	2,67	2,61	7,87(t,2H), 7,55-7,50(m,2H), 7,38(d,2H), 4,14-4,04(m,2H), 3,92-3,75(m,2H), 3,08(d,3H), 2,33-2,30(m,6H)	D6-DMSO
83	2,92	2,88	7,72-7,70(m,1H), 7,43(d,1H), 4,06-3,98(m,2H), 3,53(q,2H), 2,95(s,3H), 2,43(s,3H)	D6-DMSO
84	3,46	3,38	7,88(d,1H), 7,53(d,1H), 7,48-7,46(m,1H), 7,39-7,33(m,1H), 7,29-7,23(m,2H), 4,13-4,07(m,1H), 3,91(q,2H), 3,77-3,70(m,1H), 3,07(s,3H), 2,30(s,3H), 2,28(s,3H)	D6-DMSO
85	2,43	0,86	10,97(s,1H), 7,72(d,1H), 7,38(d,1H), 3,96(q,2H), 3,50(q,2H), 2,41(s,3H), 1,17(t,3H)	D6-DMSO
86	3,75	3,67	7,77(d,1H), 7,41(d,1H), 4,07-3,97(m,3H), 2,99(s,3H), 2,41(s,3H), 1,75-1,69(m,2H), 1,67-1,60(m,2H), 1,56-1,48(m,2H), 1,46-1,40(m,2H)	D6-DMSO
87	3,71	3,69	7,87(d,1H), 7,57-7,44(m,6H), 4,05(q,2H), 3,49(q,2H), 2,44(s,3H), 1,08(t,3H)	D6-DMSO
88	2,71	2,66	8,10(d,1H), 7,59(d,1H), 7,55-7,51(m,4H), 7,48-7,44(m,1H), 4,31-4,09(m,2H), 3,57-3,51(m,2H), 2,44(s,3H), 1,09(t,3H)	D6-DMSO
89	1,96	1,91	7,91(d,1H), 7,55-7,48(m,2H), 4,22-4,15(m,1H), 4,09-4,03(m,1H), 3,53(q,2H), 3,05(s,3H), 2,33(s,3H), 1,18(t,3H)	D6-DMSO
90	3,81	3,71	7,58(d,1H), 7,33(d,1H), 7,28-7,24(m,3H), 7,05-7,01(m,2H), 4,56(s,2H), 3,92(q,2H), 2,77-2,72(m,1H), 2,39(s,3H), 0,94-0,85(m,4H)	D6-DMSO
91	3,35	3,28	7,70(d,1H), 7,43(d,1H), 4,26-4,19(m,1H), 4,03(q,2H), 2,93(s,3H),	D6-DMSO

Bsp.- Nr.	logP (HCOOH)	logP (neutral)	NMR Daten	Lösungsmittel
			2,42(s,3H), 1,38(d,6H)	
92	2,27	2,22	7,91(d,1H), 7,55(d,1H), 4,27-4,15(m,3H), 2,97(s,3H), 2,42(s,3H), 1,39(d,6H)	D6-DMSO
93	2,58	2,54	7,93(d,1H), 7,55(d,1H), 4,27-4,14(m,3H), 3,48-3,34(m,2H), 2,42(s,3H), 1,39(d,6H), 1,00(t,3H)	D6-DMSO
94	3,85	3,82	7,68(d,1H), 7,42(d,1H), 4,02(q,2H), 2,90(s,3H), 2,42(s,3H), 1,58(s,9H)	D6-DMSO
95	2,69	2,65	7,89(d,1H), 7,53(d,1H), 4,26-4,12(m,2H), 2,94(s,3H), 2,42(s,3H), 1,58(s,9H)	D6-DMSO
96	2,66	2,61	8,05-7,99(m,1H), 7,49(d,1H), 5,67-5,63(m,1H), 5,39-5,28(m,1H), 4,55-4,50(m,1H), 4,27-4,16(m,1H), 4,12-3,95(m,1H), 3,01(s,3H), 2,41(s,3H), 1,87-1,63(m,5H), 1,54-1,43(m,1H)	D6-DMSO
97	2,91	2,83	7,72(d,1H), 7,44(d,1H), 4,01(q,2H), 3,38(q,2H), 3,01(s,3H), 2,42(s,3H), 0,99(t,3H)	D6-DMSO
98	1,93	1,91	7,94(d,1H), 7,55(d,1H), 4,26-4,09(m,2H), 3,50-3,38(m,2H), 3,02(s,3H), 2,42(s,3H), 1,00(t,3H)	D6-DMSO
99	4,21	4,16	7,70(d,1H)m 7,42(d,1H), 4,03(q,2H), 3,34(q,2H), 2,42(s,3H), 1,58(s,9H), 0,97(t,3H)	D6-DMSO
100	3,32	3,29	7,52(d,1H), 7,38(d,1H), 7,25-7,22(m,1H), 4,05(q,2H), 3,52(q,2H), 3,46(q,2H), 2,37(s,3H), 1,17(t,3H), 0,96(t,3H)	D6-DMSO
101	3,22	1,73	7,70-7,68(m,1H), 7,51-7,48(m,1H), 6,25(tt,1H), 4,10-4,01(dt,2H), 3,90-3,82(q,2H), 2,48(s,3H)	D6-DMSO
102	3,24		7,64-7,62(m,1H), 7,48-7,46(m,1H), 3,88-3,81(q,2H), 2,73-2,68(m,1H), 2,47(s,3H), 0,95-0,88(m,4H)	D6-DMSO
103	2,32	0,87	8,04-8,03(m,1H), 7,61-7,58(m,1H), 6,24(tt,1H), 4,36-4,27(m,1H), 4,10-4,01(dt,2H), 3,92-3,83(m,1H), 2,43(s,3H)	D6-DMSO

Bsp.- Nr.	logP (HCOOH)	logP (neutral)	NMR Daten	Lösungsmittel
104	2,66		7.71 (d,1H), 7.03 (d,1H), 4.54-4.49 (m,2H), 4.08-4.03 (m,2H), 3.37-3.31 (m,2H), 2.46 (s,3H)	D6-DMSO
105	1,64		8.11 (d,1H), 7.19 (d,1H), 4.58-4.49 (m,2H), 4.18-4.10 (m,1H), 4.04-3.96 (m,1H), 3.59-3.33 (m,2H), 2.41 (s,3H)	CDCl ₃
106	2,98		7.74 (d,1H), 7.31 (d,1H), 4.87-4.80 (m,1H), 4.10-4.04 (m,1H), 3.98-3.88 (m,2H), 3.64-3.59 (m,1H), 2.39 (s,3H), 1.43 (d,3H)	D6-DMSO
107	1,79		7.98 (dd, 1H), 7.26-7.07 (m,1H), 4.68-4.62 (m,1H), 4.51-4.42 (m,1H), 4.11-4.02 (m,1H), 3.53-3.39 (m,2H), 2.41 (s,3H), 1.26-1.23 (m,3H).	CDCl ₃
108	2,92		7.56 (d,1H), 7.06 (d,1H), 4.65-4.60 (m,1H), 4.45-4.38 (m,1H), 4.06-4.01 (m,1H), 3.35 (q, 2H), 2.48 (s,3H), 1.26-1.22 (m,3H)	CDCl ₃
109	1,93	1,89	8.11 (d,1H), 7.08 (d,1H), 4.90-4.81 (m,1H), 4.20-4.01 (m,1H), 3.76-3.37 (m,3H), 2.40 (s,3H), 1.57-1.54 (m,3H)	CDCl ₃
110	2,38		7.99 (d,1H), 7.24 (d,1H), 3.52-3.41 (m,2H), 2.45 (s,3H), 1.72 (s,6H)	CDCl ₃
111	3,35		7.50 (d,1H), 7.16 (d,1H), 3.39-3.32 (m,2H), 2.53 (s,3H), 1.71 (s,6H)	CDCl ₃
112	3,65	3,65	7,14(s,1H), 7,00(s,1H), 3,92(s,2H), 3,82(q,2H), 2,71(septet,1H), 2,33(s,3H), 2,06(s,3H), 1,00-0,90(m,4H)	D6-DMSO
113	4,84	4,73	7,63(d,1H), 7,37(d,1H), 4,30-4,15(m,2H), 3,89-3,86(m,2H), 2,90(d,2H), 2,43(s,3H), 0,78(s,9H)	D6-DMSO
114	3,66	3,63	7,91-7,88(m,1H), 7,49(d,1H), 4,33-3,66(m,4H), 2,97-2,87(m,2H), 2,43(d,3H), 0,81(d,9H)	D6-DMSO
115	4,33	4,31	7,63(d,1H), 7,38(d,1H), 4,50-4,10(m,2H), 3,89(q,2H), 3,02-3,00(m,2H), 2,43(s,3H), 1,77-1,70(m,1H), 0,82-0,80(m,6H)	D6-DMSO
116	2,40	2,39	7,72(d,1H), 7,42(d,1H), 3,93(q,2H), 3,19(s,6H), 2,44(s,3H)	D6-DMSO
117	1,54	1,50	7,99(d,1H), 7,54(d,1H), 4,29-4,25(m,1H), 3,96-3,89(m,1H), 3,19(s,6H), 2,50(s,3H)	D6-DMSO
118	3,03		7,72(d,1H), 7,40(d,1H), 3,96(q,2H), 3,61(q,4H), 2,42(s,3H), 1,10(t,6H)	D6-DMSO

Bsp.- Nr.	logP (HCOOH)	logP (neutral)	NMR Daten	Lösungsmittel
119	2,07		7,99(d,1H), 7,55(d,1H), 4,38-4,18(m,1H), 4,15-3,92(m,1H), 3,80-3,58(m,4H), 2,44(s,3H), 1,13(t,6H)	D6-DMSO
120	2,46		8,02(d,1H), 7,56(d,1H), 5,92-5,79(m,2H), 5,41-5,28(m,4H), 4,36-4,20(m,5H), 4,09-3,96(m,1H), 2,44(s,3H)	D6-DMSO
121	2,81		7,72(d,1H), 7,44(d,1H), 4,50(d,2H), 3,95(q,2H), 3,20(s,3H), 2,45-2,40(m,4H)	D6-DMSO
122	2,71		7,71(d,1H), 7,40(d,1H), 3,93(q,2H), 3,66(q,2H), 3,16(s,3H), 2,42(s,3H), 1,10(t,3H)	D6-DMSO
123	1,96		8,02(d,1H), 7,18(d,1H), 4,41(d,2H), 3,54-3,38(m,2H), 3,33(s,3H), 2,44(s,3H), 2,40(t,1H)	CDCl ₃
124	2,00		8,00(d,1H), 7,55(d,1H), 5,92-5,80(m,1H), 5,41-5,28(m,2H), 4,33-4,20(m,3H), 4,04-3,91(m,1H), 3,17(s,3H), 2,43(s,3H)	D6-DMSO
125	2,91		7,74(d,1H), 7,43(d,1H), 5,90-5,79(m,1H), 5,41-5,28(m,2H), 4,28(d,2H), 3,94(q,2H), 3,16(s,3H), 2,44(s,3H)	D6-DMSO
126	3,15		7,72(d,1H), 7,43(d,1H), 3,95(q,2H), 3,54(d,2H), 3,21(s,3H), 2,44(s,3H), 1,08-1,05(m,1H), 0,54-0,47(m,2H), 0,36-0,30(m,2H)	D6-DMSO
127	3,19	3,17	7,71(d,1H), 7,43(d,1H), 4,01(q,2H), 3,35(q,2H), 2,75-2,70(m,1H), 2,42(s,3H), 0,97(t,3H), 0,91-0,87(m,4H)	D6-DMSO
128	3,49	3,45	7,72(d,1H), 7,43(d,1H), 4,01(q,2H), 3,30(t,2H), 2,76-2,70(m,1H), 2,42(s,3H), 1,42-1,34(m,2H), 0,92-0,87(m,4H), 0,72(t,3H)	D6-DMSO
129	3,48	3,43	7,79(d,1H), 7,42(d,1H), 4,35(q,2H), 4,00(q,2H), 2,81-2,73(m,1H), 2,42(s,3H), 0,98-0,88(m,4H)	D6-DMSO
130	3,31	3,28	7,67(d,1H), 7,40(d,1H), 5,74-5,64(m,1H), 5,13-5,10(m,1H), 5,07-5,02(m,1H), 4,02-3,94(m,4H), 2,76-2,70(m,1H), 2,42(s,3H), 0,92-0,89(m,4H)	D6-DMSO
131	3,00	2,97	7,49(d,1H), 7,38(d,1H), 7,23-7,21(m,1H), 4,04(q,2H), 3,51(q,2H), 3,00(s,3H), 2,37(s,3H), 1,17(t,3H)	D6-DMSO
132	3,42	3,38	7,48(d,1H), 7,38(d,1H), 7,22-7,19(m,1H), 4,25-4,18(m,1H), 4,04(q,2H), 2,98(s,3H), 2,37(s,3H),	D6-DMSO

Bsp.- Nr.	logP (HCOOH)	logP (neutral)	NMR Daten	Lösungsmittel
			1,37(d,6H)	
133	3,77	3,73	7,52(d,1H), 7,38(d,1H), 7,24-7,21(m,1H), 4,26-4,19(m,1H), 4,05(q,2H), 3,44(q,2H), 2,37(s,3H), 1,38(d,6H), 0,95(t,3H)	D6-DMSO
134	4,32	4,27	7,49(d,1H), 7,37(d,1H), 7,22-7,20(m,1H), 4,05(q,2H), 3,40(q,2H), 2,37(s,3H), 1,58(s,9H), 0,94(t,3H)	D6-DMSO
135	4,77	4,70	7,52(d,1H), 7,35(d,1H), 7,23-7,21(m,1H), 4,04(q,2H), 3,74(m,1H), 2,37(s,3H), 1,56(s,9H), 1,14(d,6H)	D6-DMSO
136	4,17	4,13	7,71(d,1H), 7,43(d,1H), 4,03(q,2H), 3,87-3,78(m,1H), 2,93(s,3H), 2,42(s,3H), 2,03-1,99(m,2H), 1,81-1,71(m,4H), 1,64-1,61(m,1H), 1,33-1,25(m,2H), 1,13(m,1H)	D6-DMSO
137	3,02	2,96	7,90(d,1H), 7,54(d,1H), 4,22-4,18(m,2H), 3,40-3,37(m,2H), 2,42(s,3H), 1,58(s,9H), 0,98(t,3H)	D6-DMSO
138	2,20	2,19	7,82(d,1H), 7,58-7,55(m,1H), 7,49(d,1H), 4,22-4,03(m,2H), 3,59-3,45(m,4H), 2,39(s,3H), 1,18(t,3H), 0,98(t,3H)	D6-DMSO
139	2,71	2,70	7,77(d,1H), 7,50-7,48(m,2H), 4,18-4,06(m,2H), 3,00(s,3H), 2,38(s,3H), 1,58(s,9H)	D6-DMSO
140	2,56	2,54	7,87(d,1H), 7,57-7,55(m,1H), 7,48(d,1H), 4,23-4,13(m,1H), 4,07-3,98(m,1H), 3,80-3,74(m,1H), 3,51(q,2H), 2,38(s,3H), 1,23(d,3H), 1,21-1,15(m,6H)	D6-DMSO
141	2,27	2,24	7,78(d,1H), 7,53-7,47(m,2H), 4,26-4,15(m,2H), 4,09-4,02(m,1H), 3,03(s,3H), 2,38(s,3H), 1,38(d,6H)	D6-DMSO
142	4,19	4,13	7,74(d,1H), 7,35(d,1H), 4,12-3,86(breit,2H), 3,52-3,41(breit,2H), 2,39(s,3H), 1,23(s,9H), 1,14(t,3H)	D6-DMSO
143		4,56	7,73(d,1H), 7,35(d,1H), 4,22-4,15(m,1H), 4,11-3,85(breit,2H), 2,39(s,3H), 1,35(d,6H), 1,22(s,9H)	D6-DMSO
144	4,08	4,07	7,73(d,1H), 7,34(d,1H), 4,10-3,85(breit,2H), 2,70-2,64(m,1H), 2,39(s,3H), 1,20(s,9H), 0,91-0,82(m,4H)	D6-DMSO
145	3,54	3,49	7,81(d,1H), 7,43(d,1H), 4,41(q,2H), 4,02(q,2H), 3,58(q,2H), 2,43(s,3H), 1,20(t,3H)	D6-DMSO

Bsp.- Nr.	logP (HCOOH)	logP (neutral)	NMR Daten	Lösungsmittel
146	3,85	3,90	7,80(d,1H), 7,43(d,1H), 4,39(q,2H), 4,30-4,23(m,1H), 4,02(q,2H), 2,43(s,3H), 1,40(d,6H)	D6-DMSO
147	4,34	4,28	7,78(d,1H), 7,42(d,1H), 4,35(q,2H), 4,02(q,2H), 2,42(s,3H), 1,59(s,9H)	D6-DMSO
148	3,82	3,78	7,78(d,1H), 7,44(d,1H), 4,04(q,2H), 3,54(q,2H), 3,24(d,2H), 2,42(s,3H), 1,75-1,65(m,1H), 1,18(t,3H), 0,73(d,6H)	D6-DMSO
149	4,27	4,21	7,76(d,1H), 7,43(d,1H), 4,30- 4,20(m,1H), 4,04(q,2H), 3,21(d,2H), 2,42(s,3H), 1,76-1,65(m,1H), 1,38(d,6H), 0,73(d,6H)	D6-DMSO
151	1,98	1,88	7,90(d,1H), 7,53(d,1H), 4,25- 4,10(m,2H), 2,95(s,3H), 2,73- 2,67(m,1H), 2,42(s,3H), 0,93- 0,88(m,4H)	D6-DMSO
152	3,40	3,35	8,10-7,85(breit,1H), 7,47(d,1H), 4,30- 4,10(m,3H), 2,44(s,3H), 1,35(d,6H), 1,30-1,15(breit,9H)	D6-DMSO
153	2,95	3,04	8,03(d,1H), 7,55(d,1H), 4,44(q,2H), 4,31-4,10(m,3H), 2,44(s,3H), 1,40(d,6H)	D6-DMSO
154	3,62	3,64	7,82(d,1H), 7,44(d,1H), 5,94- 5,82(m,1H), 5,24-5,15(m,2H), 4,44(q,2H), 4,18-4,15(m,2H), 4,03(q,2H), 2,43(s,3H)	D6-DMSO
155	3,93	3,90	7,94(d,1H), 7,60-7,44(m,6H), 4,50(q,2H), 4,04(q,2H), 2,45(s,3H)	D6-DMSO
156	3,44	3,51	7,83(d,1H), 7,45(d,1H), 6,46- 6,14(m,1H), 4,46(q,2H), 4,07- 3,96(m,4H), 2,43(s,3H)	D6-DMSO
157	3,31	1,33	11,55(s,1H), 7,84(d,1H), 7,68(s,1H), 7,59-7,53(m,2H), 7,52-7,50(m,1H), 7,42(d,1H), 3,96(q,2H), 2,43(s,3H)	D6-DMSO
158	2,69	1,10		
159	2,96	2,95	7,70(d,1H), 7,49(d,1H), 4,02(q,2H), 3,56(t,2H), 3,36(t,2H), 3,21(s,3H), 2,95(s,3H), 2,43(s,3H), 1,86-1,79(m,2H)	D6-DMSO
160	3,28	3,22	7,72(d,1H), 7,44(d,1H), 4,03(q,2H), 3,46(t,2H), 2,95(s,3H), 2,43(s,3H), 1,67- 1,58(m,2H), 0,88(t,3H)	D6-DMSO
161	3,39	3,34	7,73(d,1H), 7,44(d,1H), 4,03(q,2H), 3,38(d,2H), 2,97(s,3H), 2,43(s,3H), 1,16-1,08(m,1H), 0,52-0,46(m,2H), 0,35-0,29(m,2H)	D6-DMSO

Bsp.- Nr.	logP (HCOOH)	logP (neutral)	NMR Daten	Lösungsmittel
162	3,42	3,27	7,83(d,1H), 7,56-7,44(m,6H), 4,04(q,2H), 3,05(s,3H), 2,45(s,3H)	D6-DMSO
163	2,44	2,38	8,07(d,1H), 7,58(d,1H), 7,55- 7,51(m,4H), 7,48-7,41(m,1H), 4,31- 4,10(m,2H), 3,09(s,3H), 2,44(s,3H)	D6-DMSO
164	2,58	2,54	8,03(d,1H), 7,53(d,1H), 4,40(q,2H), 4,24-4,18(m,1H), 4,15-4,04(m,1H), 2,80-2,74(m,1H), 2,43(s,3H), 0,94- 0,92(m,4H)	D6-DMSO
165	2,32	2,30	7,92(d,1H), 7,51(d,1H), 5,75- 5,67(m,1H), 5,16-5,14(m,1H), 5,09- 5,05(m,1H), 4,25-4,07(m,2H), 4,00(d,2H), 2,77-2,71(m,1H), 2,41(s,3H), 0,91-0,89(m,4H)	D6-DMSO
166	2,72	2,89	8,05(d,1H), 7,56(d,1H), 5,94- 5,84(m,1H), 5,24-5,17(m,2H), 4,48(q,2H), 4,25-4,10(m,4H), 2,44(s,3H)	D6-DMSO
167	3,05	3,01	8,20(d,1H), 7,60-7,47(m,6H), 4,55(q,2H), 4,28-4,02(m,2H), 2,45(s,3H)	D6-DMSO
168	2,60	2,58	8,06(d,1H), 7,57(d,1H), 6,45- 6,16(m,1H), 4,51-4,46(m,2H), 4,26- 3,96(m,4H), 2,44(s,3H)	D6-DMSO
169	2,30	2,33	7,93(d,1H), 7,56(d,1H), 4,28- 4,11(m,2H), 3,38(d,2H), 3,01(s,3H), 2,43(s,3H), 1,15-1,05(m,1H), 0,51- 0,45(m,2H), 0,35-0,28(m,2H)	D6-DMSO
170	1,97	1,98	7,92(d,1H), 7,55(d,1H), 4,23- 4,15(m,2H), 3,56(t,2H), 3,36(t,2H), 3,21(s,3H), 2,99(s,3H), 2,42(s,3H), 1,87- 1,80(m,2H)	D6-DMSO
171	2,18	2,15	7,93(d,1H), 7,54(d,1H), 4,25- 4,09(m,2H), 3,43-3,37(m,2H), 2,76- 2,70(m,1H), 2,42(s,3H), 0,98(t,3H), 0,91-0,87(m,4H)	D6-DMSO
172	2,46	2,42	7,93(d,1H), 7,54(d,1H), 4,27- 4,08(m,2H), 3,40-3,35(m,2H), 2,76- 2,71(m,1H), 2,42(s,3H), 1,45- 1,36(m,2H), 0,91-0,88(m,4H), 0,75(t,3H)	D6-DMSO
173	3,64	3,58	7,74(d,1H), 7,36-7,30(m,5H), 7,27- 7,23(m,1H), 3,85(q,2H), 2,30(s,3H), 1,43(s,6H)	D6-DMSO
174	2,84	2,79	7,76(d,1H), 7,45(d,1H), 4,04(q,2H), 2,93(s,3H), 2,43(s,3H), 1,30(s,6H)	D6-DMSO

Bsp.- Nr.	logP (HCOOH)	logP (neutral)	NMR Daten	Lösungsmittel
175	3,41	3,40	7,64(d,1H), 7,46(d,1H), 4,04(q,2H), 2,96(s,3H), 2,38(s,3H), 1,79-1,66(m,4H), 0,83(t,6H)	D6-DMSO
176	2,37	2,31	7,87(d,1H), 7,59(d,1H), 4,27-4,18(m,2H), 3,00(s,3H), 2,44(s,3H), 1,80-1,70(m,4H), 0,84(q,6H)	D6-DMSO
177	1,89	1,85	7,98(d,1H), 7,57(d,1H), 4,30-4,10(m,2H), 2,98(s,3H), 2,44(s,3H), 1,32(s,6H)	D6-DMSO
178	3,80	3,76	7,61(d,1H), 7,31-7,23(m,4H), 6,97-6,89(m,2H), 4,65(breit,2H), 3,96(q,2H), 2,39(s,3H), 1,30(s,6H)	D6-DMSO
179	3,00	2,96	7,71(d,1H), 7,43(d,1H), 4,01(q,2H), 2,89(s,3H), 2,43(s,3H), 2,46-2,33(m,4H), 2,16-2,09(m,2H)	D6-DMSO
180	1,99	1,97	7,92(d,1H), 7,54(d,1H), 4,30-4,08(m,2H), 2,93(s,3H), 2,48-2,31(m,7H), 2,19-2,05(m,2H)	D6-DMSO
181	3,44	3,39	7,85(d,1H), 7,50(d,1H), 4,03(q,2H), 3,31(s,3H), 2,92-2,87(m,1H), 2,44(s,3H), 1,04-0,97(m,4H)	D6-DMSO
182	3,83	3,76	7,96(d,1H), 7,55(d,1H), 4,11-3,95(m,2H), 3,39(s,3H), 3,00-2,91(m,1H), 2,46(s,3H), 1,25-1,10(m,4H)	D6-DMSO
183	2,31		7,98-7,96(m,1H), 7,58-7,56(m,1H), 4,35-4,26(m,1H), 3,90-3,81(m,1H), 2,73-2,67(m,1H), 2,42(s,3H), 0,98-0,88(m,4H)	D6-DMSO
184	2,44		7,91-7,90(m,1H), 7,42(s,1H), 6,22(tt,1H), 4,30-4,22(m,1H), 4,08-3,99(m,2H), 3,83-3,73(m,1H), 2,38(s,3H), 2,25(s,3H)	D6-DMSO
185	4,32	4,27	7,67(d,1H), 7,47(d,1H), 4,00-3,90(m,1H), 3,84(q,2H), 2,47(s,3H), 2,00-1,89(m,2H), 1,86-1,75(m,4H), 1,67-1,58(m,1H), 1,39-1,25(m,2H), 1,20-1,09(m,1H)	D6-DMSO
186	3,36	3,33	8,03(d,1H), 7,57(d,1H), 4,35-4,26(m,1H), 3,99-3,83(m,2H), 2,43(s,3H), 2,00-1,90(m,2H), 1,86-1,75(m,3H), 1,69-1,60(m,1H), 1,39-1,22(m,2H), 1,22-1,09(m,2H)	D6-DMSO
187	4,21		7,54(s,1H), 7,32(s,1H), 4,84-4,69(m,2H), 3,83-3,76(q,2H), 2,41(s,3H), 2,13(s,3H)	D6-DMSO
188	3,18		7,94(s,1H), 7,41(s,1H), 4,84-4,68(m,2H), 4,31-4,23(m,1H), 3,81-3,68(m,1H), 2,39(s,3H), 2,22(s,3H)	D6-DMSO

Bsp.- Nr.	logP (HCOOH)	logP (neutral)	NMR Daten	Lösungsmittel
189	3,95		7,70(d,1H), 7,49(d,1H), 4,87-4,71(m,2H), 3,84(q,2H), 2,49(s,3H)	D6-DMSO
190	3,03		8,08(d,1H), 7,59(d,1H), 4,87-4,69(m,2H), 4,38-3,80(m,2H), 2,44(s,3H)	D6-DMSO
191	4,62	4,54	7,70(d,1H), 7,47(d,1H), 3,83(q,2H), 3,75-3,66(m,2H), 2,48(s,3H), 2,18-2,11(m,1H), 0,96-0,91(m,6H)	D6-DMSO
192	4,89	4,80	7,69(d,1H), 7,47(d,1H), 3,87-3,77(m,4H), 2,48(s,3H), 0,99(s,9H)	D6-DMSO
193	4,50	4,42	7,64(d,1H), 7,44(d,1H), 3,82(q,2H), 2,47(s,3H), 1,79(s,9H)	D6-DMSO
194	3,56	3,53	8,09-8,06(m,1H), 7,57(d,1H), 4,38-3,64(m,4H), 2,44(s,3H), 2,17-2,12(m,1H), 0,95(d,6H)	D6-DMSO
195	3,85	3,79	8,08-8,05(m,1H), 7,57(d,1H), 4,36-4,30(m,1H), 3,89-3,71(m,3H), 2,44(s,3H), 1,00(d,9H)	D6-DMSO
196	3,45	3,41	8,00(d,1H), 7,54(d,1H), 4,40-3,45(m,2H), 2,43(d,3H), 1,79(d,9H)	D6-DMSO
197	1,97	1,89	7,90(d,1H), 7,53(d,1H), 4,25-4,10(m,2H), 2,95(s,3H), 2,73-2,67(m,1H), 2,42(s,3H), 0,93-0,88(m,4H)	D6-DMSO
198	2,79	2,75	7,67-7,65(m,1H), 7,25-7,21(m,1H), 3,91-3,83(q,2H), 3,73(t,2H), 3,44(t,2H), 2,75(s,3H), 2,37(s,3H)	D6-DMSO
199	1,76	1,74	7,99-7,97(m,1H), 7,35-7,32(m,1H), 4,18-4,09(m,1H), 3,98-3,92(m,1H), 3,83-3,81(d,1H), 3,76-3,74(d,1H), 3,48(t,2H), 2,77(s,3H), 2,35(s,3H)	D6-DMSO
200	2,42	2,33	7,61(d,1H), 7,39(d,1H), 4,20(breit,2H), 3,90(q,2H), 2,93(s,3H), 2,43(s,3H)	D6-DMSO
201	2,02	1,99	7,94(d,1H), 7,51(d,1H), 5,92-5,82(m,1H), 5,37-5,31(m,1H), 5,28-5,21(m,1H), 4,35-4,22(m,1H), 4,17(s,2H), 4,00(d,2H), 3,98-3,85(m,1H), 2,42(s,3H)	D6-DMSO
202	3,39	3,35	7,62(d,1H), 7,39(d,1H), 4,21(breit,2H), 3,90(q,2H), 3,35(t,2H), 2,44(s,3H), 1,59-1,50(m,2H), 1,38-1,28(m,2H), 0,91(t,3H)	D6-DMSO

Bsp.- Nr.	logP (HCOOH)	logP (neutral)	NMR Daten	Lösungsmittel
203	2,47	2,43	8,91(d,1H), 7,50(d,1H), 4,38-4,20(m,1H), 4,22(s,2H), 3,98-3,88(m,1H), 3,36(t,2H), 2,42(s,3H), 1,60-1,50(m,2H), 1,39-1,30(m,2H), 0,92(t,3H)	D6-DMSO
204	3,49	3,48	7,69(d,1H), 7,42-7,31(m,6H), 4,48(s,2H), 4,14(breit,2H), 3,91(q,2H), 2,45(s,3H)	D6-DMSO
205	2,60	2,52	7,99(d,1H), 7,52(d,1H), 7,42-7,31(m,5H), 4,59(s,2H), 4,38-4,21(m,1H), 4,15(s,2H), 3,99-3,85(m,1H), 2,43(s,3H)	D6-DMSO
206	2,08		7,99(dd,1H), 7,21(d,1H), 5,15-5,08(m,1H), 3,52-3,41(m,2H), 2,45(s,3H), 1,76-1,73(m,3H)	CDCl ₃
207	1,57	-0,23	10,89(s,1H), 7,99(d,1H), 7,48(d,1H), 4,25-4,16(m,1H), 4,06-3,97(m,1H), 2,73-2,66(m,1H), 2,40(s,3H), 0,91-0,87(m,4H)	D6-DMSO
208	1,68		8,18(d,1H), 7,11(d,1H), 4,44(d,1H), 4,27(d,1H), 3,54-3,38(m,2H), 3,14(s,3H), 2,42(s,3H)	CDCl ₃
209	1,92		8,18(d,1H), 7,10(d,1H), 4,38(d,1H), 4,18(d,1H), 3,55-3,39(m,2H), 2,73-2,67(m,1H), 2,42(s,3H), 1,05-1,04(m,4H)	CDCl ₃
210	2,91		7,76(d,1H), 7,05(d,1H), 4,26(s,2H), 3,35(q,2H), 2,72-2,66(m,1H), 2,48(s,3H), 1,06-1,01(m,4H)	CDCl ₃
211	2,66		7,76(d,1H), 7,06(d,1H), 4,44(s,2H), 3,34(q,2H), 3,13(s,3H), 2,48(s,3H)	CDCl ₃
212	2,92		7,60(d,1H), 7,08(d,1H), 4,51(q,1H), 3,34(q,2H), 3,12(s,3H), 2,50(s,3H), 1,37(d,3H)	CDCl ₃
213	1,91		8,12-7,97(m,1H), 7,16-7,10(m,1H), 4,62-4,49(m,1H), 3,60-3,39(m,2H), 3,13(s,3H), 2,42(s,3H), 1,40-1,37(m,3H) -Isomerengemisch	CDCl ₃
214	3,12		7,61(d,1H), 7,07(d,1H), 4,42(q,1H), 3,32(q,2H), 2,72-2,70(m,1H), 2,49(s,3H), 1,34(d,3H), 1,06-0,97(m,4H)	CDCl ₃
215	2,15		8,13-7,95(m,1H), 7,15-7,09(m,1H), 4,55-4,40(m,1H), 3,57-3,40(m,2H), 2,72-2,69(m,1H), 2,42(s,3H), 1,37-1,26(m,3H), 1,05-1,01(m,4H)	CDCl ₃
216	2,05		7,86(d,1H), 7,17(d,1H), 3,45(q,2H), 3,14(s,3H), 2,44(s,3H), 1,47(s,3H), 1,41(s,3H)	CDCl ₃

Bsp.- Nr.	logP (HCOOH)	logP (neutral)	NMR Daten	Lösungsmittel
217	3,11		7,41(d,1H), 7,14(d,1H), 3,32(q,2H), 3,12(s,3H), 1,41(s,3H), 1,40(s,3H)	CDCl ₃

Die Bestimmung der Drehwerte erfolgte an einem Perkin Elmer 341, Seriennummer 9123, bei einer Wellenlänge von 589 nm und einer Temperatur von 20 °C, nach der nachfolgender Formel:

$$(\text{spezifischer Drehwert } \alpha)_D^{\circ C} = \frac{\text{Drehwinkel } \alpha * \text{Lösungsvolumen (ml)}}{\text{Küvettenlänge (dm)} * \text{Einwaage (g)}}$$

- 5 Die unten stehenden spezifischen Drehwerte sind als Durchschnitt aus 5 unterschiedlichen Messungen zu verstehen:

151	88,7 in CHCl ₃ (c=0,009)
197	-89,1 in CHCl ₃ (c=0,009)

Anwendungsbeispiele**Amblyomma hebraeum –Test (AMBYHE)**

Lösungsmittel: Dimethylsulfoxid

Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 10 mg Wirkstoff mit 0,5 ml

5 Dimethylsulfoxid und verdünnt das Konzentrat mit Wasser auf die gewünschte Konzentration.

Zeckennymphen (*Amblyomma hebraeum*) werden in perforierte Plastikbecher gesetzt und in der gewünschten Konzentration eine Minute getaucht. Die Zecken werden auf Filterpapier in eine Petrischale überführt und in einem Klimaschrank gelagert.

Nach 42 Tagen wird die Abtötung in % bestimmt. Dabei bedeutet 100 %, dass alle Zecken abgetötet wurden; 0 % bedeutet, dass keine der Zecken abgetötet wurde.

10

Bei diesem Test zeigen z. B. die folgenden Verbindungen der Herstellungsbeispiele eine Wirkung von 100% bei einer Aufwandmenge von 100ppm: 91

Boophilus microplus – Diptest (BOOPMI Dip)

Testtiere: Rinderzecken (*Boophilus microplus*) Stamm Parkhurst,SP-resistent

15 Lösungsmittel: Dimethylsulfoxid

10 mg Wirkstoff werden in 0,5 ml Dimethylsulfoxid gelöst. Zwecks Herstellung einer geeigneten Formulierung verdünnt man die Wirkstofflösung mit Wasser auf die jeweils gewünschte Konzentration.

Diese Wirkstoffzubereitung wird in Röhrchen pipettiert. 8-10 gesogene, adulte, weibliche Rinderzecken (*Boophilus microplus*) werden in ein weiteres Röhrchen mit Löchern überführt. Das Röhrchen wird in die Wirkstoffzubereitung getaucht wobei alle Zecken vollständig benetzt werden. Nach Ablauf der Flüssigkeit werden die Zecken auf Filterscheiben in Kunststoffschalen überführt und in einem klimatisierten Raum aufbewahrt.

20

Die Wirkungskontrolle erfolgt nach 7 Tagen auf Ablage fertiler Eier. Eier, deren Fertilität nicht äußerlich sichtbar ist, werden bis zum Larvenschlupf nach etwa 42 Tagen im Klimaschrank aufbewahrt. Eine

25

Wirkung von 100 % bedeutet, dass keine der Zecken fertile Eier gelegt hat, 0% bedeutet, dass alle Eier fertil sind.

- 251 -

Bei diesem Test zeigen z.B. die folgenden Verbindungen der Herstellungsbeispiele eine Wirkung von 100% bei einer Aufwandmenge von 100ppm: 91

Bei diesem Test zeigen z.B. die folgenden Verbindungen der Herstellungsbeispiele eine Wirkung von 90% bei einer Aufwandmenge von 100ppm: 141

5 **Boophilus microplus –Injektionstest (BOOPMI Inj)**

Lösungsmittel: Dimethylsulfoxid

Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 10 mg Wirkstoff mit 0,5 ml Lösungsmittel und verdünnt das Konzentrat mit Lösungsmittel auf die gewünschte Konzentration.

10 1µl der Wirkstofflösung wird in das Abdomen von 5 vollgesogenen, adulten, weiblichen Rinderzecken (*Boophilus microplus*) injiziert. Die Tiere werden in Schalen überführt und in einem klimatisierten Raum aufbewahrt.

Die Wirkungskontrolle erfolgt nach 7 Tagen auf Ablage fertiler Eier. Eier, deren Fertilität nicht äußerlich sichtbar ist, werden bis zum Larvenschlupf nach etwa 42 Tagen im Klimaschrank aufbewahrt. Eine Wirkung von 100 % bedeutet, dass keine der Zecken fertile Eier gelegt hat, 0% bedeutet, dass alle Eier fertil sind.

Bei diesem Test zeigen z.B. die folgenden Verbindungen der Herstellungsbeispiele eine Wirkung von 100% bei einer Aufwandmenge von 20µg/Tier: 13, 26, 34, 35, 37, 47, 54, 91, 104, 106, 115, 141, 208, 209, 210, 211

20 Bei diesem Test zeigen z.B. die folgenden Verbindungen der Herstellungsbeispiele eine Wirkung von 80% bei einer Aufwandmenge von 20µg/Tier: 16, 48

Meloidogyne incognita- Test (MELGIN)

Lösungsmittel: 125,0 Gewichtsteile Aceton

25 Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit der angegebenen Menge Lösungsmittel und verdünnt das Konzentrat mit Wasser auf die gewünschte Konzentration.

- 252 -

Gefäße werden mit Sand, Wirkstofflösung, einer Ei-Larven-Suspension des südlichen Wurzelgallenälchens (*Meloidogyne incognita*) und Salatsamen gefüllt. Die Salatsamen keimen und die Pflänzchen entwickeln sich. An den Wurzeln entwickeln sich die Gallen.

5 Nach 14 Tagen wird die nematizide Wirkung anhand der Gallenbildung in % bestimmt. Dabei bedeutet 100 %, dass keine Gallen gefunden wurden; 0 % bedeutet, dass die Zahl der Gallen an den behandelten Pflanzen der unbehandelten Kontrolle entspricht.

Bei diesem Test zeigen z. B. die folgenden Verbindungen der Herstellungsbeispiele Wirkung von 100% bei einer Aufwandmenge von 20ppm: 35, 36, 37, 38, 52, 83

10 Bei diesem Test zeigen z. B. die folgenden Verbindungen der Herstellungsbeispiele Wirkung von 90% bei einer Aufwandmenge von 20ppm: 13, 20, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 41, 42, 44, 45, 54, 69, 70, 74, 80, 81, 127, 177, 179, 181, 182, 208, 209, 210

Myzus persicae - Sprühtest (MYZUPE)

Lösungsmittel: 78 Gewichtsteile Aceton
1,5 Gewichtsteile Dimethylformamid

15 Emulgator: Alkylarylpolyglykoether

Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung löst man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit den angegebenen Gewichtsteilen Lösungsmittel und füllt mit Wasser, welches eine Emulgatorkonzentration von 1000 ppm enthält, bis zum Erreichen der gewünschten Konzentration auf. Zur Herstellung weiterer Testkonzentrationen wird mit emulgatorhaltigem Wasser verdünnt.

20 Chinakohlblattscheiben (*Brassica pekinensis*), die von allen Stadien der Grünen Pfirsichblattlaus (*Myzus persicae*) befallen sind, werden mit einer Wirkstoffzubereitung der gewünschten Konzentration gespritzt.

Nach 6 Tagen wird die Wirkung in % bestimmt. Dabei bedeutet 100 %, dass alle Blattläuse abgetötet wurden; 0 % bedeutet, dass keine Blattläuse abgetötet wurden.

25 Bei diesem Test zeigen z. B. die folgenden Verbindungen der Herstellungsbeispiele Wirkung von 100% bei einer Aufwandmenge von 500g/ha: 141, 206

Phaedon cochleariae - Sprühtest (PHAECO)

Lösungsmittel: 78,0 Gewichtsteile Aceton
1,5 Gewichtsteile Dimethylformamid
Emulgator: Alkylarylpolyglykolether

- 5 Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung löst man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit den angegebenen Gewichtsteilen Lösungsmittel und füllt mit Wasser, welches eine Emulgatorkonzentration von 1000 ppm enthält, bis zum Erreichen der gewünschten Konzentration auf. Zur Herstellung weiterer Testkonzentrationen wird mit emulgatorhaltigem Wasser verdünnt.

- 10 Chinakohlblattscheiben (*Brassica pekinensis*) werden mit einer Wirkstoffzubereitung der gewünschten Konzentration gespritzt und nach dem Abtrocknen mit Larven des Meerrettichblattkäfers (*Phaedon cochleariae*) besetzt.

Nach 7 Tagen wird die Wirkung in % bestimmt. Dabei bedeutet 100 %, dass alle Käferlarven abgetötet wurden; 0 % bedeutet, dass keine Käferlarven abgetötet wurden.

- 15 Bei diesem Test zeigen z. B. die folgenden Verbindungen der Herstellungsbeispiele Wirkung von 100% bei einer Aufwandmenge von 500g/ha: 52, 57, 84, 185, 186, 190, 200

Bei diesem Test zeigen z. B. die folgenden Verbindungen der Herstellungsbeispiele Wirkung von 83% bei einer Aufwandmenge von 500g/ha: 60, 198, 211

Spodoptera frugiperda - Sprühtest (SPODFR)

- 20 Lösungsmittel: 78,0 Gewichtsteile Aceton
1,5 Gewichtsteile Dimethylformamid
Emulgator: Alkylarylpolyglykolether

- 25 Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung löst man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit den angegebenen Gewichtsteilen Lösungsmittel und füllt mit Wasser, welches eine Emulgatorkonzentration von 1000 ppm enthält, bis zum Erreichen der gewünschten Konzentration auf. Zur Herstellung weiterer Testkonzentrationen wird mit emulgatorhaltigem Wasser verdünnt.

Maisblattscheiben (*Zea mays*) werden mit einer Wirkstoffzubereitung der gewünschten Konzentration gespritzt und nach dem Abtrocknen mit Raupen des Heerwurms (*Spodoptera frugiperda*) besetzt.

Nach 7 Tagen wird die Wirkung in % bestimmt. Dabei bedeutet 100 %, dass alle Raupen abgetötet wurden; 0 % bedeutet, dass keine Raupe abgetötet wurde.

- 254 -

Bei diesem Test zeigen z. B. die folgenden Verbindungen der Herstellungsbeispiele Wirkung von 100% bei einer Aufwandmenge von 500g/ha: 157, 200

Bei diesem Test zeigen z. B. die folgenden Verbindungen der Herstellungsbeispiele Wirkung von 83% bei einer Aufwandmenge von 500g/ha: 207

5 **Tetranychus urticae – Sprühtest, OP-resistent (TETRUR)**

Lösungsmittel: 78,0 Gewichtsteile Aceton
 1,5 Gewichtsteile Dimethylformamid
 Emulgator : Alkylarylpolyglykolether

10 Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung löst man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit den angegebenen Gewichtsteilen Lösungsmittel und füllt mit Wasser, welches eine Emulgatorkonzentration von 1000 ppm enthält, bis zum Erreichen der gewünschten Konzentration auf. Zur Herstellung weiterer Testkonzentrationen wird mit emulgatorhaltigem Wasser verdünnt.

Bohnenblattscheiben (*Phaseolus vulgaris*), die von allen Stadien der Gemeinen Spinnmilbe (*Tetranychus urticae*) befallen sind, werden mit einer Wirkstoffzubereitung der gewünschten Konzentration gespritzt.

15 Nach 6 Tagen wird die Wirkung in % bestimmt. Dabei bedeutet 100 %, dass alle Spinnmilben abgetötet wurden; 0 % bedeutet, dass keine Spinnmilben abgetötet wurden.

Bei diesem Test zeigen z. B. die folgenden Verbindungen der Herstellungsbeispiele eine Wirkung von 100% bei einer Aufwandmenge von 500g/ha: 2, 5, 8, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 46, 48, 52, 53, 54, 58, 59, 65, 66, 67, 68, 76, 80, 83, 89, 90, 91, 92, 97, 101, 104, 106, 20 109, 113, 115, 116, 118, 121, 123, 124, 125, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 139, 142, 143, 145, 147, 154, 159, 161, 171, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 183, 184, 186, 191, 193, 198, 199, 201, 202, 204, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215

Bei diesem Test zeigen z. B. die folgenden Verbindungen der Herstellungsbeispiele eine Wirkung von 90% bei einer Aufwandmenge von 500g/ha: 1, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 24, 25, 29, 31, 33, 41, 43, 47, 49, 50, 25 51, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 72, 82, 85, 87, 98, 99, 105, 108, 111, 114, 117, 120, 122, 126, 131, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 150, 151, 155, 156, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 177, 181, 185, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 200, 203, 205, 207, 212, 217

Bei diesem Test zeigen z. B. die folgenden Verbindungen der Herstellungsbeispiele eine Wirkung von 100% bei einer Aufwandmenge von 100g/ha: 81, 110, 112, 160, 162

Bei diesem Test zeigen z. B. die folgenden Verbindungen der Herstellungsbeispiele eine Wirkung von 90% bei einer Aufwandmenge von 100g/ha: 74, 79, 94, 169

Tetranychus urticae- Sprühtest; OP-resistent (TETRUR)

Lösungsmittel: 7 Gewichtsteile Dimethylformamid

5 Emulgator: Alkylarylpolyglykoether

10 Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung löst man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit den angegebenen Gewichtsteilen Lösungsmittel und füllt mit Wasser, welches eine Emulgatorkonzentration von 1000 ppm enthält, bis zum Erreichen der gewünschten Konzentration auf. Zur Herstellung weiterer Testkonzentrationen wird mit emulgatorhaltigem Wasser verdünnt. Bei erforderlicher Zugabe von Ammoniumsalzen oder/und Penetrationsförderern werden diese jeweils in einer Konzentration von 1000 ppm der Präparatelösung zugefügt.


Bohnenpflanzen (*Phaseolus vulgaris*), die stark von allen Stadien der Gemeinen Spinnmilbe (*Tetranychus urticae*) befallen sind, werden durch Spritzen mit der Wirkstoffzubereitung in der gewünschten Konzentration behandelt.

15 Nach 7 Tagen wird die Wirkung in % bestimmt. Dabei bedeutet 100 %, dass alle Spinnmilben abgetötet wurden; 0 % bedeutet, dass keine Spinnmilben abgetötet wurden.

Bei diesem Test zeigen z. B. die folgenden Verbindungen der Herstellungsbeispiele Wirkung von 100% bei einer Aufwandmenge von 20ppm: 77

Patentansprüche

1. Verbindung der Formel (I)



in welcher

5 A und B gemeinsam mit den Atomen, an die sie gebunden sind, für einen gegebenenfalls substituierten gesättigten Fünfring, der gegebenenfalls durch eine weitere Carbonylgruppe, Thiocarbonylgruppe, eine gegebenenfalls substituierte Iminogruppe und/oder durch ein oder mehrere Heteroatome unterbrochenen sein kann, stehen;

10 W für Wasserstoff oder Halogen steht;

V für Sauerstoff; Schwefel, einen gegebenenfalls substituierten Stickstoff oder Salze eines gegebenenfalls substituierten Stickstoffs steht;

X, Y und Z, jeweils unabhängig voneinander,

15 für Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Amino, Cyano, Nitro, OCN, SCN, SF₅, stehen; oder

20 für Trialkylsilyl, Alkyl, Halogenalkyl, Cyanoalkyl, Hydroxyalkyl, Alkoxyalkyl, Alkenyl, Halogenalkenyl, Cyanoalkenyl, Alkinyl, Halogenalkinyl, Cyanoalkinyl, Alkoxy, Halogenalkoxy, Cyanoalkoxy, Hydroxycarbonylalkoxy, Alkoxyalkoxy, Alkoxyalkoxy, Alkylhydroxyimino, Alkoxyimino, Alkylalkoxyimino, Halogenalkylalkoxyimino, Alkylthio, Halogenalkylthio, Alkoxyalkylthio, Alkylthioalkyl, Alkylsulfinyl, Halogenalkylsulfinyl, Alkoxyalkylsulfinyl, Alkylsulfinylalkyl, Alkylsulfonyl,

- 257 -

Halogenalkylsulfonyl, Alkoxyalkylsulfonyl, Alkylsulfonylalkyl, Alkylsulfonyloxy, Alkylcarbonyl, Halogenalkylcarbonyl, Carboxyl, Alkylcarbonyloxy, Alkoxycarbonyl, Halogenalkoxycarbonyl, Aminocarbonyl, Alkylaminocarbonyl, Dialkylaminocarbonyl, Alkenylaminocarbonyl, Dialkenylaminocarbonyl, Cycloalkylaminocarbonyl, Alkylsulfonylamino, Aminosulfonyl, Alkylaminosulfonyl, Dialkylaminosulfonyl, Alkylsulfoximino, Aminothiocarbonyl, Alkylaminothiocarbonyl oder Dialkylaminothiocarbonyl stehen, wobei alle vorgenannten Reste gegebenenfalls substituiert sein können; oder

für Phenylalkyl, Phenoxy, Phenylalkyloxy, Phenoxyalkyl, Phenylthio, Phenylthioalkyl, Phenylsulfinyl, Phenylsulfonyl, Hetarylalkyl, Hetaryloxy, Hetarylalkyloxy, Hetarylthio, Hetarylsulfinyl oder Hetarylsulfonyl stehen, wobei alle vorgenannten Reste gegebenenfalls substituiert sein können; oder

für Cycloalkylalkyl, Cycloalkyloxy, Cycloalkylalkoxy, Cycloalkylthio, Cycloalkylalkylthio, Cycloalkylsulfinyl, Cycloalkylalkylsulfinyl, Cycloalkylsulfonyl, Cycloalkylalkylsulfonyl oder Cycloalkenyl stehen, wobei alle vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können; oder

für $\text{NR}^{\text{'}}$ stehen,

wobei $\text{R}^{\text{'}}$ und $\text{R}^{\text{'}}$ unabhängig voneinander

für Wasserstoff, Cyano, Alkyl, Halogenalkyl, Cyanoalkyl, Hydroxyalkyl, Alkoxyalkyl, Alkylthioalkyl, Alkenyl, Halogenalkenyl, Cyanoalkenyl, Alkinyl, Halogenalkinyl, Cyanoalkinyl, Acyl oder Alkoxycarbonyl stehen; oder

$\text{R}^{\text{'}}$ und $\text{R}^{\text{'}}$ gemeinsam mit dem N-Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls substituierten und gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome, welche unabhängig ausgewählt werden aus der Gruppe, bestehend aus O, S und N, unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten fünf- bis achtegliedrigen Ring bilden können; oder

für einen 3- bis 6-gliedrigen gesättigten, teilgesättigten oder aromatischen Ring, der gegebenenfalls ein bis drei Heteroatome, welche unabhängig ausgewählt werden aus der Gruppe, bestehend aus O, S und N, enthalten kann und der gegebenenfalls substituiert sein kann stehen;





- 258 -

oder X und Z, oder Y und Z, mit den C-Atomen, an die sie gebunden sind, einen 5 oder 6-gliedrigen Ring ausbilden, der gegebenenfalls substituiert ist und gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome, welche unabhängig ausgewählt werden, aus der Gruppe, bestehend aus O, S, N und CO, unterbrochen ist; und

n für die Zahl 0, 1 oder 2 steht.

2. Verbindung nach Anspruch 1, in welcher

A und B gemeinsam mit den Atomen, an die sie gebunden sind, für eine Substruktur stehen, die ausgewählt ist aus der Gruppe, bestehend aus



wobei

V^1 , V^2 und V^3 , jeweils unabhängig voneinander,

für Sauerstoff; Schwefel, einen gegebenenfalls substituierten Stickstoff oder Salze eines gegebenenfalls substituierten Stickstoffs stehen;

Q^1 und Q^2 , jeweils unabhängig voneinander,

für Sauerstoff, Schwefel oder einen gegebenenfalls substituierten Stickstoff stehen; oder

für ein gegebenenfalls substituiertes Kohlenstoffatom stehen; mit der Maßgabe, dass Q_1 keinen Alkylcarbonylaminorest darstellt;

R^4 , R^5 , R^6 , und R^7 , jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff, Cyano, Halogen oder Nitro stehen; oder

- 259 -

- 5 für Alkyl, Cycloalkylalkyl, Halogenalkyl, Cyanoalkyl, Hydroxyalkyl, Alkoxyalkyl, Aminoalkyl, Alkoxycarbonylalkyl, Alkylthioalkyl, Halogenalkylthioalkyl, Alkoxyalkylthioalkyl, Alkylsulfanylalkyl, Alkylsulfinylalkyl, Alkylsulfonylalkyl, Halogenalkylsulfanylalkyl, Halogenalkylsulfinylalkyl, Halogenalkylsulfonylalkyl, Alkoxyalkylsulfanylalkyl, Alkoxyalkylsulfinylalkyl, Alkoxyalkylsulfonylalkyl, Phenylalkyl, Phenoxyalkyl, Phenylsulfanylalkyl, Phenylsulfinylalkyl, Phenylsulfonylalkyl, Hetarylalkyl, Hetaryloxyalkyl oder Hetarylthioalkyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gesättigt oder ungesättigt und/oder gegebenenfalls substituiert sein können; oder
- 10 für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes Cycloalkyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome unterbrochen sein kann, stehen; oder
- 15 für Alkylcarbonyl, Halogenalkylcarbonyl, Hydroxyalkylcarbonyl, Alkoxyalkylcarbonyl, Phenylcarbonyl, Hetarylcarbonyl, Alkoxycarbonyl, Halogenalkoxycarbonyl, Aryloxycarbonyl, Aminocarbonyl, Alkylaminocarbonyl, Dialkylaminocarbonyl, Cycloalkylaminocarbonyl, Dicycloalkylaminocarbonyl, Cycloalkyl(alkyl)aminocarbonyl, Arylaminocarbonyl, Diarylaminocarbonyl, Alkyl(aryl)aminocarbonyl, Cycloalkyl(aryl)aminocarbonyl, Alkylaminothiocarbonyl, Dialkylaminothiocarbonyl oder Aminothiocarbonyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gesättigt oder ungesättigt und/oder
- 20 gegebenenfalls substituiert sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl stehen; oder
- für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl stehen;
- 25 für Alkoxy, Halogenalkoxy, Alkoxyalkoxy, Aryloxy, Arylalkyloxy, Cycloalkyloxy, Cycloalkylalkyloxy oder Carbonyloxy stehen, wobei die vorgenannten Reste gesättigt oder ungesättigt und/oder gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Hydroxy stehen; oder
- 30 für Alkylamino, Dialkylamino, Halogenalkylamino, Dihalogendialkylamino, Cycloalkylamino, Dicycloalkylamino, Cycloalkyl(alkyl)amino, Arylamino, Diarylamino, Hetarylamino, Dihetarylamino, Alkyl(aryl)amino, Cycloalkyl(aryl)amino, Alkylcarbonylamino, Arylcarbonylamino,

- 260 -

Alkoxy-carbonylamino, Aryloxy-carbonylamino, Alkyl-carbamoylamino, Aryl-carbamoylamino, Alkylsulfonylamino, oder Arylsulfonylamino stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gesättigt oder ungesättigt und/oder gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Amino stehen; oder

5 für Alkylsulfanyl, Alkylsulfinyl, Alkylsulfonyl, Halogenalkylsulfanyl, Halogenalkylsulfinyl, Halogenalkylsulfonyl, Cycloalkylsulfanyl, Cycloalkylsulfinyl, Cycloalkylsulfonyl, Cycloalkylalkylsulfanyl, Cycloalkylalkylsulfinyl, Cycloalkylalkylsulfonyl, Arylsulfanyl, Arylsulfinyl, Arylsulfonyl, Arylalkylsulfanyl, Arylalkylsulfinyl, Arylalkylsulfonyl, 10 Aminosulfonyl, Alkylaminosulfonyl, Dialkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gesättigt oder ungesättigt und/oder gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Sulfanyl stehen; oder

15 R^4 und R^5 gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls substituierten und gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome, welche unabhängig ausgewählt werden, aus der Gruppe, bestehend aus O, S und N, unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis achtegliedrigen Ring bilden können; oder

20 R^6 und R^7 gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls substituierten und gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome, welche unabhängig ausgewählt werden, aus der Gruppe, bestehend aus O, S und N, unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis achtegliedrigen Ring bilden können;

W für Wasserstoff oder Halogen steht;

25 X, Y und Z jeweils und abhängig voneinander die zuvor genannten Bedeutungen haben; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

3. Verbindung nach Anspruch 2, in welcher

A und B gemeinsam mit den Atomen, an die sie gebunden sind, für eine Substruktur stehen, die ausgewählt ist aus der Gruppe, bestehend aus (I-A) bis (I-D),

- 261 -

wobei

V^1 , V^2 und V^3 , jeweils unabhängig voneinander,

für Sauerstoff; Schwefel, NR^{11} oder ein Salz von NR^{11} stehen;

Q^1 für Sauerstoff, Schwefel, NR^1 oder CR^2R steht;

5 Q^2 NR^{10} oder CR^8R^9 steht;

R^1 für Wasserstoff, Cyano oder Nitro stehen; oder

10 für Alkyl, Cycloalkylalkyl, Halogenalkyl, Cyanoalkyl, Hydroxyalkyl, Alkoxyalkyl, Aminoalkyl, Alkoxycarbonylalkyl, Alkylsulfanylalkyl, Alkylsulfinylalkyl, Alkylsulfonylalkyl, Halogenalkylsulfanylalkyl, Halogenalkylsulfinylalkyl, Halogenalkylsulfonylalkyl, Alkoxyalkylsulfanylalkyl, Alkoxyalkylsulfinylalkyl, Alkoxyalkylsulfonylalkyl, Phenylalkyl, Phenoxyalkyl, Phenylsulfanylalkyl, Phenylsulfinylalkyl, Phenylsulfonylalkyl, Hetarylalkyl, Hetaryloxyalkyl, Hetarylthioalkyl, Alkoxycarbonyl, Aryloxycarbonyl, Arylcarbamoyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gesättigt oder ungesättigt und/oder gegebenenfalls substituiert sein können; oder

15

für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes Cycloalkyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome unterbrochen sein kann, steht; oder

20 für Halogenalkylcarbonyl, Hydroxyalkylcarbonyl, Alkoxyalkylcarbonyl, Phenylcarbonyl, Hetarylcarbonyl, Halogenalkoxycarbonyl, Aminocarbonyl, Alkylaminocarbonyl, Dialkylaminocarbonyl, Cycloalkylaminocarbonyl, Dicycloalkylaminocarbonyl, Cycloalkyl(alkyl)aminocarbonyl, Arylaminocarbonyl, Diarylaminocarbonyl, Alkyl(aryl)aminocarbonyl, Cycloalkyl(aryl)aminocarbonyl, Alkylaminothiocarbonyl, Dialkylaminothiocarbonyl oder Aminothiocarbonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gesättigt oder ungesättigt und/oder

25

gegebenenfalls substituiert sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl steht; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl steht; oder

- 262 -

für Alkoxy, Halogenalkoxy, Cycloalkyloxy, Aryloxy, Arylalkyloxy oder Carbonyloxy steht, wobei die vorgenannten Reste gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Hydroxy steht; oder

für Alkylamino, Halogenalkylamino, Dihalogenalkylamino, Dialkylamino, Cycloalkylamino, Dicycloalkylamino, Cycloalkyl(alkyl)amino, Arylamino, Diarylamino, Hetarylamino, Dihetarylamino, Alkyl(aryl)amino, Cycloalkyl(aryl)amino, Alkylcarbonylamino, Arylcarbonylamino, Alkoxy carbonylamino, Aryloxy carbonylamino, Alkylcarbamoylelamino, Arylcarbamoylelamino, Alkylsulfonylamino, oder Arylsulfonylamino steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gesättigt oder ungesättigt und/oder gegebenenfalls substituiert sein können, oder Amino steht; oder

für Alkylsulfanyl, Alkylsulfinyl, Alkylsulfonyl, Halogenalkylsulfanyl, Halogenalkylsulfinyl, Halogenalkylsulfonyl, Cycloalkylsulfanyl, Cycloalkylsulfinyl, Cycloalkylsulfonyl, Cycloalkylalkylsulfanyl, Cycloalkylalkylsulfinyl, Cycloalkylalkylsulfonyl, Arylsulfanyl, Arylsulfinyl, Arylsulfonyl, Arylalkylsulfanyl, Arylalkylsulfinyl, Arylalkylsulfonyl, Aminosulfonyl, Alkylaminosulfonyl, Dialkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gesättigt oder ungesättigt und/oder gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Sulfanyl steht; und

R^{10} und R^{11} , jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff, Cyano oder Nitro stehen; oder

für Alkyl, Cycloalkylalkyl, Halogenalkyl, Cyanoalkyl, Hydroxyalkyl, Alkoxyalkyl, Aminoalkyl, Alkoxy carbonylalkyl, Alkylsulfanylalkyl, Alkylsulfinylalkyl, Alkylsulfonylalkyl, Halogenalkylsulfanylalkyl, Halogenalkylsulfinylalkyl, Halogenalkylsulfonylalkyl, Alkoxyalkylsulfanylalkyl, Alkoxyalkylsulfinylalkyl, Alkoxyalkylsulfonylalkyl, Phenylalkyl, Phenoxyalkyl, Phenylsulfanylalkyl, Phenylsulfinylalkyl, Phenylsulfonylalkyl, Hetarylalkyl, Hetaryloxyalkyl, Hetarylthioalkyl, Alkoxy carbonyl, Aryloxy carbonyl, Arylcarbamoyle steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gesättigt oder ungesättigt und/oder gegebenenfalls substituiert sein können; oder

- 263 -

für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes Cycloalkyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome unterbrochen sein kann, steht; oder

5 für Alkylcarbonyl, Halogenalkylcarbonyl, Hydroxyalkylcarbonyl, Alkoxyalkylcarbonyl, Phenylcarbonyl, Hetarylcarbonyl, Halogenalkoxycarbonyl, Aminocarbonyl, Alkylaminocarbonyl, Dialkylaminocarbonyl, Cycloalkylaminocarbonyl, Dicycloalkylaminocarbonyl, Cycloalkyl(alkyl)aminocarbonyl, Arylaminocarbonyl, Diarylaminocarbonyl, Alkyl(aryl)aminocarbonyl, Cycloalkyl(aryl)aminocarbonyl, Alkylaminothiocarbonyl, Dialkylaminothiocarbonyl oder Aminothiocarbonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gesättigt oder ungesättigt und/oder gegebenfalls substituiert sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl steht; oder

10 für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl steht; oder

15 für Alkoxy, Halogenalkoxy, Cycloalkyloxy, Aryloxy, Arylalkyloxy oder Carbonyloxy steht, wobei die vorgenannten Reste gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Hydroxy steht; oder

20 für Alkylamino, Halogenalkylamino, Dihalogenalkylamino, Dialkylamino, Cycloalkylamino, Dicycloalkylamino, Cycloalkyl(alkyl)amino, Arylamino, Diarylamino, Hetarylamino, Dihetarylamino, Alkyl(aryl)amino, Cycloalkyl(aryl)amino, Alkylcarbonylamino, Arylcarbonylamino, Alkoxy carbonylamino, Aryloxy carbonylamino, Alkylcarbamoylelamino, Arylcarbamoylelamino, Alkylsulfonylamino, oder Arylsulfonylamino steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gesättigt oder ungesättigt und/oder gegebenfalls substituiert sein können, oder Amino steht; oder

25 für Alkylsulfanyl, Alkylsulfinyl, Alkylsulfonyl, Halogenalkylsulfanyl, Halogenalkylsulfinyl, Halogenalkylsulfanyl, Cycloalkylsulfanyl, Cycloalkylsulfinyl, Cycloalkylsulfonyl, Cycloalkylalkylsulfanyl, Cycloalkylalkylsulfinyl, Cycloalkylalkylsulfonyl, Arylsulfanyl, Arylsulfinyl, Arylsulfonyl, Arylalkylsulfanyl, Arylalkylsulfinyl, Arylalkylsulfonyl, Aminosulfonyl, Alkylaminosulfonyl, Dialkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gesättigt oder

30

- 264 -

ungesättigt und/oder gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Sulfanyl steht; und

$R^2, R^3, R^4, R^5, R^6, R^7, R^8$ und R^9 , jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff, Cyano, Halogen oder Nitro stehen; oder

5 für Alkyl, Cycloalkylalkyl, Halogenalkyl, Cyanoalkyl, Hydroxyalkyl, Alkoxyalkyl, Aminoalkyl, Alkoxycarbonylalkyl, Alkylthioalkyl, Halogenalkylthioalkyl, Alkoxyalkylthioalkyl, Alkylsulfanylalkyl, Alkylsulfinylalkyl, Alkylsulfonylalkyl, Halogenalkylsulfanylalkyl, Halogenalkylsulfinylalkyl, Halogenalkylsulfonylalkyl, Alkoxyalkylsulfanylalkyl, Alkoxyalkylsulfinylalkyl, Alkoxyalkylsulfonylalkyl, 10 Phenylalkyl, Phenoxyalkyl, Phenylsulfanylalkyl, Phenylsulfinylalkyl, Phenylsulfonylalkyl, Hetarylalkyl, Hetaryloxyalkyl oder Hetarylthioalkyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gesättigt oder ungesättigt und/oder gegebenenfalls substituiert sein können; oder

15 für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes Cycloalkyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome unterbrochen sein kann, stehen; oder

20 für Alkylcarbonyl, Halogenalkylcarbonyl, Hydroxyalkylcarbonyl, Alkoxyalkylcarbonyl, Phenylcarbonyl, Hetarylcarbonyl, Alkoxycarbonyl, Halogenalkoxycarbonyl, Aryloxycarbonyl, Aminocarbonyl, Alkylaminocarbonyl, Dialkylaminocarbonyl, Cycloalkylaminocarbonyl, Dicycloalkylaminocarbonyl, Cycloalkyl(alkyl)aminocarbonyl, Arylaminocarbonyl, Diarylaminocarbonyl, Alkyl(aryl)aminocarbonyl, Cycloalkyl(aryl)aminocarbonyl, Alkylaminothiocarbonyl, Dialkylaminothiocarbonyl oder Aminothiocarbonyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gesättigt oder ungesättigt und/oder 25 gegebenenfalls substituiert sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl stehen; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl stehen;

30 für Alkoxy, Halogenalkoxy, Alkoxyalkoxy, Aryloxy, Arylalkyloxy, Cycloalkyloxy, Cycloalkylalkyloxy oder Carbonyloxy stehen, wobei die vorgenannten Reste

- 265 -

gesättigt oder ungesättigt und/oder gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Hydroxy stehen; oder

für Alkylamino, Dialkylamino, Halogenalkylamino, Dihalogendialkylamino, Cycloalkylamino, Dicycloalkylamino, Cycloalkyl(alkyl)amino, Arylamino, Diarylamino, Hetarylamino, Dihetarylamino, Alkyl(aryl)amino, Cycloalkyl(aryl)amino, Alkylcarbonylamino, Arylcarbonylamino, Alkoxy carbonylamino, Aryloxy carbonylamino, Alkylcarbamoylelamino, Arylcarbamoylelamino, Alkylsulfonylamino, oder Arylsulfonylamino stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gesättigt oder ungesättigt und/oder gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Amino stehen; oder

für Alkylsulfanyl, Alkylsulfinyl, Alkylsulfonyl, Halogenalkylsulfanyl, Halogenalkylsulfinyl, Halogenalkylsulfonyl, Cycloalkylsulfanyl, Cycloalkylsulfinyl, Cycloalkylsulfonyl, Cycloalkylalkylsulfanyl, Cycloalkylalkylsulfinyl, Cycloalkylalkylsulfonyl, Arylsulfanyl, Arylsulfinyl, Arylsulfonyl, Arylalkylsulfanyl, Arylalkylsulfinyl, Arylalkylsulfonyl, Aminosulfonyl, Alkylaminosulfonyl, Dialkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gesättigt oder ungesättigt und/oder gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Sulfanyl stehen; oder

R^2 und R^3 gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls substituierten und gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome, welche unabhängig ausgewählt werden, aus der Gruppe, bestehend aus O, S und N, unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis achtegliedrigen Ring bilden können; oder

R^4 und R^5 gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls substituierten und gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome, welche unabhängig ausgewählt werden, aus der Gruppe, bestehend aus O, S und N, unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis achtegliedrigen Ring bilden können; oder

R^6 und R^7 gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls substituierten und gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome, welche unabhängig ausgewählt werden, aus der Gruppe, bestehend

- 266 -

aus O, S und N, unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis achtgliedrigen Ring bilden können; oder

R⁸ und R⁹ gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls substituierten und gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome, welche unabhängig ausgewählt werden, aus der Gruppe, bestehend aus O, S und N, unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis achtgliedrigen Ring bilden können;

W für Wasserstoff oder Halogen steht;

X, Y und Z jeweils und abhängig voneinander die zuvor genannten Bedeutungen haben; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

4. Verbindung nach Anspruch 2 oder 3, in welcher

A und B gemeinsam mit den Atomen, an die sie gebunden sind, für eine Substruktur stehen, die ausgewählt ist aus der Gruppe, bestehend aus (I-A) bis (I-D),

wobei

V¹, V² und V³, jeweils unabhängig voneinander,

für Sauerstoff; Schwefel, NR¹¹ oder ein Salz von NR¹¹ stehen;

Q¹ für Sauerstoff, Schwefel, NR¹ oder CR²R³ steht;

Q² NR¹⁰ oder CR⁸R⁹ steht;

R¹ für Wasserstoff, Cyano oder Nitro steht; oder

für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₂-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, Amino(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Phenoxy(C₁-C₆)alkyl,

- 267 -

Phenylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryloxy(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy-carbonyl, Aryloxy-carbonyl, Arylcarbamoyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils

5 gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können; oder

für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes (C₃-C₆)Cycloalkyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome unterbrochen sein

10 kann, steht; oder

für Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Phenylcarbonyl, Hetarylcarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxy-carbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, Di(C₃-C₆)cycloalkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)aminocarbonyl, Arylaminocarbonyl, Diarylaminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl oder Aminothiocarbonyl steht, wobei die vorgenannten

15 Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl steht; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl steht; oder

25 für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, Aryloxy, Aryl(C₁-C₆)alkyloxy oder Carbonyloxy steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Hydroxy steht; oder

für (C₁-C₆)Alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)amino, Arylamino, Diarylamino, Hetarylamino, Dihetarylamino, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)amino, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)amino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, Arylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkoxy-carbonylamino,

30

- 268 -

Aryloxycarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbamoylamino, Arylcarbamoylamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, oder Arylsulfonylamino steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können, oder Amino steht; oder

für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Arylsulfanyl, Arylsulfinyl, Arylsulfonyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Sulfanyl steht; und

R¹⁰ und R¹¹, jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff, Cyano oder Nitro steht; oder

für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₂-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, Amino(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Phenoxy(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryloxy(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl, Aryloxycarbonyl, (C₁-C₆)Alkylcarbonyl, Arylcarbamoyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte

- 269 -

Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können; oder

für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes (C₃-C₆)Cycloalkyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome unterbrochen sein kann, steht; oder

Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Phenylcarbonyl, Hetarylcarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxycarbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, Di(C₃-C₆)cycloalkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)aminocarbonyl, Arylaminocarbonyl, Diarylaminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl oder Aminothiocarbonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl steht; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl steht; oder

für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, Aryloxy, Aryl(C₁-C₆)alkyloxy oder Carbonyloxy steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Hydroxy steht; oder

für (C₁-C₆)Alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)amino, Arylamino, Diarylamino, Hetarylamino, Dihetarylamino, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)amino, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)amino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, Arylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkoxycarbonylamino, Aryloxycarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbamoylamino, Arylcarbamoylamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, oder Arylsulfonylamino steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl

- 270 -

an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können, oder Amino steht; oder

für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Arylsulfanyl, Arylsulfinyl, Arylsulfonyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Sulfanyl steht; und

R², R³, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷, R⁸ und R⁹, jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff, Cyano, Halogen oder Nitro stehen; oder

für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, Amino(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy-carbonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylthio(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylthio(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylthioalkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Phenoxy(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryloxy(C₁-C₆)alkyl oder Hetarylthio(C₁-C₆)alkyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gesättigt oder ungesättigt und/oder gegebenenfalls substituiert sein können; oder

für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes (C₃-C₆)Cycloalkyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome unterbrochen sein kann, stehen; oder

- 271 -

für (C₁-C₆)Alkylcarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Phenylcarbonyl, Hetarylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxycarbonyl, Aryloxycarbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, Di(C₃-C₆)cycloalkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)aminocarbonyl, Arylaminocarbonyl, Diarylaminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl oder Aminothiocarbonyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl stehen; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl stehen;

für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkoxy, Aryloxy, Aryl(C₁-C₆)alkyloxy, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyloxy oder Carbonyloxy stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Hydroxy stehen; oder

für (C₁-C₆)Alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)amino, Arylamino, Diarylamino, Hetarylamino, Dihetarylamino, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)amino, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)amino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, Arylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkoxycarbonylamino, Aryloxycarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbamoylamino, Arylcarbamoylamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, oder Arylsulfonylamino stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Amino stehen; oder

- 272 -

5 für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Arylsulfanyl, Arylsulfinyl, Arylsulfonyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituirt sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Sulfanyl stehen; oder

15 R² und R³ gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, substituierten und gegebenenfalls durch Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis sechsgliedrigen Ring bilden können; oder

20 R⁴ und R⁵ gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, substituierten und gegebenenfalls durch Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis sechsgliedrigen Ring bilden können; oder

30 R⁶ und R⁷ gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind—einen gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, substituierten und gegebenenfalls durch Heteroatome aus der Reihe O, S oder N

- 273 -

unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis sechsgliedrigen Ring bilden können;-oder

R^8 und R^9 gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes (C_3 - C_6)Cycloalkyl, substituierten und gegebenenfalls durch Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis sechsgliedrigen Ring bilden können;


W für Wasserstoff oder Halogen steht;

X, Y und Z jeweils und abhängig voneinander die zuvor genannten Bedeutungen haben; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

5. Verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, in welcher

A und B gemeinsam mit den Atomen, an die sie gebunden sind, für eine Substruktur der Formel (I-A) stehen



wobei

V^1 für Sauerstoff; Schwefel, NR^{11} oder ein Salz von NR^{11} steht;

Q^1 für Sauerstoff, Schwefel, NR^1 oder CR^2R^3 steht;

R^1 für Wasserstoff, Cyano oder Nitro steht; oder

- 274 -

für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₂-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, Amino(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Phenoxy(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryloxy(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl, Aryloxycarbonyl, Arylcarbamoyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können; oder

für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes (C₃-C₆)Cycloalkyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome unterbrochen sein kann, steht; oder

für Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Phenylcarbonyl, Hetarylcarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxycarbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, Di(C₃-C₆)cycloalkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)aminocarbonyl, Arylaminocarbonyl, Diarylaminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl oder Aminothiocarbonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl steht; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl steht; oder

- 275 -

für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, Aryloxy, Aryl(C₁-C₆)alkyloxy oder Carbonyloxy steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Hydroxy steht; oder

für (C₁-C₆)Alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)amino, Arylamino, Diarylamino, Hetarylamino, Dihetarylamino, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)amino, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)amino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, Arylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkoxycarbonylamino, Aryloxycarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbamoylamino, Arylcarbamoylamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, oder Arylsulfonylamino steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können, oder Amino steht; oder

für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Arylsulfanyl, Arylsulfinyl, Arylsulfonyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Sulfanyl steht; und

R¹¹ für Wasserstoff, Cyano oder Nitro steht; oder

für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₂-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, Amino(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl,

- 276 -

- 5 C₆alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Phenoxy(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryloxy(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy carbonyl, Aryloxy carbonyl, (C₁-C₆)Alkyl carbonyl, Aryl carbamoyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können; oder
- 10 für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes (C₃-C₆)Cycloalkyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome unterbrochen sein kann, steht; oder
- 15 für Halogen(C₁-C₆)alkyl carbonyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkyl carbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl carbonyl, Phenyl carbonyl, Hetaryl carbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxy carbonyl, Aryloxy carbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkyl aminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkyl aminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl aminocarbonyl, Di(C₃-C₆)cycloalkyl aminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)aminocarbonyl, Aryl aminocarbonyl, Diaryl aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkyl aminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkyl aminothiocarbonyl oder Amino thiocarbonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl steht; oder
- 20
- 25 für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl steht; oder
- für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, Aryloxy, Aryl(C₁-C₆)alkyloxy oder Carbonyloxy steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Hydroxy steht; oder
- 30 für (C₁-C₆)Alkyl amino, Halogen(C₁-C₆)alkyl amino, Dihalogen(C₁-C₆)alkyl amino, Di(C₁-C₆)alkyl amino, (C₃-C₆)Cycloalkyl amino, Di(C₃-C₆)cycloalkyl amino, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)amino, Aryl amino, Diaryl amino, Hetaryl amino,

- 277 -

5 Dihetarylamino, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)amino, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)amino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, Arylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkoxy carbonylamino, Aryloxy carbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbamoylamino, Arylcarbamoylamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, oder Arylsulfonylamino steht, wobei die vorgenannten
 10 Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können, oder Amino steht; oder

10 für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Arylsulfanyl, Arylsulfinyl, Arylsulfonyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfonyl,
 15 Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Sulfanyl steht; und

20 R², R³, R⁴, R⁵, R⁶ und R⁷, jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff, Cyano, Halogen oder Nitro stehen; oder

25 für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, Amino(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy carbonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylthio(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylthio(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylthioalkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl,
 30 Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Phenoxy(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryloxy(C₁-C₆)alkyl oder Hetarylthio(C₁-C₆)alkyl stehen, wobei die

- 278 -

vorgenannten Reste jeweils gesättigt oder ungesättigt und/oder gegebenenfalls substituiert sein können; oder

für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes (C₃-C₆)Cycloalkyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome unterbrochen sein kann, stehen; oder

für (C₁-C₆)Alkylcarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Phenylcarbonyl, Hetarylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy carbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxy carbonyl, Aryloxy carbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, Di(C₃-C₆)cycloalkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)aminocarbonyl, Arylaminocarbonyl, Diarylaminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl oder Aminothiocarbonyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl stehen; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl stehen;

für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkoxy, Aryloxy, Aryl(C₁-C₆)alkyloxy, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyloxy oder Carbonyloxy stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Hydroxy stehen; oder

für (C₁-C₆)Alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)amino, Arylamino, Diarylamino, Hetarylamino, Dihetarylamino, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)amino, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)amino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, Arylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkoxy carbonylamino, Aryloxy carbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbamoylelamino, Arylcarbamoylelamino, (C₁-

- 279 -

C₆)Alkylsulfonylamino, oder Arylsulfonylamino stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Amino stehen; oder

für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Arylsulfanyl, Arylsulfinyl, Arylsulfonyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Sulfanyl stehen; oder


R² und R³ gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, substituierten und gegebenenfalls durch Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis sechsgliedrigen Ring bilden können; oder

R⁴ und R⁵ gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, substituierten und gegebenenfalls durch Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis sechsgliedrigen Ring bilden können; oder


- 280 -

- 5 R^6 und R^7 gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind—einen gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes (C_3 - C_6)Cycloalkyl, substituierten und gegebenenfalls durch Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis sechsgliedrigen Ring bilden können; oder
- W für Wasserstoff, Fluor oder Chlor steht;
- 10 X, Y und Z unabhängig voneinander für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, Amino, Hydroxy, (C_1 - C_4)Alkyl, (C_1 - C_4)Halogenalkyl, (C_2 - C_4)Alkenyl, (C_2 - C_4)Alkynyl, (C_1 - C_4)Alkoxy, (C_1 - C_4)Halogenalkoxy oder Aminothiocarbonyl stehen;
- 15 oder für ein Benzyl, Phenoxy, Phenylthio, Cyclopropylmethyl, Cyclopropyloxy oder Cyclopropylthio, der gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden substituiert ist mit Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes Cyclopropyl stehen;
- 20 oder für einen Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl oder Phenyl, der gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden substituiert ist mit Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes Cyclopropyl stehen; und
- 25 n für die Zahl 0 oder 1 steht.
6. Verbindung nach Anspruch 5, in welcher die Substruktur der Formel (I-A) für eine Substruktur steht, welche ausgewählt wird aus der Gruppe, bestehend aus


- 281 -




(I-A-1)




(I-A-2)




(I-A-3)



(I-A-4)



(I-A-5)



(I-A-6)

wobei

R¹ für Wasserstoff steht; oder

5

für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₂-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl(C₁-C₆)alkyl, Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)Alkenyl, Halogen(C₂-C₆)Alkenyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)Alkynyl, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können steht; oder

10

für gegebenenfalls substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochen sein kann, steht; oder

für Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxy carbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-

- 282 -

C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl, (C₂-C₆)Alkenylcarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₂-C₆)Alkinylcarbonyl oder Aminothiocarbonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl steht; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl steht; oder

für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, oder Carbonyloxy steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Hydroxy steht; oder

für (C₁-C₆)Alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkoxy-carbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, (C₂-C₆)Alkenylamino, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkylamino, (C₂-C₆)Alkinylamino steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder Amino steht; oder

für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Sulfanyl steht; und

für Wasserstoff steht; oder

für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₂-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy-carbonyl(C₁-C₆)alkyl, Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)Alkenyl, Halogen(C₂-C₆)Alkenyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)Alkinyl, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können steht; oder

- 283 -

für gegebenenfalls substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochen sein kann, steht; oder

5 für (C₁-C₆)Alkylcarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxycarbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl, (C₂-C₆)Alkenylcarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₂-C₆)Alkinylcarbonyl oder Aminothiocarbonyl steht, wobei die
10 vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl steht; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl steht; oder

15 für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, oder Carbonyloxy steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Hydroxy steht; oder

20 für (C₁-C₆)Alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, , (C₁-C₆)Alkoxycarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, (C₂-C₆)Alkenylamino, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkylamino, (C₂-C₆)Alkinylamino steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder Amino steht; oder

25 für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl steht, wobei die
30 vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Sulfanyl steht; und

R², R³, R⁴, R⁵, R⁶ und R⁷, jeweils unabhängig voneinander,

- 284 -

für Wasserstoff, Cyano, Halogen oder Nitro stehen; oder

für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy-carbonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Phenyl(C₁-C₆)alkyl, , Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)Alkenyl, Halogen(C₂-C₆)Alkenyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)Alkynyl, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für gegebenenfalls substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochen sein kann, steht; oder

für (C₁-C₆)Alkylcarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy-carbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxy-carbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl, (C₂-C₆)Alkenylcarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₂-C₆)Alkynylcarbonyl oder Amino-thiocarbonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl steht; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl stehen;

für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkoxy, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyloxy, (C₂-C₆)Alkenyloxy, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkoxy, (C₂-C₆)Alkynyloxy oder Carbonyloxy stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Hydroxy stehen; oder

für (C₁-C₆)Alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, , (C₁-C₆)Alkoxy-carbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, (C₂-C₆)Alkenylamino, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkylamino, (C₂-C₆)Alkynylamino steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder Amino steht; oder

- 285 -

für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylamino-sulfonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Sulfanyl steht; oder

R² und R³ gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, substituierten und gegebenenfalls durch Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis sechsgliedrigen Ring bilden können; oder

R⁴ und R⁵ gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, substituierten und gegebenenfalls durch Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis sechsgliedrigen Ring bilden können; oder

R⁶ und R⁷ gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, substituierten und gegebenenfalls durch Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis sechsgliedrigen Ring bilden können; oder

W für Wasserstoff oder Fluor steht;


- 286 -

X und Y, unabhängig voneinander, für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, (2,2)-Difluoromethyl, Difluoromethoxy, Trifluoromethoxy, Cyclopropyl, Cyano, Amino, Hydroxy oder Nitro stehen;


Z für Wasserstoff steht; und

5 n für die Zahl 0 oder 1 steht.


7. Verbindung nach Anspruch 5 oder 6, in welcher die Substruktur der Formel (I-A) für eine Substruktur steht, welche ausgewählt wird aus der Gruppe, bestehend aus



(I-A-1)



(I-A-2)



(I-A-6)

wobei

10 R¹ und R¹¹, jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Cyclopropyl, Cyclopropylmethyl, CH₂CF₃, CH₂CHF₂, CH(CH₃)CF₃, CH₂CH₂CF₃, CH₂CH₂CHF₂ stehen; oder

R², R³, R⁴, R⁵, R⁶ und R⁷, jeweils unabhängig voneinander für Wasserstoff, Methyl, Trifluoromethyl oder Phenyl stehen;

15 W für Wasserstoff oder Fluor steht;

X für Wasserstoff, Chlor, Fluor oder Methyl steht;

Y für Chlor, Brom, Cyano, Methyl, Trifluoromethyl oder Fluor steht;

insbesondere wobei X und Y für folgende Kombinationen (Y,X) stehen: (Me, F), (Me,H), (Me,Cl), (Me,Me), (Cl,Cl), (Cl,F), (CN,F), (Cl,H), (Br,H), (Br,F), (CN,H), (F,F), (CF₃,H);


- 287 -

Z für Wasserstoff steht; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

8. Verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, in welcher

A und B gemeinsam mit den Atomen, an die sie gebunden sind, für eine Substruktur der Formel (I-B) stehen



wobei

V¹ und V², jeweils unabhängig voneinander,

für Sauerstoff; Schwefel, NR¹¹ oder ein Salz von NR¹¹ stehen;

10 Q¹ für Sauerstoff, Schwefel, NR¹ oder CR²R³ steht;

Q² NR¹⁰ oder CR⁸R⁹ steht;

R¹ für Wasserstoff, Cyano oder Nitro steht; oder

15 für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₂-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, Amino(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Phenoxy(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryloxy(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl,

20

- 288 -

Hetarylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl, Aryloxycarbonyl, Arylcarbamoyle steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können; oder

für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes (C₃-C₆)Cycloalkyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome unterbrochen sein kann, steht; oder

für Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Phenylcarbonyl, Hetarylcarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, Di(C₃-C₆)cycloalkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)aminocarbonyl, Arylaminocarbonyl, Diarylaminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl oder Aminothiocarbonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl steht; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl steht; oder

für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, Aryloxy, Aryl(C₁-C₆)alkyloxy oder Carbonyloxy steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Hydroxy steht; oder

für (C₁-C₆)Alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)amino, Arylamino, Diarylamino, Hetarylamino, Dihetarylamino, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)amino, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)amino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, Arylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkoxycarbonylamino, Aryloxycarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbamoylelamino, Arylcarbamoylelamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, oder Arylsulfonylamino steht, wobei die vorgenannten

- 289 -

Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können, oder Amino steht; oder

5 für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Arylsulfanyl, Arylsulfinyl, Arylsulfonyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Sulfanyl steht; und

R¹⁰ und R¹¹, jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff, Cyano oder Nitro steht; oder

20 für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₂-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, Amino(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Phenoxy(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryloxy(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl, Aryloxycarbonyl, (C₁-C₆)Alkylcarbonyl, Arylcarbonyl steht, wobei die

25

30

vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können; oder

- 290 -

für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes (C₃-C₆)Cycloalkyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome unterbrochen sein kann, steht; oder

für Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Phenylcarbonyl, Hetarylcarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxycarbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, Di(C₃-C₆)cycloalkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)aminocarbonyl, Arylaminocarbonyl, Diarylaminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl oder Aminothiocarbonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl steht; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl steht; oder

für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, Aryloxy, Aryl(C₁-C₆)alkyloxy oder Carbonyloxy steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Hydroxy steht; oder

für (C₁-C₆)Alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)amino, Arylamino, Diarylamino, Hetarylamino, Dihetarylamino, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)amino, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)amino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, Arylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkoxycarbonylamino, Aryloxycarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbamoylamino, Arylcarbamoylamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, oder Arylsulfonylamino steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können, oder Amino steht; oder

- 291 -

5 für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Arylsulfanyl, Arylsulfinyl, Arylsulfonyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylamino-

10 sulfonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Sulfanyl steht; und

R², R³, R⁸ und R⁹, jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff, Cyano, Halogen oder Nitro stehen; oder

15 für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, Amino(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylthio(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylthio(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylthioalkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Phenoxy(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryloxy(C₁-C₆)alkyl oder Hetarylthio(C₁-C₆)alkyl stehen, wobei die

20 vorgenannten Reste jeweils gesättigt oder ungesättigt und/oder gegebenenfalls substituiert sein können; oder

für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes (C₃-C₆)Cycloalkyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome unterbrochen sein

30 kann, stehen; oder

für (C₁-C₆)Alkylcarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Phenylcarbonyl,

- 292 -

Hetarylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxycarbonyl, Aryloxycarbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, Di(C₃-C₆)cycloalkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)aminocarbonyl, Arylamino-
 5 carbonyl, Diarylamino- carbonyl, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl oder Aminothiocarbonyl stehen, wobei die
 10 vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl stehen; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl stehen;

für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkoxy, Aryloxy, Aryl(C₁-C₆)alkyloxy, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyloxy
 15 oder Carbonyloxy stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Hydroxy stehen; oder

für (C₁-C₆)Alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)amino, Arylamino, Diarylamino, Hetarylamino, Dihetarylamino, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)amino, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)amino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, Arylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkoxy-
 20 carbonylamino, Aryloxycarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, Arylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, oder Arylsulfonylamino stehen, wobei die vorgenannten
 25 Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können
 30 oder für Amino stehen; oder

für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfonyl, (C₃-

- 293 -

- 5 (C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Arylsulfanyl, Arylsulfanyl, Arylsulfonyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Sulfanyl stehen; oder
- 10 R² und R³ gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, substituierten und gegebenenfalls durch Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis sechsgliedrigen Ring bilden
- 15 können; oder
- 20 R⁸ und R⁹ gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, substituierten und gegebenenfalls durch Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis sechsgliedrigen Ring bilden können;
- 25 W für Wasserstoff, Fluor oder Chlor steht;
- X, Y und Z unabhängig voneinander für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, Amino, Hydroxy, (C₁-C₄)Alkyl, (C₁-C₄)Halogenalkyl, (C₂-C₄)Alkenyl, (C₂-C₄)Alkinyl, (C₁-C₄)Alkoxy, (C₁-C₄)Halogenalkoxy oder Aminothiocarbonyl stehen;
- 30 oder für ein Benzyl, Phenoxy, Phenylthio, Cyclopropylmethyl, Cyclopropyloxy oder Cyclopropylthio, der gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden substituiert ist mit Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl,


- 294 -

Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes Cyclopropyl stehen;

oder für einen Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl oder Phenyl, der gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden substituiert ist mit Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes Cyclopropyl stehen; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

- 10 9. Verbindung nach Anspruch 8, in welcher die Substruktur der Formel (I-B) für eine Substruktur steht, welche ausgewählt wird aus der Gruppe, bestehend aus



wobei

R¹ für Wasserstoff steht; oder

- 15 für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₂-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl(C₁-C₆)alkyl,

- 295 -

Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)Alkenyl, Halogen(C₂-C₆)Alkenyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)Alkinyl, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können steht; oder

5 für gegebenenfalls substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochen sein kann, steht; oder

10 für Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxycarbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl, (C₂-C₆)Alkenylcarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₂-C₆)Alkinylcarbonyl oder Aminothiocarbonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl steht; oder

15 für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl steht; oder

für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, oder Carbonyloxy steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Hydroxy steht; oder

20 für (C₁-C₆)Alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkoxycarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, (C₂-C₆)Alkenylamino, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkylamino, (C₂-C₆)Alkinylamino steht, wobei die
25 vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder Amino steht; oder

30 für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl steht, wobei die

- 296 -

vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Sulfanyl steht; und

R¹⁰ und R¹¹, jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff steht; oder

5 für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₂-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy-carbonyl(C₁-C₆)alkyl, Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)Alkenyl, Halogen(C₂-C₆)Alkenyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)Alkinyl, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können steht; oder

10 für gegebenenfalls substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochen sein kann, steht; oder

15 für (C₁-C₆)Alkylcarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy-carbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxy-carbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl, (C₂-C₆)Alkenylcarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₂-C₆)Alkinylcarbonyl oder Amino-thiocarbonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl steht; oder

20

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl steht; oder

25 für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, oder Carbonyloxy steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Hydroxy steht; oder

30 für (C₁-C₆)Alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkoxy-carbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, (C₂-C₆)Alkenylamino, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkylamino, (C₂-C₆)Alkinylamino steht, wobei die

- 297 -

vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder Amino steht; oder

für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylamino-sulfonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Sulfanyl steht; und

10 R², R³, R⁸ und R⁹, jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff, Cyano, Halogen oder Nitro steht; oder

für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)Alkenyl, Halogen(C₂-C₆)Alkenyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)Alkinyl, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können ; oder

für gegebenenfalls substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochen sein kann, steht; oder

für (C₁-C₆)Alkylcarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxycarbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl, (C₂-C₆)Alkenylcarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₂-C₆)Alkinylcarbonyl oder Aminothiocarbonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl steht; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl steht; oder

- 298 -

für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkoxy, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyloxy, (C₂-C₆)Alkenyloxy, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkoxy, (C₂-C₆)Alkinyloxy oder Carbonyloxy stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Hydroxy stehen; oder

für (C₁-C₆)Alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, , (C₁-C₆)Alkoxycarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbamoylamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, (C₂-C₆)Alkenylamino, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkylamino, (C₂-C₆)Alkinylamino steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder Amino steht; oder

für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Sulfanyl steht; oder

R² und R³ gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, substituierten und gegebenenfalls durch Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis sechsgliedrigen Ring bilden können; oder

R⁸ und R⁹ gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, substituierten und gegebenenfalls durch Heteroatome aus der Reihe O, S oder N

- 299 -

unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis sechsgliedrigen Ring bilden können;


W für Wasserstoff oder Fluor steht;

X und Y, unabhängig voneinander, für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, (2,2)-Difluoromethyl, Difluoromethoxy, Trifluoromethoxy, Cyclopropyl, Cyano, Amino, Hydroxy oder Nitro stehen;

Z für Wasserstoff steht; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

10. Verbindung nach Anspruch 8 oder 9, in welcher die Substruktur der Formel (I-B) für eine Substruktur steht, welche ausgewählt wird aus der Gruppe, bestehend aus



wobei

R¹, R¹⁰ und R¹¹, jeweils unabhängig voneinander,

- 300 -

für Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, n-Butyl, Cyclopropyl, Cyclopropylmethyl, CH_2CF_3 , CH_2CHF_2 , $\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CF}_3$, $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CF}_3$, $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHF}_2$, $\text{CH}_2\text{C}(\text{CH}_3)_3$, $\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)_2$, $\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2$ (= Allyl), CH_2CCH (= Vinyl) oder Benzyl stehen;

5 R^2 , R^3 , R^8 und R^9 , jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff, Methyl, Trifluoromethyl oder Phenyl stehen;

W für Wasserstoff oder Fluor steht;

X für Wasserstoff, Chlor, Fluor oder Methyl steht;

Y für Chlor, Brom, Cyano, Methyl, Trifluoromethyl oder Fluor steht;


10 X und Y insbesondere für folgende Kombinationen (Y,X) stehen: (Me, F), (Me,H), (Me,Cl), (Me,Me), (Cl,Cl), (Cl,F), (CN,F), (Cl,H), (Br,H), (Br,F), (CN,H), (F,F), (CF_3 ,H);

Z für Wasserstoff steht; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

11 . Verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, in welcher

15 A und B gemeinsam mit den Atomen, an die sie gebunden sind, für eine Substruktur der Formel (I-C) stehen



(I-C)

wobei

V¹ und V², jeweils unabhängig voneinander,

20 für Sauerstoff; Schwefel, NR_{11} oder ein Salz von NR_{11} stehen;

- 301 -

Q¹ für Sauerstoff, Schwefel, NR₁ oder CR₂R₃ steht;

Q² NR₁₀ oder CR₈R₉ steht;

R¹ für Wasserstoff, Cyano oder Nitro steht; oder

5 für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₂-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, Amino(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Phenoxy(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryloxy(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl, Aryloxycarbonyl, Arylcarbamoyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können; oder

10 für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes (C₃-C₆)Cycloalkyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome unterbrochen sein kann, steht; oder

15 für Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Phenylcarbonyl, Hetarylcarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxycarbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, Di(C₃-C₆)cycloalkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)aminocarbonyl, Arylaminocarbonyl, Diarylaminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl oder Aminothiocarbonyl steht, wobei die vorgenannten

25 Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der

30 Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl

- 302 -

an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl steht; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl steht; oder

5 für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, Aryloxy, Aryl(C₁-C₆)alkyloxy oder Carbonyloxy steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Hydroxy steht; oder

10 für (C₁-C₆)Alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)amino, Arylamino, Diarylamino, Hetarylamino, Dihetarylamino, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)amino, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)amino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, Arylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkoxy carbonylamino, Aryloxy carbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbamoylamino, Arylcarbamoylamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, oder Arylsulfonylamino steht, wobei die vorgenannten
15 Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können, oder Amino steht; oder

20 für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Arylsulfanyl, Arylsulfinyl, Arylsulfonyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfonyl,
25 Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Sulfanyl steht; und

30 R¹⁰ und R¹¹, jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff, Cyano oder Nitro steht; oder

- 303 -

5 für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₂-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, Amino(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy-carbonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Phenoxy(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryloxy(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy-carbonyl, Aryloxy-carbonyl, (C₁-C₆)Alkyl-carbonyl, Aryl-carbamoyl steht, wobei die
 10 vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt
 15 sein können; oder

für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes (C₃-C₆)Cycloalkyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome unterbrochen sein kann, steht; oder

20 für Halogen(C₁-C₆)alkyl-carbonyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkyl-carbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl-carbonyl, Phenyl-carbonyl, Hetaryl-carbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxy-carbonyl, Aminocar-bonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocar-bonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocar-bonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocar-bonyl, Di(C₃-C₆)cycloalkylaminocar-bonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)aminocar-bonyl, Arylaminocar-bonyl, Diarylaminocar-bonyl, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)aminocar-bonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)aminocar-bonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocar-bonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocar-bonyl oder Amino-thiocar-bonyl steht, wobei die vorgenannten
 25 Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können
 30 oder für Carbonyl oder Carboxyl steht; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl steht; oder

- 304 -

für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, Aryloxy, Aryl(C₁-C₆)alkyloxy oder Carbonyloxy steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Hydroxy steht; oder

für (C₁-C₆)Alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)amino, Arylamino, Diarylamino, Hetarylamino, Dihetarylamino, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)amino, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)amino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, Arylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkoxy carbonylamino, Aryloxy carbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbamoylelamino, Arylcarbamoylelamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, oder Arylsulfonylamino steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können, oder Amino steht; oder

für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Arylsulfanyl, Arylsulfinyl, Arylsulfonyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Sulfanyl steht; und

R², R³, R⁸ und R⁹, jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff, Cyano, Halogen oder Nitro stehen; oder

für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, Amino(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy carbonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylthio(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylthio(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylthioalkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-

- 305 -

- 5 C₆)Alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Phenoxy(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryloxy(C₁-C₆)alkyl oder Hetarylthio(C₁-C₆)alkyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gesättigt oder ungesättigt und/oder gegebenenfalls substituiert sein können; oder
- 10 für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes (C₃-C₆)Cycloalkyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome unterbrochen sein kann, stehen; oder
- 15 für (C₁-C₆)Alkylcarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Phenylcarbonyl, Hetarylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy carbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxy carbonyl, Aryloxy carbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, Di(C₃-C₆)cycloalkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)aminocarbonyl, Arylaminocarbonyl, Diarylaminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl oder Aminothiocarbonyl stehen, wobei die
- 20 vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl stehen; oder
- 25 für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl stehen;
- 30 für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkoxy, Aryloxy, Aryl(C₁-C₆)alkyloxy, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyloxy oder Carbonyloxy stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Hydroxy stehen; oder

- 306 -

für (C₁-C₆)Alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)amino, Arylamino, Diarylamino, Hetarylamino, Dihetarylamino, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)amino, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)amino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, Arylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkoxy carbonylamino, Aryloxy carbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbamoylelamino, Arylcarbamoylelamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, oder Arylsulfonylamino stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Amino stehen; oder

für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Arylsulfanyl, Arylsulfinyl, Arylsulfonyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Sulfanyl stehen; oder

R² und R³ gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, substituierten und gegebenenfalls durch Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis sechsgliedrigen Ring bilden können; oder

R⁸ und R⁹ gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl,

- 307 -

5 Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder
 gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl,
 substituierten und gegebenenfalls durch Heteroatome aus der Reihe O, S oder N
 unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis sechsgliedrigen Ring bilden
 können;

W für Wasserstoff, Fluor oder Chlor steht;

X, Y und Z, jeweils unabhängig voneinander,

10 für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, Amino, Hydroxy, (C₁-C₄)Alkyl, (C₁-
 C₄)Halogenalkyl, (C₂-C₄)Alkenyl, (C₂-C₄)Alkynyl, (C₁-C₄)Alkoxy, (C₁-
 C₄)Halogenalkoxy oder Aminothiocarbonyl stehen;


15 oder für ein Benzyl, Phenoxy, Phenylthio, Cyclopropylmethyl, Cyclopropyloxy
 oder Cyclopropylthio, der gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder
 verschieden substituiert ist mit Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino,
 Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl,
 Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch
 Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes Cyclopropyl stehen;

20 oder für einen Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl oder Phenyl, der
 gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden substituiert ist mit
 Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl,
 Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy,
 Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor,
 Cyano substituiertes Cyclopropyl stehen; und


n für die Zahl 0 oder 1 steht.

12. Verbindung nach Anspruch 11, in welcher die Substruktur der Formel (I-C) für eine Substruktur
25 steht, welche ausgewählt wird aus der Gruppe, bestehend aus


- 308 -




(I-C-1)




(I-C-2)




(I-C-3)



(I-C-4)



(I-C-5)



(I-C-6)

wobei

R^1 für Wasserstoff steht; oder

5 für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₂-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl(C₁-C₆)alkyl, Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)Alkenyl, Halogen(C₂-C₆)Alkenyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)Alkinyl, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können steht; oder

10 für gegebenenfalls substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochen sein kann, steht; oder

15 für Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxycarbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-

- 309 -

(C₆)alkylaminothiocarbonyl, (C₂-C₆)Alkenylcarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₂-C₆)Alkynylcarbonyl oder Aminothiocarbonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl steht; oder

5 für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl steht; oder

für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, oder Carbonyloxy steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Hydroxy steht; oder

10 für (C₁-C₆)Alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkoxycarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, (C₂-C₆)Alkenylamino, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkylamino, (C₂-C₆)Alkynylamino steht, wobei die
15 vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder Amino steht; oder

für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl steht, wobei die
20 vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Sulfanyl steht; und

R¹⁰ für Wasserstoff steht; oder

25 für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₂-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl(C₁-C₆)alkyl, Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)Alkenyl, Halogen(C₂-C₆)Alkenyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)Alkynyl, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können steht; oder

- 310 -

für gegebenenfalls substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochen sein kann, steht; oder

5 für (C₁-C₆)Alkylcarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy carbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxy carbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl, (C₂-C₆)Alkenylcarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₂-C₆)Alkynylcarbonyl oder Aminothiocarbonyl steht, wobei die
10 vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl steht; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl steht; oder

15 für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, oder Carbonyloxy steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Hydroxy steht; oder

20 für (C₁-C₆)Alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkoxy carbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, (C₂-C₆)Alkenylamino, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkylamino, (C₂-C₆)Alkynylamino steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder Amino steht; oder

25 für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl steht, wobei die
30 vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Sulfanyl steht; und

R², R³, R⁸ und R⁹, jeweils unabhängig voneinander,

- 311 -

für Wasserstoff, Cyano, Halogen oder Nitro steht; oder

für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)Alkenyl, Halogen(C₂-C₆)Alkenyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)Alkinyl, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können ; oder

für gegebenenfalls substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochen sein kann, steht; oder

für (C₁-C₆)Alkylcarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxycarbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl, (C₂-C₆)Alkenylcarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₂-C₆)Alkinylcarbonyl oder Aminothiocarbonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl steht; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl steht; oder

für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkoxy, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyloxy, (C₂-C₆)Alkenyloxy, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkoxy, (C₂-C₆)Alkinyloxy oder Carbonyloxy stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Hydroxy stehen; oder

für (C₁-C₆)Alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkoxycarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, (C₂-C₆)Alkenylamino, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkylamino, (C₂-C₆)Alkinylamino steht, wobei die

- 312 -

vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder Amino steht; oder

für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Sulfanyl steht; oder

R² und R³ gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, substituierten und gegebenenfalls durch Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis sechsgliedrigen Ring bilden können; oder

R⁸ und R⁹ gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, substituierten und gegebenenfalls durch Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis sechsgliedrigen Ring bilden können;

W für Wasserstoff oder Fluor steht;

X und Y, jeweils unabhängig voneinander,


für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, (2,2)-Difluoromethyl, Difluoromethoxy, Trifluoromethoxy, Cyclopropyl, Cyano, Amino, Hydroxy oder Nitro stehen;

Z für Wasserstoff steht; und

- 313 -

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

13. Verbindung nach Anspruch 11 oder 12, in welcher die Substruktur der Formel (I-C) für eine Substruktur steht, welche ausgewählt wird aus der Gruppe, bestehend aus



5

wobei

R¹ und R¹⁰, jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff, (C₁-C₄)Alkyl, (C₂-C₄)Halogenalkyl, (C₁-C₃)Alkoxy(C₁-C₄)alkyl oder (C₂-C₄)Alkenyl stehen; oder

- 10 für gesättigtes oder ungesättigtes (C₃-C₆)Cycloalkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₂)alkyl, Phenyl oder Phenyl(C₁-C₂)alkyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach durch Halogen, Cyano, Nitro, Amino, Hydroxy, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy, Trifluoroethylsulfanyl oder
- 15 gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes Cyclopropyl substituiert sein können;

R², R³, R⁸ und R⁹, jeweils unabhängig voneinander,

- 314 -

für Wasserstoff stehen; oder

für (C₁-C₆)Alkyl, (C₂-C₆)Alkenyl, (C₂-C₆)Alkynyl, Halogen(C₁-C₆)alkyl oder Phenyl(C₁-C₃)alkyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach durch Halogen, Cyano, Nitro, Amino, Hydroxy, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy, Trifluoroethylsulfanyl oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes Cyclopropyl substituiert sein können; oder

für (C₃-C₆)Cycloalkyl oder Phenyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach durch Halogen, Cyano, Nitro, Amino, Hydroxy, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy, Trifluoroethylsulfanyl oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes Cyclopropyl substituiert sein können; oder

R² und R³ gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, substituiertes Cyclopropyl-, Cyclobutyl-, Cyclopentyl- oder Cyclohexylring bilden können; oder

R⁸ und R⁹ gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, substituiertes Cyclopropyl-, Cyclobutyl-, Cyclopentyl- oder Cyclohexylring bilden können;

W Wasserstoff oder Fluor steht;

X für Wasserstoff, Chlor, Fluor oder Methyl steht;

Y für Chlor, Brom, Cyano, Methyl, Trifluoromethyl oder Fluor steht;

Insbesondere wobei X und Y für folgende Kombinationen (Y,X) stehen: (Me, F), (Me,H), (Me,Cl), (Me,Me), (Cl,Cl), (Cl,F), (CN,F), (Cl,H), (Me,H), (Br,H), (Br,F), (CN,H), (F,F),

- 315 -


(CF₃,H);

Z für Wasserstoff steht; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

14. Verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, in welcher

5 A und B gemeinsam mit den Atomen, an die sie gebunden sind, für eine Substruktur der Formel (I-D) stehen



wobei

V¹, V² und V³, jeweils unabhängig voneinander,

10 für Sauerstoff; Schwefel, NR₁₁ oder ein Salz von NR₁₁ stehen;

Q² NR¹⁰ oder CR⁸R⁹ steht;R¹⁰ für Wasserstoff, Cyano oder Nitro steht; oder

15 für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₂-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, Amino(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Phenoxy(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryloxy(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl,

20

- 316 -

Hetarylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Hetarylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Arylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy carbonyl, Aryloxy carbonyl, (C₁-C₆)Alkylcarbonyl, Arylcarbamoyle steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können; oder

für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes (C₃-C₆)Cycloalkyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome unterbrochen sein kann, steht; oder

für Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Phenylcarbonyl, Hetarylcarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxy carbonyl, Aryloxy carbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, Di(C₃-C₆)cycloalkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)aminocarbonyl, Arylaminocarbonyl, Diarylaminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl oder Aminothiocarbonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl steht; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl steht; oder

für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, Aryloxy, Aryl(C₁-C₆)alkyloxy oder Carbonyloxy steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Hydroxy steht; oder

für (C₁-C₆)Alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)amino, Arylamino, Diarylamino, Hetarylamino, Dihetarylamino, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)amino, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)amino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, Arylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkoxy carbonylamino, Aryloxy carbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbamoylelamino, Arylcarbamoylelamino, (C₁-

- 317 -

C₆)Alkylsulfonylamino, oder Arylsulfonylamino steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können, oder Amino steht; oder

für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Arylsulfanyl, Arylsulfinyl, Arylsulfonyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Sulfanyl steht; und

R⁸ und R⁹, jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff, Cyano, Halogen oder Nitro stehen; oder

für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, Amino(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylthio(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylthio(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylthioalkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Phenoxy(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Phenylsulfonyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryloxy(C₁-C₆)alkyl oder Hetarylthio(C₁-C₆)alkyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gesättigt oder ungesättigt und/oder gegebenenfalls substituiert sein können; oder

- 318 -

für gegebenenfalls substituiertes gesättigtes oder ungesättigtes (C₃-C₆)Cycloalkyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome unterbrochen sein kann, stehen; oder

5 für (C₁-C₆)Alkylcarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Hydroxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, Phenylcarbonyl, Hetarylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy carbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxy carbonyl, Aryloxy carbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, Di(C₃-C₆)cycloalkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)aminocarbonyl, Arylaminocarbonyl, Diarylaminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl oder Aminothiocarbonyl stehen, wobei die
10 vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt
15 sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl stehen; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl stehen;

20 für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkoxy, Aryloxy, Aryl(C₁-C₆)alkyloxy, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyloxy oder Carbonyloxy stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Hydroxy stehen; oder

25 für (C₁-C₆)Alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkyl((C₁-C₆)alkyl)amino, Arylamino, Diarylamino, Hetarylamino, Dihetarylamino, (C₁-C₆)Alkyl(aryl)amino, (C₃-C₆)Cycloalkyl(aryl)amino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, Arylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkoxy carbonylamino, Aryloxy carbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbamoyleamino, Arylcarbamoyleamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, oder Arylsulfonylamino stehen, wobei die vorgenannten
30 Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl

- 319 -

an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Amino stehen; oder

für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Arylsulfanyl, Arylsulfinyl, Arylsulfonyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Aryl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylaminosulfonyl stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können und/oder unter der Bedingung, dass im Falle eines ungesättigten Restes, die definierte Mindestanzahl an Kohlenstoffatomen 2 beträgt, die Reste gesättigt oder ungesättigt sein können oder für Sulfanyl stehen; oder

R⁸ und R⁹ gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, substituierten und gegebenenfalls durch Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis sechsgliedrigen Ring bilden können;

W für Wasserstoff, Fluor oder Chlor steht;

X, Y und Z, jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, Amino, Hydroxy, (C₁-C₄)Alkyl, (C₁-C₄)Halogenalkyl, (C₂-C₄)Alkenyl, (C₂-C₄)Alkynyl, (C₁-C₄)Alkoxy, (C₁-C₄)Halogenalkoxy oder Aminothiocarbonyl stehen;

oder für ein Benzyl, Phenoxy, Phenylthio, Cyclopropylmethyl, Cyclopropyloxy oder Cyclopropylthio, der gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden substituiert ist mit Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch


- 320 -

Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes Cyclopropyl stehen;

oder für einen Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl oder Phenyl, der gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden substituiert ist mit Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes Cyclopropyl stehen; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

15. Verbindung nach Anspruch 14, in welcher die Substruktur der Formel (I-D) für eine Substruktur steht, welche ausgewählt wird aus der Gruppe, bestehend aus



wobei

R¹⁰ für Wasserstoff steht; oder

für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₂-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl(C₁-C₆)alkyl, Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)Alkenyl, Halogen(C₂-C₆)Alkenyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)Alkynyl, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können steht; oder

für gegebenenfalls substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochen sein kann, steht; oder

- 321 -

5 für (C₁-C₆)Alkylcarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxycarbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl, (C₂-C₆)Alkenylcarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₂-C₆)Alkynylcarbonyl oder Aminothiocarbonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Carbonyl oder Carboxyl steht; oder

10 für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl steht; oder

für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, oder Carboxyloxy steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können, oder für Hydroxy steht; oder

15 für (C₁-C₆)Alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkoxycarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbamoylamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, (C₂-C₆)Alkenylamino, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkylamino, (C₂-C₆)Alkynylamino steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder Amino steht; oder

20

25 für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylamino-sulfonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Sulfanyl steht; und

R⁸ und R⁹, jeweils unabhängig voneinander,

für Wasserstoff, Cyano, Halogen oder Nitro steht; oder

30 für (C₁-C₆)Alkyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyl, Halogen(C₁-C₆)alkyl, Cyano(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkoxycarbonyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-

- 322 -

C₆)Alkylsulfanyl(C₁-C₆)alkyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl(C₁-C₆)alkyl, Phenyl(C₁-C₆)alkyl, Hetaryl(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)Alkenyl, Halogen(C₂-C₆)Alkenyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkyl, (C₂-C₆)Alkynyl, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können ; oder

5 für gegebenenfalls substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl, welches gegebenenfalls durch ein oder mehrere Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochen sein kann, steht; oder

10 für (C₁-C₆)Alkylcarbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₁-C₆)Alkoxy carbonyl, Halogen(C₁-C₆)alkoxy carbonyl, Aminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminocarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkylaminocarbonyl, (C₁-C₆)Alkylaminothiocarbonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminothiocarbonyl, (C₂-C₆)Alkenylcarbonyl, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkylcarbonyl, (C₂-C₆)Alkynylcarbonyl oder Aminothiocarbonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für

15 Carbonyl oder Carboxyl steht; oder

für gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder gegebenenfalls substituiertes Hetaryl steht; oder

20 für (C₁-C₆)Alkoxy, Halogen(C₁-C₆)alkoxy, (C₁-C₆)Alkoxy(C₁-C₆)alkoxy, (C₃-C₆)Cycloalkyloxy, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkyloxy, (C₂-C₆)Alkenyloxy, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkoxy, (C₂-C₆)Alkynyloxy oder Carbonyloxy stehen, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Hydroxy stehen; oder

25 für (C₁-C₆)Alkylamino, Halogen(C₁-C₆)alkylamino, Dihalogen(C₁-C₆)alkylamino, Di(C₁-C₆)alkylamino, (C₃-C₆)Cycloalkylamino, Di(C₃-C₆)cycloalkylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkoxy carbonylamino, (C₁-C₆)Alkylcarbonylamino, (C₁-C₆)Alkylsulfonylamino, (C₂-C₆)Alkenylamino, (C₃-C₆)Cycloalkenyl(C₁-C₆)alkylamino, (C₂-C₆)Alkylamino steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder Amino steht; oder

30 für (C₁-C₆)Alkylsulfanyl, (C₁-C₆)Alkylsulfinyl, (C₁-C₆)Alkylsulfonyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfanyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfinyl, Halogen(C₁-C₆)alkylsulfonyl, (C₃-

- 323 -

C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfanyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfinyl, (C₃-C₆)Cycloalkyl(C₁-C₆)alkylsulfonyl, Aminosulfonyl, (C₁-C₆)Alkylaminosulfonyl, Di(C₁-C₆)alkylaminosulfonyl oder Arylamino-sulfonyl steht, wobei die vorgenannten Reste jeweils gegebenenfalls substituiert sein können oder für Sulfanyl steht; oder

R⁸ und R⁹ gemeinsam mit dem Atom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Amino, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, Difluoromethyl, Trifluoroethyl, Difluoroethyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluoromethoxy, Trifluoroethoxy oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes (C₃-C₆)Cycloalkyl, substituierten und gegebenenfalls durch Heteroatome aus der Reihe O, S oder N unterbrochenen gesättigten oder ungesättigten drei- bis sechsgliedrigen Ring bilden können;



W für Wasserstoff oder Fluor steht;

X und Y, jeweils unabhängig voneinander, für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluoromethyl, (2,2)-Difluoromethyl, Difluoromethoxy, Trifluoromethoxy, Cyclopropyl, Cyano, Amino, Hydroxy oder Nitro stehen;

Z für Wasserstoff steht; und

n für die Zahl 0 oder 1 steht.

16. Verbindung nach Anspruch 14 oder 15, in welcher die Substruktur der Formel (I-C) für eine Substruktur steht, welche ausgewählt wird aus der Gruppe, bestehend aus



wobei

- 324 -

- 5 R^{10} für Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, tert-Butyl, Cyclopropylmethyl, $CH_2CH(CH_3)_2$, $CH_2C(CH_3)_3$, CH_2CF_3 , CH_2CHF_2 , $CH(CH_3)CF_3$, $CH_2CH_2CF_3$, $CH_2CH_2CHF_2$ oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes Cyclopropyl oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes Cyclohexyl oder gegebenenfalls durch Methyl, Fluor, Chlor, Cyano substituiertes Cyclopropylmethyl steht;
- W für Wasserstoff oder Fluor steht;
- X für Wasserstoff, Chlor, Fluor oder Methyl steht;
- Y für Chlor, Brom, Cyano, Methyl, Trifluoromethyl oder Fluor steht;
- 10 Insbesondere wobei X und Y für folgende Kombinationen (Y,X) stehen: (Me, F), (Me,H), (Me,Cl), (Me,Me), (Cl,Cl), (Cl,F), (CN,F), (Cl,H), (Me,H), (Br,H), (Br,F), (CN,H), (F,F), (CF₃,H);
- Z für Wasserstoff steht; und
- n für die Zahl 0 oder 1 steht.
17. 15 Wirkstoffzusammensetzung enthaltend mindestens eine Verbindung der allgemeinen Formel (I) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 12 und mindestens einen weiteren insektiziden, akariziden oder nematiziden Wirkstoff ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus
- (1) Acetylcholinesterase (AChE) Inhibitoren, wie beispielsweise
- 20 Carbamate, z.B. Alanycarb, Aldicarb, Bendiocarb, Benfuracarb, Butocarboxim, Butoxycarboxim, Carbaryl, Carbofuran, Carbosulfan, Ethiofencarb, Fenobucarb, Formetanate, Furathiocarb, Isoprocab, Methiocarb, Methomyl, Metolcarb, Oxamyl, Pirimicarb, Propoxur, Thiodicarb, Thiofanox, Triazamate, Trimethacarb, XMC und Xylcarb; oder
- 25 Organophosphate, z.B. Acephate, Azamethiphos, Azinphos-ethyl, Azinphos-methyl, Cadusafos, Chlorethoxyfos, Chlorfenvinphos, Chlormephos, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl, Coumaphos, Cyanophos, Demeton-S-methyl, Diazinon, Dichlorvos/DDVP, Dicrotophos, Dimethoate, Dimethylvinphos, Disulfoton, EPN, Ethion, Ethoprophos, Famphur, Fenamiphos, Fenitrothion, Fenthion, Fosthiazate, Heptenophos, Imicyafos, Isufenphos, Isopropyl O-(methoxyaminothio-phosphoryl) salicylat, Isoxathion, Malathion, Mecarbam, Methamidophos, Methidathion, Mevinphos, Monocrotophos, Naled, Omethoate, Oxydemeton-methyl, Parathion, Parathion-methyl, Phenthoate, Phorate, Phosalone, Phosmet, Phosphamidon, Phoxim, Pirimiphos-methyl, Profenofos,

- 325 -

Propetamphos, Prothiofos, Pyraclofos, Pyridaphenthion, Quinalphos, Sulfotep, Tebupirimfos, Temephos, Terbufos, Tetrachlorvinphos, Thiometon, Triazophos, Trichlorfon und Vamidothion.

(2) GABA-gesteuerte Chlorid-Kanal-Antagonisten, wie beispielsweise

Cyclodien-organochlorine, z.B. Chlordane und Endosulfan; oder

5 Phenylpyrazole (Fiprole), z.B. Ethiprole und Fipronil.

(3) Natrium-Kanal-Modulatoren / Spannungsabhängige Natrium-Kanal-Blocker, wie beispielsweise

Pyrethroide, z.B. Acrinathrin, Allethrin, d-cis-trans Allethrin, d-trans Allethrin, Bifenthrin, Bioallethrin, Bioallethrin S-cyclopentenyl Isomer, Bioresmethrin, Cycloprothrin, Cyfluthrin, beta-Cyfluthrin, Cyhalothrin, lambda-Cyhalothrin, gamma-Cyhalothrin, Cypermethrin, alpha-Cypermethrin, beta-Cypermethrin, theta-Cypermethrin, zeta-Cypermethrin, Cyphenothrin [(1R)-trans-Isomere], Deltamethrin, Empenthrin [(EZ)-(1R)-Isomere], Esfenvalerate, Etofenprox, Fenpropathrin, Fenvalerate, Flucythrinate, Flumethrin, tau-Fluvalinate, Halfenprox, Imiprothrin, Kadethrin, Permethrin, Phenothrin [(1R)-trans-Isomer), Prallethrin, Pyrethrine (pyrethrum), Resmethrin, Silafluofen, Tefluthrin, Tetramethrin, Tetramethrin [(1R)- Isomere)], Tralomethrin und
10 Transfluthrin; oder
15

DDT; oder Methoxychlor.

(4) Nikotinerge Acetylcholin-Rezeptor (nAChR) Agonisten, wie beispielsweise

Neonikotinoide, z.B. Acetamiprid, Clothianidin, Dinotefuran, Imidacloprid, Nitenpyram, Thiacloprid und Thiamethoxam; oder

20 Nikotin.

(5) Nikotinerge Acetylcholin-Rezeptor (nAChR) allosterische Aktivatoren, wie beispielsweise

Spinosine, z.B. Spinetoram und Spinosad.

(6) Chlorid-Kanal-Aktivatoren, wie beispielsweise

Avermectine/Milbemycine, z.B. Abamectin, Enamectin-benzoat, Lepimectin und Milbemectin.

25 (7) Juvenilhormon-Imitatoren, wie beispielsweise

Juvenilhormon-Analoge, z.B. Hydroprene, Kinoprene und Methoprene; oder

- 326 -

Fenoxycarb; oder Pyriproxyfen.

(8) Wirkstoffe mit unbekannten oder nicht spezifischen Wirkmechanismen, wie beispielsweise

Alkylhalide, z.B. Methylbromid und andere Alkylhalide; oder

Chloropicrin; oder Sulfurylfluorid; oder Borax; oder Brechweinstein.

5 (9) Selektive Fraßhemmer, z.B. Pymetrozine; oder Flonicamid.

(10) Milbenwachstumsinhibitoren, z.B. Clofentezine, Hexythiazox und Diflovidazin; oder

Ettoxazole.

10 (11) Mikrobielle Disruptoren der Insektendarmmembran, z.B. *Bacillus thuringiensis* Subspezies israelensis, *Bacillus sphaericus*, *Bacillus thuringiensis* Subspezies aizawai, *Bacillus thuringiensis* Subspezies kurstaki, *Bacillus thuringiensis* Subspezies tenebrionis und BT Pflanzenproteine: Cry1Ab, Cry1Ac, Cry1Fa, Cry2Ab, mCry3A, Cry3Ab, Cry3Bb, Cry34/35Ab1.

(12) Inhibitoren der oxidativen Phosphorylierung, ATP-Disruptoren, wie beispielsweise Diafenthiuron; oder

Organozinnverbindungen, z.B. Azocyclotin, Cyhexatin und Fenbutatin-oxid; oder

15 Propargite; oder Tetradifon.

(13) Entkoppler der oxidativen Phosphorylierung durch Unterbrechung des H-Protongradienten, wie beispielsweise Chlorfenapyr, DNOC und Sulfluramid.

(14) Nikotinerge Acetylcholin-Rezeptor-Antagonisten, wie beispielsweise Bensultap, Cartap-hydrochlorid, Thiocyclam und Thiosultap-Natrium.

20 (15) Inhibitoren der Chitinbiosynthese, Typ 0, wie beispielsweise Bistrifluron, Chlorfluazuron, Diflubenzuron, Flucycloxuron, Flufenoxuron, Hexaflumuron, Lufenuron, Novaluron, Noviflumuron, Teflubenzuron und Triflumuron.

(16) Inhibitoren der Chitinbiosynthese, Typ 1, wie beispielsweise Buprofezin.

(17) Häutungsstörende Wirkstoffe, Dipteran, wie beispielsweise Cyromazine.

- 327 -

(18) Ecdyson-Rezeptor Agonisten, wie beispielsweise Chromafenozide, Halofenozide, Methoxyfenozide und Tebufenozide.

(19) Oktopaminerge Agonisten, wie beispielsweise Amitraz.

5 (20) Komplex-III-Elektronentransportinhibitoren, wie beispielsweise Hydramethylnon; oder Acequinocyl; oder Fluacrypyrim.

(21) Komplex-I-Elektronentransportinhibitoren, beispielsweise

METI-Akarizide, z.B. Fenazaquin, Fenpyroximate, Pyrimidifen, Pyridaben, Tebufenpyrad und Tolfenpyrad; oder

Rotenone (Derris).

10 (22) Spannungsabhängige Natriumkanal-Blocker, z.B. Indoxacarb; oder Metaflumizone.

(23) Inhibitoren der Acetyl-CoA-Carboxylase, wie beispielsweise

Tetron- und Tetramsäurederivate, z.B. Spirodiclofen, Spiromesifen und Spirotetramat.

(24) Komplex-IV-Elektronentransportinhibitoren, wie beispielsweise

Phosphine, z.B. Aluminiumphosphid, Calciumphosphid, Phosphin und Zinkphosphid; oder

15 Cyanid.

(25) Komplex-II-Elektronentransportinhibitoren, wie beispielsweise Cyenopyrafen.

(28) Ryanodinrezeptor-Effektoren, wie beispielsweise

Diamide, z.B. Chlorantraniliprole und Flubendiamide;

20 weitere Wirkstoffe mit unbekanntem Wirkmechanismus, wie beispielsweise Amidoflumet, Azadirachtin, Benclothiaz, Benzoximate, Bifenazate, Bromopropylate, Chinomethionat, Cryolite, Cyantraniliprole (Cyazypyr), Cyflumetofen, Dicofol, Diflovidazin, Fluensulfone, Flufenerim, Flufiprole, Fluopyram, Fufenozide, Imidaclothiz, Iprodione, Meperfluthrin, Pyridalyl, Pyrifluquinazon, Tetramethylfluthrin und Iodmethan; desweiteren Präparate auf Basis von Bacillus firmus (insbesondere Stamm CNCM I-1582, beispielsweise VOTiVO™, BioNem) sowie folgende
25 bekannte wirksame Verbindungen:

3-Brom-N-{2-brom-4-chlor-6-[(1-cyclopropylethyl)carbamoyle]phenyl}-1-(3-chlorpyridin-2-yl)-1H-pyrazol-5-carboxamid 4-[[[(6-Brompyrid-3-yl)methyl](2-fluorethyl)amino]furan-2(5H)-on (bekannt aus WO2007/115644), 4-[[[(6-Fluorpyrid-3-yl)methyl](2,2-difluorethyl)amino]furan-2(5H)-on (bekannt aus WO2007/115644), 4-[[[(2-Chlor-1,3-thiazol-5-yl)methyl](2-fluorethyl)amino]furan-2(5H)-on (bekannt aus WO2007/115644), 4-[[[(6-Chlorpyrid-3-yl)methyl](2-fluorethyl)amino]furan-2(5H)-on (bekannt aus WO2007/115644), Flupyradifurone, 4-[[[(6-Chlor-5-fluorpyrid-3-yl)methyl](methyl)amino]furan-2(5H)-on (bekannt aus WO2007/115643), 4-[[[(5,6-Dichlorpyrid-3-yl)methyl](2-fluorethyl)amino]furan-2(5H)-on (bekannt aus WO2007/115646), 4-[[[(6-Chlor-5-fluorpyrid-3-yl)methyl](cyclopropyl)amino]furan-2(5H)-on (bekannt aus WO2007/115643), 4-[[[(6-Chlorpyrid-3-yl)methyl](cyclopropyl)amino]furan-2(5H)-on (bekannt aus EP-A-0 539 588), 4-[[[(6-Chlorpyrid-3-yl)methyl](methyl)amino]furan-2(5H)-on (bekannt aus EP-A-0 539 588), [[1-(6-Chlorpyridin-3-yl)ethyl](methyl)oxido- λ^4 -sulfanylidene]cyanamid (bekannt aus WO2007/149134) und seine Diastereomere [[(1R)-1-(6-Chlorpyridin-3-yl)ethyl](methyl)oxido- λ^4 -sulfanylidene]cyanamid (A) und [[(1S)-1-(6-Chlorpyridin-3-yl)ethyl](methyl)oxido- λ^4 -sulfanylidene]cyanamid (B) (ebenfalls bekannt aus WO2007/149134) sowie Sulfoxaflor und seine Diastereomere [(R)-Methyl(oxido){(1R)-1-[6-(trifluormethyl)pyridin-3-yl]ethyl}- λ^4 -sulfanylidene]cyanamid (A1) und [(S)-Methyl(oxido){(1S)-1-[6-(trifluormethyl)pyridin-3-yl]ethyl}- λ^4 -sulfanylidene]cyanamid (A2), bezeichnet als Diastereomerengruppe A (bekannt aus WO 2010/074747, WO 2010/074751), [(R)-Methyl(oxido){(1S)-1-[6-(trifluormethyl)pyridin-3-yl]ethyl}- λ^4 -sulfanylidene]cyanamid (B1) und [(S)-Methyl(oxido){(1R)-1-[6-(trifluormethyl)pyridin-3-yl]ethyl}- λ^4 -sulfanylidene]cyanamid (B2), bezeichnet als Diastereomerengruppe B (ebenfalls bekannt aus WO 2010/074747, WO 2010/074751) und 11-(4-Chlor-2,6-dimethylphenyl)-12-hydroxy-1,4-dioxa-9-azadispiro[4.2.4.2]tetradec-11-en-10-on (bekannt aus WO2006/089633), 3-(4'-Fluor-2,4-dimethylbiphenyl-3-yl)-4-hydroxy-8-oxa-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-2-on (bekannt aus WO2008/067911), 1-{2-Fluor-4-methyl-5-[(2,2,2-trifluorethyl)sulfinyl]phenyl}-3-(trifluormethyl)-1H-1,2,4-triazol-5-amin (bekannt aus WO2006/043635), [(3S,4aR,12R,12aS,12bS)-3-[(Cyclopropylcarbonyl)oxy]-6,12-dihydroxy-4,12b-dimethyl-11-oxo-9-(pyridin-3-yl)-1,3,4,4a,5,6,6a,12,12a,12b-decahydro-2H,11H-benzo[f]pyrano[4,3-b]chromen-4-yl)methylcyclopropancarboxylat (bekannt aus WO2008/066153), 2-Cyan-3-(difluormethoxy)-N,N-dimethylbenzolsulfonamid (bekannt aus WO2006/056433), 2-Cyan-3-(difluormethoxy)-N-methylbenzolsulfonamid (bekannt aus WO2006/100288), 2-Cyan-3-(difluormethoxy)-N-ethylbenzolsulfonamid (bekannt aus WO2005/035486), 4-(Difluormethoxy)-N-ethyl-N-methyl-1,2-benzothiazol-3-amin-1,1-dioxid (bekannt aus WO2007/057407), N-[1-(2,3-Dimethylphenyl)-2-(3,5-dimethylphenyl)ethyl]-4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-amin (bekannt aus WO2008/104503), {1'-[(2E)-3-(4-Chlorphenyl)prop-2-en-1-yl]-5-fluorspiro[indol-3,4'-piperidin]-1(2H)-yl}(2-chlorpyridin-4-

yl)methanon (bekannt aus WO2003/106457), 3-(2,5-Dimethylphenyl)-4-hydroxy-8-methoxy-1,8-diazaspiro[4.5]dec-3-en-2-on (bekannt aus WO2009/049851), 3-(2,5-Dimethylphenyl)-8-methoxy-2-oxo-1,8-diazaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl-ethylcarbonat (bekannt aus WO2009/049851), 4-(But-2-in-1-yloxy)-6-(3,5-dimethylpiperidin-1-yl)-5-fluorpyrimidin (bekannt aus WO2004/099160),

5 (2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl)(3,3,3-trifluorpropyl)malononitril (bekannt aus WO2005/063094), (2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl)(3,3,4,4,4-pentafluorbutyl)malononitril (bekannt aus WO2005/063094), 8-[2-(Cyclopropylmethoxy)-4-(trifluormethyl)phenoxy]-3-[6-(trifluormethyl)pyridazin-3-yl]-3-azabicyclo[3.2.1]octan (bekannt aus WO2007/040280), Flometoquin, PF1364 (CAS-Reg.Nr. 1204776-60-2) (bekannt aus JP2010/018586), 5-[5-(3,5-Dichlorphenyl)-5-(trifluormethyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzonitril

10 (bekannt aus WO2007/075459), 5-[5-(2-Chlorpyridin-4-yl)-5-(trifluormethyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzonitril (bekannt aus WO2007/075459), 4-[5-(3,5-Dichlorphenyl)-5-(trifluormethyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-2-methyl-N-{2-oxo-2-[(2,2,2-trifluorethyl)amino]ethyl}benzamid (bekannt aus WO2005/085216), 4-[[[(6-Chlorpyridin-3-yl)methyl](cyclopropyl)amino]-1,3-oxazol-2(5H)-on, 4-[[[(6-Chlorpyridin-3-yl)methyl](2,2-difluorethyl)amino]-1,3-oxazol-2(5H)-on, 4-[[[(6-Chlorpyridin-3-yl)methyl](ethyl)amino]-1,3-oxazol-2(5H)-on, 4-[[[(6-Chlorpyridin-3-yl)methyl](methyl)amino]-1,3-oxazol-2(5H)-on (alle

15 bekannt aus WO2010/005692), NNI-0711 (bekannt aus WO2002/096882), 1-Acetyl-N-[4-(1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-methoxypropan-2-yl)-3-isobutylphenyl]-N-isobutyryl-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-carboxamid (bekannt aus WO2002/096882), Methyl-2-[2-({[3-brom-1-(3-chlorpyridin-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]carbonyl}amino)-5-chlor-3-methylbenzoyl]-2-methylhydrazincarboxylat (bekannt aus WO2005/085216), Methyl-2-[2-({[3-brom-1-(3-chlorpyridin-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]carbonyl}amino)-5-cyan-3-methylbenzoyl]-2-ethylhydrazincarboxylat (bekannt aus

20 WO2005/085216), Methyl-2-[2-({[3-brom-1-(3-chlorpyridin-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]carbonyl}amino)-5-cyan-3-methylbenzoyl]-2-methylhydrazincarboxylat (bekannt aus WO2005/085216), Methyl-2-[3,5-dibrom-2-({[3-brom-1-(3-chlorpyridin-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]carbonyl}amino)benzoyl]-1,2-diethylhydrazincarboxylat (bekannt aus WO2005/085216), Methyl-2-[3,5-dibrom-2-({[3-brom-1-(3-chlorpyridin-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]carbonyl}amino)benzoyl]-2-ethylhydrazincarboxylat (bekannt aus WO2005/085216),

25 (5RS,7RS;5RS,7SR)-1-(6-Chlor-3-pyridylmethyl)-1,2,3,5,6,7-hexahydro-7-methyl-8-nitro-5-propoxyimidazo[1,2-a]pyridin (bekannt aus WO2007/101369), 2-{6-[2-(5-Fluorpyridin-3-yl)-1,3-thiazol-5-yl]pyridin-2-yl}pyrimidin (bekannt aus WO2010/006713), 2-{6-[2-(Pyridin-3-yl)-1,3-thiazol-5-yl]pyridin-2-yl}pyrimidin (bekannt aus WO2010/006713), 1-(3-Chlorpyridin-2-yl)-N-[4-cyan-2-methyl-6-(methylcarbamoyl)phenyl]-3-[[5-(trifluormethyl)-1H-tetrazol-1-yl]methyl]-1H-

30 pyrazol-5-carboxamid (bekannt aus WO2010/069502), 1-(3-Chlorpyridin-2-yl)-N-[4-cyan-2-

35

- 330 -

methyl-6-(methylcarbamoyl)phenyl]-3-{{[5-(trifluormethyl)-2H-tetrazol-2-yl]methyl}-1H-pyrazol-5-carboxamid (bekannt aus WO2010/069502), N-[2-(tert-Butylcarbamoyl)-4-cyan-6-methylphenyl]-1-(3-chlorpyridin-2-yl)-3-{{[5-(trifluormethyl)-1H-tetrazol-1-yl]methyl}-1H-pyrazol-5-carboxamid (bekannt aus WO2010/069502), N-[2-(tert-Butylcarbamoyl)-4-cyan-6-methylphenyl]-1-(3-chlorpyridin-2-yl)-3-{{[5-(trifluormethyl)-2H-tetrazol-2-yl]methyl}-1H-pyrazol-5-carboxamid (bekannt aus WO2010/069502), (1E)-N-[(6-Chlorpyridin-3-yl)methyl]-N'-cyan-N-(2,2-difluorethyl)ethanimidamid (bekannt aus WO2008/009360), N-[2-(5-Amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-4-chlor-6-methylphenyl]-3-brom-1-(3-chlorpyridin-2-yl)-1H-pyrazol-5-carboxamid (bekannt aus CN102057925) und Methyl-2-[3,5-dibrom-2-({[3-brom-1-(3-chlorpyridin-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]carbonyl}amino)benzoyl]-2-ethyl-1-methylhydrazincarboxylat (bekannt aus WO2011/049233),

und/oder mindestens einen weiteren fungiziden Wirkstoff ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus

(1) Inhibitoren der Ergosterol-Biosynthese, wie beispielsweise (1.1) Aldimorph (1704-28-5), (1.2) Azaconazol (60207-31-0), (1.3) Bitertanol (55179-31-2), (1.4) Bromuconazol (116255-48-2), (1.5) Cyproconazol (113096-99-4), (1.6) Diclobutrazol (75736-33-3), (1.7) Difenconazol (119446-68-3), (1.8) Diniconazol (83657-24-3), (1.9) Diniconazol-M (83657-18-5), (1.10) Dodemorph (1593-77-7), (1.11) Dodemorph Acetat (31717-87-0), (1.12) Epoxiconazol (106325-08-0), (1.13) Etaconazol (60207-93-4), (1.14) Fenarimol (60168-88-9), (1.15) Fenbuconazol (114369-43-6), (1.16) Fenhexamid (126833-17-8), (1.17) Fenpropidin (67306-00-7), (1.18) Fenpropimorph (67306-03-0), (1.19) Fluquinconazol (136426-54-5), (1.20) Flurprimidol (56425-91-3), (1.21) Flusilazol (85509-19-9), (1.22) Flutriafol (76674-21-0), (1.23) Furconazol (112839-33-5), (1.24) Furconazol-Cis (112839-32-4), (1.25) Hexaconazol (79983-71-4), (1.26) Imazalil (60534-80-7), (1.27) Imazalil Sulfat (58594-72-2), (1.28) Imibenconazol (86598-92-7), (1.29) Ipconazol (125225-28-7), (1.30) Metconazol (125116-23-6), (1.31) Myclobutanil (88671-89-0), (1.32) Naftifin (65472-88-0), (1.33) Nuarimol (63284-71-9), (1.34) Oxpconazol (174212-12-5), (1.35) Paclobutrazol (76738-62-0), (1.36) Pefurazoat (101903-30-4), (1.37) Penconazol (66246-88-6), (1.38) Piperalin (3478-94-2), (1.39) Prochloraz (67747-09-5), (1.40) Propiconazol (60207-90-1), (1.41) Prothioconazol (178928-70-6), (1.42) Pyributicarb (88678-67-5), (1.43) Pyrifenox (88283-41-4), (1.44) Quinconazol (103970-75-8), (1.45) Simeconazol (149508-90-7), (1.46) Spiroxamin (118134-30-8), (1.47) Tebuconazol (107534-96-3), (1.48) Terbinafin (91161-71-6), (1.49) Tetraconazol (112281-77-3), (1.50) Triadimefon (43121-43-3), (1.51) Triadimenol (89482-17-7), (1.52) Tridemorph (81412-43-3), (1.53) Triflumizol (68694-11-1), (1.54) Triforin (26644-46-2), (1.55) Triticonazol (131983-72-7), (1.56) Uniconazol (83657-22-1), (1.57) Uniconazol-p (83657-17-4), (1.58) Viniconazol (77174-66-4), (1.59) Voriconazol (137234-62-9), (1.60) 1-(4-Chlorphenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)cycloheptanol (129586-32-9), (1.61) Methyl-1-(2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl)-1H-

imidazol-5-carboxylat (110323-95-0), (1.62) N'-{5-(Difluormethyl)-2-methyl-4-[3-(trimethylsilyl)propoxy]phenyl}-N-ethyl-N-methylimidoformamid, (1.63) N-Ethyl-N-methyl-N'-{2-methyl-5-(trifluormethyl)-4-[3-(trimethylsilyl)propoxy]phenyl}imidoformamid und (1.64) O-[1-(4-Methoxyphenoxy)-3,3-dimethylbutan-2-yl]-1H-imidazol-1-carbothioat (111226-71-2).

- 5 (2) Inhibitoren der Respiration (Atmungsketten-Inhibitoren), wie beispielsweise (2.1) Bixafen (581809-46-3), (2.2) Boscalid (188425-85-6), (2.3) Carboxin (5234-68-4), (2.4) Diflumetorim (130339-07-0), (2.5) Fenfuram (24691-80-3), (2.6) Fluopyram (658066-35-4), (2.7) Flutolanil (66332-96-5), (2.8) Fluxapyroxad (907204-31-3), (2.9) Furametpyr (123572-88-3), (2.10) Furmecyclox (60568-05-0), (2.11) Isopyrazam Mischung des syn-epimeren Razemates
- 10 1RS,4SR,9RS und des anti-empimeren Razemates 1RS,4SR,9SR (881685-58-1), (2.12) Isopyrazam (anti-epimeres Razemat), (2.13) Isopyrazam (anti-epimeres Enantiomer 1R,4S,9S), (2.14) Isopyrazam (anti-epimeres Enantiomer 1S,4R,9R), (2.15) Isopyrazam (syn-epimeres Razemat 1RS,4SR,9RS), (2.16) Isopyrazam (syn-epimeres Enantiomer 1R,4S,9R), (2.17) Isopyrazam (syn-epimeres Enantiomer 1S,4R,9S), (2.18) Mepronil (55814-41-0), (2.19) Oxycarboxin (5259-88-1),
- 15 (2.20) Penflufen (494793-67-8), (2.21) Penthiopyrad (183675-82-3), (2.22) Sedaxane (874967-67-6), (2.23) Thifluzamid (130000-40-7), (2.24) 1-Methyl-N-[2-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)phenyl]-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-4-carboxamid, (2.25) 3-(Difluormethyl)-1-methyl-N-[2-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)phenyl]-1H-pyrazol-4-carboxamid, (2.26) 3-(Difluormethyl)-N-[4-fluor-2-(1,1,2,3,3,3-hexafluorpropoxy)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, (2.27) N-[1-(2,4-
- 20 Dichlorphenyl)-1-methoxypropan-2-yl]-3-(difluormethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid (1092400-95-7), (2.28) 5,8-Difluor-N-[2-(2-fluor-4-{[4-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)ethyl]quinazolin-4-amin (1210070-84-0) (bekannt aus WO2010025451), (2.29) N-[9-(Dichlormethylen)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaphthalen-5-yl]-3-(difluormethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, (2.30) N-[(1S,4R)-9-(Dichlormethylen)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-
- 25 methanonaphthalen-5-yl]-3-(difluormethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid und (2.31) N-[(1R,4S)-9-(Dichlormethylen)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaphthalen-5-yl]-3-(difluormethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid.

- (3) Inhibitoren der Respiration (Atmungsketten-Inhibitoren) am Komplex III der Atmungskette, wie beispielsweise (3.1) Ametoctradin (865318-97-4), (3.2) Amisulbrom (348635-87-0), (3.3)
- 30 Azoxystrobin (131860-33-8), (3.4) Cyazofamid (120116-88-3), (3.5) Coumethoxystrobin (850881-30-0), (3.6) Coumoxystrobin (850881-70-8), (3.5) Dimoxystrobin (141600-52-4), (3.6) Enestroburin (238410-11-2) (bekannt aus WO 2004/058723), (3.9) Famoxadon (131807-57-3) (bekannt aus WO 2004/058723), (3.10) Fenamidon (161326-34-7) (bekannt aus WO 2004/058723), (3.11) Fenoxystrobin (918162-02-4), (3.12) Fluoxastrobin (361377-29-9) (bekannt aus WO

- 2004/058723), (3.13) Kresoxim-Methyl (143390-89-0) (bekannt aus WO 2004/058723), (3.14) Metominostrobin (133408-50-1) (bekannt aus WO 2004/058723), (3.15) Orysastrobin (189892-69-1) (bekannt aus WO 2004/058723), (3.16) Picoxystrobin (117428-22-5) (bekannt aus WO 2004/058723), (3.17) Pyraclostrobin (175013-18-0) (bekannt aus WO 2004/058723), (3.18) Pyrametostrobin (915410-70-7) (bekannt aus WO 2004/058723), (3.19) Pyraoxystrobin (862588-11-2) (bekannt aus WO 2004/058723), (3.20) Pyribencarb (799247-52-2) (bekannt aus WO 2004/058723), (3.21) Triclopyricarb (902760-40-1), (3.22) Trifloxystrobin (141517-21-7) (bekannt aus WO 2004/058723), (3.23) (2E)-2-(2-{[6-(3-Chlor-2-methylphenoxy)-5-fluorpyrimidin-4-yl]oxy}phenyl)-2-(methoxyimino)-N-methylethanamid (bekannt aus WO 2004/058723), (3.24) (2E)-2-(Methoxyimino)-N-methyl-2-(2-{[[(1E)-1-[3-(trifluormethyl)phenyl]ethyliden]amino]oxy)methyl}phenyl)ethanamid (bekannt aus WO 2004/058723), (3.25) (2E)-2-(Methoxyimino)-N-methyl-2-{2-[(E)-{1-[3-(trifluormethyl)phenyl]ethoxy}imino)methyl]phenyl}ethanamid (158169-73-4), (3.26) (2E)-2-{2-[[[(1E)-1-(3-{[(E)-1-Fluor-2-phenylethenyl]oxy}phenyl)ethyliden]amino]oxy)methyl]phenyl}-2-(methoxyimino)-N-methylethanamid (326896-28-0), (3.27) (2E)-2-{2-[[[(2E,3E)-4-(2,6-Dichlorphenyl)but-3-en-2-yliden]amino]oxy)methyl]phenyl}-2-(methoxyimino)-N-methylethanamid, (3.28) 2-Chlor-N-(1,1,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)pyridin-3-carboxamid (119899-14-8), (3.29) 5-Methoxy-2-methyl-4-(2-{[[(1E)-1-[3-(trifluormethyl)phenyl]ethyliden]amino]oxy)methyl}phenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-on, (3.30) Methyl-(2E)-2-{2-[[cyclopropyl[(4-methoxyphenyl)imino]methyl]sulfanyl)methyl]phenyl}-3-methoxyprop-2-enoat (149601-03-6), (3.31) N-(3-Ethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl)-3-(formylamino)-2-hydroxybenzamid (226551-21-9), (3.32) 2-{2-[(2,5-Dimethylphenoxy)methyl]phenyl}-2-methoxy-N-methylacetamid (173662-97-0) und (3.33) (2R)-2-{2-[(2,5-Dimethylphenoxy)methyl]phenyl}-2-methoxy-N-methylacetamid (394657-24-0).
- (4) Inhibitoren der Mitose und Zellteilung, wie beispielsweise (4.1) Benomyl (17804-35-2), (4.2) Carbendazim (10605-21-7), (4.3) Chlorfenazol (3574-96-7), (4.4) Diethofencarb (87130-20-9), (4.5) Ethaboxam (162650-77-3), (4.6) Fluopicolid (239110-15-7), (4.7) Fuberidazol (3878-19-1), (4.8) Pencycuron (66063-05-6), (4.9) Thiabendazol (148-79-8), (4.10) Thiophanat-Methyl (23564-05-8), (4.11) Thiophanat (23564-06-9), (4.12) Zoxamid (156052-68-5), (4.13) 5-Chlor-7-(4-methylpiperidin-1-yl)-6-(2,4,6-trifluorphenyl)[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin (214706-53-3) und (4.14) 3-Chlor-5-(6-chlorpyridin-3-yl)-6-methyl-4-(2,4,6-trifluorphenyl)pyridazin (1002756-87-7).
- (5) Verbindungen mit Multisite-Aktivität, wie beispielsweise (5.1) Bordeauxmischung (8011-63-0), (5.2) Captafol (2425-06-1), (5.3) Captan (133-06-2) (bekannt aus WO 02/12172), (5.4) Chlorothalonil (1897-45-6), (5.5) Kupferzubereitungen wie Kupferhydroxid (20427-59-2), (5.6)

- 333 -

- 5 Kupfernaphthenat (1338-02-9), (5.7) Kupferoxid (1317-39-1), (5.8) Kupferoxychlorid (1332-40-7), (5.9) Kupfersulfat (7758-98-7), (5.10) Dichlofluanid (1085-98-9), (5.11) Dithianon (3347-22-6), (5.12) Dodine (2439-10-3), (5.13) Dodine freie Base, (5.14) Ferbam (14484-64-1), (5.15) Fluorofolpet (719-96-0), (5.16) Folpet (133-07-3), (5.17) Guazatin (108173-90-6), (5.18) Guazatinacetat, (5.19) Iminoctadin (13516-27-3), (5.20) Iminoctadinalbesilat (169202-06-6), (5.21) Iminoctadintriacetat (57520-17-9), (5.22) Mankupfer (53988-93-5), (5.23) Mancozeb (8018-01-7), (5.24) Maneb (12427-38-2), (5.25) Metiram (9006-42-2), (5.26) Zinkmetiram (9006-42-2), (5.27) Kupfer-Oxin (10380-28-6), (5.28) Propamidin (104-32-5), (5.29) Propineb (12071-83-9), (5.30) Schwefel und Schwefelzubereitungen wie beispielsweise Calciumpolysulfid (7704-34-9), (5.31) Thiram (137-26-8), (5.32) Tolyfluanid (731-27-1), (5.33) Zineb (12122-67-7) und (5.34) Ziram (137-30-4).
- (6) Resistenzinduktoren, wie beispielsweise (6.1) Acibenzolar-S-Methyl (135158-54-2), (6.2) Isotianil (224049-04-1), (6.3) Probenazol (27605-76-1) und (6.4) Tiadinil (223580-51-6).
- 15 (7) Inhibitoren der Aminosäure- und Protein-Biosynthese, wie beispielsweise (7.1) Andoprime (23951-85-1), (7.2) Blasticidin-S (2079-00-7), (7.3) Cyprodinil (121552-61-2), (7.4) Kasugamycin (6980-18-3), (7.5) Kasugamycin Hydrochlorid Hydrat (19408-46-9), (7.6) Mepanipyrim (110235-47-7), (7.7) Pyrimethanil (53112-28-0) und (7.8) 3-(5-Fluor-3,3,4,4-tetramethyl-3,4-dihydroisoquinolin-1-yl)quinolin (861647-32-7) (bekannt aus WO2005070917).
- 20 (8) Inhibitoren der ATP Produktion, wie beispielsweise (8.1) Fentin Acetat (900-95-8), (8.2) Fentin Chlorid (639-58-7), (8.3) Fentin Hydroxid (76-87-9) und (8.4) Silthiofam (175217-20-6).
- (9) Inhibitoren der Zellwandsynthese, wie beispielsweise (9.1) Benthiavalicarb (177406-68-7), (9.2) Dimethomorph (110488-70-5), (9.3) Flumorph (211867-47-9), (9.4) Iprovalicarb (140923-17-7), (9.5) Mandipropamid (374726-62-2), (9.6) Polyoxins (11113-80-7), (9.7) Polyoxorim (22976-86-9), (9.8) Validamycin A (37248-47-8) und (9.9) Valifenalat (283159-94-4; 283159-90-0).
- 25 (10) Inhibitoren der Lipid- und Membran-Synthese, wie beispielsweise (10.1) Biphenyl (92-52-4), (10.2) Chloroneb (2675-77-6), (10.3) Dicloran (99-30-9), (10.4) Edifenphos (17109-49-8), (10.5) Etridiazol (2593-15-9), (10.6) Iodocarb (55406-53-6), (10.7) Iprobenfos (26087-47-8), (10.8) Isoprothiolan (50512-35-1), (10.9) Propamocarb (25606-41-1), (10.10) Propamocarb Hydrochlorid (25606-41-1), (10.11) Prothiocarb (19622-08-3), (10.12) Pyrazophos (13457-18-6), (10.13) Quintozen (82-68-8), (10.14) Tecnazene (117-18-0) und (10.15) Toleclofos-Methyl (57018-04-9).
- 30

(11) Inhibitoren der Melanin-Biosynthese, wie beispielsweise (11.1) Carpropamid (104030-54-8), (11.2) Diclocymet (139920-32-4), (11.3) Fenoxanil (115852-48-7), (11.4) Fthalid (27355-22-2), (11.5) Pyroquilon (57369-32-1), (11.6) Tricyclazol (41814-78-2) und (11.7) 2,2,2-Trifluorethyl {3-methyl-1-[(4-methylbenzoyl)amino]butan-2-yl}carbamat (851524-22-6) (bekannt aus WO2005042474).

(12) Inhibitoren der Nukleinsäuresynthese, wie beispielsweise (12.1) Benalaxyl (71626-11-4), (12.2) Benalaxyl-M (Kiralaxyl) (98243-83-5), (12.3) Bupirimat (41483-43-6), (12.4) Clozylacon (67932-85-8), (12.5) Dimethirimol (5221-53-4), (12.6) Ethirimol (23947-60-6), (12.7) Furalaxyl (57646-30-7), (12.8) Hymexazol (10004-44-1), (12.9) Metalaxyl (57837-19-1), (12.10) Metalaxyl-M (Mefenoxam) (70630-17-0), (12.11) Ofurace (58810-48-3), (12.12) Oxadixyl (77732-09-3) und (12.13) Oxolinsäure (14698-29-4).

(13) Inhibitoren der Signaltransduktion, wie beispielsweise (13.1) Chlozolinat (84332-86-5), (13.2) Fenpiclonil (74738-17-3), (13.3) Fludioxonil (131341-86-1), (13.4) Iprodion (36734-19-7), (13.5) Procymidon (32809-16-8), (13.6) Quinoxifen (124495-18-7) und (13.7) Vinclozolin (50471-44-8).

(14) Entkoppler, wie beispielsweise (14.1) Binapacryl (485-31-4), (14.2) Dinocap (131-72-6), (14.3) Ferimzon (89269-64-7), (14.4) Fluazinam (79622-59-6) und (14.5) Meptyldinocap (131-72-6).

(15) Weitere Verbindungen, wie beispielsweise (15.1) Benthiazol (21564-17-0), (15.2) Bethoxazin (163269-30-5), (15.3) Capsimycin (70694-08-5), (15.4) Carvon (99-49-0), (15.5) Chinomethionat (2439-01-2), (15.6) Pyriofenon (Chlazafenon) (688046-61-9), (15.7) Cufraneb (11096-18-7), (15.8) Cyflufenamid (180409-60-3), (15.9) Cymoxanil (57966-95-7), (15.10) Cyprosulfamide (221667-31-8), (15.11) Dazomet (533-74-4), (15.12) Debacarb (62732-91-6), (15.13) Dichlorophen (97-23-4), (15.14) Diclomezin (62865-36-5), (15.15) Difenzoquat (49866-87-7), (15.16) Difenzoquat Methylsulphat (43222-48-6), (15.17) Diphenylamin (122-39-4), (15.18) Ecomat, (15.19) Fenpyrazamin (473798-59-3), (15.20) Flumetover (154025-04-4), (15.21) Fluoromid (41205-21-4), (15.22) Flusulfamid (106917-52-6), (15.23) Flutianil (304900-25-2), (15.24) Fosetyl-Aluminium (39148-24-8), (15.25) Fosetyl-Calcium, (15.26) Fosetyl-Natrium (39148-16-8), (15.27) Hexachlorbenzol (118-74-1), (15.28) Irumamycin (81604-73-1), (15.29) Methasulfocarb (66952-49-6), (15.30) Methylisothiocyanat (556-61-6), (15.31) Metrafenon (220899-03-6), (15.32) Mildiomycin (67527-71-3), (15.33) Natamycin (7681-93-8), (15.34) Nickel Dimethyldithiocarbamat (15521-65-0), (15.35) Nitrothal-Isopropyl (10552-74-6), (15.36) Oethilinone (26530-20-1), (15.37) Oxamocarb (917242-12-7), (15.38) Oxyfenthiin (34407-87-9), (15.39) Pentachlorphenol und dessen Salze (87-86-5), (15.40) Phenothrin, (15.41) Phosphorsäure

und deren Salze (13598-36-2), (15.42) Propamocarb-Fosetylrat, (15.43) Propanosin-Natrium (88498-02-6), (15.44) Proquinazid (189278-12-4), (15.45) Pyrimorph (868390-90-3), (15.45e) (2E)-3-(4-Tert-butylphenyl)-3-(2-chlorpyridin-4-yl)-1-(morpholin-4-yl)prop-2-en-1-on (1231776-28-5), (15.45z) (2Z)-3-(4-Tert-butylphenyl)-3-(2-chlorpyridin-4-yl)-1-(morpholin-4-yl)prop-2-en-1-on (1231776-29-6), (15.46) Pyrrolnitrin (1018-71-9) (bekannt aus EP-A 1 559 320), (15.47) Tebufloquin (376645-78-2), (15.48) Tecloftalam (76280-91-6), (15.49) Tolnifanid (304911-98-6), (15.50) Triazoxid (72459-58-6), (15.51) Trichlamid (70193-21-4), (15.52) Zarilamid (84527-51-5), (15.53) (3S,6S,7R,8R)-8-Benzyl-3-[(3-[(isobutyryloxy)methoxy]-4-methoxypyridin-2-yl)carbonyl]amino]-6-methyl-4,9-dioxo-1,5-dioxonan-7-yl 2-methylpropanoat (517875-34-2) (bekannt aus WO2003035617), (15.54) 1-(4-{4-[(5R)-5-(2,6-Difluorphenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-1,3-thiazol-2-yl}piperidin-1-yl)-2-[5-methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanon (1003319-79-6), (15.55) 1-(4-{4-[(5S)-5-(2,6-Difluorphenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-1,3-thiazol-2-yl}piperidin-1-yl)-2-[5-methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanon (1003319-80-9), (15.56) 1-(4-{4-[(5-2,6-Difluorphenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-1,3-thiazol-2-yl}piperidin-1-yl)-2-[5-methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanon (1003318-67-9), (15.57) 1-(4-Methoxyphenoxy)-3,3-dimethylbutan-2-yl-1H-imidazol-1-carboxylat (111227-17-9), (15.58) 2,3,5,6-Tetrachlor-4-(methylsulfonyl)pyridin (13108-52-6), (15.59) 2,3-Dibutyl-6-chlorthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-on (221451-58-7), (15.60) 2,6-Dimethyl-1H,5H-[1,4]dithiino[2,3-c:5,6-c']dipyrrol-1,3,5,7(2H,6H)-tetron, (15.61) 2-[5-Methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1-(4-{4-[(5R)-5-phenyl-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-1,3-thiazol-2-yl}piperidin-1-yl)ethanon (1003316-53-7), (15.62) 2-[5-Methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1-(4-{4-[(5S)-5-phenyl-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-1,3-thiazol-2-yl}piperidin-1-yl)ethanon (1003316-54-8), (15.63) 2-[5-Methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1-{4-[4-(5-phenyl-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl)-1,3-thiazol-2-yl]piperidin-1-yl}ethanon (1003316-51-5), (15.64) 2-Butoxy-6-iod-3-propyl-4H-chromen-4-on, (15.65) 2-Chlor-5-[2-chlor-1-(2,6-difluor-4-methoxyphenyl)-4-methyl-1H-imidazol-5-yl]pyridin, (15.66) 2-Phenylphenol und dessen Salze (90-43-7), (15.67) 3-(4,4,5-Trifluor-3,3-dimethyl-3,4-dihydroisoquinolin-1-yl)quinolin (861647-85-0) (bekannt aus WO2005070917), (15.68) 3,4,5-Trichlorpyridin-2,6-dicarbonitril (17824-85-0), (15.69) 3-[5-(4-Chlorphenyl)-2,3-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-yl]pyridin, (15.70) 3-Chlor-5-(4-chlorphenyl)-4-(2,6-difluorphenyl)-6-methylpyridazin, (15.71) 4-(4-Chlorphenyl)-5-(2,6-difluorphenyl)-3,6-dimethylpyridazin, (15.72) 5-Amino-1,3,4-thiadiazol-2-thiol, (15.73) 5-Chlor-N'-phenyl-N'-(prop-2-in-1-yl)thiophen-2-sulfonohydrazid (134-31-6), (15.74) 5-Fluor-2-[(4-fluorbenzyl)oxy]pyrimidin-4-amin (1174376-11-4) (bekannt aus WO2009094442), (15.75) 5-Fluor-2-[(4-methylbenzyl)oxy]pyrimidin-4-amin (1174376-25-0) (bekannt aus WO2009094442), (15.76) 5-Methyl-6-octyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amin, (15.77) Ethyl-(2Z)-3-amino-2-cyan-3-phenylprop-2-enoat, (15.78) N'-(4-{3-

(4-Chlorbenzyl)-1,2,4-thiadiazol-5-yl]oxy}-2,5-dimethylphenyl)-N-ethyl-N-methylimidofornamid, (15.79) N-(4-Chlorbenzyl)-3-[3-methoxy-4-(prop-2-in-1-yloxy)phenyl]propanamid, (15.80) N-[(4-Chlorphenyl)(cyan)methyl]-3-[3-methoxy-4-(prop-2-in-1-yloxy)phenyl]propanamid, (15.81) N-[(5-Brom-3-chlorpyridin-2-yl)methyl]-2,4-dichlorpyridin-3-carboxamid, (15.82) N-[1-(5-Brom-3-chlorpyridin-2-yl)ethyl]-2,4-dichlorpyridin-3-carboxamid, (15.83) N-[1-(5-Brom-3-chlorpyridin-2-yl)ethyl]-2-fluor-4-iodpyridin-3-carboxamid, (15.84) N-{(E)-[(Cyclopropylmethoxy)imino][6-(difluormethoxy)-2,3-difluorphenyl]methyl}-2-phenylacetamid (221201-92-9), (15.85) N-{(Z)-[(Cyclopropylmethoxy)imino][6-(difluormethoxy)-2,3-difluorphenyl]methyl}-2-phenylacetamid (221201-92-9), (15.86) N'-[4-[(3-Tert-butyl-4-cyano-1,2-thiazol-5-yl)oxy]-2-chlor-5-methylphenyl]-N-ethyl-N-methylimidofornamid, (15.87) N-Methyl-2-(1-{[5-methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetyl}piperidin-4-yl)-N-(1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)-1,3-thiazol-4-carboxamid (922514-49-6), (15.88) N-Methyl-2-(1-{[5-methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetyl}piperidin-4-yl)-N-[(1R)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl]-1,3-thiazol-4-carboxamid (922514-07-6), (15.89) N-Methyl-2-(1-{[5-methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetyl}piperidin-4-yl)-N-[(1S)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl]-1,3-thiazol-4-carboxamid (922514-48-5), (15.90) Pentyl-{6-[[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)(phenyl)methyliden]amino]oxy)methyl]pyridin-2-yl}carbamate, (15.91) Phenazin-1-carbonsäure, (15.92) Chinolin-8-ol (134-31-6), (15.93) Chinolin-8-olsulfat(2:1) (134-31-6) und (15.94) Tert-butyl {6-[[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)(phenyl)methylen]amino]oxy)methyl]pyridin-2-yl}carbamate.

(16) Weitere Verbindungen, wie beispielsweise (16.1) 1-Methyl-3-(trifluormethyl)-N-[2'-(trifluormethyl)biphenyl-2-yl]-1H-pyrazol-4-carboxamid, (16.2) N-(4'-Chlorbiphenyl-2-yl)-3-(difluormethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, (16.3) N-(2',4'-Dichlorbiphenyl-2-yl)-3-(difluormethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, (16.4) 3-(Difluormethyl)-1-methyl-N-[4'-(trifluormethyl)biphenyl-2-yl]-1H-pyrazol-4-carboxamid, (16.5) N-(2',5'-Difluorbiphenyl-2-yl)-1-methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-4-carboxamid, (16.6) 3-(Difluormethyl)-1-methyl-N-[4'-(prop-1-in-1-yl)biphenyl-2-yl]-1H-pyrazol-4-carboxamid, (16.7) 5-Fluor-1,3-dimethyl-N-[4'-(prop-1-in-1-yl)biphenyl-2-yl]-1H-pyrazol-4-carboxamid, (16.8) 2-Chlor-N-[4'-(prop-1-in-1-yl)biphenyl-2-yl]pyridin-3-carboxamid, (16.9) 3-(Difluormethyl)-N-[4'-(3,3-dimethylbut-1-in-1-yl)biphenyl-2-yl]-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, (16.10) N-[4'-(3,3-Dimethylbut-1-in-1-yl)biphenyl-2-yl]-5-fluor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, (16.11) 3-(Difluormethyl)-N-(4'-ethinylbiphenyl-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, (16.12) N-(4'-Ethinylbiphenyl-2-yl)-5-fluor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, (16.13) 2-Chlor-N-(4'-ethinylbiphenyl-2-yl)pyridin-3-carboxamid, (16.14) 2-Chlor-N-[4'-(3,3-dimethylbut-1-in-1-yl)biphenyl-2-yl]pyridin-3-carboxamid (bekannt aus

- 337 -

- EP-A 1 559 320), (16.15) 4-(Difluormethyl)-2-methyl-N-[4'-(trifluormethyl)biphenyl-2-yl]-1,3-thiazol-5-carboxamid, (16.16) 5-Fluor-N-[4'-(3-hydroxy-3-methylbut-1-in-1-yl)biphenyl-2-yl]-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, (16.17) 2-Chlor-N-[4'-(3-hydroxy-3-methylbut-1-in-1-yl)biphenyl-2-yl]pyridin-3-carboxamid, (16.18) 3-(Difluormethyl)-N-[4'-(3-methoxy-3-methylbut-1-in-1-yl)biphenyl-2-yl]-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, (16.19) 5-Fluor-N-[4'-(3-methoxy-3-methylbut-1-in-1-yl)biphenyl-2-yl]-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-carboxamid, (16.20) 2-Chlor-N-[4'-(3-methoxy-3-methylbut-1-in-1-yl)biphenyl-2-yl]pyridin-3-carboxamid, (16.21) (5-Brom-2-methoxy-4-methylpyridin-3-yl)(2,3,4-trimethoxy-6-methylphenyl)methanon, (16.22) N-[2-(4-{[3-(4-Chlorphenyl)prop-2-in-1-yl]oxy}-3-methoxyphenyl)ethyl]-N2-(methylsulfonyl)valinamid (220706-93-4), (16.23) 4-Oxo-4-[(2-phenylethyl)amino]butansäure und (16.24) But-3-yn-1-yl {6-[[[(Z)-(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)(phenyl)methylen]amino]oxy)methyl]pyridin-2-yl}carbamat.
18. Agrochemische Zusammensetzungen, dadurch gekennzeichnet, dass sie mindestens eine Verbindung der Formel (I) gemäß den Ansprüchen 1 bis 16 oder eine Zusammensetzung gemäß Anspruch 17, sowie Streckmittel und/oder oberflächenaktive Stoffe enthalten.
- 15 19. Verfahren zur Herstellung agrochemischer Zusammensetzungen, dadurch gekennzeichnet, dass man Verbindungen der Formel (I) gemäß den Ansprüchen 1 bis 16 oder eine Zusammensetzung gemäß Anspruch 17 mit Streckmitteln und/oder oberflächenaktiven Stoffen vermischt.
20. Verfahren zur Bekämpfung tierischer Schädlinge, dadurch gekennzeichnet, dass man Verbindungen der Formel (I) gemäß den Ansprüchen 1 bis 16 oder eine Zusammensetzung gemäß Anspruch 17 auf tierische Schädlinge und/oder deren Lebensraum einwirken lässt.
- 20 21. Verwendung von Verbindungen der Formel (I) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 16 oder einer Zusammensetzung gemäß Anspruch 17 zur Bekämpfung tierischer Schädlinge im Pflanzenschutz, im Materialschutz und/oder im veterinärmedizinischen Sektor.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/EP2014/062510

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

INV. C07D233/34 C07D233/74 C07D233/96 C07D249/12 C07D207/22
 C07D207/404 C07D277/54 A01N43/50 A61K31/402 A01N43/653
 A01N43/36 A01N43/78 A61K31/4196 A61K31/4166 A61K31/426

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

C07D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 2 202 226 A1 (KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO [JP]; IHARA CHEMICAL IND CO [JP]) 30 June 2010 (2010-06-30)	1,17-21
Y	das gesamte Dokument, insbesondere die Ansprüche, Verbindung 1-216 in Tabelle 4 auf Seite 25; Verbindungen 2-2, 2-4, 2-6 bis 2-10 und 2-14 in Tabelle 63 auf Seite 142; die Verbindung in Absatz [0441]; Absatz [0349] in Beispiel 1; Absätze [0317], [0123], [0203], [0214], [0224] und [0286]	1-21
X	JP 2007 284386 A (KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO; IHARA CHEMICAL IND CO) 1 November 2007 (2007-11-01)	1
A	insbesondere Ansprüche 1, 4; Schemata 11, 16; Arbeitsbeispiel 3; Absatz [0299]; Zusammenfassung	2-21
	----- -/--	



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

9 July 2014

Date of mailing of the international search report

17/07/2014

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Hanisch, Inken

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2014/062510

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	WO 97/26248 A1 (BAYER AG [DE]; LINKER KARL HEINZ [DE]; HAAS WILHELM [DE]; LENDER ANDRE) 24 July 1997 (1997-07-24) das ganze Dokument, insbesondere die Ansprüche und die Beispiele (z.B. Beispiel 50 auf Seite 81) -----	1-21
Y	EP 1 803 712 A1 (KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO [JP]; IHARA CHEMICAL IND CO [JP]) 4 July 2007 (2007-07-04) insbesondere die Ansprüche; Tabellen 13, 15 und 17; z.B. Beispiele 1 oder 2 -----	1-21
Y	WO 2010/100189 A1 (BASF SE [DE]; GROSS STEFFEN [DE]; KOERBER KARSTEN [DE]; DEYN WOLFGANG) 10 September 2010 (2010-09-10) das gesamte Dokument, insbesondere die Ansprüche; Seite 68; Beispiele 1-4; Verbindungen 1-5, 1-9 bis 1-13, 1-16, 1-17 und 1-20 bis 1-35 in Tabelle C -----	1-21

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2014/062510

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
EP 2202226	A1	30-06-2010	CN	101821239 A		01-09-2010
			EP	2202226 A1		30-06-2010
			JP	5295971 B2		18-09-2013
			US	2010210704 A1		19-08-2010
			WO	2009051245 A1		23-04-2009

JP 2007284386	A	01-11-2007	NONE			

WO 9726248	A1	24-07-1997	AU	1439497 A		11-08-1997
			DE	19601626 A1		24-07-1997
			WO	9726248 A1		24-07-1997

EP 1803712	A1	04-07-2007	AU	2005296529 A1		27-04-2006
			BR	PI0516976 A		30-09-2008
			CA	2581725 A1		27-04-2006
			CN	101039922 A		19-09-2007
			EP	1803712 A1		04-07-2007
			IL	182594 A		30-04-2013
			JP	4970950 B2		11-07-2012
			KR	20070064321 A		20-06-2007
			NZ	553200 A		25-09-2009
			RU	2007118700 A		27-11-2008
			TW	1382020 B		11-01-2013
			UA	86251 C2		10-04-2009
			US	2009076282 A1		19-03-2009
			WO	2006043635 A1		27-04-2006
			ZA	200702684 A		27-08-2008

WO 2010100189	A1	10-09-2010	AR	075717 A1		20-04-2011
			AU	2010220293 A1		22-09-2011
			CA	2751836 A1		10-09-2010
			CN	102341376 A		01-02-2012
			CR	20110458 A		21-09-2011
			EP	2403837 A1		11-01-2012
			ES	2444270 T3		24-02-2014
			JP	2012519662 A		30-08-2012
			KR	20110123790 A		15-11-2011
			TW	201034573 A		01-10-2010
			US	2012053052 A1		01-03-2012
			UY	32471 A		31-08-2010
			WO	2010100189 A1		10-09-2010

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES				
INV.	C07D233/34	C07D233/74	C07D233/96	C07D249/12
	C07D207/404	C07D277/54	A01N43/50	A61K31/402
	A01N43/36	A01N43/78	A61K31/4196	A61K31/4166
				A61K31/426

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

C07D

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 2 202 226 A1 (KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO [JP]; IHARA CHEMICAL IND CO [JP]) 30. Juni 2010 (2010-06-30)	1,17-21
Y	das gesamte Dokument, insbesondere die Ansprüche, Verbindung 1-216 in Tabelle 4 auf Seite 25; Verbindungen 2-2, 2-4, 2-6 bis 2-10 und 2-14 in Tabelle 63 auf Seite 142; die Verbindung in Absatz [0441]; Absatz [0349] in Beispiel 1; Absätze [0317], [0123], [0203], [0214], [0224] und [0286]	1-21
X	JP 2007 284386 A (KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO; IHARA CHEMICAL IND CO) 1. November 2007 (2007-11-01)	1
A	insbesondere Ansprüche 1, 4; Schemata 11, 16; Arbeitsbeispiel 3; Absatz [0299]; Zusammenfassung	2-21
	----- -/-	



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

9. Juli 2014

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

17/07/2014

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Hanisch, Inken

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	WO 97/26248 A1 (BAYER AG [DE]; LINKER KARL HEINZ [DE]; HAAS WILHELM [DE]; LENDER ANDRE) 24. Juli 1997 (1997-07-24) das ganze Dokument, insbesondere die Ansprüche und die Beispiele (z.B. Beispiel 50 auf Seite 81) -----	1-21
Y	EP 1 803 712 A1 (KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO [JP]; IHARA CHEMICAL IND CO [JP]) 4. Juli 2007 (2007-07-04) insbesondere die Ansprüche; Tabellen 13, 15 und 17; z.B. Beispiele 1 oder 2 -----	1-21
Y	WO 2010/100189 A1 (BASF SE [DE]; GROSS STEFFEN [DE]; KOERBER KARSTEN [DE]; DEYN WOLFGANG) 10. September 2010 (2010-09-10) das gesamte Dokument, insbesondere die Ansprüche; Seite 68; Beispiele 1-4; Verbindungen 1-5, 1-9 bis 1-13, 1-16, 1-17 und 1-20 bis 1-35 in Tabelle C -----	1-21

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2014/062510

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 2202226	A1	30-06-2010	CN 101821239 A 01-09-2010
		EP 2202226 A1	30-06-2010
		JP 5295971 B2	18-09-2013
		US 2010210704 A1	19-08-2010
		WO 2009051245 A1	23-04-2009

JP 2007284386	A	01-11-2007	KEINE

WO 9726248	A1	24-07-1997	AU 1439497 A 11-08-1997
		DE 19601626 A1	24-07-1997
		WO 9726248 A1	24-07-1997

EP 1803712	A1	04-07-2007	AU 2005296529 A1 27-04-2006
		BR PI0516976 A	30-09-2008
		CA 2581725 A1	27-04-2006
		CN 101039922 A	19-09-2007
		EP 1803712 A1	04-07-2007
		IL 182594 A	30-04-2013
		JP 4970950 B2	11-07-2012
		KR 20070064321 A	20-06-2007
		NZ 553200 A	25-09-2009
		RU 2007118700 A	27-11-2008
		TW I382020 B	11-01-2013
		UA 86251 C2	10-04-2009
		US 2009076282 A1	19-03-2009
		WO 2006043635 A1	27-04-2006
		ZA 200702684 A	27-08-2008

WO 2010100189	A1	10-09-2010	AR 075717 A1 20-04-2011
		AU 2010220293 A1	22-09-2011
		CA 2751836 A1	10-09-2010
		CN 102341376 A	01-02-2012
		CR 20110458 A	21-09-2011
		EP 2403837 A1	11-01-2012
		ES 2444270 T3	24-02-2014
		JP 2012519662 A	30-08-2012
		KR 20110123790 A	15-11-2011
		TW 201034573 A	01-10-2010
		US 2012053052 A1	01-03-2012
		UY 32471 A	31-08-2010
		WO 2010100189 A1	10-09-2010
