



DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets ⁶ : C12N 15/86, A61K 48/00, C12N 15/24, 15/26, C07K 14/55, 14/54	A2	(11) Numéro de publication internationale: WO 95/09241 (43) Date de publication internationale: 6 avril 1995 (06.04.95)
(21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR94/01133 (22) Date de dépôt international: 28 septembre 1994 (28.09.94) (30) Données relatives à la priorité: 93/11601 29 septembre 1993 (29.09.93) FR (71) Déposant: TRANSGENE S.A. [FR/FR]; 11, rue de Molsheim, F-67000 Strasbourg (FR). (72) Inventeur: ACRES, Bruce; 20, rue L.-Apffel, F-67000 Strasbourg (FR). (74) Mandataire: WARCOIN, Jacques; Cabinet Regimbeau, 26, avenue Kléber, F-75116 Paris (FR).		(81) Etats désignés: AU, JP, brevet européen (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). Publiée <i>Sans rapport de recherche internationale, sera republiée dès réception de ce rapport.</i>
(54) Title: ANTI-CANCER GENE THERAPY BY MODULATION OF IMMUNE OR INFLAMMATORY RESPONSE (54) Titre: THERAPIE GENIQUE ANTICANCEREUSE PAR MODULATION DE LA REPOSE IMMUNITAIRE ET/OU INFLAMMATOIRE (57) Abstract A viral vector in whose genome is inserted a DNA fragment comprising one or more genes coding for all or part of an immune and/or inflammatory response modulating gene, is used in the preparation of a drug for the treatment of cancers in mammals. The invention concerns specifically the use of a viral vector derived from a poxvirus in whose genome is inserted a gene coding for a cytokin, in particular, interleukine-2, 4, 5, 6 or 7, gamma interferon, the colony stimulating factor or type β tumour necrosis factor. (57) Abrégé La présente invention a trait à l'usage d'un vecteur viral dans le génome duquel est inséré un fragment d'ADN comportant un ou plusieurs gènes codant pour tout ou partie d'un agent modulateur de la réponse immunitaire et/ou inflammatoire, pour la préparation d'un médicament pour le traitement des cancers chez les mammifères. Elle concerne plus particulièrement l'usage d'un vecteur viral dérivé d'un poxvirus dans le génome duquel est inséré un gène codant pour une cytokine, notamment une interleukine-2, 4, 5, 6 ou 7, l'interféron gamma, le facteur stimulant les colonies ou le facteur nécrosant les tumeurs de type β.		

UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AT	Autriche	GB	Royaume-Uni	MR	Mauritanie
AU	Australie	GE	Géorgie	MW	Malawi
BB	Barbade	GN	Guinée	NE	Niger
BE	Belgique	GR	Grèce	NL	Pays-Bas
BF	Burkina Faso	HU	Hongrie	NO	Norvège
BG	Bulgarie	IE	Irlande	NZ	Nouvelle-Zélande
BJ	Bénin	IT	Italie	PL	Pologne
BR	Brésil	JP	Japon	PT	Portugal
BY	Bélarus	KE	Kenya	RO	Roumanie
CA	Canada	KG	Kirghizistan	RU	Fédération de Russie
CF	République centrafricaine	KP	République populaire démocratique de Corée	SD	Soudan
CG	Congo	KR	République de Corée	SE	Suède
CH	Suisse	KZ	Kazakhstan	SI	Slovénie
CI	Côte d'Ivoire	LI	Liechtenstein	SK	Slovaquie
CM	Cameroun	LK	Sri Lanka	SN	Sénégal
CN	Chine	LU	Luxembourg	TD	Tchad
CS	Tchécoslovaquie	LV	Lettonie	TG	Togo
CZ	République tchèque	MC	Monaco	TJ	Tadjikistan
DE	Allemagne	MD	République de Moldova	TT	Trinité-et-Tobago
DK	Danemark	MG	Madagascar	UA	Ukraine
ES	Espagne	ML	Mali	US	Etats-Unis d'Amérique
FI	Finlande	MN	Mongolie	UZ	Ouzbékistan
FR	France			VN	Viet Nam
GA	Gabon				

5

10 **THERAPIE GENIQUE ANTICANCEREUSE PAR MODULATION DE LA REPONSE
IMMUNITAIRE ET/OU INFLAMMATOIRE**

15 La présente invention concerne une méthode de traitement du cancer par thérapie génique. Elle a plus particulièrement pour objet l'usage d'un vecteur viral afin de délivrer au niveau des cellules tumorales, un gène codant pour un agent modulateur de la réponse immunitaire et/ou inflammatoire.

20 Il est généralement admis que le cancer est une maladie qui résulte d'une perte du contrôle de la multiplication cellulaire. Ses causes peuvent être multiples et dues notamment à un défaut de fonctionnement de gènes cellulaires (activation de gènes potentiellement oncogènes, par exemple par mutation(s) somatique(s) de gènes normaux ; dérégulation de l'expression de gènes cellulaires ; inhibition de l'expression de gènes suppresseurs de
25 tumeurs) ou à l'expression indésirable de gènes viraux.

Au cours de ces 20 dernières années, il a été démontré que la plupart des cellules tumorales présentent à leur surface des antigènes spécifiques de tumeurs (antigènes du non-soi) qui ne trouvent pas leurs équivalents dans les cellules normales. Ces antigènes tumeur-
30 spécifiques sont par exemple (i) des antigènes cellulaires dont l'expression survient pendant la période foeto-embryonnaire et régresse à la naissance jusqu'à disparaître, (ii) des antigènes qui s'expriment normalement à un très faible niveau et qui, exprimés à fort niveau, deviennent caractéristiques d'une tumeur ou (iii) des antigènes cellulaires dont la structure ou la conformation est modifiée.

35

En principe, l'expression aberrante de ces antigènes tumeur-spécifiques est susceptible de déclencher une réponse immunitaire du même type que celle induite par tout antigène du non-soi. Celle-ci met en oeuvre l'ensemble des cellules du système immunitaire dont les neutrophiles, lymphocytes, monocytes et macrophages.

5

D'une manière générale, il existe deux grands types de réponse immunitaire : la réponse de type humorale qui correspond à la production d'anticorps par les lymphocytes B et la réponse immunitaire à médiation cellulaire à effet cytotoxique, qui fait intervenir des cellules effectrices, essentiellement des lymphocytes T cytotoxiques (T_C), des cellules NK (pour Natural Killer en anglais) et des cellules phagocytaires. Des cellules régulatrices modulent les deux types de réponses immunitaires : essentiellement les lymphocytes T auxiliaires (T_H pour T helper en anglais) et les lymphocytes T suppresseurs (T_S).

10

Une réponse immunitaire est un phénomène extrêmement complexe qui requiert notamment la coopération de différents types cellulaires. Cette coopération s'effectue par l'intermédiaire des cytokines qui sont des molécules solubles qui interviennent en tant que médiateur de cellule à cellule.

15

En ce qui concerne l'immunité humorale, les lymphocytes B sont stimulés par des antigènes du non-soi dans leur conformation native. En réponse à cette stimulation, les lymphocytes B produisent des anticorps spécifiques dirigés contre ces antigènes étrangers.

20

Les lymphocytes T en revanche, ne peuvent être stimulés que par des peptides, produits de dégradation des antigènes du non-soi, présentés à la surface des cellules présentatrices d'antigènes (CPA) en association avec des antigènes du complexe majeur d'histocompatibilité (CMH).

25

L'activation des lymphocytes T a pour effet de déclencher leur amplification et la mise en oeuvre de leurs fonctions ; en particulier, la destruction des cellules infectées ou tumorales par les lymphocytes cytotoxiques.

30

Seule une classe d'antigènes désignée super-antigènes, n'est pas présentée de façon conventionnelle. En effet, les super-antigènes sont capables de se lier aux molécules du CMH sans être au préalable dégradés en peptides et peuvent activer simultanément une quantité de lymphocytes T supérieure à celle qui le serait par la voie des antigènes classiques. Ces super-antigènes sont donc susceptibles d'induire une forte réponse immunitaire.

35

L'inflammation est déclenchée par la réponse de l'organisme à l'égard d'une agression, par exemple une blessure ou une infection. La réponse inflammatoire comprend toute une série de réactions dont notamment la libération de molécules chimiotactiques ou chémoattractives (également désignées sous le terme chémokines) qui vont attirer les

5 cellules du système immunitaire au site même de l'inflammation.

Les lymphocytes T activés produisent entre autres, des molécules inhibitrices des phénomènes de migration cellulaire, comme le MIF (pour Migration Inhibition Factor en anglais). Comme son nom l'indique, le MIF a pour rôle d'inhiber la migration des

10 macrophages, et par conséquent, de favoriser leur concentration au niveau du site d'inflammation pour qu'ils exercent leur fonction de phagocytose dans des conditions optimales.

Dans le cas d'un cancer déclaré, la réponse immunitaire anti-tumorale est déficiente, soit

15 parce que le système immunitaire lui-même est déficient, soit parce que les changements phénotypiques des cellules tumorales inhibent ou ne suffisent pas à déclencher la réponse immunitaire.

Afin de traiter les cancers, il a déjà été proposé de renforcer la réponse immunitaire anti-tumorale en administrant à des patients, des doses systémiques et répétées de cytokines telles que l'interleukine-2 (IL-2), l'interféron ($IFN\gamma$) ou le facteur nécrosant des tumeurs (TNF) de type α (Rosenberg, 1992, J. Clin. Oncology, 10, 180-199). Malheureusement les effets secondaires sont non-négligeables, allant de la nausée voire même jusqu'à la

20 mort. De plus, un tel traitement s'avère extrêmement coûteux.

Dans le même esprit, on a aussi proposé une méthode alternative basée sur le transfert *ex vivo* d'un gène codant pour une molécule immunostimulante, dans les cellules d'un patient ; ceci à des fins d'expression. Brièvement, (i) on prélève chez un patient, des cellules tumorales ou des lymphocytes infiltrant les tumeurs (TIL pour Tumor Infiltrating

25 Lymphocyte en anglais) ; (ii) on les transfecte *ex vivo* par un vecteur portant un gène codant pour une molécule immunostimulante telle que l'IL-2, l'IL-4, l'IL-6 et le $TNF\alpha$; et (iii) on les réimplante chez le patient dont elles sont issues.

30

Comme précédemment, les essais cliniques n'ont jusqu'à présent donné que des résultats modestes, voire décevants. De nombreux expérimentateurs font état d'une faible expression

35 (Anderson, 1993, Science, 259, 1391-1392). De plus, un tel protocole est difficilement applicable à grande échelle. En effet, il nécessite la culture en masse de cellules pour

- 4 -

chaque malade à traiter, avec les inconvénients que cela implique d'un point de vue coût, temps et risque. En outre, on ne peut garantir l'absence d'expression de nouveaux variants antigéniques tumoraux pendant la phase de culture *in vitro*.

5 Très récemment, Plautz et al (1993, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 90, 4645-4649) ont reporté la transfection directe *in vivo* de cellules tumorales de souris par un rétrovirus recombinant. Ce dernier a été modifié afin de permettre l'expression d'un ADN complémentaire (ADNc) codant pour un antigène de surface murin du CMH. L'antigène retenu est allogénique, c'est-à-dire présentant une variation génétique par rapport à la
10 souris hôte, dans le but de stimuler la réponse immunitaire à l'encontre des cellules tumorales exprimant cet antigène. Si cette méthode supprime le besoin d'établir une lignée cellulaire pour chaque malade, elle n'est cependant applicable qu'aux tumeurs accessibles par chirurgie.

15 On a maintenant trouvé qu'un virus de la vaccine administré à une souris développant une tumeur, infecte préférentiellement les tissus cancéreux. Lorsque le virus de la vaccine est porteur d'un gène codant pour une molécule immunostimulante, on observe une inhibition de la croissance des tumeurs et dans certains cas une régression complète.

20 C'est pourquoi la présente invention a pour objet l'usage d'un vecteur viral dans le génome duquel est inséré un fragment d'ADN comportant un ou plusieurs gènes codant pour au moins un agent intervenant dans la destruction des cellules cancéreuses, e.g. un agent toxique pour les cellules cancéreuses ou un agent modulateur de la réponse immunitaire et/ou inflammatoire ; pour la préparation d'un médicament pour le traitement du cancer
25 chez les mammifères.

Par "vecteur viral", on entend un virus dont le génome a été modifié de manière à permettre le transfert et l'expression d'un gène d'intérêt dans une cellule eucaryote. Un vecteur viral pouvant être mis en oeuvre dans le cadre de la présente invention, peut être
30 dérivé notamment d'un poxvirus, d'un virus de l'herpès, d'un rétrovirus ou d'un adénovirus. Avantagusement, il s'agira d'un vecteur non-intégratif, non-réplicatif et pour lequel la cellule-hôte d'origine est non-humaine, comme par exemple le poxvirus du canari. De tels vecteurs ainsi que leurs techniques de préparation sont connus de l'homme de l'art.

35 S'agissant d'un vecteur viral dérivé d'un adénovirus, celui-ci sera de préférence constitué par le génome complet de l'adénovirus au moins dépourvu du gène E1A situé à l'extrémité

5' et codant pour une protéine trans-activatrice essentielle à la réplication de l'adénovirus. Il sera donc propagé dans une lignée cellulaire de complémentation fournissant en *trans* le produit d'expression du gène E1A. Il va de soi que l'on peut modifier ou déléter d'autres régions du génome adénoviral, en particulier la région E3 non-essentielle et, de manière alternative, les autres régions essentielles à la réplication virale dans la mesure où les fonctions manquantes sont complémentées en *trans*. Un tel vecteur comprendra néanmoins les séquences essentielles à l'encapsidation, à savoir les ITRs (Inverted Terminal Repeat) 5' et 3' et la région d'encapsidation. Les différents vecteurs adénoviraux ainsi que leurs techniques de préparation sont conventionnels et sont présentés dans Graham et Preveet (Methods in Molecular Biology, vol 7, p 109-128 ; Ed : E.J. Murey, The human Press Inc.).

Selon un mode particulièrement préféré, un vecteur viral utile aux fins de la présente invention est dérivé d'un poxvirus, notamment d'un virus de la vaccine ou d'un poxvirus aviaire, tel que le poxvirus du canari ; ce dernier étant préféré.

Les conditions générales d'obtention d'un virus de la vaccine capable d'exprimer un gène hétérologue sont décrites dans le brevet européen EP 83 286 et la demande EP 206 920. Selon un mode avantageux, ledit fragment d'ADN sera inséré dans le gène TK du virus de la vaccine, de façon à inactiver le gène viral et faciliter la sélection des virus de la vaccine recombinants.

Conformément aux buts poursuivis par la présente invention, un vecteur viral peut en outre comprendre un bloc d'expression d'un gène marqueur de sélection afin de faciliter les étapes d'isolement et de purification du virus recombinant. On peut citer notamment le gène *Neo* conférant la résistance à l'antibiotique G418 ou le gène TK du virus de l'herpès simplex de type 1 (HSV-1) qui confère la sensibilité à certains analogues de nucléosides tels que le ganciclovir ou l'acyclovir.

Un tel vecteur viral peut également inclure un gène autre que ceux définis ci-dessus qui peut agir de façon coopérative à l'effet modulateur de la réaction immunitaire et/ou inflammatoire recherché. Il s'agira avantageusement d'un gène codant pour tout ou partie d'un antigène spécifique de tumeurs. On peut citer plus particulièrement les protéines E6, E7 du virus HPV notamment de type 16 ou 18 impliquées dans les cancers de l'utérus, la protéine MUC1 et, plus particulièrement la région répétée de celle-ci, impliquée dans les cancers du sein et enfin l'antigène GA. 733.2 impliquée dans les cancers colorectaux. Les séquences codant pour ces antigènes sont décrites dans l'art antérieur. Il est à la portée de

- 6 -

l'homme du métier de les isoler, par exemple par la technique du PCR (Polymérase Chain Reaction) en mettant en oeuvre des amorces complémentaires, de les insérer dans le vecteur viral retenu en amont ou en aval du gène modulateur et de les placer sous le contrôle des éléments nécessaires à leur expression.

5

Aux fins de la présente invention, un fragment d'ADN comportant un ou plusieurs gènes codant pour tout ou partie d'un agent modulateur de la réponse immunitaire et/ou inflammatoire, ci-après désigné agent modulateur, est introduit dans un vecteur viral, véhicule de transfert et d'expression du(des) dit(s) gène(s). Les méthodes pour insérer un

10 fragment d'ADN dans un vecteur viral sont connues de l'homme du métier.

Par ailleurs, le gène codant pour un agent modulateur peut être de type génomique (comportant tout ou partie de l'ensemble des introns du gène naturel), de type ADN complémentaire (ADNc) dépourvu d'intron ou de type minigène c'est à dire mixte

15 comportant au moins un intron. Il peut coder pour un agent modulateur natif tel que trouvé dans un mammifère, pour une partie de celui-ci, pour une molécule chimérique provenant de la fusion de séquences d'origine diverse ou un mutant présentant des propriétés biologiques améliorées ou modifiées, à la condition toutefois que ces molécules exercent une fonction immunomodulatrice ou modulatrice de la réponse inflammatoire. Un tel

20 mutant peut être obtenu par mutation, délétion, substitution et/ou addition d'un ou plusieurs nucléotide(s) du gène codant pour ledit agent modulateur. Le gène en question peut coder pour (i) une molécule soluble, soit intracellulaire soit sécrétée dans le milieu extérieur ou (ii) une molécule ancrée dans la membrane et donc présente à la surface des cellules qui l'expriment.

25

Les gènes codant pour un agent modulateur peuvent être obtenus par clonage, par PCR ou par synthèse chimique selon les techniques conventionnelles communément en usage.

Bien entendu, le fragment d'ADN peut comprendre les éléments appropriés de régulation de la transcription ainsi que des signaux d'initiation et de terminaison de la traduction permettant l'expression du ou des gène(s) codant pour un agent modulateur. Parmi ces

30 éléments, la région promotrice revêt une importance particulière.

D'une façon générale, on aura recours à une région promotrice fonctionnelle dans les cellules du mammifère que l'on veut traiter, de préférence dans les cellules humaines. Il

35 peut s'agir de la région promotrice gouvernant naturellement l'expression dudit gène ou d'une région promotrice d'origine différente, par exemple issue de gènes eucaryotes ou

- 7 -

viraux. D'autre part, la région promotrice peut être modifiée de manière à contenir des séquences régulatrices, par exemple un élément activateur de la transcription (enhancer) ou des séquences répondant à certains signaux cellulaires.

- 5 La région promotrice retenue pourra être constitutive ou régulable, et dans ce dernier cas, régulable en réponse à certains signaux cellulaires, tissu-spécifiques ou événement-spécifiques. Il sera avantageux d'utiliser une région promotrice tissu-spécifique, lorsque la tumeur à traiter est issue d'un type cellulaire particulier. D'une manière alternative, l'utilisation d'un promoteur répondant à des signaux spécifiquement tumoraux (par exemple
- 10 régulable par la présence de facteurs de croissance généralement libérés par les cellules tumorales) peut s'avérer avantageux puisque l'expression sera limitée aux cellules tumorales.

- De tels promoteurs sont généralement connus de l'homme de l'art. On peut citer
- 15 notamment les promoteurs SV40 (Virus Simian 40), HMG (Hydroxy-Methyl-Glutaryl-coenzyme A), TK (Thymidine Kinase), les LTRs (Long Terminal Repeat) du RSV (Rous Sarcoma Virus), du Mo-MLV (Moloney Murine Leukemia Virus), le MLP (Major Late Promoter) de l'adénovirus, les promoteurs 7,5K et H5R du virus de la vaccine, les promoteurs foie-spécifiques des gènes de l' α 1- antitrypsine, de l'albumine, du facteur IX
- 20 de la coagulation et de la transferrine et les promoteurs des gènes d'immunoglobulines qui permettent l'expression des gènes qu'ils gouvernent dans les lymphocytes. Ces exemples ne sont pas limitatifs.

- Dans le cadre de la présente invention, un fragment d'ADN peut comporter un ou
- 25 plusieurs gène(s) codant pour un agent modulateur qui peuvent être placés sous le contrôle des éléments permettant leur expression, de façon indépendante ou commune. En d'autres termes, le fragment d'ADN pourra contenir une ou plusieurs cassettes d'expression d'un ou plusieurs gènes codant pour un agent modulateur.

- 30 Par ailleurs, le fragment d'ADN peut également inclure une séquence signal permettant la sécrétion de l'agent modulateur en question en dehors de la cellule. Il peut s'agir de la séquence signal naturelle du gène codant pour ledit agent modulateur ou bien d'une séquence signal hétérologue fonctionnelle dans les cellules eucaryotes, par exemple la séquence signal du gène codant pour la transferrine ou l' α 1-antitrypsine.

- 35 Par agent modulateur de la réponse immunitaire et/ou inflammatoire, on entend toute molécule notamment capable :

- 8 -

- de stimuler une réponse immunitaire humorale, en activant les lymphocytes B, afin d'amplifier la production d'anticorps dirigés contre les antigènes spécifiques de tumeurs ;
- 5 - de stimuler une réponse immunitaire à médiation cellulaire, en activant les lymphocytes T, afin de déclencher une réponse cytotoxique ou de type hypersensitivité retardée (DTH) significative à l'encontre des cellules tumorales ;
- 10 - d'induire ou de stimuler une réponse inflammatoire, afin de drainer les cellules du système immunitaire au niveau du site tumoral ; ou
- 15 - d'inhiber les phénomènes de migration cellulaire, afin de conserver les cellules du système immunitaire au site même ou à proximité d'un site tumoral.
- 20 Une molécule présentant une ou plusieurs des fonctions ci-dessus définies, peut être sélectionnée notamment parmi (I) les cytokines, (II) les molécules co-stimulantes de surface cellulaire, (III) les chémokines, (IV) les anticorps monoclonaux dirigés contre des marqueurs de surface lymphocytaire, (V) les super-antigènes caractéristiques d'un organisme infectieux (bactérie, virus ou parasite) et (VI) les polypeptides à fonction d'adjuvant.

(I)

25 Des cytokines avantageuses aux fins de la présente invention, sont celles produites par les cellules du système immunitaire, notamment les lymphocytes et les macrophages ou bien leurs cellules souches progénitrices et qui interviennent dans l'activation des cellules du système immunitaire, le transport de signaux entre les cellules du système immunitaire et la différenciation cellulaire des cellules souches en cellules matures de la circulation sanguine.

30

A titre de cytokines utiles aux fins de présente invention, on cite notamment :

35 (1) Les interleukines (IL). A l'heure actuelle, 16 interleukines ont été identifiées. Il est particulièrement difficile de leur attribuer une fonction spécifique car elles exercent des effets pléiotropes. Dans le cadre de la présente invention, toutes les interleukines présentent un intérêt, mais on cite plus particulièrement :

- 9 -

- L'IL-1, qui est produite par les macrophages à la suite d'une stimulation par des composants bactériens. Son rôle s'exerce au niveau de l'activation lymphocytaire. L'IL-1 est aussi une molécule pro-inflammatoire et à ce titre induit la production de chémokines.
 - 5 - L'IL-2, qui est responsable de la prolifération des lymphocytes T activés, et qui, en association avec l'IFN γ , stimule la production d'anticorps par les lymphocytes B. De plus, certaines études tendent à montrer qu'elle a un rôle chimiotactique pour les lymphocytes lorsqu'elle est produite au niveau d'une tumeur.
 - 10 - L'IL-4, qui est produite par les lymphocytes T activés et stimule la croissance des lymphocytes B et, dans certains cas, des lymphocytes T.
 - L'IL-5, qui favorise la multiplication et la différenciation des leucocytes éosinophiles ainsi que, dans une moindre mesure, la production des anticorps.
 - 15 - L'IL-6, qui est produite par les macrophages et les lymphocytes T. Elle a un effet pléiotropique et intervient entre autre en tant que stimulant de l'activité cytotoxique des lymphocytes T et de la production d'anticorps. Il s'agit également d'une molécule pro-inflammatoire.
 - 20 - L'IL-7, qui est produite par les cellules du stroma de la moelle osseuse et intervient dans la prolifération des lymphocytes pré-B et -T.
 - 25 - L'IL-12, qui est produite par les macrophages activés et induit la production d'IFN γ .
- (2) Les interférons (IFN), qui possèdent des propriétés antivirales et immunomodulatrices. Ils peuvent activer les cellules phagocytaires et accroître l'expression des antigènes de surface de classe I et II du CMH et stimuler également la cytotoxicité des cellules NK à l'encontre des cellules tumorales. Il existe trois classes principales d'IFNs, chacune présentant un intérêt dans le cadre de la présente invention. Ces différentes classes, respectivement α , β et γ comprennent chacune de nombreux sous-types.
- 30
- (3) Les facteurs stimulant les colonies CSF (pour Colony Stimulating Factor en anglais), qui interviennent au niveau de la maturation des cellules souches hématopoïétiques et leur différenciation en cellules matures de la circulation sanguine. On distingue les GM-CSF, G-CSF et M-CSF (pour Granulocyte-Macrophage, Granulocyte et Macrophage
- 35

- 10 -

respectivement) selon le stade de maturation et le type cellulaire sur lequel ces facteurs exercent leur influence.

5 (4) Les facteurs nécrosant des tumeurs (TNF). On distingue le TNF α produit par les macrophages et le TNF β produit par les lymphocytes T. Tous deux sont responsables de l'activité cytotoxique anti-tumorale des macrophages et lymphocytes et de l'altération tissulaire locale observée dans la réaction inflammatoire.

10 (5) Les facteurs MIF, qui inhibent la migration des macrophages.

(6) Le fragment C5a du complément, qui est un facteur chimiotactique des macrophages.

Aux fins de la présente invention, sont tout particulièrement préférés, l'IL-2, l'IL-4, l'IL-5, l'IL-6, l'IL-7, l'IFN γ , le GM-CSF et le TNF β .

15

(II)

Les molécules co-stimulantes sont des molécules présentes à la surface cellulaire qui participent d'une façon indirecte à la réaction immunitaire et/ou inflammatoire ; par
20 exemple, des molécules intervenant dans le processus de présentation de l'antigène sous une forme reconnaissable par les cellules du système immunitaire.

A titre de molécules co-stimulantes utiles aux fins de la présente invention, on cite notamment :

25

(1) Les antigènes du complexe majeur d'histocompatibilité (CMH). Chez l'homme, la plupart des cellules nucléées expriment à leur surface des quantités variables d'antigènes de classe I, alors que les antigènes de classe II présentent une distribution restreinte aux lymphocytes B, cellules phagocytaires et lymphocytes T activés. Ces marqueurs de surface
30 cellulaire sont impliqués dans les phénomènes de reconnaissance immune, notamment comme cela a été décrit précédemment, dans l'interaction entre lymphocytes T et cellules CPA et entre lymphocytes T $_c$ et cellules cibles présentant à leur surface des antigènes du non-soi. On peut donc penser que l'intensité de la réponse immunitaire peut être améliorée en augmentant l'expression des antigènes du CMH au site tumoral.

35

(2) Les ligands des marqueurs humains CD27, CD28, CD30 et CD40. En particulier, le ligand du marqueur CD40 se situe à la surface des lymphocytes T activés et est impliqué

dans la stimulation et la prolifération des lymphocytes B. D'autre part, des études *in vitro* ont montré que les ligands des marqueurs CD27 et CD30 induisent la prolifération des lymphocytes T. Quant au ligand du marqueur CD28, encore désigné par certains auteurs protéine B7, il est synthétisé par les CPA et intervient dans la reconnaissance des cellules cibles présentant des antigènes du non-soi à leur surface par les cellules NK permettant ainsi leur destruction.

(3) L'antigène de fonction lymphocytaire de type 1 LFA-1 (pour Leukocyte Function Antigen en anglais). Il s'agit d'un récepteur de surface commun à tous les leucocytes et également présent sur les macrophages, qui joue un rôle important dans les phénomènes d'adhésion cellulaire non-spécifique. Ceux-ci interviennent dans le processus de chimiotactisme en participant à la migration des cellules du système immunitaire vers un site inflammatoire.

(4) La molécule d'adhésion intercellulaire de type 1 (ICAM-1) présente à la surface de nombreux types cellulaires. ICAM-1 est un des ligands de la molécule LFA-1.

(III)

Tel que précédemment énoncé, les chémokines sont des molécules synthétisées à proximité ou au niveau d'un site inflammatoire et qui drainent les cellules du système immunitaire vers ce site. D'une façon générale, les chémokines agissent par l'intermédiaire d'interactions entre d'une part, des molécules d'adhésion présentes à la surface des leucocytes et d'autre part des molécules d'adhésion présentes à la surface des cellules endothéliales (par exemple LFA-1 et ICAM-1). L'attachement des leucocytes aux cellules endothéliales de la paroi vasculaire est suivi de leur migration vers le site inflammatoire.

A titre de chémokines utiles aux fins de la présente invention, on cite notamment :

(1) Le PF-4 (pour Platelet Factor-4 en anglais ; Denel et al., 1977, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 74, 2256) ;

(2) Le RANTES, facteur chimiotactique des différents types de leucocytes (Schall et al., 1988, J. Immunol., 141, 1018) ; et

- 12 -

(3) L'ACT-2 (Ziptel et al., 1989, J. Immunol., 142, 1587). Il s'agit d'une protéine qui favorise l'adhésion des lymphocytes T intervenant dans la reconnaissance de l'antigène associé aux molécules de classe I du CMH.

5 (IV)

Un anticorps monoclonal utile aux fins de présente invention est par exemple, dirigé contre le marqueur de surface cellulaire CD2, CD3, CD28 ou CD40. En effet, certaines études ont montré le rôle d'un tel anticorps dans la stimulation de la prolifération des lymphocytes

10 T.

(V)

Un super-antigène utile aux fins de la présente invention est par exemple, la nucléoprotéine du virus de la rage ou une entérotoxine bactérienne, notamment produite par une bactérie du genre *Staphylococcus*.

15

(VI)

20 Un adjuvant de nature polypeptidique, utile aux fins de la présente invention est par exemple, un produit d'expression d'un gène bactérien "layer" 20S.

25 Le médicament issu de la présente invention est destiné au traitement d'un cancer chez les mammifères, tout particulièrement chez les humains. Les cancers qui pourraient être ainsi traités sont, avantageusement, des tumeurs solides telles que les cancers du sein, du poulmon et du colon. On indique qu'un tel médicament devrait plus particulièrement permettre de traiter les tumeurs secondaires qui sont des complications fréquentes

30

rencontrées dans de nombreux types de cancers et pour lesquelles actuellement il n'existe pas de thérapie satisfaisante.

Le médicament issu de la présente invention peut être administré selon n'importe quelle voie générale communément en usage, notamment par voie parentérale telle que la voie systémique, intramusculaire sous-cutanée ou intraperitonéale. D'une manière générale, la

35

voie intraveineuse est indiquée comme étant particulièrement avantageuse. Alternativement, dans le cas d'une tumeur accessible, le médicament peut être également administré par

injection directe dans le site de la tumeur ou par application topicale. D'une manière générale, l'administration peut avoir lieu en dose unique ou répétée, une ou plusieurs fois après un certain délai d'intervalle.

- 5 Selon un mode de mise en oeuvre préféré de l'invention, le médicament comprendra, outre une quantité thérapeutiquement efficace dudit vecteur viral, un support acceptable d'un point de vue pharmaceutique. Il peut également comprendre un véhicule, un diluant ou un adjuvant acceptable d'un point de vue pharmaceutique et se présenter sous forme liquide ou lyophilisée.

10

- Le dosage approprié varie en fonction de différents paramètres, par exemple de la voie d'administration, de l'individu à traiter, de la nature et de la sévérité de l'état tumoral, du type de vecteur viral mis en oeuvre ou encore du ou des gène(s) codant pour l'agent modulateur. Un des critères qui permet d'évaluer le dosage approprié est la mesure de l'activité sérique de l'agent modulateur. Ces tests d'activité sont des tests standards. En particulier, on peut citer le test de bioactivité en IL-2 (Gillis et al, 1978, J. Immunol., 120, 2027-2032). Cependant en général la dose de vecteur viral / kilo sera de 10^4 à 10^{11} , avantageusement de 10^7 à 10^{10} et de préférence de 10^7 à 10^9 unités formant des plaques (ufp) / kilo.

20

Enfin, la présente invention a également pour objet :

- (i) L'usage d'un vecteur viral présentant un tropisme positif pour les cellules cancéreuses, dans le génome duquel est inséré un fragment d'ADN comportant un ou plusieurs gènes codant pour au moins un agent intervenant dans la destruction des cellules cancéreuses, e.g. un agent modulateur de la réponse immunitaire et/ou inflammatoire, placé sous le contrôle des éléments nécessaires à l'expression, notamment pour délivrer de manière spécifique ledit agent au niveau d'une tumeur cancéreuse ;

- (ii) Une méthode de traitement du cancer chez les mammifères, selon laquelle on injecte à un individu ayant besoin d'un tel traitement, une quantité efficace d'un point de vue pharmaceutique d'un vecteur viral dans le génome duquel est inséré un fragment d'ADN comportant un ou plusieurs gènes codant pour au moins un agent intervenant dans la destruction des cellules cancéreuses, e.g. un agent modulateur de la réponse immunitaire et/ou inflammatoire ; et

35

- 14 -

- (iii) Une méthode pour délivrer de manière spécifique un agent intervenant dans la destruction des cellules cancéreuses, e.g. un agent modulateur de la réponse immunitaire et/ou inflammatoire, selon laquelle on administre par voie générale un vecteur viral dans le génome duquel est inséré un fragment d'ADN comportant un ou plusieurs gènes codant pour tout ou partie dudit agent.

La présente invention est illustrée, sans pour autant être limitée, par les exemples suivants.

EXEMPLES

10

EXEMPLE 1 : Construction des virus de la vaccine recombinants porteurs d'un gène codant pour une cytokine.

15

Les constructions décrites ci-après sont réalisées selon les techniques générales de génie génétique et de clonage moléculaire détaillées dans Maniatis et al. (1989, Laboratory Manual, Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, NY). L'ensemble des étapes de clonage mettant en oeuvre des plasmides bactériens est effectué par passage dans la souche *Escherichia coli* (*E. coli*) 5K ou XL1-Blue (Stratagène), alors que celles mettant en oeuvre des vecteurs dérivés du phage M13 sont réalisées dans *E. coli* NM522.

20

En ce qui concerne les mutagénèses dirigées par oligodésoxynucléotides synthétiques, on applique le protocole décrit par Zoller et Smith (1982, Nucleic Acids Res., 10, 6487) ou on met en oeuvre un kit d'origine commerciale selon les recommandations du fabricant.

25

Les fragments d'ADN comportant les gènes codant pour le GM-CSF, IL-4, IL-5, IL-6 et IL-7, sont soumis à une étape de mutagénèse dirigée afin d'introduire les sites de restriction adéquats en vue de leur insertion dans un vecteur de transfert, en aval du promoteur 7,5K du virus de la vaccine. Deux vecteurs de transfert sont utilisés : pTG186-poly (décrit dans la demande de brevet EP 206 920) et pTG194. Ce dernier diffère de

30

pTG186-poly par l'orientation du polylinker.

Plus précisément :

35

Un fragment portant l'ADNc codant pour le GM-CSF murin tel que décrit dans Gough et al. (1984, Nature, 309, 763) est soumis à une mutagénèse dirigée après clonage dans M13TG130 (Kieny et al., 1983, Gene, 26, 91), afin de créer un site *Bam*HI en position

- 15 -

-17 par rapport à l'ATG initiateur de la traduction. Le fragment *Bam*HI-*Sal*I isolé du vecteur en résultant est inséré entre les mêmes sites de pTG194.

5 Un fragment *Eco*RI-*Bam*HI portant l'ADNc codant pour l'IL-4 murin tel que décrit dans Lee et al. (1986, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 83, 2061) est introduit dans le vecteur M13TG130 et soumis à une mutagénèse dirigée, afin de créer un site *Bgl*II immédiatement en amont de l'ATG initiateur de la traduction. Le vecteur ainsi traité est digéré par *Eco*RI et *Bgl*II et le fragment correspondant introduit entre les mêmes sites de pTG194.

10 Un fragment *Eco*RI-*Bam*HI portant l'ADNc codant pour l'IL-5 murin tel que décrit dans Kinashi et al. (1986, Nature, 324, 70) est tout d'abord sous cloné dans le vecteur M13TG130 puis soumis à une mutagénèse dirigée, afin d'introduire un site *Pst*I en position -10 et un A en position -3 par rapport à l'ATG initiateur de la traduction. Le vecteur ainsi traité est digéré par *Eco*RI et *Pst*I et le fragment correspondant inséré entre les mêmes sites
15 de pTG186-poly.

Un fragment *Eco*RI portant l'ADNc codant pour l'IL-6 murin tel que décrit dans Van Snick et al. (1988, Eur. J. Immunol., 18, 193) est sous cloné dans le vecteur M13TG131 (Kieny et al., *supra*) et soumis à une mutagénèse dirigée, afin d'introduire un site *Bam*HI
20 en position -9 et un A en position -3 par rapport à l'ATG initiateur de la traduction. Le vecteur ainsi traité est digéré par *Eco*RI et *Bam*HI et le fragment correspondant inséré entre les sites *Bam*HI et *Eco*RI de pTG194.

Un fragment *Sst*I-*Hind*III portant l'ADNc codant pour l'IL-7 murin tel que décrit dans Naman et al. (1988, Nature, 333, 571) est sous cloné dans le vecteur M13TG130 et
25 soumis à une mutagénèse dirigée, afin de créer un site *Eco*RV en position -11 et un A en position -3 par rapport à l'ATG initiateur de la traduction. On isole un fragment *Eco*RV-*Pst*I du vecteur ainsi obtenu que l'on clone entre les sites *Sma*I et *Pst*I de pTG194.

30 A l'aide des vecteurs de transfert obtenus ci-dessus, on produit les virus de la vaccine correspondants selon la méthode de recombinaison homologue décrite par Kieny et al. (1984, Nature, 312, 163). Les virus recombinants ainsi obtenus sont désignés VV-GM-CSF, VV-IL-4, etc.

35 D'autres virus de la vaccine recombinants ont été précédemment décrits ; en particulier ceux comportant l'ADNc codant (i) pour l'IL-2 humaine (demande de brevet

- 16 -

EP 206 939), (ii) pour l'IL-6 humaine (Nakagawa et al., 1991, Eur. Cytokine Net., 2, 11-16) et (iii) pour l'IFN γ humain (demande de brevet EP 206 920).

EXEMPLE 2 : Traitement de souris Swiss nude porteuses de tumeurs par un virus de la vaccine comportant le gène codant pour l'IL-6 (VV-IL-6)

1. Préparation des souris Swiss nude porteuses de tumeurs

La lignée cellulaire SW948 (ATCC CCL 237) générée à partir d'une tumeur humaine colorectale est cultivée en continu selon les recommandations du fournisseur. Les cellules que l'on récolte sont traitées par la trypsine puis par la désoxyribonucléase (10 μ g/ml) pendant 5 min. Elles sont ensuite lavées dans du PBS (tampon phosphate salin Dulbecco ; Sigma, D5652) et resuspendues dans ce même tampon à la concentration de 10^7 cellules / 100 μ l.

Des souris femelles Swiss nude (Iffa Credo, France) âgées de 6 à 8 semaines reçoivent chacune 100 μ l de la suspension cellulaire ainsi obtenue, par voie sous-cutanée. Sept jours plus tard, on sélectionne les souris porteuses de tumeurs palpables.

2. Test

Ces souris sont réparties en lots de huit environ. Deux lots sont destinés à servir de lots contrôle : les souris reçoivent soit 10^7 , soit 10^8 ufp d'un virus de la vaccine non recombinant, TK-, généré à partir du vecteur de transfert pTG186-poly (VV-186). Les souris d'un troisième lot (lot-témoin négatif) reçoivent uniquement 100 μ l de PBS. Enfin, les souris de deux autres lots reçoivent soit 10^7 , soit 10^8 ufp du VV-IL-6 murin obtenu à l'Exemple 1.

Les virus sont administrés en solution de PBS, par voie intraveineuse au niveau de la queue.

Sept jours après les injections, on prélève 3 souris dans chacun des lots, et on les sacrifie afin d'analyser le contenu viral de leurs sang, organes et tumeurs, comme suit.

Les tumeurs et différents organes (foie, rate, cerveau, etc) une fois prélevés, sont traités à la trypsine et disloqués mécaniquement jusqu'à l'obtention d'une suspension. Le sang prélevé est dilué volume à volume dans du tampon PBS comprenant 20 mM d'EDTA.

- 17 -

Les cellules ainsi obtenues sont lavées deux fois dans du PBS, resuspendues dans du milieu de culture MEM Dubelcco (Modified Eagles Medium ; Gibco BRL) comprenant 10% de sérum foetal de veau. Le nombre des cellules (viabiles et non-viabiles) est estimé par comptage selon les méthodes classiques. Puis on effectue des dilutions en série de 10 en 10 dans du tampon PBS. On ajoute 1 µl, 10 µl ou 100 µl de chacune des dilutions dans des cultures de cellules BHK établies en boîte de pétri de 3cm de diamètre (Falcon 3001). Les boîtes sont incubées toute la nuit à 37°C dans 5% de CO₂ et les plages de lyse dénombrées le jour suivant.

En ce qui concerne les souris non-sacrifiées, on enregistre l'évolution de la croissance des tumeurs au cours du temps, en mesurant la longueur, la largeur et la profondeur des tumeurs à l'aide d'un pied à coulisse. Le volume de chaque tumeur est calculé en appliquant la formule des ellipsoïdes $\frac{4}{3}\pi r_1 r_2 r_3$, dans laquelle r_1 , r_2 et r_3 représentent respectivement la longueur, largeur et profondeur réduites de moitié.

3. Résultats

Quelque soit le type de virus injecté, on constate que le taux d'infection des cellules tumorales est très supérieur à celui des tissus sains.

La croissance des tumeurs des souris ayant reçues le VV-IL-6, quelque soit la dose, est moindre par rapport à celles des lots témoins et du contrôle négatif. Des souris présentent une régression totale des tumeurs environ 15 jours après l'administration de VV-IL-6.

EXEMPLE 3 : Traitement de souris DBA/2 porteuses de tumeurs par un virus de la vaccine comportant le gène codant pour IL-2 (VV-IL-2)

L'Exemple 2 est répété en utilisant :

- (i) le virus de la vaccine comportant le gène codant pour l'IL-2 humaine, tel que décrit dans la demande de brevet EP 206 939 ;
- (ii) la lignée cellulaire murine P815 (ATCC TIB 64) issue d'un mastocytome de souris DBA/2 ; et
- (iii) des souris femelles DBA/2 (Iffa Credo, France) âgées de 6 à 8 semaines.

- 18 -

Les variantes sont comme suit : 10^5 cellules P815 sous un volume de 100 μ l sont injectées aux souris DBA/2. 10^8 ufp de virus sont injectées aux souris de chacun des lots. Les souris destinées aux analyses biologiques sont prélevées dans les lots 3 jours après les injections.

- 5 On observe des résultats comparables à ceux reportés dans l'Exemple 2.

EXEMPLE 4 : Traitement de souris DBA/2 porteuses de tumeurs par un virus de la vaccine comportant le gène codant pour le GM-CSF (VV-GM-CSF)

- 10 L'exemple 3 est répété en utilisant 10^8 ufp de VV-GM-CSF. On enregistre l'évolution de la croissance de la tumeur au cours du temps comme indiqué dans l'exemple 1. Comme précédemment, on observe chez certains animaux du lot test, un ralentissement de la croissance des tumeurs par rapport aux lots témoins et au contrôle négatif. Trois souris sur
15 10 présentent une régression totale des tumeurs 15 jours après l'administration du vecteur viral.

Revendications

1. Usage d'un vecteur viral, dans le génome duquel est inséré un fragment d'ADN comportant un ou plusieurs gènes codant pour tout ou partie d'un agent modulateur de la réponse immunitaire et/ou inflammatoire sélectionné parmi les molécules co-stimulantes de surface cellulaire, les chémokines, les anticorps monoclonaux dirigés contre des marqueurs de surface lymphocytaire, les super-antigènes caractéristiques d'un organisme infectieux (bactérie, virus ou parasite), et les polypeptides à fonction d'adjuvant, pour la préparation d'un médicament pour le traitement d'un cancer chez les mammifères.
2. Usage d'un vecteur viral selon la revendication 1, selon lequel ledit médicament est destiné à être administré par voie parentérale et notamment par voie intraveineuse ou intramusculaire.
3. Usage d'un vecteur viral selon la revendication 1 ou 2, selon lequel les molécules co-stimulantes de surface cellulaire sont sélectionnées parmi les antigènes de classes I et II du complexe majeur d'histocompatibilité (CMH), les ligands des marqueurs CD27, CD28, CD30 et CD40, l'antigène de fonction lymphocytaire de type 1 (LFA-1) et la molécule d'adhésion intercellulaire de type 1 (ICAM-1).
4. Usage d'un vecteur viral selon la revendication 1 ou 2, selon lequel les chémokines, sont sélectionnées parmi le PF-4 (Platelet Factor-4), le RANTES et l'ACT-2.
5. Usage d'un vecteur viral selon la revendication 1 ou 2, selon lequel les anticorps monoclonaux sont sélectionnés parmi les anticorps monoclonaux anti-CD2, anti-CD3, anti-CD28 et anti-CD40.
6. Usage d'un vecteur viral dans le génome duquel est inséré un fragment d'ADN comportant un ou plusieurs gènes codant pour au moins une cytokine, pour la préparation d'un médicament pour le traitement d'un cancer chez les mammifères ; ledit médicament étant destiné à être administré par voie parentérale et notamment par voie intraveineuse ou intramusculaire.

7. Usage d'un vecteur viral selon la revendication 6, selon lequel les cytokines sont sélectionnées parmi les interleukines, les interférons, les facteurs stimulant les colonies (CSF), les facteurs nécrosant les tumeurs (TNF), les facteurs inhibant la migration des macrophages (MIF) et le fragment C5a du complément.
- 5 8. Usage d'un vecteur viral selon la revendication 7, selon lequel les cytokines sont sélectionnées parmi les interleukines 2, 4, 5, 6 et 7, l'interféron gamma, le facteur stimulant les colonies de type granulocyte-macrophage (GM-CSF) et le facteur nécrosant les tumeurs de type β (TNF β).
- 10 9. Usage d'un vecteur viral selon l'une des revendications 1 à 8, pour la préparation d'un médicament pour le traitement d'un cancer chez les humains.
10. Usage d'un vecteur viral selon l'une des revendications 1 à 9, pour la préparation d'un médicament pour le traitement d'une tumeur cancéreuse solide chez les mammifères.
- 15 11. Usage d'un vecteur viral selon l'une des revendications 1 à 10, selon lequel le vecteur viral est dérivé d'un virus sélectionné parmi les poxvirus, les adénovirus, les rétrovirus et les virus de l'herpès.
- 20 12. Usage d'un vecteur viral selon l'une des revendications 1 à 11, selon lequel le vecteur viral est un vecteur non-intégratif.
13. Usage d'un vecteur viral selon l'une des revendications 1 à 12, selon lequel le vecteur viral est un vecteur non-réplicatif.
- 25 14. Usage d'un vecteur viral selon la revendication 11, selon lequel le vecteur viral est dérivé d'un poxvirus.
15. Usage d'un vecteur viral selon la revendication 14, selon lequel le vecteur viral est dérivé d'un poxvirus aviaire.

16. Usage d'un vecteur viral selon la revendication 14, selon lequel le vecteur viral est dérivé d'un virus de la vaccine.
17. Usage d'un vecteur viral selon l'une des revendications 1 à 16, selon lequel le vecteur
5 viral comprend en outre un gène codant pour un antigène spécifique de tumeur.
18. Usage d'un vecteur viral présentant un tropisme positif pour des cellules cancéreuses, dans le génome duquel est inséré un fragment d'ADN comportant un ou plusieurs gènes codant pour au moins un agent intervenant dans la destruction des cellules cancéreuses,
10 placé sous le contrôle des éléments nécessaires à l'expression, pour délivrer de manière spécifique ledit agent au niveau d'une tumeur cancéreuse.
19. Usage d'un vecteur viral selon la revendication 18, dans le génome duquel est inséré un fragment d'ADN comportant un ou plusieurs gènes codant pour un agent modulateur
15 de la réponse immunitaire et/ou inflammatoire, placé sous le contrôle des éléments nécessaires à l'expression, pour délivrer de manière spécifique ledit agent modulateur de la réponse immunitaire et/ou inflammatoire au niveau d'une tumeur cancéreuse.
20. Usage d'un vecteur viral selon la revendication 18 ou 19, selon lequel le vecteur viral
20 est dérivé d'un poxvirus.